Б.Р. ДИЛД

ОПЕРАТОРНАЯ ТЕХНИКА В АТОМНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

(главы 1 - 4)

Перевод с английского
Л.Я. Шекуна

Казанский государственный университет,
кафедра теоретической физики

1965 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие редактора	5
Предисловие автора	5
Глава 1. Классические методы	5
§ 1-1. Введение	5
§ 1-2. Приближение центрального поля	6
§ 1-3. Возмущения	10
§ 1-4. Оператор углового момента	13
§ 1-5. $3-j$ символы	17
§ 1-6. Слетеровские детерминанты	23
§ 1-7. Матричные элементы	27
§ 1-8. Конфигурация sd	29
§ 1-9. Недостатки метода	35
З а д а ч и	36
Глава 2. Кристаллическое поле	41
§ 2-1. Вклад в гамильтониан	41
§ 2-2. Конечные группы	44
§ 2-3. Группа октаэдра	50
§ 2-4. Трехмерная группа вращений	54
§ 2-5. Собственные функции и операторы	57
§ 2-6. Теорема Вигнера-Экарта	60
§ 2-7. Тензорные операторы	64
§ 2-8. Внешнее магнитное поле	69
§ 2-9. Шестифтористый нептуний	72
З а д а ч и	78
Глава 3. $n-j$ символы	81
§ 3-1. Три угловых момента	81

КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

§ 1-1. Введение

Все атомы, за исключением самых легких, являются весьма сложными динамическими системами. Для анализа свойств таких систем сначала нужно делать некоторые допущения и использовать приближенные методы. Их ближайшей целью является упрощение математики, но важно руководствоваться также и физическими соображениями, поскольку целью анализа является не только как можно более точное описание свойств конкретного атома, но также и проникновение в его структуру и выявление таких особенностей, которые присущи и другим атомам. После того как допущения сделаны и приближения выбраны, нужно путем строгого расчета определить, к каким последствиям они ведут.

Общепринятые методы осуществления этих двух этапов описаны Кондоном и Шортли в их классическом труде "Теория атомных спектров" [1]. Их первоначальные допущения остаются, пожалуй, неизменными и на сегодняшний день, зато вторая стадия анализа, часто наиболее трудоемкая, до неузнаваемости изменилась после новаторских работ Рака. Тем не менее, знакомство с более прямыми методами важно для восприятия новых результатов теории. Поэтому мы начнем с изложения основных допущений, а затем используем технику Кондона и Шортли. Это особенно интересно сейчас, когда нам открылись иные, более мощные методы.

§ 1-2. Приближение центрального поля.

Для начала мы представим себе атом в виде точечного ядра с бесконечной массой и зарядом Ze , окруженного N электронами с массами m и зарядами $-e$. Нерелятивистский гамильтониан такой системы есть

$$H = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_i^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r_i} \right) + \sum_{i>j=1}^N \frac{e^2}{r_{ij}}$$

Здесь r_i — расстояние i -того электрона от ядра, r_{ij} — расстояние от i -того до j -того электрона.

Вторая сумма в H не позволяет разделить переменные в уравнении Шредингера. Кроме того, она слишком велика, чтобы её можно было опустить и рассмотреть позже как возмущение. Наше допущение будет состоять в том, что мы будем считать, что потенциал, которому подчиняется движение электрона, может быть представлен функцией $-U(r_i)/e$. Приближенным гамильтонианом тогда будет

$$E = \sum_i \left(\frac{p_i^2}{2m} + U(r_i) \right)$$

Разность $H - E$ служит возмущением. Переменные в уравнении Шредингера

$$\sum_{i=1}^N \left(-\hbar^2 \nabla_i^2 / 2m + U(r_i) \right) \Psi = E' \Psi$$

можно разделить некоторым набором функций $\Psi(k_i)$. Тогда

$$\Psi = \prod_{i=1}^N \psi_i(k_i) \quad E' = \sum_{i=1}^N E'(k_i)$$

Опустив ненужные индексы электронов, мы найдем, что все результирующие уравнения будут иметь вид

$$(-\hbar^2 \nabla^2 / 2m + U(r)) \Psi(k) = E'(k) \Psi(k) \quad (1.1)$$

Разница между уравнением (1.1) и уравнением Шредингера для атома водорода состоит лишь в том, что вместо $-e^2/r$ здесь стоит $U(r)$. Поэтому нормированные решения для связанных состояний можно записать в виде

$$\Psi(k) = r^{-1} R_{nl}(r) Y_{lm_l}(\theta, \varphi), \quad (1.2)$$

где сферические функции Y_{lm} определяются равенствами

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = (-1)^m \left\{ \frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!} \right\} P_l^m(\cos\theta) e^{im\varphi} \quad (1.3)$$

и

$$P_l^m(x) = \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}m}}{2^l l!} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l \quad (1.4)$$

Радиальная функция $R_{nl}(r)$ зависит от центрального потенциала $U(r)$; угловая часть $\Psi(k)$ совпадает с угловой частью водородной волновой функции. Символ k следует понимать как набор квантовых чисел (nlm_l) . Как и в случае атома водорода, количество узлов (не считая начала) у R_{nl} равно $n-l-1$; однако дозволённые энергии $E'(k)$ вырождены только по m_l , а не по m_l и l , как это имеет место в атоме водорода.

Спин электрона можно учесть, умножая $\Psi(k)$ на α или β в соответствии с двумя его возможными ориентациями ($m_s = \pm \frac{1}{2}$) относительно оси Z . При образовании функции Ψ мы считаем $\Psi(k_1), \Psi(k_2), \Psi(k_3) \dots$ функциями координат электронов $1, 2, 3, \dots$, однако ясно, что любая перестановка электронов отно-

сительно функций также даст решение уравнения Шредингера. Из-за наличия спина каждое из $3!$ произведений типа Ψ должно быть умножено на $3!$ спиновых волновых функций, по одной на каждый электрон. Из всех возможных линейных комбинаций этих сложных произведений приемлемы, в качестве собственных функций, которые могут встретиться в природе, только такие, которые полностью антисимметричны по отношению к одновременной перестановке пространственных и спиновых переменных любой пары электронов. Это математическое выражение принципа Паули. Он ограничивает исходные волновые функции так называемыми "слетеровскими детерминантами"*)). Примером такого детерминанта для атома с тремя электронами будет

$$\Psi^3 = (3!)^{-\frac{1}{2}} \begin{vmatrix} \Psi_1(k_1)\alpha_1 & \Psi_1(k_1)\beta_1 & \Psi_1(k_2)\alpha_1 \\ \Psi_2(k_1)\alpha_2 & \Psi_2(k_1)\beta_2 & \Psi_2(k_2)\alpha_2 \\ \Psi_3(k_1)\alpha_3 & \Psi_3(k_1)\beta_3 & \Psi_3(k_2)\alpha_3 \end{vmatrix} \quad (1.5)$$

К счастью, детерминанты такого рода не обязательно выписывать полностью, так как вся нужная информация поставляется диагональными элементами. Используя знаки плюс и минус вместо функций α и β , т.е. вместо $m_s = \pm \frac{1}{2}$, мы можем упростить

$$\Psi^3: \quad \Psi^3 = \{ \bar{k}_1 \bar{k}_1 \bar{k}_2 \} \quad (1.6)$$

Фигурные скобки означают, что подразумевается слетеровский детерминант. Свойства таких функций следуют из (1.5). Например:

$$\{ \bar{k}_1 \bar{k}_1 \bar{k}_2 \} = - \{ \bar{k}_1 \bar{k}_2 \bar{k}_2 \} = \{ \bar{k}_1 \bar{k}_2 \bar{k}_1 \} \quad (1.7)$$

*) В английской литературе принят термин "determinantal product state" (прим. перев.).

Когда изучают общие свойства слетеровских детерминантов, то часто бывает удобно включить спиновое квантовое число m_s в набор $k = (nlm_l)$. Для обозначения полного набора из четырех квантовых чисел мы будем использовать символ K . Кроме того, если, например, $K_j = k_j^+$, то вместо $\psi_i(k_j) d_i$ мы будем писать $\psi_i(K_j)$. Раскрывая обобщенный слетеровский детерминант, мы получим

$$\{K_1 K_2 \dots K_N\} = (N!)^{-\frac{1}{2}} \sum_{\bar{P}} (-1)^{\bar{P}} \psi_1(K_1) \psi_2(K_2) \dots \psi_N(K_N), \quad (1.8)$$

где сумма распространяется на все $\bar{P}$ перестановок координат электронов среди состояний, определяемых квантовыми числами $K_1, K_2, \dots, K_N$ а $\bar{P}$ - четность перестановки: $\bar{P} = +1$ если перестановка четная, и $\bar{P} = -1$, если она нечетная.

Поскольку собственные значения $E'(K)$ вырождены по m_l и m_s , то их можно различать с помощью перечня символов

$$(n_1 l_1) (n_2 l_2) \dots (n_N l_N)$$

Говорят, что эта последовательность задает электронную конфигурацию. По традиции, вместо цифр 0, 1, 2, 3, 4..., для обозначения величины l используются буквы s, p, d, f, g...; сверху ставят индекс, показывающий, сколько раз встречается данный символ (nl) . Замкнутая оболочка возникает тогда, когда индекс равен $2(2l+1)$. Это значит, что присутствуют все наборы $K = (nlm_l m_s)$, возможные при данных n и l . Наличие всех азимутальных чисел придает замкнутой оболочке инертный характер, и поэтому обычно в слетеровском детерминан-

те не нужно выписывать все квантовые числа полностью. Такое упрощение полезно потому, что наличие замкнутых оболочек является общим свойством энергетически низко расположенных конфигураций.

Если электроны вне замкнутых оболочек эквивалентны, т.е. обладают одними и теми же числами n и l , то в слетеровском детерминанте эти числа можно не повторять. Например, электронная конфигурация Nd^{3+} есть

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6 4f^3.$$

В незамкнутой оболочке находятся только три $4f$ -электрона. Поэтому исходные собственные функции можно писать в виде

$$\left\{ \begin{matrix} + & + & - \\ 3 & 2 & 1 \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} + & + & - \\ 3 & 1 & -2 \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} 0 & -1 & -3 \end{matrix} \right\} \text{ и т. д.} \quad (1.9)$$

Цифры задают m_l . Предполагается, что для всех трех электронов $(nl) \equiv (4f)$.

§ 1-3. Возмущения

Гамильтониан $\hat{E}$ дает серию энергетических уровней, называемых конфигурациями. Обычно они очень сильно вырождены. Так например, слетеровских детерминантов вида (1.9) существует 364 - и это для конфигурации, в которой на незаполненной оболочке находятся всего три f -электрона. Вырождение частично снимается возмущением

$$H - E = \sum_{i=1}^N \left(\frac{-Ze^2}{r_i} - u(r_i) \right) + \sum_{i>j=1}^N \frac{e^2}{r_{ij}}$$

Влияние первой суммы сводится к сдвигу всей конфигурации в целом. Поскольку мы интересуемся почти исключительно структурой одной конфигурации, этот член можно опустить, и тогда остается

$$H_1 = \sum_{i,j=1}^N \frac{e^2}{r_{ij}} \quad (1.10)$$

К упрощенному гамильтониану H будут и другие поправки. Так, можно устранить нерелятивистское ограничение, воспользовавшись уравнением Дирака для одного электрона, движущегося в центральном поле с потенциалом $u(r)$. Если средняя скорость электрона мала по сравнению со скоростью света c , то релятивистские поправки выглядят в виде добавочных членов в нерелятивистском гамильтониане [2]. Из них наиболее важной для наших целей поправкой является

$$\hbar s \cdot (\text{grad } u \times \bar{p}) / 2m^2 c^2 \quad (1.11)$$

где $\bar{p}$ - импульс электрона. Спиновый угловой момент электрона обозначен через s ; его z -компонента s_z обладает собственными значениями $+\frac{1}{2}$ и $-\frac{1}{2}$ для состояний, определяемых символами "+" и "-", введенных в разделе 1-2. Так как u зависит только от r , то

$$\text{grad } u = \frac{r}{r} \frac{du}{dr}$$

и (1.11) приобретает вид

$$\frac{\hbar^2}{2m^2 c^2 r} \frac{du}{dr} s \cdot l, \quad (1.12)$$

где l - орбитальный угловой момент электрона в единицах $\hbar$:

$$l = (r \times p) / \hbar. \quad \text{Для многоэлектронного атома (1.12)}$$

надо заменить на

$$H_2 = \sum \xi(r_i) \underline{s}_i \underline{l}_i, \quad (1.13)$$

где

$$\xi(r) = \frac{\hbar^2}{2m^2 c^2 r} \frac{du}{dr}$$

Это выражение для H_2 эквивалентно выражению для спин-орбитального взаимодействия, даваемому Кондоном и Шортли.

Для свободных атомов и ионов сумме $H_1 + H_2$ обычно является заведомо самым большим вкладом в возмущение. Под её влиянием каждая конфигурация распадается на уровни. Чтобы рассчитать влияние $H_1 + H_2$ мы предположим сначала, что величины l разбросаны настолько сильно, что конфигурации можно исследовать порознь. Задача состоит в наложении возмущения $H_1 + H_2$ на вырожденный уровень энергии, причем за базисные функции следует брать детерминанты, которые для одной последовательности

$$(n_1 l_1)(n_2 l_2) \dots (n_N l_N),$$

получаются перечислением всех возможных значений m_{l_1} и m_{l_2}

Прямой метод состоит в том, что строки и столбцы матрицы возмущения нумеруются с помощью детерминантов, а затем надо вычислить матричные элементы $H_1 + H_2$ и решить вековое уравнение

Эта процедура приемлема лишь для самых простых конфигураций;

в случае $d^3 4f^3$, например, надо вычислить

$364 \times 364 = 132496$ матричных элементов. Не говоря об утомительности этой процедуры, она не позволяет проникнуть в структуру

конфигурации, не дает способа для нумерации собственных значений, и не извлекает выгоды из того факта, что при решении векового уравнения часто появляются одинаковые корни.

§ 1-4. Оператор углового момента

Для того, чтобы получить возможность уменьшения трудно-
стей прямого метода, нам потребуются некоторые сведения об опе-
раторе углового момента. Основные соотношения коммутации для
компонент J_x, J_y, J_z вектора углового момента $\underline{J}$ суть

$$[J_x, J_y] = iJ_z, [J_y, J_z] = iJ_x, [J_z, J_x] = iJ_y \quad (1.14)$$

где

$$[A, B] = AB - BA$$

Нормированные состояния, в обозначениях Дирака [3], задают-
ся двумя квантовыми числами J и M . Хорошо известно [1],
что соотношения коммутации (1.14) приводят к уравнениям

$$J_z |J, M\rangle = M |J, M\rangle$$

$$J^2 |J, M\rangle = J(J+1) |J, M\rangle$$

$$J_+ |J, M\rangle = e^{i\varphi} \sqrt{J(J+1) - M(M+1)} |J, M+1\rangle$$

$$J_- |J, M\rangle = e^{-i\varphi} \sqrt{J(J+1) - M(M-1)} |J, M-1\rangle$$

(1.15)

Символы J_+ и J_- стоят, соответственно, вместо $J_x + iJ_y$
и $J_x - iJ_y$. Поскольку они увеличивают и уменьшают M их иног-
да называют операторами сдвига. Квантовое число J является
целым кратным от $\frac{1}{2}$. При заданном J число M может иметь
одно из $2J+1$ значений $J, J-1, \dots, -J$. Произвольный фазо-
вый угол φ не может влиять на какой-либо физический резуль-
тат, и для удобства мы, следуя [1], положим $\varphi = 0$. Вопрос о
фазах постоянно возникает в теории углового момента; мы, вме-

сте с Эдмондсом [4], будем всегда выбирать их так же, как Кондон и Шортли. Следует отметить, что величины, стоящие под корнем в двух последних уравнениях (1.15), можно разложить на множители. Однако запомнить их гораздо легче в том виде, как они здесь записаны, так как в обоих случаях то, что вычитается из $J(J+1)$ представляет из себя произведение M , связанное с оператором спина.

Для нахождения собственных значений кулоновского взаимодействия H_1 , удобно ввести полный орбитальный и полный спиновый угловой момент электронов, а именно

$$\underline{S} = \sum_i \underline{s}_i \quad \text{и} \quad \underline{L} = \sum_i \underline{l}_i$$

Волновые функции, которые должны быть некоторыми линейными комбинациями слатеровских детерминантов, будут тогда характеризоваться квантовыми числами $\gamma S M_S L M_L$. Символ γ обозначает другие квантовые числа, которые нужны тогда, когда набора $S M_S L M_L$ не хватает для того, чтобы задать состояние однозначно. Величины $\underline{S}$ и $\underline{L}$ важны потому, что они коммутируют с H_1 ; для $\underline{S}$ это очевидно, а для $\underline{L}$ это нетрудно доказать. Например,

$$L_z = \frac{1}{i} \sum_j (x_j \frac{\partial}{\partial y_j} - y_j \frac{\partial}{\partial x_j})$$

коммутирует с

$$H_1 = e^2 \sum_{i>j} [(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2]^{-\frac{1}{2}}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} & (\gamma S M_S L M_L | H_1 | \gamma' S' M'_S L' M'_L) M'_L \\ &= (\gamma S M_S L M_L | H_1 L_z | \gamma' S' M'_S L' M'_L) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (\gamma S M_S L M_L | L_2 H_1 | \gamma' S' M_S' L' M_L') \\
 &= M_L (\gamma S M_S L M_L | H_1 | \gamma' S' M_S' L' M_L')
 \end{aligned}$$

Если $M_L \neq M_L'$, то матричный элемент исчезает. Беря L^2 вместо L_2 , мы получим, что исчезают все те матричные элементы, для которых $L \neq L'$. По аналогичной причине исчезают все матричные элементы, недиагональные по S или по M_S .
 Более того, равенства

$$\begin{aligned}
 &(\gamma S M_S L M_L | H_1 | \gamma' S' M_S' L' M_L') \\
 &= (\gamma S M_S L M_L | H_1 L_+ | \gamma' S' M_S' L' M_L') [L(L+1) - M_L(M_L-1)]^{-\frac{1}{2}} \\
 &= (\gamma S M_S L M_L - 1 | H_1 | \gamma' S' M_S' L' M_L'),
 \end{aligned}$$

показывает, что матричные элементы не зависят от M_L , и, по той же причине, от M_S . Поэтому строки и столбцы матрицы H_1 можно просто нумеровать с помощью γ, S и L ; векторный определитель распадается на ряд определителей более низкого порядка, каждый из которых соответствует паре квантовых чисел $2L$. Собственные значения не зависят от M_S и M_L и поэтому $(2L+1)(2S+1)$ - кратно вырождены. Совокупность состояний, принадлежащих одному и тому же собственному значению, называется термом. Величину L показывает заглавная буква, согласно следующей схеме:

$$\begin{array}{cccccccccccccc}
 L = & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & \dots \\
 & S & P & D & F & G & H & I & K & L & M & N & O & Q & \dots
 \end{array}$$

Слева сверху ставится индекс, задающий мультиплетность $2S+1$.
 Так например, терм 4I , встречающийся в конфигурации $4f^3$,
 объединяет 52 вырожденных состояния, для которых $S = \frac{3}{2}$, $L = 6$

Большое вырождение термов частично снимается спин-орби-
 тальным взаимодействием H_2 , которое коммутирует не с $\underline{S}$ и $\underline{L}$
 порознь, а с их суммой $\underline{J} = \underline{L} + \underline{S}$. Это можно доказать для J_z
 следующим образом:

$$J_z \sum_i s_i l_i = \sum_{i \neq k} j_{kz} s_i l_i + \sum_i j_{iz} l_i s_i$$

Функция $\xi(\underline{r}_i)$, не зависящая от угловых переменных, комму-
 тирует с $\underline{J}$ и поэтому опущена. Очевидно, что если $i \neq k$, то
 j_{kz} коммутирует с $s_i l_i$. Остается рассмотреть один член из
 второй суммы:

$$\begin{aligned} j_z(s_l) &= (s_z + l_z)(s_x l_x + s_y l_y + s_z l_z) = \\ &= (s_x s_z + i s_y) l_x + (s_y s_z - i s_x) l_y + s_z l_z s_z + \\ &+ s_x (l_x l_z + i l_y) + s_y (l_y l_z - i l_x) + s_z l_z l_z = \\ &= (s_l) j_z \end{aligned}$$

Если $H_2 \ll H_1$, то можно адекватно описать схему энергетиче-
 ских уровней, считая термы изолированными. Различные значения
 J пишутся у символа терма внизу справа; например, терм 4I
 конфигурации f^3 образует мультиплет $^4I_{7/2}$, $^4I_{9/2}$, $^4I_{11/2}$
 и $^4I_{13/2}$. Однако, если матричные элементы H_2 между разными
 термами сравнимы с расстояниями между ними, то рассмотрение
 каждого терма по отдельности уже не будет хорошим приближени-
 ем, и нужно строить полную матрицу $H_1 + H_2$. Хотя в качестве

базиса можно использовать функции $(\gamma S M_S L M_L)$ гораздо удобнее набор $(\gamma S L J M_J)$. Причина этого предпочтения похожа на ту, что побудила нас заменить детерминантные функции набором $(\gamma S M_S L M_L)$ вековой определитель распадается на определители низших порядков, и мы избегаем многократного нахождения повторяющихся корней.

Так как H_1 и H_2 есть функции координат отдельных электронов, и их нельзя выразить через S, L и J , то получается, что на самом деле вычисление матричных элементов H_1 и H_2 может быть произведено только тогда, когда базисные состояния $(\gamma S L J M_J)$ выражены через детерминантные функции. Преобразования такого рода часто встречаются при изучении систем из многих частиц и заслуживают детального рассмотрения.

§ 1-5 3-j символы

Выражение состояний типа $(\gamma S L J M_J)$ через слетеровские детерминанты лучше всего начинать с перехода к $S L M_S M_L$ квантованию. В качестве примера рассмотрим основной уровень f^2 , а именно 3H_4 . Пусть M_J имеет наибольшую возможную величину. Тогда три решения уравнения

$$M_S + M_L = M_J = 4$$

приводят к

$$L=5, S=1, J=4$$

$$|{}^3H_4, M_J=4\rangle = a |{}^3H, M_S=1, M_L=3\rangle + b |{}^3H, 0, 4\rangle +$$

$$+ c |{}^3H, -1, 5\rangle$$

(1-16)

Коэффициенты a, b, c - это частные случаи коэффициентов векторного сложения, $\langle S M_S L M_L | S L J M_J \rangle$ Это так

называемые коэффициенты Клебше-Гордана или коэффициенты Витнера. Если взять максимальное M_J , то коэффициенты векторного сложения можно быстро вычислить с точностью до фазового множителя, действуя оператором $J_+ = S_+ + L_+$ и замечая тот факт, что результат должен быть тождественно равен нулю. Например, равенство

$$J_+ |^3H_4, 4\rangle = 0$$

ведет к

$$a(5 \cdot 6 - 3 \cdot 4)^{\frac{1}{2}} |1, 4\rangle + b(1 \cdot 2 - 0 \cdot 1)^{\frac{1}{2}} |1, 4\rangle + b(5 \cdot 6 - 4 \cdot 5)^{\frac{1}{2}} |0, 5\rangle + c(1 \cdot 2 - (-1) \cdot 0)^{\frac{1}{2}} |0, 5\rangle = 0$$

В силу ортогональности состояний $(\gamma S M_S L M_L)$ имеем

$$a(18)^{\frac{1}{2}} + b(2)^{\frac{1}{2}} = 0, \quad b(10)^{\frac{1}{2}} + c(2)^{\frac{1}{2}} = 0$$

Уравнение $aa^* + bb^* + cc^* = 1$ следует из того, что

$$(^3H_4, 4 | ^3H_4, 4) = 1 \quad \text{и из}$$

$$(^3H, M_S M_L | ^3H, M'_S M'_L) = \delta(M_S M'_S) \delta(M_L M'_L).$$

Таким образом,

$$aa^*(1+9+45) = 1 = 55aa^*,$$

откуда $a = e^{i\omega} / \sqrt{55}$ Если мы положим $\omega = 0$, то (1.16)

примет вид

$$|^3H_4, 4\rangle = \left(\frac{1}{55}\right)^{\frac{1}{2}} |1, 3\rangle - \left(\frac{9}{55}\right)^{\frac{1}{2}} |0, 4\rangle + \left(\frac{9}{11}\right)^{\frac{1}{2}} |-1, 5\rangle \quad (1.17)$$

Другие состояния $(|^3H_4, M_J)$ можно найти, действуя оператором сдвига $J_- = S_- + L_-$ Например,

$$|^3H_4, 3\rangle = \left(\frac{2}{55}\right)^{\frac{1}{2}} |1, 2\rangle - \left(\frac{16}{55}\right)^{\frac{1}{2}} |0, 3\rangle + \left(\frac{36}{55}\right)^{\frac{1}{2}} |-1, 4\rangle$$

Эту процедуру можно выводить алгебраически. Пусть j_1 и j_2 - два угловых момента, которые складываются и дают j . Обобщением ур-ния 1.17 служит

$$|j_1 j_2 j j\rangle = c \sum_{\mu_1, \mu_2} (-1)^{j-\mu_1} \delta(\mu_1 + \mu_2, j) \left[\frac{(j_1 + \mu_1)! (j_2 + \mu_2)!}{(j_1 - \mu_1)! (j_2 - \mu_2)!} \right]^{\frac{1}{2}} \times |j_1 \mu_1 j_2 \mu_2\rangle, \quad (1.18)$$

ибо легко показать, что этот ряд удовлетворяет условию

$$j + |j_1 j_2 j j\rangle = 0$$

Элементарные алгебраические выкладки показывают, что

$$\sum_{\mu_1, \mu_2} \frac{(j_1 + \mu_1)! (j_2 + \mu_2)!}{(j_1 - \mu_1)! (j_2 - \mu_2)!} \delta(\mu_1 + \mu_2, j) = \frac{(j + j_1 - j_2)! (j + j_2 - j_1)! (j + j_1 + j_2 + 1)!}{(2j + 1)! (j_1 + j_2 - j)!} \quad (1.19)$$

Следовательно, для того, чтобы сумма квадратов коэффициентов в ур.(1.18) была единицей, нам надо взять

$$c = \left[\frac{(2j + 1)(j_1 + j_2 - j)!}{(j + j_1 - j_2)! (j + j_2 - j_1)! (j + j_1 + j_2 + 1)!} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Мы сделали здесь общепринятый выбор фазы.

Чтобы найти общий VC - коэффициент, действуем j - м раз оператором $j_- = j_{1-} + j_{2-}$ на ур-ние (1.18). Из (1.15) непосредственно вытекает, что

$$(\underline{J})^x |J, M\rangle = \sqrt{\frac{(J+M)! (J-M+x)!}{(J-M)! (J+M-x)!}} |J, M-x\rangle$$

Поэтому

$$\begin{aligned}
 (j_-)^{j-m} |j_1, j_2, j, j\rangle &= \left[\frac{(2j)! (j-m)!}{(j+m)!} \right]^{1/2} |j_1, j_2, j, m\rangle \\
 &= C \sum_{k_1, k_2} (-1)^{j-k_1} \delta(k_1+k_2, j) \sqrt{\frac{(j_1+k_1)! (j_2+k_2)!}{(j_1-k_1)! (j_2-k_2)!}} \times \\
 &\quad \sum_x j_1 - j_2 - x \frac{(j-m)!}{x! (j-m-x)!} |j_1, k_1, j_2, k_2\rangle \\
 &= C \sum (-1)^{j-k_1} \delta(k_1+k_2, j) \sum_x \frac{(j-m)!}{x! (j-m-x)!} \\
 &\quad \times \left[\frac{(j_1+k_1)! (j_2+k_2)! (j_1+k_1)! (j_1-k_1+x)! (j_2+k_2)!}{(j_2-k_2+j-m-x)!} \right]^{1/2} \\
 &\quad \times |j_1, k_1 - x, j_2, k_2 - j + m + x\rangle
 \end{aligned}$$

Теперь надо сделать подстановки $k_1 = m_1 + x$,

$$k_2 = j - m - x + m_2$$

Мы находим, что

$$|j_1 j_2 j m\rangle = \sum_{m_1 m_2} (j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 j m) | j_1 m_1 j_2 m_2 \rangle,$$

где

$$= \delta_{(m_1+m_2, m)} \left[\frac{(2j+1)(j_1+j_2-j)!(j_1-m_1)!}{(j_2-m_2)!(j+m)!(j-m)!} \right]^{1/2}$$

$$\frac{(j_1+j_2+j+1)!(j+j_1-j_2)!}{(j+j_2-j_1)!(j_1+m_1)!(j_2+m_2)!}$$

$$\times \sum_x (-1)^{j_1-m_1-x} \frac{(j_1+m_1+x)!(j_2+j-m_1-x)!}{x!(j-m-x)!(j_1-m_1-x)!(j_2-j+m_1+x)!}$$

(1.20)

Это выражение обладает высокой симметрией. Например, если записать $x = j - m - y$

то мы получим результат

$$(j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 j m) = (-1)^{j_1+j_2-j} (j_2 m_2 j_1 m_1 | j_2 j_1 j m) \quad (1.21)$$

Для того, чтобы представить такого рода свойства симметрии в систематической и однообразной форме, мы построим $3-j$ -символ, согласно следующему определению:

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1 - j_2 - m_3} (2j_3 + 1)^{-\frac{1}{2}} (j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 j_3 - m_3) \quad (1.22)$$

Четная перестановка столбцов оставляет $3-j$ -символ неизменным, т.е.:

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_2 & j_3 & j_1 \\ m_2 & m_3 & m_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_3 & j_1 & j_2 \\ m_3 & m_1 & m_2 \end{pmatrix}$$

В то время как нечетная перестановка столбцов вводит фазовый множитель $(-1)^{j_1 + j_2 + j_3}$

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1 + j_2 + j_3} \begin{pmatrix} j_2 & j_1 & j_3 \\ m_2 & m_1 & m_3 \end{pmatrix}$$

Отсюда следует, что все $3-j$ символы с двумя одинаковыми столбцами равны нулю, если сумма $j_1 + j_2 + j_3$ нечетна. Можно также показать, что

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1 + j_2 + j_3} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ -m_1 & -m_2 & -m_3 \end{pmatrix}$$

Дополнительные свойства симметрии были даны Реджи [5] (см. задачу 1-6). Соотношения ортогональности

$$(j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 m_1' j_2 m_2') = \delta(m_1, m_1') \delta(m_2, m_2')$$

$$(j_1 j_2 j_3 m_3 | j_1 j_2 j_3' m_3') = \delta(j_3, j_3') \delta(m_3, m_3')$$

накладывают на $3-j$ символы следующие ограничения:

$$\sum_{j_3, m_3} (2j_3 + 1) \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1' & m_2' & m_3 \end{pmatrix} = \delta(m_1, m_1') \delta(m_2, m_2')$$

$$\sum_{m_1, m_2} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (2j_3 + 1)^{-1} \delta(j_3, j_3') \delta(m_3, m_3')$$

(1.24)

Среди имеющихся таблиц коэффициентов векторного сложения или $3-j$ символов таблицы Ротенберга и др. [6] выгодны тем, что числа, хотя и вычисленные машиной, даны в виде квадратных корней из отношений целых чисел.

§ 1-6. Слелеровские детерминанты

Переход от $SM_2 LM_2$ квантовой к $sm_2 lm_2$ можно также совершить с помощью операторов сдвига. Слелеровский детерминант общего вида можно записать в виде $\{K_1 K_2 \dots K_x\}$, где $K_i = (n_i l_i m_{si} m_{ei})$. Из (1.8) ясно, что для $x = 2$,

$$\begin{aligned} L_+ \{K_1 K_2\} &= (2)^{-\frac{1}{2}} (l_{1+} + l_{2+}) [\Psi_1(K_1) \Psi_2(K_2) - \\ &\quad - \Psi_1(K_2) \Psi_2(K_1)] \\ &= (2)^{-\frac{1}{2}} [a_1 \Psi_1(K_1') \Psi_2(K_2) - a_2 \Psi_1(K_2') \Psi_2(K_1) \\ &\quad + a_2 \Psi_1(K_1) \Psi_2(K_2') - a_1 \Psi_1(K_2) \Psi_2(K_1')] \end{aligned}$$

$$= a_1 \{K_1' K_2\} + a_2 \{K_1 K_2'\}$$

где $K_i' = (n_i l_i m_{si} m_{ei} + 1)$

$$a_i = [l_i(l_i + 1) - m_{ei}(m_{ei} + 1)]^{\frac{1}{2}}$$

Обобщение на N электронов таково:

$$L_+ \{K_1 K_2 \dots K_N\} = a_1 \{K'_1 K_2 \dots K_N\} + a_2 \{K_1 K'_2 \dots K_N\} + \dots + a_N \{K_1 K_2 \dots K'_N\} \quad (1.25)$$

Таким же способом можно показать, что

$$S_+ \{K_1 K_2 \dots K_N\} = b_1 \{K''_1 K_2 \dots K_N\} + b_2 \{K_1 K''_2 \dots K_N\} + \dots + b_N \{K_1 K_2 \dots K''_N\} \quad (1.26)$$

где

$$K''_i = (n_i l_i m_{si} + 1 m_{li})$$

$$b_i = \left[\frac{3}{4} - m_{si}(m_{si} + 1) \right] = \delta(m_{si}, -\frac{1}{2})$$

В качестве примера найдем коэффициенты a, b, c, d в разложении

$$|f^{3^2} I, M_S = \frac{1}{2}, M_L = 6\rangle = a \{ \overset{+}{3} \overset{-}{3} \overset{+}{0} \} + b \{ \overset{+}{3} \overset{-}{2} \overset{+}{1} \} + c \{ \overset{+}{3} \overset{+}{2} \overset{-}{1} \} + d \{ \overset{-}{3} \overset{+}{2} \overset{+}{1} \} \quad (1.27)$$

Поскольку M_L имеет максимальную величину

$$L_+ |f^{3^2} I, \frac{1}{2}, 6\rangle = 0$$

Подставив сюда (1.27) и используя (1.25), мы получим

$$[(12)^{\frac{1}{2}} a + (6)^{\frac{1}{2}} b - (6)^{\frac{1}{2}} d] \{ \overset{+}{3} \overset{+}{3} \overset{+}{1} \} + [-(10)^{\frac{1}{2}} b + (10)^{\frac{1}{2}} c] \{ \overset{+}{3} \overset{+}{2} \overset{-}{2} \} = 0$$

Точно так же уравнение $S_+(f^{32}I, \frac{1}{2}, 6) = 0$ приводит к

$$(b+c+d)\{\overset{+}{3}\overset{+}{2}\overset{+}{1}\} = 0$$

Получающиеся три ур-ния

$$b-d+a(2)^{\frac{1}{2}}=0 \quad b=c \quad b+c+d=0$$

надо теперь скомбинировать с

$$aa^* + bb^* + cc^* + dd^* = 1$$

и коэффициенты определяются с точностью до фазового множителя.

Выбрав фазу произвольно, мы найдем, что ур-ние (1.27) может быть записано в виде

$$\begin{aligned} |f^{32}I, \frac{1}{2}, 6) &= \left(\frac{2}{7}\right)^{\frac{1}{2}}\{\overset{+}{3}\overset{-}{3}\overset{+}{0}\} - \left(\frac{2}{21}\right)^{\frac{1}{2}}\{\overset{+}{3}\overset{-}{2}\overset{+}{1}\} \\ &\quad - \left(\frac{2}{24}\right)^{\frac{1}{2}}\{\overset{+}{3}\overset{+}{2}\overset{-}{1}\} + \left(\frac{6}{21}\right)^{\frac{1}{2}}\{\overset{-}{3}\overset{+}{2}\overset{+}{1}\} \end{aligned}$$

(1.28)

Иногда этим методом не удается получить достаточное количество уравнений для получения коэффициентов. Так например, если подействовать операторами S_+ и L_+ на нормированную функцию

$$\begin{aligned} |f^{32}H, \frac{1}{2}, 5) &= [\{\overset{+}{3}\overset{+}{2}\overset{-}{0}\} - (1+x)\{\overset{+}{3}\overset{-}{2}\overset{+}{0}\} + x\{\overset{-}{3}\overset{+}{2}\overset{+}{0}\} \\ &\quad + (2)^{-\frac{1}{2}}(2x+1)\{\overset{+}{3}\overset{-}{3}\overset{-}{1}\} + x(2)^{\frac{1}{2}}\{\overset{+}{2}\overset{-}{2}\overset{+}{1}\} \\ &\quad - \left(\frac{6}{5}\right)^{\frac{1}{2}}\{\overset{+}{3}\overset{+}{1}\overset{-}{1}\}](6x^2 + 4x + \frac{37}{10})^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

то получится тождественный нуль для любых значений x . Однако, существование шести слетеровских детерминантов с $M_S = \frac{1}{2}$, $M_L = 5$ указывает на то, что в конфигурации f^3 существуют шесть термов, для которых $S \geq \frac{1}{2}$, $L \geq 5$ кроме того, уравнение (1.27) показывает, что имеется четыре термина, для которых $S \geq \frac{1}{2}$, $L \geq 6$. Отсюда следует, что в конфигурации f^3 имеются два H -терма. Кроме того, поскольку

$$|f^{3^4} I, \frac{3}{2}, 6) = \{3^+ 2^+ 1^+\}$$

$$a \quad |f^{3^4} I, \frac{3}{2}, 5) = \{3^+ 2^+ 0^+\}$$

невозможно построить состояние $|f^{3^4} H, \frac{3}{2}, 5)$ ортогональное к $|f^{3^4} I, \frac{3}{2}, 5)$. Поэтому оба H -терма

имеют $S = 1/2$. Теперь ясно, почему мы не могли однозначно определить состояние $|f^{3^2} H, \frac{1}{2}, 5)$: обозначение

$f^3 S M_S L M_L$ является неполным. На самом деле, мы можем

взять x каким угодно и определить тем самым одно состояние, а затем вычислить второе, ортогональное первому. Эту пару можно использовать как базис при вычислении матричных элементов от $H_1 + H_2$. Подходящей ортогональной парой являются, например, состояния

$$\begin{aligned} |f^3 \gamma_1^2 H, \frac{1}{2}, 5) = & -\left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} \{3^+ 2^+ 0^+\} + \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} \{\bar{3}^+ 2^+ 0^+\} \\ & + \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \{3^+ \bar{3}^- 1^+\} + \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \{2^+ \bar{2}^+ 1^+\} \end{aligned} \quad (1.29)$$

$$\begin{aligned} \text{и } |f^3 \gamma_2^2 H, \frac{1}{2}, 5) = & \left(\frac{30}{91}\right)^{\frac{1}{2}} \{3^+ 2^+ 0^-\} - \left(\frac{40}{273}\right)^{\frac{1}{2}} \{3^+ 2^+ 0^+\} \\ & - \left(\frac{10}{273}\right)^{\frac{1}{2}} \{\bar{3}^+ 2^+ 0^+\} + \left(\frac{5}{273}\right)^{\frac{1}{2}} \{3^+ \bar{3}^- 1^+\} \\ & - \left(\frac{20}{273}\right)^{\frac{1}{2}} \{2^+ \bar{2}^+ 1^+\} - \left(\frac{36}{91}\right)^{\frac{1}{2}} \{3^+ \bar{1}^+ 1^-\} \end{aligned} \quad (1.30)$$

которые соответствуют $x = \infty$ и $x = -\frac{1}{3}$.

§ 1-7. Матричные элементы

Изменив квантование согласно схеме

$$SLJM_J \rightarrow SM_SLM_L \rightarrow sm_s l m_l$$

мы можем каждое состояние $(\tau SLJM_J)$ представить в виде линейной комбинации слетеровских детерминантов. Следовательно, матричные элементы

$$(\tau SLJM_J | H_1 + H_2 | \tau' S' L' J M_J)$$

можно представить в виде суммы интегралов вида

$$\int \{K_1 K_2 \dots K_x\}^* (H_1 + H_2) \{K'_1 K'_2 \dots K'_x\},$$

где интегрирование совершается по всем пространственным и спиновым переменным. Метод вычисления таких интегралов детально описан Кондоном и Шортли [1] как для одночастичных операторов (например, H_2), имеющих форму $F = \sum f_i$, так и для двухчастичных (например, H_1), имеющих форму $G = \sum_{i,j} g_{ij}$. Результаты, которые можно доказать с помощью разложения (1.8), сводятся к следующему:

1. Если два набора, $K_1 K_2 \dots K_x$ и $K'_1 K'_2 \dots K'_x$ можно, помощью операций типа (1.7), сделать одинаковыми, то есть

такими, что $K_i = K'_i$ для всех i , то

$$\begin{aligned} & \int \{K_1, K_2, \dots, K_x\}^* F \{K_1, K_2, \dots, K_x\} \\ &= \sum_i \int \{K_i\}^* f_i \{K_i\} = \sum_i \int \psi_i^*(K_i) f_i \psi_i(K_i) \end{aligned} \quad (1.31)$$

$$\begin{aligned} & \int \{K_1, K_2, \dots, K_x\}^* G \{K_1, K_2, \dots, K_x\} \\ &= \sum_{i>j} \int \{K_i, K_j\}^* g_{i2} \{K_i, K_j\} \\ &= \sum_{i>j} \left[\int \psi_i^*(K_i) \psi_j^*(K_j) g_{i2} \psi_i(K_i) \psi_j(K_j) \right. \\ & \quad \left. - \int \psi_i^*(K_i) \psi_j^*(K_j) g_{i2} \psi_j(K_i) \psi_i(K_j) \right] \end{aligned} \quad (1.32)$$

Интегралы, перед которыми стоит знак $+$, называются прямыми интегралами, а те, перед которыми стоит минус, называются обменными интегралами.

2. Если все наборы K_i серии $K_1, K_2, \dots, K_x$ повторяются, за исключением K_r , в серии $K'_1, K'_2, \dots, K'_x$, то, используя перестановки типа (1.7), можно поставить на одинаковые места $N-1$ соответствующих компонент и метричный элемент одночастичного оператора тогда сведется к

$$\begin{aligned} & \int \{K_1, K_2, \dots, K_r, \dots, K_x\}^* F \{K_1, K_2, \dots, K'_r, \dots, K_x\} \\ &= \int \{K_r\}^* f_r \{K'_r\} = \int \psi_r^*(K_r) f_r \psi_r(K'_r) \end{aligned}$$

а матричный элемент двухчастичного оператора сведется к

$$\begin{aligned} & \int \{K_1 K_2 \dots K_r \dots K_x\}^* G \{K_1 K_2 \dots K_r' \dots K_x\} \\ & = \sum_i \int \{K_i K_r\}^* q_{i2} \{K_i K_r'\} \end{aligned}$$

Слетеровские детерминанты второго порядка можно раскрыть так же, как это было сделано в пункте 1, однако тем интегралам, которые встретятся в сумме, не присвоены особые названия.

3. Если компоненты K_i набора $K_1 K_2 \dots K_x$ встречаются в наборе $K_1' K_2' \dots K_x'$ все, за исключением K_r и K_t , тогда все матричные элементы F исчезают. После того, как $x = 2$ соответствующих компонент поставлены на одинаковые места, мы получаем матричные элементы

$$\begin{aligned} & \int \{K_1 K_2 \dots K_r \dots K_x\}^* G \{K_1 K_2 \dots K_r' \dots K_t' \dots K_x\} \\ & = \int \{K_r K_t\}^* q_{i2} \{K_r' K_t'\} \end{aligned}$$

Все матричные элементы F и G , не попадающие ни в один из трех перечисленных выше классов, равны нулю.

§ 1-8. Конфигурация sd

Теперь, после рассмотрения свойств волновых функций, мы имеем в своем распоряжении весь аппарат, необходимый для решения любой задачи атомной спектроскопии. Методика прояснится, если рассчитать отдельный пример и произвести непосредственное сопоставление с опытом. Для вычисления матричных элементов надо строить вспомогательные таблицы (табл. 13 и 14 у Кондона и Шортли, или таблиц A20-1 и A20-2 у Слетера [1]), и так как

развитие теории тензорных операторов позволит избежать большинства этих механических расчетов, мы выберем конфигурацию, в которой количество термов превышает количество радиальных интегралов, связанных с H_1 , не более чем на единицу. В подобных случаях нет большого смысла вычислять матричные элементы H_1 , если мы не в состоянии оценить радиальные интегралы. Поскольку эти интегралы часто извлекают из опыта или рассматривают как подбираемые параметры, мы в данном случае мало теряем из-за того, что не вычисляем матричные элементы H_1 .

Конфигурация sd подходит для наших целей. Она наблюдается во многих спектрах и достаточно проста для анализа. Здесь имеются двадцать базисных слетеровских детерминантов

$$\begin{aligned} & \{2^+\bar{0}\}, \{1^+\bar{0}\}, \{0^+\bar{0}\}, \{-1^+\bar{0}\}, \\ & \{2^-\bar{0}\}, \{1^-\bar{0}\}, \{0^-\bar{0}\}, \{-1^-\bar{0}\}, \\ & \{-2^-\bar{0}\}, \{2^+\bar{0}\}, \{1^+\bar{0}\}, \{0^+\bar{0}\}, \\ & \{-1^+\bar{0}\}, \{-2^+\bar{0}\}, \{2^-\bar{0}\}, \{1^-\bar{0}\}, \\ & \{0^-\bar{0}\}, \{-1^-\bar{0}\}, \{-2^-\bar{0}\} \end{aligned}$$

(1.33)

Здесь m_s и m_l d -электрона расположены перед квантовыми числами s -электрона. Состояние с максимальными M_S и M_L есть $\{2^+\bar{0}\}$, в нем $M_S = 1$, $M_L = 2$. Это значит, что существует терм 3D . Действуя оператором S_- на функцию

$$|{}^3D, M_S=1, M_L=2\rangle = \{2^+\bar{0}\}$$

мы получим

$$|{}^3D, 0, 2\rangle = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \{2^-\bar{0}\} + \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \{2^+\bar{0}\}$$

Ортогональная ей функция не может принадлежать 3D и может происходить только из 1D

$${}^1D_{0,2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \{\bar{2}\bar{0}\} - \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \{\bar{2}\bar{0}\}$$

Так как $3 \times 5 + 1 \times 5 = 20$, термы 3D и 1D исчерпывают конфигурацию. Обозначим

$$({}^1D | H, {}^1D) - ({}^3D | H, {}^3D) = G$$

Для вычисления матричных элементов H_2 пользуемся техникой § 1-5 и § 1-6 и находим:

$${}^3D_{2,3} = {}^3D_{1,2}$$

$${}^3D_{2,2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} {}^3D_{1,1} - \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} {}^3D_{0,2}$$

$${}^3D_{2,1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{\frac{1}{2}} {}^3D_{1,0} - \left(\frac{3}{10}\right)^{\frac{1}{2}} {}^3D_{0,1} + \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{2}} {}^3D_{-1,2}$$

$${}^3D_{1,1} = \{\bar{1}\bar{0}\}$$

$${}^3D_{0,1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \{\bar{1}\bar{0}\} + \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \{\bar{1}\bar{0}\}$$

$${}^3D_{-1,2} = \{\bar{2}\bar{0}\}$$

Таким образом,

$$({}^3D_2 | H_2 | {}^3D_2) = \int \{\bar{2}\bar{0}\}^* H_2 \{\bar{2}\bar{0}\} = \zeta_d$$

где, вообще говоря,

$$\zeta_{nl} = \int R_{nl}(r) \xi(r) R_{nl}(r) dr \quad (1.34)$$

На практике часто одно или оба квантовых числа n, l при ζ_{nl} не пишут, если из константы ясно, чему они равны, или

вели формулы, в которых фигурирует ζ_{nl} справедливы для всех n и l . Для уровня 3D_2 мы найдем

$$\begin{aligned} ({}^3D_2 | H_2 | {}^3D_2) &= \left(\frac{1}{3}\right)({}^3D_{2,1,1} | H_2 | {}^3D_{2,1,1}) - 2\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}({}^3D_{2,1,1} | H_2 | {}^3D_{2,0,2}) \\ &\quad + \left(\frac{2}{3}\right)({}^3D_{2,0,2} | H_2 | {}^3D_{2,0,2}) \\ &= -\frac{1}{2} \zeta_d. \end{aligned}$$

Продолжая, мы получаем

$$\begin{aligned} ({}^3D_1 | H_2 | {}^3D_1) &= -\frac{3\zeta_d}{2} \\ ({}^3D_2 | H_2 | {}^3D_2) &= \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \zeta_d \end{aligned}$$

Если терм 3D взять за нуль энергии, то матрица возмущения будет иметь форму

	3D_3	3D_2	1D_2	3D_1
3D_3	ζ	0	0	0
3D_2	0	$-\zeta/2$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}\zeta$	0
1D_2	0	$\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}\zeta$	G	0
3D_1	0	0	0	$-3\zeta/2$

Индекс у ζ мы опустили. Если теперь для нумерации столбцов и строк использовать M_j всех уровней, то первый корень ζ повторится по диагонали семь раз, центральная матрица второго порядка повторится пять раз, а $-3\zeta/2$ - три раза. Всего

получается 20 корней, что совпадает с количеством слетеровских детерминантов. Если уровень, соответствующий угловому моменту J , обозначать $\epsilon(J)$, то

$$\begin{aligned}\epsilon(3) &= \zeta & \epsilon(4) &= \frac{-3\zeta}{2} \\ \epsilon(2) &= \frac{G}{2} - \frac{\zeta}{4} \pm \left[\left(\frac{G}{2} + \frac{\zeta}{4} \right)^2 + \frac{3\zeta^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

Чтобы было удобней изображать зависимость $\epsilon(J)$ от G и ζ , мы начертим величину

$$\eta = \left(\epsilon - \frac{G}{4} \right) \left[G^2 + \left(\frac{5\zeta}{2} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$$

как функцию $\xi = \frac{\zeta}{1+\chi}$,

где $\chi = \frac{5\zeta}{2G}$

Это сделано на рис.1.1. Использование величин η и ξ придает рисунку следующие свойства:

1. Энергетические уровни в обоих предельных случаях, $G=0$ и $\zeta=0$ можно поместить на одной и той же диаграмме.

2. Разность между значениями η , соответствующими наибольшей и наименьшей энергиям, для обоих пределов равна единице.

3. Центр тяжести уровней, вычисленный с учетом веса лежит на прямой $\eta = 0$ для всех ξ в области $0 \leq \xi \leq 1$.

4. Для всех ξ разности между η пропорциональны энергетическим разностям

Из многочисленных примеров sd -конфигураций [7] мы выбрали пять и сравнили их с теорией. Из рис.1.1 можно видеть,

Рис. 1-1

Рисунок 1-1. Четыре уровня конфигурации sd изображены для случая промежуточной связи и сравнены с экспериментом. Слева записаны обозначения уровней для случая LS -связи (что соответствует $N_1 \gg N_2$), случай jj -связи (когда $N_2 \gg N_1$) отражен справа. Расхождение между теорией и экспериментом обусловлено конфигурационным взаимодействием.

что согласие исключительно хорошее. Несколько неожиданным является попарное совпадение уровней при $G = 0$. Так произошло потому, что мы связывали моменты отдельных электронов, s и l , порознь, так чтобы получились S и L , а уже потом обрзовывали их сумму J :

$$\sum_i s_i = S \quad \sum_i l_i = L \quad S + L = J \quad (1.35)$$

Между тем, если $N_2 \gg N_1$, то более уместно сложить s_i с l_i , а потом скомбинировать получившиеся индивидуальные

$$s_i + l_i = j_i \quad \sum_i j_i = J \quad (1.36)$$

Схемы связи, представленные уравнениями (1.35) и (1.36), называются LS -связью (или Рассель-Саундерсовской (RS) связью) и jj -связью, соответственно. Если мы применим вторую схему, то 20 слетеровских детерминантов (1.33) нужно будет заменить серией из 12 определителей, задающих m_j -компоненты двух моментов j $(\frac{5}{2}, \frac{1}{2})$

$$\left\{ \frac{5}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{3}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{3}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{5}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{5}{2} -\frac{1}{2} \right\}, \\ \left\{ \frac{3}{2} -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{3}{2} -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{5}{2} -\frac{1}{2} \right\} \quad (1.37)$$

и второй серией из 8, содержащих Γ -компоненты пары моментов $(3/2, 1/2)$:

$$\left\{ \frac{3}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{3}{2} \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{3}{2} -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\}, \\ \left\{ -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{3}{2} -\frac{1}{2} \right\} \quad (1.38)$$

Поскольку собственные значения

$$\sum_i s_i \cdot l_i = \frac{1}{2} \sum_i (j_i^2 - s_i^2 - l_i^2)$$

равны

$$\frac{1}{2} \sum_i [j_i(j_i+1) - s_i(s_i+1) - l_i(l_i+1)],$$

то теперь матрица H_2 диагональна. Состояния (1.37) и (1.38) соответствующие $j_1 = 5/2$, $j_2 = 1/2$ и $j_1 = 3/2$, $j_2 = 1/2$, имеют собственные значения ζ и $-3\zeta/2$.

§ 1-9. Недостатки метода

Метод этого раздела в принципе можно распространить на любую конфигурацию. Однако, слепо применяя простую технику, которая была изложена, мы не заметим возможностей большого упрощения математики. Например, когда мы анализировали sd -конфигурацию, мы вычисляли матричные элементы

$$({}^{2S+1}D_J | H_2 | {}^{2S+1}D_J)$$

для каждого J порознь; однако результаты удовлетворяют уравнению

$$({}^3D_J | H_2 | {}^3D_J) - ({}^3D_{J-1} | H_2 | {}^3D_{J-1}) = \kappa J \quad (1.39)$$

где κ не зависит от J . Это уравнение может быть обобщено на любой мультиплет в любой конфигурации. Однако с помощью метода Кондона и Шортли мы не можем это доказать, и должны ждать, когда овладеем техникой тензорных операторов. И если даже располагать уравнениями, подобными (1.39), то есть другие причины подозревать, что теория недостаточно упрощена, или имеет не такую форму, какую она должна иметь. Например, в слетеровских

детерминантах фигурируют собственные значения (m_s, m_l) z -компонент S и L ; но многие возмущения таковы, что не позволяют выделить какую-либо ось. Далее, при изучении термов с малыми S и L в сложных конфигурациях (например, f^3) переход от SM_SLM_L к sm_slm_l -квантованию часто дает много слетеровских детерминантов, перед которыми стоят сложные числовые коэффициенты, а при вычислении матричных элементов различных возмущений эти коэффициенты неожиданно комбинируются так, что получается простой результат. Позже мы увидим, что теория тензорных операторов, вместе с теорией групп и генеалогическими коэффициентами, устраняет лишние вычисления и позволяет глубже понять законы расположения уровней энергии сложного атома.

Задачи

1.1. Показать, что в конфигурациях из N эквивалентных электронов не существует термов, имеющих мультиплетность максимальной, а L — на единицу меньше, чем *максимальное L среди термов максимальной мультиплетности*.

1.2. Показать, что для всех конфигураций из двух эквивалентных электронов сумма S и L одного и того же терма есть четное число.

1.3. Показать, что в f^3 термы ${}^2D, {}^2F, {}^2G$ и 2H встречаются дважды.

1.4. Получить формулы для некоторых 3_j -символов:

$$\begin{pmatrix} j & j & 0 \\ m & -m & 0 \end{pmatrix} = (-1)^{j-m} (2j+1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\begin{pmatrix} j & k & j \\ -j & 0 & j \end{pmatrix} = \frac{(2j)!}{[(2j-k)!(2j+k+1)!]^{1/2}}$$

1.5. Показать, что уравнения (1.14) и (1.15) останутся справедливыми, если сделать подстановку

$$\begin{aligned} J_+ &\rightarrow -\eta \frac{\partial}{\partial \xi} & J_- &\rightarrow -\xi \frac{\partial}{\partial \eta} \\ J_z &\rightarrow -\frac{1}{2} \left(\xi \frac{\partial}{\partial \xi} - \eta \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \end{aligned}$$

$$[J, M] \rightarrow f_M^J(\xi, \eta) = (-1)^{J-M} \xi^{J-M} \eta^{J+M} [(J-M)!(J+M)!]^{-1/2}$$

Найти такие линейные комбинации величин $f_{m_1}^{j_1}(\xi_1, \eta_1) f_{m_2}^{j_2}(\xi_2, \eta_2)$ с фиксированными j_1 и j_2 , которые являются собственными функциями оператора

$$j_{12} + j_{22} = -\frac{1}{2} \left(\xi_1 \frac{\partial}{\partial \xi_1} + \xi_2 \frac{\partial}{\partial \xi_2} - \eta_1 \frac{\partial}{\partial \eta_1} - \eta_2 \frac{\partial}{\partial \eta_2} \right)$$

с собственными значениями $m = m_1 + m_2$ и оператора

$(j_1 + j_2)^2$ с собственными значениями $j(j+1)$. Затем получить уравнение

$$\begin{aligned} & (j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 j m) \\ &= \delta(m_1 + m_2, m) \left[\frac{(2j+1)(j_1+j_2-j)!(j_1-j_2+j)!(j_2-j_1+j)!}{(j_1+j_2+j+1)!} \right]^{1/2} \\ & \times [(j_1+m_1)!(j_1-m_1)!(j_2+m_2)!(j_2-m_2)!(j+m)!(j-m)!]^{1/2} \\ & \times \sum_z (-1)^z \frac{[z!(j_1+j_2-j-z)!(j_1-m_1-z)!(j_2+m_2-z)!]}{[(j-j_2+m_1+z)!(j-j_1-m_2+z)!]} \end{aligned}$$

и показать, что оно эквивалентно уравнению (1.20). (Этот метод принадлежит Шарлу [8]).

1.6. Использовать результат задачи 1.5 и доказать, что коэффициент

$$u_1^{j_1 - m_1} u_2^{j_1 + m_1} u_3^{j_2 - j_1 - m_2} v_1^{j_2 - m_2} v_2^{j_2 + m_2} v_3^{j_3 + j_1 - j_2 - m_3} w_1^{j_3 - m_3} w_2^{j_3 + m_3} w_3^{j_1 + j_2 - j_3}$$

в разложении

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix}^J$$

равен

$$(-1)^J \binom{j_1 \ j_2 \ j_3}{m_1 \ m_2 \ m_3} (J+1)^{\frac{1}{2}} (J!)^{\frac{1}{2}}$$

$$\times [(j_1 - m_1)! (j_1 + m_1)! (j_2 + j_3 - j_1)! (j_2 - m_2)! (j_2 + m_2)! (j_1 + j_3 - j_2)! (j_3 - m_3)! (j_3 + m_3)! (j_1 + j_2 - j_3)!]^{-\frac{1}{2}}$$

Доказать, что символ, определяемый равенством

$$\begin{bmatrix} j_1 + j_3 - j_1 & j_3 + j_1 - j_2 & j_1 + j_2 - j_3 \\ j_1 - m_1 & j_2 - m_2 & j_3 - m_3 \\ j_1 + m_1 & j_2 + m_2 & j_3 + m_3 \end{bmatrix} = \binom{j_1 \ j_2 \ j_3}{m_1 \ m_2 \ m_3}$$

обладает следующими свойствами:

1. Четная перестановка столбцов или строк оставляет символ неизменным.

2. Нечетная перестановка столбцов или строк добавляет фазовый множитель

$$(-1)^{j_1 + j_2 + j_3}$$

3. Транспозиция оставляет символ неизменным (Реджи, [5]).

1.7. Показать, что

$$|f^2 K, M_S = \frac{1}{2}, M_L = 7) = \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{2}} \{ \overset{+}{3} \overset{-}{3} \overset{+}{1} \} + \left(\frac{5}{8}\right)^{\frac{1}{2}} \{ \overset{+}{3} \overset{+}{2} \overset{-}{2} \}$$

Используя эту формулу, показать, что

$$({}^2K_{\frac{15}{2}} | H_1 | {}^2K_{\frac{15}{2}}) = \frac{95f}{8}$$

1.8. Используя уравнения (1.29) и (1.30), доказать, что

$$(f^3 \gamma_1 {}^2H_{\frac{11}{2}} | H_2 | f^3 \gamma_1 {}^2H_{\frac{11}{2}}) = 0$$

и

$$(f^3 \gamma_1 {}^2H_{\frac{11}{2}} | H_2 | f^3 \gamma_1 {}^2H_{\frac{11}{2}}) = 0$$

1.9. Основная конфигурация Pu I содержит шесть $5f$ - электронов. Доказать, что у нее существуют три 5D -термов и закончить разложение

$$|r(x, y) {}^5D, M_S = M_L = 2) = n \{ \overset{+}{3} \overset{+}{2} \overset{+}{1} \overset{-}{0} \overset{-}{1} \overset{-}{3} \} + nx \{ \overset{+}{3} \overset{+}{2} \overset{+}{1} \overset{-}{0} \overset{-}{1} \overset{-}{3} \} + ny \{ \overset{+}{3} \overset{+}{2} \overset{+}{1} \overset{-}{1} \overset{-}{3} \} + \dots$$

Показать, что $\gamma_1 = r(0,0)$, $\gamma_2 = r(-\frac{1}{3}, 0)$ и $\gamma_3 = r(-\frac{1}{3}, -\frac{7}{18})$ определяют три ортогональных состояния.

Предположим, что действительные состояния, осуществляющиеся у атома плутония, есть $\gamma_i = r(x_i, y_i)$, где $i = 1, 2, 3$. Предлагается показать, что шесть уравнений

$$(\gamma_i | \gamma_j) = 0 \quad (\gamma_i | H_1 | \gamma_j) = 0$$

с $i \neq j$ задают вершины (x_i, y_i) самосопряженного треугольника общено для двух конических сечений $S = 0$ и $S' = 0$. Доказать, что собственными значениями H_1 , служат те λ , которые обес-

печивают превращение конического сечения $S^2 - 2S = 0$ в пару прямых. (Разложение по слетеровским детерминантам было использовано при анализе мультиплета ${}^5D \text{ и } IV$ [9]).

1.10. Показать, что переход от $SLJM_J$ к SM_SLM_L -квантованию в случае $J \neq M_J$ может быть произведен с помощью эквивалентности

$$(2S_+L_- + S_+L_+ + S_-L_+) |SLJM_J\rangle = [J(J+1) - S(S+1) - L(L+1)] |SLJM_J\rangle$$

Проверить этим способом ур. (1.17). Показать, что аналогичными операторами для перехода в sm_slm_l -квантованию будут

$$\sum_{i \neq j} l_i \cdot l_j \quad \text{и} \quad \sum_{i \neq j} s_i \cdot s_j$$

и проверить разложение в задаче 1.7. (Эта техника принадлежит Стивенсу [10]).

1.11. Доказать, что в конфигурации f^7 термы, имеющие $S \geq \frac{5}{2}$, таковы: 8S , 6P , 6D , 6F , 6G , 6H и 6I . Доказать, что

$$(f^7 {}^8S_{\frac{7}{2}} | H_2 | f^7 {}^6P_{\frac{7}{2}}) = (14)^{\frac{1}{2}} \zeta$$

Г л в в е 2

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

§ 2.1. Вклад в гамильтониан

Часто бывает так, что электроны иона, (расположенного) находящегося в кристаллической решетке, локализованы в такой степени, что влияние окружения на ион можно рассматривать как возмущение, наложенное на систему конфигураций свободного иона. Спектры поглощения и люминесценции солей, для которых эта ситуация имеет место, сильно меняются от соли к соли: иногда, например в кристаллах, содержащих ионы редких земель, линии довольно узки, и из спектров можно получить структуру энергетических уровней свободного иона. Атомы, образующие кристалл, часто бывают оптически инертными в некотором диапазоне частот. Исследуемые ионы обычно вводят в качестве заместителей в оптически инертные решетки. Таким способом можно почти устранить взаимодействие спектроскопически активного иона с активными ионами в соседних ячейках, и анализ спектров дает сразу систему уровней энергии одиночного иона, подверженного действию кристаллической решетки. В последующем изложении мы сосредоточим свое внимание на этом одиночном ионе, и примем его ядро за начало координат. Теория кристаллических полей и, в особенности, обобщение их влияния на языке теории групп, развита Бете [11].

В первом приближении можно считать, что присутствие соседних атомов и ионов приводит к чисто электростатическому эффекту. Если $V(r, \theta, \phi)$ есть электрический потенциал, созда-

ваемый некоторой сложной системой атомов и ионов, то вклад в гамильтониан равен

$$H_3 = -e \sum_i V(r_i, \theta_i, \phi_i),$$

где сумма распространяется по всем электронам центрального иона. H_3 обычно разлагают в ряд по сферическим функциям [12]:

$$H_3 = \sum_{i, k, q} B_k^q r_i^k Y_{kq}(\theta_i, \phi_i) \quad (2.1)$$

как мы увидим, количество членов в этом ряде, которые нужно рассматривать, часто бывает невелико, и во многих случаях по постоянные B_k^q можно рассматривать как подбираемые параметры. Если структура кристаллической решетки известна, то в принципе они могут быть вычислены. Потенциал в точке (r, θ, ϕ) создаваемый зарядом $-ge$, находящемся в точке (ρ, α, β) , есть

$$V = -ge/|\underline{r} - \underline{\rho}| = -ge \sum_k r^k P_k(\cos \omega) / \rho^{k+1}$$

где ω - угол между векторами $\underline{r}$ и $\underline{\rho}$, а P_k - полином Лежандра. Разложение справедливо в области $r < \rho$. С помощью теоремы сложения шаровых функций [1]

$$P_k(\cos \omega) = \frac{4\pi}{2k+1} \sum_q Y_{kq}^*(\alpha, \beta) Y_{kq}(\theta, \phi) \quad (2.2)$$

легко показать, что для совокупности зарядов $-ge_j$

$$B_k^q = \frac{4\pi}{2k+1} \sum_j \frac{g_j e^2}{\rho_j^{k+1}} Y_{kq}^*(\alpha_j, \beta_j)$$

$$= (-1)^q \left\{ \frac{4\pi (k-q)!}{(2k+1)(k+q)!} \right\}^{\frac{1}{2}} \sum_j \frac{g_j e^2}{\rho_j^{k+1}} P_k^q(\cos \alpha_j) e^{-iq\beta_j}$$

В качестве примера мы рассмотрим очень симметричную совокупность зарядов $-qe$ в точках $(\pm \rho, 0, 0)$, $(0, \pm \rho, 0)$ и $(0, 0, \pm \rho)$ (Если заряды отрицательны, то $q > 0$). С помощью уравнения

$$Y_{k,-q}(\theta, \phi) = (-1)^q Y_{kq}^*(\theta, \phi) \quad (2.4)$$

мы получим

$$\begin{aligned} B_k^q &= (-1)^q B_k^{-q} \\ &= (-1)^q \frac{qe^2}{\rho^{k+1}} \left\{ \frac{4\pi(k-q)!}{(2k+1)(k+q)!} \right\}^{\frac{1}{2}} [P_k^q(1) + 4P_k^q(0) + P_k^q(-1)] \end{aligned}$$

причем $\frac{1}{4}q$ есть либо целое число, либо нуль. Все коэффициенты B_k^q , для которых это не так, исчезают. Подставляя это соотношение в (2.1) и ограничивая разложение членами, для которых $k \leq 6$

мы получаем:

$$\begin{aligned} H_3^1 &= A_4^0 \Sigma(35z^4 - 30z^2r^2 + 3r^4) + A_4^4 \Sigma(x^4 - 6x^2y^2 + y^4) \\ &+ A_6^0 \Sigma(231z^6 - 315z^4r^2 + 105z^2r^4 - 5r^6) \\ &+ A_6^4 \Sigma(14z^2 - r^2)(x^4 - 6x^2y^2 + y^4), \end{aligned}$$

(2.5)

где

$$\begin{aligned} A_4^0 &= \frac{7qe^2}{16\rho^5} & A_4^4 &= \frac{35qe^2}{16\rho^5} \\ A_6^0 &= \frac{3qe^2}{64\rho^7} & A_6^4 &= \frac{-63qe^2}{64\rho^7} \end{aligned} \quad (2.6)$$

Ради простоты в (2.5) мы опустили индекс суммирования i , который относился к координатам электронов.

§ 2-2. Конечные группы

Влияние электрического поля кристалла на уровни энергии иона, внедренного в кристаллическую решетку, можно учесть, включив H_3 в гамильтониан свободного иона. Для ионов редких земель $H_1 \gg H_2 \gg H_3$ и в первом приближении каждый уровень характеризуется квантовым числом J и обладающий $(2J+1)$ кратным вырождением, можно считать изолированным. Строки и столбцы матрицы H_3 нумеруются с помощью M_J . Значения элементов можно находить, выражая функции через слетеровские детерминанты и используя тот факт, что H_3 есть оператор типа F (Позже мы увидим, что эту процедуру можно сильно упростить). Собственные значения получаются решением векового уравнения. Для ионов группы железа $H_3 \gg H_2$ более удобным базисом являются состояния $(\gamma S M_S L M_L)$, а спин-орбитальное взаимодействие H_2 прибавляют после того, как будут учтены кулоновское взаимодействие и эффекты кристаллического поля.

Из этой процедуры не видно, что теория неполна. Однако, на практике бывает, что многие вычисления дают неожиданные результаты. Например, собственные значения часто получаются вырожденными — особенно когда симметрия окружения высока. Матричные элементы простых операторов (например, $L_z, \sum_i z_i$ и т.д.), вычисленные с помощью собственных функций $H_1 + H_2 + H_3$, иногда без видимых причин исчезают. Соответствующая отрасль математи-

ки, объясняющая эти явления, есть теория групп. Выводить здесь хорошо известные результаты элементарной теории групп было бы излишним. Однако, краткое рассмотрение основных понятий и результатов теории поможет нам понять свойства полупростых непрерывных групп, которые мы будем впоследствии рассматривать подробно. Сейчас мы ограничимся обзором элементарной теории. Для основательного изучения предмета читатель должен обратиться к трудам Ломонта [13] и Вигнера [14].

Конечная группа G есть множество из g отдельных элементов $R_1, R_2, \dots, R_g$, которые удовлетворяют следующим условиям:

1. Каждую пару элементов R_σ, R_ρ можно скомбинировать в произведение $R_\sigma R_\rho$, которое тоже принадлежит множеству.

2. Справедлив ассоциативный закон, т.е.

$$R_\tau (R_\sigma R_\rho) = (R_\tau R_\sigma) R_\rho$$

3. Множество содержит единичный элемент $\mathcal{I}$ такой, что

$$R_\sigma \mathcal{I} = \mathcal{I} R_\sigma = R_\sigma$$

для всех σ

4. Для каждого элемента R_σ имеется обратный, R_σ^{-1} также принадлежащий множеству, т.е.

$$R_\sigma R_\sigma^{-1} = R_\sigma^{-1} R_\sigma = \mathcal{I}$$

Говорят, что две группы G и $\mathcal{H}$ изоморфны, если между элементами $R_1, R_2, \dots$ группы G и элементами $P_1, P_2, \dots$ группы $\mathcal{H}$ можно установить взаимно-однозначное соответствие, так чтобы произведения $R_\sigma R_\rho$ соответствовали бы произведениям $P_\sigma P_\rho$ для всех σ и ρ . Если все элементы G коммути-

тируют, то $\mathcal{G}$ называют абелевой группой. Элемент $R_p R_\sigma R_p^{-1} = R_\tau$ называют сопряженным элементу R_σ . Элементы, сопряженные друг с другом, образуют класс. Два класса не могут иметь общего элемента, поэтому все элементы группы $\mathcal{G}$ можно разделить по классам. Единичный элемент всегда сам по себе образует класс.

Если элементы множества $\mathcal{G}$ трактуются просто как элементы группы, то говорят, что дана абстрактная группа. Если же они являются какими-либо величинами специального вида, например, представляют собой матрицы $R_1, R_2, \dots, R_\sigma, \dots, R_g$, то образуют представление группы $\mathcal{G}$, и каждому элементу R_σ должна соответствовать несингулярная матрица R_σ и так, чтобы $R_\sigma R_p$ соответствовало $R_\sigma R_p$. Соответствие не обязательно однозначное; например, каждое R_σ может соответствовать единичной матрице. В отличие от абстрактных групп, представления не обязательно нужно строить из разных объектов. Если элементы группы можно интерпретировать как операторы, переводящие одну в другую эквивалентные точки некоторого пространства, то обычно бывает не сложно построить матричные представления. Предположим, что под действием операций группы $\mathcal{L}$ линейно независимых функций $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ преобразуются друг через друга согласно уравнению

$$R_\sigma \varphi_i = \sum_j \Gamma_{ji}(\sigma) \varphi_j$$

После действия второго оператора R_p мы получим

$$R_p R_\sigma \varphi_i = \sum_j \Gamma_{ji}(\sigma) R_p \varphi_j$$

$$= \sum_{j,k} \Gamma_{ji}(\sigma) \Gamma_{kj}(p) \varphi_k = \sum_k (R_p R_\sigma)_{ki} \varphi_k$$

если величину $\Gamma_{ji}(\sigma)$ мы интерпретируем как элемент j -й строки и i -того столбца матрицы R_σ , т.е. как $(R_\sigma)_{ji}$. Получается, что $R_p R_\sigma$ соответствует произведению $R_p R_\sigma$ и, таким образом, матрицы R_σ образуют n -мерное представление группы. Функции Γ_j называют базисом представления; обычно выгодно брать ортонормированный набор, т.к. тогда матрицы будут унитарными.

Если матрицы R_σ образуют представление группы G , то и матрицы $P_\sigma = S R_\sigma S^{-1}$, где S -несингулярная матрица, тоже образуют представление этой группы. Представления Γ_R и Γ_P , осуществляемые матрицами $R_1, R_2, \dots$ и $P_1, P_2, \dots$ соответственно, называются эквивалентными представлениями. Представление Γ_R называется приводимым, если может быть найдено такое преобразование подобия, которое приводит все матрицы R_σ (считаем, что они унитарны) к виду

$$\begin{pmatrix} R'_\sigma & 0 \\ 0 & R''_\sigma \end{pmatrix}$$

где R'_σ и R''_σ - квадратные унитарные матрицы, размерности которых не зависят от σ . Если такое преобразование найти нельзя, то представление неприводимо. Разложение приводимого представления на его составные части $\Gamma_{R'}$ и $\Gamma_{R''}$ символизируется равенством

$$\Gamma_R = \Gamma_{R'} + \Gamma_{R''}$$

Развитие теории представлений опирается на важную теорему, известную под названием леммы Шура. Содержание этой теоремы Вейль [15] выражает следующим образом:

1. Если R_σ и Q_σ образуют два неэквивалентных неприво-

димых матричных представления группы, и если существует матрица A (может быть, квадратная) такая, что

$$R_{\sigma} A = A Q_{\sigma}$$

для всех σ , то $A = 0$.

2. Если матрицы R_{σ} образуют неприводимое представление группы, и если

$$R_{\sigma} A = A R_{\sigma}$$

для всех σ , то A пропорциональна единичной матрице.

Из (1) можно вывести, что если матрицы R_{σ} и Q_{σ} двух неэквивалентных неприводимых представлений унитарны, то их элементы удовлетворяют уравнению

$$\sum_{\sigma} r_{ij}(\sigma) q_{lk}^*(\sigma) = 0 \quad (2.7)$$

для всех i, j, k и l . Пункт 2 приводит к уравнению

$$\sum_{\sigma} r_{ij}(\sigma) r_{lk}^*(\sigma) = g \delta(i, l) \delta(j, k) / n_R \quad (2.8)$$

при условии, что матрицы R_{σ} ранга n_R унитарны и образуют неприводимое представление группы.

Характером $\chi^R(\sigma)$ матрицы R_{σ} называется сумма её диагональных элементов,

$$\chi^R(\sigma) = \sum_i r_{ii}(\sigma)$$

Поскольку след матрицы инвариантен по отношению к преобразованию подобия, характеры всех матриц R_{σ} , принадлежащих данному классу, одинаковы. Поэтому разложение

$$\Gamma_W = \sum_R c_R \Gamma_R,$$

которое просто констатирует, что неприводимое представление Γ_R встречается в разложении Γ_W c_R раз, может быть выражено

алгебраически уравнением

$$\chi^{\Psi}(\sigma) = \sum_R c_R \chi^R(\sigma)$$

(для всех σ).

Пусть теперь n функций $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ образуют базис n -мерного представления Γ_X группы G , и пусть m функций $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_m$ образуют базис m -мерного неприводимого представления Γ_Y группы G . Тогда под действием операций группы $m \times n$ функций $\Phi_i \Psi_k$ преобразуются друг через друга линейно, и, следовательно, образуют базис представления Γ_{Ψ} группы G . Это представление называется прямым или кронекеровским произведением представлений Γ_X и Γ_Y , и обозначается $\Gamma_X \times \Gamma_Y$. Если

$$R_{\sigma} \Phi_i = \sum_j r_{ji}(\sigma) \Phi_j$$

и

$$R_{\sigma} \Psi_k = \sum_l q_{lk}(\sigma) \Psi_l$$

то

$$R_{\sigma}(\Phi_i \Psi_k) = \sum_{j,l} r_{ji}(\sigma) q_{lk}(\sigma) (\Phi_j \Psi_l)$$

Поскольку

$$\sum_{j,k} r_{ji}(\sigma) q_{lk}(\sigma) = \left(\sum_i r_{ii}(\sigma) \right) \left(\sum_k q_{kk}(\sigma) \right)$$

характеры представлений удовлетворяют условию

$$\chi^{\Psi}(\sigma) = \chi^X(\sigma) \chi^Y(\sigma) \quad (2.9)$$

В большинстве случаев Γ_{Ψ} приводимо.

§ 2-3. Группа октаэдра

Чтобы проиллюстрировать вышеизложенное и подготовить почву для последующих приложений, мы исследуем группу O поворотов, оставляющих неизменным октаэдр. Любой такой поворот будет оставлять неизменным также и куб, вершины которого являются центрами граней октаэдра, и ясно, что группа куба и группа октаэдра изоморфны. Обозначим цифрами 1, 2, 3, 4 четыре оси, проходящие через противоположные вершины куба, как это показано на рис. 2-1. Если поворот, принадлежащий группе, переносит вершины, лежавшие на оси a , в новое положения на оси 1, а вершины на оси b переносит на ось 2, и т.д., то операцию удобно обозначить символом

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & b & c & d \end{pmatrix}$$

Верхний ряд полезно иметь как исходное положение, когда надо комбинировать несколько вращений:

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots \\ a & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & a & \cdot \\ \cdot & e & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & e & \cdot \\ \cdot & f & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots \\ f & \dots \end{pmatrix}$$

Хотя операция, написанная справа, выполняется первой (т.е. вершины движутся сначала от оси f к оси e , затем к оси a и затем к оси 1) конечную перестановку удобнее строить, начиная слева и перемещаясь направо (т.е. замечая, что в первой перестановке под 1 стоит a , во второй — под a стоит e , и в третьей под e стоит f ; таким образом, в результате под 1 будет стоять f). Например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Повороты, оставляющие куб неизменным, перечислены ниже.

Рис. 2-1

Рисунок 2-1. Оси 1, 2, 3 и 4 проходят через противоположные вершины куба и считаются фиксированными в пространстве. Поворот, который совмещает куб с самим собой, можно определить, устанавливая, что вершины, которые сначала лежали на оси a , теперь лежат на оси 1, а те, которые сначала лежали на оси b , лежат теперь на оси 2, и т.д. Поворот задается перестановкой

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & b & c & d \end{pmatrix}.$$

1. Тождественность

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

2. Повороты на π вокруг осей, проходящих через середины противоположных ребер куба

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

3. Повороты на π вокруг осей, проходящих через центры противоположных граней куба:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Повороты на $2\pi/3$ вокруг осей 1, 2, 3 и 4:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

5. Повороты на $\frac{1}{2}\pi$ вокруг осей, проходящих через центры противоположных граней куба:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Эти 24 операции исчерпывают все перестановки четырех объектов: группа октаэдра O , очевидно, изоморфна симметрической группе четвертого порядка, S_4 . Составляя тройные произведения типа $R_\rho R_\sigma R_\rho^{-1}$, как например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

можно показать, что совокупности элементов $1, 2, \dots, 5$, приведенные выше, образуют пять классов, которые мы обозначим $C_1, C_2, \dots, C_5$. Характеры χ_j^R матриц R_G , принадлежащих классу C_j и неприводимому представлению Γ_R даны в таблице 2-1.

Базис неприводимых представлений могут быть легко найдены. Пусть x, y и z будут оси, параллельные ребрам куба, и проходящие через центры граней. Беря по одной операции из каждого класса и действуя ими на точку (x, y, z) мы будем переводить её в точки:

$$(x, y, z), (y, x, -z), (x, -y, -z), (z, x, y), (x, -z, y)$$

Следы трехрядных матриц, задающих эти операции, суть $3, -1, -1, 0, 1$, соответственно. Из таблицы характеров мы видим, что функции x, y и z образуют базис неприводимого представления Γ_4 группы O . Под действием тех же самых операций произведение xyz переходит в

$$xyz, -yxz, xyz, zxy, -xzy$$

Таким образом, функция xyz служит базисом неприводимого представления Γ_2 . Разумеется, представления, которые можно получить, беря за базис функции x, y, z , не обязательно будут неприводимыми; например, x^2, y^2, z^2 переходят в

$$(x^2, y^2, z^2), (y^2, x^2, z^2), (x^2, y^2, z^2), (z^2, x^2, y^2), (x^2, z^2, y^2)$$

и набор характеров $3, 1, 3, 0, 1$ в таблице отсутствует. Однако, его можно получить, взявши сумму $\Gamma_1 + \Gamma_3$. Это показывает, что из функций x^2, y^2 и z^2 можно скомбинировать инвариант (а именно, $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$) и два линейно-независимых выражения (например, $x^2 - y^2$ и $3z^2 - r^2$), образующих базис представления Γ_3 .

Табл. 2-1

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
Γ_1	1	1	1	1	1
Γ_2	1	-1	1	1	-1
Γ_3	2	0	2	-1	0
Γ_4	3	-1	-1	0	1
Γ_5	3	1	-1	0	-1

Таблица 2-1. Характеристики неприводимых представлений группы C_5 .

5.3

В качестве иллюстрации прямого произведения мы возьмем

функции x_1, y_1, z_1 и x_2, y_2, z_2 - координаты двух электронов. Каждая триада порознь образует базис неприводимого представления Γ_4 . Из таблицы 2-1 и уравнения (2.9) мы находим, что девять функций $x_1 x_2, x_1 y_2, \dots, z_1 z_2$ образуют базис такого представления группы O , характеры которого суть 9, 1, 1, 0, 1. Разложение этого представления выражается уравнением

$$\Gamma_4 \times \Gamma_4 = \Gamma_1 + \Gamma_3 + \Gamma_4 + \Gamma_5$$

Базисы ϕ_i для $\Gamma_1, \Gamma_3, \Gamma_4$ и Γ_5 можно легко получить методом подбора. Удобным ортогональным набором, нормированным так же, как исходные функции, является такой набор:

$$\Gamma_1: \phi_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} (x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2)$$

$$\Gamma_3: \phi_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} (x_1 x_2 - y_1 y_2)$$

$$\phi_3 = \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} (2z_1 z_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2)$$

$$\Gamma_4: \phi_4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} (y_1 z_2 + z_1 y_2)$$

$$\phi_5 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} (z_1 x_2 + x_1 z_2)$$

$$\phi_6 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} (x_1 y_2 + y_1 x_2)$$

$$\Gamma_5: \phi_7 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} (y_1 z_2 - z_1 y_2)$$

$$\phi_8 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} (z_1 x_2 - x_1 z_2)$$

$$\phi_9 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} (x_1 y_2 - y_1 x_2)$$

(2-10)

§ 2-4. Трёхмерная группа вращений

Рассмотрение предыдущего раздела можно применить к любой группе преобразований, оставляющих неизменной какую-либо геометрическую фигуру. Естественным расширением теории служит рассмотрение группы вращения в трёхмерном пространстве, R_3 , поскольку её можно рассматривать как группу, состоящую из операций, оставляющих неизменной сферу. Помимо того, что её содержание важно само по себе, она является связующим звеном между конечными группами, с одной стороны, и непрерывными группами (простейшим примером которых она является) - с другой.

Хорошо известно, что при повороте (задаваемой, скажем эйлеравыми углами α, β, γ) шаровая функция $Y_{lm}(\theta, \phi)$ переходит в линейную комбинацию шаровых функций l -того порядка. Переходя на язык теории конечных групп, мы можем сказать, что $2l+1$ шаровых функций образуют базис неприводимого представления группы R_3 . Можно показать, что это представление - обозначим его D_l - неприводимо. В группе октаэдра все операции одного класса соответствуют повороту на один и тот же угол. Это справедливо и для R_3 ; более того, все повороты на один и тот же угол входят в один класс, независимо от того, вокруг какой оси совершён поворот. Простое доказательство этого утверждения можно получить, рассматривая последовательные положения точки на сфере. Чтобы найти характер элемента какого-либо класса, мы будем считать, что вращение совершается на угол α вокруг оси z . Поскольку

$$Y_{lm}(\theta, \phi + \alpha) = e^{im\alpha} Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (2.11)$$

то матрица представления будет диагональной, со следом, равным

$$\begin{aligned}\chi_{\alpha}^l &= e^{i l \alpha} + e^{i(l-1)\alpha} + \dots + e^{-i l \alpha} \\ &= \frac{e^{i(l+\frac{1}{2})\alpha} - e^{-i(l+\frac{1}{2})\alpha}}{e^{i\frac{1}{2}\alpha} - e^{-i\frac{1}{2}\alpha}} = \frac{\sin \frac{1}{2}(2l+1)\alpha}{\sin \frac{1}{2}\alpha}\end{aligned}$$

(2.12)

Группа октаэдра является подгруппой R_3 , элементы O содержатся в R_3 и удовлетворяют между собой групповым постулатам. Функции $Y_{lm}(\theta, \phi)$ образуют базис неприводимого представления $\mathcal{D}_l$ группы R_3 и, следовательно, образуют базис некоторого представления O . Однако последнее будет, вообще говоря, приводимо. Чтобы узнать, каким образом распадутся представления $\mathcal{D}_l$, если их рассматривать как представления группы O , можно вычислить характеры $\mathcal{D}_l$ для тех углов поворота, которые фигурируют в O , и получающиеся наборы чисел представлять в виде линейных комбинаций строк таблицы характеров O . Углы поворотов, соответствующих классам C_1, C_2, C_3, C_4 и C_5 группы O есть, соответственно, $0, \pi, \pi, 2\pi/3$ и $\pi/2$. Из уравнения (2.12) видим, что, например, для

$$\chi_0^3 = 7 \quad \chi_{\pi}^3 = -1 \quad \chi_{2\pi/3}^3 = 1 \quad \chi_{\pi/2}^3 = -1$$

Можно убедиться, что набор чисел $7, -1, -1, 1, -1$ можно представить как сумму характеров неприводимых представлений Γ_2, Γ_4 и Γ_5 группы O . Говорят, что при переходе $R_3 \rightarrow O$ неприводимое представление $\mathcal{D}_3$ распадается по закону

$$\mathcal{D}_3 \rightarrow \Gamma_2 + \Gamma_4 + \Gamma_5$$

Это - пример правила приведения ().

Набор правил для $l \leq 6$ приведен в таблице 2-2.

Легко получить разложение кронекеровского произведения

$\mathcal{D}_j \times \mathcal{D}_k$. Находя характеры χ_α^j и χ_α^k по формуле (2.12) и подставляя их в (2.9), мы найдем

$$\begin{aligned} \chi_\alpha^j \chi_\alpha^k &= [e^{ij\alpha} + e^{i(j-1)\alpha} + \dots + e^{-ij\alpha}] \\ &\quad \times [e^{ik\alpha} + e^{i(k-1)\alpha} + \dots + e^{-ik\alpha}] = \\ &= [e^{i(j+k)\alpha} + e^{i(j+k-1)\alpha} + \dots + e^{-i(j+k)\alpha}] \\ &\quad + [e^{i(j+k-1)\alpha} + e^{i(j+k-2)\alpha} + \dots + e^{-i(j+k-1)\alpha}] \\ &\quad + \dots + [e^{i|j-k|\alpha} + e^{i(|j-k|-1)\alpha} + \dots + e^{-i|j-k|\alpha}] \\ &= \chi_\alpha^{j+k} + \chi_\alpha^{j+k-1} + \dots + \chi_\alpha^{|j-k|} \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\mathcal{D}_j \times \mathcal{D}_k = \mathcal{D}_{j+k} + \mathcal{D}_{j+k-1} + \dots + \mathcal{D}_{|j-k|} \quad (2.13)$$

56a

Табл. 2-2.

- $D_1 \rightarrow \Gamma_1$
- $D_2 \rightarrow \Gamma_2$
- $D_3 \rightarrow \Gamma_2 + \Gamma_1$
- $D_4 \rightarrow \Gamma_2 + \Gamma_1 + \Gamma_1$
- $D_5 \rightarrow \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_1 + \Gamma_1$
- $D_6 \rightarrow \Gamma_2 + 2\Gamma_1 + \Gamma_1$
- $D_7 \rightarrow \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_1 + \Gamma_1 + 2\Gamma_1$

Таблица 2-2. Правила приведения

$$R_2 \rightarrow O.$$

§ 2-5. Собственные функции и операторы

Теперь мы можем начать применять теорию групп к задачам атомной спектроскопии. Предположим, что линейно-независимые функции Φ_i суть собственные функции оператора H , отвечающие собственному значению E

$$H\Phi_i = E\Phi_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.14)$$

Если H остается инвариантным при операциях группы G , то все функции $R_\sigma \Phi_i$ также будут собственными функциями H , отвечающими собственному значению E . В соответствии с этим, любую из них можно представить в виде линейной комбинации исходных функций Φ_i и, следовательно, функции Φ_i образуют базис n -мерного представления Γ_R группы G . Символ Γ_R можно использовать для обозначения n -кратно вырожденного уровня; если Γ_R приводимо, то вырождение называют случайным. В этом случае можно построить два (или больше) набора линейных комбинаций собственных функций Φ_i и каждый из наборов будет служить базисом неприводимого представления G . Теория групп, определяя, какие неприводимые представления G могут возникнуть из данного набора базисных функций, фиксирует минимальную возможную степень вырождения; в то же время она не дает гарантии того, что осуществляется именно этот предельный случай, хотя примеры случайного вырождения чрезвычайно редки (см. задачу 2-3).

В случае группы октаэдра O трансформационные свойства функций x , y , и z мы могли легко изучать, делая замены типа $x \rightarrow y, y \rightarrow x, z \rightarrow -z$. Чтобы изучить свойства

операторов и собственных функций по отношению к произвольным поворотам в пространстве, мы введем операторы вида $e^{i\alpha J_z}$

Пусть (x, y, z) суть координаты электрона в сложном атоме, полный угловой момент которого есть J . Разлагая оператор $e^{i\alpha J_z}$ в степенной ряд, можно показать, что [16]

$$\begin{aligned} e^{-i\alpha J_z} (x+iy) e^{i\alpha J_z} &= (x+iy) e^{-i\alpha} \\ e^{-i\alpha J_z} z e^{i\alpha J_z} &= z \end{aligned} \quad (2.15)$$

Компоненты импульса электрона p и компоненты всех угловых моментов преобразуются точно так же, например

$$\begin{aligned} e^{-i\alpha J_z} s_+ e^{i\alpha J_z} &= s_+ e^{-i\alpha} \\ e^{-i\alpha J_z} s_z e^{i\alpha J_z} &= s_z \end{aligned} \quad (2.16)$$

Можно считать, что после воздействия этого оператора мы получаем координаты и моменты электронов в новой системе отсчета, оси x и y которой повернуты на угол α от их начальных направлений; и наоборот, преобразования (2.15) и (2.16) можно интерпретировать как вращение всего атома в целом на угол $-\alpha$ вокруг оси z ^{х)}. Любой оператор H , составленный из координат и угловых моментов электронов переходит в оператор H'

$$H' = e^{-i\alpha J_z} H e^{i\alpha J_z} \quad (2.17)$$

х) Структурой ядра мы здесь пренебрегаем, но её легко можно учесть, заменив J на $F = J + I$ где I есть спин ядра. Если $e^{i\alpha J_z}$ заменить на $e^{i\alpha F_z}$ то и электроны, и нуклоны будут поворачиваться на угол $-\alpha$ вокруг оси z .

Уравнение

$$e^{-i\alpha J_z} |J, M_J\rangle = e^{-i\alpha M_J} |J, M_J\rangle \quad (2.18)$$

показывает, что собственная функция $|J, M_J\rangle$ умножается на $e^{-i\alpha M_J}$

Поскольку операторы J_x , J_y и J_z , действуя на $|J, M_J\rangle$ дают состояния с тем же самым квантовым числом J , то получается, что при любом пространственном вращении состояние $|J, M_J\rangle$ переходит в некоторую линейную комбинацию $2J+1$ таких состояний. Этого следовало ожидать, так как $H_1 + H_2$ при операциях R_3 остается инвариантным, и собственные функции каждого J -уровня должны образовывать базис какого-либо представления группы R_3 . Характеры этих представлений χ_2^J можно легко получить из уравнения (2.18); в самом деле, сравнивая это уравнение с (2.11), видим, что для получения χ_2^J нужно только заменить l на J в уравнении (2.12). Итак, $2J+1$ состояний $|J, M_J\rangle$ образуют базис неприводимого представления D_J группы R_3 .

В отличие от l квантовое число J может быть полуцелым. Первое "полуцелое" представление R_3 есть $D_{\frac{1}{2}}$. Самым простым его базисом являются спиновые функции α и β , соответствующие $m_s = \pm \frac{1}{2}$. Если J полуцелое, то множитель $e^{-2\pi i M_J}$ равен -1 ; это значит, что при повороте на 2π вокруг оси Z функция $|J, M_J\rangle$ умножается на -1 . Ясно, что разложить D_J по представлениям O нельзя, поскольку в этой группе вращения на 0 и на 2π эквивалентны. Поэтому можно подумать, что при полуцелом J невозможно построить

такие линейные комбинации состояний (J, M_J) , которые обладали бы октаэдрической симметрией. Чтобы обойти эту трудность, к группе O добавляют элемент $\mathcal{E}$, который коммутирует со всеми элементами группы, удовлетворяет условию $\mathcal{E}^2 = \mathcal{I}$ и обладает таким свойством, что элемент $\mathcal{R}$, удовлетворявший раньше условию $\mathcal{R}^2 = \mathcal{I}$, теперь удовлетворяет условию $\mathcal{R}^2 = \mathcal{E}$. Группы, расширенные таким способом, называются двойными. Вообще говоря, они не обладают вдвое большим количеством классов по сравнению с исходными группами, так как класс, соответствующий повороту на $\mathcal{I}$, часто не удваивается. Характеры двойной группы октаэдра, найденные Бете [11], даны в таблице 2-3. Некоторые правила приведения для $R_3 \rightarrow O$ в случае полуцелых J собраны в таблице 2-4.

§ 2-6. Теорема Вигнера - Экарта

Знание трансформационных свойств собственных функций и операторов приносит наибольшую пользу при вычислении матричных элементов типа

$$\int \varphi_i^* h_j \varphi_k d\tau$$

Предположим, что удовлетворяются следующие условия:

1. p функций φ_i ($i = 1, 2, \dots, p$) образуют ортонормальный базис неприводимого представления Γ_p группы $\mathcal{G}$
2. q функций ψ_j ($j = 1, 2, \dots, q$) образуют ортонормальный базис неприводимого представления Γ_q группы $\mathcal{G}$
3. r функций θ_k ($k = 1, 2, \dots, r$) образуют ортонормальный базис неприводимого представления Γ_r группы $\mathcal{G}$

Табл 2-3

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8
Γ_1	1	1	1	1	1	1	1	1
Γ_2	1	1	-1	1	1	1	-1	-1
Γ_3	2	2	0	2	-1	-1	0	0
Γ_4	3	3	-1	-1	0	0	1	1
Γ_5	3	3	1	-1	0	0	-1	-1
Γ_6	2	-2	0	0	1	-1	(2) [†]	-(2) [†]
Γ_7	2	-2	0	0	1	-1	-(2) [†]	(2) [†]
Γ_8	4	-4	0	0	-1	1	0	0

Таблица 2-3. Характеристики двойной группы октаэдра.

4. Под действием преобразований группы Q операторов h_j ($j=1,2,\dots,q$) ведут себя так же, как базисные функции ψ_j . А именно, если в результате действия операции Q_σ функции ψ_j переходят в ψ_j' , где

$$\psi_j' = \sum_l \Gamma_{lj}(\sigma) \psi_l$$

то должно быть $h_j \rightarrow h_j'$ где

$$h_j' = \sum_l \Gamma_{lj}(\sigma) h_l$$

для всех σ .

q функций $\psi_j \theta_k$ образуют базис представления $\Gamma_Q \times \Gamma_R$ группы S . В соответствии с разложением

$$\Gamma_Q \times \Gamma_R = \sum_S c_S \Gamma_S$$

из произведений $\psi_j \theta_k$ можно построить такие наборы линейных комбинаций, каждый из которых будет являться ортонормальным базисом некоторого неприводимого представления группы S .

Запишем

$$\rho_l(\Gamma_S \beta) = \sum_{j,k} (\Gamma_Q j; \Gamma_R k | \Gamma_S \beta l) \psi_j \theta_k \quad (2.19)$$

где l изменяется от 1 до s , так как у неприводимого представления Γ_S группы S имеется s штук базисных функций. Символ β служит для того, чтобы различать эквивалентные неприводимые представления, которые возникают, если $c_S > 1$. Примерами уравнения (2.19) являются (2.10). В выборе ортонормальных базисных функций $\rho_l(\Gamma_S \beta)$ для данного Γ_S существует значительная свобода. После того, как выбор сделан, коэффициенты в уравнении (2.19) фиксируются. Нужно проследить

за тем, чтобы функции $\rho_i(\Gamma_p \beta)$ преобразовывались так же, как функции ϕ_i для всех β

Ввиду унитарности преобразований (2.19)

$$\psi_j \theta_k = \sum_{l, s, \beta} (\Gamma_s \beta l | \Gamma_Q j; \Gamma_R k) \rho_l(\Gamma_s \beta) \quad (2.20)$$

где

$$(\Gamma_s \beta l | \Gamma_Q j; \Gamma_R k) = (\Gamma_Q j; \Gamma_R k | \Gamma_s \beta l)^*$$

Взяв точно такие же линейные комбинации величин $h_j \theta_k$ какие брались для $\psi_j \theta_k$ мы можем построить функции $\lambda_l(\Gamma_s \beta)$, которые преобразуются так же, как функции $\rho_l(\Gamma_s \beta)$. По аналогии с уравнением (2.20) имеем

$$h_j \theta_k = \sum_{\beta, s, l} (\Gamma_s \beta l | \Gamma_Q j; \Gamma_R k) \lambda_l(\Gamma_s \beta)$$

Умножим ~~это~~ ^{обе части этого} равенства ~~на~~ ~~обеим сторонам~~ на ϕ_i^* и проинтегрируем по всему координатному пространству. Тогда останутся только члены, для которых $\Gamma_s = \Gamma_p$ и $l = i$ более того - можно показать также, что интегралы

$$\int \phi_i^* \lambda_i(\Gamma_p \beta) d\tau \quad (2.21)$$

не зависят от i и могут быть обозначены $A_p^{(x)}$. Итак,

$$\int \phi_i^* h_j \theta_k d\tau = \sum_{\beta} A_p(\Gamma_p \beta i | \Gamma_Q j; \Gamma_R k) \quad (2.22)$$

х) Формальное доказательство условия $\Gamma_s = \Gamma_p$ можно легко получить для конечной группы из g элементов. Уравнения

$$R_{\sigma} \phi_i^* = \sum_m R_{mi}^*(\sigma) \phi_m^* \quad R_{\sigma} \lambda_l = \sum_n S_{nl}(\sigma) \lambda_n$$

это уравнение и есть содержание теоремы Вигнера-Экарта, названной так по именам её авторов [14,17].

Иногда можно отыскивать другие базисы для Γ_p и Γ_R , или другие операторы, преобразующиеся так, как Γ_Q . Чтобы различать величины, преобразующиеся одинаковым образом, мы будем ставить сверху индексы. Например, $(\theta_1^1, \theta_2^1, \dots, \theta_r^1)$ и $(\theta_1^2, \theta_2^2, \dots, \theta_r^2)$ это два набора функций, которые по отдельности преобразуются согласно уравнению

$$R_\sigma \theta_k^c = \sum_l r_{lk}(\sigma) \theta_l^c$$

Тогда уравнение (2.22) запишется так

$$\int \Phi_i^{a^*} h_j^b \theta_k^c d\tau = \sum_\beta A_\beta(\alpha, \beta, c) (\Gamma_p \beta i | \Gamma_Q \beta j | \Gamma_R k) \quad (2.23)$$

Сумма по β содержит C_p членов, где C_p - число, показывающее, сколько раз Γ_p встречается в разложении $\Gamma_Q \times \Gamma_R$

Таким образом, любой набор pqr интегралов

$$\int \Phi_i^{a^*} h_j^b \theta_k^c d\tau$$

показывают, что

$$\begin{aligned} \int \Phi_i^* \lambda_\ell d\tau &= g^{-1} \sum_\sigma \int (R_\sigma \Phi_i)^* (R_\sigma \lambda_\ell) d\tau \\ &= g^{-1} \sum_{m,n} \sum_\sigma \rho_{mi}^*(\sigma) s_{n\ell}(\sigma) \int \Phi_m^* \lambda_n d\tau \end{aligned}$$

Согласно (2.7), сумма по σ исчезает для всех i, ℓ, m и n если Γ_p и Γ_S суть неэквивалентные неприводимые представления. Значит, чтобы интеграл не был нулем, надо, чтобы $\Gamma_p = \Gamma_S$. Условие $\ell = i$ и инвариантность интегралов (2.21) можно ввести таким же образом с помощью (2.8).

при данном выборе a , b и c , может быть выражен в виде суммы не более чем C_p линейно-независимых наборов интегралов. Или, по-другому, можно найти коэффициенты f_{uvw}^{abc} такие, что

$$\int \phi_i^a h_j^b \theta_k^c d\tau = \sum f_{uvw}^{abc} \int \phi_i^u h_j^v \theta_k^w d\tau \quad (2.24)$$

для всех i , j и k , где сумма распространяется не более чем на C_p членов, в предположении, что совокупности из pqr интегралов для различных u , v и w линейно-независимы. Уравнение (2.24) обычно является более удобной формой записи теоремы Вигнера-Экарта тогда, когда коэффициенты $(\Gamma_p \beta i | \Gamma_q j; \Gamma_r k)$ не затабулированы. Само собой разумеется, что если $C_p = 0$, то все матричные элементы исчезают.

§ 2-7. Тензорные операторы

Чаще всего теорему Вигнера-Экарта применяют к группе R_3 . Функциями ϕ_i^* и θ_k служат $(\Gamma K M_K |$ и $| \Gamma' K' M'_K)$ где K и K' - пара угловых моментов одинаковой природы (например, J и J'). Тогда, чтобы теорема Вигнера-Экарта была применима, надо, чтобы операторы h_j преобразовывались так же, как совокупность функций $| \Gamma^p k q)$ где $q = k, k-1, \dots, -k$. Это будет обеспечено, если операторы (будем теперь их обозначать $T_q^{(k)}$) будут преобразовываться так же, как сферические функции Y_{kq} или, что одно и то же, так как величины

$$C_q^{(k)} = \left(\frac{4\pi}{2k+1} \right)^{\frac{1}{2}} Y_{kq}(\theta, \phi) = (-1)^q \left[\frac{(k-q)!}{(k+q)!} \right]^{\frac{1}{2}} P_k^q(\cos \theta) e^{iq\phi} \quad (2.25)$$

$2k+1$ операторов $T_q^{(k)}$, где $k, k-1, \dots, -k$ являются компонентами тензорного оператора $T^{(k)}$ k -того ранга.

Согласно уравнению (2.17), преобразование какого-либо оператора при поворотах вокруг оси Z полностью определяется правилами коммутации оператора с J_z . Для того, чтобы операторы $T_q^{(k)}$ и $C_q^{(k)}$ при любом повороте преобразовывались одинаково, нужно только, чтобы правила коммутации $T_q^{(k)}$ с J_x, J_y и J_z были такими же, как у $C_q^{(k)}$. Единственной частью J , не коммутирующей с $C_q^{(k)}$ является орбитальный угловой момент l ; с помощью подстановок

$$l_z = \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad l_{\pm} = e^{\pm i\varphi} \left(\pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

можно показать, что

$$\begin{aligned} [J_z, C_q^{(k)}] &= q C_q^{(k)} \\ [J_{\pm}, C_q^{(k)}] &= [k(k+1) - q(q \pm 1)]^{\frac{1}{2}} C_{q \pm 1}^{(k)} \end{aligned}$$

В соответствии с этим, величины $T_q^{(k)}$ обладают точно такими же, как $C_q^{(k)}$ трансформационными свойствами тогда, когда они удовлетворяют следующим соотношениям коммутации

$$\begin{aligned} [J_z, T_q^{(k)}] &= q T_q^{(k)} \\ [J_{\pm}, T_q^{(k)}] &= [k(k+1) - q(q \pm 1)]^{\frac{1}{2}} T_{q \pm 1}^{(k)} \end{aligned} \quad (2.26)$$

Эти уравнения были использованы Рака [18] в качестве исходной точки теории тензорных операторов.

Из уравнения (2.13) ясно, что $\mathcal{D}_K$ встречается в разложении прямого произведения $\mathcal{D}_k \times \mathcal{D}_{K'}$ не более одного раза. Таким образом, уравнение (2.22) переходит в

$$(\gamma K M_K | T_q^{(k)} | \gamma' K' M_{K'}) = A(K M_K | k q; K' M_{K'})$$

где A не зависит от M_K , q и $M_{K'}$. Коэффициент в правой части есть просто коэффициент векторной связи; заменяя его $3-j$ символом и вводя более подробное обозначение для A мы получим

$$(\gamma K M_K | T_q^{(k)} | \gamma' K' M_{K'}) = (-1)^{K-M_K} \begin{pmatrix} K & k & K' \\ -M_K & q & M_{K'} \end{pmatrix} (\gamma K | T^{(k)} | \gamma' K') \quad (2.27)$$

Последний множитель в правой части называется приведенным матричным элементом. Представление $\mathcal{D}_K$ встречается в разложении $\mathcal{D}_k \times \mathcal{D}_{K'}$ тогда, когда удовлетворяется условие треугольника, то-есть когда можно построить треугольник с длинами сторон K , k и K' . Если условие треугольника не выполняется, $3-j$ символ автоматически пропадает.

Каждый член вида $\sum_i r_i^k Y_{kq}(\theta_i, \phi_i)$ в уравнении (2.1), будучи суммой сферических функций, является тензорным оператором. Если H_3 рассматривается как возмущение, то для первого приближения нужны матричные элементы, для которых $K=K'$. В этом случае мы можем построить операторы, которые зависят от K_x , K_y и K_z и преобразуются аналогично шаровым функциям Y_{kq} ; следовательно, матричные элементы этих операторов будут пропорциональны матричным элементам тензорных операторов $\sum_i r_i^k Y_{kq}(\theta_i, \phi_i)$. Приведем примеры таких операторов-экви-

элементов, пригодных для конфигураций вида l^n

$$\sum_i (3z_i^2 - r_i^2) \equiv \alpha \langle r^2 \rangle [3K_2^2 - K(K+1)] \quad (2.28)$$

$$\begin{aligned} \sum_i (35z_i^4 - 30z_i^2 r_i^2 + 3r_i^4) \\ \equiv \beta \langle r^4 \rangle [35K_2^4 - 30K(K+1)K_2^2 + 25K_2^2 \\ - 6K(K+1) + 3K^2(K+1)^2] \end{aligned} \quad (2.29)$$

$$\begin{aligned} \sum_i (231z_i^6 - 315z_i^4 r_i^2 + 105z_i^2 r_i^4 - 5r_i^6) \\ \equiv \gamma \langle r^6 \rangle [231K_2^6 - 315K(K+1)K_2^4 + 735K_2^4 \\ + 105K^2(K+1)^2 K_2^2 - 525K(K+1)K_2^2 + 294K_2^2 \\ - 5K^3(K+1)^3 + 40K^2(K+1)^2 - 60K(K+1)] \end{aligned} \quad (2.30)$$

где

$$\langle r^k \rangle = \int_0^\infty R_{nl}(r) r^k R_{nl}(r) dr$$

Если отбросить $\langle r^k \rangle$, то множители перед операторами-эквивалентами, α , β и γ , становятся просто числами, не зависящими от радиальных волновых функций. Выражения, стоящие справа в уравнениях (2.28), (2.29) и (2.30), проще всего получаются заменой M_K на K_2 в явных формулах для соответствующих $3-j$ символов. Можно сделать иначе: взять нужную шаровую

функцию и заменить x, y, z на K_x, K_y, K_z . При этом надо учитывать, что K_x, K_y, K_z , в отличие от x, y, z не коммутируют. Значит, образуя оператор, воспроизводящий собственные значения суммы $\sum_i (35z_i^4 - 30z_i^2\Gamma_i^2 + 3\Gamma_i^4)$ мы должны заменять $\sum_i \Gamma_i^4$ не величиной $(K^2)^2$ собственные значения которой равны $K^2(K+1)^2$, а величиной

$$\frac{1}{6} \sum_{i,j=1,2,3} (K_i^2 K_j^2 + K_j^2 K_i^2 + K_i K_j K_i K_j + K_j K_i K_j K_i + K_i K_j^2 K_i + K_j K_i^2 K_j)$$

Путем многократного использования правил коммутации (1.15) её можно свести к оператору, собственные значения которого равны

$$K^2(K+1)^2 - K(K+1)/3$$

одного вычисления очень утомительны. Операторы-эквиваленты (2.28)-(2.30) ввел Стивенс [10]. Примеры их использования для расчета сверхтонких взаимодействий были даны Рэмзи [19].

Поскольку вычисления для любого тензорного оператора $T_q^{(k)}$ должны обязательно привести нас к интегралу на одноэлектронных состояниях, то условие треугольника для тройки l, k, l показывает, что количество членов, которые нужно удерживать в H_3 , ограничено. Для f -электронов все тензорные операторы $T_q^{(k)}$ с $k > 6$ дают нулевые матричные элементы, и разложение (2.5) для H_3^f является достаточным для всех конфигураций типа f^n . Очевидно, что если требуются лишь матричные элементы между состояниями одной и той же конфигурации, то члены нечетных степеней вклю-

чить в H_3 не нужно. Кроме того, множители перед операторами, эквивалентными любой из компонент $T_{\nu}^{(k)}$ тензорного оператора $T^{(k)}$ будут одинаковыми, так как эти множители, будучи произведением приведенного матричного элемента на некоторые величины, зависящие только от K , не зависят от q . Всё это, вместе взятое, показывает, что когда изучаются эффекты кристаллического поля в конфигурациях вида f^n , то надо вычислять только три фактора α, β и γ . Стивенс [10] табулировал α, β и γ для основных уровней всех трехзарядных редкоземельных ионов.

§ 2-8. Внешнее магнитное поле

Чтобы проиллюстрировать мощь теоремы Вигнера-Экарта даже в её первоначальной форме (2.24), рассмотрим влияние внешнего магнитного поля H на уровни энергии редкоземельного иона в кристаллической решетке. Уравнение Дирака показывает, что для одиночного электрона соответствующей добавкой к гамильтониану будет $\beta H \cdot (L + 2S)$, где $\beta = e\hbar / 2mc$ есть магнетон Бора. Поэтому в качестве первого (и очень хорошего) приближения для многоэлектронного случая мы добавим к гамильтониану оператор

$$H_4 = \sum_i \beta H \cdot (l_i + 2s_i) = \beta H \cdot (L + 2S) \quad (2.31)$$

Неравенства $H_1 \gg H_2 \gg H_3 \gg H_4$, которые имеют место для редкоземельных ионов, показывают, что H_4 можно считать возмущением, накладываемым на систему уровней энергии; волновые

функции последних имеют вид $(f^{\nu} r^{\nu} S L J \Gamma_R t)$, где индексом t помечаются различные функции, вместе образующие базис для Γ_R . Если симметрия на ядре редкоземельного иона ортаэдрическая, то Γ_R есть неприводимое представление группы O . Предположим, что мы хотим найти влияние внешнего магнитного поля на дублет Γ_2 . Величина $L+2S$ является вектором, и при простых вращениях три ее компоненты преобразуются друг через друга так, как координаты (x, y, z) точки. Таким образом, в случае группы O компоненты $L+2S$ преобразуются по Γ_4 . С помощью таблицы (2-1) легко показать, что $\Gamma_4 \times \Gamma_3 = \Gamma_4 + \Gamma_5$. Отсутствие Γ_3 в разложении сразу же показывает, что все матричные элементы от $L+2S$ между состояниями, преобразующимися по Γ_3 исчезают. Поэтому дублет остается вырожденным (в первом приближении) когда накладывается магнитное поле.

Легко найти примеры ур-ния (2.24) с $c_p = 1$. Состояния (J, M_J) образуют базис неприводимого представления $\mathcal{D}_J$ группы R_3 . Вектор преобразуется по $\mathcal{D}_1$ и в $\mathcal{D}_J \times \mathcal{D}_1$ представление $\mathcal{D}_J$ содержится только один раз. Таким образом, матричные элементы от компонент $L+2S$ должны быть пропорциональны матричным элементам компонент любого другого вектора. Поскольку все состояния нумеруются с помощью вектора J , то очень удобно взять в качестве такого вектора именно J . Тогда ур. (2.24) перейдет в

$$(JM_J | L_j + 2S_j | JM_J') = g (JM_J | J_j | JM_J') \quad (2.32)$$

для всех M_J, j и M_J' . Символ g называется фактором Ланде g_J и зависит от детальной природы состояний. Ур-ние (2.32) соответствует $a = u, b \neq v, c = w$ в ур-нии (2.24); ин-

декс j у L , S и J стоит вместо x, y или z , и соответствует тому же самому индексу в (2.24).

Нетрудно найти случаи, когда $a \neq u$, $c \neq v$. Например, две собственные функции ($S' = 1/2$, $M'_S = \pm 1/2$) служат базисом неприводимого представления Γ_6 группы O . Две базисные функции любого другого дублета Γ_6 можно привести во взаимно-однозначное соответствие с компонентами $M'_S = \pm 1/2$; и поскольку Γ_6 встречается в разложении $\Gamma_4 \times \Gamma_6$ только один раз, матричные элементы $\beta H \cdot (L + 2S)$ можно воспроизвести с помощью оператора $g' \beta H \cdot S'$ действуя им на состояния, для которых $M'_S = \pm 1/2$, причем g' постоянно. Это показывает, что расщепление дублета типа Γ_6 во внешнем магнитном поле не зависит от ориентации H по отношению к кубическим осям. Экспериментаторы, работающие в области парамагнитного резонанса, обнаружили, что им почти всегда можно резюмировать свои наблюдения в сжатой форме, перечислив величины (например, упомянутые выше g -факторы), появляющиеся в спин-гамильтониане, т.е. гамильтониане, в котором фигурирует эффективный спин S' . На самом деле им часто можно использовать спин-гамильтониан во многих таких случаях, где строгие теоретико-групповые соображения не позволяют это делать. Этот вопрос обсуждался Костаром и Статцем [20].

В качестве примера, где $C_p = 2$, возьмем действие H на энергетический уровень, соответствующий неприводимому представлению Γ_8 группы O . Состояния ($S' = \frac{3}{2}$, M'_S) образуют базис для Γ_8 и поскольку Γ_8 в разложении $\Gamma_4 \times \Gamma_8$ встречается дважды (что можно проверить, используя таблицу 2-3), то,

чтобы изобразить действие H_4 , нам потребуется два независимых набора функций S' , преобразующихся согласно Γ_4 . Легко видеть, что $(S'_x)^d$, $(S'_y)^d$ и $(S'_z)^d$, где d - нечетное положительное число, обладают нужными трансформационными свойствами, и поэтому возможной формой спин-гамильтониана будет [21]

$$\beta H_x (gS'_x + fS_z'^3) + \beta H_y (gS'_y + fS_z'^3) + \beta H_z (gS'_z + fS_z'^3)$$

Константы g и f соответствуют f_{uvw}^{abc} и $f_{u\sigma'vw}$ в обозначениях ур-ния (2.24).

§ 2-9. Шестифтористый нептуний

Чтобы свести вместе различные вопросы этой главы, мы рассмотрим задачу об одном f -электроне в октаэдрическом поле. Гамильтониан есть просто $H_2 + H'_3$. Первая часть, H_2 представляют собой спин-орбитальную связь и дается ур-нием (1-13). Вторая, H'_3 , есть энергия взаимодействия f ^{с кристаллическими полями} f -электронов, точно задается ур-нием (2.5). Прямой метод решения - это взять 14 состояний $|sm_s \ell m_\ell\rangle$, для которых $s = 1/2$, $m_s = \pm 1/2$, $\ell = 3$, $m_\ell = 3, 2, \dots, -3$, и найти полную матрицу $H_2 + H'_3$. Гораздо лучше, однако, взять за базис такие линейные комбинации $|sm_s \ell m_\ell\rangle$, которые диагонализуют или H_2 или H'_3 , потому что тогда мы избежим необходимости диагонализировать матрицу 14×14 . Если мы решим диагонализировать H'_3 , то нам нужно найти матричные элементы тензорных операторов между состояниями $|sm_s \ell m_\ell\rangle$. Следуя установившейся практике, будем использовать метод операторов-эквивалентов, а не саму теорему Вигнера-Экарта в форме (2.27). Из (2.29) следует

$$35z^4 - 30z^2r^2 + 3r^4 \equiv \beta \langle r^4 \rangle [35l_2^4 - 30l(l+1)l_2^2 + 25l_2^2 - 6l(l+1) + 3l^2(l+1)^2]$$

Метод замены при выводе операторов-эквивалентов сразу дает

$$x^4 - 6x^2y^2 + y^4 = \frac{1}{2} [(x+iy)^4 + (x-iy)^4] \equiv \frac{1}{2} \beta \langle r^4 \rangle (l_+^4 + l_-^4)$$

Аналитические эквиваленты существуют для сферических функций шестого порядка. Матричные элементы можно быстро выписать из таблиц Стивенса [10] и Бейкера, Блини и Хейса [22]. Два множителя перед операторами-эквивалентами, β и γ , можно найти, вычислив по одному матричному элементу:

$$\begin{aligned} \beta \langle r^4 \rangle (f, m_l = 0 | 35l_2^4 - 30l(l+1)l_2^2 + \dots | f, m_l = 0) \\ = 360 \beta \langle r^4 \rangle = (f, 0 | 35z^4 - 30z^2r^2 + 3r^4 | f, 0) \\ = 28 \langle r^4 \rangle \int_{-1}^1 P_3(\mu) P_4(\mu) P_3(\mu) d\mu = \frac{16}{11} \langle r^4 \rangle \end{aligned}$$

Вековой определитель H_3' распадается на несколько определителей второго и первого порядка, причем строки и столбцы их нумеруются с помощью m_l . Приравнивая определители нулю, получаем:

$$\begin{vmatrix} 3a+b-\epsilon & (a-7b)(15)^{\frac{1}{2}} \\ (a-7b)(15)^{\frac{1}{2}} & a+15b-\epsilon \end{vmatrix} = 0$$

74.

для комбинаций m_l типа 3, -1 и -3, 1;

$$\begin{vmatrix} -7a - 6b - \epsilon & 5a + 42b \\ 5a + 42b & -7a - 6b - \epsilon \end{vmatrix} = 0$$

для 2, -2; и

$$6a - 20b - \epsilon = 0$$

для $m_l = 0$. Константы a и b есть

$$a = 60 \gamma A_4^0 \langle r^4 \rangle = 8 A_4^0 \langle r^4 \rangle / 53$$

$$b = 180 \gamma A_6^0 \langle r^6 \rangle = -30 A_6^0 \langle r^6 \rangle / 429$$

Векторные уравнения не похожи друг на друга, и можно подумать, что для ϵ получится пять различных корней. Однако, правило разложения $D_3 \rightarrow \Gamma_2 + \Gamma_4 + \Gamma_5$ показывает, что здесь может быть не более трех различных корней, и это сразу же можно проверить, решив уравнения. Энергии и соб. функции таковы:

$$\begin{aligned} \epsilon_0 = 6a - 20b : & \quad (0) \\ & \quad \left(\frac{5}{8}\right)^{\frac{1}{2}} |3\rangle + \left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{1}{2}} |-1\rangle \\ & \quad \left(\frac{5}{8}\right)^{\frac{1}{2}} |-3\rangle + \left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{1}{2}} |1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \epsilon_1 = -2a + 36b : & \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} |2\rangle + \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} |-2\rangle \\ & \quad \left(\frac{2}{8}\right)^{\frac{1}{2}} |3\rangle - \left(\frac{5}{8}\right)^{\frac{1}{2}} |-1\rangle \\ & \quad \left(\frac{2}{8}\right)^{\frac{1}{2}} |-3\rangle - \left(\frac{5}{8}\right)^{\frac{1}{2}} |1\rangle \end{aligned}$$

$$\epsilon_2 = -12a - 48b : \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} |2\rangle - \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} |-2\rangle$$

Видно, что третий уровень соответствует Γ_2 , т.е. он один не имеет вырождения. Производя повороты на $\frac{1}{2}\pi$, легко убедиться, что ϵ_1 соответствует Γ_4 , а второй, ϵ_2 - Γ_5 .

Спин можно включить, написав просто + или - над m_l в вышеперечисленных функциях. Однако, поскольку состояния $|m_s = \pm \frac{1}{2}\rangle$ образуют базис неприводимого представления Γ_6 двойной группы октаэдра, и поскольку

$$\Gamma_6 \times \Gamma_4 = \Gamma_6 + \Gamma_7$$

$$\Gamma_6 \times \Gamma_5 = \Gamma_7 + \Gamma_8$$

$$\Gamma_6 \times \Gamma_2 = \Gamma_7$$

то лучше будет построить такие линейные комбинации состояний, которые преобразуются по неприводимым представлениям двойной группы. Поскольку спин-орбитальное взаимодействие есть скаляр (т.е. оно преобразуется по Γ_1), то эти линейные комбинации можно найти, рассматривая каждый набор функций $\Gamma_6 \times \Gamma_i$ порознь (здесь $i = 4, 5, 2$) и диагонализуя H_2 внутри каждого из наборов. Собственные функции со спином будут теперь такими:

$$\epsilon_1 \left\{ \begin{array}{l} \left(\left(\frac{5}{8} \right)^{\frac{1}{2}} |-\bar{3}\rangle + \left(\frac{2}{8} \right)^{\frac{1}{2}} |1\rangle \right) \\ \left(\left(\frac{5}{8} \right)^{\frac{1}{2}} |\bar{3}\rangle + \left(\frac{2}{8} \right)^{\frac{1}{2}} |-\bar{1}\rangle \right) \\ \left(\left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} |0\rangle - \left(\frac{5}{24} \right)^{\frac{1}{2}} |-\bar{3}\rangle - \left(\frac{1}{8} \right)^{\frac{1}{2}} |1\rangle \right) \\ \left(\left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} |0\rangle - \left(\frac{5}{24} \right)^{\frac{1}{2}} |\bar{3}\rangle - \left(\frac{1}{8} \right)^{\frac{1}{2}} |-\bar{1}\rangle \right) \\ \left(\left(\frac{1}{3} \right)^{\frac{1}{2}} |0\rangle + \left(\frac{5}{12} \right)^{\frac{1}{2}} |-\bar{3}\rangle + \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} |1\rangle \right) \\ \left(\left(\frac{1}{3} \right)^{\frac{1}{2}} |0\rangle + \left(\frac{5}{12} \right)^{\frac{1}{2}} |\bar{3}\rangle + \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} |-\bar{1}\rangle \right) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \Gamma_8 \\ \Gamma_6 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \epsilon_2 & \left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{3} \rangle - \left(\frac{5}{6}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{1} \rangle \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{3} \rangle - \left(\frac{5}{6}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{1} \rangle \\ \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{2} \rangle + \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{2} \rangle - \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{3} \rangle + \left(\frac{5}{24}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{1} \rangle \\ \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{2} \rangle + \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{2} \rangle - \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{3} \rangle + \left(\frac{5}{24}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{1} \rangle \\ \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{2} \rangle + \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{2} \rangle + \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{3} \rangle - \left(\frac{5}{12}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{1} \rangle \\ \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{2} \rangle + \left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{2} \rangle + \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{3} \rangle - \left(\frac{5}{12}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{1} \rangle \end{array} \right\} \Gamma_8 \\
 \epsilon_3 & \left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{2} \rangle - \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{2} \rangle \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} | \bar{2} \rangle - \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} | -\bar{2} \rangle \end{array} \right\} \Gamma_7
 \end{aligned}$$

Заключительный этап состоит в вычислении метрических элементов H_2 с помощью вышеприведенных функций. Поскольку H_2 инвариантно по отношению к операциям группы октаэдра и в то же время коммутирует с J_2 , вековое уравнение распадается на четыре одинаковых квадратных (для четырех компонент двух Γ_8 -уровней), еще два одинаковых квадратных (для двух компонент двух Γ_7 -уровней) и два линейных (для двух компонент Γ_6) уравнения. Эти уравнения таковы (в порядке перечисления):

$$\begin{vmatrix} \epsilon_2 + \frac{\zeta}{4} - \epsilon & \frac{3\zeta(5)^{\frac{1}{2}}}{4} \\ \frac{3\zeta(5)^{\frac{1}{2}}}{4} & \epsilon_1 - \frac{3\zeta}{2} - \epsilon \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} \epsilon_3 - \epsilon & \zeta(3)^{\frac{1}{2}} \\ \zeta(3)^{\frac{1}{2}} & \epsilon_2 - \frac{\zeta}{2} - \epsilon \end{vmatrix} = 0$$

$$\epsilon_1 + \frac{3\zeta}{2} - \epsilon = 0$$

Эти уравнения позволяют выразить все энергии и все волновые функции через ξ , ϵ_1 , ϵ_2 и ϵ_3 .

Теперь мы в состоянии приложить теорию к UprF_6 . Ион нептуния, Upr^{6+} , окружен октаэдром из отрицательно заряженных ионов фтора. Согласно ур-ниям (2.6), $A_4^0 > 0$ и $A_6^0 > 0$. Из (2.33) имеем $a > 0$ и $b < 0$. В предельном случае $H_2 = 0$ порядок уровней зависит от соотношения вкладов сферических функций четвертого и шестого порядков в гамильтониан. Если $b = 0$, то $\epsilon_1 > \epsilon_2 > \epsilon_3$, а если $a = 0$, то $\epsilon_3 > \epsilon_1 > \epsilon_2$. Энергии ϵ_1 , ϵ_2 и ϵ_3 компонент Γ_4 , Γ_5 и Γ_2 конфигурации f^2 показаны на рис. 2.2 для всех отрицательных отношений a/b . Рисунок построен так, что обладает теми же свойствами, что и 1.1; абсцисса есть $\xi = \chi / (1 + \chi)$ где $\chi = -14b/3a$ а ордината η выбрана так, чтобы центр тяжести лежал на прямой $\eta = 0$ и чтобы разброс уровней был равен единице в обоих предельных случаях. Если выбрать для ξ определенное значение, то отношение $(\epsilon_1 - \epsilon_2) / (\epsilon_2 - \epsilon_3)$ фиксируется, и можно использовать уравнения (2.34), чтобы начертить уровни энергии для различных значений константы спин-орбитальной связи ζ . Это сделано на рис. 2.3 для $\xi = 0,253$. При таком выборе описывается спектр поглощения [23] UprF_6 , а также магнитные свойства [24] основного дублета. Значение ξ' параметра, определяющего отношение кристаллического поля к спин-орб. взаимодействию, есть 0,725. Приведенный выше анализ существенно упрощен по сравнению с тем, который проделали Эйзенштейн и Прайс [24], исключившие в рассмотрении эффекты ковалентности.

Экс [25] изучал свойства Pa^{4+} в малых количествах замещающего Zr^{4+} в Cs_2ZrCl_6 у иона протактиния имеется

один $5f$ -электрон, и мы можем применить приведенный анализ. Из таблицы 2-5 видно, что параметры кристаллического поля сильно отличаются от параметров в XrF_6 . Неравенство

$\langle r^2 \rangle / \rho^4 > \langle r^4 \rangle / \rho^6$, вместе с уравнением (2.6) показывают, что в обоих случаях нужно ожидать преобладания $A_2^0 \langle r^4 \rangle$ над $A_0^0 \langle r^4 \rangle$.

Из рис. 2-2 ясно, что относительный вклад сферических функций четвертого порядка для Cs_2PaCl_6 больше, чем для XrF_6 .

Однако значения ξ достаточно близки для того, чтобы мы могли включить данные ЭКСа в рис. 2-3 без грубого искажения ситуации. Согласие улучшается, если уровень Γ_5 в предельном случае $N_2 = 0$ поднять как показано на рис. 2-2.

Задачи

2-1. Показать, что подгруппа O , содержащая перестановки

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

является абелевой, и что каждый элемент сам по себе образует класс. Показать, что эта группа изоморфна группе плоских вращений C_4 , оставляющей неизменным квадрат, и что четырем перестановкам отвечают углы поворота $0, \pi/2, \pi$ и $3\pi/2$. Показать, что функции $x^2 + y^2, xy, x + iy, x - iy$ образуют четыре одномерных базиса неприводимых представлений C_4 и построить таблицу характеров. Получить правила разложения неприводимых представлений Γ_R группы O по неприводимым представлениям γ_R группы C_4 .

78a

Рис. 2-2.

Рисунок 2-2. Показана система уровней энергии уровня с $l = 3$ в кристалл^{ическом} поле октаэдрич^{еской} симметрии для различных относительных величин тензорных операторов 4-го и 6-го рангов в гамильтониане H_3 . С левого края только тензорные операторы 4-го ранга вносят вклад в расщепление, с правого — только 6-го. Настоящие соотношения таковы, что энергетические схемы, наблюдаемые и для Cs_2PaCl_6 и для NpF_6 надо изображать в левой части диаграммы. Это показывает, что операторы 4-го ранга дают больший вклад.

Рис. 2-3.

Рисунок 2-3. Уровни энергии одиночного f -электрона в октаэдрическом кристаллическом поле нарисованы, для различных отношений H_2 и H_3 . Слева $H_3 = 0$; расположение уровней на рис.2.2 для $Np F_6$ взято в качестве правого предела. Строго говоря, уровни $Cs_2 Pa Cl_6$ должны бы исходить (справа) от несколько иных точек, как показано на рис.2-2. Однако ситуации настолько сходны, что позволяют изобразить результаты обоих экспериментов на одной и той же диаграмме.

$$\Gamma_1 \rightarrow \gamma_1$$

$$\Gamma_2 \rightarrow \gamma_2$$

$$\Gamma_3 \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2$$

$$\Gamma_4 \rightarrow \gamma_1 + \gamma_3 + \gamma_4$$

$$\Gamma_5 \rightarrow \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4$$

2-2. Доказать, что

$$C_0^{(1)} = z/r \quad C_{\pm}^{(1)} = \mp \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} (x \pm iy)/r$$

и

$$C_0^{(2)} = (3z^2 - r^2)/2r^2 \quad C_{\pm 1}^{(2)} = \mp \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{2}} z(x \pm iy)/r^2$$

$$C_{\pm}^{(2)} = \left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{1}{2}} (x \pm iy)^2/r^2$$

2-3. Восемь зарядов $-eq$ находятся на одинаковом расстоянии ρ от ядра иона и расположены по вершинам куба. Доказать, что вклад в гамильтониан можно записать в форме (2.5), где

$$A_4^0 = -\frac{7qe^2}{18\rho^5} \quad A_4^4 = -\frac{35qe^2}{18\rho^5}$$

$$A_6^0 = \frac{qe^2}{9\rho^7} \quad A_6^4 = -\frac{7qe^2}{3\rho^7}$$

Ион церия Ce^{3+} , имеющий в незаполненной оболочке один f -электрон, может быть внедрен в решетку CaF_2 , причем его ближайшими соседями являются восемь ионов фтора, занимающих вершины куба. Согласно опытам Двира и Лоу [26], два нижних уровня энер-

гии есть Γ_4 и Γ_6 и почти полностью совпадают. Показать, что если не рассматривать крайние случаи - (1) $\xi = 0, -7\delta - a$ и (2) $a = \delta = 0$, где a и δ определены уравнениями (2.33) - то ξ должна удовлетворять условию

$$\xi = (10a + 84\delta)(9a + 14\delta)(2a - 14\delta) / (165a^2 + 539a\delta)$$

2-4. Ион $(\text{U}pO_2)^{2+}$ имеет линейную форму $O-\text{U}p-O$. Свободный атом нептуния имеет семь электронов ($5f^4 6d^1 7s^2$) вне оболочки радона, четыре из которых идут на связи с атомами кислорода, а два - на образование иона. В предположении, что сферические функции второго порядка являются самыми важными в разложении электрического потенциала, создаваемого аксиальным столбом отрицательного заряда, показать, что семь вырожденных орбит. состояний оставшегося f -электрона распадаются на четыре компоненты, и найти расщепления. Показать, что расщепления, создаваемые слабой спин-орбитальной связью, находятся в отношении 3:2:1:0. Доказать, что влияние магнитного поля на нижний дублет можно описать спин-гамильтонианом

$$g_{\parallel} \beta H_z S_z + g_{\perp} \beta (H_x S_x + H_y S_y)$$

где $S = 1/2$, $g_{\parallel} = 4$, $g_{\perp} = 0$. Экспериментальные g -факторы [27] для кристаллов $(\text{VO}_2)_2\text{Rb}(\text{NO}_3)_3$, содержащих малые количества $\text{U}p$ замещающего U , есть $g_{\parallel} = 3,40 \pm 0,05$, $g_{\perp} = 1,0 \pm 0,5$. Указать причины расхождения между экспериментом и теорией [28].