Энциклопедический словарь медицинских терминов

Энциклопедический словарь медицинских терминов

ТОМ III

РАЦИТОЗЫ — ЯЩУР

БМЭ

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

Главный редактор академик Б. В. ПЕТРОВСКИЙ

Том III

РАБДИТОЗЫ—ЯЩУР

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» · 1984

Производство настоящего тома осуществлялось в ордена Трудового Красного Знамени Московской типографии № 2 Союзполиграфпрома — директор типографии Кулешов Ю. А., главный инженер Базылев Н. С., нач. печатного цеха Кириллова Л. Н., нач. переплетно-брюшюровочного цеха Бузунова Л. В.

Энциклопедический словарь медицинских терминов: Э 68 В 3-х томах. Около 60 000 терминов. /Гл. ред. Б. В. Петровский. — М.: Советская энциклопедия, — Т. 3. Рабдитозы — Ящур. 1984. 512 с.

Словарь представляет собой первое в отечественной практике систематизированное научно-справочное издание, содержащее размещенный в алфавитном порядке свод терминов (около 60 000), применяемых в современной научной и учебной медицинской литературе. Кроме собственно медицинских терминов, словарь включает термины смежных областей знания: биофизики, биохимии, генетики и др., широко применяемые в медицине. Термины снабжены краткими научными определениями, рекомендациями по правописанию и сведениями о происхождении.

Словарь адресован врачам, ученым в области медицины, студентам медицинских учебных заведений, а также лингвистам.

Э $\frac{4100000000-004}{007(01)-84}$ **Свод. пл. подписных изд. 1984**

Адрес Главной редакции БМЭ: Москва, 101882, Петроверигский пер., д. 6/8

ИБ № 112

Сдано в набор 23.08.82. Подписано к печати 29.12.83. Т—08741. Формат бумаги 84×108/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура кудряшовская. Печать высокая. Усл. п. л. 53,76. Усл. кр. отт. 53,76. Уч.-изд. л. 102,11. Тираж 100000 экз. Заказ № 509. Цена 6 руб. 10 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Московская типография № 2 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129085. Москва, проспект Мира, 105.

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1984

scan: The Stainless Steel Cat

АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР

БОЛЬШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор — академик **Б. В. ПЕТРОВСКИЙ**

Заместитель Главного редактора — профессор **И. П. ЛИДОВ** (заведующий Главной редакцией)

БЛОХИН Н. Н., БОЛДЫРЕВ Т. Е., БОРОДИН Ю. И., БОЧКОВ Н. П., БУРГАСОВ П. Н., БУРЕНКОВ С. П., ВАСИЛЕНКО В. Х., ВЕНЕДИКТОВ Д. Д., ВОЛКОВ М. В., ВОРОБЬЕВ Е. И., ГАВРИЛОВ О. К., ГОРИЗОНТОВ П. Д., ДЕБОВ С. С., ДУБИНИН Н. П., ЕМЕЛЬЯНОВ С. В., ЖДАНОВ В. М., ЗАКУСОВ В. В., ЗЕДГЕНИДЗЕ Г. А., ИЛЬИН Л. А., ИСАКОВ Ю. Ф., КАНЕП В. В., КОВАНОВ В. В., КОМАРОВ Ф. И., КОСЯКОВ П. Н., КРАЕВСКИЙ Н. А., КРАСНОВ М. М., КРОТКОВ Ф. Г., ЛАПИН В. П. (главный ученый секретарь), ЛИСИЦЫН Ю. П., ЛОПАТКИН Н. А., МАЛИНОВСКИЙ Н. Н., МИХАЙЛОВ С. С., ОРЕХОВИЧ В. Н., ПАВЛОВ А. С., РОМОДАНОВ А. П., РУСАНОВ С. А., СМИРНОВ Е. И., СНЕЖНЕВСКИЙ А. В., СТОЧИК А. М., СТРУКОВ А. И., СТРУЧКОВ В. И., СУДАКОВ К. В., ТАБОЛИН В. А., ТРОФИМОВ В. В., ФРОЛОВ И. Т., ЦАРЕГОРОДЦЕВ Г. И., ЧАЗОВ Е. И., ШАПОШНИКОВ О. К., ШМИДТ Е. В., ЩЕПИН О. П., ЮДАЕВ Н. А.

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ

Зам. заведующего Главной редакцией (зав. научно-контрольной редакцией) — **Варнаков О. В.**

Зам. заведующего Главной редакцией по научно-редакционной работе — к. м. н. **Сточик А. М.**

Научно-контрольная редакция. Заместитель заведующего — к. м. н. **Болдырев С. Т.**; научные консультанты — проф. **Аветисов Э. С.**, проф. **Баскаков В. П.**, акад. АМН **Вальдман А. В.**, к. м. н. **Великов В. К.**, чл.-корр. АМН **Вельтищев Ю. Е.**, проф. **Воронцов Н. Н.**, проф. **Граевская Н. Д.**, проф. **Жильцов И. Ф.**, проф. **Крылова Н. В.**, проф. **Кулаков Г. П.**, д. м. н. **Кучеренко Д. Г.**, проф. **Милонов О. Б.**, **Плецер В. Э.**, проф. **Помелов В. С.**, проф. **Портнов А. А.**, проф. **Преображенский Ю. Б.**, проф. **Русанов С. А.**, к. м. н. **Шлугер И. А.**; *научно-контрольная группа:* **Анисимова Т. П.**, **Биркина Н. А.**, **Евланова Р. Н.**, **Недодаев А. И.**, **Передерий С. П.**; *заведующий производственным отделом* — **Рысев В. И.**; *группа контрольной правки:* заведующий — **Суханова И. Г.**

Научная редакция. Заведующий — доц. **Зимонт Л. Н.**; заместители заведующего — **Ланцман М. Н.**, **Рослякова Н. В.**; *научно-редакционная группа:* **Будковская Н. Г.**, **Бычкова Л. А.**, **Вострикова С. А.**, доц. **Крашкевич К. В.**, **Максимов В. Я.**, д. б. н. **Сальманович В. С.**, **Соколенко В. И.**, к. м. н. **Терещенко С. Н.**, к. ф. н. **Тищенко П. Д.**, к. м. н. **Яковлев А. С.**; *группа иллюстраций:* заведующий — **Вербицкий В. М.**; **Карманов Ю. В.**, **Косачева Е. Ю.**, **Проскурина В. Д.**, **Щеголева В. П.**; *группа библиографии:* заведующий — **Корнева В. В.**; **Егорова Т. И.**, **Павлова К. Н.**; *группа цифровых материалов:* заведующий — **Мушинский И. П.**; **Жерновая Р. А.**, **Москалева Т. И.**; *литературная группа:* заведующий — **Проказова К. В.**; **Некрасова Н. Е.**, **Осипова И. Б.**; *группа комплектования:* заведующий — **Тюрина М. П.**

Редакция словника. Заведующий — засл. врач УССР **Волгин В. П.**; зам. заведующего — **Обысова Е. С.**; **Енякина М. И.**, **Иванова Г. В.**, **Кванина С. А.**, **Юшко Г. Я.**

Редакция терминологии и указателей. Заведующий — **Поляков А. Н.**; консультанты — **Ильичева К. И.**, **Лабезов Г. И.**; *группа транскрипции:* заведующий — **Котельникова М. А.**; **Кирсева Т. Н.**, **Куликова Н. Ф.**; *группа указателей:* заведующий — **Дворянцев М. В.**; **Дубровская Т. М.**, к. м. н. **Завьялов Е. С.**, к. м. н. **Корендясев М. А.**; *терминологическая группа:* заведующий — засл. врач РСФСР **Акопян С. Ш.**; **Гузов В. В.**, **Денисова Е. В.**

Общая редакция. Заведующий — **Комаров А. И.**; *группа заказов:* заведующий — **Жиляева В. П.**; *корректорская:* заведующий — **Худина Т. И.**; *отдел перепечатки рукописей:* заведующий — **Зимина Л. Н.**

Научно-исследовательская энциклопедическая группа АМН СССР. Старшие научные сотрудники — к. б. н. **Михайлов В. И.**, к. м. н. **Пономарь Е. К.**, научный сотрудник — к. б. н. **Капрелян Л. Б.**

Настоящее издание подготовила редакция Энциклопедического словаря медицинских терминов в составе: заведующий — засл. врач РСФСР **Акопян С. Ш.**; зам. заведующего — **Вербицкий В. М.**; *научно-редакционная группа:* **Денисова Е. В.**, к. м. н. **Завьялов Е. С.**, к. ф. н. **Тищенко П. Д.**, к. м. н. **Черняк И. М.**; составители этимологических справок и словаря греко-латинских терминоэлементов: проф. **Чернявский М. Н.**, **Шубов Я. И.**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Зам. директора — **Куприянов В. А.** Заведующий производственным отделом — **Качалова Л. М.** Выпускающие: **Коновалова Л. И.**, **Коршунова Г. М.**

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

В соответствии с решениями XXVI съезда КПСС в нашей стране успешно реализуется программа дальнейшего развития советского общества по пути к коммунизму. При этом укрепление системы охраны здоровья советского народа в значительной степени предопределяется выполнением задач, вытекающих из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию народного здравоохранения» (1977) и «О дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья населения» (1982). В этой связи важное значение приобретает ускорение темпов научно-технического прогресса, всемерное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях науки,в том числе в медицине.

Масштабы современной научной деятельности, взаимопроникновение идей и методов различных наук, расширение объема информации создают возможности для комплексного решения актуальных проблем. В то же время между представителями различных медицинских специальностей имеется значительная терминологическая разобщенность, затрудняющая обмен информацией и в известной мере препятствующая развитию медицины и здравоохранения. Для преодоления языковой разобщенности в науке используются терминологические словари.

Настоящий Энциклопедический словарь медицинских терминов (ЭСМТ) представляет собой первое в отечественной практике систематизированное научно-справочное издание, содержащее размещенный в алфавитном порядке свод медицинских терминов, применяемых в современной научной и учебной медицинской литературе на русском языке, а также краткие научные определения этих терминов.

Словарь адресован врачам и научным работникам в области медицины и смежных с нею отраслей знания, организаторам здравоохранения, преподавателям и студентам медицинских учебных заведений, а также работникам печати.

В Словаре описано около 60 тыс. терминов. Представлены термины, обозначающие основные группы понятий: процессы и морфологические структуры, характерные для организма человека в норме и патологии на различных стадиях его развития; болезни и патологические состояния человека, формы их течения и признаки (симптомы, синдромы); возбудители и переносчики болезней; факторы окружающей среды, благотворно или отрицательно влияющие на человеческий организм, показатели их гигиенического нормирования и оценки; методы диагностики, профилактики и лечения болезней; области и отрасли медицины, медицинские и медико-биологические науки, важнейшие учения и теории медицины; принципы и организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению и санитарно-эпидемиологической службы СССР, а также медицинского обеспечения войск и гражданской обороны; групповые названия лекарственных средств, а также аппараты, приборы, инструменты и другие технические устройства медицинского назначения. В Словарь не включены наименования отдельных лекарств и лекарственных растений, конкретных медицинских учреждений, организаций и печатных органов, а также фирменные названия и марки аппаратов и приборов. Кроме медицинских терминов, в ЭСМТ включены имеющие непосредственное отношение к медицине термины других отраслей знания, главным образом биологии, биохимии и биофизики. Вместе с тем встречающиеся в медицинской литературе физические, химические и математические термины в Словарь не включены.

Отбор терминов производился редакционными отделами Большой медицинской энциклопедии при участии коллективов медицинских научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, а также ведущих ученых в различных отраслях теоретической и клинической медицины. В Словарь включены термины, устойчиво применяющиеся в медицинской литературе двух последних десятилетий. Часть терминов, признанных устаревшими или ложно ориентирующими, не включены в Словарь, другие — помещены с соответствующими пометами («истор.», «устар.», «нрк» — нерекомендуемый) или замечаниями в тексте. Признано нецелесообразным включение в ЭСМТ сложных терминов, не требующих определения, поскольку их компоненты представлены в Словаре отдельно (напр., «Перелом бедра» или «Физиология внешнего дыхания»).

Важным источником формирования Словаря явились Международная классификация болезней (VIII пересмотра), Государственная фармакопея СССР, приказы министра здравоохранения СССР, определяющие перечни врачебных специальностей, лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений и др.

Отбор анатомических, гистологических и эмбриологических терминов произведен на основе русских переводов латинских номенклатур, утвержденных IX Международным конгрессом анатомов в 1970 году. Перечень русских эквивалентов номенклатурных терминов дополнен традиционными названиями анатомических и гистологических структур, широко применяемыми и в медицинской практике, а также некоторыми не предусмотренными номенклатурой терминами топографической анатомии. Изменения и дополнения указанных номенклатур, утвержденные X Международным конгрессом анатомов, лишь частично учтены в ЭСМТ в связи с отсутствием соответствующих апробированных русских эквивалентов. Поскольку наряду с русскими эквивалентами в отечественной медицинской литературе распространено употребление латинских названий анатомических структур, в ЭСМТ в виде приложений включены перечни основных латинских анатомических терминов (1-й том — артерии и вены, 2-й том — кости, лимфатические узлы, мышцы и нервы, 3-й том — связки, синовиальные влагалища, сухожилия и фасции); в корпусе Словаря в алфавитном порядке помещены их русские эквиваленты.

В последние годы терминология, относящаяся к отдельным видам изделий медицинской техники, была стандартизована, однако некоторые термины не получили признания. В таких случаях сохранены традиционные названия изделий.

Выбор терминов, рекомендуемых для употребления, из числа синонимов производился, в первую очередь, на основе современных классификаций. В тех областях медицины, где терминология остается недостаточно упорядоченной, соответствующие вопросы решались компетентными коллективами ученых.

Около 45 тыс. терминов снабжены краткими научными определениями (дефинициями), содержащими родовое понятие или категорию, к которой относится обозначаемое понятие, и его наиболее существенные черты. Остальные 15 тыс. терминов являются их синонимами и представлены в виде ссылок. Определение обычно дополнено информацией о сфере применения термина, примерами и др. Однако Словарь не может рассматриваться как пособие по диагностике, лечению и определению прогноза конкретного заболевания.

Для многих терминов уточнены рекомендации по правописанию и произношению (постановке ударения), объяснено происхождение иноязычных терминов и терминоэлементов. Помещенные в Словаре эпонимические термины снабжены имеющимися в распоряжении редакции сведениями об оригинальном написании фамилий ученых, а также о годах их жизни, государственной принадлежности и специальности.

В качестве дополнительных справочных материалов в 3-й том ЭСМТ включены: краткий очерк истории, особенностей и проблем упорядочения медицинской терминологии; словарь греко-латинских терминоэлементов (этимологический справочник); таблица основных единиц измерения Международной системы единиц (СИ); указатель эпонимических терминов; перечень лекарственных средств, разрешенных для применения в медицинской практике и к промышленному производству в СССР.

Представляя собой свод ныне употребляемых медицинских терминов, ЭСМТ не претендует на нормативность. Однако редколлегия надеется, что Словарь послужит ценным подспорьем в развертывающейся работе по упорядочению и стандартизации отечественной медицинской терминологии. В подготовке Словаря приняли участие многие ученые. Те из них, кто не входит в состав редакционной коллегии и редакционных отделов, будут упомянуты в списке авторов и редакторов в 3-м томе Словаря.

Редколлегия выражает глубокую благодарность всем организациям, учреждениям и отдельным лицам, принявшим участие в подготовке Словаря. Редколлегия рассчитывает на получение от читателей отзывов, критических замечаний, пожеланий и предложений, которые будут учтены при переиздании ЭСМТ.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

1. Все термины словаря расположены в алфавитном порядке; иноязычные термины, представленные в оригинальном написании, расставлены в соответствии с русским алфавитом, напр.:

Мансонеллез
Mansonia
Манту реакция

2. Термин, состоящий из двух слов, между которыми стоит дефис, при расстановке по алфавиту принимается за одно слово, напр.:

Бужирование
Буж-перфоратор
Буж-щуп
Буйо симптом

3 Термины, имеющие буквенные обозначения, располагаются вслед за термином, представляющим родовое понятие, в алфавитном порядке буквенных обозначений, напр.:

Агглютинация
Н-Агглютинация
О-Агглютинация
vi-Агглютинация

4 При расстановке по алфавиту сложных терминов, в состав которых входят предлоги **в, по, с, без** и др., предлоги во внимание не принимаются, напр..

Делирий гипнагогический
Делирий без делирия
Делирий инициальный

5. Если фамилии в эпонимических терминах (анатомические, нозологические, клинические и другие понятия, названные по фамилии автора либо нескольких авторов, впервые их описавших) содержат частицы **де, ван-дер** и др., то при расстановке по алфавиту этих терминов такие фамилии, независимо от способа написания частицы (через дефис, раздельно), принимаются за одно слово, напр.:

Декартилагинизация
Де Кастро рефлекс
Де Кервена болезнь

6. Если эпонимические термины начинаются с одинаковой фамилии, то при расстановке их по алфавиту сначала располагаются те, в состав которых входит одна фамилия, а затем следуют термины, в которых она при наличии нескольких фамилий является первой, напр.:

Бехтерева эритроз
Бехтерева ядро
Бехтерева — Менделя рефлекс
Бехтерева — Файерштайна симптом

7. Если термин представляет собой словосочетание, то в нем может быть применен либо прямой порядок слов (напр., **Ритм галопа),** либо использована инверсия — обратный порядок слов (напр., **Бронхит хронический).** Инверсия применяется в эпонимических терминах (напр., **Вассермана реакция, Рейно болезнь).** Кроме того, она используется в терминах, представляющих собой словосочетание, часть которого является самостоятельным медицинским термином, напр.: **Гастрит атрофический, Дыхательная недостаточность обструктивная, Поле зрения физиологическое (Гастрит, Дыхательная недостаточность, Поле зрения** — самостоятельные медицинские термины).

8. Группа терминов-словосочетаний с одним общим родовым термином, находящихся между собой в смысловом родстве, объединена в цепочку. Подчиненные термины, входящие в цепочку, набраны светлым шрифтом, прописными буквами, со втяжкой (т. е. несколько отступя вправо от заглавного термина); общее слово цепочки в них сокращено до одной (первой) буквы, напр.:

АНИЗОМЕТРОПИЯ
А. ОСЕВАЯ
А. ПРЕСБИОПИЧЕСКАЯ
А. РЕФРАКЦИОННАЯ
А. СМЕШАННАЯ

Развернутое определение дается лишь заглавному термину, смысл терминов цепочки разъяснен с помощью заглавного с уточнением их особенностей. В цепочку могут входить и ссылки, напр .

ПЕРЕЛОМ — повреждение кости с нарушением ее целости
П. ВКОЛОЧЕННЫЙ — полный П. с глубоким и прочным внедрением одного из отломков в канал или губчатое вещество другого.
ПЕРЕЛОМ ДЮПЮИТРЕНА — см. *Дюпюитрена перелом.*
П. КЛАССИЧЕСКИЙ — см. *Перелом типичный.*

Если заглавный термин цепочки имеет два значения и более, то определение каждого из них дается отдельно, а подчиненные им термины располагаются под ними в виде самостоятельных цепочек Каждый заглавный термин имеет порядковый номер, помещенный надстрочно, напр :

АНЕСТЕЗИЯ [1] — отсутствие чувствительности (тактильной, температурной, болевой и др.).
А. ДИССОЦИИРОВАННАЯ — отсутствие болевой и температурной чувствительности при сохранении тактильной и проприоцептивной или наоборот.
А. ИСТЕРИЧЕСКАЯ — А у больных истерией, характеризующаяся отсутствием органического поражения рецепторов, проводящих путей и центров нервной системы и распространяющаяся обычно на области тела, границы к-рых не соответствуют зонам иннервации определенных корешков или нервов.
А КОРЕШКОВАЯ — тотальная А. в зоне иннервации определенного заднего корешка спинного мозга

АНЕСТЕЗИЯ [2] — общее название методов обезболивания, напр. при хирургических операциях
А ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ — внутрисосудистая А , при к рой раствор анестезирующего вещества вводят в артерию.
А. ВНУТРИВЕННАЯ — внутрисосудистая А , при к-рой раствор анестезирующего вещества вводят внутривенно
А. ВНУТРИКОСТНАЯ — регионарная А., при к-рой раствор анестезирующего вещества вводят в губчатое вещество кости.

В таких цепочках могут встречаться термины, представленные одним и тем же словосочетанием, но имеющие различные значения; напр. словосочетание **Анастомоз артериовенозный** есть и в цепочке к термину **Анастомоз** [1] (в анатомии), и в цепочке к термину **Анастомоз** [2] (в хирургии).

Термин-словосочетание, первое слово которого повторяет заглавный термин цепочки, но не имеет с ним прямой смысловой связи, в состав цепочки не включается и помещается после нее, напр :

МУТАЦИЯ — изменение генотипа вследствие превращения одного аллеля в другой, изменения положения генов в хромосоме или изменения числа хромосом.
М. ХРОМОСОМНАЯ — М., при к-рой изменяется структура хромосом.
М. ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ — М., представляющая собой изменение генетических структур цитоплазмы.

МУТАЦИЯ ГОЛОСА — изменение голоса в период полового созревания, обусловленное ростом гортани.

9 Термины в словаре даны, как правило, в единственном числе; исключение составляют те случаи, когда они традиционно употребляются во множественном, напр.: **Газы крови, Зернистые шары** и др. Если в цепочку включены слова как в единственном, так и во множественном числе, то заглавный термин представлен в единственном числе, а в скобках дано окончание множественного числа; напр.: **Виб-рион(-ы), Клетка(-и).**

10 Справочный материал к термину (приведен в скобках) включает пометы, аббревиатуры, латинский эквивалент, этимологическую справку, сведения об эпониме в эпонимических терминах, синонимы:

а) Пометы (письменные знаки, отметки) приводятся при нек-рых терминах: так, помета «истор.» указывает, что понятие, обозначаемое данным термином, имеет лишь историческое значение, напр. **Медицинская коллегия** (истор); помета «устар » указывает, что термин практически не используется и заменен современным, напр **Мозговик** (устар) — см. *Рак медуллярный;* помета «нрк» (нерекомендуемый) указывает, что употребления этого термина следует избегать как неправильно ориентирующего, напр. **Гипертония** (нрк) — см. *Гипертензия.*

б) Аббревиатуры — сокращения, употребляемые в устной и письменной речи, напр.: **Доза смертельная** (DL; син. доза летальная); **Рибонуклеиновая кислота** (РНК).

в) Латинские эквиваленты даются к русским медицинским терминам, напр **Вывих** (luxatio), **Желтуха** (icterus) Латинские эквиваленты анатомических, гистологических и эмбриологических терминов снабжены указаниями на их принадлежность к Парижской (PNA), Базельской (BNA) или Йенской (JNA) анатомическим номенклатурам, Ленинградской гистологической (LNH) или Ленинградской эмбриологической (LNE) номенклатурам; напр : **Глаз** (oculus, PNA, BNA, JNA).

Сокращенное слово «Ber», относящееся к микроорганизмам, указывает на то, что под данным названием микроорганизм фигурирует в определителе бактерий Берджи (Bergey's manual of determinative bacteriology, 8 ed., 1974); напр.: **Бактерии веретенообразные** (Fusobacterium, Ber)

В цепочках повторяющаяся часть латинских эквивалентов так же, как и родовой термин, сокращается до первой буквы; напр.:

АНКИЛОЗ (ankylosis)
А. костный (a. ossea)
А. фиброзный (a. fibrosa)

г) Этимологическая справка (сведения о происхождении термина) дается, как правило, к заимствованному медицинскому термину; напр.: **Аметропия** (ametropia; греч ametros несоразмерный, непропорциональный + ōps, ōpos глаз). Этимологическая справка не приводится при химических и биологических терминах, названиях возбудителей болезни.

Этимологическая справка может состоять из иноязычного слова, от которого произошел термин (этимона), без перевода (при совпадении значения термина и этимона) с указанием языка-источника, напр. **Бандаж** (франц bandage) Если термин представляет собой иноязычное слово, требующее перевода, то перевод приводится в скобках с указанием языка-источника, напр. **Vertebra brevis** (лат. короткий позвонок)

Если термин представляет собой сложное слово, образованное из компонентов, помещенных в Словаре в качестве самостоятельных статей, то в этимологической справке каждый компонент этого сложного слова дан в русской транскрипции *курсивом,* что означает ссылку на соответствующие статьи, снабженные этимологической справкой, напр. **Бронхоспазм** (bronchospasmus; *бронх* + *спазм*)

Если один из компонентов сложного слова не помещен в Словаре в качестве самостоятельного термина или помещен без этимологической справки, он дан прямым шрифтом, напр. **Вакуумметр** (вакуум + греч. metreō измерять)

Если в сложное слово входит один из компонентов другого приведенного в Словаре сложного термина, то компонент, не вошедший в это слово, заключается в скобки, напр. **Хромофибрилла** [chromofibrilla; *хромо(сома)* + *фибрилла*]

д) При эпонимических терминах приведены имеющиеся в распоряжении редакции сведения о годах жизни, государственной принадлежности и специальности ученых, напр. **Абрикосова метод** (А. И Абрикосов, 1875—1955, сов патологоанатом) Инициалы и фамилии иностранных ученых даны в оригинальном написании При повторении одного и того же эпонима в ряде идущих друг за другом эпони-

мических терминов эти сведения приведены лишь к первому термину, а в остальных помещено только оригинальное написание фамилии и инициалов, напр.:

Бабинского параплегия (J. F. F. Babinski, 1857—1932, франц. невропатолог)

Бабинского рефлекс (J. F. F. Babinski).

Бабинского феномен (J. F. F. Babinski).

е) Синонимы (слова, совпадающие по значению, но отличающиеся по звучанию) в справочном материале располагаются по алфавиту, напр.: **Гепатит инфекционный** (син.: Боткина болезнь, гепатит А, гепатит эпидемический, желтуха вирусная — устар.). Все иноязычные слова в справочном материале (в том числе греческие, арабские, японские и др.) даны в латинской транскрипции.

11. Все термины снабжены знаком ударения (´), за исключением односложных и имеющих ударное «Ё». В тех случаях, когда традиционно сложившееся в медицинской практике ударение (напр., диа́физ) расходится с рекомендациями лингвистов (диафи́з), приводится ударение, принятое в медицине.

12. Если имеется ряд терминов с одним и тем же начальным элементом, то этот элемент выделяется в самостоятельную статью, помещенную в общем алфавитном порядке; напр.: **АНДРО-** (греч. anēr, andros мужчина) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к мужчине», «мужской». В этимологических справках к последующим статьям этот терминоэлемент приводится курсивом; напр.:

Андрология (*андро-* + греч. logos учение) — раздел урологии, изучающий заболевания мужских мочеполовых органов.

Также в виде самостоятельных статей в словарь помещены четыре наиболее распространенных конечных терминоэлемента: **-ит, -иаз, -оз, -ома.**

13. В качестве дополнительных справочных материалов в 3-м томе ЭСМТ помещены: а) краткий очерк истории, особенностей и проблем упорядочения медицинской терминологии; б) словарь греко-латинских терминоэлементов (этимологический справочник), в к-ром даны этимологические справки ко всем наиболее употребительным терминоэлементам греческого и латинского происхождения, как правило, более подробные, чем в основной части словаря, и приведены примеры применения терминоэлементов в русской медицинской терминологии; в) указатель эпонимических терминов; г) таблицы основных единиц измерения Международной системы единиц (СИ); д) перечень лекарственных средств, разрешенных для применения в медицинской практике и к промышленному производству в СССР.

СПИСОК ДОПУСКАЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

амер. — американский
анат. — анатомический
англ. — английский
ат. вес (масса) — атомный вес (масса)
Bac. — Bacillus
Bact. — Bacterium
бельг. — бельгийский
Ber — определитель бактерий Берджи (Bergey's manual of determinative bacteriology, 8 ed., 1974)
BNA — Базельская анатомическая номенклатура
в — век
вв. — века
г. — год
гг. — годы
гист. — гистологический
гл. обр. — главным образом
ГОСТ — Государственный общесоюзный стандарт
греч. — греческий
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
зоол. — зоологический
JNA — Йенская анатомическая номенклатура
ирланд. — ирландский
исп. — испанский
истор. — исторический
итал. — итальянский
кл. — класс
к-рый — который
КФ — международная классификация ферментов
LNE — Ленинградская эмбриологическая номенклатура
LNH — Ленинградская гистологическая номенклатура
млн. — миллион
мол. вес (масса) — молекулярный вес (масса)
МСГО — медицинская служба гражданской обороны
напр. — например
нек-рый — некоторый
нем. — немецкий
нрк — нерекомендуемый
н. э. — наша эра (73 г. н. э.)
отеч. — отечественный
отр. — отряд (в зоологии)
PNA — Парижская анатомическая номенклатура
РНК — рибонуклеиновая кислота
сем. — семейство
син. — синоним
сов. — советский
тыс. — тысяча
уд. вес — удельный вес
устар. — устаревший
франц. — французский
ц. н. с. — центральная нервная система
швейц. — швейцарский
шотл. — шотландский

СОКРАЩЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

а — ампер
ат — атмосфера техническая (единица давления)
ата — атмосфера абсолютная
ати — атмосфера избыточная
атм — атмосфера нормальная, или физическая
бар — единица атмосферного давления, единица звукового давления
бэр — биологический эквивалент рентгена
в — вольт
в·а — вольт-ампер
вб — вебер
вт — ватт
вт·ч — ватт-час
г — грамм
g — гравитация (единица перегрузок)
г·атом — грамм-атом
га — гектар
гб — гильберт
г·ион — грамм-ион
г·моль — грамм-моль
гн — генри
г% — грамм-процент
гс — гаусс
гц — герц
г·экв — грамм-эквивалент
дб — децибел
дж — джоуль
дин — дина
дптр — диоптрия
к — кулон
°К — градус Кельвина
кал — калория
кв — киловольт
квт — киловатт
квт·ч — киловатт-час
кг — килограмм
кд — кандела
ккал — килокалория
л — литр
лк — люкс
лм — люмен
м — метр
ма — миллиампер
мв — милливольт
мг — миллиграмм
мг% — миллиграмм-процент
мг·экв — миллиграмм-эквивалент
мин. — минута
мкг — микрограмм
мкл — микролитр
мкм — микрометр
мкс — максвелл
мксек — микросекунда
мккюри — микрокюри
мкюри — милликюри
мл — миллилитр
мм — миллиметр
мм вод. ст. — миллиметр водяного столба
мм рт. ст. — миллиметр ртутного столба
мсек — миллисекунда
н — ньютон
нм — нанометр
об/мин — оборот в минуту
об. % — объемный процент
об/сек — оборот в секунду
ом — ом
пз — пуаз
pH — водородный показатель
‰ — промилле
пф — пикофарада
р — рентген
рад — рад
°С — градус Цельсия
сб — стильб
св — свеча
сг — сантиграмм
сек. — секунда
спз — сантипуаз
ф — фарада
фэр — физический эквивалент рада
час. — часов
э — эрстед
эв — электрон-вольт

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕДАКЦИОННЫХ РАЗДЕЛОВ И ОТДЕЛОВ БМЭ

1. АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Ответственный редактор — акад. **Газенко О. Г.**; зам. ответственного редактора — **Волынкин Ю. М.**, проф. **Нефедов Ю. Г.**, проф. **Рудный Н. М.**; ученый секретарь — доц. **Попов А. П.**

Редакторы

Адамович Б. А., проф. (Москва)
Алексанян И. В., проф. (Москва)
Алякринский Б. С., доц. (Москва)
Бресткин М. П., проф. (Ленинград)
Вакар М. И., д. м. н. (Москва)
Васильев П. В., проф. (Москва)
Воробьев Е. И., чл.-корр. АМН (Москва)
Генин А. М., проф. (Москва)
Гуровский Н. Н., д. м. н. (Москва)
Егоров Б. Б., д. м. н. (Москва)
Иванов Д. И., проф. (Москва)
Ильин Е. А., к. м. н. (Москва)
Исаков П. К., проф. (Москва)
Какурин Л. И., проф. (Москва)
Карпов Е. А., к. м. н. (Москва)
Копанев В. И., проф. (Ленинград)
Крупина Т. Н., проф. (Москва)
Шепелев Е. Я., д. м. н. (Москва)
Юганов Е. М., проф. (Москва)

2. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Савельева Г. М.**; зам. ответственного редактора — проф. **Ельцов-Стрелков В. И.**, чл.-корр. АМН **Серов В. Н.**; ученый секретарь — к. м. н. **Аветисова К. Р.**

Редакторы

Алипов В. И., проф. (Ленинград)
Бакулева Л. П., проф. (Москва)
Бодяжина В. И., проф. (Москва)
Ванина Л. В., проф. (Москва)
Вихляева Е. М., чл.-корр. АМН (Москва)
Герасимович Г. И., проф. (Минск)
Гранат Н. Е., к. м. н. (Москва)
Грищенко В. И., проф. (Харьков)
Жмакин К. Н., проф. (Москва)
Закиров И. З., проф. (Самарканд)
Кейлин С. Л., проф. (Новосибирск)
Кобозева Н. В., проф. (Ленинград)
Лебедев А. А., проф. (Москва)
Лельчук П. Я., проф. (Ростов-на-Дону)
Мандельштам А. Э., проф. (Ленинград)
Мануилова И. А., чл.-корр. АМН (Москва)
Маркарян П. А., проф. (Ереван)
Новиков Ю. И., чл.-корр. АМН (Ленинград)
Обысова Е. С. (Москва)
Омаров С.-М. А., проф. (Махачкала)
Паллади Г. А., проф. (Кишинев)
Перфильева И. Ф., д. м. н. (Москва)
Радионченко А. А., чл.-корр. АМН (Томск)
Садаускас В. М., проф. (Каунас)
Старовойтов И. М., проф. (Минск)
Стрижова Н. В., проф. (Москва)
Тимошенко Л. В., чл.-корр. АМН (Киев)
Утегенова К. Д., проф. (Алма-Ата)
Хакимова С. Х., чл.-корр. АМН (Душанбе)
Червакова Т. В., проф. (Москва)

3. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ

Ответственный редактор — проф. **Михайлов С. С.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Куприянов В. В.**, чл.-корр. АН **Хрущов Н. Г.**; ученый секретарь — доц. **Воробьева Е. А.**

Редакторы

Абдуллаев М.-С. М., проф (Баку)
Афанасьев Ю. И., проф (Москва)
Бородин Ю. И., акад. АМН (Новосибирск)
Волкова О. В., чл.-корр. АМН (Москва)
Выренков Ю. Е., проф. (Москва)
Гаврилов Л. Ф., проф. (Москва)
Голуб Д. М., проф. (Минск)
Джавахишвили Н. А., проф. (Тбилиси)
Джафаров М. А., проф. (Львов)
Дыбан А. П., проф. (Ленинград)
Елецкий Ю. К., проф. (Москва)
Зазыбин Н. И., чл.-корр. АМН (Киев)
Зуфаров К. А., проф (Ташкент)
Каган И. И., проф. (Оренбург)
Кальберг В. А., проф. (Рига)
Караганов Я. Л., проф. (Москва)
Касаткин С. Н., проф. (Волгоград)
Клишов А. А., проф. (Ленинград)
Копаев Ю. Н., проф. (Москва)
Крылова Н. В., проф. (Москва)
Кульчицкий К. И., проф. (Киев)
Липченко В. Я., проф. (Волгоград)
Лякишева Л. А., к. м. н. (Москва)
Матюшин И. Ф., проф. (Горький)
Михайлов В. П., проф. (Ленинград)
Никитюк Б. А., проф. (Москва)
Островерхов Г. Е., чл.-корр. АМН (Москва)
Рахишев А. Р., проф. (Алма-Ата)
Сапин М. Р., чл.-корр. АМН (Москва)
Сатюкова Г. С., проф. (Москва)
Семенова Л. К., проф. (Москва)
Сперанский В. С., проф. (Саратов)
Степанов П. Ф., проф. (Смоленск)
Стовичек Г. В., проф. (Ярославль)
Студитский А. Н., проф. (Москва)
Судзиловский Ф. В., проф. (Ленинград)
Сутулов Л. С., проф. (Рязань)
Токин И. Б., д. б. н. (Дальние Зеленцы, Мурм. обл.)
Травин А. А., проф. (Москва)
Фукс Б. Б., проф. (Москва)

4. БИОЛОГИЯ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Львов Д. К.**; зам. ответственного редактора — д. м. н. **Алексеев А. Н.**, проф. **Воронцов Н. Н.**; ученый секретарь — доц. **Сидорова Г. А.**

Редакторы

Алов И. А., проф. (Москва)
Алпатов В. В., проф (Москва)
Балашов Ю. С., д. б. н. (Ленинград)
Барабанов Е. И., доц. (Москва)
Беляев Д. К., акад (Новосибирск)
Богоявленский Ю. К., проф. (Москва)
Виноградов-Волжинский Д. В., проф. (Москва)
Властовский В. Г., д. б. н. (Москва)
Гаджиев Д. В., проф. (Баку)
Залетаева Т. А., доц. (Москва)
Заречная С. Н., доц. (Москва)
Маркевич А. П., проф. (Киев)
Маруашвили Г.М., чл.-корр.АМН(Тбилиси)
Сыроечковский Е. Е., чл.-корр. ВАСХНИЛ (Москва)
Трошин А. С., чл.-корр. АН (Ленинград)
Хамидов Д. Х., проф. (Ташкент)
Хесин Я. Е., проф. (Москва)
Ярыгин В. Н., проф. (Москва)

5. БИОФИЗИКА

Ответственный редактор — проф. **Владимиров Ю. А.**; зам. ответственного редактора — проф. **Журавлев А. И.**, проф. **Рубин А. Б.**; ученый секретарь — к. б. н. **Федоров Г. Е.**

Редакторы

Антонов В. Ф., проф. (Москва)
Бурлакова Е. Б., проф. (Москва)
Бурлакова Е. В., проф. (Москва)
Верхотуров В. Н., к. физ.-мат. н. (Москва)
Иваницкий Г. Р., чл.-корр. АН (Пущино, Московской обл.)
Калантаров К. Д., д. б. н. (Москва)
Каюшин Л. П., проф. (Москва)
Козлов Ю. П., проф. (Иркутск)
Кольс О. Р., д. б. н. (Москва)
Конев С. В., проф. (Минск)
Кудряшов Ю. Б., проф. (Москва)
Лаврентьев В. В., проф. (Москва)
Ливенцев Н. М., проф. (Москва)
Максимов В. Я. (Москва)
Маленков А. Г., проф. (Москва)
Островский М. А., проф. (Москва)
Петрусевич Ю. М., доц. (Москва)
Пирузян Л. А., чл.-корр. АН (Москва)
Портнов Ф. Г., проф. (Рига)
Ремизов А. Н., проф. (Москва)
Самойлов В. О., проф. (Ленинград)
Сумароков Г. В., к. б. н. (Москва)
Терсков И. А., акад. (Красноярск)
Чизмаджев Ю. А., проф. (Москва)
Шмелев В. П., доц. (Воронеж)
Штранкфельд И. Г., к. б. н. (Москва)
Яглова Л. Г., доц. (Москва)

6. БИОХИМИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Орехович В. Н.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Березов Т. Т.**, д. х. н. **Гинодман Л. М.**, проф. **Николаев А. Я.**, чл.-корр. АН **Торгов И. В.**; ученый секретарь — к. б. н. **Городецкий В. К.**

Редакторы

Арчаков А. И., д б н (Москва)
Ашмарин И. П., акад. АМН (Москва)
Белицер В. А., проф. (Киев)
Брауштейн А. Е., акад (Москва)
Бунятян Г. Х., проф (Ереван)
Верболович П. А., проф (Алма-Ата)
Горкин В. З., проф. (Москва)
Дебов С. С., акад. АМН (Москва)
Климов А. Н., акад. АМН (Ленинград)
Кнорре Д. Г., чл.-корр. АН (Новосибирск)
Кометиани П. А., проф. (Тбилиси)
Кочетков Н. К., акад. (Москва)
Леутский К. М., проф. (Черновцы)
Мазуров В. И., д б н. (Москва)
Меньшиков В. В., проф. (Москва)
Николаев Л. А., проф (Москва)
Островский Ю. М., проф (Гродно)
Туракулов Я. Х., проф. (Ташкент)
Усольцева В. А., проф. (Иваново)
Утевский А. М., проф. (Харьков)
Шпикитер В. О., проф. (Москва)
Энгельгардт В. А., акад. (Москва)

Раздел ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

(отделы 7—15)

Ответственный редактор — акад. АМН **Василенко В. Х.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Комаров Ф. И.**, акад. АМН **Седов К. Р.**, акад. АМН **Янушкевичус З. И.**; ученые секретари — к. м. н. **Бородулин В. И.**, доц. **Жмуркин В. П.**

7. АРТРОЛОГИЯ. РЕВМАТОЛОГИЯ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Насонова В. А.**; зам. ответственного редактора — проф. **Астапенко М. Г.**, проф. **Долгополова А. В.**; ученый секретарь — к. м. н. **Бунчук Н. В.**

Редакторы

Агабабова Э. Р., д м н (Москва)
Алекберова З. С., д м н (Москва)
Анохин В. Н., проф. (Москва)
Бисярина В. П., акад АМН (Омск)
Бржезовский М. М., к м н. (Москва)
Горбунова З. В., проф (Свердловск)
Гусева Н. Г., д м. н (Москва)
Дмитрова Н. А., проф (Харьков)
Долабчян З. Л., проф (Ереван)
Дормидонтов Е. Н., проф (Ярославль)
Зборовский А. Б., проф. (Волгоград)
Иевлева Л. В., проф. (Москва)
Исаева Л. А., проф. (Москва)
Казначеев В. П., акад. АМН (Новосибирск)
Коханович М. В., проф. (Симферополь)
Кузьмина Н. Н., д. м. н. (Москва)
Курмаева М. Е., проф. (Ярославль)
Лауцевичус Л. З., проф. (Вильнюс)
Левин А. И., проф. (Пермь)
Матвейков Г. П., проф. (Минск)
Матулис А. А., проф. (Вильнюс)
Миррахимов М. М., чл.-корр. АМН (Фрунзе)
Надеждина Е. А., проф. (Москва)
Пяй Л. Т., проф (Тарту)
Шакимова Б. Ш., проф. (Алма-Ата)
Шахбазян И. Е., д м. н. (Москва)
Шихов М. М., проф. (Сочи)
Янбаева Х. И., проф. (Ташкент)

8. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Василенко В. Х.**; зам. ответственного редактора — проф. **Белоусов А. С.**, проф. **Гребенев А. Л.**, чл.-корр. АМН **Логинов А. С.**; ученый секретарь — д. м. н. **Клемашев И. С.**

Редакторы

Абасов И. Т., проф (Баку)
Аскаров А. А., проф (Ташкент)
Беюл Е. А., проф (Москва)
Бурчинский Г. И., проф. (Киев)
Галкин В. А., проф. (Москва)
Крышень П. Ф., проф. (Днепропетровск)
Мансуров Х. Х., проф. (Душанбе)
Масевич Ц. Г., проф. (Ленинград)
Меликова М. Ю., д. м. н. (Москва)
Салуперe В. П., проф. (Тарту)
Скуя Н. А., проф. (Рига)
Смагин В. Г., чл -корр. АМН (Москва)
Соколов Л. К., проф. (Москва)
Фролькис А. В., проф. (Ленинград)
Ходжакулиев Г. К., проф. (Ашхабад)
Широкова К. И., проф. (Москва)

9. ГЕМАТОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Гаврилов О. К.**; зам. ответственного редактора — проф. **Воробьев А. И.**, проф. **Федотенков А. Г.**, проф. **Хохлова М. П.**; ученый секретарь — д. м. н. **Турбина Н. С.**

Редакторы

Абрамов М. Г., проф (Москва)
Алмазов В. А., чл. корр АМН (Ленинград)
Ахундова А. М., проф (Баку)
Баркаган З. С., проф (Барнаул)
Богомолова Л. Г., проф (Ленинград)
Германов В. А., проф (Куйбышев)
Гроздов Д. М., проф. (Москва)
Дыгин В. П., проф. (Ленинград)
Зотиков Е. А., чл -корр. АМН (Москва)
Круглова Г. В., д м. н. (Москва)
Лаврик С. С., проф. (Киев)
Махонова Л. А., проф (Москва)
Менделеев И. М., проф. (Петрозаводск)
Митерев Ю. Г., д. м. н. (Москва)
Морозова В. Т., проф. (Москва)
Петров Н. С., проф. (Ленинград)
Розанова Л. М., к. м. н. (Ленинград)
Сейц И. Ф., проф. (Ленинград)
Сулейманова Г. С., проф (Ташкент)
Токарев Ю. Н., проф. (Москва)
Умнова М. А., проф. (Москва)
Файнштейн Ф. Э., проф. (Москва)
Федоров Н. А., акад. АМН (Москва)
Федорова З. Д., проф. (Ленинград)
Шабалин В. Н., проф. (Ленинград)
Яворковский Л. И., проф. (Рига)

10. ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Чеботарев Д. Ф.**; зам. ответственного редактора — проф. **Коркушко О. В.**, проф. **Фролькис В. В.**; ученый секретарь — д. м. н. **Черкасский Л. П.**

Редакторы

Адамян А. А., д м н (Москва)
Вержиковская Н. В., д м. н (Киев)
Войтенко В. П., д м н (Киев)
Горев Н. П., акад АМН (Киев)
Далакишвили С. М., к. м. н. (Тбилиси)
Маньковский Н. Б., проф (Киев)
Морозов К. А., проф. (Ленинград)
Никитин В. Н., проф (Харьков)
Никитюк Б. А., проф (Москва)
Пелещук А. П., проф. (Киев)
Пицхелаури Г. З., проф. (Тбилиси)
Подрушняк Е. П., проф. (Киев)
Тнимова К. З., проф (Караганда)
Токарь А. В., д. м. н. (Киев)

11. КАРДИОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. **Чазов Е. И.**; зам. ответственного редактора — проф. **Сметнев А. С.**; ученый секретарь — к. м. н. **Богословский В. А.**

Редакторы

Виноградов А. В., проф. (Москва)
Гаспилин В. С., чл.-корр. АМН (Москва)
Грицюк А. И., чл.-корр. АМН (Киев)
Кедров А. А., проф. (Ленинград)
Кипшидзе Н. Н., чл.-корр. АМН (Тбилиси)
Мазур Н. А., проф. (Москва)
Маколкин В. И., проф. (Москва)
Мухарлямов Н. М., проф. (Москва)
Попов В. Г., проф. (Москва)
Сумароков А. В., проф. (Москва)
Шхвацабая И. К., акад. АМН (Москва)
Янушкевичус З. И., акад. АМН (Каунас)

12. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИКИ И ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. ДЕОНТОЛОГИЯ

Ответственный редактор — проф. **Соколов Е. И.**; зам. ответственного редактора — к. м. н. **Алексеев Г. К.**, акад. АМН **Билибин А. Ф.**, д. м. н. **Мартынов И. В.**, проф. **Пресняков Д. Ф.**; ученый секретарь — к. м. н. **Каменкер С. М.**

Редакторы

Алексеев Г. А., проф. (Москва)
Аншелевич Ю. В., проф. (Рига)
Артемьев Е. Н., проф. (Москва)
Бадалян Г. О., проф. (Ереван)
Бурчинский Г. И., проф. (Киев)
Вирсаладзе К. С., проф. (Тбилиси)
Гембицкий Е. В., проф. (Москва)
Гогин Е. Е., проф. (Москва)
Жмуркин В. П., доц. (Москва)
Кедров А. А., проф. (Ленинград)
Лазовскис И. Р., проф. (Рига)
Миррахимов М. М., чл.-корр. АМН (Фрунзе)
Сидоренко Г. И., проф. (Минск)
Чернов А. З., проф. (Москва)
Эльштейн Н. В., проф. (Таллин)
Яблоков Д. Д., акад. АМН (Томск)
Янушкевичус З. И., акад. АМН (Каунас)

13. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

Ответственный редактор — проф. **Путов Н. В.**; зам. ответственного редактора — проф. **Лукомский Г. И.**, чл.-корр. АМН **Перельман М. И.**, проф. **Федосеев Г. Б.**, чл.-корр. АМН **Чучалин А. Г.**; ученый секретарь — д. м. н. **Овчинников А. А.**

Редакторы

Борохов А. И., проф. (Смоленск)
Буренков С. П., к. м. н. (Москва)
Дубилей В. В., проф. (Нальчик)
Егорова Л. И., проф. (Москва)
Жихарев С. С., доц. (Ленинград)
Замотаев И. П., проф. (Москва)
Колесов А. П., акад. АМН (Ленинград)
Недвецкая Л. М., проф. (Москва)
Никулин К. Г., проф. (Горький)
Палеев Н. Р., проф. (Москва)
Помелов В. С., проф. (Москва)
Пугачев А. Г., проф. (Москва)
Родионов В. В., проф. (Москва)
Скрипниченко Д. Ф., проф. (Киев)
Цыбырна К. А., проф. (Кишинев)

14. ФТИЗИАТРИЯ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Хоменко А. Г.**; зам. ответственного редактора — проф. **Авербах М. М.**, акад. АМН **Богуш Л. К.**; ученый секретарь — к. м. н. **Клочкова Г. С.**

Редакторы

Картозия Л. С., проф. (Тбилиси)
Кочнова И. Е., проф. (Москва)
Мамолат А. С., проф. (Киев)
Меве Е. Б., проф. (Минск)
Митинская Л. А., проф. (Москва)
Соловьева В. А., д. м. н. (Москва)
Филиппов В. П., д. м. н. (Москва)
Яблоков Д. Д., акад. АМН (Томск)

15. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Юдаев Н. А.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Баранов В. Г.**, проф. **Комиссаренко В. П.**, проф. **Старкова Н. Т.**; ученый секретарь — доц. **Мазовецкий А. Г.**

Редакторы

Балаболкин М. И., проф. (Москва)
Гольбер Л. М., проф. (Москва)
Дедов И. И., проф. (Москва)
Жуковский М. А., проф. (Москва)
Зефирова Г. С., доц. (Москва)
Иверпели В. П., проф. (Тбилиси)
Исламбеков Р. К., чл.-корр. АМН (Москва)
Максимов С. В., к. м. н. (Харьков)
Мельниченко Г. А., к. м. н. (Москва)
Панков Ю. А., чл.-корр. АМН (Москва)
Покровский Б. В., д. б. н. (Москва)
Потемкин В. В., доц. (Москва)
Смирнов Н. П., к. м. н. (Москва)
Туракулов Я. Х., проф. (Ташкент)
Федотов В. П., д. м. н. (Москва)

16. ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Ответственный редактор — акад. АМН **Смирнов Е. И.**; зам. ответственного редактора — чл. корр. АМН **Воробьев Е. И.**, проф. **Гембицкий Е. В.**, проф. **Георгиевский А. С.**, акад. АМН **Комаров Ф. И.**, проф. **Лисицин К. М.**; ученые секретари — **Гринь В. А.**, доц. **Журавский В. А.**

Редакторы

Агафонов В. И., д. м. н. (Москва)
Акопян С. Ш. (Москва)
Беляков В. Д., акад. АМН (Ленинград)
Беркутов А. Н., проф. (Ленинград)
Владимиров В. Г., д. м. н. (Ленинград)
Гайко Б. А. (Москва)
Давыдов А. Д. (Москва)
Дерябин И. И., проф. (Ленинград)
Донченко Г. П., доц. (Ленинград)
Жижин В. Н., к. м. н. (Москва)
Иванов Н. Г., чл.-корр. АМН (Ленинград)
Комаров А. И. (Москва)
Кошелев Н. Ф., проф. (Ленинград)
Курпита П. Н., д. м. н. (Москва)
Лидов И. П., проф. (Москва)
Лобанов Г. П., проф. (Москва)
Лобастов О. С., проф. (Ленинград)
Михайлов В. И. (Москва)
Полумисков Ю. М., проф. (Москва)
Поляков Л. Е., проф. (Ленинград)
Саватеев Н. В., проф. (Ленинград)
Ткаченко С. С., проф. (Ленинград)
Трофимов Б. В., (Москва)
Фаршатов М. Н., проф. (Ленинград)
Харламов Г. Е., д. м. н. (Москва)
Шеляховский М. В., проф. (Москва)

Раздел ГИГИЕНА
(отделы 17—19)

Ответственный редактор — акад. АМН **Кротков Ф. Г.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Измеров Н. Ф.**, акад. АМН **Летавет А. А.**, акад. АМН **Минх А. А.**, проф. **Чвырёв В. Г.**; ученый секретарь — к. м. н. **Падалкин В. П.**

17. ГИГИЕНА ТРУДА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Измеров Н. Ф.**; зам. ответственного редактора — проф. **Рощин А. В.**; ученый секретарь — к. м. н. **Турбин Е. В.**

Редакторы

Алексеев С. В., проф (Ленинград)
Алтынбеков Б. Е., проф. (Караганда)
Артамонова В. Г., проф. (Ленинград)
Архипов А. С., проф. (Москва)
Вашакидзе В. И., проф. (Тбилиси)
Величковский Б. Т., чл.-корр. АМН (Москва)
Волкова З. А., проф. (Москва)
Гудзовский Г. А., проф (Ставрополь)
Зимонт Л. Н., доц. (Москва)
Зорина Л. А., проф. (Москва)
Каган Ю. С., проф. (Киев)
Каспаров А. А., проф. (Москва)
Кундиев Ю. И., чл.-корр. АМН (Киев)
Медведь Л. И., акад. АМН (Киев)
Монаенкова А. М., д. м. н. (Москва)
Пархоменко Г. М., проф. (Москва)
Ретнев В. М., проф. (Ленинград)
Рудь Г. Г., проф. (Кишинев)
Саноцкий И. В., проф. (Москва)
Стенько Ю. М., проф. (Москва)
Тарасенко Н. Ю., чл.-корр. АМН (Москва)
Трахтенберг И. М., проф. (Киев)
Хасанова К. А., проф. (Душанбе)
Цессарский А. В. (Москва)
Шаталов Н. Н., проф. (Москва)
Шахбазян Г. Х., чл.-корр. АМН (Киев)

18. ОБЩАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Ответственный редактор — акад. АМН **Минх А. А.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Сердюковская Г. Н.**, акад. АМН **Сидоренко Г. И.**, чл.-корр. АМН **Шандала М. Г.**; ученый секретарь — к. м. н. **Алимов Г. В.**

Редакторы

Акулов К. И., проф. (Москва)
Беляев И. И., чл.-корр АМН (Горький)
Волгин В. П. (Москва)
Габович Р. Д., проф. (Киев)
Гомелаури Л. З., проф. (Тбилиси)
Гончарук Е. И., проф. (Киев)
Губернский Ю. Д., проф. (Москва)
Золотов П. А., проф. (Ростов-на-Дону)
Ильин Л. А., акад. АМН (Москва)
Кошелев Н. Ф., проф. (Ленинград)
Маслов Л. М., проф. (Омск)
Новиков Ю. В., проф. (Москва)
Пивоваров Ю. П., проф. (Москва)
Покровский В. А., проф. (Воронеж)
Рамзаев П. В., проф. (Ленинград)
Самедов И. Г., проф. (Баку)

19. ПИТАНИЕ

Ответственный редактор — акад. АМН **Шарманов Т. Ш.**; зам. ответственного редактора — проф. **Петровский К. С.**, чл.-корр. АМН **Самсонов М. А.**, чл.-корр. АМН **Шатерников В. А.**; ученый секретарь — д. м. н. **Конышев В. А.**

Редакторы

Бакалян П. А., проф. (Ереван)
Беюл Е. А., проф. (Москва)
Бондарев Г. И., проф. (Москва)
Величко А. А., доц (Москва)
Волгарев М. Н., д. м. н. (Москва)
Ефремов В. В., проф. (Москва)
Карплюк И. А., проф. (Москва)
Кудашева В. А., доц. (Москва)
Лебедева Е. А., проф. (Ленинград)
Спиричев В. Б., д. б. н. (Москва)
Столмакова А. И., проф. (Львов)
Черников М.П., проф. (Москва)
Шицкова А.П., чл.-корр. АМН (Москва)
Шлыгин Г. К., проф. (Москва)
Штенберг А. И., проф. (Москва)

20. ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Шапошников О. К.**; зам. ответственного редактора — проф. **Скрипкин Ю. К.**, проф. **Студницин А. А.**; ученый секретарь — к. м. н. **Кряжева С. С.**

Редакторы

Антоньев А. А., проф. (Москва)
Аравийский А. Н., проф. (Ленинград)
Ариевич А. М., проф. (Москва)
Бабаянц Р. С., проф. (Москва)
Богданович Л. И., проф. (Витебск)
Задорожный Б. А., проф. (Харьков)
Зенин Б. А., проф. (Куйбышев)
Ильин И. И., проф. (Челябинск)
Каламкарян А. А., проф. (Москва)
Машкиллейсон А. Л., проф. (Москва)
Нестеренко Г. Б., проф. (Днепропетровск)
Овчинников Н. М., проф. (Москва)
Рахматов Б. Р., проф. (Душанбе)
Родякин Н. Ф., проф. (Ашхабад)
Романенко Г. Ф., проф. (Москва)
Самцов В. И., проф. (Ленинград)
Стоянов Б. Г., проф. (Москва)
Сулейманов К. С., проф. (Ташкент)
Туранов Н. М., проф. (Москва)
Фомин К. Ф., проф. (Рязань)
Шеклаков Н. Д., проф. (Москва)

21. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Петров Б. Д.**; зам. ответственного редактора, ученый секретарь — проф. **Потулов Б. М.**

Редакторы

Алексанян И. В., проф. (Москва)
Бизюлявичюс С. К., проф (Вильнюс)
Бородулин В. И., к. м. н. (Москва)
Васильев К. Г., проф. (Одесса)
Георгиевский А. С., проф. (Ленинград)
Данилин Е. Н., проф. (Москва)
Дупленко К. Ф., проф. (Киев)
Заблудовский П. Е., проф. (Москва)
Кадыров А. А., проф. (Самарканд)
Калнин В. В., доц. (Тарту)
Крючок Г. Р., проф. (Москва)
Кузьмин М. К., проф. (Москва)
Мендрина Г. И., проф. (Томск)
Сточик А. М., к. м. н. (Москва)
Чокин А. Р., проф. (Алма-Ата)
Шенгелия М. С., проф. (Тбилиси)
Шилинис Ю. А., к. м. н. (Москва)

22. КУРОРТОЛОГИЯ. ФИЗИОТЕРАПИЯ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Обросов А. Н.**; зам. ответственного редактора — проф. **Боголюбов В. М.**, доц. **Полторанов В. В.**, проф. **Сперанский А. П.**; ученый секретарь — к. м. н. **Антропова М. И.**

Редакторы

Антонов И. П., чл.-корр. АМН (Минск)
Беленький М. С., доц. (Одесса)
Бокша В. Г., проф. (Ялта)
Вульфсон И. З., к. м. н. (Москва)
Ефанов О. И., доц. (Москва)
Ивашов В. В., проф. (Москва)
Карачевцева Т. В., проф. (Москва)
Каценович Р. А., проф. (Ташкент)
Ларичев Л. С., к. м. н. (Киев)
Олефиренко В. Т., проф. (Москва)
Оппенгейм Д. Г., д. м. н. (Москва)
Парфенов А. П., проф. (Ленинград)
Портнов Ф. Г., проф. (Рига)
Серов С. И., проф. (Свердловск)
Соколова Н. Ф., д. м. н. (Москва)
Сорокина Е. И., проф. (Москва)
Стариков Н. М., доц. (Томск)
Стрелкова Н. И., проф. (Москва)
Стругацкий В. М., к. м. н. (Москва)
Ясногородский В. Г., проф. (Москва)

23. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Ответственный редактор — проф. **Линденбратен Л. Д.**; зам. ответственного редактора — проф. **Габуния Р. И.**; ученый секретарь — к. м. н. **Китаев В. В.**

Редакторы

Абдурасулов Д. М., проф. (Ташкент)
Бочкарев В. В., проф. (Москва)
Зубовский Г. А., проф. (Москва)
Ишмухаметов А. И., проф. (Москва)
Калантаров К. Д., д. б. н. (Москва)
Касаткин Ю. Н., проф. (Москва)
Кишковский А. Н., проф. (Ленинград)
Климова М. К., проф. (Москва)
Лемберг А. А., проф. (Харьков)
Мазаев П. Н., чл.-корр. АМН (Москва)
Максумов Д. Н., чл.-корр. АМН (Ташкент)
Панов Н. А., проф. (Москва)
Плецер В. Э. (Москва)
Позмогов А. И., проф. (Киев)
Рабкин И. Х., проф. (Москва)
Розенштраух Л. С., проф. (Москва)
Соколов Ю. Н., проф. (Москва)
Файзуллин М. Х., проф. (Казань)
Фрейдин Л. М., доц. (Москва)
Цыб А. Ф., проф. (Обнинск, Калужской обл.)
Шехтер А. И., д. м. н. (Москва)

24. МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА

Ответственный редактор — акад. АМН **Бочков Н. П.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Давиденкова Е. Ф.**, проф. **Конюхов Б. В.**; ученый секретарь — к. м. н. **Гуменюк В. А.**

Редакторы

Бадалян Л. О., чл.-корр. АМН (Москва)
Бужиевская Т. И., к. м. н. (Киев)
Вартанян М. Е., проф. (Москва)
Вельтищев Ю. Е., чл.-корр. АМН (Москва)
Глотов Н. В., доц. (Ленинград)
Захаров А. Ф., чл.-корр. АМН (Москва)
Зотиков Е. А., чл.-корр. АМН (Москва)
Иванов В. И., проф. (Москва)
Ильяшенко Б. Н., проф. (Москва)
Лазюк Г. И., проф. (Минск)
Лебедев Б. В., проф. (Москва)
Лучник Н. В., проф. (Обнинск, Калужской обл.)
Прокофьева-Бельговская А. А., чл.-корр. АМН (Москва)
Пузырев В. П., доц. (Томск)
Резник Б. Я., проф. (Одесса)
Таболин В. А., чл.-корр. АМН (Москва)
Токарев Ю. Н., проф. (Москва)

25. МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Павлов А. С.**; зам. ответственного редактора — д. м. н. **Владимиров В. Г.**, проф. **Григорьев Ю. Г.**, д. м. н. **Костромина К. Н.**; ученый секретарь — проф. **Агранат В. З.**

Редакторы

Александров Н. Н., чл.-корр. АМН (Минск)
Александров С. Н., проф. (Ленинград)
Байсоголов Г. Д., проф. (Обнинск, Калужской обл.)
Балмуханов С. Б., проф. (Алма-Ата)
Бочкарев В. В., проф. (Москва)
Вайнберг М. Ш., к. б. н. (Москва)
Варнаков О. В. (Москва)
Воробьев Е. И., чл.-корр. АМН (Москва)
Гуськова А. К., проф. (Москва)
Жаков И. Г., к. м. н. (Минск)
Жербин Е. А., проф. (Ленинград)
Ильин Л. А., акад. АМН (Москва)
Киселева Е. С., проф. (Москва)
Книжников В. А., д. м. н. (Москва)
Корогодин В. И., проф. (Москва)
Кронгауз А. Н., проф. (Москва)
Кузин А. М., чл.-корр. АН (Москва)
Лясс Ф. М., проф. (Москва)
Маргулис У. Я., проф. (Москва)
Пелевина И. И., д. б. н. (Москва)
Переслегин И. А., проф. (Москва)
Петров Р. В., акад. АМН (Москва)
Романцев Е. Ф., чл.-корр. АМН (Москва)
Рудерман А. И., проф. (Москва)
Симбирцева Л. П., д. м. н. (Ленинград)
Штуккенберг Ю. М., к. т. н. (Москва)
Ярмоненко С. П., проф. (Москва)

26. МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Шумаков В. И.**; зам. ответственного редактора — проф. **Викторов В. А.**, к. т. н. **Утямышев Р. И.**; ученый секретарь — к. б. н. **Белькевич В. И.**

Редакторы

Ананьев В. М., д. б. н. (Москва)
Бабкин С. И., доц. (Москва)
Баландин И. Г., проф. (Москва)
Бобров Б. С., к. т. н. (Москва)
Егоров Т. Л., д. м. н. (Москва)
Инин Ю. С. (Москва)
Кабатов Ю. Ф., к. т. н. (Москва)
Коблов Л. Ф., доц. (Москва)
Козлов Ю. Г., д. т. н. (Москва)
Кремнев В. А., к. т. н. (Москва)
Ленский Ю. В. (Москва)
Ливенсон А. Р., к. б. н. (Москва)
Лукьянов Е. К., к. б. н. (Москва)
Мишин Л. Н., к. б. н. (Москва)
Носкова Т. И., д. м. н. (Москва)
Поливода А. И., доц. (Москва)
Смирнов И. П., к. т. н. (Москва)
Собакин М. А., чл.-корр. АМН (Новосибирск)
Табаровский И. К., к. т. н. (Москва)
Успенский Ю. Н., проф. (Москва)
Цепелев Ю. А. (Москва)
Шейнин Т. Б. (Москва)
Шлугер Н. А., к. м. н. (Москва)

Раздел МИКРОБИОЛОГИЯ. ИММУНОЛОГИЯ

(отделы 27—30)

Ответственный редактор — акад. АМН **Жданов В. М.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Косяков П. Н.**; ученый секретарь — к. м. н. **Быков А. С.**

27. АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Адо А. Д.**; зам. ответственного редактора — проф. **Ишимова Л. М.**, проф. **Кравченко А. Т.**; ученый секретарь — проф. **Пыцкий В. И.**

Редакторы

Адрианова Н. В., к. м. н. (Москва)
Беклемишев Н. Д., проф. (Алма-Ата)
Богданов И. Л., чл.-корр. АМН (Киев)
Гургенидзе Г. В., проф. (Тбилиси)
Исхаки Ю. Б., чл.-корр. АМН (Душанбе)
Канчурин А. Х., проф. (Москва)
Кашкин П. Н., проф. (Ленинград)
Медуницын Н. В., проф. (Москва)
Остроумов А. И., проф. (Краснодар)
Польнер А. А., проф. (Москва)
Соколова Т. С., проф. (Москва)
Тареев Е. М., акад. АМН (Москва)
Тюрин Н. А., проф. (Москва)
Федосеев Г. Б., проф. (Ленинград)
Хакбердыев М. М., проф. (Ташкент)
Чучалин А. Г., чл.-корр. АМН (Москва)
Шатершков В. А., чл.-корр. АМН (Москва)

28. БАКТЕРИОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Выгодчиков Г. В.**, чл.-корр. АМН **Навашин С. М.**; зам. ответственного редактора — проф. **Левашев В. С.**, проф. **Матвеев К. И.**, проф. **Соболев В. Р.**; ученый секретарь — доц. **Пашков Е. П.**

Редакторы

Акатов А. К., д м. н. (Москва)
Антадзе В. С., проф (Тбилиси)
Ведьмина Е. А., проф. (Москва)
Вершилова П. А., акад. АМН (Москва)
Воропаева С. Д., д м н. (Москва)
Гаузе Г. Ф., акад АМН (Москва)
Голубева И. В., проф. (Москва)
Домарадский И. В., чл -корр. АМН (Москва)
Зацепин Н. И., проф. (Одесса)
Имшенецкий А. А., акад. (Москва)
Каган Г. Я., проф. (Москва)
Кочемасова З. Н., проф. (Москва)
Кудлай Д. Г., проф. (Москва)
Мельникова В. М., проф. (Москва)
Олейник И. И., проф. (Москва)
Петровская В. Г., проф (Москва)
Фомина И. П., проф. (Москва)
Фомичев Ю. К., проф. (Минск)
Холчев Н. В., проф (Москва)
Шестаков С. В., проф. (Москва)

29. ВИРУСОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Жданов В. М.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Дроздов С. Г.**; ученые секретари — проф. **Баландин И. Г.**, проф. **Ершов Ф. И.**

Редакторы

Анджапаридзе О. Г., акад. АМН (Москва)
Баринский И. Ф., проф. (Москва)
Бахуташвили В. И., проф (Тбилиси)
Блохина И. Н., акад. АМН (Горький)
Болотовский В. М., проф. (Москва)
Бочаров А. Ф., д м н. (Москва)
Букринская А. Г., проф. (Москва)
Быковский А. Ф., проф. (Москва)
Вотяков В. И., акад. АМН (Минск)
Гендон Ю. З., проф (Москва)
Дзагуров С. Г., чл -корр. АМН (Москва)
Клименко С. М., проф. (Москва)
Лашкевич В. А., проф. (Москва)
Львов Д. К., чл.-корр. АМН (Москва)
Максумов С. С., проф. (Ташкент)
Марченко В. И., д. м. н. (Москва)
Пилле Э. Р., д. м. н. (Москва)
Семенов Б. Ф., проф. (Москва)
Смородинцев А. А., акад. АМН (Ленинград)
Соловьев В. Д., акад. АМН (Москва)
Сюрин В. Н., проф. (Москва)
Фролов А. Ф., проф. (Киев)
Хованова А. М., проф. (Свердловск)
Шевлягин В. Я., д. м н. (Москва)
Шубладзе А. К., чл.-корр. АМН (Москва)

30. ИММУНОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Косяков П. Н.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Кашкин К. П.**, акад. АМН **Петров Р. В.**; ученый секретарь — д. м. н. **Ровнова З. И.**

Редакторы

Гущин И. С., д м н (Москва)
Ершов Ф. И., проф. (Москва)
Зотиков Е. А., чл.-корр АМН (Москва)
Каулен Д. Р., чл.-корр. АМН (Москва)
Кокорин И. Н., проф. (Москва)
Красильников А. П., проф. (Минск)
Кульберг А. Я., проф. (Москва)
Микаелян В. Г., проф. (Ереван)

31. НЕВРОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Шмидт Е. В.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Антонов И. П.**, чл.-корр. АМН **Бадалян Л. О.**, проф. **Михеев В. В.**; ученый секретарь — доц. **Скворцов И. А.**

Редакторы

Аносов Н. Н., проф. (Ленинград)
Богородинский Д. К., проф (Ленинград)
Гусев Е. И., проф. (Москва)
Давиденкова Е. Ф., чл -корр. АМН (Ленинград)
Златоверов А. П., проф (Куйбышев)
Лекарь П. Г., проф (Ленинград)
Лунев Д. К., проф. (Москва)
Маджидов Н. М., проф. (Ташкент)
Маньковский Н. Б., проф. (Киев)
Миловидов Ю. К. (Москва)
Мисюк Н. С., чл -корр. АМН (Минск)
Панченко Д. И., проф. (Киев)
Поляков А. Н. (Москва)
Салаева З. М., проф. (Баку)
Сараджишвили П. М., акад. АМН (Тбилиси)
Ходос Х. Г., проф. (Иркутск)

32. ОНКОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. **Блохин Н. Н.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Краевский Н. А.**, чл.-корр. АМН **Петерсон Б. Е.**, акад. АМН **Трапезников Н. Н.**, акад. АМН **Шабад Л. М.**; ученые секретари — доц. **Летягин В. П.**, проф. **Сыркин А. Б.**

Редакторы

Абелев Г. И., проф. (Москва)
Александров Н. Н., чл -корр АМН (Минск)
Бадмуханов С. Б., проф (Алма-Ата)
Вагнер Р. И., проф. (Ленинград)
Гарин А. М., проф (Москва)
Герасименко В. Н., проф. (Москва)
Гершанович М. Л., проф. (Ленинград)
Дурнов Л. А., проф. (Москва)
Мазуренко Н. П., проф. (Москва)
Мельников Р. А., проф. (Ленинград)
Мороз Л. В., д. м н (Москва)
Напалков Н. П., чл.-корр. АМН (Ленинград)
Пачес А. И., проф. (Москва)
Переводчикова Н. И., проф. (Москва)
Рудерман А. И., проф. (Москва)
Самойлов В. И., к м. н. (Москва)
Соловьев Ю. Н., проф. (Москва)
Турусов В. С., проф. (Москва)
Чаклин А. В., проф. (Москва)
Шапот В. С., чл.-корр. АМН (Москва)
Шишков В. П., акад. ВАСХНИЛ (Москва)

33. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Преображенский Н. А.**; зам. ответственного редактора — доц. **Волков Ю. Н.**, чл.-корр. АМН **Лихачев А. Г.**; ученый секретарь — д. м. н. **Гамов В. П.**

Редакторы

Бляговещенская Н. С., проф. (Москва)
Гаудинь Э. П., проф. (Рига)
Исхаки Ю. Б., чл -корр. АМН (Душанбе)
Кручинина И. Л., проф. (Москва)
Крылов Б. С., доц. (Ленинград)
Курилин И. А., проф. (Киев)
Луковский Л. А., проф. (Днепропетровск)
Миньковский А. Х., проф. (Челябинск)
Миразизов К. Д., проф (Ташкент)
Овчинников Ю. М., проф. (Москва)
Пальчун В. Т., проф. (Москва)
Погосов В. С., проф. (Москва)
Попов А. П., доц. (Москва)
Преображенский Ю. Б., проф (Москва)
Сагалович Б. М., проф. (Москва)
Сийрде Э. К., проф. (Тарту)
Солдатов И. Б., акад. АМН (Куйбышев)
Тарасов Д. И., проф. (Москва)
Филиппов М. М. (Москва)
Ханамиров А. Р., проф. (Ростов-на-Дону)
Хечинашвили С. Н., акад АМН (Тбилиси)
Шантуров А. Г., проф. (Иркутск)
Шевцов В. М., проф. (Москва)
Шукурян К. Г., проф. (Ереван)

34. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Ответственный редактор — проф. **Краснов М. Л.**; зам. ответственного редактора — проф. **Аветисов Э. С.**, акад. АМН **Краснов М. М.**, проф. **Шульпина Н. Б.**; ученый секретарь — к. м. н. **Попова З. С.**

Редакторы

Беляев В. С., проф. (Москва)
Бирич Т. В., проф. (Минск)
Богословский А. И., проф. (Москва)
Водовозов А. М., проф. (Волгоград)
Волков В. В., проф. (Ленинград)
Волоконенко А. И., проф. (Воронеж)
Ерошевский Т. И., чл.-корр. АМН (Куйбышев)
Иванов Н. К., доц. (Москва)
Каспаров А. А., д. м. н. (Москва)
Ковалевский Е. И., проф. (Москва)
Ларюхина Г. М., к. м. н. (Москва)
Маланова Н. Л., проф. (Горький)
Медведев Н. И., проф. (Самарканд)
Нестеров А. П., чл.-корр. АМН (Москва)
Пучковская Н. А., акад. АМН (Одесса)
Трутнева К. В., к. м. н. (Москва)
Федоров С. Н., чл.-корр. АМН (Москва)
Хамидова М. Х., проф. (Ташкент)
Ченцова О. Б., проф. (Москва)
Шевалев В. Е., проф (Киев)
Шоттер Л. Х., проф. (Тарту)

35. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Саркисов Д. С.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Серов В. В.**, акад. АМН **Смольянников А. В.**; ученый секретарь — проф. **Пермяков Н. К.**

Редакторы

Абдуллаходжаева М. С., проф. (Ташкент)
Авцын А. П., акад АМН (Москва)
Анестиади В. Х., проф (Кишинев)
Бегларян А. Г., проф. (Ереван)
Виноградова Т. П., проф. (Москва)
Деканосидзе Т. И., проф. (Тбилиси)
Ивановская Т. Е., проф. (Москва)
Краевский Н. А., акад АМН (Москва)
Ланцман М. Н. (Москва)
Максимович Н. А., проф. (Киев)
Рапопорт Я. Л., проф. (Москва)
Соловьев Ю. Н., проф (Москва)
Торопцев И. В., акад АМН (Томск)
Хмельницкий О. К., проф (Ленинград)
Цинзерлинг А. В., проф. (Ленинград)

36. ПЕДИАТРИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Бисярина В. П.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Вельтищев Ю. Е.**, акад. АМН **Нисевич Н. И.**, чл.-корр. АМН **Таболин В. А.**; ученый секретарь — доц. **Лебедев В. П.**

Редакторы

Витебский Е. М., проф. (Донецк)
Воротынцева Н. В., проф. (Москва)
Державин В. М., проф. (Москва)
Дурнов Л. А., проф. (Москва)
Исаева Л. А., проф. (Москва)
Кисляк Н. С., чл.-корр. АМН (Москва)
Князев Ю. А., проф. (Москва)
Крылов В. И., проф. (Тюмень)
Кузьмичева А. Т., проф. (Ленинград)
Лукьянова Е. М., чл.-корр. АМН (Киев)
Мазурин А. В., проф. (Москва)
Носов С. Д., чл.-корр. АМН (Москва)
Пагава И. К., проф. (Тбилиси)
Папаян А. В., проф. (Ленинград)
Рослякова Н. В. (Москва)
Студеникин М. Я., акад АМН (Москва)
Сухарева М. Е., проф (Москва)
Усов И. Н., проф. (Минск)
Шамсиев С. Ш., чл.-корр АМН (Ташкент)

37. ПСИХИАТРИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Снежневский А. В.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Вартанян М. Е.**, проф. **Ковалев В. В.**, проф. **Поляков Ю. Ф.**; ученый секретарь — д. м. н **Шумский Н. Г.**

Редакторы

Бабаян Э. А., к. м. н. (Москва)
Банщиков В. М., проф. (Москва)
Гасанов Х. Г., проф. (Баку)
Гулямов М. Г., проф. (Душанбе)
Жариков Н. М., чл.-корр. АМН (Москва)
Зейгарник Б. В., проф. (Москва)
Зурабашвили А. Д., акад АМН (Тбилиси)
Коркина М. В., проф. (Москва)
Личко А. Е., проф. (Ленинград)
Матвеев В. Ф., проф. (Москва)
Меграбян А. А., чл.-корр. АМН (Ереван)
Морозов В. М., чл.-корр. АМН (Москва)
Морозов Г. В., акад. АМН (Москва)
Наджаров Р. А., проф. (Москва)
Озерецковский Д. С., проф. (Ленинград)
Портнов А. А., проф (Москва)
Пятницкая И. Н., проф (Москва)
Саарма Ю. М., чл.-корр. АМН (Тарту)
Семенов С. Ф., проф. (Москва)
Спивак Л. И., проф. (Ленинград)
Сухарева Г. Е., проф (Москва)
Татаренко Н. П., проф. (Харьков)
Ушаков Г. К., проф. (Москва)
Фрумкин Я. П., проф (Киев)
Хохлов Л. К., проф. (Ярославль)

38. РЕАНИМАТОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Неговский В. А.**; зам. ответственного редактора — проф. **Андреев Г. Н.**, чл.-корр. АН **Ефуни С. Н.**, д. м. н. **Маркелов И. М.**; ученый секретарь — д. м. н. **Семенов В. Н.**

Редакторы

Берман В. С., д. м. н (Москва)
Богомолец О. А., проф. (Киев)
Богомолов С. А. (Москва)
Гурвич А. М., д м. н (Москва)
Долецкий С. Я., чл.-корр. АМН (Москва)
Замотаев И. П., проф. (Москва)
Золотокрылина Е. С., к. м. н. (Москва)
Кассиль В. Л., к м н (Москва)
Лебедева Р. Н., проф. (Москва)
Малышев В. Д., проф. (Москва)
Попова Л. М., проф (Москва)
Руда М. Я., д. м. н (Москва)
Шанин Ю. Н., проф. (Ленинград)
Шапиро В. М., к м н (Москва)
Шикунова Л. Г., д. м. н. (Москва)

39. СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ответственный редактор — к. м. н. **Трофимов В. В.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Канеп В. В.**, чл.-корр. АМН **Лисицын Ю. П.**, проф. **Щепин О. П.**; ученые секретари — доц. **Кравченко Н. А.**, к. м. н. **Линденбратен А. Л.**

Редакторы

Александрова М. Б., проф. (Москва)
Балтийский В. А. (Москва)
Братусь В. Д., проф. (Киев)
Буренков С. П., к. м. н. (Москва)
Венедиктов Д. Д., проф. (Москва)
Ворохобов Л. А. (Москва)
Галахов Е. В., к. м. н. (Москва)
Головтеев В. В. (Москва)
Данилов Ю. Е., проф. (Москва)
Еременко Г. С., доц. (Москва)
Ермаков В. В., проф. (Москва)
Казаков Б. Н. (Москва)
Лаврова И. Г., проф. (Москва)
Лекарев Л. Г., проф. (Винница)
Лидов И. П., проф. (Москва)
Логинова Е. А., проф. (Москва)
Миняев В. А., проф. (Ленинград)
Морозов В. И., д. м н. (Ленинград)
Мухутдинов И. З., доц (Казань)
Нестеров В. А., проф. (Краснодар)
Ноткин Е. Л., проф. (Москва)
Оппенгейм Д. Г., д м н. (Москва)
Петраков Б. Д., проф. (Москва)
Поляков Л. Е., проф. (Ленинград)
Родов Я. И., доц. (Москва)
Сафонов А. Г., к. м. н. (Москва)
Серенко А. Ф., чл.-корр. АМН (Москва)
Скорнякова Л. К. (Москва)
Сточик А. М., к. м. н. (Москва)
Троян Н. В., доц. (Москва)
Удинцов Е. И., проф. (Москва)
Церковный Г. Ф., к. м. н. (Москва)
Чикин С. Я., д. м. н. (Москва)
Шупик П. Л., проф. (Киев)

40. СТОМАТОЛОГИЯ

Ответственный редактор — проф. **Рудько В. Ф.**; зам. ответственного редактора — проф. **Виноградова Т. Ф.**, проф. **Прохончуков А. А.**, акад. АМН **Рыбаков А. И.**; ученый секретарь — проф. **Гемонов В. В.**

Редакторы

Бажанов Н. Н., чл.-корр. АМН (Москва)
Безруков В. М., д. м. н. (Москва)
Боровский Е. В., проф. (Москва)
Гаврилов Е. И., проф. (Калинин)
Данилевский Н. Ф., проф. (Киев)
Дмитриева В. С., проф. (Москва)
Дойников А. И., проф. (Москва)
Дунаевский В. А., проф. (Ленинград)
Егиян Г. М., проф. (Ереван)
Иванов В. С., проф. (Москва)
Ильина-Маркосян Л. В., проф. (Москва)
Каламкаров Х. А., проф. (Москва)
Конобевцев О. Ф., проф. (Москва)
Копейкин В. Н., проф. (Москва)
Кручинский Г. В., проф. (Минск)
Леонтьев В. К., проф. (Омск)
Молчанова К. А., проф (Москва)
Наумов П. В., проф. (Калинин)
Новоселов Р. Д., проф. (Калинин)
Овруцкий Г. Д., проф. (Казань)
Паникаровский В. В., проф. (Москва)
Пахомов Г. Н., проф. (Москва)
Петрович Ю. А., проф. (Москва)
Плотников Н. А., проф. (Москва)
Семенченко Г. И., проф. (Одесса)
Сукачев В. А., д. м. н. (Москва)
Федоров Ю. А., проф. (Ленинград)
Хитров Ф. М., проф. (Москва)
Школяр Т. Т., проф. (Калинин)

41. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА

Ответственный редактор — проф. **Крюков В. Н.**, проф. **Смольянинов В. М.**; зам. ответственного редактора — проф. **Капустин А. В.**, проф. **Прозоровский В. И.**, проф. **Томилин В. В.**; ученый секретарь — к. м. н. **Буромский И. В.**

Редакторы

Авакян Н. М., проф. (Ереван)
Алисиевич В. И., проф. (Москва)
Атакишиев А. Р., проф. (Баку)
Бедрин Л. М., проф. (Ярославль)
Громов А. П., чл.-корр. АМН (Москва)
Загрядская А. П., проф. (Горький)
Зорин Б. Н., проф. (Донецк)
Кисин М. В., д. м. н. (Москва)
Концевич И. А., проф. (Киев)
Литвак А. С., проф. (Ставрополь)
Марченко Н. П., проф. (Харьков)
Мельников Ю. Л., проф. (Москва)
Найнис И. И., проф. (Каунас)
Науменко В. Г., проф. (Москва)
Поркшеян О. Х., проф. (Ленинград)
Рубежанский А. Ф., проф. (Днепропетровск)
Рубцов А. Ф., к. фарм. н. (Москва)
Солохин А. А., проф. (Москва)
Хижнякова К. И., проф. (Москва)
Ширинский П. П., доц. (Москва)

42. УРОЛОГИЯ. НЕФРОЛОГИЯ. СЕКСОПАТОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Лопаткин Н. А.**, чл.-корр. АМН **Пытель А. Я.**; зам. ответственного редактора — проф. **Васильченко Г. С.**, д. м. н. **Горюнов В. Г.**, проф. **Кулаков Г. П.**, проф. **Савченко Н. Е.**, акад. АМН **Тареев Е. М.**; ученый секретарь — к. м. н. **Тимохов В. С.**

Редакторы

Абрамян А. Я., проф. (Москва)
Борисова-Хроменко В. М., доц. (Барнаул)
Великанов К. А., проф. (Одесса)
Войно-Ясенецкий А. М., проф. (Хабаровск)
Гудынский Я. В., доц. (Москва)
Джавад-заде М.-М. Д.-о., чл.-корр. АМН (Баку)
Дунаевский Л. И., проф. (Москва)
Инасаридзе Г. З., проф. (Тбилиси)
Мазин В. В., проф. (Владивосток)
Мохорт В. А., проф. (Минск)
Паникратов К. Д., проф. (Иваново)
Пытель Ю. А., проф. (Москва)
Рябинский В. С., проф. (Москва)
Старкова Н. Т., проф. (Москва)
Тареева И. Е., проф. (Москва)
Ткачук В. Н., проф. (Ленинград)
Хоменко В. Ф., проф. (Новосибирск)
Шаповал В. И., проф. (Харьков)
Шевцов И. П., проф. (Ленинград)
Шульцев Г. П., проф. (Москва)

43. ФАРМАКОЛОГИЯ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Лакин К. М.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Вальдман А. В.**, проф. **Каркищенко Н. Н.**, акад. АМН **Машковский М. Д.**, чл.-корр. АМН **Харкевич Д. А.**; ученые секретари — доц. **Муратов В. К.**, проф. **Соловьев В. Н.**, доц. **Чурюканов В. В.**

Редакторы

Бабаян Э. А., к. м. н. (Москва)
Бабичев В. А., проф. (Москва)
Голиков С. Н., акад. АМН (Ленинград)
Дедов И. И., проф. (Москва)
Золотухин С. И., проф. (Москва)
Камилов И. К., проф. (Ташкент)
Клюев М. А. (Москва)
Лапин В. П., к. фарм н. (Москва)
Мирзоян С. А., проф. (Ереван)
Першин Г. Н., чл.-корр. АМН (Москва)
Сангайло А. К., проф. (Свердловск)
Саратиков А. С., проф. (Томск)
Сенов П. Л., проф. (Москва)
Тенцова А. И., чл.-корр. АМН (Москва)

Раздел ФИЗИОЛОГИЯ
(отделы 44—46)

Ответственный редактор — акад. АМН **Горизонтов П. Д.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Судаков К. В.**

44. БИОНИКА. МЕДИЦИНСКАЯ КИБЕРНЕТИКА

Ответственный редактор — чл.-корр. АН **Емельянов С. В.**; зам. ответственного редактора — проф. **Васадзе Г. Ш.**, проф. **Шидловский В. А.**; ученый секретарь — проф. **Авен О. И.**

Редакторы

Амосов Н. М., чл.-корр. АМН (Киев)
Ахутин В. М., проф. (Ленинград)
Белькевич В. И., к б. н. (Москва)
Васильев Ю. М., проф. (Москва)
Гурарий К. Н., к. т. н. (Москва)
Коган А. Б., проф. (Ростов-на-Дону)
Новосельцев В. Н., д. т. н. (Москва)
Петровский А. М., проф. (Москва)
Шик Л. Л., проф. (Москва)

45. НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Ответственный редактор — чл.-корр. АМН **Судаков К. В.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Косицкий Г. И.**; ученый секретарь — к. м. н. **Котов А. В.**

Редакторы

Асмаян Н. В., д. б. н. (Москва)
Беленков Н. Ю., чл.-корр. АМН (Ленинград)
Бехтерева Н. П., акад. (Ленинград)
Булыгин И. А., проф. (Минск)
Ведяев Ф. П., проф. (Харьков)
Гамбарян Л. С., проф. (Ереван)
Голубева Е. Л., д. м. н. (Москва)
Зилов В. Г., проф. (Москва)
Исабаева В. А., проф. (Фрунзе)
Каграманов К. М., проф. (Баку)
Коротько Г. Ф., проф. (Андижан)
Костюк П. Г., акад. (Киев)
Кудряшов Б. А., проф. (Москва)
Ливанов М. Н., акад (Москва)
Орлов Р. С., проф. (Ленинград)
Путилин Н. И., проф. (Киев)
Скляров Я. П., проф. (Львов)
Уранов В. Н., к. м. н (Москва)
Шидловский В. А., проф. (Москва)

46. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Горизонтов П. Д.**; зам. ответственного редактора — проф. **Нейман И. М.**, акад. АМН **Федоров Н. А.**, акад. АМН **Чернух А. М.**; зам. ответственного редактора, ученый секретарь — чл.-корр. АМН **Мороз Б. Б.**

Редакторы

Адо А. Д., акад. АМН (Москва)
Андреев С. В., проф. (Москва)
Веселкин П. Н., акад. АМН (Ленинград)
Горев Н. Н., акад. АМН (Киев)
Зайко Н. Н., чл.-корр. АМН (Киев)
Крыжановский Г. Н., чл.-корр. АМН (Москва)
Кулагин В. К., акад. АМН (Ленинград)
Лосев Н. И., проф. (Москва)
Майстрах Е. В., проф. (Ленинград)
Мчедлишвили Г. И., проф. (Тбилиси)
Сааков Б. А., проф. (Ростов-на-Дону)
Хомазюк А. И., проф. (Киев)

47. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Ответственный редактор — проф. **Иванов С. М.**; зам. ответственного редактора — проф. **Граевская Н. Д.**, проф. **Хрущев С. В.**, проф. **Чоговадзе А. В.**; ученый секретарь — доц. **Илларионов В. П.**

Редакторы

Атаев З. М., проф. (Москва)
Белая Н. А., проф. (Москва)
Бункин Н. А., доц. (Москва)
Гулько И. С., проф. (Минск)
Данько Ю. И., проф. (Ленинград)
Добровольский В. К., проф. (Ленинград)
Журавлева А. И., проф. (Москва)
Каптелин А. Ф., проф. (Москва)
Максимова В. Н., проф. (Харьков)
Минасян Г. А., проф. (Ереван)
Мотылянская Р. Е., проф. (Москва)
Мошков В. Н., чл.-корр. АМН (Москва)
Сванишвили Р. А., доц. (Тбилиси)
Тихвинский С. Б., проф. (Ленинград)
Федорова Г. С., доц. (Москва)
Хитрик И. И., проф. (Москва)
Шелюженко А. А., проф. (Киев)

48. ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

Ответственный редактор — чл.-корр. АН **Фролов И. Т.**; зам. ответственного редактора — д. ф. н. **Карпинская Р. С.**; зам. ответственного редактора, ученый секретарь — д. ф. н. **Пастушный С. А.**

Редакторы

Адо А. Д., акад. АМН (Москва)
Дубровский Д. И., проф. (Москва)
Жирнов В. Д., доц. (Москва)
Изуткин А. М., проф. (Горький)
Карсаевская Т. В., доц. (Ленинград)
Кузин М. И., акад. АМН (Москва)
Лисицын Ю. П., чл.-корр. АМН (Москва)
Мамзин А. С., проф. (Ленинград)
Петленко В. П., проф (Ленинград)
Смирнов И. Н., проф. (Москва)
Спиркин А. Г., чл.-корр. АН (Москва)
Степанов А. Д., д. м. н. (Горький)
Струков А. И., акад. АМН (Москва)
Тарасов К. Е., проф. (Москва)
Тищенко В. И., к. ф. н. (Москва)
Царегородцев Г. И., проф. (Москва)
Шингаров Г. Х., проф. (Москва)
Юдин Б. Г., к. ф. н. (Москва)

Раздел ХИРУРГИЯ

(отделы 49—55)

Ответственный редактор — акад. **Петровский Б. В.**; зам. ответственного редактора — проф. **Лисицин К. М.**, проф. **Милонов О. Б.**, акад. АМН **Савельев В. С.**; ученый секретарь — к. м. н. **Катковский Г. Б.**

49. АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Ответственный редактор — проф. **Маят В. С.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Ванцян Э. Н.**, проф. **Гуляев А. В.**; ученый секретарь — проф. **Покровский Г. А.**

Редакторы

Агаев Б. А., проф. (Баку)
Агейчев В. А., к. м. н. (Москва)
Аминев А. М., проф. (Куйбышев)
Братусь В. Д., проф. (Киев)
Кахиани З. Н., проф. (Тбилиси)
Климинский И. В., к. м. н. (Москва)
Кузин М. И., акад. АМН (Москва)
Нестеренко Ю. А., проф. (Москва)
Панцырев Ю. М., проф. (Москва)
Пипиа И. К., проф. (Тбилиси)
Русанов А. А., проф. (Ленинград)
Скобелкин О. К., проф. (Москва)
Сызганов А. Н., проф. (Алма-Ата)
Федоров В. Д., чл.-корр. АМН (Москва)
Чухриенко Д. П., проф. (Днепропетровск)

50. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Ответственный редактор — проф. **Дарбинян Т. М.**; зам. ответственного редактора — проф. **Гологорский В. А.**, проф. **Долина О. А.**; ученый секретарь — к. м. н. **Смольников П. В.**

Редакторы

Андреев Г. Н., проф. (Рига)
Белов В. А., к. м. н. (Москва)
Белоярцев Ф. Ф., д. м. н (Москва)
Бунятян А. А., проф. (Москва)
Дамир Е. А., проф. (Москва)
Ефуни С. Н., чл.-корр. АН (Москва)
Малышев В. Д., проф. (Москва)
Тверской А. Л., к. м. н. (Москва)
Трещинский А. И., проф. (Киев)
Уваров Б. С., проф. (Ленинград)
Чепкий Л. П., проф. (Киев)

51. КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

Ответственный редактор — акад. АМН **Малиновский Н. Н.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Бураковский В. И.**, чл.-корр. АМН **Покровский А. В.**, проф. **Сергеев В. М.**; ученый секретарь — к. м. н. **Дземешкевич С. Л.**

Редакторы

Абашидзе Г. Г., проф. (Тбилиси)
Авдалбекян С. Х., проф. (Ереван)
Амосов Н. М., чл.-корр. АМН (Киев)
Арапов А. Д., д. м. н. (Москва)
Аскерханов Р. П., чл.-корр. АМН (Махачкала)
Беличенко И. А., проф. (Москва)
Богуш Л. К., акад АМН (Москва)
Бухарин В. А., проф. (Москва)
Вахидов В. В., проф. (Ташкент)
Волколаков Я. В., проф. (Рига)
Даниленко М. В., чл.-корр. АМН (Львов)
Зубарев Р. П., проф. (Москва)
Князев М. Д., проф. (Москва)
Колесников С. А., проф (Москва)
Колесов А. П., акад АМН (Ленинград)
Колесов В. И., проф. (Ленинград)
Корендясев М. А., к. м. н. (Москва)
Люде М. Н., д. м. н (Москва)
Мешалкин Е. Н., акад АМН (Новосибирск)
Милонов О. Б., проф. (Москва)
Морозов Ю. И., проф. (Смоленск)
Петров В. И., чл.-корр. АМН (Москва)
Пипия В. И., проф. (Тбилиси)
Сергиевский В. С., проф. (Новосибирск)
Топчибашев М. А., акад АМН (Баку)
Углов Ф. Г., акад. АМН (Ленинград)
Францев В. И., проф. (Москва)
Шеляховский М. В., проф. (Москва)
Шотт А. В., проф. (Минск)

52. НЕЙРОХИРУРГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Ромоданов А. П.**; зам. ответственного редактора — проф. **Зозуля Ю. А.**, проф. **Кандель Э. И.**, акад. АМН **Коновалов А. Н.**; ученый секретарь — проф. **Васин Н. Я.**

Редакторы

Бабиченко Е. И., проф (Саратов)
Вихерт Т. М., д. м. н. (Москва)
Земская А. Г., проф. (Ленинград)
Злотник Э. И., проф (Минск)
Клумбис Л. А., проф. (Каунас)
Педаченко Г. А., проф. (Киев)
Раудам Э. И., проф. (Тарту)
Рачков Б. М., д. м. н. (Ленинград)
Ростоцкая В. И., д. м. н. (Москва)
Самотокин Б. А., проф. (Ленинград)
Харитонова К. И., проф. (Новосибирск)
Хилько В. А., проф. (Ленинград)

53. ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Стручков В. И.**; зам. ответственного редактора — проф. **Буянов В. М.**, проф. **Гостищев В. К.**, проф. **Дерябин И. И.**, проф. **Макаренко Т. П.**; ученый секретарь — к. м. н. **Мазуров В. Г.**

Редакторы

Астапенко В. Г., проф. (Минск)
Белов И. Н., д. м. н. (Москва)
Бычихин Н. П., проф. (Архангельск)
Галеев М. А.-В., проф. (Уфа)
Дмитриев А. Е., проф (Москва)
Затолокин В. Д., проф. (Курск)
Карпенко В. Г., проф. (Волгоград)
Колесов В. И., проф. (Ленинград)
Кузин М. И., акад АМН (Москва)
Лопухин Ю. М., акад. АМН (Москва)
Лохвицкий С. В., проф. (Караганда)
Луцевич Э. В., проф. (Москва)
Митряков Н. Ф., проф. (Тюмень)
Розанов И. Б., проф. (Москва)
Русанов А. А., проф. (Ленинград)
Русанов С. А., проф. (Москва)
Сергеев В. М., проф. (Москва)
Скрипниченко Д. Ф., проф. (Киев)
Тачмурадов Н. М., проф. (Ашхабад)
Цыбырнэ К. А., проф. (Кишинев)
Шабанов А. Н., чл.-корр. АМН (Москва)
Юхтин В. И., проф (Москва)

54. ТРАВМАТОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ

Ответственный редактор — акад. АМН **Волков М. В.**; зам. ответственного редактора — проф. **Зацепин С. Т.**, проф. **Кондрашин Н. И.**, проф. **Ткаченко С. С.**; ученый секретарь — к. м. н. **Маттис Э. Р.**

Редакторы

Андрианов В. Л., проф. (Ленинград)
Дедова В. Д., проф. (Москва)
Дубров Я. Г., проф (Москва)
Калнберз В. К., чл.-корр. АМН (Рига)
Каплан А. В., проф. (Москва)
Корж А. А., чл.-корр АМН (Харьков)
Крюк А. С., проф (Минск)
Меженина Е. П., проф (Киев)
Миронова З. С., проф (Москва)
Мовшович И. А., проф. (Москва)
Нефедьева Н. Н., доц. (Москва)
Поляков В. А., проф. (Москва)
Тумян С. Д., проф. (Ереван)
Фищенко П. Я., проф. (Москва)
Шаматов Н. М., проф (Ташкент)
Юмашев Г. С., проф. (Москва)

55. ХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Ответственный редактор — акад. АМН **Исаков Ю. Ф.**; зам. ответственного редактора — чл.-корр. АМН **Баиров Г. А.**, проф. **Гераськин В. И.**, проф. **Ситковский Н. Б.**, проф. **Степанов Э. А.**; ученый секретарь — к. м. н. **Криворак С. М.**

Редакторы

Авалиани Л. В., проф (Тбилиси)
Гаврюшов В. В., д. м. н (Москва)
Георгиу Н. К., чл.-корр АМН (Кишинев)
Державин В. М., проф. (Москва)
Кущ Н. Л., проф. (Донецк)
Мартикян Э. С., проф. (Ереван)
Мишарев О. С., проф (Минск)
Михельсон В. А., проф. (Москва)
Пугачев А. Г., проф. (Москва)
Пулатов А. Т., проф. (Душанбе)
Христич А. Д., проф. (Днепропетровск)

---

56. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

Ответственный редактор — акад. АМН **Бургасов П. Н.**; зам. ответственного редактора — акад. АМН **Покровский В. И.**, проф. **Сумароков А. А.**; ученые секретари — доц. **Рождественский В. М.**, доц. **Туманов Ф. А.**

Редакторы

Алексеева М. И., доц. (Москва)
Бароян О. В., акад АМН (Москва)
Белов Г. Ф., проф. (Новосибирск)
Билибин А. Ф., акад. АМН (Москва)
Блюгер А. Ф., проф. (Рига)
Богомолов Б. П., проф. (Москва)
Болдырев Т. Е., чл.-корр. АМН (Москва)
Бунин К. В., акад АМН (Москва)
Вотяков В. И., акад. АМН (Минск)
Дроздов С. Г., чл.-корр. АМН (Москва)
Елкин И. И., проф. (Москва)
Ершов В. С., акад ВАСХНИЛ (Москва)
Ильинский Ю. А., проф. (Москва)
Истомина Т. И., к. м. н (Москва)
Крашкевич К. В., доц. (Москва)
Кулиев М. М., д. м. н. (Баку)
Лейкина Е. С., проф. (Москва)
Лобан К. М., проф. (Москва)
Лысенко А. Я., проф (Москва)
Мусабаев И. К., чл.-корр. АМН (Ташкент)
Назиров М. Р., проф. (Баку)
Озерецковская Н. Н., проф. (Москва)
Пак С. Г., проф. (Москва)
Сакварелидзе Л. А., проф. (Тбилиси)
Семенов Б. Ф., проф. (Москва)
Сомов Г. П., чл.-корр. АМН (Владивосток)
Степанов И. Р., доц. (Москва)
Угрюмов Б. Л., проф. (Киев)
Урбан В. П., акад. ВАСХНИЛ (Ленинград)
Хашимов Д. М., проф. (Душанбе)
Чагин К. П., чл.-корр. АМН (Москва)

Р

РАБДИТО́ЗЫ (rhabditoses) — гельминтозы, вызываемые свободно живущими нематодами сем. Rhabditidae, характеризующиеся поносом или другими расстройствами в зависимости от локализации паразита в организме человека (напр., в почках, коже и др.).

РАБДО- (греч. rhabdos прут, палка, полоса) — составная часть сложных слов, означающая «имеющий вид палочки», «полосатый».

РАБДОВИ́РУСЫ (Rhabdoviridae; *рабдо-* + *вирусы*) — семейство вирусов, содержащих одноцепочечную РНК; объединяет два рода — везикуловирусы и лиссавирусы; включает патогенные для человека виды (напр., вирус бешенства).

РАБДОМИО- (греч. rhabdos прут, палка, полоса + mys, myos мышца) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к поперечнополосатой мышечной ткани».

РАБДОМИОБЛАСТО́МА (rhabdomyoblastoma; *рабдомио-* + *бластома*) — см. *Рабдомиосаркома.*

РАБДОМИОБЛАСТО́МА ЭМБРИОНА́ЛЬНАЯ (rhabdomyoblastoma embryonale) — см. *Миобластома зернисто-клеточная.*

РАБДОМИО́МА (rhabdomyoma; *рабдомио-* + *-ома*) — доброкачественная опухоль, исходящая из поперечнополосатой мышечной ткани.

РАБДОМИО́МА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (rhabdomyoma malignum) — см. *Рабдомиосаркома.*

РАБДОМИОСАРКО́МА (rhabdomyosarcoma; *рабдомио-* + *саркома*; син.: рабдомибластома, рабдомиома злокачественная) — злокачественная опухоль, исходящая из поперечнополосатой мышечной ткани.

РАБДОМИОСАРКО́МА ЭМБРИОНА́ЛЬНАЯ (rhabdomyosarcoma embryonale) — см. *Саркома ботриоидная.*

РАБДОСФИ́НКТЕР (rhabdosphincter; *рабдо-* + *сфинктер*) — сфинктер, образованный поперечнополосатой мышечной тканью, напр. сфинктер мочеиспускательного канала.

РА́БКИНА ПОЛИХРОМАТИ́ЧЕСКИЕ ТАБЛИ́ЦЫ (Е. Б. Рабкин, род. в 1895 г., сов. офтальмолог) — см. *Полихроматические таблицы.*

РА́БКИНА СПЕКТРА́ЛЬНЫЙ АНОМАЛОСКО́П (Е. Б. Рабкин) — см. *Спектроаномалоскоп.*

РАБО́ТА ДИНАМИ́ЧЕСКАЯ в физиологии — процесс сокращения мышц, приводящий к перемещению в пространстве тела или его частей.

РАБО́ТА СТАТИ́ЧЕСКАЯ в физиологии — процесс сокращения мышц для поддержания тела или его частей в пространстве (напр., при удержании груза, для поддержания позы).

РАБОТОСПОСО́БНОСТЬ — 1) способность органа или целого организма к активной деятельности в заданном режиме; 2) в физиологии труда — уровень функциональных возможностей организма (физиологической системы, органа), характеризующийся эффективностью (количеством и качеством) работы, выполняемой за определенный промежуток времени.

РАБОТОСПОСО́БНОСТЬ ПСИХИ́ЧЕСКАЯ — см. *Работоспособность умственная.*

РАБОТОСПОСО́БНОСТЬ У́МСТВЕННАЯ (син. Р. психическая) — способность воспринимать и перерабатывать информацию.

РАБОТОСПОСО́БНОСТЬ ФИЗИ́ЧЕСКАЯ — способность выполнять мышечную работу в заданной интенсивности и сложности.

РАБО́ЧАЯ ЗО́НА (по ГОСТ 12.1.005 — 76) — пространство высотой 2 *м* над уровнем пола или площадки, на к-рых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

РАБО́ЧАЯ НАГРУ́ЗКА (син. трудовая нагрузка) — комплекс факторов, обусловливающих функциональное напряжение организма в процессе труда, включающий средства труда, трудовые действия и условия окружающей среды; различают физическую и психическую нагрузку.

РАБО́ЧАЯ ПО́ЗА — взаимное расположение частей тела при выполнении трудовой операции; Р. п. не должна оказывать неблагоприятного воздействия на организм.

РАБО́ЧЕЕ МЕ́СТО — часть пространства, предназначенная для выполнения работником (группой работников) производственной деятельности, оснащенная необходимыми для трудового процесса материально-техническими средствами, в т. ч. устройствами, обеспечивающими безопасность труда и улучшающими его условия.

РАБО́ЧЕЕ НАПРЯЖЕ́НИЕ — реакция организма на рабочую нагрузку, выражающаяся в изменении функционального напряжения организма человека при работе, как правило, в повышении активности физиологических функций.

РА́ВИЧ-ЩЕ́РБО СИМПТО́М (В. А. Равич-Щербо, 1890—1955, сов. фтизиатр; син. симптом югулярный) — втяжение кожи и подкожной клетчатки над грудиной на высоте вдоха, наблюдаемое при туберкулезном поражении лимфатических узлов средостения; обусловлено перифокальным воспалением и фиброзом прилежащей клетчатки.

РАВНОПА́ЛОСТЬ (isodactylia) — см. *Изодактилия.*

РАДЗИЕ́ВСКОГО ОПЕРА́ЦИЯ (А. Г. Радзиевский, сов. хирург) — хирургическая операция: фиксация прямой кишки (в области ее крестцового изгиба) к передней стенке живота с помощью ленты, иссекаемой из апоневроза наружной косой мышцы живота; применяется при выпадении прямой кишки.

РАДИА́ТОР (лат. radio, radiatum излучать) в коммунальной гигиене — нагревательный прибор парового или водяного отопления, действующий по принципу конвекционной передачи тепла в окружающий воздух и излучением с поверхности прибора.

РАДИАЦИО́ННАЯ БЕЗОПА́СНОСТЬ — система мероприятий, направленных на устранение или ограничение воздействия источников ионизирующего излучения на людей и окружающую среду.

РАДИАЦИО́ННАЯ ЗАЩИ́ТА (нрк) — см. *Противолучевая защита.*

РАДИАЦИО́ННАЯ РАЗВЕ́ДКА — сбор сведений о наличии радиоактивных веществ в окружающей среде с целью предупреждения радиационных поражений.

РАДИАЦИО́ННО-ХИМИ́ЧЕСКИЕ ПРОЦЕ́ССЫ — химические реакции, протекающие при взаимодействии ионизирующего излучения с веществом, приводящие к образованию химически активных свободных атомов и радикалов, а также возбужденных молекул; Р.-х. п. лежат в основе лучевого поражения тканей организма.

РАДИАЦИО́ННЫЕ ПОЯСА́ ЗЕМЛИ́ — области околоземного пространства, характеризующиеся повышенной плотностью потоков заряженных частиц, обусловленной удержанием их магнитным полем Земли; длительное пребывание в Р. п. З. при полетах в околоземном пространстве может вызвать радиационные поражения.

РАДИА́ЦИЯ (лат. radio, radiatum излучать) — см. *Излучение* [1].

РАДИА́ЦИЯ ПРОНИКА́ЮЩАЯ (нрк) — см. *Излучение ионизирующее.*

РА́ДИЙ (Radium; Ra) — радиоактивный химический элемент II группы периодической системы Д. И. Менделеева; атомный номер 88, атомная масса 226,0254; содержит изотопы с массовыми числами от 213 до 230 и периода-

ми полураспада от 10^{-3} сек. до 1600 лет; изотоп Р. с массовым числом 226 использовался для гамма-терапии.

РАДИКО-(радикул-, радикуло-; лат. radicula корешок, от radix, radicis корень) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к корешкам (гл. обр. спинномозговых нервов)».

РАДИКОТОМИЯ (radicotomia; *радико-* + греч. tomē разрез, рассечение; син. ризотомия) — хирургическая операция: перерезка корешков спинномозговых или черепных нервов.

Р. ЗАДНЯЯ (r. posterior) — Р. задних корешков спинномозговых нервов; применяется для устранения локальных болей.

Р. ПЕРЕДНЯЯ (r. anterior) — Р. передних корешков спинномозговых нервов; применяется для устранения локальных тонических гиперкинезов.

Р. СУБДУРАЛЬНАЯ (r. subduralis)—см. *Ферстера — Абби операция*.

Р. ЭКСТРАДУРАЛЬНАЯ (r. extraduralis) — см. *Гулеке операция*.

РАДИКУЛ- — см. *Радико-*.

РАДИКУЛАЛГИЯ (radiculalgia; *радикул-* + греч. algos боль) — боль, распространяющаяся в зоне иннервации корешка спинномозгового нерва.

РАДИКУЛИТ (radiculitis; *радикул-* + *-ит*) — воспаление корешков спинномозговых нервов; характеризуется болями и нарушениями чувствительности по корешковому типу, реже периферическими парезами.

Р. ДИСКОГЕННЫЙ (r. discogena) — Р. при остеохондрозе позвоночника, обусловленный раздражением и (или) сдавлением корешков спинномозговых нервов сместившимся межпозвоночным диском.

Р. КОМПРЕССИОННЫЙ (r. compressione) — Р., обусловленный сдавлением корешков спинномозговых нервов опухолью, остеофитом, сместившимся позвонком и др.

Р. ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ (r. lumbosacralis) — Р., локализующийся на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Р. САКРАЛЬНЫЙ (r. sacralis) — Р., локализующийся на уровне крестца.

Р. ШЕЙНО-ГРУДНОЙ (r. cervicothoracica) — Р., локализующийся на уровне нижнешейного и верхнегрудного отделов позвоночника.

РАДИКУЛО- — см. *Радико-*.

РАДИКУЛОНЕВРИТ (radiculoneuritis; *радикуло-* + *неврит*) — сочетанное поражение спинномозговых нервов и их корешков; проявляется болями и нарушением чувствительности по смешанному корешковому и невритическому типу, периферическими параличами или парезами.

РАДИО- (лат. radio излучать; radius палочка, радиус, луч) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к излучению», «относящийся к радиотехнике».

РАДИОАКТИВНАЯ МАСКА — изготовленный в виде маски или полумаски муляж, содержащий радиоактивные препараты и предназначенный для наложения на лицо больного с целью проведения лучевой терапии опухолей лицевой области.

РАДИОАКТИВНАЯ ТРУБОЧКА — приспособление для бета-терапии, представляющее собой запаянную металлическую трубку, в к-рую помещено радиоактивное вещество, что исключает его соприкосновение с тканями.

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (син. заражение радиоактивное) — наличие радиоактивных веществ в каких-либо средах и (или) на поверхности объектов окружающей среды и живых организмов в количествах, превышающих уровень естественной радиоактивности; термин применяется, если явление нежелательно с гигиенической точки зрения.

Р. З. СНИМАЕМОЕ — часть Р. з., к-рая удаляется с поверхности самопроизвольно (не считая радиоактивного распада) или в результате дезактивации обычно используемыми методами.

Р. З. ФИКСИРОВАННОЕ — часть Р. з., к-рая не удаляется с поверхности самопроизвольно (не считая радиоактивного распада) и остается после дезактивации обычно используемыми методами.

РАДИОАКТИВНОЕ ОБЛАКО — скопление взвешенных в атмосфере частиц, содержащих радиоактивные продукты ядерного взрыва.

РАДИОАКТИВНОСТЬ (*радио-* + активность) — свойство нек-рых нуклидов самопроизвольно превращаться в другие нуклиды с испусканием частиц и фотонов.

Р. ЕСТЕСТВЕННАЯ (син. Р. природная) — Р. нуклидов, встречающихся в природе.

Р. ИСКУССТВЕННАЯ — Р. нуклидов, полученных искусственно в результате ядерных реакций.

Р. НАВЕДЕННАЯ — искусственная Р., обусловленная ядерными реакциями, происходящими при облучении стабильных нуклидов.

Р. ПРИРОДНАЯ — см. *Радиоактивность естественная*.

РАДИОАКТИВНЫЕ АЭРОЗОЛИ — аэрозоли, дисперсная фаза к-рых содержит радионуклиды; при попадании внутрь организма или на поверхность кожи Р. а. могут вызывать радиационные поражения.

РАДИОАКТИВНЫЕ ГАЗЫ — радиоактивные вещества, находящиеся при обычных условиях температуры и давления в газообразном состоянии; могут вызывать радиационные поражения; нек-рые Р. г., напр. радон, применяются с диагностической и лечебной целью.

РАДИОАКТИВНЫЕ КОЛЛОИДЫ (син. радиоколлоиды) — радиофармацевтические препараты, содержащие меченные радионуклидами коллоидные частицы; используются для радиоизотопного исследования печени, селезенки, костного мозга и лимфатических узлов.

РАДИОАКТИВНЫЕ НИТИ — радиофармацевтический препарат, приготовленный в виде нитей, рассасывающихся в организме; Р. н. вводят в ткань опухоли или в ее ложе после оперативного вмешательства.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОСАДКИ — радиоактивные аэрозоли, образовавшиеся после ядерного взрыва или в результате выбросов предприятий и выпадающие из атмосферы.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ — отходы предприятий и учреждений (вентиляционные выбросы, сточные воды, использованное оборудование и материалы и др.), содержащие радиоактивные вещества в количествах, превышающих уровень естественной радиоактивности.

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — химические элементы, все изотопы к-рых радиоактивны.

РАДИОАКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЛИНЕЙНЫЙ — закрытый источник ионизирующего излучения, имеющий форму тонкого стержня или иглы.

РАДИОАКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ОБЪЕМНЫЙ — закрытый источник ионизирующего излучения, имеющий форму шара или близкую к ней (напр., бусины, гранулы).

РАДИОАЛЛЕРГОСОРБЕНТНЫЙ ТЕСТ (RAST) — полуколичественный метод определения IgE-антител в сыворотке крови, основанный на определении меченой анти-IgE-сыворотки, к-рая фиксируется на комплексе аллерген — IgE-антитело, полученном предварительно путем обработки аллергена исследуемой сывороткой крови.

РАДИОАУТОГРАФИЯ — см. *Ауторадиография*.

РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — общее название функциональных и органических изменений, развивающихся в организме в результате воздействия на него ионизирующего излучения.

РАДИОБИОЛОГИЯ (*радио-* + *биология*) — биологическая наука, изучающая действие ионизирующего излучения на живые организмы, их сообщества и биосферу в целом.

Р. КОСМИЧЕСКАЯ — раздел Р., изучающий биологическое действие космического излучения, в т. ч. в сочетании с другими факторами космического полета.

Р. МОЛЕКУЛЯРНАЯ — раздел Р., изучающий на молекулярном уровне радиохимические процессы в живых тканях.

РАДИОГЕПАТОГРАФИЯ — см. *Гепатография радиоизотопная*.

РАДИОГРАММА (*радио-* + греч. gramma запись) в радиологии — кривая, отображающая изменения во времени интенсивности излучения исследуемого органа или ткани после введения радиофармацевтического препарата, что обусловлено его перераспределением, распадом и выведением.

РАДИОГРАФИЯ (*радио-* + греч. graphō писать, изображать) в медицине — общее название методов исследования, основанных на графической регистрации изменений во времени интенсивности излучения органов и тканей после введения в организм радиофармацевтического препарата.

РАДИОДЕРМАТИТ (radiodermatitis; *радио-* + *дерматит*) — см. *Радиодермит*.

РАДИОДЕРМИТ (radiodermitis; *радио-* + греч. derma кожа + *ит*-; син.: радиодерматит, радиоэпидермит) — принятое в радиологии обозначение лучевого дерматита.

Р. БУЛЛЕЗНЫЙ (r. bullosa) — см. *Радиодермит влажный*.

Р. ВЛАЖНЫЙ (син.: Р. буллезный, Р. мокнущий, Р. эксфолиативный) — Р., характеризующийся покраснением, отечностью кожи и появлением на ней пузырьков с желтоватой серозной жидкостью; приводит к атрофии и депигментации кожи с развитием телеангиэктазий.

Р. МОКНУЩИЙ — см. *Радиодермит влажный.*

Р. СУХОЙ — Р., характеризующийся шелушением и отслаиванием эпидермиса, сухостью и пигментацией кожи, выпадением волос.

Р. ЭКСФОЛИАТИВНЫЙ (r. exfoliativa) — см. *Радиодермит влажный.*

РАДИОДУКТОГРАФИЯ (*радио-* + лат. ductus проток + греч. graphō писать, изображать; син. дукторадиография) — исследование проходимости протока какого-либо органа методом радиографии.

РАДИОЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО — стекло, содержащее соли свинца, предназначенное для защиты людей от воздействия ионизирующих излучений.

РАДИОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, в высокой степени поглощающие ионизирующее излучение и используемые при защите людей от воздействия ионизирующих излучений.

РАДИОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА (radioprotectiva; син.: противолучевые средства, радиопротекторы) — лекарственные средства, повышающие устойчивость организма к действию ионизирующего излучения и применяемые для профилактики радиационных поражений и лучевой болезни (напр., меркамина гидрохлорид, цистамина дигидрохлорид, мексамин, батилол).

РАДИОИЗОТОП (*радио-* + *изотоп*) — см. *Изотоп радиоактивный.*

РАДИОИЗОТОПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ в биологии и медицине — изучение строения и функций органов и тканей в норме и патологии с использованием радиоактивных изотопов и меченых соединений.

РАДИОИЗОТОПНЫЙ КОНТЕЙНЕР (син. защитный контейнер) — емкость, предназначенная для хранения и (или) транспортировки радионуклидов или радиофармацевтических препаратов; конструкция и материал, из к-рого изготовлен Р. к., обеспечивают снижение мощности дозы ионизирующего излучения до регламентированного уровня.

Р. К. РАБОЧИЙ — стационарный Р. к., предназначенный для хранения радиофармацевтических препаратов в радиологическом отделении.

Р. К. ТРАНСПОРТНЫЙ — Р. к., предназначенный для транспортировки радиофармацевтических препаратов и (или) радионуклидов.

РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ — методы исследования взаимодействия антитела с антигеном, при к-рых в один из компонентов вводят радиоактивную метку.

РАДИОИММУНОСОРБЕНТНЫЙ ТЕСТ (RIST) — метод определения концентрации иммуноглобулинов Е в сыворотке крови, основанный на их связывании соответствующими антителами, фиксированными на твердой основе, в условиях конкуренции с такими же иммуноглобулинами, несущими радиоактивную метку.

РАДИОИММУНОЭЛЕКТРОФОРЕЗ (*радио-* + *иммуноэлектрофорез*) — иммуноэлектрофорез с использованием антител, в к-рые введена радиоактивная метка.

РАДИОИНДИКАЦИЯ (*радио-* + *индикация*) — см. *Диагностика радиоизотопная.*

РАДИОКАПСУЛА (*радио-* + *капсула*; син.: датчик кишечный, радиопилюля) — прибор для исследования органов пищеварительного тракта путем непосредственного измерения в их просвете нек-рых показателей (температура, pH, давление и др.) и передачи результатов по радио; представляет собой заглатываемый обследуемым миниатюрный радиопередатчик, совмещенный с соответствующими датчиками.

РАДИОКАРДИОГРАФИЯ (*радио-* + *кардиография*; син. кардиография радиоизотопная) — метод исследования сердечной деятельности, основанный на графической регистрации изменений концентрации радиофармацевтического препарата в крови, протекающей через какую-либо полость сердца; позволяет определить многие количественные показатели гемодинамики раздельно правого и левого желудочков сердца.

РАДИОКАРДИОЦИРКУЛОГРАФИЯ (*радиокардиография* + *циркулография*) — метод исследования гемодинамики, основанный на одновременной графической регистрации изменений концентрации радиофармацевтического препарата в крови, протекающей через какую-либо полость сердца и какой-либо периферический кровеносный сосуд.

РАДИОКОЛЛОИДЫ (*радио-* + *коллоиды*) — см. *Радиоактивные коллоиды.*

РАДИОКСЕНОМЕТР (*радио-* + ксенон + греч. metreō измерять) — радиометр для измерения активности радиоактивного ксенона, введенного в организм с диагностической целью.

РАДИОЛИЗ (*радио-* + греч. lysis разложение, распад) — распад сложных веществ на более простые под действием ионизирующего излучения.

РАДИОЛИМФАДЕНОГРАФИЯ (*радио-* + *лимфа* + греч. adēn железа + graphō писать, изображать) — радиоизотопное исследование лимфатических узлов, основанное на избирательном накоплении ими радиоактивных веществ.

РАДИОЛИМФОГРАФИЯ (*радио-* + *лимфография*) — см. *Лимфография радиоизотопная.*

РАДИОЛОГ (*радио-* + греч. logos учение, наука) — врач-специалист, получивший подготовку в области медицинской радиологии и лучевой терапии.

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА — см. *Противолучевая защита.*

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР (син. радиоманипулятор) — устройство, состоящее из защитного экрана и дистанционного инструмента; предназначено для безопасной работы с веществами, материалами и изделиями, являющимися источниками ионизирующего излучения.

РАДИОЛОГИЯ ВОЕННАЯ (*радио-* + греч. logos учение, наука) — раздел военной медицины и медицинской радиологии, изучающий особенности радиационных поражений, вызываемых ядерным (термоядерным) оружием и разрабатывающий методы и средства диагностики, лечения и профилактики боевых радиационных поражений.

РАДИОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ — область медицины, изучающая действие ионизирующего излучения на организм человека, разрабатывающая методы его применения с лечебной или диагностической целью, а также вопросы противолучевой защиты и радиационной гигиены.

РАДИОМАНИПУЛЯТОР — см. *Радиологический манипулятор.*

РАДИОМАНИПУЛЯЦИОННАЯ — помещение радиологического отделения, оборудованное радиологическими манипуляторами и предназначенное для расфасовки с их помощью радиофармацевтических препаратов и подготовки их к дальнейшему использованию (изготовление растворов, мазей и т. п.).

РАДИОМАНИПУЛЯЦИОННЫЙ СТОЛ — стол, предназначенный для выполнения на нем работ с радиоактивными веществами; конструкция Р. с. призвана обеспечить безопасность персонала.

РАДИОМЕТР (*радио-* + греч. metreō измерять) в радиологии — общее название приборов для измерения плотности потоков ионизирующего излучения, активности радиоактивных веществ, концентрации радионуклидов в различных средах и уровней радиоактивного загрязнения поверхностей.

Р. КЛИНИЧЕСКИЙ — Р., предназначенный для измерения активности радиоактивных веществ, введенных в организм с диагностической или терапевтической целью.

РАДИОМЕТР ИНФРАКРАСНЫЙ (*радио-* + греч. metreō измерять; син. термометр излучения) — прибор для измерения температуры поверхности объекта по величине его инфракрасного излучения; применяется в гигиенических и медико-биологических исследованиях.

РАДИОМЕТРИЯ (*радио-* + греч. metreō измерять) — 1) совокупность методов измерения активности радиоактивных веществ; 2) совокупность методов измерения энергии любого излучения.

РАДИОМИМЕТИКИ (radiomimetica; *радио-* + греч. mimētikos способный к подражанию, воспроизводящий) — см. *Радиомиметические вещества.*

РАДИОМИМЕТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (radiomimetica; *радио-* + греч. mimētikos способный к подражанию, воспроизводящий; син. радиомиметики) — химические соединения, вызывающие в живых организмах изменения, сходные с теми, к-рые возникают после воздействия ионизирующего излучения; к Р. в. относятся, напр., нек-рые лекарственные средства (новэмбихин, допан и др.).

РАДИОНЕКРОЗ (radionecrosis; *радио-* + *некроз*) — см. *Некроз лучевой.*

РАДИОНУКЛИД — общее название любых радиоактивных атомов; нек-рые Р. используются для радиоизотопной диагностики и лучевой терапии.

РАДИОПИЛЮЛЯ (*радио-* + *пилюля*) — см. *Радиокапсула.*

РАДИОПНЕВМОГРАФИЯ (*радио-* + *пневмография*) — см. *Радиопульмонография.*

РАДИОПОРТОГРАФИЯ ВНУТРИВЕННАЯ (*радио-* + *портография*) — см. *Спленопортография радиоизотопная.*

РАДИОПРОТЕКТОРЫ (*радио-* + лат. protector защитник) — см. *Радиозащитные средства.*

РАДИОПРОЦЕДУРНАЯ — помещение радиологического отделения, в к-ром больным вводят радиофармацевтические препараты.

РАДИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (*радио-* + *пульмонография*; син.: пульморадиография, радиопневмография, радиоспирография, радиоторакография

— нрк, спирорадиография) — общее название радиографических методов исследования легочной вентиляции и жизненной емкости легких, основанных на использовании для дыхания воздушно-ксеноновой смеси, содержащей радиоактивный ксенон.

РАДИОПУНКТУ́РА (устар.; *радио-* + лат. pungo, punctum колоть, прокалывать) — способ внутритканевой гаммa-терапии, основанный на использовании радионосных игл.

РАДИОРЕЗИСТЕ́НТНОСТЬ (*радио-* + *резистентность*; син. радиоустойчивость) — устойчивость организма, его органов, тканей и клеток к воздействию ионизирующего излучения.

РАДИОРЕНОГРАФИ́Я (*радио-* + *ренография*) — см. *Ренография радиоизотопная.*

РАДИОРЕФЛЕКСО́МЕТР (*радио-* + *рефлекс* + греч. metreō измерять) — прибор для дистанционного измерения скорости рефлекторных реакций с передачей информации по радио.

РАДИОСЕНСИБИЛИЗА́ТОРЫ — см. *Радиосенсибилизирующие средства.*

РАДИОСЕНСИБИЛИЗА́ЦИЯ (radiosensibilisatio; *радио-* + *сенсибилизация*) — повышение чувствительности организма, отдельных клеток или тканей к действию ионизирующего излучения, вызываемое предшествующим облучению воздействием внешних (физических, химических) факторов.

РАДИОСЕНСИБИЛИЗИ́РУЮЩИЕ СРЕ́ДСТВА (син. радиосенсибилизаторы) — факторы физической или химической природы, вызывающие радиосенсибилизацию, используемые в онкологии.

РАДИОСПЕКТРОСКОПИ́Я (*радио-* + спектр + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — общее название методов определения веществ по спектрам поглощения ими электромагнитного излучения в радиодиапазоне.

РАДИОСПИРОГРАФИ́Я (*радио-* + *спирография*) — см. *Радиопульмонография.*

РАДИОСФИГМОТАХО́МЕТР (*радио-* + греч. sphygmos пульс + tachos скорость + metreō измерять) — прибор для дистанционного измерения частоты артериального пульса с передачей информации по радио.

РАДИОСЦИНТИГРАФИ́Я (*радио-* + *сцинтиграфия*) — см. *Сцинтиграфия.*

РАДИОСЦИНТИСКОПИ́Я (истор.; *радио-* + *сцинтископия*) — см. *Сцинтископия.*

РАДИОСЦИНТИФОТОГРАФИ́Я (*радио-* + *сцинтифотография*) — сцинтископия с фотографированием полученного изображения.

РАДИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ ИНТЕРВА́Л (син. терапевтический интервал радиочувствительности) — разница в радиочувствительности нормальных и опухолевых клеток и тканей; используется при лучевой терапии для уничтожения опухолевых тканей при сохранении окружающих нормальных тканей.

РАДИОТЕРАПИ́Я (*радио-* + *терапия*) — см. *Терапия лучевая.*

РАДИОТИРЕОГРАФИ́Я (*радио-* + *тиреография*) — см. *Тиреография радиоизотопная.*

РАДИОТОКСИКОЛО́ГИЯ (*радио-* + *токсикология*) — см. *Токсикология радиационная.*

РАДИОТОКСИ́НЫ (*радио-* + *токсин*) — низкомолекулярные биологически активные вещества, образующиеся в организме в результате воздействия ионизирующего излучения и участвующие в формировании лучевых поражений.

РАДИОТОРАКОГРАФИ́Я (нрк; *радио-* + греч. thōrax, thōrakos грудь, грудная клетка + graphō писать, изображать) — см. *Радиопульмонография.*

РАДИОУСТО́ЙЧИВОСТЬ — см. *Радиорезистентность.*

РАДИОФОТО́ГРАФ — см. *Флюорограф.*

РАДИОФОТОГРАФИ́Я — см. *Флюорография.*

РАДИОХИРУРГИ́Я (*радио-* + *хирургия*) — метод лечения злокачественных опухолей, основанный на использовании лучевой терапии в сочетании с оперативным вмешательством.

РАДИОХОЛЕЦИСТОГРАФИ́Я (*радио-* + *холецистография*) — см. *Холецистография радиоизотопная.*

РАДИОХРОМАТОГРАФИ́Я (*радио-* + *хроматография*) — хроматография, при к-рой разделению подвергают радиоактивные элементы или вещества, содержащие радиоактивную метку.

РАДИОЦИРКУЛОГРАФИ́Я (*радио-* + лат. circulus круг + греч. graphō писать, изображать; син. циркулография) — общее название радиографических методов исследования гемодинамики.

РАДИОЦИРКУЛОГРАФИ́Я СПЛЕНОПОРТА́ЛЬНАЯ — см. *Спленопортография радиоизотопная.*

РАДИОЧУВСТВИ́ТЕЛЬНОСТЬ — чувствительность организма, его органов, тканей и клеток к воздействию ионизирующего излучения.

Р. ВИДОВА́Я — Р., обусловленная принадлежностью особи к определенному биологическому виду.

Р. ВОЗРАСТНА́Я — Р., обусловленная возрастом особи; Р. в. особенно высока в период роста организма и дифференцировки его систем.

Р. ГЕНЕТИ́ЧЕСКАЯ — Р., выражаемая числом мутаций, индуцируемых дозой в 1 *рад* за одно поколение в расчете на один геном.

Р. ИНДИВИДУА́ЛЬНАЯ — Р., обусловленная индивидуальными свойствами особи.

Р. ПОЛОВА́Я — Р., обусловленная половой принадлежностью особи.

Р. ТКАНЕВА́Я — Р. ткани, обусловленная особенностями ее строения; высокая Р. т. присуща малодифференцированным тканям, в т. ч. опухолевым.

РАДИОЭКОЛО́ГИЯ (*радио-* + *экология*) — см. *Экология радиационная.*

РАДИОЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИ́Я (*радио-* + *электрокардиография*) — см. *Телеэлектрокардиография.*

РАДИОЭПИДЕРМИ́Т (radioepidermitis; *радио-* + *эпидермис* + *-ит*) — см. *Радиодермит.*

РАДИОЭПИТЕЛИ́ИТ (radioepithelіitis; *радио-* + *эпителиит*; син. эпителиит лучевой) — поражение слизистой оболочки в результате воздействия ионизирующего излучения; характеризуется резко выраженной гиперемией, отечностью и образованием эрозий.

РА́ДИУС КАЧА́НИЯ (лат. radius луч) — см. *Радиус ротации.*

РА́ДИУС РОТА́ЦИИ (син. радиус качания) — радиус окружности, описываемой источником ионизирующего излучения вокруг облучаемого объекта при круговом облучении.

РАДО́Н (Radonum; Rn; син. эманация радия) — радиоактивный химический элемент VIII группы периодической системы Д. И. Менделеева; атомный номер 86, атомная масса 222, относится к инертным газам; изотоп ^{222}Rn с периодом полураспада 3,823 суток используется в общей альфа-терапии.

РАДОНОТЕРАПИ́Я (радон + *терапия*) — метод лечения, заключающийся в воздействии на организм радона (и его дочерних продуктов); применяется обычно в виде ванн, питья, ингаляции или орошения.

РА́ДУЖКА (iris, PNA, BNA, JNA; син. радужная оболочка) — передняя часть сосудистой оболочки глазного яблока, расположенная впереди хрусталика и разделяющая переднюю и заднюю камеры глаза; содержит циркулярно и радиально расположенные гладкие мышечные клетки, сокращение к-рых изменяет величину зрачка.

РА́ДУЖКА «БОМБИ́РОВАННАЯ» — см. *Iris bombé.*

РА́ДУЖНАЯ ОБОЛО́ЧКА (iris) — см. *Радужка.*

РА́ДУЖНО-РОГОВИ́ЧНЫЙ У́ГОЛ (angulus iridocornealis, PNA, JNA; angulus iridis, BNA; син.: камерный угол, угол передней камеры) — периферическая часть передней камеры глаза, заключенная между местом перехода роговицы в склеру и ресничным краем радужки.

РА́ДУЖНЫЕ КРУГИ́ — цветные круги, видимые вокруг источника света; признак повышенного внутриглазного давления.

РАЗБАВИ́ТЕЛЬ — см. *Наполнитель.*

РАЗВРА́ТНЫЕ ДЕ́ЙСТВИЯ — действия по отношению к малолетнему или несовершеннолетнему, представляющие собой удовлетворение полового влечения в извращенной форме, т. е. без полового акта.

РАЗГИБА́НИЕ (extensio; син. экстензия) — движение в суставе, приводящее к увеличению угла между сочлененными сегментами конечности.

РАЗГИБА́ТЕЛЬ (-И) (extensor, PNA; син. экстензор) — мышца, при сокращении к-рой происходит разгибание в каком-либо суставе.

Р. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ ДЛИ́ННЫЙ (musculus extensor pollicis longus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *477.*

Р. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ КОРО́ТКИЙ (musculus extensor pollicis brevis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *476.*

Р. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ МА́ЛЫЙ (musculus extensor pollicis minor) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *476.*

Р. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА СТОПЫ́ ДЛИ́ННЫЙ (musculus extensor hallucis longus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *473.*

Р. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА СТОПЫ́ КОРО́ТКИЙ (musculus extensor hallucis brevis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *472.*

Р. ЗАПЯ́СТЬЯ ЛОКТЕВО́Й (musculus extensor carpi ulnaris, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *461.*

Р. ЗАПЯ́СТЬЯ ЛУЧЕВО́Й ДЛИ́ННЫЙ (musculus extensor carpi radia-

lis longus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *459*.
Р. ЗАПЯСТЬЯ ЛУЧЕВО́Й КОРО́ТКИЙ (musculus extensor carpi radialis brevis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *458*.
Р. МИЗИ́НЦА (musculus extensor digiti minimi, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *462*.
Р. V ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ СО́БСТВЕННЫЙ (musculus extensor digiti quinti proprius, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *462*.
Р. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ (musculus extensor digitorum manus, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *468*.
Р. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ ГЛУБО́КИЙ (musculus extensor digitorum manus profundus) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *474*.
Р. ПА́ЛЬЦЕВ ЛУЧЕВО́Й (musculus extensor digitorum radialis) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *468*.
Р. ПА́ЛЬЦЕВ О́БЩИЙ (musculus extensor digitorum communis, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *468*.
Р. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ ДЛИ́ННЫЙ (musculus extensor digitorum longus pedis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *467*.
Р. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ ДЛИ́ННЫЙ О́БЩИЙ (musculus extensor digitorum communis longus pedis) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *467*.
Р. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ КОРО́ТКИЙ (musculus extensor digitorum brevis pedis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *464*.
Р. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ (musculus extensor digitorum pedis sublimis) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *467*.
Р. УКАЗА́ТЕЛЬНОГО ПА́ЛЬЦА (musculus extensor indicis, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *474*.
Р. УКАЗА́ТЕЛЬНОГО ПА́ЛЬЦА СО́БСТВЕННЫЙ (musculus extensor indicis proprius, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *474*.

РАЗДА́ВЛЕННАЯ КА́ПЛЯ — препарат для витальной микроскопии микроорганизмов, приготовляемый путем помещения капли их взвеси между предметным и покровным стеклами.

РАЗДВОЕ́НИЕ СОЗНА́НИЯ — см. *Сознание альтернирующее*.

РАЗДЕЛИ́ТЕЛЬ ПОЛЕ́Й ЗРЕ́НИЯ — прибор для раздельного рассматривания парных изображений правым и левым глазом; применяется для диагностики и ортоптического лечения косоглазия.

РАЗДЕЛЯ́ЮЩАЯ ПОЛО́СКА (stria separans) — см. *Разделяющий канатик*.

РАЗДЕЛЯ́ЮЩИЙ КАНА́ТИК (funiculus separans, PNA; син. разделяющая полоска) — тяж из нейроглии, расположенный в нижней части ромбовидной ямки, отделяющий треугольник блуждающего нерва от самого заднего поля (area postrema).

РАЗДО́ЛЬСКОГО СИМПТО́М (И. Я. Раздольский, 1890—1962, сов. невропатолог) — 1) см. *Симптом ликворного толчка*; 2) см. *Симптом остистого отростка*; 3) см. *Симптом отведения бедра*.

РАЗДРАЖА́ЮЩИЕ СРЕ́ДСТВА (irritantia; син. отвлекающие средства) — лекарственные средства, оказывающие местное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки; применяются при лечении воспалительных процессов, а также с целью ослабления болевых ощущений (масло терпентинное очищенное, раствор аммиака, ментол и др.).

РАЗДРАЖЕ́НИЕ — воздействие факторов окружающей или внутренней среды (раздражителей) на органы и ткани.
Р. ДИСКРЕ́ТНОЕ (лат. discretus раздельный, прерывистый) — Р., повторяющееся с определенной частотой.
Р. ИНДИСКРЕ́ТНОЕ (лат. отрицательная приставка in- + discretus раздельный, прерывистый) — Р., происходящее непрерывно на протяжении какого-то отрезка времени.
Р. КОНДИЦИОНИ́РУЮЩЕЕ (син. Р. обусловливающее) — Р., приводящее к изменениям функционального состояния тканей, определяемого последующим тестирующим раздражением.
Р. НЕПРЯМО́Е — Р. возбудимых тканей через иннервирующий их нерв.
Р. ОБУСЛО́ВЛИВАЮЩЕЕ — см. *Раздражение кондиционирующее*.
Р. ПРЯМО́Е — Р. в виде непосредственного воздействия раздражителя на возбудимую ткань.
Р. ТЕСТИ́РУЮЩЕЕ — Р., способствующее выявлению изменений функционального состояния, вызванных предшествующим (кондиционирующим) раздражением.

РАЗДРАЖИ́МОСТЬ — присущая живым объектам способность отвечать на воздействие факторов окружающей или внутренней среды изменением своего состояния или деятельности.

РАЗДРАЖИ́ТЕЛЬ — фактор окружающей или внутренней среды, изменяющий состояние возбудимых структур.
Р. АДЕКВА́ТНЫЙ — см. *Раздражитель специфический*.
Р. БЕЗУСЛО́ВНЫЙ — Р., вызывающий безусловный рефлекс.
Р. БОЛЕВО́Й (син. Р. ноцицептивный) — специфический Р., вызывающий ощущение боли.
Р. ВКУСОВО́Й — специфический Р., вызывающий вкусовые ощущения.
Р. ЗВУКОВО́Й — специфический Р., вызывающий звуковые ощущения.
Р. ИНТЕРОЦЕПТИ́ВНЫЙ — специфический Р. интероцепторов.
Р. НАДПОРО́ГОВЫЙ — Р., величина к-рого превышает величину порогового Р.
Р. НЕАДЕКВА́ТНЫЙ — см. *Раздражитель неспецифический*.
Р. НЕСПЕЦИФИ́ЧЕСКИЙ (син. Р. неадекватный) — Р., действующий на биологическую структуру, специально не приспособленную для его восприятия.
Р. НОЦИЦЕПТИ́ВНЫЙ — см. *Раздражитель болевой*.
Р. ОБОНЯ́ТЕЛЬНЫЙ — специфический Р., вызывающий ощущение запаха.
Р. ОБСТАНО́ВОЧНЫЙ — неспецифический Р., оказывающий влияние на взаимодействие специфического Р. и соответствующей биологической структуры.
Р. ОПТИМА́ЛЬНЫЙ — Р., величина к-рого достаточна для возникновения максимальной ответной реакции возбудимой ткани.
Р. ПАТОГЕ́ННЫЙ — см. *Раздражитель патологический*.
Р. ПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ (син. Р. патогенный) — Р., вызывающий повреждение структур тканей и нарушение функций органов или систем организма; является причиной возникновения патологического процесса и болезни.
Р. ПОДПОРО́ГОВЫЙ — Р., величина к-рого ниже величины порогового Р.
Р. ПОРО́ГОВЫЙ — Р., величина к-рого достаточна, чтобы вызвать минимальную реакцию, изучаемую в пределах данного метода.
Р. ПРОПРИОЦЕПТИ́ВНЫЙ — специфический Р. проприоцепторов.
Р. СИГНА́ЛЬНЫЙ — см. *Раздражитель условный*.
Р. СПЕЦИФИ́ЧЕСКИЙ (син. Р. адекватный) — Р., действующий на биологическую структуру (рецептор), специально приспособленную для взаимодействия с ним.
Р. ТАКТИ́ЛЬНЫЙ — специфический Р. тактильных рецепторов.
Р. УСЛО́ВНЫЙ (син. Р. сигнальный) — Р., вызывающий возникновение условного рефлекса.
Р. ЧРЕЗВЫЧА́ЙНЫЙ — Р., воздействие к-рого вызывает мобилизацию защитно-приспособительных механизмов, но, как правило, не приводит к возникновению болезни.
Р. ЭКСТЕРОЦЕПТИ́ВНЫЙ — специфический Р. экстероцепторов.

РАЗДРАЖИ́ТЕЛЬНАЯ СЛА́БОСТЬ — психопатологический синдром, характеризующийся сочетанием аффективной лабильности и раздражительности со снижением работоспособности, ослаблением концентрации внимания и повышенной утомляемостью.

РАЗДРАЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ (erethismus) — склонность несоразмерно реагировать на обыденные раздражители, выражая в словах и поступках недовольство и неприязнь к окружающим.

РАЗЖИЖЕ́НИЕ СТЕКЛОВИ́ДНОГО ТЕ́ЛА (synchysis corporis vitrei) — патологическое изменение стекловидного тела глаза, при к-ром оно приобретает жидкую консистенцию; обусловлено разрушением его фибриллярной структуры.

РАЗЛОЖЕ́НИЕ тканей — разрушение молекулярной структуры тканей, происходящее после прекращения их жизнедеятельности и обусловленное процессами аутолиза и (или) гниения.

РАЗМИ́НКА — выполнение комплекса физических упражнений непосредственно перед тренировочным занятием или спортивным стартом для подготовки организма к предстоящим повышенным физическим нагрузкам.

РАЗМНОЖЕ́НИЕ (син. репродукция) — присущее всем организмам свойство воспроизводить себе подобные особи, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни.
Р. БЕСПО́ЛОЕ — Р., осуществляемое без участия половых клеток и характеризующееся наличием единственной родительской формы.
Р. ВЕГЕТАТИ́ВНОЕ — бесполое Р. путем образования новой особи из части материнского организма.
Р. ДЕ́ВСТВЕННОЕ — см. *Партеногенез*.
Р. ПОЛОВО́Е — Р., осуществляющееся путем слияния женской и муж-

ской половых клеток (гамет) с образованием зиготы, из к-рой развивается новая особь.

РАЗМОЗЖЕ́НИЕ (conquassatio) — обширное разрушение тканей с утратой ими жизнеспособности, возникающее в результате грубого механического воздействия.

РАЗМЯГЧЕ́НИЕ МО́ЗГА (malacia cerebri) — см. *Энцефаломаляция.*

РАЗМЯГЧЕ́НИЕ МЫ́ШЦ (myomalacia)— см. *Миомаляция.*

РАЗНОВИ́ДНОСТЬ (varietas) в биологии — совокупность особей какого-либо биологического вида, отличающихся от других особей того же вида устойчивым однородным отклонением нек-рых морфологических, физиологических и (или) экологических признаков.

РАЗО́РВАННОСТЬ РЕ́ЧИ — расстройство речи, характеризующееся нарушением или отсутствием в ней смысловых и грамматических связей, наличием неологизмов и деформированных слов.

РАЗРЕЖЕ́НИЕ КО́СТИ (osteoporosis) — см. *Остеопороз.*

РАЗРЕ́З (incisio) — рассечение кожи или слизистой оболочки и подлежащих мягких тканей для доступа к определенной анатомической области в ходе хирургической операции или для вскрытия очага воспалительного процесса (абсцесса и др.).

Р. АРБАЛЕ́ТНЫЙ — Р. кожи при трепанации задней черепной ямки, дугообразная часть к-рого соединяет сосцевидные отростки, проходя на 1,5—2 *см* выше наружного затылочного выступа, а вертикальная часть проходит по средней линии от вершины дугообразной части до остистого отростка V или VI шейного позвонка.

Р. БАРЬЕ́РНЫЙ — Р. кожи и подкожной клетчатки, проводимый в непораженных тканях с целью преграждения пути распространения анаэробной инфекции или подкожной эмфиземы.

Р. ЛАМПА́СНЫЙ — длинный продольный Р. кожи наружной поверхности бедра, производимый гл. обр. при лечении анаэробной инфекции.

Р. ПОЛУАРБАЛЕ́ТНЫЙ — Р. кожи при доступе к мостомозжечковому углу и полушарию мозжечка, отличающийся от арбалетного Р. тем, что дугообразную его часть выполняют лишь с одной стороны затылочной области — от сосцевидного отростка до средней линии.

Р. ПО́СЛАБЛЯЮЩИЙ (i. relaxans) — 1) Р., проводимый параллельно зашиваемой ране, уменьшающий натяжение тканей и облегчающий сближение ее краев; 2) Р., проводимый через воспаленные ткани, уменьшающий их сдавление, обусловленное отеком.

Р. ПОЯСНИ́ЧНЫЙ ПО ФЁДОРОВУ — см. *Федорова поясничный разрез.*

Р. ТОРАКОАБДОМИНА́ЛЬНЫЙ (i. thoracoabdominalis) — см. *Рейффершейда доступ.*

РАЗРЕША́ЮЩИЙ ФА́КТОР — аллерген, действие к-рого на сенсибилизированный организм вызывает видимые проявления аллергии.

РАЗРЫ́В (ruptura; син. руптура) — закрытая травма органа или ткани с нарушением целости соответствующего анатомического образования, вызванная чрезмерным его растяжением, при сдавлении, ударе или связанная с развитием в нем патологического процесса.

Р. ЖЁЛТОГО ТЕ́ЛА (r. corporis lutei) — см. *Апоплексия яичника.*

Р. КАПСУЛЯ́РНЫЙ (r. capsularis) — Р. паренхиматозного органа с нарушением целости его капсулы.

Р. МА́ТКИ (r. uteri) — см. *Гистерорексис.*

Р. СУБКАПСУЛЯ́РНЫЙ (r. subcapsularis) — Р. паренхимы органа без нарушения целости его капсулы.

Р. ЯИ́ЧНИКА (r. ovarii) — см. *Апоплексия яичника.*

РАЗРЫ́В МЕЖЖЕЛУ́ДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРО́ДКИ (ruptura septi interventricularis) — образование сквозного дефекта в межжелудочковой перегородке, измененной в результате инфаркта миокарда; характеризуется выраженным артериовенозным сбросом и острой правожелудочковой недостаточностью.

РАЗРЫ́В ПРОМЕ́ЖНОСТИ (ruptura perinei) в акушерстве — осложнение родов: нарушение целости тканей промежности с повреждением стенок влагалища, иногда и прямой кишки.

РАЗРЫ́В СЕ́РДЦА (ruptura cordis, cardiorrhexis; син.: кардиорексис, разрыв сердца внешний) — образование сквозного дефекта в стенке сердца при трансмуральном инфаркте миокарда.

РАЗРЫ́В СЕ́РДЦА ВНЕ́ШНИЙ (ruptura cordis externa) — см. *Разрыв сердца.*

РАЗРЫ́В СЕ́РДЦА ВНУ́ТРЕННИЙ (ruptura cordis interna) — нарушение целости внутриполостных элементов стенки сердца (межжелудочковой перегородки, сосочковых мышц) в связи с их некрозом и миомаляцией.

РАЗЪЕ́ДЕННЫЕ ЛАКУ́НЫ (lacunae erosionis, LNH; син. гаушиповы лакуны) — углубления на поверхности кости, возникающие при ее внутренней перестройке в процессе развития.

РА́ЙЛИ ВИ́РУС (V. Riley) — см. *Вирус лактатдегидрогеназы мышей.*

РА́ЙЛИ — ДЕ́Я СЕМЕ́ЙНАЯ ВЕГЕТАТИ́ВНАЯ ДИСФУ́НКЦИЯ (C. M. Riley, амер. педиатр 20 в.; R. L. Day, амер. врач 20 в.) — см. *Райли — Дея синдром.*

РА́ЙЛИ — ДЕ́Я СИНДРО́М (C. M. Riley; R. L. Day; син. Райли — Дея семейная вегетативная дисфункция) — наследственный синдром: сочетание гиперсаливации, пониженного слезоотделения, эритемы, психической лабильности, гипорефлексии и пониженной болевой чувствительности; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

РАЙМИ́СТА СИМПТО́М (Я. М. Раймист) — непроизвольное приведение или отведение паретичной ноги при попытке произвести то же движение здоровой ногой, сдерживаемой рукой исследующего; патологическая синкинезия, наблюдаемая в период восстановления функций при гемиплегии.

РАЙМО́НА ПРИ́ЗНАК (F. Raymond, 1844—1910, франц. невропатолог) — приступообразное побледнение или цианоз конечностей, особенно пальцев, возникающие при переохлаждении или эмоциональном возбуждении; наблюдается при болезни Рейно.

РАЙМО́НА — СЕСТА́НА СИНДРО́М (F. Raymond, 1844—1910, франц. невропатолог; M. R. Cestan, 1872—1932, франц. невропатолог) — понтинный альтернирующий синдром: сочетание пареза взора в сторону патологического очага, атаксии и хореоатетоза на той же стороне с гемипарезом и гемигипестезией на противоположной стороне.

РА́ЙТА МЕ́ТОД ОКРА́СКИ (J. H. Wright, 1871—1928, амер. патолог) — метод быстрой окраски мазков крови с использованием краски, изготовленной из метиленового синего и эозина; при этом ядра окрашиваются в вишнево-красный цвет и выявляется азурофильная зернистость.

РА́ЙТА РЕА́КЦИЯ (A. E. Wright, 1861—1947, англ. бактериолог и инфекционист) — реакция агглютинации бруцелл (убитых нагреванием) сывороткой крови больного бруцеллезом.

РА́ЙТА СИНДРО́М (I. S. Wright, род. в 1901 г., амер. врач; син. синдром малой грудной мышцы) — сочетание боли в области малой грудной мышцы с акропарестезией, побледнением и трофическими расстройствами кисти и пальцев, наблюдающееся при сдавлении сосудов подмышечной области и нервных стволов плечевого сплетения.

РА́ЙТМАНА — ФРЕ́НКЕЛЯ МЕ́ТОД (S. Reitman; S. Frankel) — метод определения аланин- или аспартат-трансферазы по катализируемому ими образованию пировиноградной кислоты в смеси d-кетоглутаровой к-ты и аланина или аспарагиновой кислоты (во втором случае — после добавления анилин-цитрата); количественное определение пировиноградной кислоты производят путем колориметрии окрашенного производного ее реакции с динитрофенилгидразином; применяется, напр., при диагностике инфаркта миокарда, вирусных гепатитов.

РАЙЦЕРАПИ́Я (истор.; нем. Reiz возбуждение, раздражение + *терапия*) — общее название лечебных мероприятий, применявшихся с целью повышения защитно-приспособительных реакций организма при ареактивных формах хронических болезней, напр. парентеральное введение белка, применение раздражающих средств.

РАК (carcinoma, cancer; син.: карцинома, эпителиома злокачественная) — злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиальной ткани.

Р. АЛЬВЕОЛЯ́РНО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ (c. alveolocellulare; син.: аденоматоз легких, опухоль альвеолярно-клеточная, опухоль легкого цистопапиллярная, Р. бронхиолоальвеолярный) — Р., развивающийся из эпителия терминальных отделов бронхиол.

Р. АНАПЛАЗИ́РОВАННЫЙ (c. anaplasticum) — см. *Рак недифференцированный.*

Р. АНИЛИ́НОВЫЙ (устар.) — профессиональный Р. мочевого пузыря, — последствие систематического контакта с онкогенными аминами, напр. анилиновыми красителями.

Р. БАЗА́ЛЬНО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ (c. basocellulare) — см. *Базалиома.*

Р. БЕТЕ́ЛЕВЫЙ— Р. слизистой оболочки полости рта, возникающий в результате систематического жевания бетеля.

Р. БЛЮДЦЕОБРА́ЗНЫЙ — Р. желудка с обширным изъязвлением в центре и с краями, приподнятыми за счет сохранившейся по периферии опухолевой ткани и отека слизистой оболочки.

Р. БРАНХИОГЕ́ННЫЙ (с. branchiogenum) — см. *Опухоль бранхиогенная.*

Р. БРИКЕ́ТЧИКОВ — профессиональный Р. кожи, вызванный длительным контактом с онкогенными углеводородами из состава угольной пыли и пека при изготовлении отопительных брикетов.

Р. БРОНХИОЛОАЛЬВЕОЛЯ́РНЫЙ (с. bronchioloalveolare) — см. *Рак альвеолярно-клеточный.*

Р. ВНУТРИЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЙ (с. intraepitheliale) — см. *Carcinoma in situ.*

Р. ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННЫЙ (син. Р. дифференцированный) — Р., морфологически сходный с нормальной тканью, послужившей источником его возникновения.

Р. ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯ́РНЫЙ (с. hepatocellulare) — см. *Рак печеночно-клеточный.*

Р. ГИГАНТОКЛЕ́ТОЧНЫЙ (с. gigantocellulare) — недифференцированный Р., характеризующийся преобладанием в опухоли очень крупных, нередко многоядерных клеток.

Р. ГОРМОНА́ЛЬНО-ЗАВИСИМЫЙ — Р., сохранивший чувствительность к гормонам.

Р. ГРАНУЛИ́РУЮЩИЙ (с. granulosum) — Р. желудка, морфологически характеризующийся сочетанием опухолевого роста по типу фиброзного рака с реактивным разрастанием грануляционной ткани.

Р. ГРИБОВИ́ДНЫЙ (с. fungosum; син. Р. фунгозный) — Р. желудка со значительным выступанием опухолевого узла над уровнем слизистой оболочки, с к-рой он связан более тонкой «ножкой».

Р. ДЕГТЯ́РНЫЙ — Р. кожи, вызванный длительным контактом с каменноугольным дегтем или другой онкогенной смолой.

Р. ДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННЫЙ — см. *Рак высокодифференцированный.*

Р. ДХО́ТИ — Р. кожи в области правой верхней передней подвздошной ости у мужчин в Индии, связанный, вероятно, с обычаем носить набедренную повязку (дхоти), узел к-рой постоянно раздражает кожу в этой области тела.

Р. ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ (с. adenomatosum) — см. *Аденокарцинома.*

Р. ЖЕЛУ́ДКА ДИФФУ́ЗНЫЙ (с. ventriculi diffusum; син. линит пластический — устар.) — Р. желудка с диффузным распространением опухоли, интенсивным развитием фиброзной стромы, уплотнением и сморщиванием стенки желудка.

Р. ИНТРАДУКТА́ЛЬНЫЙ (с. intraductale) — см. *Рак угревидный.*

Р. КА́НГРИ (англ. kangri burncarcinoma) — Р. кожи передней брюшной стенки у жителей Гималаев, возникающий в связи с многократными ожогами от горшков с горячими углями (кангри), к-рые подвязывают к животу для согревания тела.

Р. КОЛЛО́ИДНЫЙ (с. colloidale) — см. *Рак слизеобразующий.*

Р. КРИБРО́ЗНЫЙ (с. cribriforme; лат. cribrum решето) — Р., характеризующийся морфологически решетчатым видом опухоли из-за образования в ней просветов вследствие гибели опухолевых клеток.

Р. КРУПНОКЛЕ́ТОЧНЫЙ (с. magnocellulare) — недифференцированный Р., характеризующийся преобладанием в опухоли крупных, резко полиморфных клеток с оксифильной цитоплазмой; чаще развивается в легком.

Р. КХА́ЙНИ (kchaini) — Р. нижней губы у жителей Индии, связанный с привычкой помещать за нижнюю губу жевательную смесь, состоящую из гашеной извести и табака (кхайни).

Р. МАСТИТОПОДО́БНЫЙ (с. mastitoideum; син.: мастит карциноматозный, мастит раковый) — инфильтративный Р. молочной железы, проявляющийся ее отеком, диффузным уплотнением и болезненностью, гиперемией кожи, повышением температуры тела.

Р. МЕДУЛЛЯ́РНЫЙ (с. medullare; син.: мозговик, Р. мозговидный) — Р., характеризующийся резким преобладанием опухолевых клеток над соединительнотканной стромой опухоли.

Р. МЕЗОНЕФРОГЕ́ННЫЙ (с. mesonephrogenum) — см. *Мезонефрома.*

Р. МЕЛКОКЛЕ́ТОЧНЫЙ (с. parvocellulare) — Р. легкого, характеризующийся веретенообразной, полигональной и лимфоцитоподобной формой клеток, бурным течением и ранним метастазированием.

Р. МИНДА́ЛИН ЭПИДЕРМА́ЛЬНЫЙ (с. tonsillarum epidermale) — см. *Шминке опухоль.*

Р. МОЗГОВИ́ДНЫЙ — см. *Рак медуллярный.*

Р. МОЛО́ЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ ДО́ЛЬКОВЫЙ (с. mammae lobulare) — Р. мелких канальцев и альвеол молочной железы.

Р. МОЛО́ЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ КРАЕВО́Й (с. mammae marginale) — Р. молочной железы с локализацией опухоли по ее периферии; характеризуется более злокачественным течением и склонностью к раннему метастазированию.

Р. МОЛО́ЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ ЭКЗЕМОПОДО́БНЫЙ (с. mammae eczematoideum) — см. *Педжета рак соска молочной железы.*

Р. МУКО́ИДНЫЙ (с. mucoideum) — см. *Рак слизеобразующий.*

Р. НЕДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННЫЙ (син. Р. анаплазированный) — Р. с высокой степенью атипизма опухолевых клеток, что не позволяет при обычном морфол. исследовании судить о том, какая ткань явилась источником опухоли; классифицируется по формально-морфологическим признакам — мелкоклеточный, полиморфно-клеточный, солидный, альвеолярный и т. п.

Р. ОВСЯ́НО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ — Р. легкого, состоящий из скоплений мелких, напоминающих зерна овса клеток с гиперхромными ядрами и узким ободком цитоплазмы.

РАК ПА́НКОСТА — см. *Панкоста рак.*

Р. ПА́НЦИРНЫЙ — Р. молочной железы, при к-ром наблюдается плотная инфильтрация кожи над ней с наличием участков гиперемии, изъязвления и кровоизлияний.

Р. ПАПИЛЛЯ́РНЫЙ (с. papillare; син.: папиллокарцинома, Р. сосочковый) — железистый Р., характеризующийся образованием в ткани опухоли множественных сосочкоподобных соединительнотканных разрастаний, покрытых слоем опухолевых клеток.

Р. ПАРАФИ́НОВЫЙ (с. paraffinatum) — Р. кожи, вызываемый систематическим контактом с онкогенными углеводородами, загрязняющими парафины.

Р. ПЕРЕХО́ДНО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ (с. transitocellulare) — Р., развивающийся из переходного эпителия верхних дыхательных путей, околоносовых пазух или мочевых путей.

Р. ПЕРСТНЕВИ́ДНО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ — см. *Рак слизеобразующий.*

Р. ПЕЧЕ́НОЧНО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ (с. hepatocellulare; син.: аденома печени злокачественная, гепатома злокачественная, Р. гепатоцеллюлярный, эпителиома печени) — Р. печени, развивающийся из гепатоцитов и отличающийся малой склонностью к метастазированию.

Р. ПЛЕОМО́РФНЫЙ (с. pleomorphum; греч. plēon больше + morphē вид, форма) — см. *Рак полиморфно-клеточный.*

Р. ПЛОСКОКЛЕ́ТОЧНЫЙ (с. planocellulare; син.: Р. спиноцеллюлярный, Р. эпидермоидный) — Р., развивающийся из многослойного плоского эпителия.

Р. ПЛОСКОКЛЕ́ТОЧНЫЙ НЕОРОГОВЕВА́ЮЩИЙ (с. planocellulare non cornescens) — см. *Рак плоскоклеточный без ороговения.*

Р. ПЛОСКОКЛЕ́ТОЧНЫЙ ОРОГОВЕВА́ЮЩИЙ (с. planocellulare cornescens) — см. *Рак плоскоклеточный с ороговением.*

Р. ПЛОСКОКЛЕ́ТОЧНЫЙ С ОРОГОВЕ́НИЕМ (с. planocellulare cornescens; син. Р. плоскоклеточный ороговевающий) — Р. п., характеризующийся образованием роговых (кератиновых) масс («раковых жемчужин»).

Р. ПЛОСКОКЛЕ́ТОЧНЫЙ БЕЗ ОРОГОВЕ́НИЯ (с. planocellulare non cornescens; син. Р. плоскоклеточный неороговевающий) — Р. п., клетки к-рого не обладают способностью продуцировать кератин.

Р. ПОЛИМО́РФНО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ (с. polymorphocellulare; син.: Р. плеоморфный, Р. полиморфный) — недифференцированный Р., характеризующийся различными по форме и размерам клетками, обычно с большим количеством фигур деления в них.

Р. ПОЛИМО́РФНЫЙ (с. polymorphum; греч. polymorphos многообразный, разнородный) — см. *Рак полиморфно-клеточный.*

Р. ПО́ЧЕЧНО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ (с. renocellulare) — см. *Рак почки.*

Р. ПО́ЧКИ (с. renis; син.: гипернефрома — устар., Гравитца опухоль, опухоль почки гипернефроидная, Р. почечно-клеточный, Р. светлоклеточный) — Р., развивающийся из эпителия почечных канальцев.

Р. ПРЕИНВАЗИ́ВНЫЙ (с. praeinvasivum) — см. *Carcinoma in situ.*

Р. ПРОФЕССИОНА́ЛЬНЫЙ (c. professionale) — Р., возникший вследствие систематического контакта человека с какими-либо онкогенными факторами в процессе профессиональной деятельности.
Р. ИЗ ПСЕВДОМУЦИНО́ЗНОЙ КИСТЫ́ — см. *Кистома яичника псевдомуцинозная малигнизированная.*
Р. РОЖЕПОДО́БНЫЙ (c. erysipeliforme) — Р. молочной железы, при к-ром на коже в области молочной железы появляются участки гиперемии с неровными, языкообразными краями, местным повышением температуры, инфильтрацией и отечностью кожи, иногда распространяющихся за пределы железы.
Р. СВЕТЛОКЛЕ́ТОЧНЫЙ (c. clarocellulare) — см. *Рак почки.*
Р. ИЗ СЕРО́ЗНОЙ КИСТЫ́ — см. *Кистома яичника цилиоэпителиальная малигнизированная.*
Р. СЛИЗЕОБРАЗУ́ЮЩИЙ (c. mucoideum; син.: Р. коллоидный, Р. мукоидный, Р. перстневидно-клеточный, Р. слизистый) — Р. (обычно аденокарцинома), клетки к-рого продуцируют слизь.
Р. СЛИ́ЗИСТЫЙ (c. mucoideum) — см. *Рак слизеобразующий.*
Р. СО́ЛИДНЫЙ (c. solidum) — Р., клетки к-рого располагаются пластами или тяжами, разделенными прослойками соединительной ткани.
Р. СОСКА́ МОЛО́ЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ — см. *Педжета рак соска молочной железы.*
Р. СОСО́ЧКОВЫЙ (c. papillare) — см. *Рак папиллярный.*
Р. СОСУ́ДИСТОГО СПЛЕТЕ́НИЯ (chorioidcarcinoma) — см. *Хориоидкарцинома.*
Р. СПИНОЦЕЛЛЮЛЯ́РНЫЙ (c. spinocellulare) — см. *Рак плоскоклеточный.*
Р. ТРАБЕКУЛЯ́РНЫЙ (c. trabeculare) — Р. (обычно аденокарцинома), клетки к-рого расположены в виде тяжей, разделенных широкими кровеносными сосудами и слабо развитыми прослойками стромы.
Р. ТРУБО́ЧИСТОВ (истор.) —профессиональный Р. кожи, преимущественно мошонки, наблюдавшийся у трубочистов.
Р. ТУБУЛЯ́РНЫЙ (c. tubulare) — железистый Р., характеризующийся преобладанием трубчатых структур, образованных одним или несколькими рядами опухолевых клеток.
Р. УГРЕВИ́ДНЫЙ (c. acneforme; син.: комедокарцинома, Р. интрадуктальный) — Р. молочной железы, развивающийся гл. обр. внутри протоков, при к-ром выводные протоки железы прощупываются в виде извилистых, плотных образований, идущих от опухоли к соску.
Р. ФИБРО́ЗНЫЙ (c. fibrosum; син. скирр) — Р., характеризующийся преобладанием соединительнотканной стромы над опухолевыми клетками.
Р. ФУНГО́ЗНЫЙ (c. fungosum) — см. *Рак грибовидный.*
Р. ХОЛАНГИОГЕ́ННЫЙ (c. cholangiogenum) — см. *Рак холангиоцеллюлярный.*
Р. ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯ́РНЫЙ (c. cholangiocellulare син.: Р. холангиогенный, холангиокарцинома) — Р. печени, развивающийся из клеток эпителия желчных протоков.
Р. ЦЕЛОМИ́ЧЕСКИЙ (c. coelomicum) — см. *Мезотелиома злокачественная.*
Р. ШНЕЕРБЕ́РГСКИЙ (истор.; син. болезнь шнеербергских рудокопов) — Р. легких, вызывавшийся систематическим вдыханием пыли минералов (руд), содержащих радиоактивные вещества.
РАК ШО́УПА — см. *Шоупа рак.*
Р. ЭКЗОФИ́ТНЫЙ (c. exophyticum; греч. exō вне, снаружи + phyton нечто вырастающее) — Р., выступающий над поверхностью пораженного органа.
Р. ЭКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНЫЙ — индуцированный или трансплантированный Р. у лабораторного животного.
Р. ЭКСТРАМАМИЛЛЯ́РНЫЙ ПЕ́ДЖЕТА — см. *Педжета экстрамаммиллярный рак.*
Р. ЭМБРИОНА́ЛЬНЫЙ (c. embryonale; син. тератокарцинома) — тератобластома, состоящая из недифференцированных эпителиальных элементов, формирующих железистоподобные сосочковые и солидные структуры.
Р. ЭНДОФИ́ТНЫЙ (c. endophyticum; греч. endon внутри + phyton нечто вырастающее) — Р., распространяющийся в глубь органа.
Р. ЭПИДЕРМО́ИДНЫЙ (c. epidermoideum) — см. *Рак плоскоклеточный.*
Р. ЯИ́ЧНИКА БАЗА́ЛЬНЫЙ (c. ovarii basale) — см. *Опухоль гранулезоклеточная.*
Р. ЯИ́ЧНИКА ФОЛЛИКУЛО́ИДНЫЙ — см. *Опухоль гранулезоклеточная.*

РАК ВОДЯ́НОЙ (устар.) — см. *Нома.*

РАК ЛУЧЕВО́Й (carcinoma radiale)— общее название злокачественных опухолей, чаще кожи и костей, возникших в результате воздействия ионизирующего излучения.

«РА́КОВЫЕ ЖЕМЧУ́ЖИНЫ» (син.: канкроидные тельца, «роговые жемчужины») — образования, состоящие из концентрически расположенных слоев опухолевых клеток с ороговением в центре; свидетельствуют о высокой дифференцировке плоскоклеточного рака.

РАКООБРА́ЗНЫЕ (Crustaceae) — класс преимущественно водных членистоногих, тело к-рых состоит из трех отделов и покрыто хитиновой кутикулой; кровеносная система не замкнута; нек-рые Р. являются промежуточными хозяевами отдельных видов гельминтов, патогенных для человека.

РА́МА-БЕСЕ́ДКА — приспособление для установки нескольких носилок с пораженными (больными) для одновременной их передачи с корабля на корабль с помощью подъемных средств.

РАМАПИТЕ́КИ (Ramapithecus) — ископаемые высшие приматы, обнаруженные на севере полуострова Индостан и в Южной Африке; древность 12 млн. лет назад.

РА́МЗАЯ ХА́НТА СИНДРО́М (J. R. Hunt, 1872—1937, амер. невропатолог) — см. *Ханта синдром.*

РАМИКОТОМИ́Я (ramicotomia; лат. ramex, ramicis ветвь + греч. tomē разрез, рассечение; син. рамисекция) — общее название хирургических операций: пересечение соединительных ветвей между спинным мозгом и симпатическим стволом, между симпатическим стволом и спинномозговым нервом, между соседними ганглиями симпатического ствола или между симпатическими стволами левой и правой стороны.

РАМИСЕ́КЦИЯ (лат. ramus ветвь + sectio разрез, рассечение) — см. *Рамикотомия.*

РАМНО́ЗА — моносахарид, входящий в состав гликозидов и полисахаридов растений и бактерий.

РАМО́НА ФЕНО́МЕН (G. L. Ramon, 1886—1963, франц. бактериолог) — феномен флоккуляции, наблюдаемый при реакции нейтрализации токсина.

РАМО́Н-И-КАХА́ЛЯ МЕ́ТОДЫ (S. Ramón y Cajal, 1852—1934, исп. гистолог) — общее название гистологических методов выявления элементов нервной ткани (нейрофибрилл, астроцитов и др.), основанных на импрегнации препаратов серебром или золотом.

РАМО́С-И-СИ́ЛЬВЫ КРАЕВА́Я КЕРАТОДЕРМИ́Я ЛАДО́НЕЙ (J. Ramos e Silva) — см. *Кератодермия ладоней краевая.*

РА́НА (vulnus) — нарушение целости кожи или слизистых оболочек на всю их толщину (часто и глубжележащих тканей и органов), вызванное механическим воздействием.

Р. АСЕПТИ́ЧЕСКАЯ (v. aseptiсum) — Р., практически не содержащая патогенных или условно-патогенных микроорганизмов.
Р. БАКТЕРИА́ЛЬНО-ЗАГРЯЗНЕ́ННАЯ — Р., в к-рую внесены микроорганизмы, не вызывающие (или еще не вызвавшие) патологических изменений и отягощения нормального течения раневого процесса.
Р. ГНОЙНАЯ (v. purulentum; v. suppuratum) — Р., характеризующаяся гнойным воспалением стенок и дна ее полости.
Р. ГРАНУЛИ́РУЮЩАЯ (v. granulatiosum) — Р., полость к-рой заполняется грануляционной тканью, т. е. заживающая вторичным натяжением.
Р. ИНФИЦИ́РОВАННАЯ (v. infectiosum) — Р., в к-рую внесены патогенные микроорганизмы, вызвавшие раневую инфекцию.
Р. КО́ЛОТАЯ (v. punctum) — Р., нанесенная острым предметом с небольшими поперечными размерами; характеризуется узким и длинным раневым каналом.
Р. ОГНЕСТРЕ́ЛЬНАЯ (v. sclopetarium) — Р., нанесенная раняющим снарядом стрелкового оружия или боеприпасов взрывного действия (снаряды, мины, бомбы, гранаты и др.).
Р. ОПЕРАЦИО́ННАЯ (v. operativum; син. Р. хирургическая) — Р., нанесенная в процессе хирургической операции.
Р. ОТРА́ВЛЕННАЯ (v. venenatum) — Р., в к-рую внесен яд.
Р. РАЗМОЗЖЕ́ННАЯ (v. conquassatum) — Р., при нанесении к-рой произошло раздавливание и разрыв тканей; характеризуется обширной зоной первичного травматического некроза.
Р. РВА́НАЯ (v. laceratum) — Р., возникшая под влиянием перерастяжения тканей; характеризуется неправильной формой краев, отслойкой или отрывом тканей, значительной зоной их повреждения.
Р. РЕ́ЗАНАЯ (v. incisum) — Р., нанесенная скользящим движением тон-

кого острого предмета; характеризуется преобладанием длины над глубиной, ровными параллельными краями и почти полным отсутствием первичного травматического некроза.

Р. РУ́БЛЕНАЯ (v. caesum) — Р. от удара тяжелым острым предметом; характеризуется большой глубиной, незначительной зоной первичного травматического некроза.

Р. СКАЛЬПИ́РОВАННАЯ — Р. с полным или почти полным отделением обширного лоскута кожи (на волосистой части головы — всех мягких тканей).

Р. УКУ́ШЕННАЯ (v. morsum) — Р., нанесенная зубами животного или человека; характеризуется инфицированностью, неровными, раздавленными краями.

Р. УШИ́БЛЕННАЯ (v. contusum) — Р. от удара тупым предметом с одновременным ушибом окружающих тканей; характеризуется обширными зонами первичного и особенно вторичного травматического некроза.

Р. ХИРУРГИ́ЧЕСКАЯ (v. chirurgicum) — см. *Рана операционная.*

РАНВЬЕ́ КРЕСТЫ́ (устар.; L. A. Ranvier, 1835—1922, франц. анатом) — крестообразные фигуры черного цвета, наблюдаемые на гистологических препаратах миелиновых нервных волокон в области перехватов узла; представляют собой артефакты, обусловленные обработкой волокон нитратом серебра.

РАНВЬЕ́ МЕ́ТОДЫ (L. A. Ranvier) — общее название гистологических методов выявления нейрофибрилл, основанных на импрегнации препаратов раствором хлорного золота.

РАНВЬЕ́ ПЕРЕХВА́Т (L. A. Ranvier) — см. *Перехват узла.*

РАНДОМИЗА́ЦИЯ (англ. random выбранный наугад, случайный) — процедура случайного выбора элементов статистической совокупности при проведении выборочного исследования, в т. ч. медико-биологического характера.

РАНДОМИЗА́ЦИЯ ЖИРО́В — см. *Переэтерификация жиров.*

РАНДЮ — ВЕ́БЕРА — О́СЛЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (H. J. L. M. Rendu, 1844—1902, франц. врач; F. P. Weber, 1863—1962, англ. врач; W. Osler, 1849—1919, канадский врач) — см. *Ослера — Рандю синдром.*

РАНЕВА́Я БАЛЛИ́СТИКА (син. баллистика ранения) — учение о движении ранящего снаряда в органах и тканях и характере повреждающего действия на них.

РАНЕВА́Я ПО́ЛОСТЬ (cavum vulnerale) — пространство, ограниченное стенками и дном раны; размеры и форма Р. п. определяются характером раны и степенью ее зияния.

РАНЕВО́Й КАНА́Л (canalis vulneralis) — раневая полость, глубина к-рой значительно превосходит ее поперечные размеры.

РАНЕВО́Й ПРОЦЕ́СС — совокупность клинических, патофизиологических, биохимических, бактериологических и морфологических изменений, характеризующих динамику заживления раны.

РАНЕ́НИЕ (vulneratio) — механическое воздействие на ткани и органы, влекущее нарушение их целости с образованием раны; нанесение операционной раны термином Р. не обозначают.

Р. КАСА́ТЕЛЬНОЕ — огнестрельное Р., при к-ром ранящий снаряд рассекает кожу, образуя неглубокую рану в форме желоба.

Р. МНО́ЖЕСТВЕННОЕ — Р. двух и более органов (областей тела) несколькими ранящими снарядами, несколькими ударами холодного оружия и т. п.

Р. НЕПРОНИКА́ЮЩЕЕ — Р., при к-ром образовавшийся раневой канал не сообщается с какой-либо полостью организма.

Р. ОГНЕСТРЕ́ЛЬНОЕ — Р. ранящим снарядом стрелкового оружия или боеприпаса взрывного действия.

Р. ПРОНИКА́ЮЩЕЕ — Р., при к-ром образовавшийся раневой канал сообщается с какой-либо полостью организма.

Р. СКВОЗНО́Е — Р., при к-ром образовавшийся раневой канал имеет входное и выходное отверстия.

Р. СЛЕПО́Е — Р., при к-ром образовавшийся раневой канал не имеет выходного отверстия.

Р. СОЧЕТА́ННОЕ — Р. одиночным поражающим агентом двух и более органов или областей тела.

РА́НЕНЫЙ — человек, получивший открытое повреждение в результате воздействия механического поражающего агента, чаще стрелкового или холодного оружия, боеприпасов взрывного действия.

РАНИ́МЫЙ ПЕРИ́ОД СЕРДЕ́ЧНОГО ЦИ́КЛА — см. *Уязвимый период сердечного цикла.*

РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ — инструмент, предназначенный для расширения краев раны; снабжен устройством для фиксации его рабочих частей (напр., зеркал, крючков) в разведенном положении.

РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ А́КСЕНФЕЛЬДА — см. *Аксенфельда ранорасширитель.*

Р. ВИНТОВО́Й — Р., перемещение и фиксация зеркал или крючков к-рого производятся вращением винта.

РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ ЕГО́РОВА—ФРЕ́ЙДИНА — см. *Егорова — Фрейдина ранорасширитель.*

Р. ЗАМКО́ВЫЙ — Р., бранши к-рого в разведенном состоянии фиксируют с помощью кремальеры.

РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ МЕЙО́ — СИМПСОНА — КО́ЛЛЕНА — см. *Мейо — Симпсона — Коллена ранорасширитель.*

РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ МЮ́ЛЛЕРА — см. *Мюллера ранорасширитель.*

Р. РА́МОЧНЫЙ — Р. в виде рамки, на к-рой укреплены крючки или зеркала.

Р. РЕ́ЕЧНЫЙ — Р., крючки или зеркала к-рого перемещают и фиксируют с помощью реечного механизма.

РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ ТЬЮДО́РА — ЭДВАРДСА — см. *Тьюдора—Эдвардса ранорасширитель.*

РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ ФИ́НСЕНА — см. *Финсена ранорасширитель.*

РА́НСОМА РЕФЛЕ́КС (G. A. Ransome) — физиологический сухожильный рефлекс: разгибание большого пальца стопы у лежащего на спине исследуемого при ударе молоточком по концевой фаланге этого пальца.

РА́НСОНА МЕ́ТОД (S. W. Ranson, род. в 1880 г., амер. невролог; син. Рансона метод) — метод выявления нервной ткани в гистологических препаратах путем их импрегнации раствором нитрата серебра после фиксации в смеси абсолютного спирта и аммиака и обработки пиридином.

РАНТ-БОЛЕ́ЗНЬ (англ. runt малорослое животное; син.: болезнь карликовая, болезнь малорослости) — болезнь, вызываемая в эксперименте трансплантацией плоду или новорожденному животному аллогенных иммунокомпетентных клеток взрослого животного; характеризуется отставанием в росте и весе, дистрофическими изменениями тканей и органов.

РА́НУЛА (ranula; лат. rana лягушка; син.: киста подъязычная ретенционная, опухоль лягушачья) — ретенционная киста в переднем отделе подъязычной области, возникающая из долек подъязычной железы, иногда из мелких слюнных желез дна полости рта или передних желез языка.

РА́НЯЩИЙ СНАРЯ́Д ВТОРИ́ЧНЫЙ — общее название наносящих рану предметов окружающей среды, пришедших в движение в результате воздействия на них первичного ранящего снаряда или ударной волны взрыва, в т. ч. ядерного; к Р. с. в. относят также костные осколки, образовавшиеся в раневом канале и вызывающие дополнительное повреждение органов и тканей.

РА́НЯЩИЙ СНАРЯ́Д ПЕРВИ́ЧНЫЙ — конструктивный поражающий элемент стрелкового боеприпаса или боеприпаса взрывного действия (пуля, осколок, шарик и др.).

РАПА́ — вода солевых озер и лиманов, представляющая собой высококонцентрированный, чаще насыщенный, раствор солей; используется с лечебной целью в виде ванн.

РА́ПАНТА ОПЕРА́ЦИЯ (V. Rapant) — хирургическая операция: прошивание и перевязка варикозно-расширенных вен пищевода при кровотечении из них.

РАПОПО́РТ СРЕДА́ (М. А. Рапопорт) — твердая селективная дифференциально-диагностическая питательная среда для выделения энтеробактерий, содержащая глицерин, бычью желчь и кислый фуксин.

РАПОПО́РТ — ВА́ЙНТРАУБА СРЕДА́ (М. А. Рапопорт; А. Вайнтрауб) — жидкая селективная питательная среда для выделения из крови возбудителей брюшного тифа, содержащая мясопептонный бульон, желчь, индикатор Андраде, глюкозу или маннит.

РАПОПО́РТА ИММУНОБЛА́СТ (Я. Л. Рапопорт, род. 1898 г., сов. патологоанатом) — устаревшее название плазматических клеток.

РАПОПО́РТА ПАТОЛО́ГИЯ ИНТЕГРА́ЦИИ (Я. Л. Рапопорт, род. в 1898 г., сов. патологоанатом; син. патология интеграции) — патологическое изменение трансплантированного органа, обусловленное наличием заболевания у реципиента.

РАПОПО́РТА ПРО́БА (А. М. Рапопорт, 1894—1968, сов. психиатр) — метод обнаружения паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, основанный на окислении и разложении перманганата калия этиловым спиртом в присутствии серной кислоты.

РАПОПО́РТА ТРАНСПЛАНТАЦИО́ННЫЙ МИОКАРДИ́Т (Я. Л. Рапопорт, род. в 1898 г., сов. патологоана-

том) — см. *Миокардит трансплантационный.*

РАППАПО́РТА — ЭЙХГО́РНА МЕ́ТОД (F. Rappaport; F. Eichhorn) — метод определения остаточного азота в сыворотке крови, основанный на взаимодействии азотистых соединений и щелочного раствора гипобромита с образованием молекулярного азота; о содержании остаточного азота судят по результатам йодометрического титрования непрореагировавшего гипобромита.

РАППО́РТ (фран. rapport) в психотерапии — словесный контакт гипнотизирующего с лицом, находящимся в состоянии гипноза.

РА́ПТУС (raptus; лат. захватывание, резкое движение) — приступ неистового возбуждения, вызванный чрезвычайно сильным аффектом тоски или страха.

Р. ИСТЕРИ́ЧЕСКИЙ (r. hystericus) — Р., при к-ром двигательное возбуждение носит экспрессивный характер; сопровождается речевым возбуждением, отражающим травматизирующую ситуацию и рассчитанным на привлечение внимания окружающих; возникает при истерии.

Р. МЕЛАНХОЛИ́ЧЕСКИЙ (r. melancholicus) — Р., при к-ром импульсивные действия направлены на самоповреждение или самоубийство; возникает при депрессии.

РАР — см. *Реакция агглютинации с риккетсиозным антигеном.*

РАРЕФИКА́ЦИЯ КО́СТИ (лат. rarefacio разрежать) — см. *Остеопороз.*

РА́СА человека (син. антропологический тип) — часть вида Homo sapiens (человек разумный), объединяющая исторически сложившуюся большую группу людей, характеризующуюся нек-рыми общими наследуемыми морфологическими и физиологическими особенностями, связанными с единством происхождения и определенной областью обитания; представители всех Р. обладают равными биологическими возможностями для достижения высокого уровня цивилизации.

Р. АЗИА́ТСКО-АМЕРИКА́НСКАЯ — см. *Раса монголоидная.*

Р. БОЛЬША́Я — Р., отчетливо выделяемая по большой группе признаков; различают три Р. б.: европеоидную, монголоидную и экваториальную (негроавстралоидную).

Р. ЕВРАЗИ́ЙСКАЯ — см. *Раса европеоидная.*

Р. ЕВРОПЕО́ИДНАЯ (син. Р. евразийская) — Р., характеризующаяся волнистыми, мягкими волосами, светлой или смуглой кожей, интенсивным ростом бороды и усов, тонкими губами, узким и резко выступающим носом; основные районы обитания — Европа, Северная Африка, Западная Азия, Северная Индия.

Р. МОНГОЛО́ИДНАЯ (син. Р. азиатско-американская) — Р., характеризующаяся прямыми и жесткими волосами, смуглой или светлой кожей, слабым ростом бороды и усов, сильным выступанием скул и наличием эпикантуса; основные районы обитания — Восточная и Центральная Азия, Сибирь, Индонезия, Америка.

Р. НЕГРОАВСТРАЛО́ИДНАЯ — см. *Раса экваториальная.*

Р. ЭКВАТОРИА́ЛЬНАЯ (син. Р. негроавстралоидная) — Р., характеризующаяся курчавыми и волнистыми волосами, темной кожей, толстыми губами и широким носом; основные районы обитания — Африка, Юго-Восточная Азия, Австралия и острова Меланезии.

РАСИ́ЗМ — совокупность антинаучных реакционных концепций, в основе которых лежит представление о психической и биологической неравноценности человеческих рас, о решающем влиянии расовых различий на ход истории и развитие культуры человеческого общества, о наличии «высших» и «низших» рас.

РА́СМУССЕНА АНЕВРИ́ЗМА (F. U. Rasmussen, 1834—1877, датский патологоанатом) — аневризма артерии, находящаяся в полости туберкулезной легочной каверны; разрыв Р. а. является наиболее частой причиной массивного легочного кровотечения при туберкулезе.

РАСОВЕ́ДЕНИЕ — раздел антропологии, изучающий процессы формирования и развития человеческих рас.

РА́СОВЫЕ ПРИ́ЗНАКИ — морфологические, биохимические и другие признаки, устойчиво передающиеся по наследству и используемые для дифференциации человеческих рас.

РАСОГЕНЕ́З (раса + греч. genesis происхождение, развитие) — процесс формирования и развития человеческих рас.

РАСПА́Д РЕ́ЧИ — нарастающее или внезапное нарушение речевой деятельности, приводящее к тотальной афазии.

РАСПА́ТОР (франц. raspatoire) — хирургический инструмент, предназначенный для отделения надкостницы от кости.

РАСПА́ТОР АНДО́ГСКОГО — см. *Андогского распатор.*

Р. РЁБЕРНЫЙ — см. *Дуайена распатор.*

РАСПА́ТОР ФАРАБЕ́ФА — см. *Фарабефа распатор.*

РАСПИСА́НИЕ БОЛЕ́ЗНЕЙ — перечень болезней и врожденных дефектов, служащих основанием для признания человека негодным или ограниченно годным к военной службе; объявляется приказом Министра Обороны СССР.

РАСПЛАВЛЕ́НИЕ РОГОВИ́ЦЫ (keratomalacia) — см. *Кератомаляция.*

РАСПРЕДЕЛИ́ТЕЛЬ-ЗАГРАДИ́ТЕЛЬ (истор.) — совокупность лечебных и противоэпидемических учреждений дивизии (армии, фронта), развертывавшихся на основных путях эвакуации в период Гражданской войны (1918—1920 гг.) для оказания медицинской помощи и лечения раненых и больных с максимальным ограничением их дальнейшей эвакуации, обусловленной наличием в стране эпидемий паразитарных тифов и недостатком транспортных средств.

РАСПРЕДЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ ПОСТ (РП) — пост в составе среднего медицинского работника, дозиметристов и сандружинниц, выставляемый на въезде в расположение отряда первой медицинской помощи для распределения потока пораженных и больных в изоляторы, отделение частичной санитарной обработки и приемно-сортировочное отделение; является составной частью приемно-сортировочного отделения.

РАСПРЕДЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ ПОСТ ВСПОМОГА́ТЕЛЬНЫЙ (ВРП)— пост, организуемый головной больницей при въезде в больничный коллектор с задачей распределения пораженных и больных в лечебные учреждения коллектора.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ БОЛЕ́ЗНЕЙ — см. *Болезненность.*

РАСПРОСТРАНЯ́ЮЩИЙСЯ ПОТЕНЦИА́Л — см. *Потенциал действия.*

РАСПЫЛИ́ТЕЛЬ (син. аппарат дезинфекционный распыливающий) — аппарат, предназначенный для распыления жидких и порошкообразных веществ с целью дезинфекции (дезинсекции) поверхностей различных объектов и воздушной среды.

РА́ССЕЛЛА РАСШИРИ́ТЕЛЬ (истор.; J. C. Russell, англ. врач) — инструмент для расширения кардии с целью консервативного лечения кардиоспазма; представляет собой зонд с баллоном на конце, к-рый после введения в желудок заполняется водой; при подтягивании заполненного водой Р. р. происходит расширение кардии.

РА́ССЕЛЛА СРЕ́ДА (F. F. Russell, 1870—1960, амер. бактериолог) — плотная дифференциально-диагностическая питательная среда для идентификации тифозных, паратифозных и дизентерийных бактерий по их ферментативной активности; содержит агар, перевар Хоттингера, лактозу, глюкозу, индикатор Андраде.

РАССЕЧЕ́НИЕ (discissio) в хирургии — разделение тканей с помощью какого-либо острого инструмента.

РАССКА́ЗОВА — ЛУКО́МСКОГО — ПАЛЬТА́УФА ПЯ́ТНА (И. О. Рассказов, отеч. судебный медик; Ю. А. Лукомский, отеч. судебный медик; A. Paltauf, 1860—1893, чешский врач) — полиморфные кровоизлияния светло-красного цвета с нечеткими, расплывчатыми краями, обнаруживаемые под висцеральной плеврой в случае смерти от утопления.

РАССО́ЛЫ (син. рассольные воды) — минеральные воды, содержащие от 35 до 150 *г/л* растворенных минеральных веществ.

РАССО́ЛЫ КРЕ́ПКИЕ — минеральные воды, содержание растворенных веществ в к-рых превышает 150 *г/л.*

РАССО́ЛЬНЫЕ ВО́ДЫ — см. *Рассолы.*

РАССТОЯ́НИЕ ИСТО́ЧНИК — ДИАФРА́ГМА — расстояние от источника ионизирующего излучения в аппарате для лучевой терапии до внешней поверхности защитных элементов тубуса, коллиматора или диафрагмы, формирующих пучок излучения.

РАССТОЯ́НИЕ ИСТО́ЧНИК — ОЧА́Г — расстояние от источника ионизирующего излучения в аппарате для лучевой терапии до условного центра облучаемого патологического очага.

РАССТОЯ́НИЕ ИСТО́ЧНИК — ПОВЕ́РХНОСТЬ — расстояние от источника ионизирующего излучения в аппарате для лучевой терапии до ближайшей к нему поверхности облучаемого объекта (больного, фантома).

РАССТОЯ́НИЕ ИСТО́ЧНИК — ЦЕНТР РОТА́ЦИИ — расстояние от источника ионизирующего излучения в аппарате для лучевой терапии до оси вращения источника или облучаемого объекта.

РАССТРО́ЙСТВА «Я» — общее название нарушений самосознания, переживаний больным изменения собственной личности (напр., расстройство ак-

тивности «Я», идентичности «Я», деперсонализация).

РАССТРО́ЙСТВО АКТИ́ВНОСТИ «Я» — вид расстройств «Я», заключающийся в утрате психически больным чувства собственной активности при психической деятельности, принадлежности себе собственных мыслей, восприятий, представлений, воспоминаний и др.; составная часть синдрома Кандинского — Клерамбо.

РАССТРО́ЙСТВО ГРАНИ́Ц «Я» (син. расстройство демаркации «Я») — вид расстройств «Я», заключающийся в утрате психически больным чувства четкого разграничения собственного «Я» от окружающего мира; обычно сопровождается переживаниями отчуждения психической деятельности, психическим автоматизмом, бредовыми расстройствами и развитием аутизма.

РАССТРО́ЙСТВО ДЕМАРКА́ЦИИ «Я» — см. *Расстройство границ «Я»*.

РАССТРО́ЙСТВО ИДЕНТИ́ЧНОСТИ «Я» — вид расстройств «Я», заключающийся в утрате психически больным сознания тождественности собственной личности в различные периоды времени; сопровождается чувством неуверенности, чуждости собственной личности или бредовой деперсонализацией.

РАССТРО́ЙСТВО СОЗНА́НИЯ — см. *Помрачение сознания*.

РАССТРО́ЙСТВО СХЕ́МЫ ТЕ́ЛА — ощущение или представление психически больного об увеличении или уменьшении размеров собственного тела или отдельных его частей, об изменении их расположения или даже об их отделении от тела.

РАССТРО́ЙСТВО ЦЕ́ЛОСТНОСТИ «Я» — вид расстройств «Я», заключающийся в утрате психически больным сознания единства, взаимосвязанности и принадлежности к «Я» всех видов собственной психической деятельности; сопровождается паническим страхом, возбуждением или ступором.

РАССУ́ДОВА ОПЕРА́ЦИЯ (П. М. Рассудов, сов. хирург) — пластическая операция при распространенном папилломатозе гортани, заключающаяся в пересадке в гортань кожного лоскута, взятого с бедра, после предварительной ларингостомии и удаления папиллом.

RAST — см. *Радиоаллергосорбентный тест*.

РАСТЕ́РЯННОСТЬ (син.: аффект недоумения, аффект растерянности) в психиатрии — обусловленное острым расстройством психической деятельности мучительное непонимание больным ситуации и своего состояния, к-рые представляются ему необычными, получившими какой-то новый, неясный смысл.

РАСТОРМА́ЖИВАНИЕ — временное устранение тормозного состояния в нек-рых участках ц. н. с. за счет иррадиации процесса возбуждения; термин введен И. П. Павловым.

РАСТОРМОЖЕ́НИЕ ВЛЕЧЕ́НИЙ — патологическое усиление влечений (пищевых, сексуальных и др.), обусловленное ослаблением социально-приобретенных форм поведения и сознательных установок.

РАСЧЁСЫ (excoriationes) — поверхностные, обычно линейные дефекты кожи, обусловленные расчесыванием при зуде.

РАСЧЛЕНЕ́НИЕ ТРУ́ПА — разделение трупа на отдельные части в результате несчастного случая или с преступной целью.

РАСШИРЕ́НИЕ ЖЕЛУ́ДКА (gastrectasia) — см. *Гастрэктазия*.

РАСШИРЕ́НИЕ О́БЩЕГО ЖЁЛЧНОГО ПРОТО́КА ВРОЖДЁННОЕ — см. *Киста общего желчного протока врожденная*.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ — хирургический инструмент для расширения краев ран, полостей и каналов, для оттеснения органа или ткани; к Р. относят бужи, крючки, зеркала и др.

Р. ГОРТА́ННЫЙ — Р. в виде металлического бужа, предназначенный для бужирования при хронических стенозах гортани.

Р. ТРАХЕОТОМИ́ЧЕСКИЙ — Р. для разведения краев раны трахеи с целью введения в нее трахеотомической трубки.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ ФИНОКЬЕ́ТТО — см. *Финокьетто расширитель*.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ ХЕГА́РА — см. *Хегара буж*.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ ШТА́РКА — см. *Штарка расширитель*.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ ЮДИНА — см. *Юдина расширитель*.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ ГЛО́ТКИ (musculus dilatator pharyngis) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *819*.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ ЕВСТА́ХИЕВОЙ ТРУБЫ́ (musculus dilatator tubae Eustachii) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *838*.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ НО́СА (musculus nasum dilatans) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *696*.

РАСШИРИ́ТЕЛЬ-ПОДЪЁМНИК РЁБЕРНЫХ ДУГ — расширитель, предназначенный для обеспечения абдоминального доступа к кардиальному отделу желудка и пищевода при хирургических операциях.

РАСЩЕ́ЛИНА ВЕ́РХНЕЙ ЧЕ́ЛЮСТИ (gnathoschisis) — аномалия развития: расщепление альвеолярного отростка верхней челюсти вследствие несращения в эмбриональном периоде верхнечелюстного и среднего носового отростков.

РАСЩЕ́ЛИНА ГУ́БЫ (labium fissum; cheiloschisis; син.: губа заячья, незарощение губы, хейлосхизис) — аномалия развития: наличие щели верхней губы, идущей от ее красной каймы к носу.

РАСЩЕ́ЛИНА ЛИЦА́ (prosoposchisis) — аномалия развития: наличие щелей в тканях лица, обусловленных несращением зародышевых бугров, образующих лицо.

РАСЩЕ́ЛИНА МОЧЕВО́ГО ПУЗЫРЯ (cystoschisis) — см. *Экстрофия мочевого пузыря*.

РАСЩЕ́ЛИНА МОЧЕИСПУСКА́ТЕЛЬНОГО КАНА́ЛА ВЕ́РХНЯЯ (fissura urethrae superior) — см. *Эписпадия*.

РАСЩЕ́ЛИНА МОЧЕИСПУСКА́ТЕЛЬНОГО КАНА́ЛА НИ́ЖНЯЯ (fissura urethrae inferior) — см. *Гипоспадия*.

РАСЩЕ́ЛИНА НЁБА (palatoschisis, palatum fissum, uranoschisis; син. палатосхизис) — аномалия развития: незарощение тканей неба, в результате чего по средней линии имеется широкое сообщение между ротовой и носовой полостями; приводит к нарушению сосания, глотания, а в дальнейшем и речи.

РАСЩЕПЛЕ́НИЕ (син. сегрегация) в генетике — возникновение различных гено- и фенотипов в потомстве гибридов, обусловленное случайным распределением гомологичных хромосом между гаметами в мейозе, кроссинговером и случайными сочетаниями гамет при оплодотворении.

РАСЩЕПЛЕ́НИЕ ВОЛО́С — см. *Трихоклазия узловатая*.

РАСЩЕПЛЕ́НИЕ КИ́СТИ ВРОЖДЁННОЕ (dicheiria congenita) — аномалия развития: удлинение межпальцевых промежутков до костей запястья.

РАСЩЕПЛЕ́НИЕ МОЧЕТО́ЧНИКА (fissura ureteris) — аномалия развития: удвоение мочеточника на ограниченном участке.

РАСЩЕПЛЕ́НИЕ НО́СА (син. нос дога) — аномалия развития: наличие щели по средней линии спинки носа.

РАСЩЕПЛЕ́НИЕ ПИРАМИ́ДНОГО СИНДРО́МА — преобладание одних признаков пирамидного синдрома при отсутствии, ослаблении или видоизменении других; наблюдается при изолированном поражении моторной либо премоторной области коры большого мозга (или начинающихся от них волокон пирамидного пути); в первом случае наблюдаются симптомы пареза (паралича) и разгибательные патологические рефлексы (напр., Бабинского), а во втором — повышенный мышечный тонус и сгибательные патологические рефлексы (напр., Бехтерева — Менделя).

РАСЩЕПЛЕ́НИЕ ПСИХИ́ЧЕСКОЕ — нарушение единства психической деятельности в виде распада логического и смыслового единства мыслительных процессов, согласованности между мышлением и аффектами; по Блейлеру — основное расстройство при шизофрении.

РАСЩЕПЛЕ́НИЕ СОЗНА́НИЯ — расстройство самосознания с утратой сознания единства идентичности «Я», выражающееся в чувственном переживании расщепления личности больного на две одновременно существующие личности.

РАТИЦИ́ДЫ (франц. rat крыса + лат. caedo убивать) — см. *Родентициды*.

РА́ТКЕ КАРМА́Н (sacculus hypophysialis, LNE; M. H. Rathke, 1793—1860, нем. анатом; син. гипофизарный карман) — выпячивание эпителия задней стенки ротовой полости зародыша на границе с глоткой; зачаток аденогипофиза.

РАУ́ЛЯ ЗАКО́НЫ (F. M. Raoult, 1830—1901, франц. физик и химик) — общее название нек-рых видов зависимости физических свойств растворов от их концентрации: 1) понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором пропорционально увеличению его концентрации; 2) повышение температуры кипения или понижение температуры замерзания раствора пропорционально увеличению его концентрации; на Р. з. основаны нек-рые методы лабораторных медико-биологических исследований.

РАУ́ЛЯ — КРЕПИ́ МЕТОД (Y. Raoul; O. Crépy) — метод определения никотиновой кислоты в крови, основанный на появлении желтовато-оранжевого окрашивания при ее взаимодействии с цианистым бромом и параминофенилсульфонамидом в присутствии соляной кислоты.

РА́УСА САРКО́МА (F. P. Rous, 1879—1970, амер. врач) — саркома

кур, вызываемая одноименным вирусом; используется в качестве экспериментальной модели злокачественной опухоли.

РАУТИА́НА АНОМАЛОСКО́П (Г. Н. Раутиан, сов. офтальмолог) — см. *Аномалоскоп*[2].

РА́УХФУСА СИМПТО́М (К. А. Рауфус, 1835—1915, отеч. педиатр) — притупление перкуторного звука в области треугольника Грокко—Раухфуса; признак экссудативного плеврита.

РА́УХФУСА ТРЕУГО́ЛЬНИК (К. А. Раухфус) — см. *Грокко — Раухфуса треугольник*.

РА́УШЕРА ВИ́РУС (F. J. Rauscher, род. в 1931 г., амер. онколог) — вирус, вызывающий у мышей эритробластоз, реже — лимфолейкоз или миелолейкоз; используется при экспериментальном изучении лейкозов.

РА́УШКОЛЬБА — ТУ́МИ СИНДРО́М (J. E. Rauschkolb, совр. амер. дерматолог; J. A. Toomey, род. в 1889 г., амер. педиатр; син.: Коула синдром, синдром дермально-мезодермальной дисплазии) — сочетание пятнистой атрофии кожи шеи и туловища, линейной атрофии кожи конечностей, расстройств пигментации, дистрофии ногтей и зубов с синдактилией IV—V пальцев кисти, отсутствием I пальца и первой плюсневой кости стопы, чаще левой.

РА́УШ-НАРКО́З (нем. Rausch опьянение; син. наркоз оглушением) — кратковременный неглубокий наркоз, вызванный вдыханием воздуха с высокой концентрацией паров эфира или хлорэтила.

РА́УШ-СОСТОЯ́НИЕ (нем. Rausch опьянение) — легкое помрачение сознания («вуаль на сознание») с сохранением аутопсихической и аллопсихической ориентировки при нарушении критики, аффектов, двигательных и речевых реакций.

РАФА́ЛЬСКОГО КОЭФФИЦИЕ́НТ — см. *Гипогликемический коэффициент*.

РАХИ- (рахио-; греч. rhachis хребет, позвоночник) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к спине, к позвоночнику».

РАХИМЕТРИ́Я (*рахи-* + греч. metreō измерять) — измерение давления цереброспинальной жидкости в позвоночном канале.

РАХИО- см. *Рахи-*.

РАХИОТО́М (устар.; *рахио-* + греч. tomē разрез, рассечение) — инструмент для рассечения позвоночника плода при плодоразрушающих операциях.

РАХИОТОМИ́Я (rhachiotomia; *рахио-* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Ламинэктомия*.

РАХИОТОМИ́Я ПО СЕ́ДДОНУ — см. *Седдона рахиотомия*.

РАХИСХИ́ЗИС (rhachischisis; *рахи-* + греч. schisis расщепление) — тяжелая форма spina bifida, характеризующаяся несращением не только тел и дужек позвонков, но и прилежащих мягких тканей (в т. ч. кожи); при этом спинной мозг оказывается обнаженным.

РАХИ́Т (rhachitis, rachitis; от греч. rhachis хребет, позвоночник + *-ит*; син. болезнь английская — устар.) — гиповитаминоз D у детей раннего возраста, характеризующийся расстройством кальциевого и фосфорного обмена; проявляется нарушениями костеобразования, функций нервной системы и внутренних органов.

Р. ВРОЖДЁННЫЙ (r. congenita) — Р., проявляющийся с момента рождения; обусловлен гиповитаминозом D матери во время беременности.

Р. ПО́ЗДНИЙ (r. tarda) — Р., проявляющийся в дошкольном возрасте развитием костных деформаций (кифоз, сколиоз, плоская стопа, деформация голеней) и мышечной гипотонией.

РАХИ́Т КИШЕ́ЧНЫЙ (rachitis intestinalis) — см. *Остеодистрофия кишечная*.

РАХИ́Т НЕФРОГЕ́ННЫЙ (rachitis nephrogena) — см. *Рахит почечный*.

РАХИ́Т ПЕЧЕ́НОЧНЫЙ (rachitis hepatica; син. инфантилизм печеночный) — патологическое состояние, характеризующееся рахитоподобными изменениями костей в сочетании с желтухой, увеличением печени и селезенки; наблюдается у детей, страдающих хроническими болезнями печени.

РАХИ́Т ПО́ЧЕЧНЫЙ (rachitis renalis; син.: остит ренальный, псевдорахит почечный, рахит нефрогенный, рахит ренальный) — разновидность нефрогенной остеопатии, при к-рой изменения костей сходны с наблюдаемыми при рахите.

РАХИ́Т РЕНА́ЛЬНЫЙ (rachitis renalis) — см. *Рахит почечный*.

РАХИ́Т СТРО́НЦИЕВЫЙ — рахитоподобные изменения костей с их декальцинацией, развивающиеся при попадании в организм радиоактивного стронция.

РАХИ́Т ЧРЕ́ВНЫЙ (rachitis coeliaca) — см. *Остеодистрофия кишечная*.

РАХИТЕРМОМЕТРИ́Я (*рахи-* + *термометрия*) — измерение температуры цереброспинальной жидкости, производимое при спинномозговой пункции с помощью термопары, введенной через пункционную иглу.

РАХИТИ́ЧЕСКИЕ «БРАСЛЕ́ТЫ» — наблюдаемые при рахите костные выступы, циркулярно окружающие лучезапястные и (или) голеностопные суставы; обусловлены утолщением и деформацией дистальных эпифизов костей предплечья и голени.

РАХИТИ́ЧЕСКИЕ «ЧЁТКИ» — наблюдаемые при рахите утолщения реберных хрящей в месте их соединения с костными частями ребер.

РАХМА́НОВА КРОВА́ТЬ ДЛЯ РОЖЕНИ́Ц (А. Н. Рахманов, 1861—1926, сов. врач-акушер) — кровать, предназначенная для приема родов; снабжена выдвижной частью и ногодержателями, обеспечивающими удобство выполнения акушерских операций и пособий.

РАХМА́НОВА СПО́СОБ (А. В. Рахманов, 1878—1948, сов. невропатолог) — метод окраски гистологических препаратов нервной ткани путем их импрегнации серебром; нервные волокна окрашиваются в черный или темно-коричневый цвет на желтом фоне.

РАЧКИ́ ВЕСЛОНО́ГИЕ (Copepoda) — отряд членистоногих подкласса жаброногих ракообразных (Branchiopoda); включает промежуточных хозяев широкого лентеца и других лентецов, паразитирующих у человека, а также промежуточных хозяев ришты.

РА́ШКИНДА ПРОЦЕДУ́РА (W. J. Rachkind, род. в 1922 г., амер. хирург; син. атриосептотомия) — паллиативная хирургическая операция, производимая при транспозиции магистральных сосудов у детей раннего возраста; заключается в расширении незаращенного овального отверстия с созданием значительного дефекта межпредсердной перегородки.

РВА́НОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (foramen lacerum, PNA BNA, JNA) — неправильной формы отверстие на основании черепа между вершиной пирамиды и большим крылом клиновидной кости, закрытое пластинкой волокнистого хряща.

РВО́ТА (vomitus, emesis) — непроизвольное выбрасывание содержимого пищеварительного тракта, гл. обр. желудка, через рот (иногда и через нос).

Р. ЖЕ́ЛЧНАЯ (v. felliosus) — Р., при к-рой в рвотных массах постоянно присутствует желчь; наблюдается, напр., при зиянии канала привратника, обусловленном ахилией или сужением двенадцатиперстной кишки.

Р. ИСТЕРИ́ЧЕСКАЯ (v. hysericus) — Р., возникающая как проявление истерии.

Р. КА́ЛОВАЯ (copremesis; син. копремезис — устар.) — Р., при к-рой рвотные массы имеют каловый запах или примесь кала; наблюдается, напр., при непроходимости кишечника, наличии кишечно-желудочного свища.

Р. «КОФЕ́ЙНОЙ ГУ́ЩЕЙ» — кровавая Р., при к-рой рвотные массы имеют черно-коричневый цвет, обусловленный образованием солянокислого гематина при взаимодействии крови с соляной кислотой желудочного сока.

Р. КРОВА́ВАЯ (haematemesis, v. cruentus; син. гематемезис) — Р. кровью или с примесью крови к рвотным массам; возникает при желудочном кровотечении.

Р. МОЗГО́ВАЯ (v. cerebralis) — приступообразная Р., возникающая независимо от приема пищи у больных с органическим поражением головного мозга или его оболочек.

Р. НЕУКРОТИ́МАЯ (hyperemesis; син. гиперемезис) — Р., упорно повторяющаяся по несколько раз в сутки, в т. ч. и ночью; наблюдается, напр., при тяжелых формах инфекционных болезней, отравлениях, токсикозе беременных.

РВО́ТА БЕРЕ́МЕННЫХ (emesis gravidarum) — ранний токсикоз беременных, основным проявлением к-рого является рвота, возникающая независимо от приема пищи.

Р. БЕРЕ́МЕННЫХ НЕУКРОТИ́МАЯ (hyperemesis gravidarum; син. Р. беременных чрезмерная) — тяжелая форма Р. б., характеризующаяся отвращением к пище, многократной рвотой (днем и ночью), значительными нарушениями функций нервной системы и внутренних органов.

Р. БЕРЕ́МЕННЫХ ЧРЕЗМЕ́РНАЯ — см. *Рвота беременных неукротимая*.

РВО́ТНЫЕ СРЕ́ДСТВА (emetica, vomitiva) — лекарственные средства, вызывающие рвоту; действие Р. с. обусловлено избирательным возбуждением хеморецепторов рвотного центра или раздражением чувствительных нервных окончаний в слизистой оболочке желудка.

РГА — см. *Реакция гемагглютинации*.

РЕ- (лат. re-) — приставка, означаю-

щая: «повторное, возобновляемое, воспроизводимое действие», «действие, противоположное (обратное) тому, что выражено основной частью слова», «противодействие».

РЕАБИЛИТА́ЦИЯ (франц. réhabilitation, от лат. приставки *re-* вновь + habilis удобный, приспособленный) в медицине — комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма, а также социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов.

РЕАБРА́ЗИЯ (reabrasio; *ре-* + лат. abrasio соскабливание) — повторное выскабливание стенок полости матки, производимое в случае неполного удаления плодного яйца при выполнении искусственного аборта.

РЕАБСО́РБЦИЯ мочи (*ре-* + *абсорбция*) — обратное всасывание воды и нек-рых растворенных в ней веществ из первичной мочи в кровь, происходящее в почечных канальцах и собирательных трубочках.

Р. ОБЛИГА́ТНАЯ — Р. воды, хлорида натрия, аминокислот, глюкозы и других веществ, происходящая в проксимальном отделе нефрона и не подверженная физиологической регуляции.

Р. ФАКУЛЬТАТИ́ВНАЯ — физиологически регулируемая Р. воды и нек-рых ионов в дистальном отделе нефрона.

РЕАГИ́НЫ (*ре-* + лат. ago действовать; син.: антитела атопические, антитела кожно-сенсибилизирующие) — аллергические антитела (гл. обр., иммуноглобулины Е), способные фиксироваться на нек-рых клетках (лаброцитах, базофильных гранулоцитах) и принимающие участие в развитии атопии и анафилаксии.

РЕАДАПТА́ЦИЯ (*ре-* + *адаптация*) — комплекс мероприятий, направленных на восстановление утраченных или ослабленных реакций человека, содействующих его приспособлению к условиям труда и быта.

Р. МЕДИЦИ́НСКАЯ — Р., включающая комплекс лечебно-профилактических мер, направленных на восстановление физиологических и психофизиологических реакций человека, обеспечивающих его приспособление к определенным условиям труда и быта.

Р. СОЦИА́ЛЬНАЯ — Р., включающая комплекс государственных и общественных мероприятий, направленных на восстановление приспособленности человека к конкретным условиям (гл. обр., социальным) его труда и быта.

РЕАККЛИМАТИЗА́ЦИЯ (*ре-* + *акклиматизация*) — повторное приспособление к ранее привычным условиям после временного пребывания в другой климато-географической зоне.

РЕАКТИВА́ТОРЫ ХОЛИНЭСТЕРА́З (*ре* + лат. activus действенный, деятельный) — лекарственные средства, восстанавливающие активность холинэстераз, напр. после ее угнетения, обусловленного воздействием на организм фосфорорганических соединений.

РЕАКТИВА́ЦИЯ (*ре-* + лат. activus действенный, деятельный) в генетике — восстановление жизнеспособности клеток или вирусов, утраченной в результате воздействия мутагенного или летального фактора.

Р. КАТАЛА́ЗНАЯ — Р. бактерий, подвергнутых ультрафиолетовому облучению, наблюдаемая при добавлении в питательную среду дыхательных ферментов (напр., каталаз) или экстрактов клеток.

Р. КЛЕ́ТКОЙ ХОЗЯ́ИНА — Р. бактериофага, подвергнутого ультрафиолетовому облучению или воздействию нек-рых химических веществ, обусловленная устранением повреждений его дезоксирибонуклеиновой кислоты при участии ферментов бактериальной клетки.

Р. НЕГЕНЕТИ́ЧЕСКАЯ (син. Бери — Дедрика феномен) — Р. вируса, обусловленная присутствием в той же клетке неповрежденного вируса, ферменты к-рого (в частности, транскриптаза) обеспечивают репродукцию инактивированного вируса.

Р. СРЕДО́Й ИНКУБА́ЦИИ — Р. бактерий, подвергнутых ультрафиолетовому облучению, наблюдаемая при изменении питательной среды.

РЕАКТИВА́ЦИЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ — образование жизнеспособного бактериофага при множественном заражении бактериальной клетки бактериофагами, потерявшими жизнеспособность в результате мутаций; обусловлена процессами комплементации, рекомбинации и возможна в том случае, если повреждения генома у разных бактериофагов затрагивают различные его участки.

РЕАКТИВА́ЦИЯ ПЕРЕКРЁСТНАЯ — включение локусов бактериофага, инактивированного ультрафиолетовым облучением, в потомство необлученного жизнеспособного бактериофага при смешанном заражении бактериальной клетки.

РЕАКТИ́ВНОСТЬ (*ре-* + лат. activus действенный, деятельный) в биологии — свойство живого организма реагировать определенным образом на воздействие каких-либо факторов окружающей среды.

Р. ВИДОВА́Я — совокупность особенностей Р., характерных для данного вида живых существ.

Р. ВОЗРАСТНА́Я — совокупность особенностей Р., характерных для данной возрастной группы.

Р. ИММУНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — Р. в виде развития иммунологических реакций на воздействие антигена.

Р. ИНДИВИДУА́ЛЬНАЯ — совокупность особенностей Р., обусловленных отличиями данного индивидуума (особи) от других индивидуумов (особей) того же вида, пола и возраста.

Р. ПАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — Р., возникшая в результате действия на организм патологического раздражителя и характеризующаяся сниженной приспособляемостью организма к окружающим условиям.

Р. ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — Р. в отношении физиологических раздражителей в адекватных условиях существования, носящая защитно-приспособительный характер и направленная на сохранение динамического постоянства внутренней среды организма и на полноценное взаимодействие его с окружающей средой.

РЕАКТИ́ВНЫЕ СОСТОЯ́НИЯ — см. *Психогении.*

РЕАКТИ́ВНЫЕ СОСТОЯ́НИЯ ВОЕ́ННОГО ВРЕ́МЕНИ — см. *Психогении военного времени.*

РЕАКТИ́ВНЫЙ ЦЕНТР — см. *Светлый центр.*

РЕАКТОГЕ́Н ФРЕ́Я — см. *Фрея реактоген.*

РЕАКТОГЕ́ННОСТЬ вакцины (*реакция* + греч. gennaō создавать, порождать) — свойство вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты (повышение температуры тела, местный отек и др.).

РЕА́КЦИЯ (reactio; *ре-* + лат. actio действие; син. Р. психогенная) в психиатрии — общее название патологических изменений психической деятельности, возникающих в ответ на психическую травму или психическое напряжение и находящихся с ними в психологически понятных связях.

Р. АЛКОГО́ЛЬНАЯ ИСТЕРИ́ЧЕСКАЯ (r. alcoholica hysterica) — Р. в виде театральности поведения с преувеличенным реагированием на окружающее; наблюдается у больных хроническим алкоголизмом, обычно во второй его стадии.

Р. АСТЕНИ́ЧЕСКАЯ (r. asthenica) — Р. в виде раздражительной слабости, сопровождающейся бессонницей, пониженным настроением, ипохондрией и субъективным ослаблением памяти.

Р. АФФЕКТИ́ВНО-ШО́КОВАЯ — Р. в виде остро возникающего аффекта страха или ужаса, помрачения сознания и двигательных расстройств; наблюдается при реактивных психозах, обусловленных попаданием в экстремальные условия, создающие опасность для жизни.

Р. АФФЕКТИ́ВНО-ШО́КОВАЯ ГИПЕРКИНЕТИ́ЧЕСКАЯ — Р. а.-ш., при к-рой двигательные расстройства проявляются в форме хаотического возбуждения.

Р. АФФЕКТИ́ВНО-ШО́КОВАЯ ГИПОКИНЕТИ́ЧЕСКАЯ — Р. а. ш., при к-рой двигательные расстройства проявляются в форме ступора.

Р. БЕ́ГСТВА — примитивная Р. в виде беспорядочного, бессмысленного бегства.

Р. ДЕПРЕССИ́ВНАЯ (r. depressiva) — Р. в виде подавленного настроения, тоски с переживаниями, отражающими психическую травму, и двигательной заторможенностью.

Р. ИПОХОНДРИ́ЧЕСКАЯ (r. hypochondriaca) — Р. в виде возникновения у больного убежденности в наличии у него тяжелой болезни.

Р. ИСТЕРИ́ЧЕСКАЯ (r. hysterica) — Р. с проявлениями, характерными для истерии.

Р. МНИ́МОЙ СМЕ́РТИ — примитивная Р. в виде полной обездвиженности.

Р. НЕВРОТИ́ЧЕСКАЯ (r. neurotica) — Р. в форме астенических, истерических расстройств или навязчивых состояний.

Р. ОТРЫВА — Р., возникающая при длительной изоляции человека от коллектива и привычной окружающей обстановки, характеризующаяся напряженностью, возбуждением, беспокойством, страхом или беспричинной веселостью.

Р. ПАРАНО́ИДНАЯ (r. paranoidea) — Р. в виде галлюцинаций и бреда, содержание к-рых в известной

мере отражает обстоятельства, вызвавшие Р.

Р. ПАРАНОЙЯ́ЛЬНАЯ (r. paranoialis) — Р. в форме бреда, в большей или меньшей степени систематизированного, причем его содержание отражает психотравмирующую ситуацию.

Р. ПРИМИТИ́ВНАЯ (син. Кречмера эксплозивная реакция) — Р., обусловленная развитием гипобулических механизмов Кречмера и проявляющаяся импульсивными реакциями паники (оцепенение или бессмысленное убегание), криками или аффективным ступором.

Р. ПРИМИТИ́ВНАЯ БРЕДОВА́Я — Р. в форме бредовой трактовки окружающего с развитием идей преследования или отношения; возникает под влиянием мотивированного аффекта страха.

Р. ПСИХИ́ЧЕСКАЯ ЛИ́ЧНОСТНАЯ — Р., в формировании к-рой отражается склад личности больного и индивидуальные формы его реагирования на определенные переживания.

Р. ПСИХОГЕ́ННАЯ (r. psychogena) — см. *Реакция*.

Р. СУТЯ́ЖНАЯ — Р. в форме бесконечного обращения в различные учреждения с целью отстаивания своих якобы ущемленных прав, предъявления необоснованных притязаний на восстановление якобы попранной справедливости.

Р. ФИКСИ́РОВАННАЯ — Р., закрепившаяся на длительный срок после исчезновения обстоятельств, послуживших причиной психической травмы или сильного эмоционального напряжения.

РЕА́КЦИЯ АВЕ́РСИИ (лат. aversio отворачивание в другую сторону) — защитная реакция организма, представляющая собой его перемещение с целью выхода из сферы действия неблагоприятного раздражителя.

РЕА́КЦИЯ АГГЛЮТИНА́ЦИИ — метод обнаружения и идентификации антител или корпускулярных антигенов, основанный на феномене специфической агглютинации.

РЕА́КЦИЯ АГГЛЮТИНА́ЦИИ ЛЕЙКОЦИ́ТОВ (син. реакция лейкоагглютинации) — метод определения тканевой совместимости донора и реципиента, основанный на феномене агглютинации антилейкоцитарных антител.

РЕА́КЦИЯ АГГЛЮТИНА́ЦИИ С РИККЕТСИО́ЗНЫМ АНТИГЕ́НОМ (РАР) — реакция агглютинации сыворотки крови больного с очищенной и стандартизованной взвесью риккетсий Провацека, выращенных в желточном мешке куриных эмбрионов; используется в диагностике сыпного тифа.

РЕА́КЦИЯ АКТИВА́ЦИИ — см. *Реакция десинхронизации*.

РЕА́КЦИЯ АНАФИЛАКСИ́И С ДЕСЕНСИБИЛИЗА́ЦИЕЙ — метод антигенного анализа, при к-ром сходство антигенов устанавливается по способности одного из них специфически подавлять реактивность морских свинок, сенсибилизированных другим антигеном; выявляется по отсутствию анафилаксии после введения антигена.

РЕА́КЦИЯ «АНТИГЕ́Н — АНТИТЕ́ЛО» — образование комплекса между антигеном и направленными к нему антителами.

РЕА́КЦИЯ БЕРЛИ́НСКОЙ ЛАЗУ́РИ — метод выявления трехвалентного железа в гистологических срезах, основанный на образовании в этом случае темно-синего осадка берлинской лазури при выдерживании срезов в растворе ферроцианида и соляной кислоты.

РЕА́КЦИЯ БЛАСТОТРАНСФОРМА́ЦИИ ЛИМФОЦИ́ТОВ — 1) метод диагностики специфической сенсибилизации организма, основанный на определении интенсивности бластотрансформации лимфоцитов после добавления к их взвеси исследуемого аллергена; 2) метод оценки состояния клеточного иммунитета, основанный на определении интенсивности бластотрансформации лимфоцитов после добавления к их взвеси антигенов или неспецифических стимуляторов.

РЕА́КЦИЯ «ГАПТЕ́Н — АНТИТЕ́ЛО» — образование комплекса между гаптеном и антителами; используется в иммунохимических исследованиях как модель реакции антиген — антитело, а также в реакциях задержки.

РЕА́КЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНА́ЦИИ (РГА) — метод обнаружения и идентификации вирусов, основанный на наличии у нек-рых вирусов способности избирательно агглютинировать эритроциты определенных видов животных.

РЕА́КЦИЯ ДЕСИНХРОНИЗА́ЦИИ (син. реакция активации) — смена высокоамплитудных и низкочастотных колебаний биопотенциалов мозга на низкоамплитудные и высокочастотные; наблюдается, напр., при переходе от сна к бодрствованию.

РЕА́КЦИЯ ЗАДЕ́РЖКИ — метод обнаружения малых концентраций антител, моновалентных гаптенов или поливалентных антигенов, основанный на торможении в их присутс вии реакций преципитации, агглютинации или связывания комплемента вследствие специфического блокирования соответствующих антигенов или антител.

РЕА́КЦИЯ ИМИТА́ЦИИ ПАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (син. эхотимия) — подражание мимическим реакциям окружающих (напр., в виде смеха, плача, выражения испуга или удивления), без развития соответствующего аффекта; наблюдается преимущественно у детей и подростков.

РЕА́КЦИЯ ИММОБИЛИЗА́ЦИИ БЛЕ́ДНЫХ ТРЕПОНЕ́М (РИБТ; син. Нелсона — Мейера реакция) — серологический метод диагностики сифилиса, основанный на феномене обездвиживания бледных трепонем при добавлении к их взвеси сыворотки крови больного сифилисом.

РЕА́КЦИЯ ИММУ́ННОГО ПРИЛИПА́НИЯ — метод определения активности различных антител и антигенов, а также комплемента, основанный на способности комплекса антиген — антитело — комплемент взаимодействовать с тромбоцитами и эритроцитами, что проявляется их прилипанием к поверхности корпускулярного антигена (напр., бактериальной клетки, плазматической или другой соматической клетки животных и человека).

РЕА́КЦИЯ КАТАСТРО́ФЫ — реактивный психоз, возникающий под влиянием чрезвычайных событий (напр., при землетрясении, кораблекрушении); проявляется сумеречным помрачением сознания, хаотическим возбуждением, паническим бегством или оцепенением, иногда приступами крика, смеха, плача, развитием психогенной глухонемоты, парезов и других расстройств.

РЕА́КЦИЯ КОЛЬЦЕПРЕЦИПИТА́ЦИИ — модификация реакции преципитации, при к-рой регистрируют формирование преципитата в виде кольца на границе между растворами антигена и антител.

РЕА́КЦИЯ КОРО́ТКОГО ЗАМЫКА́НИЯ — исключительное состояние, возникающее под влиянием случайной внешней причины на фоне длительно скрываемого интенсивного эмоционального напряжения с доминированием в сознании представлений, связанных с источником этого напряжения.

РЕА́КЦИЯ ЛЕЙКОАГГЛЮТИНА́ЦИИ — см. *Реакция агглютинации лейкоцитов*.

РЕА́КЦИЯ ЛЕЙКО́ЛИЗА — см. *Тест лейкоцитолиза*.

РЕА́КЦИЯ С МЕТИЛЕ́НОВЫМ СИ́НИМ (син. редуктазная проба) — метод определения степени бактериальной загрязненности молока, основанный на феномене ускоренного обесцвечивания введенного в молоко метиленового синего в присутствии бактерий.

РЕА́КЦИЯ НАПРЯЖЕ́НИЯ — комплекс приспособительных реакций организма, направленных на мобилизацию его энергетических и пластических ресурсов.

РЕА́КЦИЯ НАРАСТА́НИЯ ТИ́ТРА ФА́ГА (РНФ) — метод обнаружения бактерий, заключающийся во внесении в исследуемый материал специфического фага и учете его размножения.

РЕА́КЦИЯ НЕЙТРАЛИЗА́ЦИИ в вирусологии — метод идентификации вируса, основанный на феномене потери им инфекционности в результате взаимодействия со специфическими антителами.

РЕА́КЦИЯ НЕЙТРАЛИЗА́ЦИИ ТОКСИ́НА (син. реакция «токсин-антитоксин») — взаимодействие токсина со специфическим антитоксином, приводящее к образованию комплекса, не обладающего токсичностью.

РЕА́КЦИЯ НЕПРЯМО́Й ГЕМАГГЛЮТИНА́ЦИИ (РНГА; син. реакция пассивной гемагглютинации) — метод обнаружения и идентификации антигенов или антител, основанный на возникающем в их присутствии феномене агглютинации эритроцитов, на поверхности к-рых были предварительно адсорбированы соответствующие специфические антитела или антигены.

РЕА́КЦИЯ ОПО́РЫ (син. Магнуса реакция опоры) — патологический рефлекс: сгибание (отрицательная Р. о.) или разгибание (положительная Р. о.) конечности соответственно при пассивном сгибании или разгибании пальцев; наблюдается при поражении мозжечка, лобной или височной доли большого мозга, а также их проводящих путей.

РЕА́КЦИЯ ОППОЗИ́ЦИИ ПАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — появление у детей и подростков отклонений в поведении, имеющих характер противопоставления поведению окружающих лиц (родителей, педагогов и др.).

РЕА́КЦИЯ ОСЕДА́НИЯ ЭРИТРОЦИ́ТОВ (РОЭ; син. скорость оседания эритроцитов) — показатель, отражающий изменения физико-химических свойств крови и измеряемый величиной столба плазмы, освобождающейся от

эритроцитов при их оседании из цитратной смеси в специальной пипетке (как правило, за один час).

РЕА́КЦИЯ ОТКЛОНЕ́НИЯ — см. *Рефлекс вестибулоспинальный.*

РЕА́КЦИЯ ОТКЛОНЕ́НИЯ КОМПЛЕМЕ́НТА (устар.) — см. *Реакция связывания комплемента.*

РЕА́КЦИЯ ОТКЛОНЕ́НИЯ РУК — см. *Отана феномен.*

РЕА́КЦИЯ ОТТОРЖЕ́НИЯ ТРАНСПЛАНТА́ТА (син. реакция «хозяин против трансплантата») — иммунный ответ организма реципиента на трансплантацию генетически чужеродных органов и тканей, приводящий к их омертвению.

РЕА́КЦИЯ ПАССИ́ВНОЙ АГГЛЮТИНА́ЦИИ — метод обнаружения и идентификации антигенов или антител, основанный на возникающем в их присутствии феномене агглютинации нейтральных частиц (напр., латекса) или эритроцитов, на поверхности к-рых адсорбированы соответствующие специфические антитела или антигены.

РЕА́КЦИЯ ПАССИ́ВНОЙ ГЕМАГЛЮТИНА́ЦИИ (РПГА) — см. *Реакция непрямой гемагглютинации.*

РЕА́КЦИЯ ПОДЪЁМА СПОНТА́ННАЯ — непроизвольное медленное поднимание вытянутых вперед рук при закрытых глазах; относится к рефлексам Магнуса — Клейна.

РЕА́КЦИЯ ПРЕЦИПИТА́ЦИИ — метод обнаружения и идентификации антител или растворимых антигенов, основанный на феномене преципитации.

РЕА́КЦИЯ ПРОМА́ХИВАНИЯ — см. *Барани указательная проба.*

РЕА́КЦИЯ СВЯЗЫВАНИЯ КОМПЛЕМЕ́НТА (РСК; син.: Борде — Жангу реакция, реакция отклонения комплемента — устар., реакция фиксации алексина — устар.) — метод серологического исследования, основанный на способности образующегося комплекса антиген — антитело связывать комплемент, что выявляется по отсутствию гемолиза при добавлении гемолизина и эритроцитов.

РЕА́КЦИЯ СИНХРОНИЗА́ЦИИ — увеличение регулярности ритма колебаний биопотенциалов мозга с одновременным увеличением их амплитуды и уменьшением частоты; наблюдается, напр., при переходе от бодрствования ко сну.

РЕА́КЦИЯ «ТОКСИ́Н — АНТИТОКСИ́Н» — см. *Реакция нейтрализации токсина.*

РЕА́КЦИЯ ТО́НУСА РУК — см. *Водака — Фишера проба.*

РЕА́КЦИЯ ТОРМОЖЕ́НИЯ ГЕМАГЛЮТИНА́ЦИИ (РТГА) — метод идентификации вируса или выявления противовирусных антител в сыворотке крови больного, основанный на феномене отсутствия агглютинации эритроцитов препаратом, содержащим вирус, в присутствии иммунной к нему сыворотки крови.

РЕА́КЦИЯ ТОРМОЖЕ́НИЯ МИГРА́ЦИИ МАКРОФА́ГОВ (син. тест торможения миграции макрофагов) — метод оценки клеточного иммунитета или сенсибилизации замедленного типа, с помощью к-рого выявляют продуцируемый активированными лимфоцитами неспецифический фактор, подавляющий миграцию макрофагов под влиянием антигена.

РЕА́КЦИЯ «ТРАНСПЛАНТА́Т ПРО́ТИВ ХОЗЯ́ИНА» — см. *Болезнь гомологичная.*

РЕА́КЦИЯ ФИКСА́ЦИИ АЛЕКСИ́НА (устар.) — см. *Реакция связывания комплемента.*

РЕА́КЦИЯ «ХОЗЯ́ИН ПРО́ТИВ ТРАНСПЛАНТА́ТА» — см. *Реакция отторжения трансплантата.*

РЕАМПУТА́ЦИЯ (reamputatio; *ре-* + *ампутация*; син. ампутация повторная) — повторно производимая ампутация с лечебной целью или для обеспечения возможности протезирования.

РЕАНИМАТОЛО́ГИЯ (*реанимация* + греч. logos учение, наука) — область клинической медицины, изучающая патогенез процессов и явлений, возникающих в организме при пограничных со смертью состояниях и в восстановительном периоде после перенесенной клинической смерти, и разрабатывающая методы реанимации и интенсивной терапии.

РЕАНИМА́ЦИЯ (reanimatio; *ре-* + лат. animatio одушевленность, оживление; син. оживление организма) — комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление угасающих или только что угасших жизненно важных функций организма.

РЕАНКИЛО́З СТРЕ́МЕНИ (reankylosis stapedis; *ре-* + *анкилоз*) — повторная фиксация («анкилоз») стремени в области овального окна, возникающая иногда через нек-рое время после хирургической мобилизации стремени по поводу отосклероза.

РЕ́БЕРГА ПРО́БА (R. B. Rehberg, род. в 1895 г., датский физиолог) — метод исследования функции почек путем определения почечного клиренса креатинина, введенного внутривенно.

РЕ́БЕРГА — ТАРЕ́ЕВА ПРО́БА (R. B. Rehberg, род. в 1895 г., датский физиолог; Е. М. Тареев, род. в 1895 г., сов. клиницист) — метод исследования функции почек путем определения почечного клиренса креатинина, исходно содержащегося в крови (без его дополнительного введения).

РЕ́БЕРНАЯ ВЕТВЬ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (ramus costalis lateralis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *192.*

РЕ́БЕРНАЯ ДУГА́ (arcus costarum, PNA, BNA, JNA) — костно-хрящевое образование дугообразной формы, состоящее из соединенных между собой реберных хрящей VIII — X ребер и костных частей X ребер; ограничивает грудную клетку снизу.

РЕ́БЕРНО-ДИАФРА́ГМАЛЬНОЕ УГЛУБЛЕ́НИЕ (recessus costodiaphragmaticus, PNA) — см. *Рёберно-диафрагмальный синус.*

РЁБЕРНО-ДИАФРАГМА́ЛЬНЫЙ СИ́НУС (recessus costodiaphragmaticus, PNA; sinus phrenicocostalis, BNA, JNA; син. реберно-диафрагмальное углубление) — глубокий плевральный синус, расположенный в месте перехода реберной плевры в диафрагмальную.

РЁБЕРНО-МЕДИАСТИНА́ЛЬНОЕ УГЛУБЛЕ́НИЕ (recessus costomediastinalis) — см. *Реберно-медиастинальный синус.*

РЁБЕРНО-МЕДИАСТИНА́ЛЬНЫЙ СИ́НУС (recessus costomediastinalis, PNA; sinus costomediastinalis, BNA, JNA; син.: реберно-медиастинальное углубление, реберно-средостенный синус) — плевральный синус, расположенный вертикально в месте перехода реберной плевры спереди и сзади в медиастинальную.

РЁБЕРНО-ПОПЕРЕ́ЧНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (foramen costotransversarium, PNA, BNA, JNA) — промежуток между передней поверхностью поперечного отростка грудного позвонка и задней поверхностью шейки соответствующего ребра, заполненный связкой шейки ребра.

РЁБЕРНО-СРЕДОСТЕ́ННЫЙ СИ́НУС (sinus costomediastinalis) — см. *Реберно-медиастинальный синус.*

РЁБЕРНО-ШЕ́ЙНЫЙ СТВОЛ (truncus costocervicalis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *193.*

РЁБЕРНЫЕ ВЫРЕ́ЗКИ (incisurae costales, PNA, BNA, JNA) — выемки на латеральных краях тела грудины; места соединения грудины с реберными хрящами.

РЁБЕРНЫЙ ОТРО́СТОК (processus costarius, PNA, BNA, JNA) — часть поперечных отростков шейных и поясничных позвонков, являющаяся рудиментом ребра.

РЕБРО́(-А) (costa, -ae, PNA, BNA, JNA) — парные длинные изогнутые плоские кости грудной клетки, состоящие из костной части и реберного хряща; у человека имеется 12 пар Р.

Р. ГРУДИ́ННЫЕ (c. sternales, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *30.*

Р. ДОБА́ВОЧНОЕ (c. accessoria) — Р., развивающееся как аномалия развития с одной или обеих сторон у шейных или поясничных позвонков.

Р. И́СТИННЫЕ (c. verae, PNA, BNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *30.*

Р. КОЛЕ́БЛЮЩИЕСЯ (c. fluctuantes, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *26.*

Р. ЛО́ЖНЫЕ (c. spuriae, PNA, BNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *28.*

Р. ПОЯСНИ́ЧНОЕ (c. lumbalis) — добавочное Р. у I., реже у II поясничного позвонка.

Р. ШЕ́ЙНОЕ (c. cervicalis) — добавочное Р. у VII, реже у VI шейного позвонка.

РЕБРОСБЛИЖА́ТЕЛЬ (истор.) — инструмент для сближения ребер между собой при зашивании раны грудной клетки.

РЕВАКЦИНА́ЦИЯ (*ре-* + *вакцинация*) — повторное введение вакцины в отдаленные сроки после первичной вакцинации.

РЕВАСКУЛЯРИЗА́ЦИЯ (revascularisatio; *ре-* + *васкуляризация*) — восстановление сосудов в каком-либо участке ткани или органа, сосудистая сеть к-рого была разрушена воспалительным, некротическим или склеротическим процессом.

РЕВЕ́НКО КРОНШТЕ́ЙН (Т. А. Ревенко, род. в 1919 г., сов. хирург-травматолог) — устройство для внутрикостной фиксации проксимального отдела бедра, состоящее из двух браншей: проксимальной, имеющей Г-образную форму, и дистальной, выполненной в форме косы, скрепляемых между собой замком.

РЕВЕРБЕРА́ЦИЯ ВОЗБУЖДЕ́НИЯ (лат. reverbero отбрасывать, отражать) — длительная циркуляция импульсов возбуждения в сетях нейронов

или между различными структурами ц. н. с.

РЕВЕРДЕ́НА ЗАЖИ́М (J. L. Reverdin, 1842—1929, швейц. хирург) — хирургический зажим с эластичными окончатыми рабочими губками овальной формы, слегка изогнутыми по ребру.

РЕВЕРДЕ́НА ИГЛА́ (истор.; J. L. Reverdin) — лигатурная игла с S-образным изгибом рабочей части, отличающаяся от иглы Дешана тем, что вместо ушка на конце имела прорезь, закрывавшуюся заслонкой, управление к-рой осуществлялось с помощью кнопки, расположенной вблизи рукоятки.

РЕВЕРДЕ́НА КО́ЖНАЯ ПЛА́СТИКА (J. L. Reverdin) — кожная пластика свободными лоскутами эпидермиса, накладываемыми на всю гранулирующую поверхность раны так, что каждый лоскут частично накрывает соседний (по типу черепицы).

РЕВЕРДЕ́НА — ЯНО́ВИЧА-ЧАЙНСКОГО — ОЛЛЬЕ́ КО́ЖНАЯ ПЛА́СТИКА (J. L. Reverdin, 1842—1929, швейц. хирург; С. М. Янович-Чаинский, 1834—1903, отеч. хирург; L. L. X. E. Ollier, 1830—1900, франц. хирург) — кожная пластика свободными лоскутами кожи, включающими сосочковый слой и эпидермис, накладываемыми на гранулирующую поверхность раны в виде многочисленных мелких островков.

РЕВЕ́РСИЯ (лат. reversio круговорот, возврат; син.: мутация обратная, мутация ревертирующая) в генетике — возврат потомства мутантной особи к исходному фенотипу.

РЕВЕ́РСИЯ ГЕТЕРОПИКНО́ЗА — способность хромосом проявлять себя положительно или отрицательно гетеропикнотически.

РЕВЕРТА́ЗА — см. *Транскриптаза обратная*.

РЕВИЙО́ СИМПТО́М (L. Revilliod, 1835—1919, швейц. терапевт; син. симптом раздельного зажмуривания глаз) — неспособность зажмурить глаз на стороне пареза лицевого нерва при сохранении способности одновременно зажмурить оба глаза.

РЕВМАТИ́ЗМ (rheumatismus; греч. rheumatismos течение, истечение жидкости, патологические выделения; син. Сокольского — Буйо болезнь) — инфекционно-аллергическая болезнь, этиологически связанная со стрептококком группы А, характеризующаяся системным воспалением соединительной ткани с преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе и рецидивирующим течением.

РЕВМАТИ́ЗМ ВТОРИ́ЧНЫЙ (устар.; rheumatismus secundarius) — см. *Полиартрит инфекционно-аллергический*.

РЕВМАТИ́ЗМ МОЗГОВО́Й (устар.; rheumatismus cerebralis) — общее название различных форм поражения ткани и сосудов головного мозга ревматической природы (напр., малая хорея).

РЕВМАТИ́ЗМ МЫШЕ́ЧНЫЙ ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ (устар.; rheumatismus muscularis epidemicus) — см. *Плевродиния эпидемическая*.

РЕВМАТИ́ЗМ ПУСТЫ́ННЫЙ (устар.) — см. *Кокцидиоидоз*.

РЕВМАТИ́ЗМ СУСТАВНО́Й ПОДО́СТРЫЙ ВЗРО́СЛЫХ (устар.) — см. *Полиартрит инфекционно-аллергический*.

РЕВМАТИ́ЗМ ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ (устар.; rheumatismus epidemicus) — см. *Плевродиния эпидемическая*.

РЕВМАТИ́ЧЕСКАЯ АТА́КА (син. ревматический приступ) — клинически выраженная активная фаза ревматизма.

РЕВМАТИ́ЧЕСКАЯ ТРИА́ДА в психиатрии — сочетание депрессии, галлюцинаций и моторной заторможенности, характерное для выраженного ревматического психоза.

РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ ПРИ́СТУП — см. *Ревматическая атака*.

РЕВМАТО- (ревмо-; лат. rheuma и rheumatismus от греч. rheuma и rheumatismos течение, истечение жидкости, патологические выделения) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к ревматизму».

РЕВМАТО́ИДНЫЙ ФА́КТОР (РФ) — антитела к Fc-фрагменту иммуноглобулина G; обнаруживается в сыворотке крови при ревматоидном артрите и нек-рых других болезнях.

РЕВМАТОЛО́ГИЯ (*ревмато-* + греч. logos учение, наука) — раздел внутренних болезней, изучающий группу болезней, для к-рых характерно системное поражение соединительной ткани, внутренних органов и суставов.

РЕВМО- — см. *Ревмато-*.

РЕВМОКАРДИ́Т (rheumocarditis; *ревмо-* + *кардит*; син. кардит ревматический) — воспаление всех или отдельных слоев стенки сердца при ревматизме; характеризуется мукоидным набуханием и фибриноидными изменениями соединительной ткани, образованием ревматических гранулем и развитием склероза.

Р. ВОЗВРА́ТНЫЙ (r. recurrens) — Р., развивающийся повторно на фоне уже сформировавшегося порока сердца, миокардиофиброза и (или) перикардиальных сращений.

Р. ЛАТЕ́НТНЫЙ (r. latens) — Р., при к-ром отсутствуют основные клинические признаки болезни.

Р. ПЕРВИ́ЧНЫЙ (r. primaria) — Р., развивающийся в течение первой ревматической атаки.

РЕ́ВНОСТЬ СВЕРХЦЕ́ННАЯ — сверхценная идея супружеской неверности, сопровождающаяся сомнениями, аффектом тревоги и злобностью.

РЕГЕНЕРА́Т (лат. regeneratus возрожденный, восстановленный; *ре-* + genero, generatum порождать, производить) — 1) комплекс незрелых пролиферирующих клеток ткани в зоне повреждения; 2) заново образовавшаяся в результате регенерации часть организма.

РЕГЕНЕРАЦИО́ННЫЙ ЗАЧА́ТОК — группа клеток, с к-рой начинается регенерация.

РЕГЕНЕРА́ЦИЯ (лат. regeneratio возрождение, восстановление; *ре-* + genero, generatum порождать, производить) в биологии — восстановление организмом утраченных или поврежденных частей.

Р. ВНУТРИКЛЕ́ТОЧНАЯ (син. Саркисова внутриклеточная регенерация) — Р. поврежденных органоидов и мембранных структур клетки; характерна для клеток миокарда, нервной системы.

Р. КЛЕ́ТОЧНАЯ — Р. органов или тканей путем размножения неповрежденных клеток; характерна для покровного эпителия, соединительной ткани.

Р. НЕПО́ЛНАЯ (син. субституция) — Р., при к-рой погибшие участки замещаются тканью иного вида (обычно грануляционной, а затем рубцом).

Р. ПАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — 1) см. *Регенерация репаративная*; 2) Р., характеризующаяся замедленным течением процессов заживления или избыточным развитием замещающей ткани.

Р. ПО́ЛНАЯ (син. реституция) — Р., при к-рой погибшие участки замещаются тканью того же вида и той же структуры.

Р. РЕПАРАТИ́ВНАЯ (син.: Р. патологическая, репарация) — Р. участков органов или тканей, погибших в результате какого-либо патологического процесса.

Р. ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — Р. тканей, отмирающих в процессе нормальной жизнедеятельности организма, напр. Р. эпидермиса.

РЕГЕНЕРА́ЦИЯ ВО́ЗДУХА — восстановление нормального химического состава воздуха, изменившегося вследствие жизнедеятельности людей, работы технических устройств и др.

РЕГЕНЕРА́ЦИЯ ЛЕЧЕ́БНОЙ ГРЯ́ЗИ — восстановление лечебных свойств и самоочищение использованной лечебной грязи, обеспечивающие возможность ее повторного применения.

РЕГИ́СТР ГО́ЛОСА — участок диапазона певческого голоса, характеризующийся единым тембром в связи с одним и тем же механизмом голосообразования; различают головной, грудной и смешанный Р. г., а у мужчин и фальцетный.

РЕГИСТРАТУ́РА (лат. registro, registratum вносить в список) — подразделение амбулаторно-поликлинического учреждения, осуществляющее запись больных на прием к врачу при первичном обращении, регулирование их потока, хранение медицинских карт, регистрацию листков нетрудоспособности.

РЕГИСТРИ́РУЮЩЕЕ УСТРО́ЙСТВО — устройство для записи результатов исследования на носителе информации; Р. у. различного типа применяются в медицинских приборах.

РЕГО́ ЖИ́ДКОСТЬ (C. F. Regaud, 1870—1940, франц. гистолог и радиобиолог) — жидкость для фиксации гистологических препаратов, представляющая собой смесь 4 частей 3% раствора бихромата калия с 1 частью формалина.

РЕГРЕДИЕ́НТНОСТЬ в психиатрии — развитие психической болезни с ослаблением позитивных, а в ряде случаев и негативных психических симптомов; характерна, напр., для психических расстройств при черепно-мозговой травме, прогрессивного паралича в стадии ремиссии.

РЕГРЕ́СС (лат. regressus возвращение, отступление) в биологии — упрощение строения организмов в процессе их исторического развития под влиянием изменившихся условий существования.

РЕГРЕССИ́ВНЫЙ ТИП НАСЕЛЕ́НИЯ — см. *Возрастная структура населения регрессивная*.

РЕГРЕ́ССИЯ (лат. regressio отступление, отход) в статистике — мера изменения признака при изменении на определенную величину другого, коррелирующего с ним признака.

РЕГУЛИ́РОВАНИЕ (лат. regulo упорядочивать, регулировать) в ки-

бернетике — поддержание постоянства или изменение в желательном направлении значения нек-рого параметра, характеризующего управляемый процесс.

Р. АВТОМАТИ́ЧЕСКОЕ — Р. при помощи автоматических устройств.

Р. КОМПЕНСИ́РУЮЩЕЕ — Р., направленное на устранение вызванных каким-либо фактором изменений регулируемого параметра.

РЕ́ГУЛЫ (regulae; лат. regula норма, правило) — см. *Менструация.*

РЕГУРГИТА́ЦИЯ (франц. regurgitation; от *ре-* + лат. gurgitus хлынувший) — перемещение содержимого полого органа в направлении, противоположном физиологическому в результате сокращения его мышц.

РЕ́ДЕРА СИМПТО́М (A. R. Reder, 1826—1904, австрийский хирург) — болезненность брюшной стенки в точке, расположенной несколько ниже и медиальнее точки Мак-Бернея; один из признаков аппендицита.

РЕ́ДЕРА СИНДРО́М (G. J. Raeder, 1889—1956, норвежский офтальмолог; син. синдром паратригеминальный) — приступообразная сильная односторонняя головная боль, преимущественно в области глазницы, возникающая чаще по утрам и утихающая в середине дня; обусловлен наличием локального патологического процесса (напр., опухоли) в непосредственной близости от ганглия тройничного нерва.

РЕ́ДЕРЕРА АСИНКЛИТИ́ЗМ (J. G. Roederer, 1727—1763, нем. акушер) — клиновидное вставление головки плода с глубоким стоянием малого родничка; наблюдается при общеравномерносуженном тазе.

РЕ́ДИЯ — стадия развития трематод, образующаяся внутри спороцисты в теле промежуточного хозяина — моллюска.

РЕ́ДЛИХА СИМПТО́М (E. Redlich, 1866—1930, австрийский психиатр) — мидриаз и исчезновение реакции зрачков на свет при истерическом припадке, сопровождающемся сильным мышечным напряжением.

РЕ́ДЛИХА ЭНЦЕФАЛИ́Т (E. Redlich) — см. *Редлиха — Флатау болезнь.*

РЕ́ДЛИХА — ФЛАТА́У БОЛЕ́ЗНЬ (E. Redlich, 1866—1930, австрийский психиатр; E. Flatau, 1869—1932, польский невропатолог; син.: Редлиха энцефалит, энцефаломиелит диссеминированный абортивный) — форма энцефаломиелита, характеризующаяся легким течением, проявляющаяся чаще парестезиями и изменениями сухожильных рефлексов.

РЕДРЕССА́ТОР (франц. redresser выпрямлять, выправлять) — ортопедический аппарат для насильственного исправления неправильного положения позвонков, костей стопы или других частей скелета.

РЕДРЕССА́ТОР - ОСТЕОКЛА́СТ ШТИ́ЛЛЕ — см. *Штилле редрессатор-остеокласт.*

РЕДРЕССА́ЦИЯ (франц. redresser выпрямлять, выправлять) — насильственное исправление деформации конечности или позвоночника путем последовательного растяжения и сжатия тканей или одновременного их растяжения в одном направлении и сжатия в другом; применяется при контрактурах, фиброзных анкилозах или неправильно сращающихся переломах в стадии провизорной костной мозоли.

Р. ПО ЛО́РЕНЦУ — см. *Лоренца редрессация.*

Р. ПОЗВОНО́ЧНИКА ПО ДЕ́ЙВИСУ — см. *Дейвиса редрессация позвоночника.*

Р. ПОЗВОНО́ЧНИКА ПО УО́ТСОН-ДЖО́НСУ — см. *Уотсон-Джонса редрессация позвоночника.*

РЕДУКТА́ЗНАЯ ПРО́БА — см. *Реакция с метиленовым синим.*

РЕДУКЦИОНИ́ЗМ — 1) естественнонаучная методология, утверждающая возможность и необходимость познания сложных интегративных процессов и явлений путем их сведения к более простым (элементарным) процессам и явлениям (напр., биологических к молекулярно-биологическим); в сочетании с другими научными методами и прежде всего диалектикой составляет фундамент научного познания объективной реальности; 2) направление в современной буржуазной философии, ограничивающее познание сложных интегративных процессов и явлений путем сведения их к более простым (элементарным) процессам и явлениям; разновидность механицизма.

РЕДУКЦИО́ННОЕ ТЕ́ЛЬЦЕ — см. *Полярное тельце.*

РЕДУ́КЦИЯ[1] (лат. reductio отведение назад, возвращение, восстановление) в биологии — уменьшение размеров, упрощение структуры или полная утрата органа, ткани или клетки в ходе исторического развития (филогенеза).

РЕДУ́КЦИЯ[2] в цитологии — регенерация ультраструктур или восстановление биохимических констант клетки после ее обратимого повреждения.

РЕДУ́КЦИЯ[3] (син. гаплозис — устар.) в генетике — уменьшение соматического числа хромосом вдвое; происходит при образовании половых клеток.

Р. ИЗБИРА́ТЕЛЬНАЯ (син. деление созревания избирательное) — Р., при к-рой происходит предпочтительное отхождение определенных хромосом или их сегментов к одному полюсу в первом делении мейоза.

РЕДУ́КЦИЯ ЭНЕРГЕТИ́ЧЕСКОГО ПОТЕНЦИА́ЛА (син. динамическое опустошение) — психическое расстройство, проявляющееся снижением психической активности и продуктивности, невозможностью целенаправленного использования сохраняющихся знаний и опыта при отсутствии нарушений интеллекта и памяти.

РЕДУОДЕНИЗА́ЦИЯ (*ре-* + анат. duodenum двенадцатиперстная кишка) — см. *Гастроеюнодуоденопластика.*

РЕДУПЛИКА́ЦИЯ (*ре-* + лат. duplicatio удвоение) — процесс воспроизведения дезоксирибонуклеиновой кислоты в клетке.

РЕДУЦЕ́НТЫ (лат. reduco отводить назад, возвращать, восстанавливать; от *ре-* + duco вести) — организмы, минерализующие органические вещества, в т. ч. продукты диссимиляции других организмов; к Р. относятся бактерии и грибы.

РЕЖИ́М ДВИ́ГАТЕЛЬНОЙ АКТИ́ВНОСТИ — см. *Режим движений.*

РЕЖИ́М ДВИЖЕ́НИЙ (син.: двигательный режим, режим двигательной активности) — часть общего режима больного, регламентирующая в соответствии с медицинскими показаниями активную мышечную деятельность, включая занятия физическими упражнениями, трудовые процессы, прогулки и др.

РЕЖИ́М МИНЕРА́ЛЬНЫХ ВОД — совокупность параметров минеральных вод определенного месторождения или источника (дебит, температура, химический состав и др.) с учетом их изменений под влиянием природных и антропогенных факторов.

РЕЖИ́М ПИТА́НИЯ (син. пищевой режим) — количественная и качественная характеристика питания, включающая кратность, время приема пищи и распределение ее по калорийности и химическому составу, а также поведение человека во время еды.

РЕЖИ́М ТРУДА́ И О́ТДЫХА — система сочетания периодов работы и отдыха, определяющая их длительность, содержание и порядок чередования; различают внутрисменный, суточный, недельный и годовой Р. т. и о.

РЕЖИ́СА ОНИРИ́ЧЕСКИЙ БРЕД (E. Régis, 1855—1911, франц. психиатр; син. ониризм) — сочетание делирия с онейроидным синдромом, наблюдаемое при экзогенных психозах.

РЕ́ЗЕ МЕ́ТОД КРАНИОГРАФИ́И (Rhese) — прицельная рентгенография глазницы в проекции, позволяющей выявить канал зрительного нерва.

РЕЗЕКТОСКО́П (лат. resectio отсечение + греч. skopeō смотреть, наблюдать) — см. *Резектоскоп-цистоскоп.*

РЕЗЕКТОСКО́П-ЦИСТОСКО́П (*резектоскоп* + *цистоскоп*; син.: резектоскоп, резектоцистоскоп) — цистоскоп, снабженный режущей петлей или коагулятором, подключенными к генератору тока высокой частоты; предназначен для удаления под визуальным контролем тканей, суживающих шейку мочевого пузыря, напр. при аденоме предстательной железы.

РЕЗЕКТОЦИСТОСКО́П (лат. resectio отсечение + греч. kystis мочевой пузырь + skopeō смотреть, наблюдать) — см. *Резектоскоп-цистоскоп.*

РЕЗЕ́КЦИЯ (resectio; лат. «отсечение») — хирургическая операция: удаление части органа или анатомического образования, обычно с соединением его сохраненных частей.

Р. АРТЕ́РИИ — см. *Артериэктомия.*

Р. АРТРОПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (r. arthroplastica) — моделирующая резекция суставов, при к-рой вновь сформированные суставные поверхности покрывают ауто- или аллотрансплантатом (обычно фасциальным) для предотвращения их сращения.

Р. ЖЕЛУ́ДКА НА ВЫКЛЮЧЕ́НИЕ (син.: выключение привратника, Р. желудка паллиативная) — Р. желудка по способу Бильрот-II при низко расположенной, недоступной удалению язве двенадцатиперстной кишки, производимая так, что язва остается в культе кишки, но оказывается выключенной из пути движения пищи по пищеварительному тракту.

Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО ГО́ФМЕЙСТЕРУ — см. *Гофмейстера резекция желудка.*

Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО ГО́ФМЕЙСТЕРУ — ФИНСТЕРЕРУ — см. *Гофмейстера — Финстерера резекция желудка.*

Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО КЕ́ЛЛИНГУ — МАДЛЕ́НЕРУ — см. *Келлинга — Мадленера резекция желудка.*

Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО КО́ХЕРУ — см. *Кохера резекция желудка.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО МИКУ́ЛИЧУ — см. *Микулича резекция желудка.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО МО́ЙНИХЕНУ — см. *Мойнихена резекция желудка.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПАЛЛИАТИ́ВНАЯ (r. ventriculi palliativa) — см. *Резекция желудка на выключение.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПИЛОРОАНТРА́ЛЬНАЯ (r. ventriculi pyloroantralis; анат. antrum pyloricum преддверие привратника) — Р. желудка, при к-рой удаляют его привратниковую часть.
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО РЕ́ЙХЕЛЮ — ПО́ЛИА — см. *Рейхеля — Полиа резекция желудка.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО РУ — см. *Ру гастроэнтеростомия.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО СПАСОКУКО́ЦКОМУ — ВИ́ЛЬМСУ — см. *Спасокукоцкого — Вильмса резекция желудка.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА СТУПЕ́НЧАТАЯ — Р. желудка, при к-рой его рассекают от середины большой кривизны в поперечном направлении до оси органа, а затем в направлении кардиальной части, где пересекают малую кривизну; применяется при высоко расположенной язве малой кривизны.
Р. ЖЕЛУ́ДКА СУБТОТА́ЛЬНАЯ (r. ventriculi subtotalis) — Р. желудка, при к-рой оставляют только его кардиальную часть и дно; применяется при высоком расположении язвы или при раке желудка.
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО ФИНСТЕРЕРУ — см. *Финстерера резекция желудка.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО ХО́ЛДИНУ — см. *Холдина резекция желудка.*
Р. ЖЕЛУ́ДКА ПО ЭЙЗЕЛЬСБЕРГУ — см. *Эйзельсберга резекция.*
Р. ЗАПЯ́СТЬЯ ПО КЛА́ППУ — см. *Клаппа резекция.*
Р. ЗО́БА ПО МИКУ́ЛИЧУ — см. *Микулича резекция зоба.*
Р. ЗО́БА ПО МИКУ́ЛИЧУ — МАРТЫ́НОВУ — см. *Микулича резекция зоба.*
Р. ЗО́БА ПО НИКОЛА́ЕВУ — см. *Николаева резекция зоба.*
Р. ИЛЕОЦЕКА́ЛЬНАЯ (r. ileocaecalis; анат. ileum подвздошная кишка + caecum слепая кишка) — Р. кишечника, при к-рой удаляют терминальный отдел подвздошной кишки и всю слепую кишку с последующим наложением анастомоза между подвздошной и поперечной ободочной кишкой.
Р. КАРДИ́И ПО РУ́МПЕЛЮ — см. *Румпеля резекция кардии.*
Р. КОЛЕ́ННОГО СУСТА́ВА ПО ВОЛКО́ВИЧУ — см. *Волковича резекция.*
Р. КОЛЕ́ННОГО СУСТА́ВА ПО КО́РНЕВУ — см. *Корнева резекция.*
Р. КОЛЕ́ННОГО СУСТА́ВА ПО СТАРКО́ВУ — ДЬЯ́КОНОВУ — см. *Старкова — Дьяконова резекция.*
Р. КОСТЕ́Й ПРЕДПЛЕ́ЧЬЯ ПО БОГДА́НОВУ — см. *Богданова резекция.*
Р. КОСТЕ́Й ПРЕДПЛЕ́ЧЬЯ ПО МИКУ́ЛИЧУ — ГЕ́НЛЕ — см. *Микулича — Генле резекция.*
Р. ЛЁГКОГО СЕГМЕНТА́РНАЯ (r. pulmonis segmentalis) — см. *Сегментэктомия.*
Р. ЛОКТЕВО́ГО СУСТА́ВА ПО КО́ХЕРУ — см. *Кохера резекция локтевого сустава.*
Р. МЕЖЛОПА́ТОЧНО-ГРУДНА́Я — см. *Тихова — Линберга операция.*
Р. ПО МЕ́ЛЬНИКОВУ — см. *Мельникова резекция.*
Р. НАДПО́ЧЕ́ЧНИКОВ — см. *Адреналэктомия.*
Р. НОСОВО́Й ПЕРЕГОРО́ДКИ ПО ВОЯ́ЧЕКУ — см. *Воячека резекция.*
Р. НОСОВО́Й ПЕРЕГОРО́ДКИ ПОДСЛИ́ЗИСТАЯ (r. septi nasi submucosa) — см. *Киллиана операция.*
Р. ПАНКРЕАТОДУОДЕНА́ЛЬНАЯ (r. pancreatoduodenalis; син. панкреатодуоденэктомия частичная) — Р. поджелудочной железы вместе с частью двенадцатиперстной кишки с последующим восстановлением путей прохождения желудочного содержимого, желчи и секрета поджелудочной железы.
Р. ПРЯМО́Й КИШКИ́ ПО МИКУ́ЛИЧУ — НИКОЛАДО́НИ — см. *Микулича — Николадони резекция прямой кишки.*
Р. СИГМОВИ́ДНОЙ КИШКИ́ ПО ГРЕ́КОВУ — см. *Грекова резекция.*
Р. СЛИЗИСТОЙ ПРЯМО́Й КИШКИ́ ПО БИ́РУ — см. *Склифосовского — Рена — Делорма — Бира операция.*
Р. СТОПЫ́ ПО КУ́СЛИКУ — см. *Куслика резекция стопы.*
Р. СУСТА́ВА МОДЕЛИ́РУЮЩАЯ — Р. сустава с формированием суставных поверхностей, по форме приближенных к нормальным, с целью восстановления подвижности сустава.
Р. СУСТА́ВА РАСШИРЕ́ННАЯ — Р. сустава, при к-рой полностью удаляют суставные концы костей; применяется, напр., при опухолях, эпифизарных остеомиелитах.
Р. СУСТА́ВА ЭКОНО́МНАЯ — Р. сустава, при к-рой удаляют суставной хрящ с тонким слоем подлежащей эпифизарной кости с целью последующего получения анкилоза.
Р. ТА́ЗА ПО БА́ДГЛИ — см. *Бадгли резекция таза.*
Р. ТА́ЗА ПО ВО́ЙНО-ЯСЕНЕ́ЦКОМУ — см. *Войно-Ясенецкого резекция таза.*
Р. ТЕЛ ПОЗВОНКО́В ПО РО́ФУ — см. *Рофа резекция.*
Р. ТО́ЛСТОЙ КИШКИ́ ПО МИКУ́ЛИЧУ — см. *Микулича резекция толстой кишки.*

РЕЗЕ́РВ ДЫХА́НИЯ — разность между величиной максимальной вентиляции легких и минутным объемом дыхания в покое.

РЕЗЕ́РВ УЛИ́ТКИ — степень функциональной полноценности улитки при тугоухости, определяемая по различию между костной и воздушной проводимостью; наличие достаточного Р. у. служит основным критерием возможности протезирования слуха и проведения слухулучшающих операций при поражении звукопроводящего аппарата.

РЕЗЕ́РВНЫЙ ВО́ЗДУХ (устар.) — см. *Резервный объем выдоха.*

РЕЗЕ́РВНЫЙ ОБЪЁМ ВДОХА (син. дополнительный воздух — устар.) — максимальный объем воздуха, к-рый человек может вдохнуть после обычного вдоха.

РЕЗЕ́РВНЫЙ ОБЪЁМ ВЫ́ДОХА (син. резервный воздух — устар.) — максимальный объем воздуха, к-рый человек может выдохнуть после обычного выдоха.

РЕ́ЗЕРФОРД (E. Rutherford, 1871—1937, англ. физик; rd) — устаревшая единица измерения активности радиоактивного вещества, соответствующая 10^6 актов распада в 1 секунду; 1 rd = $2{,}72 \cdot 10^{-5}$ *кюри.*

РЕЗИДУА́ЛЬНЫЕ ПСИХИ́ЧЕСКИЕ РАССТРО́ЙСТВА (лат. residuus оставшийся, сохранившийся) — отдельные психопатологические симптомы, чаще бредовые идеи, остающиеся на длительный срок после перенесенного психоза и обычно постепенно ослабевающие.

РЕЗИДУА́ЛЬНЫЙ (лат. residuus оставшийся, сохранившийся) — остаточный, сохранившийся (напр., о проявлении болезни).

РЕЗИСТЕ́НТНОСТЬ (лат. resistentia сопротивление, противодействие; син. сопротивляемость) — устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов.

РЕЗИСТЕ́НТНОСТЬ ЕСТЕ́СТВЕННАЯ — см. *Иммунитет наследственный.*

РЕЗИСТЕ́НТНОСТЬ КАПИЛЛЯ́РОВ — способность капилляров сохранять целость сосудистой стенки при механическом воздействии.

РЕЗИСТЕ́НТНЫЙ (лат. resistens, resistentis, от resisto противостоять, сопротивляться) — обладающий резистентностью.

РЕЗОНА́НС АФФЕКТИ́ВНЫЙ (франц. résonanse, от лат. resonans дающий отзвук) — способность индивидуума проявлять сочувствие, эмоциональную отзывчивость в отношении окружающих лиц.

РЕЗОНА́ТОРНАЯ ТЕО́РИЯ ГЕЛЬМГО́ЛЬЦА — см. *Гельмгольца теория слуха.*

РЕЗО́РБТИВНОЕ ДЕ́ЙСТВИЕ — действие лекарственных средств или токсичных веществ, проявляющееся после всасывания их в кровь.

РЕЗО́РБЦИЯ[1] (resorbtio; лат. resorbeo поглощать, впитывать) в патологии — рассасывание некротических масс, инородных тел, воспалительного экссудата при участии макрофагов и путем всасывания веществ в кровеносные или лимфатические сосуды.

Р. КО́СТИ ГЛА́ДКАЯ — см. *Резорбция кости пазушная*
Р. КО́СТИ КЛЕ́ТОЧНАЯ — см. *Резорбция кости лакунарная.*
Р. КО́СТИ ЛАКУНА́РНАЯ (r. ossis lacunaris; син.: Р. кости клеточная, Р. кости остеокластическая) — Р. кости при участии остеокластов, характеризующаяся образованием углублений (лакун) в костных пластинках.
Р. КО́СТИ ОСТЕОКЛАСТИ́ЧЕСКАЯ — см. *Резорбция кости лакунарная.*
Р. КО́СТИ ПА́ЗУШНАЯ (r. ossis sinualis; син.: Р. кости гладкая, Русакова пазушная резорбция кости) — Р. кости, при к-рой вещества измененной костной ткани всасываются в кровеносные сосуды; характеризуется образованием в кости пустот (пазух) с гладкими стенками.

РЕЗО́РБЦИЯ[2] в физиологии — см. *Всасывание.*

РЕ́ЗУС-АНТИТЕЛА́ (резус — вид обезьян из рода макаков) — антитела, направленные против одного из изоантигенов резус-фактора или их комбинации.

РЕ́ЗУС-НЕСОВМЕСТИ́МОСТЬ — наличие у донора и реципиента или у беременной женщины и плода антигенных различий по резус-фактору; может обусловливать возникновение посттрансфузионных реакций и осложнений или гемолитическую болезнь новорожденного.

РЕ́ЗУС-ФА́КТОР (син.: антиген системы резус, изоантиген системы резус)— система из шести изоантигенов эритроцитов человека, обусловливающих фенотипические различия.

РЕЗЦО́ВОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (foramen incisivum, PNA, BNA, JNA) — отверстие в передней части нижней стенки полости носа в области соединения небных отростков верхних челюстей, ведущее в резцовый канал.

РЕЗЦО́ВЫЙ КАНА́Л (canalis incisivus, PNA, BNA, JNA; син.: носонебный канал, стенонов канал) — непарный костный канал, начинающийся резцовым отверстием и открывающийся на нижней поверхности твердого неба; место прохождения носонебного нерва.

РЕЗЦО́ВЫЙ СОСО́ЧЕК (papilla incisiva, PNA, BNA, JNA) — бугорок на слизистой оболочке неба, расположенный позади медиальных резцов соответственно отверстию резцового канала.

РЕИМПЛАНТА́ЦИЯ (reimplantatio; *ре-* + *имплантация*; син. неоимплантация) — хирургическая операция: замена имплантата, пришедшего в негодность.

РЕИНВА́ЗИЯ (*ре-* + *инвазия*) — повторное заражение больного или переболевшего какой-либо паразитарной болезнью возбудителем той же болезни, вызвавшее развитие инвазионного процесса.

РЕИНВЕ́РСИЯ (*ре-* + *инверсия*) — мутация, ведущая к восстановлению последовательности генов, ранее измененной на обратную.

РЕИННЕРВА́ЦИЯ (reinnervatio; *ре-* + *иннервация*) — 1) восстановление нарушенной иннервации органов и тканей хирургическими методами; 2) (устар.) — появление признаков восстановления проводимости нерва в период регенерации.

РЕИНФЕ́КЦИЯ (reinfectio; *ре-* + *инфекция*; син. инфекция повторная) — повторное заражение переболевшего какой-либо инфекционной болезнью возбудителями той же болезни, приведшее к развитию инфекционного процесса.

РЕИНФУ́ЗИЯ КРО́ВИ (reinfusio sanguinis; *ре-* + *инфузия*) — см. *Переливание крови обратное.*

РЕ́ЙЛЕВА БОРО́ЗДА (J. Ch. Reil, 1759—1813, нем. анатом и врач) — см. *Борозда островка круговая.*

РЕ́ЙЛЯ ОСТРОВО́К (J. Ch. Reil) — см. *Островок.*

РЕ́ЙМАННА БОЛЕ́ЗНЬ (H. A. Reimann, род. в 1897 г., амер. врач) — см. *Болезнь периодическая.*

РЕ́ЙНА — МЫ́ША КО́СТНЫЙ ШОВ (истор.; Ф. А. Рейн, 1866—1925, сов. хирург; В. М. Мыш, 1873—1947, сов. хирург) — остеосинтез с помощью штифтов, изготовленных из коровьего рога.

РЕ́ЙНА — ПО́РРО ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; Г. Е. Рейн, отеч. акушер; E. Porro, 1842—1902, итал. акушер и гинеколог) — абдоминальное кесарево сечение с ампутацией матки и подшиванием культи шейки матки к передней брюшной стенке.

РЕЙНА́ЛЬСА ФА́КТОР (F. Duran-Reynals, 1899—1958, исп. бактериолог) — см. *Фактор распространения.*

РЕ́ЙНДЕЛЛЯ ДИЛАТА́ЦИЯ СЕ́РДЦА (H. Reindell; син. дилатация сердца регулятивная) — увеличение размеров сердца, обусловленное увеличением остаточного количества крови в его полостях после систолы.

РЕЙНО́ БОЛЕ́ЗНЬ (A. G. M. Raynaud, 1834—1881, франц. врач) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся приступообразными спазмами артерий пальцев кистей, реже стоп, проявляющаяся их побледнением, болями и парестезиями.

РЕЙНО́ — ЛЕРИ́ША СИНДРО́М (A. G. M. Raynaud, 1834—1881, франц. врач; R. H. M. Leriche, 1879—1955, франц. хирург) — симптомокомплекс, типичный для болезни Рейно, но возникающий при нек-рых других болезнях, характеризующихся поражением кровеносных сосудов конечностей и (или) иннервирующих их отделов нервной системы, напр. при склеродермии, системной красной волчанке, сирингомиелии, полиневритах, поражениях шейного отдела позвоночника.

РЕ́ЙССЕЙЗЕНА МЫ́ШЦЫ (F. D. Reisseisen, 1773—1828, нем. анатом) — гладкие мышцы, расположенные в стенках бронхиол.

РЕ́ЙССНЕРА МЕМБРА́НА (E. Reissner, 1824—1878, нем. гистолог) — см. *Преддверная мембрана.*

РЕ́ЙТЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (H. C. J. Reiter, 1881—1969, нем. терапевт; син.: Рейтера синдром, Рейтера триада, синдром уретроокулосиновиальный) — инфекционно-аллергическая болезнь, характеризующаяся сочетанием острого уретрита, конъюнктивита, а также обычно множественного артрита, поражающего гл. обр. крупные суставы ног, а иногда и суставы позвоночника; возникает преимущественно на фоне генетической предрасположенности у лиц, переболевших неспецифическим уретритом, дизентерией или иерсиниозом.

РЕ́ЙТЕРА СИНДРО́М (H. C. J. Reiter) — см. *Рейтера болезнь.*

РЕ́ЙТЕРА ТРИА́ДА (H. C. J. Reiter)— см. *Рейтера болезнь.*

РЕ́ЙТЕРЫ (нем. Reiter всадник, наездник; син.: всадники, наездники) в офтальмологии — частично помутневшие пучки волокон хрусталика, расположенные по экватору перинуклеарной зоны при зонулярной катаракте.

РЕ́ЙФФЕРШЕЙДА ДО́СТУП (M. Reifferscheid; син. разрез торакоабдоминальный) — разрез передней брюшной стенки, продолженный по X межреберью на грудную клетку для одновременного или последовательного вскрытия брюшной и грудной полости.

РЕ́ЙФФЕРШЕЙДА СХЕ́МА (M. Reifferscheid) — топографическая схема деления печени на 8 сегментов с учетом расположения ветвей воротной и печеночных вен.

РЕ́ЙХА ФАЛЛОПЛА́СТИКА (Reich)— пластическая операция: замещение дефекта кожи полового члена лоскутом, выкроенным из кожи мошонки.

РЕ́ЙХАРДТА СИМПТО́М (M. Reichardt, 1873—1966, нем. психиатр) — видение больным (при соответствующем внушении) различных предметов, живых существ, цифр или отрывков текста на чистом листе белой бумаги; симптом алкогольного делирия.

РЕ́ЙХЕЛЯ — ПО́ЛИА РЕЗЕ́КЦИЯ ЖЕЛУ́ДКА (P. F. Reichel, 1858—1934, нем. хирург; E. J. Polya, 1876—1944, венгерский хирург) — модификация резекции желудка способом Бильрот-II, при к-рой культю желудка на всем протяжении анастомозируют с короткой петлей тонкой кишки, проведенной позади поперечной ободочной кишки.

РЕ́ЙХЕРТА СИНДРО́М (F. L. Reichert, амер. хирург 20 в.; син.: neuralgia plexus tympanici, синдром барабанного сплетения) — приступообразная резкая боль в наружном слуховом проходе, иррадиирующая в область сосцевидного отростка, щеку и висок; наблюдается при поражении барабанного сплетения.

РЕ́ЙХЕРТА — МЕ́ЙССЛЯ ЧИСЛО́ (E. Reichert, 1838—1894 г., нем. химик; V. Meissl) — показатель свежести жиров и масел, представляющий собой количество (в *мл*) 0,1 н. раствора щелочи, необходимое для нейтрализации жирных кислот, извлеченных водяным паром из 5 *г* исследуемого продукта.

РЕ́ЙХМАННА СИНДРО́М (N. Reichmann, 1851—1918, польский врач; син.: гастромиксорея, гастросуккорея) — сочетание отрыжки кислым, изжоги и рвоты натощак, обусловленное повышенным выделением желудочного сока, напр. при язвенной болезни с локализацией язвы в луковице двенадцатиперстной кишки.

РЕКАЛЬЦИФИКА́ЦИЯ ПЛА́ЗМЫ (*ре-* + *кальцификация*) — метод исследования активности свертывающей системы крови, основанный на определении времени свертывания цитратной или оксалатной плазмы после добавления в нее раствора хлорида кальция.

РЕКАПИТУЛЯ́ЦИЯ (лат. recapitulatio сжатое повторение) — формирование на ранних стадиях онтогенеза признаков предков, утраченных современными зрелыми формами, напр. жаберных щелей у зародышей наземных позвоночных.

РЕКЛИНА́ТОР НАДКРОВА́ТНЫЙ (лат. reclino, reclinatum отклонять назад) — ортопедический аппарат, устанавливаемый на кровати больного для проведения этапной дозированной реклинации позвоночника, напр. при лечении компрессионных переломов нижних грудных или поясничных позвонков.

РЕКЛИНА́ЦИЯ (reclinatio; лат. «наклон назад, откидывание») — метод насильственного исправления деформации позвоночника воздействием силы, вызывающей его деформацию в противоположном направлении.

Р. ПО ФИНКУ — см. *Финка реклинация.*

Р. ЭТА́ПНАЯ — Р., производимая в несколько этапов с постепенным увеличением воздействующей силы.

РЕКЛИНА́ЦИЯ КАТАРА́КТЫ (истор.; reclinatio cataractae) — хирургическая операция: смещение помутневшего хрусталика в стекловидное тело (в сторону от зрительной оси) с целью улучшения зрения при катаракте.

РЕКЛИНГХА́УЗЕНА БОЛЕ́ЗНЬ (F.D. Recklinghausen, 1833—1910, нем. патолог) — 1) см. *Нейрофиброматоз*; 2) см. *Остеодистрофия паратиреоидная*.

РЕКЛИНГХА́УЗЕНА ВЕРЕТЕНООБРА́ЗНЫЕ КЛЕ́ТКИ (F. D. Recklinghausen, 1833—1910, нем. патолог) — тромбоциты удлиненной (веретенообразной) формы, содержащие ядро; наблюдаются у низших позвоночных животных, напр. у лягушек.

РЕКЛИНГХА́УЗЕНА ГИПЕРПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ МАЛЯ́ЦИЯ (F. D. Recklinghausen) — размягчение кости при рахите, обусловленное избыточным разрастанием необызвествляющейся остеоидной ткани.

РЕКЛИНГХА́УЗЕНА ДИЗОНТОГЕНЕТИ́ЧЕСКАЯ ДИСТРОФИ́Я (F. D. Recklinghausen) — см. *Остеодистрофия паратиреоидная*.

РЕКЛИНГХА́УЗЕНА ПОРОТИ́ЧЕСКАЯ МАЛЯ́ЦИЯ (F. D. Recklinghausen; греч. poros отверстие, пора) — размягчение костной ткани при рахите, обусловленное истончением коркового слоя в результате лакунарной резорбции.

РЕКЛЮ́ БОЛЕ́ЗНЬ (P. Reclus, 1847—1914, франц. хирург) — см. *Мастопатия кистозная*.

РЕКЛЮ́ ДЕРЕВЯНИ́СТАЯ ФЛЕГМО́НА (P. Reclus; син. флегмона деревянистая) — плотный малоболезненный, медленно увеличивающийся и обычно не склонный к нагноению инфильтрат в подкожной клетчатке шеи, возникающий в результате внедрения маловирулентных микроорганизмов; наблюдается у пожилых и ослабленных людей.

РЕКОМБИНАЦИО́ННЫЙ ИНДЕКС — показатель потенциальной способности организма к рекомбинации хромосом в процессе мейоза, выражаемый средним числом хиазм на ядро.

РЕКОМБИНА́ЦИЯ БАКТЕ́РИЙ (*ре-* + лат. combino связывать, сочетать) — обмен участками бактериальных хромосом в результате конъюгации, трансформации или трансдукции, приводящий к появлению бактериальных клеток с новым сочетанием генов.

РЕКОМБИНА́ЦИЯ ВИ́РУСОВ — обмен генетическими структурами между двумя вирусными геномами, происходящий в смешанно-зараженных клетках.

РЕКОМБИНА́ЦИЯ ХРОМОСО́М — обмен участками гомологичных хромосом, приводящий к появлению хромосом с новым сочетанием генов.

РЕКОМПРЕ́ССИЯ (recompressio; *ре-* + лат. compressio сжатие) — метод лечения кессонной болезни путем помещения больного в барокамеру с повышенным атмосферным давлением, к-рое постепенно снижают до нормального.

РЕКО́Н — минимальный участок хромосомы, неделимый при рекомбинации.

РЕКОНВАЛЕСЦЕ́НТ (*ре-* + лат. convalescens, convalescentis выздоравливающий) — больной в стадии выздоровления.

РЕКОНВАЛЕСЦЕ́НЦИЯ (reconvalescentia; *ре-* + лат. convalescentia выздоровление) — см. *Выздоровление*.

РЕКОНСТРУ́КЦИЯ ВИ́РУСОВ — образование вирионов in vitro из вирионной нуклеиновой кислоты и субъединиц капсида; применяется при исследовании роли отдельных компонентов вириона.

РЕКРУ́ТМЕНТ (англ. recruitment; син.: феномен выравнивания громкости звука, феномен ускорения нарастания громкости) — усиленное нарастание восприятия громкости звука в больном ухе по сравнению со здоровым при интенсивности звука, превышающей пороговую величину.

РЕКТА́ЛЬНАЯ ПРО́БА (testum rectale) — аллергическая диагностическая проба, при к-рой исследуемый аллерген наносят на слизистую оболочку прямой кишки.

РЕКТА́ЛЬНО - БРЮШНОСТЕ́НОЧНОЕ ИССЛЕ́ДОВАНИЕ — см. *Ректальное исследование бимануальное*.

РЕКТА́ЛЬНОЕ ИССЛЕ́ДОВАНИЕ (exploratio rectalis) — общее название диагностических манипуляций (напр., пальцевого исследования, эндоскопии), производимых через задний проход в просвете прямой кишки с целью определения ее состояния или состояния прилежащих к ней органов и тканей.

Р. И. БИМАНУА́ЛЬНОЕ (e. r. bimanualis; син. ректально-брюшностеночное исследование) — Р. и., при к-ром в просвет прямой кишки вводят палец, а пальцы другой руки располагают на поверхности передней брюшной стенки и производят пальпацию органов малого таза.

Р. И. ПАЛЬЦЕВО́Е (e. r. palpatoria) — Р. и., при к-ром производят пальпацию стенок прямой кишки и прилегающих к ней органов пальцем, введенным через задний проход.

РЕКТА́ЛЬНЫЙ СОСКО́Б — метод забора материала для исследования на яйца гельминтов, заключающийся в соскабливании слизи с поверхности слизистой оболочки прямой кишки.

РЕКТО- (анат. rectum прямая кишка, от лат. rectus прямой) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к прямой кишке».

РЕКТОКОЛИ́Т ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ ГНОЙНЫЙ (rectocolitis haemorrhagica purulenta; *ректо-* + *колит*) — см. *Колит язвенный неспецифический*.

РЕКТОКОЛИ́Т СЛИ́ЗИСТО-ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (rectocolitis mucosohaemorrhagica) — см. *Колит язвенный неспецифический*.

РЕКТОРОМАНОСКО́П (*ректо-* + анат. устар. S-romanum сигмовидная ободочная кишка + греч. skopeō рассматривать, наблюдать; син. сигмоидоскоп) — эндоскоп для осмотра прямой и сигмовидной ободочной кишок и проведения в них лечебных и диагностических манипуляций под контролем зрения.

РЕКТОРОМАНОСКОПИ́Я (*ректо-* + анат. устар. S-romanum сигмовидная ободочная кишка + греч. skopeō рассматривать, наблюдать; син.: проктосигмоидоскопия, ректосигмоидоскопия) — метод исследования прямой и сигмовидной ободочной кишок путем осмотра поверхности их слизистой оболочки с помощью ректороманоскопа, введенного в просвет кишки.

РЕКТОСИГМО́ИД (*ректо-* + анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка) — участок толстой кишки в месте перехода сигмовидной ободочной кишки в прямую.

РЕКТОСИГМОИДОСКОПИ́Я (*ректо-* + анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — см. *Ректороманоскопия*.

РЕКТОСИГМОИДЭКТОМИ́Я (rectosigmoidectomia; *ректо-* + анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление прямой и сигмовидной ободочной кишок при высокорасположенном раке прямой кишки.

РЕКТОСКО́П (*ректо-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — эндоскоп для осмотра слизистой оболочки прямой кишки.

Р. ХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ — Р., снабженный набором вводимых через него электрокоагуляторов и других инструментов, предназначенных для хирургических операций на стенке прямой кишки.

РЕКТОСКОПИ́Я (*ректо-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать; син. проктоскопия) — метод исследования прямой кишки путем осмотра поверхности ее слизистой оболочки с помощью ректального зеркала или ректоскопа.

РЕКТОЦЕ́ЛЕ (rectocele; *ректо-* + греч. kēlē выбухание, грыжа; син.: архоцеле, проктоцеле) — 1) шаровидное подкожное выпадение передней стенки прямой кишки через дефект мышц промежности, возникающий в результате травмы или при недостаточности этих мышц; 2) грыжа живота, выходящая через задний проход; грыжевой мешок образован передней стенкой прямой кишки и прилежащего отрезка сигмовидной ободочной кишки.

РЕКУРАРИЗА́ЦИЯ (*ре-* + *кураризация*) — самопроизвольное возобновление блокады нервно-мышечного проведения вследствие недостаточной декураризации.

РЕКУРВА́ЦИЯ (recurvatio; лат. recurvo, recurvatum гнуть в обратную сторону) — избыточное разгибание суставов с их деформацией и нарушением функции.

РЕКУРРЕ́НТНЫЙ (recurrens, recurrentis; лат. recurro бежать назад, возвращаться) — характеризующийся повторным возникновением клинических проявлений (о болезни, патологическом процессе).

РЕЛАКСА́ЦИЯ (relaxatio; лат. ослабление напряжения) в медицине — 1) расслабление скелетной мускулатуры; 2) снятие психического напряжения.

РЕЛАКСА́ЦИЯ ДИАФРА́ГМЫ (relaxatio diaphragmatica; син.: атрофия купола диафрагмы, высокое стояние диафрагмы идиопатическое, высокое стояние диафрагмы стойкое одностороннее, гипоплазия диафрагмы, недостаточность диафрагмы, элевация диафрагмы) — аномалия развития: резкое недоразвитие мышечных слоев купола диафрагмы, проявляющееся в виде его высокого стояния.

РЕЛАПАРОТОМИ́Я (relaparotomia; *ре-* + *лапаротомия*) — повторная лапаротомия, производимая в послеоперационном периоде по поводу возникших осложнений.

РЕЛЬЕ́Ф-НИ́ША — см. *Ниша рельефа*.

РЕ́ЛЬМАНА — ГУ́ННА — СА́ЛЮСА СИМПТО́М (Э. Рельман, отеч. офтальмолог конца 19 — начала 20 в.; R. M. Gunn, 1850—1909, англ. офтальмолог; R. Salus, род. в 1877 г., чешский офтальмолог) — см. *Салюса — Гунна симптом*.

РЕ́МАКА БЕ́ДРЕННЫЙ РЕФЛЕ́КС (E. J. Remak, 1848—1911, нем. невропатолог) — сгибание I — III пальцев стопы и разгибание в коленном суставе при штриховом раздражении передневнутренней поверхности верхней трети бедра согнутой ноги; защитный рефлекс, наблюдающийся при поражении верхних отделов спинного мозга.

РЕ́МАКА СИМПТО́М (E. J. Remak, 1848—1911, нем. невропатолог) — длительное ощущение боли после прекращения болевого раздражения; наблюдается при tabes dorsalis.

РЕ́МАКА СИНДРО́М (E. J. Remak, 1848—1911, нем. невропатолог) — см. *Полиневрит свинцовый.*

РЕ́МАКА УЗЛЫ́ (R. Remak, 1815—1865, нем. невролог) — группы симпатических нейронов, расположенные в стенке правого предсердия у венозного синуса.

РЕ́МАКОВСКОЕ НЕ́РВНОЕ ВОЛОКНО́ (R. Remak, 1815—1865, нем. невролог) — см. *Волокно нервное безмиелиновое.*

РЕ́МЕРА МЕ́ТОД (P. H. Römer, 1876—1916, нем. бактериолог) — метод титрования дифтерийного токсина или антитоксина путем проведения внутрикожной пробы на морских свинках, к-рым в первом случае вводят смеси различного количества токсина с определенной дозой стандартной иммунной сыворотки, а во втором случае — смеси испытуемой сыворотки с ранее определенными предельными дозами (L_n или I_r) токсина.

РЕМИ́ССИЯ (remissio; лат. «ослабление», «ремиссия», от remitto отпускать, ослаблять) — этап течения болезни, характеризующийся временным ослаблением или исчезновением ее проявлений.

Р. АСТЕНИ́ЧЕСКАЯ (r. asthenica) — Р. психоза, во время к-рой наблюдаются слабость, утомляемость, раздражительность, неспособность к длительному умственному напряжению.

Р. БРЕДОВА́Я — Р. психоза, при к-рой у больного имеется остаточный бред.

Р. ГИПЕРСТЕНИ́ЧЕСКАЯ (r. hypersthenica) — Р. психоза, при к-рой наблюдается повышенное стремление больного к постоянной, часто однонаправленной деятельности.

Р. НЕВРОЗОПОДО́БНАЯ — Р. психоза с остаточными проявлениями в виде навязчивых состояний (фобий и др.), ипохондрически-сенестопатических, деперсонализационных или циклотимоподобных расстройств.

Р. ПАРАНО́ИДНАЯ (r. paranoidea)— Р. психоза с остаточными бредовыми или галлюцинаторно-бредовыми расстройствами, сочетающимися с циклотимоподобными расстройствами.

Р. ПСЕВДОПСИХОПАТИ́ЧЕСКАЯ — см. *Ремиссия психопатоподобная.*

Р. ПСИХОПАТОПОДО́БНАЯ (син. Р. псевдопсихопатическая) — Р. психоза, при к-рой наблюдаются глубокие изменения личности в форме, сходной с каким-либо видом психопатии.

Р. СПОНТА́ННАЯ (r. spontanea) — Р., наступающая независимо от внешних воздействий на организм; обычно является закономерным этапом развития болезни.

Р. ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКАЯ (r. therapeutica) — Р., наступающая под влиянием проведенного лечения.

Р. ТИМОПАТИ́ЧЕСКАЯ (r. thymopathica; греч. thymos душа, настроение, чувство + pathos страдание, болезнь) — Р. психоза, при к-рой наблюдаются циклотимоподобные расстройства.

РЕМИТТИ́РУЮЩИЙ (remittens; лат. remitto отпускать, ослаблять) — характеризующийся повторными периодами ослабления симптомов заболевания.

РЕ́МХЕЛЬДА СИНДРО́М (L. Roemheld, 1871—1938, нем. врач) — см. *Синдром гастрокардиальный.*

РЕ́НА ОПЕРА́ЦИЯ (L. Rehn, 1849—1930, нем. хирург) — см. *Склифосовского — Рена — Делорма — Бира операция.*

РЕ́НА-ДЕЛО́РМА ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; L. Rehn, 1849—1930, нем. хирург; E. Delorme, 1847—1929, франц. хирург) — см. *Кардиолиз.*

РЕНА́НДЕРА — МЮ́ЛЛЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (A. Renander, шведский врач; Müller) — остеохондропатия сесамовидной кости I плюснефалангового сустава.

РЕНАТУРА́ЦИЯ (*ре-* + лат. natura природные свойства, природа) — полное или частичное восстановление денатурированными биополимерами (нуклеиновыми кислотами, белками) своих естественных свойств, в т. ч. биологической активности, обусловленное постепенным возвращением макромолекул к исходной — вторичной и третичной структуре.

РЕ́НИН — фермент подкласса протеиназ (КФ 3.4.99.19), катализирующий процесс превращения ангиотензиногена в ангиотензин; вырабатывается в юкстагломерулярном комплексе почек.

РЕ́НКВИСТА ТЕО́РИЯ ВКУ́СА (Y. Renqvist) — теория, согласно к-рой возникновение и динамика интенсивности вкусовых ощущений объясняется закономерностями адсорбции растворенных веществ на мембране вкусовых рецепторов.

РЕНО- (лат. ren почка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к почке».

РЕНОВАЗОГРАФИ́Я (*рено-* + *вазография*) — серийная рентгенография кровеносных сосудов почек после введения в артерии или вены почек контрастного вещества.

РЕНОГРАФИ́Я (*рено-* + греч. graphō — писать, изображать) — см. *Нефрография.*

РЕНОГРАФИ́Я РАДИОИЗОТО́ПНАЯ (син.: радиоренография, ренорадиография) — радиографическое исследование функции почек, основанное на их способности избирательно накапливать и выделять радиофармацевтические препараты.

РЕНОПРЕССО́РНЫЙ МЕХАНИ́ЗМ ГО́ЛЬДБЛАТТА — см. *Гольдблатта ренопрессорный механизм.*

РЕНОПРИ́ВНЫЙ ФА́КТОР (*рено-* + лат. privo лишать) — гипотетическое вещество (или вещества), вырабатываемое нормально функционирующей почкой и обладающее свойством понижать артериальное давление; предполагается, что при нарушении выработки Р. ф. развивается реноприв ная гипертензия.

РЕНОРАДИОГРАФИ́Я (*рено-* + *радиография*) — см. *Ренография радиоизотопная.*

РЕ́НСКОЕ КОЛЕСО́ — гимнастический снаряд, применяемый для активной вестибулярной тренировки, представляющий собой колесо, внутри к-рого помещается тренирующийся.

РЕ́НСОНА МЕ́ТОД (S. W. Ranson, род. в 1880 г., амер. невролог)— см. *Рансона метод.*

РЕНТГЕНО- (W. K. Röntgen, 1845—1923, нем. физик) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к рентгенологии, к рентгеновскому излучению».

РЕНТГЕНОАНАТО́МИЯ (*рентгено-* + *анатомия*) — см. *Анатомия рентгенологическая.*

РЕНТГЕНОАНГИОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *ангиография*) — см. *Ангиография.*

РЕНТГЕНОАНГИОКИНЕМАТОГРАФИ́Я (*рентгено-* + греч. angeion сосуд + кинематография) — см. *Рентгеновазокинематография.*

РЕНТГЕНОВАЗОГРАФИ́Я (устар.; *рентгено-* + *вазография*) — см. *Ангиография.*

РЕНТГЕНОВАЗОКАРДИОГРА́ММА (*рентгено-* + *вазокардиограмма*) — см. *Ангиокардиограмма.*

РЕНТГЕНОВАЗОКАРДИОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *вазокардиография*) — см. *Ангиокардиография.*

РЕНТГЕНОВАЗОКИНЕМАТОГРАФИ́Я (*рентгено-* + лат. vas сосуд + кинематография; син. рентгеноангиокинематография) — разновидность ангиографии, при к-рой ее результаты фиксируют на кинопленке.

РЕНТГЕ́НОВСКАЯ РЕШЁТКА — см. *Отсеивающая решетка.*

РЕНТГЕ́НОВСКАЯ СТА́НЦИЯ ПЕРЕДВИЖНА́Я (устар.) — см. *Авторентген.*

РЕНТГЕ́НОВСКАЯ ТРУ́БКА — электровакуумное устройство для получения рентгеновского излучения; основной узел любого рентгеновского аппарата.

РЕНТГЕ́НОВСКИЕ ПЕРЧА́ТКИ — перчатки, изготовленные из просвинцованной резины, обеспечивающей защиту рук от рентгеновского излучения.

РЕНТГЕ́НОВСКИЙ РАСТР (лат. rastrum грабли) — поглощающая рассеянное рентгеновское излучение деталь отсеивающей решетки, представляющая собой набор поставленных на ребро узких полосок свинца, разделенных материалом, слабо поглощающим рентгеновское излучение.

РЕНТГЕ́НОВСКИЙ СНИ́МОК — см. *Рентгенограмма.*

РЕНТГЕ́НОВСКИЙ ЭЛЕКТРО́ННО-ОПТИ́ЧЕСКИЙ УСИЛИ́ТЕЛЬ — см. *Усилитель рентгеновского изображения.*

РЕНТГЕ́НОВСКОЕ ИЗЛУЧЕ́НИЕ (син. рентгеновы лучи — нрк) — электромагнитное излучение с длиной волны от 10^{-4} до 10^3 *нм*, занимающее спектральную область между гамма- и ультрафиолетовым излучением; обладает проникающей способностью и ионизирующим действием; по ГОСТ 15484—74: фотонное излучение, состоящее из тормозного и (или) характеристического излучений.

Р. И. ДЛИННОВО́ЛНОВОЕ (син. Р. и. мягкое — устар.) — Р. и. с длиной волны более 0,2 *нм* и энергией менее 50 *кэв*, обладающее малой проникающей способностью.

Р. И. ЖЁСТКОЕ (устар.) — см. *Рентгеновское излучение коротковолновое.*

Р. И. КОРОТКОВО́ЛНОВОЕ (син. Р. и. жесткое — устар.) — Р. и. с длиной волны менее 0,2 *нм* и энергией более 50 *кэв*, обладающее большой проникающей способностью.

Р. И. МЯ́ГКОЕ (устар.) — см. *Рентгеновское излучение длинноволновое.*

РЕНТГЕ́НОВСКОЕ ИЗОБРАЖЕ́НИЕ — теневое изображение, возникающее на флюоресцирующем или светочувствительном материале под воздействием рентгеновского излучения, прошедшего через исследуемый объект.

РЕНТГЕ́НОВСКОЕ ОБЛУЧЕ́НИЕ — облучение рентгеновским излучением.

РЕНТГЕ́НОВЫ ЛУЧИ́ (нрк) — см. *Рентгеновское излучение.*

РЕНТГЕНОГРА́ММА (*рентгено-* + греч. gramma запись, изображение; син. рентгеновский снимок) — рентгеновское изображение, зафиксированное на светочувствительном материале (гл. обр. на фотопленке).

РЕНТГЕНОГРАММЕТРИ́Я (*рентгенограмма* + греч. metreō измерять, определять) — определение размеров органов, морфологических образований или инородных тел путем измерения их рентгеновского изображения.

РЕНТГЕНОГРАФИ́Я (*рентгено-* + греч. graphō писать, изображать; син. рентгеносъемка) — рентгенологическое исследование, при к-ром получают изображение исследуемого объекта, фиксированное на светочувствительном материале.

Р. БЕЗЭКРА́ННАЯ — Р., осуществляемая без применения усиливающего экрана.

Р. БЕССКЕЛЕ́ТНАЯ — Р. мягких тканей в проекции, при к-рой их изображение не совпадает с изображением костей.

Р. БЛИЗКОФО́КУСНАЯ — см. *Плезиография.*

Р. КОНТА́КТНАЯ — Р., при к-рой с целью повышения отчетливости изображения рентгеновскую пленку, обернутую тонким слоем светонепроницаемого материала (напр., плотной бумагой), прикладывают к поверхности тела (напр., к слизистой оболочке десен при Р. зуба).

Р. КОНТРА́СТНАЯ — Р., при к-рой применяют рентгеноконтрастные вещества.

Р. ОБЗО́РНАЯ — Р., при к-рой получают изображение всего исследуемого органа или анатомической области.

Р. ПРИЦЕ́ЛЬНАЯ — Р. органа или его части в проекции, обеспечивающей оптимальное для диагностики изображение патологического очага; эту проекцию устанавливают после предварительной рентгеноскопии.

Р. С ПРЯМЫ́М УВЕЛИЧЕ́НИЕМ ИЗОБРАЖЕ́НИЯ — Р. при увеличенном расстоянии между исследуемым объектом и рентгеновской пленкой с целью получения увеличенного изображения.

Р. СЕРИ́ЙНАЯ — Р., при к-рой в течение одного исследования получают последовательно несколько рентгенограмм; отражает динамику изучаемого процесса.

Р. СКОРОСТНА́Я — серийная Р. с интервалами между снимками равными долям секунды.

РЕНТГЕНОДЕНСИМЕТРИ́Я (*рентгено-* + лат. densus плотный + греч. metreō измерять, определять) — см. *Рентгеноденситометрия.*

РЕНТГЕНОДЕНСИТОМЕТРИ́Я (*рентгено-* + лат. densitas плотность + греч. metreō измерять, определять; син. рентгеноденсиметрия) — определение «прозрачности» органов и тканей для рентгеновского излучения; используется при рентгенодиагностике.

Р. НЕПРЯМА́Я — Р., при к-рой измеряют оптическую плотность тени исследуемого объекта на рентгенограмме или яркость свечения соответствующего участка флюоресцирующего экрана.

Р. ПРЯМА́Я — Р., при к-рой непосредственно измеряют интенсивность рентгеновского излучения, прошедшего через исследуемый объект.

РЕНТГЕНОДИАГНО́СТИКА (*рентгено-* + *диагностика*; син. диагностика рентгенологическая) — диагностика болезней с использованием данных рентгенологического исследования.

Р. НЕОТЛО́ЖНАЯ (син. Р. ургентная) — Р., осуществляемая в целях оказания неотложной медицинской помощи.

Р. ПОСМЕ́РТНАЯ — Р., при к-рой исследованию подвергают труп и (или) трупный материал.

Р. ТОПИ́ЧЕСКАЯ — Р. с целью определения локализации патологического образования.

Р. УРГЕ́НТНАЯ — см. *Рентгенодиагностика неотложная.*

РЕНТГЕНОКАРДИОМЕТРИ́Я (*рентгено-* + греч. kardia сердце + metreō измерять, определять) — совокупность методов определения линейных размеров и объема сердца путем измерения его рентгеновской тени.

РЕНТГЕНОКИМО́ГРАФ (*рентгено-* + *кимограф*) — общее название устройств для рентгенокимографии.

РЕНТГЕНОКИМОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *кимография*) — метод регистрации движений органа посредством его рентгенографии таким образом, что контуры органа получают на рентгенограмме зубчатую форму, причем величина зубцов отражает амплитуду движений; это достигается перемещением решетки, помещенной поперек пучка излучения, и кассеты с пленкой относительно друг друга.

Р. ВЕ́КТОРНАЯ — Р., основанная на применении многощелевой решетки радиарного типа, вращающейся во время съемки.

Р. МНОГОЩЕЛЕВА́Я — Р. с применением многощелевой решетки.

Р. НЕПРЕРЫ́ВНАЯ — Р., при к-рой перемещают решетку.

Р. ОДНОЩЕЛЕВА́Я — Р., при к-рой роль решетки выполняет свинцовая пластина с одной щелью.

Р. СТУПЕ́НЧАТАЯ — Р., при к-рой перемещают кассету с пленкой.

РЕНТГЕНОКИНЕЗИМЕТРИ́Я (*рентгено-* + греч. kinēsis движение + metreō измерять, определять) — совокупность рентгенологических методов изучения движений органов и частей тела.

РЕНТГЕНОКИНЕМАТОГРАФИ́Я (*рентгено-* + кинематография; син.: кинематография рентгенотелевизионная — нрк, кинорентгенография, кинофлюорография — нрк, кинофлюороскопия — нрк) — киносъемка рентгеновского изображения с экрана электронно-оптического преобразователя или рентгенотелевизионного устройства.

РЕНТГЕНОКОЛЬПОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *кольпография*) — см. *Кольпография.*

РЕНТГЕНОКОНТРА́СТНЫЕ ВЕЩЕСТВА́ (roentgenocontrastica; син. контрастные вещества) — безвредные вещества, обладающие более высоким (рентгенопозитивные Р. в.) или более низким (рентгенонегативные Р. в.) коэффициентом поглощения рентгеновского излучения по отношению к тканям организма и применяемые при рентгенологическом исследовании путем введения их в полости или ткани для усиления контрастности рентгеновского изображения.

РЕНТГЕНОЛИЕНОПОРТОГРАФИ́Я (*рентгено-* + лат. lien селезенка + *портография*) — см. *Спленопортография.*

РЕНТГЕНОЛИМФОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *лимфография*) — см. *Лимфография.*

РЕНТГЕНО́ЛОГ — врач-специалист, получивший подготовку по вопросам применения рентгеновского излучения для диагностики болезней человека.

РЕНТГЕНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ГРУ́ППА ПОДВИЖНА́Я (ПРГ) — медицинское подразделение военного времени, предназначенное для проведения рентгенологического обследования раненых и больных в полевых подвижных госпиталях и профилактического обследования личного состава войск.

РЕНТГЕНОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ИССЛЕ́ДОВАНИЕ в медицине — исследование морфологических и функциональных особенностей органов и систем человека, в т. ч. с целью диагностики болезней, основанное на получении и анализе рентгеновских изображений соответствующих участков тела.

Р. И. ПОСЛО́ЙНОЕ — см. *Томография.*

РЕНТГЕНОЛО́ГИЯ медицинская (*рентгено-* + греч. logos учение, наука) — область клинической медицины, изучающая применение рентгеновского излучения для исследования строения и функции органов и систем, для диагностики болезней человека.

Р. ВОЕ́ННО-ПОЛЕВА́Я — раздел военной медицины и Р., разрабатывающий вопросы организации, технического оснащения и методики рентгенологического исследования пораженных и больных в полевых условиях.

РЕНТГЕНООСТЕОЛО́ГИЯ (*рентгено-* + *остеология*) — раздел рентгенологии, изучающий нормальное строение и патологические изменения костей и суставов.

РЕНТГЕНОПЕЛЬВИМЕТРИ́Я (*рентгено-* + *пельвиметрия*) — определение размеров таза методом рентгенограмметрии.

РЕНТГЕНОПЕЛЬВИЦЕФАЛОМЕТРИ́Я (*рентгено-* + анат. pelvis таз + греч. kephalē голова + metreō измерять, определять) — определение размеров таза беременной женщины и размеров головки плода методом рентгенограмметрии.

РЕНТГЕНОПНЕВМОПЕЛЬВИГРАФИ́Я (*рентгено-* + греч. pneuma воздух + *пельвиграфия*; син.: пельвиграфия газовая, пневмопельвиграфия) — рентгенография тазовых органов после

их контрастирования введением газа в брюшную полость.

РЕНТГЕНОПНЕВМОПОЛИГРАФИ́Я (*рентгено-* + греч. pneuma воздух + *полиграфия*; син. пневмополиграфия)— рентгенологическое исследование легких методом полиграфии.

РЕНТГЕНОПОЛИГРАФИ́ЧЕСКАЯ РЕШЁТКА — приспособление к рентгеновскому аппарату, предназначенное для получения изображения амплитуды дыхательных движений ребер, диафрагмы и органов средостения, а также изменений воздухонаполнения легких на протяжении дыхательного цикла; используется для рентгенопневмополиграфии.

РЕНТГЕНОСКИАЛО́ГИЯ (*рентгено-* + греч. skia тень + logos учение, наука) — раздел рентгенологии, изучающий закономерности образования рентгеновского изображения.

РЕНТГЕНОСКОПИ́Я (*рентгено-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать; син. флюороскопия) — рентгенологическое исследование, при к-ром рентгеновское изображение объекта получают на флюоресцирующем экране.

РЕНТГЕНОСТЕРЕОПЕ́ЛЬВИМЕТРИ́Я (*рентгено-* + греч. stereos пространственный + *пельвиметрия*) — разновидность рентгенопельвицефалометрии, позволяющая определить истинные внутренние размеры таза беременной и головки плода в трех измерениях.

РЕНТГЕНОСТЕРЕОСКОПИ́Я (*рентгено-* + *стереоскопия*) — см. *Стереорентгеноскопия*.

РЕНТГЕНОСЪЁМКА — см. *Рентгенография*.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИ́ДЕНИЕ (нрк; *рентгено-* + телевидение) — применение телевизионных устройств для передачи и усиления рентгеновского изображения.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИО́ННОЕ ПРОСВЕ́ЧИВАНИЕ — рентгеноскопия, при к-рой рентгеновское изображение, усиленное с помощью электронно-оптического преобразователя, наблюдают на экране кинескопа.

РЕНТГЕНОТЕРАПИ́Я (*рентгено-* + *терапия*) — лучевая терапия, основанная на использовании рентгеновского излучения.

Р. ГЛУБО́КАЯ — Р., при к-рой воздействуют на органы и ткани, расположенные в глубине тела.

Р. МЕ́СТНАЯ — Р., при к-рой облучению подвергают отдельный орган, анатомическое образование или ограниченный участок тела.

Р. О́БЩАЯ (син. Р. тотальная) — Р., при к-рой облучению подвергают все тело.

Р. ПОВЕ́РХНОСТНАЯ — Р., при к-рой воздействуют на поверхностно расположенные ткани.

Р. ТОТА́ЛЬНАЯ — см. *Рентгенотерапия общая*.

РЕНТГЕНОТЕ́ХНИКА медицинская (*рентгено-* + техника) — раздел рентгенологии и медицинской техники, разрабатывающий методы расчета, конструирования, производства и эксплуатации рентгеновских аппаратов, предназначенных для медицинских целей, и вспомогательного оборудования рентгеновских кабинетов.

РЕНТГЕНОТОМОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *томография*) — см. *Томография*.

РЕНТГЕНОУРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ СТОЛ — стол для размещения больного, совмещенный с рентгеновским аппаратом, предназначенный для проведения урологических исследований и операций.

РЕНТГЕНОУСТАНО́ВКА — см. *Аппарат рентгеновский*.

РЕНТГЕНОФИЗИОЛО́ГИЯ (*рентгено-* + *физиология*) — раздел физиологии, в к-ром основным методом изучения функции органов и систем животных и человека является рентгенологическое исследование.

РЕНТГЕНОФЛЮОРОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *флюорография*) — см. *Флюорография*.

РЕНТГЕНОФОТО́ГРАФ — см. *Флюорограф*.

РЕНТГЕНОФОТОГРА́ФИЯ (*рентгено-* + фотография) — см. *Флюорография*.

РЕНТГЕНОЦЕРВИКОГИСТЕРОГРАФИ́Я (*рентгено-* + лат. cervix, cervicis шейка + греч. hystera матка + graphō писать, изображать) — рентгенография шейки и тела матки после введения в полость матки контрастного вещества.

РЕНТГЕНОЦЕРВИКОГРАФИ́Я (*рентгено-* + лат. cervix, cervicis шейка + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография шейки матки после введения в ее канал контрастного вещества.

РЕНТГЕНОЦИСТОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *цистография*) — см. *Цистография*.

РЕНТГЕНОЦИСТОУРЕТРОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *цистоуретрография*) — см. *Цистоуретрография*.

РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОКИМОГРАФИ́Я (*рентгено-* + *электрокимография*) — см. *Электрокимография*.

РЕ́НШО КЛЕ́ТКИ (B. Renshaw, 1911—1948, нейрофизиолог) — нейроны, расположенные в передних рогах спинного мозга, оказывающие тормозное влияние на мотонейроны и предохраняющие их от чрезмерного возбуждения.

РЕО- (греч. rheō течь; rheos ток, поток) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «течь», «течение», «текущий»; 2) «относящийся к электрическому току».

РЕОБА́ЗА (*рео-* + греч. basis основание) — минимальная величина силы или напряжения электрического тока, способная вызывать возбуждение при воздействии на возбудимую ткань в течение неограниченно долгого времени.

РЕОВИ́РУСЫ (от англ. respiratory enteric orphan viruses) — 1) (Reoviridae) — семейство вирусов человека, животных и растений, содержащих двухцепочечную фрагментированную рибонуклеиновую кислоту; среди представителей родов Orbivirus, Rotavirus и, вероятно, Reovirus имеются вирусы, патогенные для человека; 2) (Reovirus) — род вирусов сем. Reoviridae, включающий несколько видов, циркулирующих среди населения (роль в патологии изучена недостаточно).

РЕОГЕПАТОГРАФИ́Я (*рео-* + *гепатография*) — метод исследования кровеносных сосудов печени, основанный на графической регистрации изменений полного электрического сопротивления ее ткани, обусловленных пульсовыми колебаниями кровенаполнения сосудов.

РЕОГИСТЕРОГРАФИ́Я (*рео-* + *гистерография*) — метод исследования кровеносных сосудов матки, основанный на графической регистрации изменений полного электрического сопротивления ее ткани, обусловленных пульсовыми колебаниями кровенаполнения сосудов.

РЕОГРА́ММА (*рео-* + греч. gramma запись, изображение; син. электрореограмма) — кривая, отражающая изменения во времени полного электрического сопротивления ткани и, тем самым, кровенаполнения ее сосудов.

РЕО́ГРАФ (*рео-* + греч. graphō писать, изображать; син. электрореограф) — прибор для регистрации изменений электрического сопротивления тканей и органов человека, обусловленных пульсовыми колебаниями кровенаполнения сосудов.

РЕОГРАФИ́Я (*рео-* + греч. graphō писать, изображать; син. электрореография) — метод исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов различных органов и тканей, основанный на графической регистрации изменений полного электрического сопротивления тканей.

Р. ГЛАЗНА́Я — см. *Офтальмореография*.

Р. ПОПЕРЕ́ЧНАЯ — Р. конечности, при к-рой электроды располагают на одном уровне относительно ее продольной оси; используется для оценки функции кровеносных сосудов определенной части конечности.

Р. ПРОДО́ЛЬНАЯ — Р. конечности, при к-рой электроды располагают по ее продольной оси; используется для оценки функции кровеносных сосудов всей конечности.

РЕОКАРДИОГРА́ММА (*рео-* + *кардиограмма*) — кривая, отражающая изменения полного электрического сопротивления сердца в течение сердечного цикла.

РЕОКАРДИОГРАФИ́Я (*рео-* + *кардиография*) — метод исследования функционального состояния сердца, основанный на графической регистрации изменений его полного электрического сопротивления в течение сердечного цикла.

РЕОКОРТИКОГРАФИ́Я (*рео-* + *кортикография*) — разновидность реоэнцефалографии, при к-рой электроды накладывают на поверхность коры полушарий большого мозга.

РЕОЛО́ГИЯ (*рео-* + греч. logos учение, наука) — физическая наука, изучающая процессы необратимых остаточных деформаций и течения различных материалов, явления упругости и др.; в своих медико-биологических приложениях Р. (биореология) исследует процессы течения крови, цереброспинальной, синовиальной и других биологических жидкостей, а также деформации костной, мышечной и других тканей организма человека и животных.

РЕО́МЕТР (*рео-* + греч. metreō измерять, определять) — прибор для измерения объемной скорости газа, проходящего по трубопроводу; применяется в гигиенических исследованиях; входит в состав нек-рых аппаратов и приборов медицинского назначения.

РЕОМЕТРИ́Я (*рео-* + греч. metreō измерять, определять) — 1) измерение полного электрического сопротивления тканей организма; используется, напр., для уточнения локализации патологи-

ческих образований; 2) (син. реометрия объемная) — измерение с помощью реометра объема воздуха или другого газа, проходящего в единицу времени по системе газопровода; применяется, напр., при гигиенических исследованиях.

РЕОМЕТРИ́Я ОБЪЁМНАЯ — см. *Реометрия* [2].

РЕООФТАЛЬМОГРАФИ́Я (*рео-* + греч. ophthalmos глаз + graphō писать, изображать) — см. *Офтальмореография.*

РЕОПАРОДОНТОГРАФИ́Я (*рео-* + *пародонтография*) — метод исследования функционального состояния кровеносных сосудов пародонта, основанный на графической регистрации изменений полного электрического сопротивления его тканей.

РЕОПЕРА́ЦИЯ (*ре-* + *операция*) — повторное оперативное вмешательство в случае недостаточной эффективности первого или при возникновении послеоперационных осложнений.

РЕОПЛЕТИЗМОГРАФИ́Я (*рео-* + *плетизмография*) — см. *Плетизмография импедансная.*

РЕОСУБКОРТИКОГРАФИ́Я (*рео-*+ анат. subcorticalis подкорковый + греч. graphō писать, изображать) — разновидность реоэнцефалографии, при к-рой электроды вводят в подкорковые области головного мозга.

РЕОСФИГМОГРАФИ́Я (*рео-* + *сфигмография*) — метод исследования пульсовых колебаний кровеносного сосуда, обычно артерии, основанный на регистрации изменений омического сопротивления его стенки.

РЕОФЛЕБОГРАФИ́Я (*рео-* + *флебография*) — реосфигмография вены.

РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИ́Я (*рео-* + *энцефалография*) — метод исследования функционального состояния сосудов головного мозга, основанный на регистрации изменений полного электрического сопротивления ткани мозга, обусловленных пульсовыми колебаниями сосудов.

РЕПАРА́ЦИЯ (лат. reparatio восстановление, возобновление) — 1) в генетике — восстановление исходной структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты, поврежденной в результате воздействия каких-либо физических или химических факторов; Р. включает удаление поврежденного участка, замещение его на основе комплементарной молекулы и восстановление целостности ДНК; 2) в патологии — см. *Регенерация репаративная.*

РЕПЕЛЛЕ́НТЫ (repellentia; лат. repellens, repellentis отталкивающий, отгоняющий) — химические вещества из группы пестицидов, применяемые для отпугивания членистоногих от людей, домашних животных или от мест их пребывания.

РЕПЕРКУ́ССИЯ (repercussio; лат. отражение) — рефлекторное нарушение функций каких-либо органов и тканей при наличии патологического процесса в других, часто удаленных, органах и тканях, напр. нарушение деятельности сердца при поражении печени, желчного пузыря или желчных протоков.

РЕ́ПКЕ ОСТЕОТОМИ́Я (K. Röpke, род. в 1873 г., нем. хирург) — остеотомия, при к-рой кость пересекают в двух плоскостях, образующих угол; используется для исправления деформации длинных трубчатых костей.

РЕПЛАНТА́ЦИЯ (replantatio; лат. replanto, replantatum вновь сажать, пересаживать; от *ре-* + planto сажать) — пластическая операция, производимая для приживления отделенного при травме участка ткани, органа или конечности на прежнем месте.

РЕПЛАНТА́ЦИЯ ЗУ́БА (replantatio dentis) — внедрение удаленного зуба в его альвеолу; применяется при лечении периодонтита или полного вывиха зуба.

РЕПЛАНТА́ЦИЯ КО́ЖИ (replantatio cutis; син. Красовитова кожная пластика) — пластическая операция: закрытие дефектов кожи, при к-ром оторванные или отслоенные обширные кожные лоскуты тщательно освобождают от подкожной клетчатки и укладывают на поверхность раны.

РЕПЛАНТА́ЦИЯ ПИЕЛОУРЕТЕРА́ЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИ́ЧЕСКАЯ (replantatio pyeloureteralis elliptica) — хирургическая операция при высоком отхождении мочеточника, заключающаяся в формировании в нижней части почечной лоханки нового лоханочно-мочеточникового соустья овальной формы.

РЕ́ПЛИКА (англ. replica отпечаток; от replicate копировать, воспроизводить, повторять) в молекулярной генетике — молекула нуклеиновой кислоты, синтезированная на другой молекуле (матрице).

РЕПЛИКА́ТОР (англ. replicator; от replicate копировать, воспроизводить; син. ген-репликатор) — участок репликона, с к-рого начинается репликация.

РЕПЛИКА́ЦИЯ (англ. replication копирование, воспроизведение) — процесс образования реплики.

РЕПЛИКО́Н (англ. replicon, от replicate копировать, воспроизводить) — элементарная генетическая структура, способная к репликации как единое целое.

РЕПОЗИТО́РИЙ (истор., лат. repono, repositum возвращать на место, вправлять) — акушерский инструмент, применявшийся для вправления выпавшей петли пуповины.

РЕПОЗИ́ЦИЯ (repositio; лат. repono, repositum возвращать на место, вправлять) — хирургическое вмешательство при переломе, заключающееся в устранении смещения и сопоставлении костных отломков с целью восстановления нормальных анатомических соотношений.

Р. ЗАКРЫ́ТАЯ — Р., проводимая без разреза мягких тканей.

Р. ОТКРЫ́ТАЯ — Р., проводимая после обнажения костных отломков разрезом мягких тканей.

РЕПОЛЯРИЗА́ЦИЯ (*ре-* + *поляризация*) — возвращение разности потенциалов на мембране живой клетки к уровню, предшествовавшему ее деполяризации.

РЕПРЕЗЕНТАТИ́ВНОСТЬ (франц. representation предъявление, представительство) в статистике — соответствие изучаемых характеристик выборочной совокупности характеристикам генеральной совокупности; учитывается при организации выборочного исследования.

РЕПРЕ́ССИЯ (лат. repressio подавление) — подавление синтеза ферментов цепи биосинтеза.

РЕПРЕ́ССОР (лат. repressor подавляющий) — белок, синтезируемый под контролем регуляторного гена, способный связываться с оператором, блокировать его функцию и тем самым подавлять синтез белка.

РЕПРИ́З (франц. reprise повторение, возобновление) — судорожный вдох, сопровождаемый свистом, возникающий вслед за быстро следующими друг за другом кашлевыми толчками во время приступа кашля у детей, больных коклюшем.

РЕПРОДУКТИ́ВНЫЙ ПОТЕНЦИА́Л — см. *Биотический потенциал.*

РЕПРОДУ́КЦИЯ (*ре-* + лат. productio производство) — 1) в биологии — см. *Размножение*; 2) в психологии — см. *Воспроизведение.*

РЕСАЗУРИ́НОВЫЙ ТЕСТ — метод оценки загрязненности молока микроорганизмами, основанный на способности нек-рых бактерий обесцвечивать добавленный к молоку краситель резазурин.

РЕСИНХРОНИЗА́ЦИЯ БИОЛОГИ́ЧЕСКИХ РИ́ТМОВ (*ре-* + синхронизация) — приведение биологических ритмов в синхронное состояние с теми сигналами времени (наступление дня и ночи и др.), по отношению к к-рым ритмы были нарушены, напр. в условиях космического полета, работы в ночную смену.

РЕСНИ́ЦЫ (cilia, PNA, BNA, JNA) — волосы, растущие на передних краях век.

РЕСНИ́ЧНОЕ ТЕ́ЛО (corpus ciliare, PNA, BNA, JNA; син. цилиарное тело) — часть сосудистой оболочки глаза, расположенная позади радужки; содержит ресничную мышцу.

РЕСНИ́ЧНЫЕ ОТРО́СТКИ [processus ciliares, PNA, BNA; processus (ciliares) majores, JNA; син. цилиарные отростки] — радиальные выступы на внутренней поверхности ресничного тела; место прикрепления ресничного пояска.

РЕСНИ́ЧНЫЙ ВЕ́НЧИК (corona ciliaris, PNA, BNA, JNA; син. цилиарный венчик) — часть ресничного тела, расположенная близ корня радужки, несущая ресничные отростки.

РЕСНИ́ЧНЫЙ КРУЖО́К (orbiculus ciliaris, PNA, BNA, JNA; син. цилиарный кружок) — периферическая часть ресничного тела, продолжающаяся в собственно сосудистую оболочку глаза.

РЕСНИ́ЧНЫЙ ПОЯСО́К (zonula ciliaris, PNA; zonula ciliaris Zinni, BNA; apparatus suspensorius lentis, JNA; син.: связка ресничная, циннова связка) — система волокон, идущих от ресничных отростков к капсуле хрусталика и прикрепляющихся в области его экватора; натяжение Р. п. при сокращении ресничной мышцы приводит к уменьшению кривизны хрусталика.

РЕСПИРА́ТОР[1] (лат. respiro, respiratum дышать) — средство индивидуальной защиты органов дыхания человека от вредных газов, паров и аэрозолей.

Р. ИЗОЛИ́РУЮЩИЙ — Р., в к-ром воздух, используемый для дыхания, полностью разобщен с окружающей средой.

Р. КИСЛОРО́ДНЫЙ — изолирующий Р., в к-ром состав воздуха, используемого для дыхания, постоянно возобновляется за счет подачи кислорода, напр. из переносного баллона.

Р. ПРОТИВОПЫЛЕВО́Й — см. *Респиратор фильтрующий.*

Р. ФИЛЬТРУ́ЮЩИЙ (син. Р. противопылевой)—Р., в к-ром вдыхаемый воздух проходит через фильтр, очищающий его от пыли и других аэрозолей.

Р. ШЛА́НГОВЫЙ — изолирующий Р., в к-ром воздух, используемый для дыхания, постоянно заменяется чистым, подаваемым по шлангу, присоединенному к Р.

РЕСПИРА́ТОР[2] — см. *Аппарат искусственной вентиляции легких.*

РЕСПИРА́ТОР БО́КСОВЫЙ (син.: «легкие железные» — устар., респиратор кабинный, респиратор танковый) — аппарат искусственной вентиляции легких, создающий периодические колебания давления газа в камере, в к-рой находится все тело больного, кроме головы.

РЕСПИРА́ТОР КАБИ́ННЫЙ — см. *Респиратор боксовый.*

РЕСПИРА́ТОР КИРА́СНЫЙ (син. Р. панцирный — устар.) — аппарат искусственной вентиляции легких, создающий периодические колебания давления газа в жесткой камере, окружающей грудную клетку больного.

РЕСПИРА́ТОР НАРУ́ЖНОГО ДЕ́ЙСТВИЯ — аппарат искусственной вентиляции легких, создающий колебания окружающего давления, вызывающие изменения объема грудной клетки.

РЕСПИРА́ТОР ОБЪЁМНЫЙ — аппарат искусственной вентиляции легких, в к-ром смена фаз дыхания происходит после вдувания в легкие больного определенного объема воздуха (газовой смеси).

РЕСПИРА́ТОР ПА́НЦИРНЫЙ (устар.) — см. *Респиратор кирасный.*

РЕСПИРА́ТОР ПРЕССОЦИКЛИ́ЧЕСКИЙ (лат. pressus давление + греч. kyklos круг, цикл) — аппарат искусственной вентиляции легких, в к-ром смена фаз дыхания происходит по достижении в легких заданного давления воздуха (газовой смеси).

РЕСПИРА́ТОР ТА́НКОВЫЙ — см. *Респиратор боксовый.*

РЕСПИРАТО́РНОЕ ЗАБОЛЕВА́НИЕ О́СТРОЕ (ОРЗ; син. катар дыхательных путей острый) — общее название ряда клинически сходных острых инфекционных болезней, вызываемых преимущественно вирусами (аденовирусами, реовирусами, энтеровирусами и др.), передающимися воздушно-капельным путем; регистрируются в виде спорадических случаев и эпидемических вспышек; характеризуются воспалением слизистой оболочки дыхательных путей, напр. в виде ринофарингита, ларинготрахеита, реже конъюнктивитом или кератоконъюнктивитом при умеренных явлениях интоксикации; термин используется только до установления этиологического диагноза лабораторными методами.

РЕСПИРАТО́РНЫЙ (лат. respiro, respiratum дышать) — относящийся к дыханию, к дыхательным путям.

РЕСПИРО́МЕТР (лат. respiro, respiratum дышать + греч. metreō измерять, определять) — прибор для измерения интенсивности газообмена в клетках и тканях при их культивировании.

«РЕСТАВРА́ЦИЯ» ТРУ́ПА (лат. restauratio восстановление) — совокупность воздействий, производимых на обезображенном трупе с целью восстановления внешнего облика умершего.

РЕСТЕНО́З (restenosis; *ре-* + *стеноз*)— повторное сужение просвета какого-либо органа после его расширения оперативным путем.

РЕСТИТУ́ЦИЯ (restitutio; лат. восстановление) в патологии — см. *Регенерация молная.*

РЕСТРИ́КЦИЯ (лат. restrictio ограничение) — разрушение чужеродной дезоксирибонуклеиновой кислоты под воздействием эндонуклеаз клетки.

РЕТАРДА́ЦИЯ (лат. retardatio опоздание, задержка; *ре-* + tardo замедлять) — запаздывание действия гена, в результате чего контролируемый этим геном признак в онтогенезе формируется позднее и фенотипически ослаблен.

RETÉNTIO TÉSTIS (лат. «удерживание, задерживание яичка») — см. *Крипторхизм.*

РЕТЕ́НЦИЯ (лат. retentio удерживание, задерживание) в психологии — компонент памяти: сохранение приобретенной информации.

РЕТЕ́НЦИЯ ЗУ́БА (retentio dentis; лат. retentio удерживание, задерживание; син. задержка зуба) — задержка сроков прорезывания нормально сформировавшегося постоянного зуба.

РЕ́ТИ МЕ́ТОД (L. Réthi, 1857—1924, венгерский оториноларинголог) — метод остановки носового кровотечения, заключающийся в выскабливании кровоточащего участка слизистой оболочки перегородки носа.

РЕ́ТИКУЛ- (ретикуло-; лат. reticulum уменьшительное от rete сеть) — составная часть сложных слов, означающая «сетчатый», «имеющий сетчатое строение», «относящийся к ретикулярной ткани».

РЕТИКУЛЁЗ (reticulosis; *ретикул-* + *-оз*) — 1) (истор.; син. ретикулобластоматоз) — общее название болезней, в основе к-рых лежит злокачественная системная пролиферация ретикулярных клеток, входящих в состав ретикулярной стромы кроветворных органов; 2) см. *Гистиоцитоз злокачественный.*

РЕТИКУЛЁЗ КО́ЖИ (reticulosis cutis) — прогрессирующая пролиферация так называемых ретикулярных клеток, преимущественно кожи; проявляется полиморфной сыпью (эритемой, папулами, узлами и др.).

РЕТИКУЛЁЗ КО́ЖИ ЛИПОМЕЛАНОТИ́ЧЕСКИЙ (reticulosis cutis lipomelanotica) — см. *Потрие — Воренже синдром.*

РЕТИКУЛЁЗ МАКРОГЛОБУЛИНЕМИ́ЧЕСКИЙ (нрк; reticulosis macroglobulinaemica) — см. *Вальденстрема болезнь.*

РЕТИКУЛЁЗ НЕЛЕЙКЕМИ́ЧЕСКИЙ (нрк; reticulosis aleukaemica) — см. *Ниманна — Пика болезнь.*

РЕТИКУЛЁЗ СЕЗАРИ́ (нрк) — см. *Сезари синдром.*

РЕТИКУЛЁЗ ФИБРОМИЕЛО́ИДНЫЙ (нрк; reticulosis fibromyeloidea)— см. *Лимфогранулематоз.*

РЕТИКУЛЕ́МА ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (нрк; reticuloma benignum; *ретикул-* + *-ома*) — см. *Гранулема эозинофильная.*

РЕТИКУЛЕ́МА ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННАЯ ЛИМФО́ИДНО-КЛЕ́ТОЧНАЯ (reticuloma lymphoidocellulare benignum) — см. *Лимфоцитома кожи.*

РЕТИКУЛИ́Н — белок ретикулярных волокон, по составу близкий к коллагену.

РЕТИКУЛО- — см. *Ретикул-.*

РЕТИКУЛОБЛАСТОМАТО́З [истор.; reticuloblastomatosis; *ретикуло-* + *бластома* (основа blastomat-) + *-оз*] — см. *Ретикулез.*

РЕТИКУЛОГИСТИОЦИТО́З НЕЛИПО́ИДНЫЙ — см. *Леттерера — Сиве болезнь.*

РЕТИКУЛОЛИМФОМАТО́З МАКРОГЛОБУЛИНЕМИ́ЧЕСКИЙ [reticulolymphomatosis macroglobulinaemica; *ретикуло-* + лимфома (основа lymphomat-) + *-оз*] — см. *Вальденстрема болезнь.*

РЕТИКУЛОПЛАЗМОЦИТО́З (reticuloplasmocytosis; *ретикуло-* + *плазмоцит* + *-оз*) — см. *Болезнь миеломная.*

РЕТИКУЛОСАРКО́МА (reticulosarcoma; *ретикуло-* + *саркома*; син.: ретельсаркома, саркома ретикулоклеточная) — злокачественная опухоль из клеток ретикулярной ткани (ретикулярные клетки, гистиоциты и др.).

РЕТИКУЛОСПИНА́ЛЬНЫЙ ТРАКТ (tractus reticulospinalis) — см. *Ретикулоспинномозговой путь.*

РЕТИКУЛОСПИННОМО́ЗГОВО́Й ПУТЬ (tractus reticulospinalis, PNA; син.: ретикулоспинальный тракт, сетчато-спинномозговой путь) — эфферентный проводящий нервный путь экстрапирамидной системы, начинающийся в ретикулярной формации продолговатого мозга, проходящий рассеянными пучками в переднем и боковом канатиках спинного мозга и заканчивающийся в передних рогах спинного мозга.

РЕТИКУЛОТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ ПУТЬ (tractus reticulothalamicus; син. ретикулоталамический тракт) — восходящий нервный путь, начинающийся в ретикулярной формации ствола головного мозга и заканчивающийся в ретикулярном ядре таламуса.

РЕТИКУЛОТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ ТРАКТ (tractus reticulothalamicus) — см. *Ретикулоталамический путь.*

РЕТИКУЛОЦИ́Т (reticulocytus; *ретикуло-* + гист. cytus клетка) — эритроцит, при суправитальной окраске к-рого выявляется базофильная сеточка.

РЕТИКУЛОЦИТО́З (reticulocytosis; *ретикулоцит* + *-оз*) — увеличенное содержание ретикулоцитов в периферической крови (более 1% от числа эритроцитов); признак напряжения эритроцитопоэза.

РЕТИКУЛОЦИТОПЕ́НИЯ (reticulocytopenia; *ретикулоцит* + греч. penia бедность, недостаток) — уменьшенное содержание ретикулоцитов в периферической крови (менее 0,5% от числа эритроцитов); признак угнетения эритропоэза.

РЕТИКУЛОЭНДОТЕ́ЛИЙ (*ретикуло-* + *эндотелий*)— см. *Система макрофагов.*

РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИО́З (reticuloendotheliosis; *ретикулоэндотелий* + *-оз*) — см. *Гистиоцитоз злокачественный.*

РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИО́З МЕТАБОЛИ́ЧЕСКИЙ (reticuloendotheliosis metabolica) — см. *Ниманна — Пика болезнь.*

РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИО́З ЭПИТЕЛИО́ИДНО-КЛЕ́ТОЧНЫЙ ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (reticuloendotheliosis epithelioidocellularis chronica)—см. *Саркоидоз.*

РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИО́З ЭРУПТИ́ВНЫЙ КОНЕ́ЧНОСТЕЙ (reticuloendotheliosis eruptiva extremitatum)— см. *Крости — Джанотти болезнь.*

РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИОЦИ́Т (reticuloendotheliocytus, LNH; *ретикуло-* + *эндотелиоцит*; син. клетка ретикулоэндотелиальная) — клетка, способная фагоцитировать инородные частицы и накапливать в цитоплазме коллоидные вещества; к Р. относят макрофаги рыхлой соединительной ткани, ретикулярные клетки кроветворных органов, эндотелиальные клетки капилляров кроветворных органов и др.

Р. ЗВЁЗДЧАТЫЙ (r. stellatus, LNH; син.: Бровича — Купфера клетка, клетка береговая, клетка синусоидная, клетка эндотелиальная звездчатая, Купфера клетка) — Р., представляющий собой эндотелиальную клетку внутридольковых синусоидальных капилляров печени, имеющую звездчатую форму и способную превращаться в макрофаг.

РЕТИКУЛЯ́РНАЯ МЕМБРА́НА (membrana reticularis) — см. *Сетчатая мембрана.*

РЕТИКУЛЯ́РНАЯ СУБСТА́НЦИЯ (substantia reticularis) — см. *Ретикулярная формация.*

РЕТИКУЛЯ́РНАЯ ФОРМА́ЦИЯ (formatio reticularis, PNA; substantia reticularis grisea et alba, BNA, JNA; син.: ретикулярная субстанция, сетевидная формация) — скопление нейронов, окруженное нервными волокнами, расположенное в центральных отделах ствола головного мозга и между боковыми и задними рогами спинного мозга; осуществляет активирующее воздействие на кору большого мозга и контролирует рефлекторную деятельность спинного мозга.

РЕТИ́Н- (ретино-; анат. retina сетчатка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сетчатке».

РЕТИНА́Л — см. *Ретинальдегид.*

РЕТИНА́ЛЬ — см. *Ретинальдегид.*

РЕТИНАЛЬДЕГИ́Д (retinaldehydum; син.: витамин А-альдегид, зрительный желтый, ретинал, ретиналь, ретинен) — форма витамина А, отличающаяся от ретинола наличием альдегидной группы; Р. в соединении с белком опсином образует родопсин (зрительный пурпур).

РЕТИНЕ́Н — см. *Ретинальдегид.*

РЕТИНИ́Т (retinitis; *ретин-* + *-ит*) — воспаление сетчатки; при локализации в ее центральной части (в области желтого пятна) приводит к снижению остроты зрения.

РЕТИНИ́Т АЛЬБУМИНУРИ́ЧЕСКИЙ (устар.; retinitis albuminurica) — см. *Ретинопатия почечная.*

РЕТИНИ́Т АРТЕРИОСПАСТИ́ЧЕСКИЙ (retinitis arteriospastica) — см. *Ретинопатия гипертоническая.*

РЕТИНИ́Т КАХЕКТИ́ЧЕСКИЙ (retinitis cachectica) — дегенерация сетчатки при опухолевой кахексии.

РЕТИНИ́Т КОЛЬЦЕВИ́ДНЫЙ — см. *Ретинит опоясывающий.*

РЕТИНИ́Т КРУГОВО́Й — см. *Ретинит опоясывающий.*

РЕТИНИ́Т ЛЕ́БЕРА — см. *Лебера ретинопапиллит.*

РЕТИНИ́Т МЕТАСТАТИ́ЧЕСКИЙ (retinitis metastatica) — ретинит, обусловленный заносом возбудителей инфекции в сетчатку из какого-либо отдаленного очага воспаления.

РЕТИНИ́Т НАРУ́ЖНЫЙ ЭКССУДАТИ́ВНЫЙ (retinitis exsudativa; син. Коутса болезнь) — односторонний ретинит неизвестной этиологии, характеризующийся наличием экссудата между наружными слоями сетчатки и сосудистой оболочки и кровоизлияниями на поверхности сетчатки; наблюдается у детей и лиц молодого возраста.

РЕТИНИ́Т ОПОЯСЫВАЮЩИЙ (retinitis circinata; син.: дегенерация сетчатки кольцевидная, ретинит кольцевидный, ретинит круговой) — дегенерация сетчатки при атеросклерозе, офтальмоскопически характеризующаяся наличием мелких округлых белых очажков, расположенных вокруг желтого пятна в виде незамкнутого кольца.

РЕТИНИ́Т ПИГМЕ́НТНЫЙ (нрк; retinitis pigmentosa) — см. *Дегенерация сетчатки пигментная.*

РЕТИНИ́Т ПРОЛИФЕРИ́РУЮЩИЙ (retinitis proliferans) — см. *Илза болезнь.*

РЕТИНИ́Т ПСЕВДОАЛЬБУМИНУРИ́ЧЕСКИЙ ЗВЁЗДЧАТЫЙ (retinitis pseudoalbuminurica stellata) — см. *Ретинит псевдонефритический звездчатый.*

РЕТИНИ́Т ПСЕВДОНЕФРИТИ́ЧЕСКИЙ ЗВЁЗДЧАТЫЙ (retinitis pseudonephritica stellata; син. ретинит псевдоальбуминурический звездчатый) — дегенерация сетчатки, офтальмоскопически характеризующаяся наличием в области желтого пятна узких белых очагов, образующих фигуру звезды; наблюдается при нек-рых инфекционных болезнях и интоксикациях, протекающих без поражения почек, напр. при кори, гриппе.

РЕТИНИ́Т СЕПТИ́ЧЕСКИЙ (retinitis septica) — метастатический ретинит при сепсисе.

РЕТИНИ́Т СО́ЛНЕЧНЫЙ (retinitis solaris) — ретинит, обусловленный действием прямого солнечного излучения на сетчатку (напр., при наблюдении солнечного затмения без защитных очков).

РЕТИНИ́Т ТОКСОПЛАЗМО́ЗНЫЙ (retinitis toxoplasmotica) — см. *Хориоретинит токсоплазмозный.*

РЕТИНИ́Т ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ ЭКССУДАТИ́ВНЫЙ (устар.; retinitis centralis exsudativa) — см. *Ретинопатия центральная серозная.*

РЕТИНИ́Т ЦИРКУМПАПИЛЛЯ́РНЫЙ (retinitis circumpapillaris) — форма сифилитического хориоретинита, при к-рой поражен участок сетчатки вокруг диска зрительного нерва.

РЕТИНО- — см. *Ретин-.*

РЕТИНОБЛАСТО́МА (retinoblastoma; *ретино-* + *бластома*; син.: глиома сетчатки — нрк, нейроэпителиома злокачественная, нейроэпителиома сетчатки) — злокачественная нейроэктодермальная опухоль сетчатки.

РЕТИНОДЕГЕНЕРА́ЦИЯ (retinodegeneratio; *ретино-* + *дегенерация*) — см. *Дегенерация сетчатки.*

РЕТИНОДИСТРОФИ́Я (retinodystrophia; *ретино-* + *дистрофия*) — см. *Дегенерация сетчатки.*

РЕТИНО́ЕВАЯ КИСЛОТА́ (acidum retinoicum; син. витамин А-кислота) — форма витамина А, отличающаяся от ретинола наличием карбоксильной группы.

РЕТИНО́Л (син. витамин А) — жирорастворимый витамин, образующийся в организме человека из поступающего с пищей каротина; недостаточность Р. обусловливает развитие алиментарной гемералопии.

РЕТИНОПАПИЛЛИ́Т ЛЕ́БЕРА — см. *Лебера ретинопапиллит.*

РЕТИНОПАТИ́Я (retinopathia, *ретино-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название нек-рых поражений сетчатки невоспалительного характера; при локализации в центральной части сетчатки (в области желтого пятна) приводит к снижению остроты зрения.

Р. АНГИОСПАСТИ́ЧЕСКАЯ (r. angiospastica) — см. *Ретинопатия гипертоническая.*

Р. АНГИОСПАСТИ́ЧЕСКАЯ ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ (r. angiospastica centralis) — см. *Ретинопатия центральная серозная.*

Р. АНЕМИ́ЧЕСКАЯ (r. anaemica) — Р. при пернициозной анемии, офтальмоскопически проявляющаяся бледной окраской глазного дна и кровоизлияниями в сетчатку.

Р. АРТЕРИОСКЛЕРОТИ́ЧЕСКАЯ (r. arteriosclerotica; син. Р. склеротическая) — Р., обусловленная атеросклерозом сосудов сетчатки; офтальмоскопически проявляется извитостью сосудов сетчатки, их сужением или облитерацией.

Р. ГИПЕРТОНИ́ЧЕСКАЯ (r. hypertonica; син.: ретинит артериоспастический, Р. ангиоспастическая) — Р., обусловленная артериальной гипертензией; офтальмоскопически проявляется сужением артерий сетчатки, наличием кровоизлияний и белых очагов в сетчатке, отеком диска зрительного нерва.

Р. ДИАБЕТИ́ЧЕСКАЯ (r. diabetica) — Р. при сахарном диабете; офтальмоскопически проявляется аневризмами артерий сетчатки, наличием мелких кровоизлияний и белых очагов в окружности диска зрительного нерва.

Р. ДИСПРОТЕИНЕМИ́ЧЕСКАЯ (r. dysproteinaemica) — Р., обусловленная диспротеинемией; офтальмоскопически проявляется серо-белой окраской глазного дна и расширением вен сетчатки.

Р. КОЛЛАГЕНО́ЗНАЯ (r. collagenosa) — Р. при коллагенозах; офтальмоскопически проявляется резким расширением венул сетчатки и наличием ватоподобных белых очагов разной величины и формы в области желтого пятна.

Р. ЛЕЙКЕМИ́ЧЕСКАЯ (r. leukaemica) — Р. при острых лейкозах; офтальмоскопически проявляется обесцвечиванием глазного дна, множественными кровоизлияниями в сетчатку и наличием в ней небольших круглых белых очагов, иногда окаймленных красным ободком.

Р. ЛУЧЕВА́Я (r. radialis) — Р., обусловленная воздействием ионизирующего излучения; офтальмоскопически проявляется расширением сосудов сетчатки и кровоизлияниями в нее.

Р. ПАРАПРОТЕИНЕМИ́ЧЕСКАЯ (r. paraproteinaemica) — Р., обусловленная парапротеинемией; офтальмоскопически проявляется серо-белой окраской глазного дна и резким расширением венул сетчатки.

Р. ПИГМЕ́НТНАЯ (r. pigmentosa) — см. *Дегенерация сетчатки пигментная.*

Р. ПОЛИЦИТЕМИ́ЧЕСКАЯ (r. polycythaemica) — Р. при полицитемии; офтальмоскопически проявляется цианотичной окраской глазного дна, извитыми венулами сетчатки и кровоизлияниями около них.

Р. ПО́ЧЕЧНАЯ (r. renalis; син.: ретинит альбуминурический — устар.)— гипертоническая Р., обусловленная поражением почек.

Р. СКЛЕРОТИ́ЧЕСКАЯ (r. sclerotica) — см. *Ретинопатия артериосклеротическая.*

Р. ТОКСОГРАВИДА́РНАЯ (r. gravidarum) — Р. при токсикозе беременности; офтальмоскопически проявляется отеком диска зрительного нерва, перипапиллярным отеком, сужением артериол, наличием сероватобелых очагов и кровоизлияний в сетчатку.

Р. ТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ (r. traumatica; син.: ангиопатия сетчатки травматическая, Пурчера болезнь) — Р., возникающая при внезапном сдавлении черепа, грудной клетки или брюшной полости; офтальмоскопически проявляется наличием белых пятен вокруг диска зрительного нерва и полосчатых кровоизлияний в сетчатку.

РЕТИНОПАТИ́Я ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ СЕРО́ЗНАЯ (retinopathia centralis serosa; син.: Китахары синдром, Масуды — Китахары синдром, отек преретинальный, отслойка сетчатки идиопатическая плоская, ретинит центральный экссудативный, ретинопатия ангиоспастическая центральная, хориоретинит центральный ангионевротический, хориоретинит центральный серозный) — болезнь глаз токсико-инфекционной природы, характеризующаяся спазмом сосудов хориокапиллярной пластинки сосудистой оболочки и проявляющаяся внезапным ухудшением зрения с развитием центральной скотомы, а офтальмоскопически — помутнением и отеком сетчатки в области желтого пятна.

РЕТИНОСКОПИ́Я (*ретино-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — см. *Офтальмоскопия в бескрасном свете.*

РЕТИНОФО́Т (*ретино-* + фотографирование) — аппарат для фотографирования глазного дна.

РЕТИНОХОРИОИДИ́Т (retinochorioiditis; *ретино-* + анат. chorioidea собственно сосудистая оболочка глазного яблока + *-ит*) — см. *Хориоретинит.*

РЕТИНОХОРИОИДИ́Т ОКОЛОСОСО́ЧКОВЫЙ (retinochorioiditis juxtapapillaris; син.: Йенсена нейроретинит, Йенсена околососочковый ретинохориоидит) — хориоретинит, характеризующийся развитием секторовидного дефекта поля зрения, а офтальмоскопически — наличием матово-белого очага в сетчатке, сливающегося с диском зрительного нерва и отчасти прикрывающего сосуды сетчатки.

РЕТИНОШИ́ЗИС (retinoschisis; *ретино-* + греч. schisis расщепление) — расслоение сетчатки при ее кистовидной дегенерации; сопровождается скоплением жидкости между образовавшимися слоями.

РЕТОРАКОПЛА́СТИКА (rethoracoplastica; *ре-* + *торакопластика*) — торакопластика, произведенная повторно, в той же области, по поводу того же заболевания.

РЕТОРАКОТОМИ́Я (rethoracotomia; *ре-* + *торакотомия*) — повторная торакотомия с вскрытием плевральной полости путем разведения краев ранее ушитой операционной раны.

РЕТОТЕ́ЛИЙ [лат. rete сеть + (*эндо*)*телий*] — см. *Система макрофагов.*

РЕТОТЕЛЬСАРКО́МА (retothelsarcoma; *ретотелий* + *саркома*) — см. *Ретикулосаркома.*

РЕТРАВИ́РУСЫ (Retraviridae; син. вирусы лейкозов) — семейство вирусов, вирионы к-рых содержат нуклеокапсид и имеют наружную оболочку; геном представлен однонитчатой молекулой рибонуклеиновой кислоты; в вирионе Р. содержится ревертаза (обратная транскриптаза); включает вирусы, патогенные для человека и животных, в т. ч. медленные вирусы.

РЕТРА́КТОР АМПУТАЦИО́ННЫЙ (лат. retraho, retractum, оттягивать, стягивать) — хирургический инструмент для оттягивания и защиты мягких тканей при перепиливании кости в ходе ампутации конечности.

РЕТРА́КТОР ДЛЯ ЯЗЫКА́ — хирургический инструмент в виде овальной лопатки, расположенной под углом к петлеобразной ручке, предназначенный для отведения языка при хирургических операциях в подъязычной области.

РЕТРАКТОЭНЗИ́М — см. *Фактор 6 тромбоцитов.*

РЕТРА́КЦИЯ (лат. retractio стягивание, сокращение) — уменьшение объема клетки, ткани или другого морфологического образования (напр., кровяного сгустка) за счет сокращения (укорочения) нек-рых элементов его структуры.

РЕТРАНСФУ́ЗИЯ КРО́ВИ (retransfusio sanguinis; *ре-* + *трансфузия*) — см. *Переливание крови обратное.*

РЕТРО- (лат. retro-) — приставка, означающая «находящийся, расположенный позади чего-либо», «направленный назад, обратно».

РЕТРОВЕ́РСИЯ МА́ТКИ (retroversio uteri; *ретро-* + лат. verto, versum вертеть, поворачивать) — положение матки, при к-ром ее тело отклонено кзади, а шейка — кпереди относительно оси таза.

РЕТРОГЕНИ́Я (retrogenia; *ретро-* + греч. genys, genyos челюсть, нижняя челюсть) — аномалия развития: сдвиг нижней челюсти кзади при ее нормальных размерах.

РЕТРОГНАТИ́Я (retrognathia; *ретро-* + греч. gnathos челюсть) — аномалия развития; сдвиг верхней челюсти кзади при ее нормальных размерах.

РЕТРОДЕВИА́ЦИЯ МА́ТКИ (retrodeviatio uteri; *ретро-* + лат. devio, deviatum сбиваться с пути) — положение матки, при к-ром ее тело отклонено кзади, шейка — кпереди (ретроверсия), а угол между ними открыт кзади (ретрофлексия).

РЕТРОКАРДИА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium retrocardiacum; *ретро-* + греч. kardia сердце; син.: Гольцкнехта пространство, позадисердечное пространство) — пространство между задней поверхностью сердца и передней поверхностью позвоночника; размеры Р. п. определяют на косых и боковых рентгенограммах грудной клетки путем рентгенограмметрии.

РЕТРОКОРНЕА́ЛЬНАЯ ПЛЁНКА (membrana retrocornealis; *ретро-* + анат. cornea роговица) — фиброзная пленка на задней поверхности роговицы, формирующаяся в результате асептического пролиферативного воспаления при повреждениях задней пограничной пластинки и эндотелия роговицы, напр. после сквозной кератопластики.

РЕТРОЛЕНТА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium retrolentale; *ретро-* + анат. lens, lentis хрусталик) — щелевидное пространство между задней поверхностью хрусталика и передней поверхностью стекловидного тела.

РЕТРОМАНДИБУЛЯ́РНАЯ ЯМКА (fossa retromandibularis; *ретро-* + анат. mandibula нижняя челюсть) — см. *Позадичелюстная ямка.*

РЕТРОНАЗА́ЛЬНЫЙ (retronasalis; *ретро-* + лат. nasus нос) — относящийся к носовой части глотки.

РЕТРОПЕРИТОНЕА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium retroperitoneale; *ретро-* + анат. peritoneum брюшина)— см. *Забрюшинное пространство.*

РЕТРОПЕРИТОНИ́Т (retroperitonitis; *ретро-* + *перитонит*) — воспаление клетчатки забрюшинного пространства.

РЕТРОПЕРИТОНИ́Т ФИБРО́ЗНЫЙ ИДИОПАТИ́ЧЕСКИЙ (retroperitonitis fibrosa idiopathica) — см. *Ормонда болезнь.*

РЕТРОПОЗИ́ЦИЯ (*ретро-* + лат. positio установка, положение) в офтальмологии — см. *Рецессия.*

РЕТРОПОЗИ́ЦИЯ МА́ТКИ (retropositio uteri; *ретро-* + лат. positio установка, положение) — положение матки, при к-ром она вся смещена кзади относительно оси таза.

РЕТРОПУ́ЛЬСИЯ (retropulsio; *ретро-* + лат. pello, pulsum толкать) — непреодолимое ускорение движения больного назад после толчка в этом направлении; наблюдается при паркинсонизме.

РЕТРОРЕКТА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium retrorectale; *ретро-*+ анат. rectum прямая кишка) — см. *Позадипрямокишечное пространство.*

РЕТРОСТЕРНА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium retrosternale; *ретро-* + анат. sternum грудина) — см. *Загрудинное пространство.*

РЕТРОТРАНСПОЗИ́ЦИЯ (retrotranspositio; *ретро-* + лат. transpositio перестановка) — хирургическая операция: удлинение мягкого неба путем смещения кзади слизисто-надкостничных лоскутов с твердого неба; применяется при врожденных расщелинах неба.

РЕТРОФАРИНГЕА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium retropharyngeale; *ретро-* + анат. pharynx, pharyngis глотка) — см. *Заглоточное пространство.*

РЕТРОФЛЕ́КСИЯ МА́ТКИ (retroflexio uteri; *ретро-* + лат. flexio сгибание, изгиб; син. загиб матки) — аномальный перегиб между телом и шейкой матки, при к-ром образованный ими тупой угол открыт кзади.

РЕТРОЦИКЛОДИА́ЛИЗ (retrocyclodialysis; *ретро-* + *циклодиализ*) — модификация циклодиализа, при к-рой ресничное тело отсепаровывают от склеры на большем протяжении в направлении заднего полюса глаза.

РЕ́ТЦИУСА ВЕ́НЫ (venae Retzii; A. Retzius, 1796—1860, шведский анатом) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1356.*

РЕ́ТЦИУСА ИЗВИ́ЛИНЫ (gyri Retzii; A. Retzius, 1796—1860, шведский анатом) — см. *Извилины мозолистого тела.*

РЕ́ТЦИУСА ОПО́РНЫЕ НИ́ТИ (M. G. Retzius, 1842—1919, шведский гистолог) — см. *Слуховые струны.*

РЕ́ТЦИУСА ПРОСТРА́НСТВО (spatium Retzii; A. Retzius, 1796—1860,

шведский анатом) — см. *Залобковое пространство.*

РЕФЛЕ́КС (-Ы) (reflexus; лат. «отражение», от reflecto, reflexum поворачивать, обращать назад) — реакция организма на раздражение, осуществляемая при участии нервной системы.

Р. АДДУКТО́РНЫЙ (r. adductorius) — физиологический периостальный Р.: приведение бедра при поколачивании по гребешку подвздошной кости, лобковому симфизу, внутренней поверхности колена или по большеберцовой кости.

Р. АДДУКТО́РНЫЙ ДОРСА́ЛЬНЫЙ (r. adductorius dorsalis; син.: Мак-Карти спиноаддукторный рефлекс, Членова дорсальный рефлекс аддукторов, Членова — Мак-Карти рефлекс) — патологический Р.: приведение одного или обоих бедер сидящего с разведенными ногами исследуемого при поколачивании по остистым отросткам позвонков; наблюдается при поражении пирамидных путей.

Р. АЛЛИЙРОВАННЫЕ (франц. allier соединять, соединяться) — Р., взаимно усиливающие друг друга.

Р. АНА́ЛЬНЫЙ (r. analis) — физиологический Р.: сокращение наружного сфинктера заднего прохода при покалывании или штриховом раздражении кожи вокруг него; вызывают в положении исследуемого на боку с приведенными к животу ногами.

Р. АНТАГОНИСТИ́ЧЕСКИЕ (r. antagonistici) — Р., один из к-рых оказывает тормозящее влияние на другой.

Р. АУРОПАЛЬПЕБРА́ЛЬНЫЙ (r. auropalpebralis; лат. auris ухо + palpebra веко; син. Р. кохлеопальпебральный) — физиологический Р.: смыкание век при внезапном воздействии звукового раздражителя.

Р. АУРОПУПИЛЛЯ́РНЫЙ (r. auropupillaris; лат. auris ухо + pupilla зрачок) — физиологический Р.: быстрое сужение зрачков с последующим медленным их расширением при внезапном воздействии звукового раздражителя.

Р. АХИ́ЛЛОВ (r. Achillis) — физиологический Р.: подошвенное сгибание стопы при ударе молоточком по пяточному (ахиллову) сухожилию.

РЕФЛЕ́КС А́ШНЕРА — см. *Рефлекс глазосердечный.*

РЕФЛЕ́КС БАБИ́НСКОГО — см. *Бабинского рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС БА́БКИНА — см. *Рефлекс ладонно-рото-головной.*

Р. БЕ́ДРЕННЫЙ РЕ́МАКА — см. *Ремака бедренный рефлекс.*

Р. БЕЗУСЛО́ВНЫЙ (син. Р. врожденный) — врожденный Р., постоянно возникающий у особей данного вида и возраста при адекватном раздражении определенных рецепторов.

РЕ́ФЛЕ́КС БЕ́ЙНБРИДЖА — см. *Бейнбриджа рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС БЕ́ТТИГЕРА — см. *Беттигера рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС БЕ́ХТЕРЕВА — МАРИ́—ФУА́ — см. *Бехтерева — Мари — Фуа рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС БЕ́ХТЕРЕВА — МЕ́НДЕЛЯ — см. *Бехтерева — Менделя рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС БЕ́ХТЕРЕВА — ЯКОБСО́НА — см. *Якобсона — Ласка рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС БИ́НГА — см. *Бинга рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС БРИССО́ — см. *Бриссо рефлекс.*

Р. БРЮШНО́Й (r. abdominalis) — общее название физиологических Р., проявляющихся сокращением каких-либо мышц передней брюшной стенки.

Р. БРЮШНО́Й ВЕ́РХНИЙ (r. abdominalis superior) — поверхностный Р. б., при к-ром раздражение наносят вдоль реберной дуги.

Р. БРЮШНО́Й ГЛУБО́КИЙ (r. abdominalis profundus) — Р. б., вызываемый ударом молоточка по гребешку подвздошной кости, по лобку или по реберной дуге.

Р. БРЮШНО́Й КО́ЖНЫЙ (r. abdominalis cutaneus) — см. *Рефлекс брюшной поверхностный.*

Р. БРЮШНО́Й НИ́ЖНИЙ (r. abdominalis inferior) — поверхностный Р. б., при к-ром раздражение наносят над паховой связкой.

Р. БРЮШНО́Й ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ (r. abdominalis superficialis; син. Р. брюшной кожный) — Р. б., вызываемый быстрым штриховым раздражением кожи живота в направлении от периферии к средней линии.

Р. БРЮШНО́Й СРЕ́ДНИЙ (r. abdominalis medius) — поверхностный Р. б., при к-ром раздражение наносят на кожу брюшной стенки на уровне пупка.

Р. БУЛЬБА́РНЫЕ (r. bulbares) — Р., рефлекторная дуга к-рых замыкается в ядрах продолговатого мозга (напр., глоточный, небный, глотательный, сосательный Р.).

Р. БУЛЬБОКАВЕРНО́ЗНЫЙ (r. bulbocavernosus) — физиологический Р.: сокращение луковично-губчатой мышцы при легком сдавливании пальцами головки полового члена.

Р. БУЛЬДО́ЖИЙ — см. *Янишевского симптом.*

РЕФЛЕ́КС ВА́РТЕНБЕРГА — см. *Вартенберга рефлекс.*

Р. ВЕГЕТАТИ́ВНЫЙ (r. vegetativus) — общее название Р., регулирующих деятельность желез, сосудов, внутренних органов, гладких мышц, а также оказывающих различные адаптационно-трофические влияния.

Р. ВЕГЕТОСОМАТИ́ЧЕСКИЙ (r. vegetosomaticus) — см. *Рефлекс висцеромоторный.*

Р. ВЕКОЗРАЧКО́ВЫЙ (r. palpebropupillaris) — см. *Орбикулярный феномен.*

Р. ВЕСТИБУЛОСПИНА́ЛЬНЫЙ (r. vestibulospinalis; син. реакция отклонения) — физиологический Р.: отклонение туловища и конечностей в сторону при раздражении рецепторов вестибулярного анализатора.

Р. ВЕСТИБУЛОТОНИ́ЧЕСКИЙ (r. vestibulotonicus) — тонический Р.: изменение тонуса мышц на стороне раздражения рецепторов лабиринта.

Р. ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (r. visceralis; син. висцерорефлекс) — общее название Р., обусловленных раздражением внутренних органов или проявляющихся изменением функции каких-либо внутренних органов.

Р. ВИСЦЕРОВАЗОМОТО́РНЫЙ (r. viscerovasomotorius) — висцеральный Р.: изменение просвета кровеносных сосудов при раздражении рецепторов внутренних органов.

Р. ВИ́СЦЕРО-ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (r. visceravisceralis) — висцеральный Р.: изменение деятельности внутреннего органа при раздражении рецепторов другого внутреннего органа.

Р. ВИСЦЕРОДЕРМА́ЛЬНЫЙ (r. viscerodermalis) — см. *Рефлекс висцерокутанный.*

Р. ВИСЦЕРОКУТА́ННЫЙ (r. viscerocutaneus; син. Р. висцеродермальный) — висцеральный Р.: изменение чувствительности определенных участков кожи (зон Захарьина — Геда) при раздражении рецепторов внутреннего органа.

Р. ВИСЦЕРОМОТО́РНЫЙ (r. visceromotorius; син.: Р. вегетосоматический, Р. висцеросоматический) — висцеральный Р.: сокращение определенных скелетных мышц при раздражении рецепторов внутреннего органа.

Р. ВИСЦЕРОСЕКРЕТО́РНЫЙ (r. viscerosecretorius) — висцеральный Р.: изменение деятельности определенных желез внешней или внутренней секреции при раздражении рецепторов внутреннего органа.

Р. ВИСЦЕРОСЕНСО́РНЫЙ (r. viscerosensorius) — висцеральный Р.: возникновение различных ощущений при раздражении рецепторов внутренних органов.

Р. ВИСЦЕРОСОМАТИ́ЧЕСКИЙ (r. viscerosomaticus) — см. *Рефлекс висцеромоторный.*

Р. ВКУСОСЛЁЗНЫЙ (r. gustolacrimalis) — одностороннее профузное слезотечение при раздражении вкусовых рецепторов; возникает на стороне поражения лицевого нерва (в области ганглия коленца).

РЕФЛЕ́КС ВО́ДАКА — см. *Водака рефлекс.*

Р. ВОЛОСКО́ВЫЙ — см. *Рефлекс пиломоторный.*

Р. НА ВРЕ́МЯ — вид условного Р., при к-ром условным раздражителем является наступление определенного момента времени.

Р. ВРОЖДЁННЫЙ — см. *Рефлекс безусловный.*

Р. ВУЛЬВОАНА́ЛЬНЫЙ (r. vulvoanalis) — физиологический Р. у женщин: одновременное сокращение наружного сфинктера заднего прохода и луковично-губчатой мышцы при штриховом раздражении кожи промежности и окружности заднего прохода или при раздражении слизистой оболочки прямой кишки.

Р. ВЫПРЯМИ́ТЕЛЬНЫЙ — см. *Рефлекс установочный.*

РЕФЛЕ́КС ВЮРПА́ — см. *Вюрпа рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ВЮРПА́ — ТУЛУ́ЗА — см. *Вюрпа рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ГААБА — см. *Гааба рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ГА́ЛАНТА — см. *Галанта рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ГАЛА́ССИ — см. *Орбикулярный феномен.*

Р. ГАЛЬВАНОЗРАЧКО́ВЫЙ (син. Р. гальванопупилломоторный) — зрачковый Р.: сужение зрачков под влиянием раздражения гальваническим током, для нанесения к-рого анод помещают над глазом или в височной области, а катод — на задней поверхности шеи.

Р. ГАЛЬВАНОПУПИЛЛОМОТО́РНЫЙ — см. *Рефлекс гальванозрачковый.*

Р. ГАСТРОИЛЕА́ЛЬНЫЙ ПО́РГЕСА (греч. gastēr желудок + анат. ileum подвздошная кишка) — см. *Поргеса гастроилеальный рефлекс.*
Р. ГАСТРОЛИНГВА́ЛЬНЫЙ (r. gastrolingualis; греч. gastēr желудок + лат. lingua язык) — висцеровисцеральный Р.: изменение секреторной функции слизистой оболочки языка при раздражении рецепторов слизистой оболочки желудка.
Р. ГАСТРОЦЕКА́ЛЬНЫЙ r. gastrocecalis; греч. gastēr желудок + анат. coecum слепая кишка) — висцеровисцеральный Р.: ускорение эвакуации содержимого слепой кишки при растяжении стенки желудка.
РЕФЛЕ́КС ГЕ́ННЕБЕРГА — см. *Геннеберга рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ГЕ́НРИ — ГА́УЭРА — см. *Генри — Гауэра рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ГЕ́РИНГА — см. *Геринга рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ГЕ́РИНГА — БРЕ́ЙЕРА — см. *Геринга — Брейера рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ГИЙЕ́НА — ТРИУ́МФОВА — см. *Триумфова рефлекс.*
Р. ГИПОХОНДРА́ЛЬНЫЙ (r. hypochondrialis; греч. hypochondrion подреберье, от hypo- под + chondros хрящ) — физиологический Р.: сокращение верхней части прямой мышцы живота при штриховом раздражении кожи в области пятого — шестого межреберья.
РЕФЛЕ́КС ГИ́РШБЕРГА — см. *Маринеску — Гиршберга симптом.*
РЕФЛЕ́КС ГИ́ФФОРДА — ГАЛА́ССИ — см. *Гиффорда — Галасси рефлекс.*
Р. ГЛАБЕЛЛЯ́РНЫЙ (r. glabellaris; анат. glabella надпереносье) — физиологический Р. у новорожденных: сокращение круговой мышцы глаза при ударе молоточком в области надпереносья.
Р. ГЛАЗОДЫХА́ТЕЛЬНЫЙ (r. oculorespiratorius) — см. *Рефлекс зрачковый дыхательный.*
Р. ГЛАЗОСЕРДЕ́ЧНЫЙ (r. oculocardiacus; син.: Ашнера рефлекс, Ашнера феномен, Даньини — Ашнера рефлекс, рефлекс окулокардиальный) — вегетативный Р.: замедление пульса на 4—8 ударов в 1 мин. и снижение артериального давления при надавливании на глазные яблоки; бо́льшее замедление указывает на повышенную возбудимость парасимпатической части вегетативной нервной системы.
Р. ГЛОТА́ТЕЛЬНЫЙ — физиологический Р.: глотательные движения при раздражении рецепторов слизистой оболочки глотки и корня языка.
Р. ГЛО́ТОЧНЫЙ (r. pharyngeus) — физиологический Р.: сокращение мышц глотки и гортани с возникновением рвоты или кашля при механическом раздражении слизистой оболочки задней стенки глотки.
Р. ГЛЮТЕА́ЛЬНЫЙ (r. glutealis; греч. glutos ягодица) — см. *Рефлекс ягодичный.*
РЕФЛЕ́КС ГНУ́ДИ — см. *Гнуди рефлекс.*
Р. ГОЛО́ВКИ ЛУЧА́ — см. *Рефлекс лучевой.*
РЕФЛЕ́КС ГО́ЛЬТЦА — см. *Гольтца рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ГО́РДОНА — см. *Гордона рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ГО́ФФМАННА — см. *Гоффманна рефлекс.*
Р. ГУБНЫ́Е (r. labiales) — Р. орального автоматизма, вызываемые штриховым раздражением губ или постукиванием молоточком около углов губ.
Р. ГУБОПОДБОРО́ДОЧНЫЙ (r. labiomentalis) — Р. орального автоматизма: сокращение мышц подбородка при раздражении слизистой оболочки губ.
РЕФЛЕ́КС ДАНЬИ́НИ — А́ШНЕРА — см. *Рефлекс глазосердечный.*
Р. С ДВУГЛА́ВОЙ МЫ́ШЦЫ БЕДРА́ (r. musculi bicipitis femoris; син.: Р. перонеофеморальный, Эрба — Ферстера — Барре — Левенштейна рефлекс) — физиологический Р.: разгибание голени при ударе молоточком по сухожилию двуглавой мышцы бедра.
Р. С ДВУГЛА́ВОЙ МЫ́ШЦЫ ПЛЕЧА́ (r. musculi bicipitis brachii) — см. *Бицепс-рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ДЕЖЕРИ́НА — см. *Дежерина рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ДЕ КА́СТРО — см. *Рефлекс подбородочный.*
Р. ДЕПРЕССО́РНЫЕ (deprimo, depressum понижать) — общее название Р., приводящих к снижению артериального давления.
Р. ДИСТА́НТНО-ОРА́ЛЬНЫЙ КАРЧИКЯ́НА — см. *Карчикяна рефлекс.*
Р. ДЫХА́ТЕЛЬНЫЙ (r. respiratorius) — изменение внешнего дыхания при раздражении рецепторов дыхательных путей.
РЕФЛЕ́КС ЖУКО́ВСКОГО — см. *Жуковского рефлекс.*
Р. ЗАЩИ́ТНЫЙ (r. defensivus, r. protectivus) — 1) (син. Р. оборонительный) — Р., возникающий при воздействии на организм вредного для него или угрожающего жизни раздражителя; направлен на его устранение; 2) (син. Р. спинального автоматизма) в п а т о л о г и и — патологический Р.: непроизвольные сложные движения парализованной части тела при раздражении экстеро- и проприорецепторов; наблюдается при поражении пирамидных путей.
Р. ЗРАЧКО́ВЫЙ (r. pupillaris; син. Р. пупилломоторный) — общее название Р., характеризующихся изменением диаметра зрачков (или одного зрачка).
Р. ЗРАЧКО́ВЫЙ БОЛЕВО́Й (r. pupillaris dolorosus) — Р. з., проявляющийся расширением зрачков при интенсивном болевом раздражении.
Р. ЗРАЧКО́ВЫЙ ГЛО́ТОЧНЫЙ (r. pupillaris pharyngeus) — Р. з., проявляющийся расширением зрачков при механическом раздражении задней стенки глотки.
Р. ЗРАЧКО́ВЫЙ ДЫХА́ТЕЛЬНЫЙ (r. pupillaris respiratorius; син. Р. глазодыхательный) — Р. з., проявляющийся расширением зрачков при глубоком вдохе и сужением при выдохе.
Р. ЗРАЧКО́ВЫЙ КО́РКОВЫЙ (r. pupillaris corticalis) — Р. з., проявляющийся расширением зрачков при внезапном изменении психического состояния, напр. при испуге.
Р. ЗРАЧКО́ВЫЙ ТРИГЕМИНА́ЛЬНЫЙ (r. pupillaris trigeminalis; анат. nervus trigeminus тройничный нерв; син. Р. тригеминопупиллярный) — Р. з., проявляющийся небольшим расширением зрачков, быстро сменяющимся их сужением, вызываемый раздражением роговицы, конъюнктивы или тканей, окружающих глаз.
РЕФЛЕ́КС ИМПЕРАТО́РИ — см. *Императори рефлекс.*
Р. ИШИОКРЕМА́СТЕРНЫЙ (r. ischiocremastericus; греч. ischion тазобедренный сустав, бедро + анат. musculus cremaster мышца, поднимающая яичко) — см. *Либесни рефлекс.*
Р. КАРДИОВАСКУЛЯ́РНЫЙ (r. cardiovascularis) — вегетативный Р.: изменение просвета кровеносных сосудов при раздражении рецепторов определенного участка сердца.
Р. КА́РДИО-КАРДИА́ЛЬНЫЙ (r. cardiocardialis) — вегетативный Р: изменение деятельности сердца или его отделов при изменении давления в полостях сердца (напр., падение давления в левом желудочке вызывает рефлекторное учащение и усиление его сокращений).
Р. КАРПОРАДИА́ЛЬНЫЙ (r. carporadialis; греч. karpos запястье + анат. radius лучевая кость) — см. *Рефлекс лучевой.*
Р. КАРПОУЛЬНА́РНЫЙ (r. carpoulnaris; греч. karpos запястье + анат. ulna локтевая кость) — см. *Рефлекс ульнарный.*
РЕФЛЕ́КС КАРЧИКЯ́НА — см. *Карчикяна рефлекс.*
Р. КАШЛЕВО́Й (r. tussis) — физиологический Р.: кашель, возникающий при раздражении рецепторов дыхательных путей.
РЕФЛЕ́КС КИТА́ЕВА — см. *Китаева рефлекс.*
Р. КЛИНОСТАТИ́ЧЕСКИЙ (r. clinostaticus; греч. klinō наклонять + statikos занимающий определенное положение) — соматовегетативный Р.: урежение пульса на 6—8 ударов в 1 мин. при переходе из вертикального положения в горизонтальное.
Р. КО́ЖНО-ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (r. cutaneovisceralis) — висцеральный Р., возникающий при раздражении рецепторов кожи.
Р. КО́ЖНО-ГАЛЬВАНИ́ЧЕСКИЙ — см. *Кожно-гальваническая реакция.*
Р. КО́ЖНО-МЫШЕ́ЧНЫЙ (r. cutaneomuscularis) — изменение тонуса мышц или их сокращение при раздражении рецепторов кожи.
Р. КО́ЖНО-СЕРДЕ́ЧНЫЙ (r. cutaneocardiacus) — кожно-висцеральный Р., проявляющийся изменением каких-либо параметров сердечной деятельности (ритма, ударного объема и др.).
Р. КО́ЖНО-СЛИ́ЗИСТЫЙ (r. cutaneomucosus) — кожно-висцеральный Р., проявляющийся изменением секреторной и (или) всасывательной деятельности слизистых оболочек.
Р. КО́ЖНЫЙ (r. cutaneus) — общее название Р., вызываемых раздражением рецепторов кожи.
Р. КОЛЕ́ННЫЙ (r. genualis; син.: Вестфаля рефлекс, Р. пателлярный, Р. с четырехглавой мышцы бедра, Эрба рефлекс) — физиологический Р.: разгибание голени при ударе молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы бедра под надколенником.
Р. КОЛЕ́ННЫЙ МАЯТНИКООБРА́ЗНЫЙ (син.: Русецкого качательный тип коленного рефлекса, Тома

рефлекс) — ритмичные, постепенно уменьшающиеся по амплитуде колебательные движения голени при вызывании коленного Р.; наблюдается при мозжечковой гипотонии.

Р. КОНЪЮНКТИВА́ЛЬНЫЙ (r. conjunctivalis) — физиологический Р.: смыкание век при легком прикосновении к конъюнктиве глазного яблока.

Р. КООРДИНИ́РОВАННЫЙ (r. coordinatus) — Р., в осуществлении к-рого участвуют различные, иногда удаленные друг от друга мышцы (напр., кашлевой Р., рвотный Р.).

Р. КОРНЕА́ЛЬНЫЙ (r. cornealis) — см. *Рефлекс роговичный.*

Р. КОРНЕОМАНДИБУЛЯ́РНЫЙ (r. corneomandibularis; анат. cornea роговица + mandibula нижняя челюсть; син.: Зельдера корнеомандибулярный симптом, мигательно-жевательный тест, Р. корнеоптеригоидный) — патологический Р.: содружественное сокращение круговой мышцы глаза и наружной крыловидной мышцы с последующим движением нижней челюсти в противоположную сторону при прикосновении к роговице или энергичном зажмуривании глаза; признак двустороннего поражения корково-ядерных путей.

Р. КОРНЕОПТЕРИГОИ́ДНЫЙ (анат. cornea роговица + pterygoideus крыловидный) — см. *Рефлекс корнеомандибулярный.*

Р. КОРТИКА́ЛЬНЫЙ ЗРИТЕ́ЛЬНЫЙ (r. corticalis opticus) — см. *Гааба рефлекс.*

Р. КОСТОАБДОМИНА́ЛЬНЫЙ БЕ́ХТЕРЕВА (лат. costa ребро) — см. *Рефлекс реберный.*

РЕФЛЕ́КС КО́ХЕРА — см. *Кохера рефлекс.*

Р. КОХЛЕА́РНЫЙ (r. cochlearis; анат. cochlea улитка) — 1) физиологический Р.: поворот глаз в сторону источника звука; 2) физиологический Р.: изменение частоты сердечных сокращений и дыхания при интенсивном звуковом раздражении.

Р. КОХЛЕОПАЛЬПЕБРА́ЛЬНЫЙ (r. cochleopalpebralis; анат. cochlea улитка + palpebra веко) — см. *Рефлекс ауропальпебральный.*

Р. КОХЛЕОПУПИЛЛЯ́РНЫЙ (r. cochleopupillaris; анат. cochlea улитка + pupilla зрачок) — см. *Рефлекс улитказрачковый.*

Р. КОХЛЕОСТАПЕДИА́ЛЬНЫЙ (анат. cochlea улитка + musculus stapedius стременная мышца) — физиологический Р.: сокращение стременной мышцы при интенсивном звуковом раздражении, проявляющееся ощущением боли в ухе.

Р. КРЕМА́СТЕРНЫЙ (анат. musculus cremaster мышца, поднимающая яичко; син. кремастер-рефлекс) — физиологический Р.: подтягивание яичка при штриховом раздражении кожи верхне-внутренней поверхности бедра.

Р. КРЕМА́СТЕРНЫЙ ФИНКЕЛЬБУ́РГА — см. *Финкельбурга кремастерный рефлекс.*

Р. КУБИТА́ЛЬНЫЙ (r. cubitalis; анат. cubitalis локтевой) — см. *Рефлекс ульнарный.*

Р. КУБИТОПРОНА́ТОРНЫЙ (r. cubitopronatorius; анат. cubitus локоть + musculus pronator пронатор) — см. *Рефлекс ульнарный.*

РЕФЛЕ́КС КУЙМО́ВА — см. *Куймова рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС КУССМАУ́ЛЯ — ГЕ́НЦЛЕРА — см. *Рефлекс поисковый.*

Р. ЛАБИРИ́НТНЫЙ (r. labyrinthicus) — общее название тонических Р., обусловленных раздражением рецепторов вестибуляторного аппарата.

Р. ЛАДО́ННО-РО́ТО-ГОЛОВНО́Й (r. palmoörocephalicus; син. Бабкина рефлекс) — физиологический Р. у детей в возрасте до 3 месяцев: открывание рта иногда с наклоном головы вперед при надавливании на ладонную поверхность кисти у основания большого пальца.

РЕФЛЕ́КС ЛАНДА́У — см. *Ландау рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ЛЕ́ЩЕНКО — см. *Лещенко рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ЛИБЕ́СНИ — см. *Либесни рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ЛИДДЕ́ЛЛА — ШЕ́РРИНГТОНА — см. *Лидделла — Шеррингтона рефлекс.*

Р. ЛОБКО́ВЫЙ (r. pubicus) — см. *Триумфова рефлекс.*

Р. ЛО́ННЫЙ ГИЙЕ́НА — АЛАЖУАНИ́НА — см. *Гийена — Алажуанина лонный рефлекс.*

Р. ЛОПА́ТОЧНЫЙ (r. scapularis; син. Штейнхаузена скапулопериостальный рефлекс) — физиологический Р.: приведение лопатки при поколачивании по внутреннему ее краю или при штриховом раздражении кожи кнутри от внутреннего края лопатки.

Р. ЛОПА́ТОЧНО-ПЛЕЧЕВО́Й (r. scapulobrachialis; син. Бехтерева лопаточно-плечевой рефлекс) — физиологический Р.: приведение плеча и вращение его кнаружи при ударе молоточком по внутреннему краю лопатки.

Р. ЛУЧЕВО́Й (r. radialis; син.: Р. головки луча, Р. карпорадиальный, Р. пястно-лучевой, Р. радиопронаторный, Р. стилорадиальный) — физиологический Р.: пронация и сгибание предплечья, иногда и пальцев при ударе молоточком по шиловидному отростку лучевой кости.

РЕФЛЕ́КСЫ МА́ГНУСА — КЛЕ́ЙНА — см. *Магнуса — Клейна рефлексы.*

Р. МАМИЛЛОАРЕОЛЯ́РНЫЙ (r. mamilloareolaris; лат. mamilla сосок + areola mammae околососковый кружок) — физиологический Р.: сокращение гладкомышечных волокон околососочкового кружка, проявляющееся его заметным уплотнением при раздражении поверхности соска.

Р. МАНДИБУЛЯ́РНЫЙ (r. mandibularis; син. masseter-reflex) — физиологический Р.: сокращение жевательных мышц при ударе молоточком непосредственно по подбородку или по шпателю, положенному на нижние зубы при полуоткрытом рте.

РЕФЛЕ́КС МАРИНЕ́СКУ — РАДО́ВИЧА — см. *Симптом ладонно-подбородочный.*

Р. МЕДИОПЛАНТА́РНЫЙ (r. medioplantaris; лат. medium середина + planta подошва) — физиологический Р.: сгибание стопы при ударе молоточком по середине подошвы.

Р. МЕ́НТО-МЕНТА́ЛЬНЫЙ (лат. mentum подбородок) — см. *Рефлекс подбородочный.*

Р. МИГА́ТЕЛЬНЫЙ — защитный Р: сокращение круговой мышцы глаза, напр. при внезапном освещении глаза или появлении предмета перед глазами.

Р. МИОСТАТИ́ЧЕСКИЙ (нрк) — см. *Рефлекс растяжения.*

Р. МОНОСИНАПТИ́ЧЕСКИЙ (r. monosynapticus; греч. monos один + *синапс*) — Р., рефлекторная дуга к-рого не имеет в своем составе вставочных нейронов.

РЕФЛЕ́КС МОРО́ — см. *Моро рефлекс.*

Р. МОТО́РНО-ВАСКУЛЯ́РНЫЙ (r. motovascularis) — соматовегетативный Р.: изменение просвета кровеносных сосудов при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры.

Р. МОТО́РНО-ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (r. motovisceralis) — общее название соматовисцеральных Р. в виде изменения деятельности каких-либо внутренних органов при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры.

Р. МОТО́РНО-ДЕРМА́ЛЬНЫЙ (r. motodermalis) — соматовегетативный Р.: изменение функций кожи, напр. потоотделении при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры.

Р. МОТО́РНО-ЖЕЛУ́ДОЧНЫЙ (r. motogastricus) — моторно-висцеральный Р.: изменение секреторной и моторной деятельности желудка при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры.

Р. МОТО́РНО-КАРДИА́ЛЬНЫЙ (r. motocardiacus) — моторно-висцеральный Р.: изменение ритма сердечных сокращений при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры.

Р. МОТО́РНО-РЕНА́ЛЬНЫЙ (r. motorenalis) — моторно-висцеральный Р.: изменение функции почек при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры.

Р. МОТО́РНО-РЕСПИРАТО́РНЫЙ (r. motorespiratorius) — моторно-висцеральный Р.: изменение частоты и глубины дыхания при раздражении или сокращении скелетной мускулатуры.

Р. НАДБРО́ВНЫЙ (r. superciliaris; син. Мак-Карти надглазничный рефлекс) — физиологический Р.: смыкание век при поколачивании по внутреннему краю надбровной дуги.

Р. НАДГЛАЗНИ́ЧНЫЙ МАК-КАРТИ — см. *Рефлекс надбровный.*

Р. НАДКО́СТНИЧНЫЙ — см. *Рефлекс периостальный.*

Р. НАЗОЛАБИА́ЛЬНЫЙ (r. nasolabialis; лат. nasus нос + labium губа) — см. *Аствацатурова носогубный рефлекс.*

Р. НАЗОПАЛЬПЕБРА́ЛЬНЫЙ (r. nasopalpebralis; лат. nasus нос + palpebra веко) — физиологический Р.: смыкание век при легком поколачивании по спинке носа или надавливании на нее.

Р. НЁБНО-СЕРДЕ́ЧНЫЙ (r. palatocardiacus) — вегетативный Р.: учащение пульса при надавливании на твердое небо.

Р. НЁБНЫЙ (r. palatalis) — физиологический Р.: поднятие мягкого неба и язычка при механическом раздражении мягкого неба.

РЕФЛЕ́КС НЕ́РИ — см. *Нери рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС НОЙКИ — см. *Нойки рефлекс.*

Р. НОСОГУ́БНЫЙ АСТВАЦАТУ́РОВА — см. *Аствацатурова носогубный рефлекс.*

Р. НОСОПОДБОРО́ДОЧНЫЙ (r. nasomentalis; син.: Симховича носоподбородочный рефлекс, Флатау рефлекс) — Р. орального автоматизма: сокращение мышц подбородка при ударе молоточком по спинке носа.

Р. ОБСТАНО́ВОЧНЫЙ — изменение развития какого-либо условного Р. при изменении окружающей обстановки.

Р. ОБОРОНИ́ТЕЛЬНЫЙ (r. protectivus) — см. *Рефлекс защитный.*

Р. ОКУЛОКАРДИА́ЛЬНЫЙ (r. oculocardiacus; лат. oculus глаз + греч. kardia сердце) — см. *Рефлекс глазосердечный.*

Р. ОКУЛО-ОКУЛЯ́РНЫЙ (r. oculooccularis; лат. oculus глаз) — вегетативный Р.: повышение внутриглазного давления в интактном глазу при гипертензии в другом глазу, обусловленной воздействием какого-либо раздражителя (болевого, термического, химического и др.).

РЕФЛЕ́КС ОППЕНГЕЙМА — см. *Оппенгейма рефлекс.*

Р. ОПТОМОТО́РНЫЙ ФУЗИО́ННЫЙ (греч. optikos относящийся к зрению + лат. motor приводящий в движение; син.: Р. слияния, Р. фузионный) — двигательный Р. в виде содружественных движений глазных яблок, возникающих при одновременном раздражении функционально различных (диспаратных) точек сетчатки правого и левого глаза и приводящих к проецированию изображения объекта-раздражителя на корреспондирующие точки сетчатки; обеспечивает возможность бинокулярного зрения.

Р. ОРА́ЛЬНОГО АВТОМАТИ́ЗМА — вытягивание губ или появление сосательных движений при раздражении нек-рых участков тела, гл. обр. лица; для детей первого года жизни являются физиологическими Р., позже — проявлениями псевдобульбарного паралича.

Р. ОРИЕНТИРО́ВОЧНЫЕ — Р., возникающие при внезапном изменении окружающей среды и сопровождающиеся активацией анализаторов и мобилизацией энергетических ресурсов.

РЕФЛЕ́КС О́РТНЕРА — см. *Ортнера рефлекс.*

Р. ОРТОСТАТИ́ЧЕСКИЙ (r. orthostaticus) — физиологический вегетативный Р.: учащение пульса на 8—12 ударов в 1 мин. при изменении положения тела человека из горизонтального в вертикальное, напр. при вставании с постели.

Р. ОСА́НКИ ФУА — ТЕВЕНА́РА — см. *Фуа — Тевенара рефлекс осанки*

Р. ОТКИ́ДЫВАНИЯ ГОЛОВЫ́ — см. *Вартенберга симптом.*

Р. ПАЛАТОПАЛЬПЕБРА́ЛЬНЫЙ (r. palatopalpebralis; лат. palatum нёбо + palpebra веко) — см. *Императори рефлекс.*

Р. ПАЛЬЦЕВО́Й РОССОЛИ́МО — см. *Россолимо пальцевой рефлекс.*

Р. ПАРАДОКСА́ЛЬНЫЙ (r. paradoxalis) — Р., выражающийся извращенным (чаще противоположным) эффектом по сравнению с нормально протекающим Р. (напр., сокращение сгибателей при раздражении сухожилий разгибателей и наоборот).

РЕФЛЕ́КС ПА́РИНА — см. *Парина рефлекс.*

Р. ПАТЕЛЛЯ́РНЫЙ (r. patellaris; анат. patella надколенник) — см. *Рефлекс коленный.*

Р. ПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЕ — общее название Р., обнаруживаемых у взрослого человека при поражении пирамидных путей (у детей раннего возраста такие Р. являются нормальным явлением).

РЕФЛЕ́КС ПЕ́РЕСА — см. *Переса рефлекс.*

Р. ПЕРИОСТА́ЛЬНЫЙ (r. periostalis; син. Р. надкостничный) — физиологический Р.: сокращение определенных мышц при механическом раздражении надкостницы, напр. при ударе молоточком.

Р. ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКИЙ (r. perifericus) — вегетативный Р., осуществляющийся через ганглии вегетативной нервной системы без прямого участия центральной нервной системы.

Р. ПЕРОНЕОФЕМОРА́ЛЬНЫЙ (r. peroneofemoralis; анат. peroneus малоберцовый + лат. femur бедро) — см. *Рефлекс с двуглавой мышцы бедра.*

Р. ПИЛОМОТО́РНЫЙ (r. pilomotorius; лат. pilus волос + motor приводящий в движение; син. Р. волосковый) — вегетативный Р.: сокращение мышц, поднимающих волосы, при механическом или термическом раздражении рецепторов кожи; проявляется возникновением «гусиной кожи».

РЕФЛЕ́КС ПИ́ЛЬТЦА — см. *Пильтца рефлекс.*

Р. ПИЩЕВО́Й (r. alimentarius) — общее название вегетативных Р., проявляющихся изменением функционального состояния органов пищеварения при действии пищевого раздражителя.

Р. ПЛАНТА́РНЫЙ (r. plantaris; лат. planta подошва) — см. *Рефлекс подошвенный.*

Р. ПЛЕВРОПУЛЬМОНА́ЛЬНЫЙ (r. pleuropulmonalis; анат. pleura плевра + pulmo, pulmonis легкое) — висцеральный Р.: генерализованный спазм бронхиальной мускулатуры и кровеносных сосудов легких при раздражении рецепторов плевры.

Р. ПОДБОРО́ДОЧНЫЙ (r. mentalis; син.: Де Кастро рефлекс, Р. менто-ментальный) — Р. орального автоматизма: сокращение подбородочных мышц при ударе молоточком по подбородку.

Р. ПОДО́ШВЕННЫЙ (r. plantaris; син. Р. плантарный) — физиологический Р.: подошвенное сгибание пальцев стопы при штриховом раздражении кожи ее подошвенной поверхности у наружного края.

Р. ПОЗОТОНИ́ЧЕСКИЙ — см. *Рефлекс постуральный.*

Р. ПОИСКО́ВЫЙ (син. Куссмауля — Генцлера рефлекс) — физиологический Р. у детей в возрасте до 2 месяцев: вытягивание губ, отклонение языка и поворот головы в сторону раздражения кожи в области носогубной складки.

Р. ПОЛИСИНАПТИ́ЧЕСКИЙ (греч. poly много + *синапс*) — Р., рефлекторная дуга к-рого имеет один или несколько вставочных нейронов.

Р. ПОСТУРА́ЛЬНЫЙ (r. posturalis; син.: Р. позотонический, Р. статический) — общее название Р., обеспечивающих поддержание определенного положения в пространстве всего тела или его части (напр., конечности).

Р. ПРЕССО́РНЫЙ (r. pressorius; лат. presso давить, жать) — общее название Р., приводящих к повышению артериального давления.

Р. ПРИОБРЕТЁННЫЙ — см. *Рефлекс условный.*

Р. ПРОНА́ТОРНЫЙ (r. pronatorius; анат. musculus pronator пронатор) — физиологический Р.: пронация кисти и предплечья при ударе молоточком по круглому пронатору в области медиального мыщелка плечевой кости.

Р. ПРОПРИОЦЕПТИ́ВНЫЙ (r. proprioceptivus) — общее название Р., проявляющихся сокращением скелетных мышц при раздражении проприоцепторов.

Р. ПСИХОГАЛЬВАНИ́ЧЕСКИЙ — см. *Кожно-гальваническая реакция.*

Р. ПУЗЫРНЫЙ — висцеральный Р.: сокращение желчного пузыря при раздражении слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки нек-рыми пищевыми раздражителями (напр., растительными маслами) или специально вводимыми веществами (напр., раствором сульфата магния).

Р. ПУПИЛЛОМОТО́РНЫЙ (r. pupillomotorius; анат. pupilla зрачок + лат. motor приводящий в движение) — см. *Рефлекс зрачковый.*

РЕФЛЕ́КС ПУУСЕППА — см. *Пууседпа рефлекс.*

Р. ПЯСТНО-ЛУЧЕВО́Й (r. metacarporadialis) — см. *Рефлекс лучевой.*

Р. РАДИОПРОНА́ТОРНЫЙ (r. radiopronatorius; анат. radius лучевая кость + musculus pronator пронатор) — см. *Рефлекс лучевой.*

Р. РАЗГИБА́ТЕЛЬНО-ЛОКТЕВО́Й — см. *Рефлекс с трехглавой мышцы плеча.*

Р. РАЗГИБА́ТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТНЫЙ (син. Филиппсона рефлекс) — разгибание согнутой ноги при пассивном сгибании другой ноги в тазобедренном и коленном суставах; наблюдается при спастическом парапарезе нижних конечностей в качестве патологического защитного Р., а также в норме — у детей раннего возраста.

Р. РАСТЯЖЕ́НИЯ (син. Р. миостатический — нрк) — общее название Р., проявляющихся сокращением скелетной мышцы в ответ на ее пассивное или активное растяжение.

Р. РВО́ТНЫЙ (r. vomificus) — физиологический Р.: возникновение рвоты или позывов к ней при механическом раздражении рецепторов задней стенки глотки.

Р. РЁБЕРНЫЙ (r. costalis; син. Бехтерева костоабдоминальный рефлекс) — физиологический Р.: одностороннее сокращение мышц верхней части брюшной стенки при ударе молоточком по краю реберной дуги.

Р. РЕТРОМАЛЛЕОЛЯ́РНЫЙ (r. retromalleolaris; *ретро-* + анат. malleolus лодыжка) — см. *Барре рефлекс.*

Р. РОГОВИ́ЧНЫЙ (син. Р. корнеальный) — физиологический Р.: смыкание век при прикосновении к роговице.
Р. СГИБА́ТЕЛЬНО-ЛОКТЕВО́Й (r. flexiocubitalis) — см. *Бицепс-рефлекс.*
Р. СЕГМЕНТА́РНЫЕ (r. segmentarii) — Р., рефлекторная дуга к-рых замыкается на уровне одного или нескольких соседних сегментов спинного мозга, напр. сухожильные Р.
Р. СИНОКАРОТИ́ДНЫЙ (r. sinocaroticus; анат. sinus caroticus сонный синус) — общее название Р., возникающих при раздражении рецепторов, расположенных в сонном синусе.
Р. СКАПУЛОПЕРИОСТА́ЛЬНЫЙ ШТЕЙНХА́УЗЕНА (анат. scapula лопатка + periosteum надкостница) — см. *Рефлекс лопаточный.*
Р. СКУЛОВО́Й (r. zygomaticus) — патологический Р.: смещение нижней челюсти в сторону гемиплегии при поколачивании по скуловой дуге с той же стороны.
Р. СЛИЯ́НИЯ — см. *Рефлекс оптомоторный фузионный.*
Р. СОЛЯ́РНЫЙ (r. solaris; анат. устар. plexus solaris солнечное сплетение; син.: Р. эпигастральный, Тома — Ру симптом) — вегетативный Р.: замедление пульса и снижение артериального давления при надавливании на брюшную стенку между пупком и мечевидным отростком (область чревного сплетения).
Р. СОМАТИ́ЧЕСКИЙ (r. somaticus) — общее название Р., проявляющихся изменением тонуса скелетных мышц или их сокращением при каких-либо воздействиях на организм.
Р. СОМАТОВЕГЕТАТИ́ВНЫЙ (r. somatovegetativus) — Р., возникающий при раздражении рецепторов кожи, слизистых оболочек и опорно-двигательного аппарата и осуществляемый при участии вегетативной нервной системы.
Р. СОМАТОВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (r. somatovisceralis) — Р., проявляющийся изменением функции внутренних органов при раздражении рецепторов кожи или опорно-двигательного аппарата.
Р. СОСА́ТЕЛЬНЫЙ — физиологический Р. у новорожденных: ритмичные движения губ, языка и мышц стенок ротовой полости при раздражении рецепторов слизистой оболочки губ или окружающей кожи; обеспечивает акт сосания.
Р. СОСУ́ДИСТЫЙ (r. vascularis) — вегетативный Р., проявляющийся изменением тонуса кровеносных сосудов.
Р. СПИНА́ЛЬНОГО АВТОМАТИЗМА — см. *Рефлекс защитный.*
Р. СПИНА́ЛЬНЫЕ (r. spinales) — Р., рефлекторная дуга к-рых замыкается в спинном мозге без участия вышележащих отделов ц. н. с.
Р. СПИНОАДДУКТО́РНЫЙ МАККА́РТИ — см. *Рефлекс аддукторный дорсальный.*
Р. СТАТИ́ЧЕСКИЙ (r. staticus; греч. statikos занимающий определенное положение) — см. *Рефлекс постуральный.*
Р. СТАТОКИНЕТИ́ЧЕСКИЕ (r. statokinetici; греч. statos относящийся к определенному положению + kinēsis движение) — Р., обеспечивающие сохранение равновесия тела при активном и пассивном перемещении его в пространстве.
Р. СТВОЛОВЫ́Е — Р., рефлекторная дуга к-рых замыкается в ядрах ствола головного мозга.
РЕФЛЕ́КС СТЕ́РЛИНГА — РУСЕ́ЦКОГО — см. *Стерлинга — Русецкого рефлекс.*
Р. СТИЛОРАДИА́ЛЬНЫЙ (r. styloradialis; анат. processus styloideus radii шиловидный отросток лучевой кости) — см. *Рефлекс лучевой.*
Р. СУСТАВНО́Й ЛЕРИ́ — см. *Лери суставной рефлекс.*
Р. СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ (r. tendinis) — физиологический Р.: сокращение мышцы при механическом раздражении ее сухожилия, напр. при ударе молоточком.
Р. ТЕЛЕРЕЦЕПТИ́ВНЫЙ (r. telereceptivus) — общее название физиологических Р., возникающих при раздражении дистантных рецепторов (зрительных, слуховых, обонятельных).
Р. ТИБИОАДДУ́КТОРНЫЙ (r. tibioadductorius; анат. tibia большеберцовая кость + musculus adductor приводящая мышца; син. Р. тибиофеморальный) — физиологический Р.: приведение бедра при поколачивании по нижней части большеберцовой кости.
Р. ТИБИОФЕМОРА́ЛЬНЫЙ (r. tibiofemoralis; анат. tibia большеберцовая кость + femur бедро) — см. *Рефлекс тибиоаддукторный.*
РЕФЛЕ́КС ТОМА́ — см. *Рефлекс коленный маятникообразный.*
Р. ТОНИ́ЧЕСКИЙ (r. tonicus) — общее название Р., выражающихся изменением мышечного тонуса.
Р. ТОНИ́ЧЕСКИЙ ЛАДО́ННЫЙ (r. tonicus palmaris) — сгибание пальцев супинированной кисти с увеличением вогнутости ладони при повторном штриховом раздражении ладони в направлении от гипотенара к основанию большого пальца; наблюдается при поражении премоторной области лобной доли большого мозга на противоположной стороне.
Р. ТОНИ́ЧЕСКИЙ ШЕ́ЙНЫЙ (r. tonicus cervicalis) — постуральный Р.: изменение тонуса мышц шеи, туловища и конечностей при изменении положения головы.
Р. ТОНИ́ЧЕСКИЙ ШЕ́ЙНЫЙ АСИММЕТРИ́ЧНЫЙ (r. tonicus cervicalis asymmetricus) — повышение тонуса разгибателей конечностей на стороне, в к-рую повернуто лицо, с одновременным повышением тонуса сгибателей конечностей с другой стороны; физиологический постуральный Р. у детей в возрасте до 3 месяцев, в более позднем возрасте — симптом детского церебрального паралича.
Р. ТОНИ́ЧЕСКИЙ ШЕ́ЙНЫЙ СИММЕТРИ́ЧНЫЙ (r. tonicus cervicalis symmetricus) — повышение тонуса сгибателей верхних и разгибателей нижних конечностей при наклоне головы вперед; физиологический постуральный Р. у детей в возрасте до 3 месяцев, в более позднем возрасте — симптом детского церебрального паралича.
Р. С ТРЕХГЛА́ВОЙ МЫ́ШЦЫ ПЛЕЧА́ (r. musculi tricipitis brachii; син. Р. разгибательно-локтевой) — физиологический Р.: разгибание предплечья при ударе молоточком по сухожилию трехглавой мышцы.
Р. ТРИГЕМИНОПУПИЛЛЯ́РНЫЙ (r. trigeminopupillaris; анат. nervus trigeminus тройничный нерв + pupilla зрачок) — см. *Рефлекс зрачковый тригеминальный.*
РЕФЛЕ́КС ТРИУ́МФОВА — см. *Триумфова рефлекс.*
Р. ТЫЛЬНО-СТО́ПНЫЙ (r. dorsi pedis) — см. *Бехтерева — Менделя рефлекс.*
РЕФЛЕ́КС ТЮ́РКА — см. *Тюрка рефлекс.*
Р. УЛИТКОЗРАЧКО́ВЫЙ (r. cochleopupillaris; син.: зрачковая реакция кохлеарная, зрачковая реакция отогенная, Р. кохлеопупиллярный, Шурыгина рефлекс) — зрачковый Р.: быстрое сужение зрачков с последующим их медленным расширением, возникающее при внезапном воздействии громкого звука.
Р. УЛЬНА́РНЫЙ (r. ulnaris; анат. ulna локтевая кость; син.: Р. карпоульнарный, Р. кубитальный, Р. кубитопронаторный) — физиологический Р.: пронация и легкое сгибание предплечья и пальцев при ударе молоточком по шиловидному отростку локтевой кости.
Р. УСЛО́ВНЫЙ (син. Р. приобретенный) — приобретенный в течение индивидуальной жизни Р.; формируется в результате неоднократного воздействия сочетания раздражителей — индифферентного и биологически значимого, напр. пищевого, полового оборонительного и др., в результате чего индифферентный раздражитель также становится биологически значимым.
Р. УСЛО́ВНЫЙ ВЫ́СШИХ ПОРЯ́ДКОВ — Р. у., возникающий при подкреплении ранее выработанными условными раздражителями.
Р. УСЛО́ВНЫЙ ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННЫЙ — Р. у. на сигналы, близкие по физическим характеристикам к сигналу, на к-рый вырабатывается рефлекс; наблюдается на начальных стадиях выработки условного Р.
Р. УСЛО́ВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ — Р. у. в виде серии специальных движений.
Р. УСЛО́ВНЫЙ ИНСТРУМЕНТА́ЛЬНЫЙ (син. Р. условный оперантный) — Р. у. в виде одного или серий специальных действий.
Р. УСЛО́ВНЫЙ НАТУРА́ЛЬНЫЙ — Р. у. на естественные компоненты соответствующего безусловного раздражителя (напр., пищевой Р. у. на запах мяса).
Р. УСЛО́ВНЫЙ ОПЕРА́НТНЫЙ — см. *Рефлекс условный инструментальный.*
Р. УСЛО́ВНЫЙ ПЕ́РВОГО ПОРЯ́ДКА — Р. у., вырабатываемый при подкреплении безусловным раздражителем.
Р. УСЛО́ВНЫЙ ПОДРАЖА́ТЕЛЬНЫЙ — Р. у., возникающий у животного в результате наблюдения им за процедурой выработки Р. у. у другого животного.
Р. УСТАНО́ВОЧНЫЙ (син. Р. выпрямительный) — статокинетический Р.: возвращение тела человека или животного из неестественного положения в нормальное; обусловлен раздражением лабиринтных рецеп-

торов, рецепторов шейных мышц или поверхности кожи.

Р. УСТАНО́ВОЧНЫЙ ОПТИ́ЧЕСКИЙ — физиологический Р. у детей в возрасте 4—10 месяцев: вытягивание рук вперед ребенком, если его, держа на вытянутых руках вниз животом, внезапно приблизить к горизонтальной поверхности.

Р. УХОКАШЛЕВО́Й — физиологический Р.: возникновение кашля, слезотечения, неприятного ощущения в горле при раздражении передней стенки наружного слухового прохода.

Р. ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ (r. physiologicus) — Р., постоянно возникающий при раздражении определенной группы рецепторов; отсутствие Р. ф. служит признаком нарушения функции соответствующего участка нервной системы.

РЕФЛЕ́КС ФИЛИППСО́НА — см. *Рефлекс разгибательный перекрестный.*

РЕФЛЕ́КС ФЛАТА́У — см. *Рефлекс носоподбородочный.*

РЕФЛЕ́КС ФРЕ́ШЕЛЬСА — ЦЕ́МАХА — см. *Фрешельса — Цемаха рефлекс.*

Р. ФУЗИО́ННЫЙ — см. *Рефлекс оптомоторный фузионный.*

Р. ХВАТА́ТЕЛЬНЫЙ — 1) см. *Робинсона хватательный рефлекс;* 2) см. *Янишевского — Бехтерева хватательный рефлекс.*

Р. ХВАТА́ТЕЛЬНЫЙ ДИСТА́НТНЫЙ — см. *Автоматическое хватание.*

Р. ХОБОТКО́ВЫЙ — общее название Р. орального автоматизма, проявляющихся, гл. образом, выпячиванием губ.

Р. ЦЕПНО́Й — Р., представляющий собой серию последовательных Р., завершение каждого из к-рых служит сигналом для возникновения следующего.

РЕФЛЕ́КС ЧА́ДДОКА — см. *Чаддока рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ЧЕ́РМАКА — см. *Чермака рефлекс.*

Р. ЧЕТВЕРОХО́ЛМНЫЙ (син. старт-рефлекс) — физиологический Р.: вздрагивание, настораживание в ответ на неожиданный раздражитель.

Р. С ЧЕТЫРЕХГЛА́ВОЙ МЫ́ШЦЫ БЕДРА́ (r. musculi quadricipitis femoris) — см. *Рефлекс коленный.*

Р. ЧИХА́ТЕЛЬНЫЙ (r. sternutationis) — физиологический Р.: чиханье, сопровождаемое мимической реакцией, при раздражении слизистой оболочки полости носа.

РЕФЛЕ́КС ЧЛЕ́НОВА — МАККА́РТИ — см. *Рефлекс аддукторный дорсальный.*

Р. ША́ГОВЫЙ (син. ходьба автоматическая) — шаговые движения при опоре на ноги и легком наклоне туловища вперед; физиологический Р. у детей в возрасте до 3 месяцев, в более позднем возрасте — симптом детского церебрального паралича.

РЕФЛЕ́КС ШЕ́РРИНГТОНА — см. *Шеррингтона рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ШЕ́ФФЕРА — см. *Шеффера рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ШМИ́ДТА — см. *Шмидта рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ШТЕ́РНБЕРГА — см. *Бехтерева — Менделя рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ШУРЫ́ГИНА — см. *Рефлекс улиткозрачковый.*

Р. ЭКСТЕРОЦЕПТИ́ВНЫЙ (r. exteroceptivus) — общее название Р., возникающих при действии раздражителя на экстерорецепторы.

Р. ЭКСТРАПОЛЯЦИО́ННЫЙ (r. extrapolationis) — двигательный условный Р. на наиболее вероятное перемещение безусловного раздражителя в пространстве.

Р. ЭЛЕМЕНТА́РНОЙ ОСА́НКИ ДЕЛЬМА́ — МАРСАЛЕ́ — см. *Фуа — Тевенара рефлекс осанки.*

Р. ЭНТЕРОГАСТРА́ЛЬНЫЙ (r. enterogastricus; греч. enteron кишка + gastēr желудок) — висцеро-висцеральный Р.: торможение секреции желудочного сока и эвакуации содержимого желудка при раздражении слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

Р. ЭПИГАСТРА́ЛЬНЫЙ (r. epigastricus) — см. *Рефлекс солярный.*

РЕФЛЕ́КС ЭРБА — см. *Рефлекс коленный.*

РЕФЛЕ́КС ЭРБА — ФЕ́РСТЕРА — БАРРЕ́ — ЛЕВЕНШТЕ́ЙНА — см. *Рефлекс с двуглавой мышцы бедра.*

Р. ЭРЕКЦИО́ННЫЙ ФЛАТА́У — см. *Флатау эрекционный рефлекс.*

Р. ЯГОДИ́ЧНЫЙ (r. gluteus; син. Р. глютеальный) — физиологический Р.: сокращение большой ягодичной мышцы, иногда с разгибанием бедра, на стороне штрихового раздражения кожи ягодичной области; вызывается в положении исследуемого на животе.

Р. ЯИ́ЧКОВО-СЕРДЕ́ЧНЫЙ (r. testiculocardiacus) — вегетативный Р.: изменение ритма сердечной деятельности и дыхания, спазм или расширение кровеносных сосудов, расширение зрачков при болевом раздражении яичка.

РЕФЛЕ́КС ЯКОБСО́НА — ЛА́СКА — см. *Якобсона — Ласка рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ЯНИШЕ́ВСКОГО — см. *Янишевского — Бехтерева хватательный рефлекс.*

РЕФЛЕ́КС ПУЛЬСИ́РУЮЩИЙ — деформированный световой конус барабанной перепонки, наблюдаемый при отоскопии как появляющаяся и исчезающая блестящая точка; признак нек-рых форм гнойного среднего отита, обусловленный синхронными с пульсом колебаниями барабанной перепонки; сопровождается толчкообразным выделением гноя через перфорационное отверстие.

РЕФЛЕ́КС СВЕТОВО́Й — см. *Световой конус.*

РЕФЛЕ́КС ЦЕ́ЛИ — поведенческая реакция организма, направленная на поиск и получение определенных раздражителей.

РЕФЛЕКСИ́Я (франц. réflexion размышление, обдумывание; от лат. reflecto, reflexum поворачивать, обращать назад) — форма теоретической деятельности, заключающаяся в осмыслении собственных психических процессов (эмоций, влечений, мыслей и др.) или действий.

РЕФЛЕКСОГЕ́ННАЯ ЗО́НА (син. рецептивное поле) — область тела (напр., участок кожи, слизистой оболочки, сосудистой стенки), в пределах к-рой расположены рецепторы одного типа, раздражение к-рых приводит к возникновению определенного рефлекса.

РЕФЛЕКСО́ГРАФ (истор.; *рефлекс* + греч. graphō писать, изображать) — прибор для графической регистрации сухожильных рефлексов; сконструирован В. М. Бехтеревым.

РЕФЛЕКСОЛО́ГИЯ (истор.; *рефлекс* + греч. logos учение, наука) — редукционистское направление в психологии и неврологии, к-рое сводило психическую деятельность к сумме условных рефлексов; ограничивалось изучением внешних реакций человека и исключало роль сознания.

РЕФЛЕКСО́МЕТР (*рефлекс* + греч. metreō измерять) — 1) прибор для измерения силы и (или) скорости рефлекторной реакции (обычно — движения); 2) (истор.) — прибор для количественной оценки коленного рефлекса путем измерения изменений угла между бедром и голенью.

РЕФЛЕКСОМЕТРИ́Я (*рефлекс* + греч. metreō измерять) — измерение силы и (или) скорости рефлекторных реакций.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИ́Я (reflexotherapia; *рефлекс* + *терапия*; син. терапия рефлекторная) — общее название нек-рых методов лечения, основанных на раздражении (механическом, термическом и др.) определенных зон (точек) поверхности тела (биологически активных точек); включает иглоукалывание, аурикулотерапию, электропунктуру и др.

РЕФЛЕКТО́РНАЯ ДУГА́ (син. рефлекторный путь — нрк) — совокупность образований, необходимых для осуществления рефлекса; состоит из рецептора, эффектора и соединяющих их первных структур.

Р. Д. МОНОСИНАПТИ́ЧЕСКАЯ — Р. д., не имеющая в своем составе вставочных нейронов.

Р. Д. ПОЛИСИНАПТИ́ЧЕСКАЯ — Р. д. с одним или несколькими вставочными нейронами.

РЕФЛЕКТО́РНОЕ ДЕ́ЙСТВИЕ ЛЕКА́РСТВЕННЫХ ВЕЩЕ́СТВ — действие лекарственных веществ, обусловленное раздражением рефлексогенных зон.

РЕФЛЕКТО́РНЫЙ ПУТЬ (нрк) — см. *Рефлекторная дуга.*

РЕФЛЮ́КС (refluxus; лат. refluo, refluxum течь обратно; *ре-* + fluo течь) — пассивное перемещение (затекание) содержимого из одного полого органа в другой в направлении, противоположном нормальному.

Р. БИЛИОПАНКРЕАТИ́ЧЕСКИЙ (r. biliopancreaticus) — Р. желчи из общего желчного протока в проток поджелудочной железы.

Р. ВЕ́ЗИКО-УРЕТЕРА́ЛЬНЫЙ (r. vesicouretericus; син. Р. пузырно-мочеточниковый) — Р. содержимого мочевого пузыря в мочеточник.

Р. ГАСТРОЭЗОФАГЕА́ЛЬНЫЙ (r. gastroesophageus; син. Р. желудочно-пищеводный) — Р. желудочного содержимого в пищевод при патологическом раскрытии кардиального отверстия.

Р. ДУОДЕНОБИЛИА́РНЫЙ (r. duodenobiliaris) — Р. содержимого двенадцатиперстной кишки в желчные протоки.

Р. ДУОДЕНОГАСТРА́ЛЬНЫЙ (r. duodenogastricus) — Р. содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок.

Р. ЖЕЛУ́ДОЧНО-ПИЩЕВО́ДНЫЙ (r. gastroesophageus) — см. *Рефлюкс гастроэзофагеальный.*

Р. КИШЕ́ЧНО-ПО́ЧЕЧНЫЙ (r. intestinorenalis) — Р. кишечного содержимого в почечную лоханку через анастомоз, наложенный между мочеточником и толстой кишкой для отведения мочи.

Р. ПИЕЛОТУБУЛЯ́РНЫЙ (r. pyelotubularis) — см. *Рефлюкс тубулярный.*

Р. ПУЗЫ́РНО-МОЧЕТО́ЧНИКОВЫЙ (r. vesicoureteric us) — см. *Рефлюкс везико-уретеральный.*

Р. ТУБУЛЯ́РНЫЙ (r. tubularis; син. р. пиелотубулярный)— Р. содержимого почечной лоханки в прямые почечные канальцы при внезапном повышении гидростатического давления в лоханке (напр., при ретроградной пиелографии, при обтурации мочеточника).

Р. ХОЛЕДОХОПАНКРЕАТИ́ЧЕСКИЙ (r. choledochopancreaticus; анат. ductus choledochus общий желчный проток + pancreas поджелудочная железа) — Р. желчи из печеночно-поджелудочной ампулы общего желчного протока в проток поджелудочной железы.

Р. ЦЕКОИЛЕА́ЛЬНЫЙ (r. cecoiliacus; анат. cecum слепая кишка + ileum подвздошная кишка) — Р. кишечного содержимого из слепой кишки в подвздошную при недостаточности илеоцекального клапана.

РЕФЛЮ́КС ЛОХА́НОЧНО-ПО́ЧЕЧНЫЙ (refluxus pyelorenalis) — см. *Рефлюкс пиелоренальный.*

РЕФЛЮ́КС МА́ТОЧНО-ВЕНО́ЗНЫЙ (refluxus uterovenosus) — попадание контрастного вещества при метрографии из полости матки в поврежденные венозные сосуды.

РЕФЛЮ́КС МОЧЕТО́ЧНИКОВО-ВЕНО́ЗНЫЙ (refluxus ureterovenosus) — попадание содержимого мочеточника в его крупные вены; наблюдается при повреждении мочеточника или резком увеличении гидростатического давления в его просвете (напр., при ретроградной пиелоуретерографии, при обструкции мочеточника).

РЕФЛЮ́КС ПЕРИВАСКУЛЯ́РНЫЙ (refluxus perivascularis; син. рефлюкс перивенозный) — форникальный рефлюкс, при к-ром содержимое почечной лоханки попадает в ткань, окружающую вены почки.

РЕФЛЮ́КС ПЕРИВЕНО́ЗНЫЙ (refluxus perivenosus) — см. *Рефлюкс периваскулярный.*

РЕФЛЮ́КС ПЕЧЁНОЧНО-ЯРЕ́МНЫЙ (refluxus hepatojugularis; син. Пастера — Рудо симптом) — набухание яремных вен при надавливании на застойно-увеличенную печень при правожелудочковой недостаточности, обусловленное повышением давления в системе нижней полой вены и в правых отделах сердца.

РЕФЛЮ́КС ПИЕЛОВЕНО́ЗНЫЙ (refluxuc pyelovenosus) — форникальный рефлюкс, при к-ром содержимое почечной лоханки попадает в вены почки.

РЕФЛЮ́КС ПИЕЛОЛИМФАТИ́ЧЕСКИЙ (refluxus pyelolymphaticus) — форникальный рефлюкс, при к-ром содержимое почечной лоханки попадает в лимфатические сосуды почки.

РЕФЛЮ́КС ПИЕЛОРЕНА́ЛЬНЫЙ (refluxus pyelorenalis; син. рефлюкс лоханочно-почечный) — общее название различных вариантов проникания содержимого почечной лоханки в другие части почки.

РЕФЛЮ́КС ПИЕЛОРЕТРОПЕРИТОНЕА́ЛЬНЫЙ (refluxus pyeloretroperitonealis) — форникальный рефлюкс, при к-ром содержимое почечной лоханки попадает в клетчатку, расположенную в области ворот почки.

РЕФЛЮ́КС ПИЕЛОСИ́НУСНЫЙ (refluxus pyelosinualis) — пиеловенозный рефлюкс, при к-ром содержимое почечной лоханки попадает в вены области почечной пазухи.

РЕФЛЮ́КС СУБКАПСУЛЯ́РНЫЙ (refluxus subcapsularis) — форникальный рефлюкс, при к-ром содержимое почечной лоханки попадает в паренхиму почки и скапливается под ее фиброзной капсулой.

РЕФЛЮ́КС УРЕТРОВЕНО́ЗНЫЙ (refluxus urethrovenosus; син. инвазия уретровенозная) — попадание содержимого мочеиспускательного канала в вены области таза; возникает при повреждении мочеиспускательного канала.

РЕФЛЮ́КС ФОРНИКА́ЛЬНЫЙ (refluxus fornicalis; лат. fornix, fornicis свод) — попадание содержимого почечной лоханки в паренхиму почки, кровеносные или лимфатические сосуды через разрывы стенок малых почечных чашечек в их проксимальной части (форниксе); обусловлено повышением гидростатического давления в почечной лоханке при обструкции мочеточника или при ретроградной пиелографии.

РЕФЛЮ́КС-ИЛЕ́ИТ (refluxus-ileitis; син. рефлюкс-энтерит) — воспаление конечной части подвздошной кишки, обусловленное цекоилеальным рефлюксом.

РЕФЛЮ́КС-ЭЗОФАГИ́Т (refluxus-oesophagitis) — воспаление слизистой оболочки пищевода, обусловленное гастроэзофагеальным рефлюксом; проявляется загрудинными болями, изжогой.

РЕФЛЮ́КС-ЭНТЕРИ́Т (refluxus-enteritis) — см. *Рефлюкс-илеит.*

РЕФРАКТЕ́РНАЯ ФА́ЗА — см. *Рефрактерный период.*

РЕФРАКТЕ́РНОСТЬ (франц. réfractaire невосприимчивый) — преходящее состояние пониженной возбудимости нервной или мышечной ткани, возникающее после их возбуждения.

Р. АБСОЛЮ́ТНАЯ — Р. в виде полной потери возбудимости, возникающее сразу после возбуждения.

Р. ОТНОСИ́ТЕЛЬНАЯ — Р. в виде пониженной, постепенно восстанавливающейся возбудимости; наступает после абсолютной Р.

РЕФРАКТЕ́РНЫЙ ПЕРИО́Д (франц. réfractaire невосприимчивый; син. рефрактерная фаза) — период пониженной возбудимости нервной или мышечной ткани, наступающий в процессе и после их возбуждения.

РЕФРАКТО́МЕТР (рефракция + греч. metreō измерять) — оптический прибор для измерения показателя преломления света на поверхности раздела двух сред; различные Р. широко применяются при клинических, гигиенических, фармацевтических, лабораторных исследованиях.

Р. ИНТЕРФЕРЕНЦИО́ННЫЙ — Р., основанный на наблюдении смещения интерференционных полос, образующихся в плоскости пересечения когерентных пучков света, один из к-рых проходит через слой вещества с известным коэффициентом преломления, а другой — с исследуемым веществом.

РЕФРАКТО́МЕТР ГЛАЗНО́Й — оптический прибор для объективного определения рефракции глаза путем проецирования на сетчатку тестового знака в виде горизонтальных и вертикальных полосок и наблюдения его отражения.

РЕФРАКТОМЕТРИ́Я ГЛА́ЗА — объективное измерение рефракции глаза с помощью оптических приборов — рефрактометров.

РЕФРАКТУ́РА (refractura; *ре-* + лат. fractura перелом) — повторный перелом в области костной мозоли при ее незавершенной консолидации.

РЕФРА́КЦИЯ ГЛА́ЗА клиническая (refractio oculi; лат. от refringo, refractum ломать, преломлять) — характеристика преломляющей силы оптической системы глаза, определяемая по положению заднего главного фокуса относительно сетчатки.

Р. ГЛА́ЗА АМЕТРОПИ́ЧЕСКАЯ (r. oculi ametropica) — Р. г., при к-рой положение заднего главного фокуса оптической системы глаза не совпадает с сетчаткой.

Р. ГЛА́ЗА ГИПЕРМЕТРОПИ́ЧЕСКАЯ (r. oculi hypermetropica) — см. *Дальнозоркость.*

Р. ГЛА́ЗА ДИНАМИ́ЧЕСКАЯ (r. oculi dynamica) — Р. г. в процессе аккомодации.

Р. ГЛА́ЗА МИОПИ́ЧЕСКАЯ (r. oculi myopica) — см. *Близорукость.*

Р. ГЛА́ЗА СОРАЗМЕ́РНАЯ (r. oculi emmetropica) — см. *Рефракция глаза эмметропическая.*

Р. ГЛА́ЗА СТАТИ́ЧЕСКАЯ (r. oculi statica) — Р. г. в состоянии покоя аккомодации.

Р. ГЛА́ЗА СФЕРИ́ЧЕСКАЯ (r. oculi sphaerica) — Р. г. без учета астигматизма.

Р. ГЛА́ЗА ЭММЕТРОПИ́ЧЕСКАЯ (r. oculi emmetropica; син.: р. глаза соразмерная, эмметропия) — Р. г., при к-рой положение заднего главного фокуса оптической системы глаза совпадает с сетчаткой.

РЕФРА́КЦИЯ ГЛА́ЗА ФИЗИ́ЧЕСКАЯ (refractio oculi physicalis) — преломляющая сила оптической системы глаза, выраженная в диоптриях.

РЕФРА́КЦИЯ РОГОВИ́ЦЫ (refractio corneae) — преломляющая сила передней поверхности роговицы, выраженная в диоптриях.

РЕФРА́КЦИЯ ХРУСТА́ЛИКА (refractio lentis) — суммарная преломляющая сила хрусталика, выраженная в диоптриях.

РЕ́ФСУМА СИНДРО́М (S. B. Refsum, род. в 1907 г., норвежский невропатолог) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена фитиновой кислоты и характеризующаяся хроническим полиневритом, пигментным ретинитом, мозжечковой атаксией, иногда обыкновенным ихтиозом; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

РЕЦЕ́ПТ (receptum; лат. «взятое, полученное», от recipio, receptum брать, принимать) — письменное, установленной формы (на печатном бланке) обращение врача (фельдшера, акушерки, зубного врача) в аптеку об отпуске лекарственного средства в определенной дозировке или изготовлении ле-

карственной формы с указанием способа употребления лекарственного средства; является основанием для отпуска (продажи) из аптек большинства лекарственных средств.

РЕЦЕПТА́Р-КОНТРОЛЁР (истор.) — должностное лицо аптечного учреждения, имевшее высшее фармацевтическое образование, осуществлявшее прием рецептов и требований, проверку правильности их выписывания и оформления, контроль за качеством и технологией приготовления лекарств, а также производившее их отпуск; с 1976 г. обязанности Р.-к. выполняет провизор-технолог.

РЕЦЕПТИ́ВНОЕ ПО́ЛЕ (франц. réceptif воспринимающий, рецептивный; от лат. recipio, receptum брать, принимать) — 1) зрительно-ганглиозного нейрона — участок сетчатки, в к-ром расположены фоторецепторы, функционально связанные с данным зрительно-ганглиозным нейроном; 2) рефлекса — см. *Рефлексогенная зона.*

РЕЦЕ́ПТОР(-Ы) (лат. recipio, receptum брать, принимать; син. рецепторный прибор — нрк) — анатомическое образование (чувствительное нервное окончание или специализированная клетка), преобразующее воспринимаемое раздражение в первные импульсы.

α-РЕЦЕ́ПТОРЫ — см. *α-Адренорецепторы.*

β-РЕЦЕ́ПТОРЫ — см. *β-Адренорецепторы.*

Р. АДРЕНЕРГИ́ЧЕСКИЕ — см. *Адренорецепторы.*

РЕЦЕ́ПТОРЫ α-АДРЕНЕРГИ́ЧЕСКИЕ — см. *α-Адренорецепторы.*

РЕЦЕ́ПТОРЫ β-АДРЕНЕРГИ́ЧЕСКИЕ — см. *β-Адренорецепторы.*

Р. БОЛЕВО́Й (син.: ноцирецептор, ноцицептор) — Р., раздражение к-рого вызывает ощущение боли.

Р. ВКУСОВЫЕ — хеморецепторы, раздражение к-рых вызывает вкусовые ощущения; локализуются в слизистой оболочке ротовой полости, гл. обр. в сосочках языка.

Р. ВНЕ́ШНИЙ — см. *Экстероцептор.*

Р. ВНУ́ТРЕННИЙ — см. *Интероцептор.*

Р. ВТОРИ́ЧНО-ЧУ́ВСТВУЮЩИЙ (син. Р. несвободный) — Р., представляющий собой специализированную клетку, возбуждение к-рой передается окончаниям соответствующего афферентного нейрона, напр. в органах зрения или слуха.

Р. ГАНГЛИОНА́РНЫЙ — Р., расположенный в вегетативном ганглии или сплетении; участвует в осуществлении периферических вегетативных рефлексов.

Р. ДИСТА́НТНЫЙ (син. телерецептор) — Р., воспринимающий раздражения, источник к-рых находится на нек-ром расстоянии от организма (напр., зрительный, слуховой Р.).

Р. ЗРИТЕ́ЛЬНЫЕ (син. фоторецепторы) — Р. сетчатки, раздражение к-рых вызывает зрительное ощущение.

Р. КО́ЖНЫЕ — Р., расположенные в коже и обеспечивающие восприятие механического, температурного и болевого раздражения.

Р. КОНТА́КТНЫЙ (син. контакт-рецептор) — Р., возбуждение к-рого происходит при непосредственном соприкосновении (контакте) с источником раздражения.

Р. МОНОМОДА́ЛЬНЫЙ — Р., воспринимающий только один вид раздражения, напр. зрительный Р.

Р. НЕСВОБО́ДНЫЙ — см. *Рецептор вторично-чувствующий.*

Р. ОБОНЯ́ТЕЛЬНЫЕ — хеморецепторы слизистой оболочки верхних отделов полости носа, раздражение к-рых вызывает ощущение запаха.

Р. ПЕРВИ́ЧНО-ЧУ́ВСТВУЮЩИЙ — Р., представляющий собой чувствительное нервное окончание.

Р. ПОЛИВАЛЕ́НТНЫЙ — см. *Рецептор полимодальный.*

Р. ПОЛИМОДА́ЛЬНЫЙ (син. Р. поливалентный) — Р., воспринимающий несколько видов раздражений, напр. механическое и температурное.

Р. ПРЕССО́РНЫЕ — см. *Барорецепторы.*

Р. РАСТЯЖЕ́НИЯ — см. *Тензорецепторы.*

Р. СЛУХОВЫ́Е (син. фонорецепторы) — Р. спирального органа, раздражение к-рых вызывает слуховые ощущения.

Р. СУСТАВНЫ́Е — механорецепторы, расположенные в суставной капсуле, суставных хрящах, связочном аппарате суставов и в перикапсулярной соединительной ткани; участвуют в проприоцепции.

Р. СУХОЖИ́ЛЬНЫЕ — механорецепторы, расположенные в сухожилиях и перимизии.

Р. ТАКТИ́ЛЬНЫЕ — механорецепторы, воспринимающие прикосновение, давление и вибрацию.

Р. ТЕМПЕРАТУ́РНЫЕ (син. терморецепторы) — Р., воспринимающие изменения температуры, окружающей среды, а при глубоком расположении — температуры тела.

Р. ТКАНЕВЫЕ — Р., расположенные в органах и тканях вне специализированных рефлексогенных зон, напр. нек-рые хеморецепторы.

РЕЦЕ́ПТОР АНТИГЕНСВЯЗЫВАЮЩИЙ — клеточный рецептор лимфоцита, способный распознавать определенный антиген.

РЕЦЕ́ПТОР ВИ́РУСНЫЙ — участок поверхности вириона, определяющий специфичность взаимодействия вируса с клеточной оболочкой.

РЕЦЕ́ПТОР ИММУНОГЛОБУЛИ́НОВЫЙ — антигенсвязывающий рецептор В-лимфоцита, имеющий иммуноглобулиновую природу.

РЕЦЕ́ПТОР КЛЕ́ТОЧНЫЙ — участок клеточной оболочки, молекулярная структура к-рого характеризуется избирательным сродством к нек-рым определенным веществам (напр., антигенам, вирусным рецепторам), способностью вступать с ними в химическое взаимодействие (присоединять, связывать).

РЕЦЕ́ПТОР ОПИА́ТНЫЙ — клеточный рецептор нейрона ц. н. с., способный избирательно взаимодействовать с морфином, а также с синтезируемыми в организме пептидами (энкефалинами и эндорфинами), что вызывает специфические биологические эффекты (напр., аналгезию).

РЕЦЕ́ПТОР ЭРЛИХА — см. *Эрлиха рецептор.*

РЕЦЕПТО́РНЫЙ ПОТЕНЦИА́Л (син. генераторный потенциал) — биопотенциал, возникающий при деполяризации поверхностной мембраны рецептора, обусловленной действием на него раздражителя.

РЕЦЕПТО́РНЫЙ ПРИБО́Р (нрк) — см. *Рецептор.*

РЕЦЕПТУ́РА (receptura; лат. recipio, receptum брать, принимать) — 1) раздел фармации, посвященный правилам выписывания рецептов; 2) сведения о количестве рецептов в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях с их характеристикой; 3) состав и способ изготовления смеси веществ (в т. ч. лекарственных средств).

РЕЦЕПТУ́РА ЭКСТЕМПОРА́ЛЬНАЯ (лат. ex tempore сообразно обстоятельствам) — сведения о количестве и характере рецептов, по к-рым лекарственные формы изготовляются в аптеках индивидуально, по мере поступления рецептов.

РЕЦЕ́ПЦИЯ (лат. receptio прием, принятие) — преобразование воспринимаемых раздражений в нервные импульсы.

РЕЦЕССИ́ВНОСТЬ (лат. recessus отступление) — свойство одного из генов аллельной пары проявляться фенотипически в геми- или гомозиготном состоянии и не проявляться в гетерозиготном состоянии.

РЕЦЕ́ССИЯ (recessio; лат. отступление, отдаление; син. ретропозиция) — хирургическая операция: исправление косоглазия, заключающееся в перемещении кзади места прикрепления к склере одной из наружных мышц глаза.

РЕЦИДИ́В (recidivum; лат. recidivus возвращающийся, возобновляющийся; от recido возвращаться) — повторное появление признаков болезни после ремиссии.

РЕЦИДИ́В МАЛЯРИ́ЙНЫЙ — возобновление проявлений малярии (клинических симптомов или паразитемии) через интервал более длительный, чем при обычной периодичности малярийных пароксизмов.

Р. МАЛЯРИ́ЙНЫЙ БЛИ́ЖНИЙ — 1) Р. м., наступающий не позднее чем через 2—3 месяца после первичного пароксизма; 2) Р. м., обусловленный сохранением в организме эритроцитных форм возбудителя болезни.

Р. МАЛЯРИ́ЙНЫЙ ОТДАЛЁННЫЙ — 1) Р. м., наступающий позднее чем через 6 месяцев после первичного пароксизма; 2) Р. м., обусловленный повторным проникновением в эритроциты экзоэритроцитных форм возбудителя болезни.

РЕЦИПИЕ́НТ (лат. recipiens, recipientis принимающий, получающий) — 1) человек (в эксперименте — животное), к-рому производится переливание донорской крови или ее препаратов; 2) человек (в эксперименте — животное), к-рому производится трансплантация органа или тканей от донора; 3) клетка, получающая генетический материал (ДНК) от другой клетки (донора).

РЕЦИПИЕ́НТ ВОЗБУДИ́ТЕЛЯ БОЛЕ́ЗНИ — восприимчивый человек (или животное), заражающийся возбудителем инфекционной болезни; термин используется преимущественно в системе «донор — переносчик — реципиент».

РЕЦИРКУЛЯ́ЦИЯ ВО́ЗДУХА (*ре-* + лат. circulatio круговращение) — многократное использование одного и того же объема воздуха в замкнутой системе

воздухообеспечения с повторной его обработкой (фильтрацией, увлажнением или обезвоживанием и др.).

РЕЧЕВА́Я БЕССВЯ́ЗНОСТЬ (син.: инкогерентность речевая, речевая спутанность) — патологическое речевое возбуждение с утратой смысловых и грамматических связей между словами и фразами, к-рые больной нередко рифмует.

РЕЧЕВА́Я ЗО́НА МОТО́РНАЯ — область коры большого мозга, расположенная в заднем отделе нижней лобной извилины доминантного полушария кпереди от корковых центров движений губ, языка и гортани; при поражении Р. з. м. возникает моторная афазия.

РЕЧЕВА́Я ЗО́НА СЕНСО́РНАЯ — см. *Вернике центр*.

РЕЧЕВА́Я СПУ́ТАННОСТЬ — см. *Речевая бессвязность*.

РЕЧЕВО́Е НЕДЕРЖА́НИЕ (logorrhoea) — см. *Логорея*.

РЕЧЕВО́Е НОВООБРАЗОВА́НИЕ — см. *Неологизм*.

РЕЧЕВО́Й НАПО́Р — патологическое речевое возбуждение, при к-ром больной ощущает непрерывную потребность говорить и не может прекратить свои многословные высказывания.

РЕЧЕГРА́ММА — графическая запись речи с помощью аппарата, регистрирующего уровень звукового давления; применяется для изучения плавности, громкости, интонационного строя речи.

РЕЧЬ — специфически человеческая форма деятельности, служащая общению между людьми посредством языка.

РЕЧЬ АВТОМАТИ́ЧЕСКАЯ — воспроизведение хорошо выученной серии слов (последовательный ряд чисел, дни недели, месяцы года, алфавит и др.).

РЕЧЬ ВНУ́ТРЕННЯЯ — речевая деятельность, участвующая в процессах мышления и памяти и не предназначенная для непосредственного общения с другими людьми; внешне может проявляться лишь микродвижениями артикуляционного аппарата.

РЕЧЬ ВЫ́ЧУРНАЯ (син. речь манерная) — расстройство речи, при к-ром больной использует необычные, малопонятные, часто неподходящие по смыслу слова; сопровождается манерной жестикуляцией и гримасничаньем, наблюдается при нек-рых психических болезнях.

РЕЧЬ ЖЕ́СТОВАЯ — см. *Речь мимико-жестикуляторная*.

РЕЧЬ ЗЕРКА́ЛЬНАЯ (син. эхопалилалия) — расстройство речи, при к-ром больной непроизвольно повторяет слова, услышанные от окружающих; наблюдается при органических заболеваниях головного мозга, шизофрении.

РЕЧЬ ИМПРЕССИ́ВНАЯ (франц. impressif производящий впечатление, запечатлевающийся) — см. *Речь сенсорная*.

РЕЧЬ МАНЕ́РНАЯ — см. *Речь вычурная*.

РЕЧЬ МИ́МИКО-ЖЕСТИКУЛЯТО́РНАЯ (син. речь жестовая) — общение между людьми, основанное на системе жестов и мимических движений.

РЕЧЬ МОНОТО́ННАЯ — расстройство речи, при к-ром отсутствуют (или крайне незначительны) изменения интонаций; наблюдается при нек-рых болезнях нервной системы (паркинсонизм и др.), а иногда и у здоровых людей.

РЕЧЬ МОТО́РНАЯ (син. речь экспрессивная) — формулировка и высказывание своих мыслей, чувств, желаний в устной или письменной форме.

РЕЧЬ ОБСТОЯ́ТЕЛЬНАЯ — расстройство речи, при к-ром больной медленно и подробно излагает маловажные детали, что затрудняет понимание цели высказывания; наблюдается, напр., при эпилепсии.

РЕЧЬ ОЛИГОФАЗИ́ЧЕСКАЯ (греч. oligos малый, недостаточный + phasis речь) — расстройство речи, при к-ром она обеднена по словарному запасу, грамматическому строю и интонациям; наблюдается при эпилепсии.

РЕЧЬ ПАРАДОКСА́ЛЬНАЯ — расстройство речи, при к-ром в ней преобладают противоречивые по смыслу высказывания; наблюдается при нек-рых психических болезнях.

РЕЧЬ ПЕРСЕВЕРАТИ́ВНАЯ (лат. persevero, perseveratum упорно держаться, продолжаться) — расстройство речи, при к-ром больной многократно повторяет одно и то же слово или оборот речи и затрудняется в подборе других слов и оборотов, требуемых для продолжения речи; наблюдается при органических заболеваниях головного мозга.

РЕЧЬ ПУЭРИ́ЛЬНАЯ (лат. puerilis детский) — расстройство речи, при к-ром она у взрослого больного напоминает детскую (упоминание себя в третьем лице, картавость и др.); наблюдается гл. обр. при психогениях, реже при органических заболеваниях головного мозга.

РЕЧЬ РИФМО́ВАННАЯ — расстройство речи, при к-ром больной рифмует слова, часто в ущерб смыслу; наблюдается, напр., у больных с маниакальными состояниями и при кататонии.

РЕЧЬ СЕНСО́РНАЯ (син. речь импрессивная) — восприятие и понимание чужой устной или письменной речи.

РЕЧЬ СКАНДИ́РОВАННАЯ — расстройство речи, при к-ром больной говорит медленно, раздельно произнося слоги и слова; наблюдается при поражении мозжечка; характерный симптом рассеянного склероза.

РЕЧЬ СЛАЩА́ВАЯ — расстройство речи, при к-ром больной говорит с вкрадчивой интонацией, употребляет уменьшительные формы слов и шаблонные хвалебные обороты; наблюдается при эпилепсии, нек-рых психопатиях.

РЕЧЬ ЭКСПРЕССИ́ВНАЯ (франц. expressif выразительный, экспрессивный) — см. *Речь моторная*.

РЕШЁТЧАТАЯ БОРОЗДА́ (sulcus ethmoidalis, PNA, BNA, JNA) — линейное углубление на внутренней поверхности носовой кости; место прохождения переднего решетчатого нерва.

РЕШЁТЧАТАЯ ВОРО́НКА (infundibulum ethmoidale, PNA, BNA, JNA) — передневерхняя часть полулунной расщелины полости носа, ведущая к отверстиям передних пазух решетчатой кости и лобной пазухи.

РЕШЁТЧАТАЯ ПЛАСТИ́НКА (lamina cribrosa, PNA, BNA; lamina cribriformis, JNA; син. продырявленная пластинка — устар.) — горизонтальная пластинка решетчатой кости, входящая в состав верхней стенки полости носа; содержит отверстия, через к-рые проходят обонятельные нервы.

РЕШЁТЧАТОЕ ОТВЕ́РСТИЕ ЗА́ДНЕЕ (foramen ethmoidale posterius, PNA, BNA; canalis orbitoethmoideus, JNA) — канал в медиальной стенке глазницы (в шве между лобной и решетчатой костями), ведущий в задние ячейки решетчатой кости; место прохождения заднего решетчатого нерва и одноименных сосудов.

РЕШЁТЧАТОЕ ОТВЕ́РСТИЕ ПЕРЕ́ДНЕЕ (foramen ethmoidale anterius, PNA, BNA; canalis orbitocranialis, JNA) — канал в медиальной стенке глазницы (в шве между лобной и решетчатой костями), ведущий в полость черепа; место прохождения переднего решетчатого нерва и одноименных сосудов.

РЕШЁТЧАТЫЕ ПЯ́ТНА (maculae cribrosae, PNA, BNA; areae cribriformes, JNA) — участки стенки преддверия костного лабиринта, пронизанные отверстиями, через к-рые проходят ветви эллиптически-мешотчато-ампулярного и сферически-мешотчатого нервов.

РЕШЁТЧАТЫЕ ЯЧЕ́ЙКИ (cellulae ethmoidales, PNA, BNA; sinus ethmoidei, JNA) — воздухоносные ячейки решетчатой кости; открываются в верхний и средний носовые ходы.

РЕШЁТЧАТЫЙ ЛАБИРИ́НТ (labyrinthus ethmoidalis, PNA, BNA; labyrinthus ossis ethmoidis, JNA) — совокупность ячеек решетчатой кости, сообщающихся между собой и с полостью носа.

РЕШЁТЧАТЫЙ ОТРО́СТОК (processus ethmoidalis, PNA, BNA; processus ethmoideus, JNA) — задний выступ на верхнем крае нижней носовой раковины; соединяется с крючкообразным отростком решетчатой кости.

РЕЭДУКА́ЦИЯ СЛУ́ХА (*ре-* + лат. educatio воспитание, тренировка) — метод улучшения слуха при тугоухости и нек-рых формах глухоты, основанный на применении упражнений, заключающихся в периодическом раздражении рецепторных клеток кортиева органа звуками большой интенсивности.

РИБО́ ЗАКО́Н (Т. А. Ribot, 1839—1916, франц. психолог) — закономерность, согласно к-рой прогрессирующий распад памяти при органических заболеваниях головного мозга и при физиологическом старении происходит в последовательности, обратной накоплению информации в течение жизни, т. е. от более поздно приобретенной информации к давно приобретенной.

РИБО́ЗА — моносахарид из группы пентоз, присутствующий во всех живых клетках, напр. в составе РНК.

РИБОНУКЛЕА́ЗЫ — ферменты класса гидролаз (напр., КФ 3.1.4.22 и 3.1.4.23), катализирующие расщепление рибонуклеиновых кислот; широко распространены в клетках всех организмов.

РИБОНУКЛЕ́ИНОВАЯ КИСЛОТА́ (РНК; син. пентозонуклеиновая кислота — устар.) — биополимер, построенный из мононуклеотидов, содержащих рибозу; обнаруживается во всех клеточных фракциях, в наибольшем количестве — в рибосомах; участвует в процессе биосинтеза белка; у нек-рых вирусов является носителем генетической информации.

Р. К. ИНФОРМАЦИО́ННАЯ (иРНК, мРНК; син. Р. к. матричная) — Р. к., синтезируемая в ядре в ходе транскрипции генетической информации и содержащая последовательность рибонуклеотидов, комплементарную последовательность де-

зоксирибонуклеотидов в дезоксирибонуклеиновой кислоте; определяет первичную структуру синтезируемой молекулы белка.

Р. К. МАТРИЧНАЯ — см. *Рибонуклеиновая кислота информационная.*

Р. К. РИБОСОМНАЯ (рРНК) — Р. к., входящая в состав рибосом и определяющая их структуру.

Р. К. ТРАНСПОРТНАЯ (тРНК) — Р. к., характеризующаяся сравнительно небольшой молекулярной массой, выполняющая в процессе биосинтеза белка функцию переносчика активированных аминокислотных остатков в рибосомы.

РИБОСО́МА (ribosoma; *рибоза* + греч. sōma тело; син. Пелейда гранула) — органоид, являющийся местом биосинтеза клеточных белков; представляет собой плотную сферическую частицу, состоящую из почти равных количеств рибонуклеиновых кислот и белков, организованных в две разные по величине субъединицы.

РИБОФЛАВИ́Н (riboflavinum; *рибоза* + лат. flavus желтый; син.: витамин B_2, лактофлавин) — водорастворимый витамин, входящий в состав флавопротеидов; содержится в зернобобовых продуктах, овощах, а также продуктах животного происхождения; при недостаточности Р. наблюдаются ангулярный стоматит, хейлоз, глоссит, конъюнктивит, кератит и светобоязнь.

РИБТ — см. *Реакция иммобилизации бледных трепонем.*

РИБУЛО́ЗА — природный моносахарид (кетопентоза), имеющий кетонную группу у второго атома углерода; нек-рые производные D-рибулозы — одного из стереоизомеров Р. — являются промежуточными продуктами обмена углеводов в организме.

РИ́ВА-РО́ККИ АППАРА́Т (S. Riva-Rocci, 1863—1937, итал. врач) — см. *Сфигмоманометр ртутный.*

РИ́ВАСА МЕ́ТОД (R. Rivas) — метод искусственного контрастирования, применяемый при рентгенопневмопельвиографии, ретроперитонеальной пневмографии или газовой медиастинографии; заключается в том, что газ посредством околокопчиковой пункции вводят в клетчатку полости таза, откуда он постепенно перемещается в забрюшинное пространство, а затем в средостение.

РИВЕ́РО-КОРВА́ЛЬО СИМПТО́М (J. Rivero-Corvallo; син. Корвальо симптом) — физиологический феномен: усиление аускультативных явлений, связанных с деятельностью правых отделов сердца, при задержке дыхания на высоте глубокого вдоха; способствует выявлению пороков трехстворчатого клапана.

РИ́ВЕРСА ДВОЙНА́Я ПРО́БА (A. B. Rivers) — см. *Гистаминовая проба двойная.*

РИ́ВИНУСОВ ПРОТО́К (A. Q. Rivinus, 1652—1723, нем. анатом и ботаник) — см. *Подъязычный проток большой.*

РИ́ВИНУСОВА ВЫ́РЕЗКА (A. Q. Rivinus) — см. *Барабанная вырезка.*

РИ́ВИНУСОВА ЖЕЛЕЗА́ (A. Q. Rivinus) — см. *Железа подъязычная.*

РИВУА́РА ОПЕРА́ЦИЯ (J. R. Rivoir, нем. хирург) — пластическая операция: замещение обширного дефекта мочеиспускательного канала (при гипоспадии) трубкой, сформированной из оболочек яичка.

РИ́ГЕЛЯ ОБЕ́Д (истор.; F. Riegel) — пробный обед, состоящий из 400 *мл* супа, 150—200 *г* жареного мяса (бифштекс), 50 *г* картофельного пюре и 35 *г* белого хлеба; применялся для исследования эвакуаторной функции желудка путем желудочного зондирования.

РИ́ГЕЛЯ ПРИ́ЗНАК (F. Riegel, 1843—1904, нем. врач) — 1) уменьшение (иногда исчезновение) дыхательной аритмии, наблюдающееся при поражениях миокарда и нек-рых нарушениях иннервации сердца; 2) исчезновение пульса на лучевой артерии во время полного выдоха; признак экссудативного перикардита; 3) верхушечный толчок, визуально определяемый на высоте глубокого вдоха; признак спаечного перикардита.

РИ́ГЕРА ПРО́БА — метод оценки глубины старческого слабоумия по наличию или отсутствию у больного реакции негодования на предъявленное ему ложное обвинение в неблаговидном поступке.

РИ́ГЕРА СИНДРО́М (H. Rieger, род. в 1898 г., австрийский офтальмолог) — аномалия развития глаз: сочетание гипоплазии мезодермального листка радужки, щелевидной деформации зрачка, эктопии хрусталика, врожденной катаракты, наличия дермоидной кисты у лимба и колобомы сосудистой оболочки в области желтого пятна; сопровождается нарушениями рефракции высокой степени.

РИ́ГИ БОЛЕ́ЗНЬ (A. Riga, итал. врач 19 в.; син.: афты кахектические, Кардарелли — Риги болезнь, Риги — Феде синдром, фиброгранулема подъязычная) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся появлением у грудных детей под языком затрудняющих питание узелков с изъязвленной твердой поверхностью, покрытой белым налетом.

РИ́ГИ — ФЕ́ДЕ СИНДРО́М (A. Riga, итал врач 19 в.; F. Fede, 1832—1913, итал. педиатр) — см. *Риги болезнь.*

РИГИ́ДНОСТЬ ВОСКОВИ́ДНАЯ (rigiditas ceroidea; лат. rigiditas твердость, жесткость, оцепенение) — продолжительное сохранение туловищем и конечностями больного приданной им позы; проявление экстрапирамидной ригидности.

РИГИ́ДНОСТЬ ДЕЦЕРЕБРАЦИО́ННАЯ (rigiditas decerebrationis) — резкое повышение мышечного тонуса в разгибателях туловища и конечностей, обусловленное полным нарушением связей коры полушарий и подкорковых ядер головного мозга с его стволом.

РИГИ́ДНОСТЬ ПРОГРЕССИ́РУЮЩАЯ (rigiditas progressiva) — см. *Галлервордена — Шпатца болезнь.*

РИГИ́ДНОСТЬ ПСИХИ́ЧЕСКАЯ (rigiditas psychica) — психопатологическое состояние, при к-ром снижены подвижность, переключаемость и приспособляемость психических процессов (мышления, установок и др.) к меняющимся требованиям среды.

РИГИ́ДНОСТЬ ЭКСТРАПИРАМИ́ДНАЯ (rigiditas extrapyramidalis) — повышение мышечного тонуса, одинаково выраженное во всех фазах активных и пассивных движений, обусловленное поражением экстрапирамидной системы.

РИД — ШТЕ́РНБЕРГА КЛЕ́ТКИ (D. M. Reed, 1874—1964, амер. патолог; K. Sternberg, 1872—1935, нем. патолог) — см. *Березовского — Штернберга клетки.*

РИ́ДА ПЛО́СКОСТЬ (R. W. Reid, 1851—1939, шотл. анатом) — предполагаемая горизонтальная плоскость, проходящая через центры наружных слуховых отверстий; используется в качестве наружного ориентира при стереотаксических операциях.

РИ́ДА ФО́РМУЛА (J. M. Read, род. в 1889 г., амер. врач) — формула, отображающая статистическую связь величины основного обмена с частотой пульса и средним артериальным давлением; используется для ориентировочной оценки уровня основного обмена.

РИ́ДЕЛЯ ОПЕРА́ЦИЯ (V. Riedel) — хирургическая операция, применяемая для лечения хронического фронтита или обширного повреждения лобной пазухи, заключающаяся в полном удалении ее передней и нижней стенок, тщательном выскабливании слизистой оболочки пазухи и решетчатых ячеек и создании широкого соустья с полостью носа.

РИ́ДЕЛЯ РАЗРЕ́З (B. M. K. L. Riedel, 1846—1916, нем. хирург) — продольный разрез через прямую мышцу живота в области надчревья для доступа к органам верхней части брюшной полости.

РИ́ДЕЛЯ СТРУ́МА (B. M. K. L. Riedel, 1846—1916, нем. хирург; син.: зоб каменный, зоб фиброзный, Риделя тиреоидит, струма деревянистая, струма твердожелезная, струмит железоподобный, тиреоидит фиброзный) — хронический тиреоидит, характеризующийся первичным разрастанием волокнистой соединительной ткани с вторичной гибелью фолликулярного эпителия щитовидной железы; фиброз может распространяться на окружающие ткани, имитируя злокачественную опухоль.

РИ́ДЕЛЯ ТИРЕОИДИ́Т (B. M. K. L. Riedel, 1846—1916, нем. хирург) — см. *Риделя струма.*

РИ́ДЛИ ОПЕРА́ЦИЯ (N. H. Z. Ridley, род. в 1906 г., англ. офтальмолог) — хирургическая операция: экстракция катаракты с одновременным вставлением на место удаленного хрусталика линзы из органического стекла (акрилата).

РИ́ДЛИ СИНДРО́М (Ridley) — сочетание симптомов острой левожелудочковой недостаточности при атеросклеротическом кардиосклерозе.

РИЕ́ТТИ — ГРЕ́ППИ — МИКЕ́ЛИ БОЛЕ́ЗНЬ (F. Rietti, род. в 1890 г., итал. гематолог; E. Greppi, род. в 1896 г., итал. гематолог; F. Micheli, 1872—1937, итал. врач) — см. *Талассемия малая.*

РИ́ЗА МЕ́ТОД (R. G. Reese, 1866—1926, амер. офтальмолог) — хирургическая операция: устранение птоза путем соединения подкожными швами хряща века с лобной мышцей.

РИ́ЗА СИНДРО́М (A. B. Reese, амер. офтальмолог 20 в.) — см. *Дисплазия энцефалоофтальмическая семейная.*

РИ́ЗА — БЛО́ДИ СИНДРО́М (A. B. Reese, амер. офтальмолог 20 в.; F. D. Blodi, амер. офтальмолог 20 в.) — см. *Дисплазия энцефалоофтальмическая семейная.*

РИЗ- (ризо-) — 1) (греч. rhiza корень, начало, основание) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к корешкам», «относящийся к основанию»; 2) (анат. устар. rhizomelicus ризомелический, относящийся к «кор-

ням конечностей») — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к плечевому и (или) тазобедренному суставу».

РИЗАРТРО́З (rhizarthrosis; *риз- + артроз*; син. артроз ризомелический) — деформирующий артроз с поражением плечевых или тазобедренных суставов.

РИЗО- — см. *Риз-*.

РИЗОМОНОМЕЛОРЕОСТО́З (*ризо-* + греч. monos один + *мелореостоз*) — см. *Мелореостоз*.

РИЗОПЛА́СТ (*ризо-* + греч. plastos сформированный, образованный) — микрофибрилла у простейших, напр. у трихомонад, связывающая основание жгутика с ядром.

РИЗОТОМИ́Я (rhizotomia; *ризо-* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Радикотомия*.

РИ́ККЕНБЕРГА — БРУ́СИНА РЕА́КЦИЯ (H. Rieckenberg, нем. врач 20 в.; А. М. Брусин, род. в 1895 г., сов. врач) — иммунологическая реакция, основанная на феномене фиксации тромбоцитов на поверхности микроорганизма в присутствии иммунной сыворотки и комплемента; предложена для диагностики вшиного возвратного тифа.

РИККЕ́ТСИИ — см. *Rickettsia*.

РИККЕТСИО́З (rickettsiosis; риккетсии + *-оз*) — общее название острых инфекционных болезней, вызываемых риккетсиями, передающимися преимущественно трансмиссивным, а также воздушно пылевым и алиментарным путями.

Q-РИККЕТСИО́З — см. *Ку-лихорадка*.

РИККЕТСИО́З «Д» — см. *Риккетсиоз везикулезный*.

РИККЕТСИО́З БЕРНЕТА — см. *Ку-лихорадка*.

Р. ВЕЗИКУЛЁЗНЫЙ (r. vesiculosa; син.: лихорадка пятнистая Кью-Гардена, оспа риккетсиозная русская, риккетсиоз «Д», Р. осповидный) — природно-очаговый клещевой Р., вызываемый Rickettsia acari (Dermacentroxenus murinus); переносится гамазовыми клещами, характеризуется первичным аффектом, с регионарным лимфаденитом, кратковременной лихорадкой, головной болью, миалгиями, необильной полиморфной макулезно-папулезно-везикулезной сыпью.

Р. ГАМА́ЗОВЫЙ (r. gamasa; биол. Gamasidae сем. клещей) — см. *Гамазориккетсиоз*.

Р. КЛЕЩЕВО́Й (r. acarina) — общее название Р., возбудители к-рых переносятся клещами.

Р. КЛЕЩЕВО́Й АВСТРАЛИ́ЙСКИЙ (r. acarina australiana; син.: тиф клещевой Квинсленда, тиф сыпной клещевой Северного Квинсленда) — клещевой Р., вызываемый Rickettsia australis; характеризуется первичным аффектом с регионарным лимфаденитом, лихорадкой, распространенной папулезно-везикулезной сыпью.

Р. КЛЕЩЕВО́Й АМЕРИКА́НСКИЙ (r. acarina americana) — см. *Лихорадка пятнистая Скалистых гор*.

Р. КЛЕЩЕВО́Й АФРИКА́НСКИЙ (r. acarina africana; син.: лихорадка клещевая восточноафриканская, лихорадка клещевая южноафриканская) — клещевой Р., вызываемый риккетсиями, сходными с возбудителем марсельской лихорадки; характеризуется первичным аффектом с центральным некрозом кожи и регионарным лимфаденитом, распространенной розеолезно-папулезной сыпью; не исключено тождество Р. к. а. с марсельской лихорадкой.

Р. КЛЕЩЕВО́Й БИРОБИДЖА́НСКИЙ — см. *Риккетсиоз клещевой североазиатский*.

Р. КЛЕЩЕВО́Й ПАРОКСИЗМА́ЛЬНЫЙ (r. acarina paroxysmalis) — малоизученный клещевой Р., протекающий приступообразно без сыпи.

Р. КЛЕЩЕВО́Й СЕВЕРОАЗИА́ТСКИЙ (син.: лихорадка клещевая тифозная североазиатская, Р. клещевой биробиджанский, Р. клещевой сибирский, тиф клещевой сибирский, тиф сыпной клещевой, тиф сыпной клещевой североазиатский) — Р., вызываемый Rickettsia sibirica, переносится иксодовыми клещами; характеризуется лихорадкой, первичным аффектом, розеолезно-папулезной сыпью, постепенно распространяющейся по телу.

Р. КЛЕЩЕВО́Й СИБИ́РСКИЙ (r. acarina sibirica) — см. *Риккетсиоз клещевой североазиатский*.

Р. КРЫСИ́НЫЙ — см. *Тиф блошиный эндемический*.

Р. МАРСЕ́ЛЬСКИЙ — см. *Лихорадка марсельская*.

Р. ОСПОВИ́ДНЫЙ (r. variioliformis) — см. *Риккетсиоз везикулезный*.

Р. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНЫЙ (r. paroxysmalis) — см. *Лихорадка окопная*.

RICKÉTTSIA (Ber; риккетсии; H. T. Ricketts, 1871—1910, амер. врач) — род микроорганизмов сем. Rickettsiaceae (порядок Rickettsiales), к-рый объединяет полиморфные, неподвижные, грамотрицательные микроорганизмы, окрашивающиеся по Романовскому — Гимзе; растут на питательных субстратах, содержащих живые (переживающие) клетки, или культивируемые в организме животных; включает возбудителей риккетсиозов человека и животных.

R. ACÁRI (Ber) — вид микроорганизмов рода R.; кокки (часто диплококки), коккобактерии или небольшие палочки, окрашивающиеся по Романовскому — Гимзе в ярко-красный цвет; возбудитель везикулезного риккетсиоза у человека.

R. AUSTRÁLIS (Ber) — вид микроорганизмов рода R.: эллипсовидные небольшие палочки или кокки, окрашивающиеся по Романовскому — Гимзе в красный цвет; возбудитель австралийского клещевого риккетсиоза.

R. CONÓRII (Ber; риккетсия марсельской лихорадки) — вид микроорганизмов II биотипа рода R.: палочковидные или ланцетовидные диплококки, окрашивающиеся по Романовскому — Гимзе в пурпурный цвет; возбудитель марсельской лихорадки.

R. PROWÁZEKII (Bep) — см. *Провацека риккетсия*.

R. RICKÉTTSII (Ber) — вид микроорганизмов II биотипа рода R.: коккобактерии овальной или ланцетовидной формы, располагающиеся парами, окрашивающиеся по Романовскому — Гимзе в голубой цвет; возбудитель пятнистой лихорадки Скалистых гор.

R. TSUTSUGAMÚSHI (Ber) — вид микроорганизмов III биотипа рода R.: диплококки или короткие палочки эллипсовидной формы, окрашивающиеся по Романовскому — Гимзе в пурпурный цвет с темными полюсами; возбудитель цуцугамуши.

R. TYPHI (Ber) — см. *Музера риккетсия*.

РИККЕ́ТСИЯ БЕ́РНЕТА — см. *Бернета риккетсия*.

РИККЕ́ТСИЯ КУ-ЛИХОРА́ДКИ — см. *Бернета риккетсия*.

РИККЕ́ТСИЯ МАРСЕ́ЛЬСКОЙ ЛИХОРА́ДКИ — см. *Rickettsia conorii*.

РИККЕ́ТСИЯ МУ́ЗЕРА — см. *Музера риккетсия*.

РИККЕ́ТСИЯ ПРОВА́ЦЕКА — см. *Провацека риккетсия*.

РИ́ККО ЗАКО́Н (A. Ricco) — правило, согласно к-рому произведение пороговой яркости раздражителя на площадь его изображения на сетчатке есть постоянная величина; справедлив для объектов, изображение к-рых на сетчатке относительно мало.

РИЛИ́ЗИНГ-ГОРМО́НЫ — см. *Либерины*.

РИЛИ́ЗИНГ-ФА́КТОРЫ — см. *Либерины*.

РИ́ЛЯ КЕРАТО́З (G. Riehl, 1855—1943, австрийский дерматолог) — наследственная болезнь, характеризующаяся гиперкератозом ладоней и подошв в виде множественных островков или полос, а также утолщением ногтевых пластинок; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

РИ́ЛЯ МЕЛАНО́З (G. Riehl, син.: меланоз военного времени, Риля меланотический синдром) — меланодермия, характеризующаяся сетчатой гиперпигментацией коричневато-серого цвета, сопровождающейся небольшим фолликулярным гиперкератозом и атрофией эпидермиса на открытых участках кожи; предположительно обусловлен токсическим воздействием углеводородов и (или) повышенной чувствительностью к солнечному свету.

РИ́ЛЯ МЕЛАНОТИ́ЧЕСКИЙ СИНДРО́М (G. Riehl) — см. *Риля меланоз*.

РИ́ЛЯ — ПАЛЬТА́УФА БОРОДА́ВЧАТЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ КО́ЖИ (G. Riehl, 1855—1943, австрийский дерматолог; R. Paltauf, 1858—1924, австрийский патологоанатом) — см. *Туберкулез кожи бородавчатый*.

РИН- (рино-; греч. rhis, rhinos нос) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к носу».

РИ́НГЕРА РАСТВО́Р (S. Ringer, 1835—1910, англ. врач) — изотонический по отношению к крови водный раствор хлорида натрия, хлорида кальция и однозамещенного карбоната натрия, применяемый, напр., как кровезаменитель в экспериментах на животных.

РИ́НГЕРА — ЛО́ККА РАСТВО́Р (S. Ringer, 1835—1910, англ. врач; F. S. Locke, 1871—1949, англ. физиолог) — изотонический по отношению к крови водный раствор хлорида натрия, хлорида кальция, однозамещенного карбоната натрия и глюкозы, применяемый, напр., как кровезаменитель в экспериментах на животных.

РИНИ́Т (rhinitis; *рин- + -ит*; син. насморк) — воспаление слизистой оболочки полости носа.

Р. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ (r. allergica) — Р., развивающийся как аллергическая реакция (чаще при поллинозе), проявляющийся отеком слизистой оболочки и выделением обильного слизистого секрета.

Р. АТРОФИ́ЧЕСКИЙ ПЕРЕ́ДНИЙ (r. atrophica anterior; син. Р. сухой передний) — хронический атрофический Р. с локализацией процесса в передних отделах полости носа, преимущественно в области его перегородки; часто приводит к перфорации перегородки носа.

Р. АТРОФИ́ЧЕСКИЙ ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (r. atrophica chronica; син. насморк дистрофический незловонный) — хронический Р., характеризующийся атрофией слизистой оболочки, реже костной ткани, носовых раковин с образованием вязкого экссудата и корок.

Р. ВАЗОМОТО́РНЫЙ (r. vasomotoria; син.: астма носовая, Р. нейровегетативный, Р. нервно-рефлекторный) — Р., обусловленный нарушением регуляции тонуса кровеносных сосудов, проявляющийся приступами обильного выделения водянисто-слизистого секрета и заложенности носа в связи с набуханием слизистой оболочки.

Р. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (r. haemorrhagica) — Р., сопровождающийся носовыми кровотечениями, напр. при гриппе или дифтерии.

Р. ГИПЕРПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (r. hyperplastica; син.: Р. гиперпластический хронический, Р. гипертрофический хронический) — Р., характеризующийся разрастанием слизистой оболочки, надкостницы и костного вещества носовых раковин; проявляется нарушениями носового дыхания.

Р. ГИПЕРПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (r. hyperplastica chronica) — см. *Ринит гиперпластический.*

Р. ГИПЕРТРОФИ́ЧЕСКИЙ ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (r. hypertrophica chronica) — см. *Ринит гиперпластический.*

Р. ГОНОРЕ́ЙНЫЙ (r. gonorrhoica)— гонококковый Р., характеризующийся обильным гнойным отделяемым, иногда окрашенным кровью, резким отеком и гиперемией слизистой оболочки; встречается чаще у новорожденных в сочетании с бленнореей.

Р. ГРИППО́ЗНЫЙ (r. gripposa) — Р., часто геморрагический, возникающий на 2—3-й день заболевания гриппом; отличается длительным течением, часто осложняется поражением околоносовых пазух.

Р. ДИФТЕРИ́ЙНЫЙ (r. diphtherica) — см. *Дифтерия носа.*

Р. КАТАРА́ЛЬНЫЙ О́СТРЫЙ (r. catarrhalis acuta) — Р., проявляющийся сухостью и резкой гиперемией слизистой оболочки, сменяющимися выделением обильного серозно-слизистого (позже слизисто-гнойного) экссудата и отеком слизистой оболочки.

Р. КАТАРА́ЛЬНЫЙ ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (r. catarrhalis chronica; син. Р. простой) — Р., характеризующийся разлитой застойной гиперемией слизистой оболочки, равномерной припухлостью носовых раковин и проявляющийся периодическим затруднением носового дыхания, расстройством обоняния, выделением обильного слизистого секрета.

Р. ЛЕПРО́ЗНЫЙ (r. leprosa) — Р. при лепроматозном типе леп-ры, характеризующийся гиперемией, сухостью слизистой оболочки, образованием лепром и инфильтратов, к-рые изъязвляются, нередко с разрушением перегородки носа, деформацией наружного носа.

Р. НЕЙРОВЕГЕТАТИ́ВНЫЙ (r. neurovegetativa) — см. *Ринит вазомоторный.*

Р. НЕ́РВНО-РЕФЛЕКТО́РНЫЙ (r. neuroreflectoria) — см. *Ринит вазомоторный.*

Р. ПРОСТО́Й — см. *Ринит катаральный хронический.*

Р. РО́ЖИСТЫЙ (r. erysipelatosa) — Р. в виде рожистого воспаления, развивающийся, как правило, вследствие перехода процесса с кожи лица; проявляется резким покраснением слизистой оболочки с образованием характерных пузырьков, сильной головной болью, высокой температурой тела, подчелюстным лимфаденитом.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЙ ГУММО́ЗНЫЙ (r. syphilitica gummosa) — Р. при сифилисе, характеризующийся образованием гумм с последующей деструкцией хрящевой или костной части перегородки носа, ее перфорацией и деформацией наружного носа.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЙ ПАПУЛЁЗНЫЙ (r. syphilitica papulosa) — Р. при сифилисе, характеризующийся папулезными высыпаниями на слизистой оболочке, к-рые эрозируются и (или) изъязвляются; наблюдается чаще при раннем врожденном сифилисе.

Р. СУХО́Й ПЕРЕ́ДНИЙ (r. sicca anterior) — см. *Ринит атрофический передний.*

Р. ФИБРИНО́ЗНЫЙ О́СТРЫЙ (r. fibrinosa acuta) — Р., при к-ром слизистая оболочка покрывается фибринозными пленками; наблюдается чаще при дифтерии носа.

РИ́ННЕ О́ПЫТ (H. Rinne, 1819—1868, нем. оториноларинголог) — метод дифференциальной диагностики поражений звуковоспринимающего и звукопроводящего аппаратов, основанный на сравнении продолжительности восприятия звука при исследовании костной и воздушной звукопроводимости с помощью камертона C_{128}, переносимого с сосцевидного отростка к наружному слуховому проходу.

РИНО- — см. *Рин-.*

РИНОВИ́РУСЫ (Rhinovirus; *рино-* + *вирус*) — род вирусов сем. пикорнавирусов, вирионы к-рых не имеют наружной оболочки, а геном представлен однонитчатой линейной нефрагментированной молекулой РНК; включает возбудителей острых респираторных заболеваний и ящура.

РИНОГЕ́ННЫЙ (*рино-* + греч. -genēs порождающий, возникающий) — обусловленный патологическим процессом в носу.

РИНОКЛАДИО́З (rhinocladiosis; от устар. названия возбудителя Rhinocladium) — см. *Споротрихоз.*

РИНОЛАЛИ́Я (rhinolalia; *рино-* + греч. lalia речь) — см. *Гнусавость.*

РИНОЛИ́Т (rhinolithus; *рино-* + греч. lithos камень; син. конкремент носовой) — конкремент, образовавшийся в результате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция в слизи, окружающей инородное тело, находившееся длительное время в полости носа.

РИНОМИКО́З (rhinomycosis; *рино-* + *микоз*) — поражение слизистой оболочки полости носа, вызванное паразитическими грибками.

РИНОПАТИ́Я (rhinopathia; *рино-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название аллергического и вазомоторного ринита.

РИНОПЛА́СТИКА (rhinoplastica; *рино-* + *пластика*) — общее название пластических операций восстановления носа или исправления его формы.

Р. ПО ГУСЫНИНУ — см. *Гусынина ринопластика.*

Р. ПО ДИФФЕНБАХУ — см. *Диффенбаха ринопластика.*

Р. ПО ДЬЯКОНОВУ — см. *Дьяконова ринопластика.*

Р. ПО ИВАНО́ВУ — см. *Иванова ринопластика.*

Р. ПО ЙОЗЕФУ — см. *Йозефа ринопластика.*

Р. ПО КЕ́НИГУ — см. *Кенига ринопластика.*

Р. ПО КРАМАРЕ́НКО — см. *Крамаренко ринопластика.*

Р. ПО КЮСТЕРУ — см. *Кюстера ринопластика.*

Р. ПО ЛА́НГЕНБЕКУ — см. *Лангенбека ринопластика.*

Р. ПО ЛЕ́КСЕРУ — см. *Лексера операция.*

Р. ПО НЕЛАТО́НУ — см. *Нелатона ринопластика.*

Р. ПО ПРОСКУРЯКО́ВУ — см. *Проскурякова ринопластика.*

Р. ПО ТАРНОПО́ЛЬСКОМУ — см. *Тарнопольского ринопластика.*

Р. ПО ШИМАНО́ВСКОМУ — см. *Шимановского ринопластика.*

Р. ПО ШИММЕЛЬБУШУ — см. *Шиммельбуша ринопластика.*

Р. ПО ШТЕЙНТАЛЮ — см. *Штейнталя ринопластика.*

РИНОПНЕВМО́МЕТР (*рино-* + греч. pneuma воздух + metreō измерять) — прибор для определения степени проходимости носовых ходов путем измерения давления, к-рое создают путем нагнетания воздуха в нос и отсасывания его из носа.

РИНОРЕ́Я (rhinorrhoea; *рино-* + греч. rhoia течение, истечение) — обильное выделение экссудата слизистой оболочкой полости носа; признак ринита.

РИНОСИНУСИ́Т (rhinosinusitis; *рино-* + анат. sinus пазуха, синус + *-ит*) — сочетанное воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

РИНОСИНУСОПАТИ́Я (rhinosinusopathia; *рино-* + анат. sinus пазуха, синус + греч. pathos страдание, болезнь) — аллергическая болезнь, проявляющаяся приступами ринита, отеком слизистой оболочки и скоплением жидкости в околоносовых пазухах.

РИНОСКЛЕРО́МА (rhinoscleroma; *рино-* + *склерома*) — см. *Склерома.*

РИНОСКОПИ́Я (*рино-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — метод исследования полости носа, заключающийся в осмотре ее стенок.

Р. ЗА́ДНЯЯ (син.: ринофарингоскопия, эпифарингоскопия) — Р. задних отделов полости носа, обычно сочетающаяся с осмотром носоглотки; проводится с помощью носоглоточного зеркала.

Р. ПЕРЕ́ДНЯЯ — Р. передних и средних отделов полости носа; проводится с помощью носового зеркала.

Р. СРЕ́ДНЯЯ — Р. средних (гл. обр., среднего носового хода) и верхних отделов полости носа; проводится с помощью носового зеркала с удлиненными браншами.

РИНОСПОРИДИО́З (rhinosporidiosis) — хронический микоз, вызываемый Rhinosporidium seeberi, характеризующийся образованием полипозных разрастаний на слизистой оболочке носа, гортани, глаз, реже в ушах и в области промежности; при гематогенной диссеминации возбудителя; возможно поражение внутренних органов.

RHINOSPORÍDIUM SÉEBERI — малоизученный паразитический грибок, вызывающий риноспоридиоз.

РИНОСТОМИ́Я (нрк; rhinostomia; *рино-* + греч. stoma отверстие) — см. *Дакриоцисториностомия.*

РИНОФАРИНГИ́Т (rhinopharyngitis; *рино-* + греч. pharynx, pharyngos глотка + *-ит*) — сочетанное воспаление слизистых оболочек полости носа и глотки.

РИНОФАРИНГОСКЛЕРО́МА (rhinopharyngoscleroma; *рино-* + греч. pharynx, pharyngos глотка + *склерома*) — склерома с поражением тканей носа и глотки.

РИНОФАРИНГОСКОПИ́Я (*рино-* + греч. pharynx, pharyngos глотка + skopeō рассматривать, исследовать) — см. *Риноскопия задняя.*

РИНОФИ́МА (rhinophyma; *рино-* + греч. phyma нарост, разбухание; син.: нос винный, нос шишковидный) — хроническое воспаление кожных покровов носа, щек и лба с развитием инфильтратов, на к-рых располагаются узелки ярко-красного цвета и телеангиэктазии.

РИНОФОНИ́Я (rhinophonia; *рино-* + греч. phōnē голос) — см. *Гнусавость.*

РИНОЦИТОСКОПИ́Я (*рино-* + гист. cytus клетка + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — метод диагностики поражений слизистой оболочки полости носа путем микроскопии ее отделяемого.

РИ́О БРА́НКО ДО́СТУП (Rio Branco, совр. бразильский врач) — хирургический доступ к желчным путям, при к-ром рассекают брюшную стенку по белой линии от мечевидного отростка до пупка и затем вправо к переднему концу X ребра.

РИОЛА́НА ДУГА́ (arcus Riolani, J. Riolan, 1580—1657, франц. анатом) — анастомоз между ветвями верхней и нижней брыжеечных артерий в брыжейке поперечной ободочной кишки.

RIPICEPHÁLUS — род клещей сем. иксодовых, отр. паразитиформных; многие виды являются переносчиками или носителями возбудителей ряда инфекционных болезней человека и животных, напр. Ку-лихорадки, марсельской лихорадки, чумы.

R. SANGUÍNEUS — вид клещей рода R., обитающий в степных, предгорных и горных районах (в СССР — на Кавказе, в Крыму, Казахстане и республиках Средней Азии); основной переносчик возбудителей марсельской лихорадки, носитель возбудителей крымской геморрагической лихорадки, клещевого сыпного тифа, Ку-лихорадки, а также чумы.

РИПОФОБИ́Я (rhypophobia; греч. rhypos грязь + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь грязи, нечистот.

РИ́СА СРЕДА́ (C. W. Rees, англ. инфекционист) — жидкая питательная среда для выращивания Balantidium coli, состоящая из мясо-пептонного бульона, изотонического раствора хлорида натрия, лошадиной сыворотки и крахмала.

РИСОВИ́ДНЫЕ ТЕЛА́ (corpora oryzoidea— см. *Рисовидные тельца.*

РИСОВИ́ДНЫЕ ТЕЛЬЦА́ (corpuscula oryzoidea) — 1) (син. рисовидные тела) — микроскопические образования, возникающие в очагах воспаления суставных сумок, сухожильных влагалищ, в полости суставов и состоящие из фибрина и некротизированной грануляционной ткани; 2) (син. Коха линзы) — комочки беловатого или желтоватого цвета, выделяемые с мокротой при кавернозном туберкулезе легких и состоящие из микобактерий туберкулеза, детрита и эластических волокон.

РИ́ССА СИМПТО́М (Riess) — громкие, с металлическим оттенком тоны сердца, выслушиваемые над областью проекции желудка; непостоянный признак спаечного перикардита, обусловленный образованием перикардиально-диафрагмальных и внутрибрюшных сращений.

RIST — см. *Радиоиммуносорбентный тест.*

РИСТОМИЦИ́Н (ristomycinum; син. ристоцеин) — антибиотик, продуцируемый Nocardia fructiferi, var. ristomycini, активный в отношении грамположительных кокков.

РИСТОЦЕЙН — см. *Ристомицин.*

РИТМ БИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ (греч. rhythmos размеренность, ритм) — см. *Биоритм.*

α-РИТМ — см. *Альфа-ритм.*

β-РИТМ — см. *Бета-ритм.*

γ-РИТМ — см. *Гамма-ритм.*

μ-РИТМ — см. *Мю-ритм.*

РИТМ ГАЛО́ПА — аускультативный феномен, заключающийся в наличии экстратона (или экстратонов) сердца.

Р. ГАЛО́ПА ДИАСТОЛИ́ЧЕСКИЙ (син. Р. г. желудочковый) — Р. г., при к-ром экстратоны регистрируют во время диастолы.

Р. ГАЛО́ПА ЖЕЛУ́ДОЧКОВЫЙ — см. *Ритм галопа диастолический.*

Р. ГАЛО́ПА МЕЗОДИАСТОЛИ́ЧЕСКИЙ (греч. mesos средний + *диастола*) — диастолический Р. г., при к-ром экстратон определяется примерно в середине диастолы; сочетание Р. г. с тахикардией свидетельствует о тяжелом поражении миокарда.

Р. ГАЛО́ПА ПРЕДСЕ́РДНЫЙ — см. *Ритм галопа пресистолический.*

Р. ГАЛО́ПА ПРЕСИСТОЛИ́ЧЕСКИЙ (син. Р. г. предсердный) — диастолический Р. г., при к-ром экстратон выслу́шивается перед первым тоном сердца и обусловлен сокращением предсердий; регистрируется при неполной атриовентрикулярной блокаде.

Р. ГАЛО́ПА ПРОТОДИАСТОЛИ́ЧЕСКИЙ (греч. prōton сначала + *диастола*) — диастолический Р. г., при к-ром экстратон определяется в начале диастолы; обусловлен неодновременным захлопыванием клапанов аорты и легочного ствола.

Р. ГАЛО́ПА СИСТОЛИ́ЧЕСКИЙ — Р. г., при к-ром экстратон определяется во время систолы желудочков, обычно вскоре после первого тона; регистрируется при неодновременном сокращении правого и левого желудочков; наблюдается, напр., при нарушениях проводимости в одной из ножек предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса) при спаечном перикардите.

РИТМ КОРОНА́РНОГО СИ́НУСА — форма пассивного гетеротопного автоматизма сердца, при к-рой водителем ритма является участок миокарда, расположенный в непосредственной близости от венечного синуса сердца; диагностируется только электрокардиографически.

РИТМ НОДА́ЛЬНЫЙ (лат. nodus узел) — см. *Ритм сердца атриовентрикулярный.*

РИТМ ОКОЛОСУ́ТОЧНЫЙ — см. *Ритм циркадный.*

РИТМ ПЕ́РЕПЕЛА (син. Боткина ритм перепела) — раздвоение второго тона, выслушиваемое над верхушкой сердца и в точке Боткина — Эрба при сужении левого предсердно-желудочкового отверстия; обусловлен появлением дополнительного тона (щелчка) открытия митрального клапана.

РИТМ РОЛАНДИ́ЧЕСКИЙ — см. *Мю-ритм.*

РИТМ СЕЗО́ННЫЙ — биоритм, скоординированный с периодичностью смены сезонов года.

РИТМ СЕ́РДЦА АРТИФИЦИА́ЛЬНЫЙ — см. *Ритм сердца искусственный.*

РИТМ СЕ́РДЦА АТРИОВЕНТРИКУЛЯ́РНЫЙ (анат. atrium предсердие + ventriculus желудочек; син.: ритм нодальный, ритм сердца узловой, ритм узловой) — аритмия сердца, при к-рой водитель ритма расположен в участке миокарда предсердий или проводящей системы, непосредственно прилежащем к предсердно-желудочковому узлу; проявляется умеренной брадикардией.

РИТМ СЕ́РДЦА ГЕТЕРОТО́ПНЫЙ (греч. heteros другой, иной + topos место; син. ритм сердца эктопический) — ритм сердечных сокращений при гетеротопном автоматизме.

РИТМ СЕ́РДЦА ИДИОВЕНТРИКУЛЯ́РНЫЙ (греч. idios собственный + анат. ventriculus желудочек) — гетеротопный ритм сердца, при к-ром водитель ритма расположен в миокарде желудочков.

РИТМ СЕ́РДЦА ИДИОВЕНТРИКУЛЯ́РНЫЙ УСКО́РЕННЫЙ (син. тахикардия медленная желудочковая) — аритмия сердца, обусловленная патологической циркуляцией возбуждения по миокарду желудочков и характеризующаяся относительно небольшой (60—120 в 1 мин.) частотой сердечных сокращений.

РИТМ СЕ́РДЦА ИСКУ́ССТВЕННЫЙ (син.: ритм сердца артифициальный, ритм сердца навязанный) — ритм сердечных сокращений, возбуждаемых электрическими импульсами, поступающими от электрокардиостимулятора.

РИТМ СЕ́РДЦА МАЯТНИКООБРА́ЗНЫЙ (син.: ритм сердца эмбриональный, эмбриокардия) — аускультативный феномен: практически полное равенство продолжительности систолы и диастолы, а также одинаковая громкость и тембр первого и второго тонов сердца; наблюдается при пароксизмальной тахикардии и правильной форме трепетания предсердий с высокой частотой сокращений желудочков.

РИТМ СЕ́РДЦА МНОГОЧЛЕ́ННЫЙ — ритм галопа, при к-ром выслушиваются два или более экстратона.
РИТМ СЕ́РДЦА НАВЯ́ЗАННЫЙ — см. *Ритм сердца искусственный.*
РИТМ СЕ́РДЦА НОМОТО́ПНЫЙ (греч. nomos закон, норма + topos место)—ритм сердечных сокращений при номотопном автоматизме; у человека и теплокровных животных номотопным является синусовый ритм сердца.
РИТМ СЕ́РДЦА РЕЦИПРО́КНЫЙ (лат. reciprocus возвращающийся; син. эхо-ритм) — нарушение ритма сердечных сокращений, при к-ром возбуждение, возникшее в предсердии или желудочке, вызвав сокращение соответственно желудочков или предсердий, возвращается в тот отдел сердца, где оно возникло, и вызывает его повторное сокращение.
РИТМ СЕ́РДЦА СИ́НУСНЫЙ — см. *Ритм сердца синусовый.*
РИТМ СЕ́РДЦА СИ́НУСОВЫЙ (син. ритм сердца синусный) — ритм сердечных сокращений, при к-ром водителем ритма является синусно-предсердный узел; у человека и теплокровных животных синусовый Р. с. выступает как номотопный ритм сердца.
РИТМ СЕ́РДЦА ТЕРМИНА́ЛЬНЫЙ — общее название ритмов сердечных сокращений, наблюдающихся в терминальном состоянии (напр., фибрилляция и трепетание желудочков).
РИТМ СЕ́РДЦА ТРЕХЧЛЕ́ННЫЙ — ритм галопа, при к-ром выслушивается только один экстратон.
РИТМ СЕ́РДЦА УЗЛОВО́Й — см. *Ритм сердца атриовентрикулярный.*
РИТМ СЕ́РДЦА ЧЕТЫРЕХЧЛЕ́ННЫЙ — многочленный ритм галопа, при к-ром выслушиваются два экстратона.
РИТМ СЕ́РДЦА ЭКТОПИ́ЧЕСКИЙ (греч. приставка ek- вне + topos место)— см. *Ритм сердца гетеротопный.*
РИТМ СЕ́РДЦА ЭМБРИОНА́ЛЬНЫЙ — см. *Ритм сердца маятникообразный.*
РИТМ СУ́ТОЧНЫЙ — биоритм, скоординированный с суточной фотопериодичностью.
РИТМ УЗЛОВО́Й — см. *Ритм сердца атриовентрикулярный.*
РИТМ УСЛО́ВНО-ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ (УФР) — частота половых сношений (2—3 семяизвержения в неделю), условно принятая за нормальную для мужчин зрелого возраста.
РИТМ ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ — общее название биоритмов физиологических процессов в организме.
РИТМ ЦИРКА́ДНЫЙ (лат. circa кругом, вокруг; син.: ритм околосуточный, ритм циркодианный) — биоритм, скоординированный с суточной периодичностью вращения Земли, но регулярно отклоняющийся от 24 часов.
РИТМ ЦИРКОДИА́ННЫЙ — см. *Ритм циркадный.*
РИТМ ЭКЗОГЕ́ННЫЙ — биоритм, обусловленный ритмичным изменением факторов окружающей среды, напр. освещенности, температуры воздуха.
РИТМ ЭНДОГЕ́ННЫЙ — биоритм, обусловленный генетически и сохраняющийся при отсутствии изменений факторов окружающей среды.
РИТМОКАРДИО́ГРАФ (ритм + *кардиограф*) — см. *Кардиотахограф.*
РИТМОКАРДИО́МЕТР (ритм + греч. kardia сердце + metreō измерять) — см. *Кардиотахометр.*
РИ́ТТЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (G. Ritter, 1820—1883, нем. врач) — см. *Дерматит эксфолиативный новорожденных.*
РИ́ТТЕРА — ЯНСЕ́НА ОПЕРА́ЦИЯ (G. Ritter; A. Jansen, 1859—1933, нем. оториноларинголог) — хирургическая операция на лобной пазухе, характеризующаяся доступом через ее глазничную стенку; при высоко расположенной пазухе этот доступ сочетают с доступом через ее переднюю стенку.
РИТУА́Л (лат. ritualis обрядовый; син. символические действия) в психиатрии — простое или сложное движение или действие, выполняемые против воли и вопреки разуму для предотвращения воображаемого несчастья или с целью его преодоления; возникает при наличии фобий, навязчивых сомнений, других навязчивых состояний.
РИ́ТЧИ МЕ́ТОД (L. S. Ritchie, амер. паразитолог) — метод гельминтоовоскопии, основанный на осаждении яиц гельминтов из водной взвеси фекалий путем ее центрифугирования после смешивания с формалином и этиловым эфиром.
РИФАМИЦИ́НЫ — антибиотики, продуцируемые Nocardia mediterranei; активные преимущественно в отношении грамположительных и кислотоустойчивых бактерий.
РИХАНОТРЕПА́Н (истор., син.: сверлоструг, Штолля — Делицина риханотрепан) — режущий инструмент для трепанации черепа, представляющий собой однолезвийный цилиндрический нож.
РИ́ХТЕРА ГРЫ́ЖА (A. G. Richter, 1742—1812, нем. хирург) — ущемленная грыжа живота, при к-рой ущемлению подверглась лишь часть стенки кишки (без брыжейки); проявляется явлениями частичной непроходимости кишечника.
РИ́ХТЕРА НО́ЖНИЦЫ (Richter; син. ножницы изогнутые по ребру) — хирургические ножницы с рабочими концами, изогнутыми под углом 25—30° к оси симметрии инструмента.
РИ́ХТЕРА РАЗРЕ́З (Г. А. Рихтер, род. в 1898 г., сов. хирург) — разрез на внутренней поверхности верхней трети плеча, применяемый в качестве малотравматического доступа к лучевому нерву.
РИ́ЧА ШТАММ ВИ́РУСА (M. A. Rich) — штамм вируса лейкоза мышей, вызывающий у них лимфолейкозы, иногда миелолейкозы.
РИ́ЧАРДСА — РА́НДЛА СИНДРО́М (B. W. Richards, совр. амер. врач; A. T. Rundle, совр. амер. врач) — см. *Кетоацидоурия с умственной отсталостью.*
РИ́ЧАРДСОНА ПРА́ВИЛО — закономерность, согласно к-рой в гомологических рядах наркотических веществ сила наркотического действия возрастает с увеличением числа атомов углерода.
РИ́ЧАРДСОНА ЭНТЕРОСТОМИ́Я (L. Richardson, род. в 1907 г., амер. хирург)— хирургическая операция: формирование наружного свища тонкой кишки путем введения в ее просвет резинового катетера, укрепляемого в стенке кишки кисетным швом; наружный конец катетера выводится через прокол в брюшной стенке.
РИ́ЧМОНДА КОРО́НКА — см. *Ричмонда штифтовой зуб.*
РИ́ЧМОНДА ШТИФТОВО́Й ЗУБ (син. Ричмонда коронка) — штифтовой зуб, снабженный кольцом с надкорневым приспособлением, защищающим канал корня от слюны.
РИШЕ́ — РУ́БНЕРА ПРА́ВИЛО ТЕПЛООТДА́ЧИ (Ch. R.Richet, 1850—1935, франц. физиолог и иммунолог; M. Rubner, 1854—1932, нем. физиолог и гигиенист) — см. *Рубнера закон поверхности тела.*
РИ́ШТА — 1) см. *Дракункулез*; 2) см. *Dracunculus medinensis.*
РНГА — см. *Реакция непрямой гемагглютинации.*
РНК — см. *Рибонуклеиновая кислота.*
иРНК — см. *Рибонуклеиновая кислота информационная.*
мРНК — см. *Рибонуклеиновая кислота информационная.*
рРНК — см. *Рибонуклеиновая кислота рибосомная.*
тРНК — см. *Рибонуклеиновая кислота транспортная.*
РНФ — см. *Реакция нарастания титра фага.*
РОБЕ́НА СИНДРО́М (P. Robin, 1867—1950, франц. педиатр; син. Пьера Робена синдром) — сочетание врожденной гипоплазии нижней челюсти с недоразвитием и западением языка и расщеплением неба, вызывающее затруднения глотания и дыхания.
РОБЕ́НА — МАЖИТО́ СКЛА́ДКА (P. Robin, 1867—1950, франц. педиатр; E. F. Magitot, 1833—1897, франц. стоматолог) — дубликатура слизистой оболочки полости рта у грудного ребенка, расположенная вдоль альвеолярных дуг, облегчающая акт сосания и обеспечивающая при этом герметизацию полости рта.
РО́БЕРТСА ОПЕРА́ЦИЯ (B. Roberts, 1852—1924, амер. хирург) — хирургическая операция, применяемая для устранения птоза, заключающаяся в подшивании к хрящу века мышечного пучка, выкроенного из лобной мышцы.
РО́БЕРТСОНА СИМПТО́М (W. E. Robertson, 1869—1956, амер. врач) — фибриллярные сокращения грудных мышц в области проекции сердца, иногда наблюдаемые в агонии.
РО́БИНОУ МЕ́ТОД (C. F. R. Robinow, совр. канадский бактериолог) — метод окраски ядерных структур бактерий, заключающийся в обработке препаратов децинормальным раствором соляной кислоты при температуре 60° с последующей окраской по Романовскому — Гимзе.
РО́БИНСОНА ГИДРАДЕНО́МА (A. R. Robinson, 1845—1924, амер. дерматолог; син.: железы потовые кистовидные, Робинсона гидроцистома) — аномалия развития выводных протоков потовых желез, характеризующаяся образованием кистозных полостей.
РО́БИНСОНА ГИДРОЦИСТО́МА (A. R. Robinson, 1845—1924, амер. дерматолог) — см. *Робинсона гидраденома.*
РОБИНСО́НА ФИ́СТУЛА (B. E. Робинсон, род. в 1902 г., сов. физиолог) — комбинированная экспериментальная фистула желудка и изолированного желудочка, позволяющая раздельно забирать из них желудочный сок, а в промежутке между опытами возвращать сок из изолированного желудочка в желудок с помощью шунтирующей трубки.

РОБИНСОНА ХВАТАТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС (син. рефлекс хватательный) — физиологический рефлекс у детей в возрасте до 2—3 месяцев: непроизвольное схватывание ребенком предмета, вложенного в его кисть.

РОБИНСОНА — ФУРНЬЕ РУБЦЫ (A. R. Robinson, 1845—1924, амер. дерматолог; J. A. Fournier, 1832—1914, франц. дерматолог; син. Робинсона-Фурнье симптом) — рубцы кожи вокруг рта на месте диффузных папулезных инфильтратов при раннем врожденном сифилисе.

РОБИНСОНА — ФУРНЬЕ СИМПТОМ (A. R. Robinson; J. A Fournier) — см. *Робинсона-Фурнье рубцы*.

РОБСОНА ЭНТЕРОСТОМИЯ (A. W. Mayo-Robson, 1853 — 1933, англ. хирург) — см. *Мейо-Робсона операция*.

РОВСИНГА СИМПТОМ (N. Th. Rovsing, 1862—1927, датский хирург) — усиление боли в области слепой кишки при толчкообразном надавливании в левой подвздошной области, наблюдающееся при остром аппендиците.

РОГ БОКОВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЗАДНИЙ (cornu posterius ventriculi lat., PNA, BNA, JNA) — часть полости бокового желудочка, расположенная в затылочной доле большого мозга.

РОГ БОКОВОГО ЖЕЛУДОЧКА НИЖНИЙ (cornu inferius, PNA, BNA; pars temporalis, JNA) — часть полости бокового желудочка, расположенная в височной доле большого мозга.

РОГ БОКОВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПЕРЕДНИЙ (cornu anterius, PNA, BNA; cornu frontale, JNA) — часть полости бокового желудочка, расположенная в лобной доле большого мозга между прозрачной перегородкой, головкой хвостатого ядра и мозолистым телом.

РОГ МАТКИ РУДИМЕНТАРНЫЙ — недоразвитый отдел двурогой матки.

РОГ СПИННОГО МОЗГА БОКОВОЙ (cornu laterale, PNA) — выступ серого вещества между передним и задним рогами в грудном отделе спинного мозга; содержит ядра симпатической части вегетативной нервной системы.

РОГ СПИННОГО МОЗГА ЗАДНИЙ (cornu posterius medullae spinalis, PNA) — задний выступ серого вещества спинного мозга; содержит ядра, связанные с восходящими и ассоциативными путями.

РОГ СПИННОГО МОЗГА ПЕРЕДНИЙ (cornu anterius medullae spinalis, PNA) — передний выступ серого вещества спинного мозга; содержит двигательные ядра.

РОГАЛЬСКОЙ СИМПТОМ (В. А. Рогальская, сов. хирург) — сглаживание контуров или «отсутствие» головки пястной кости при сгибании кисти в пястно-фаланговом суставе; признак перелома пястной кости.

РОГОВАЯ ОБОЛОЧКА (cornea) — см. *Роговица*.

РОГОВИЦА (cornea, PNA, BNA, JNA; син. роговая оболочка) — передняя прозрачная часть фиброзной оболочки глазного яблока, передняя поверхность к-рой покрыта многослойным плоским эпителием, а задняя — эндотелием.

РОГОВИЦА ГИГАНТСКАЯ — см. *Мегалокорнеа*.

РОГОВИЦА КОНИЧЕСКАЯ — см. *Кератоконус*.

РОГОВИЦА МАЛАЯ — см. *Микрокорнеа*.

РОГОВИЦА ОВАЛЬНАЯ (cornea ovalis) — аномалия развития: роговица, вертикальный диаметр к-рой больше горизонтального.

РОГОВИЧНЫЕ ТЕЛЬЦА — см. *Клетки роговичные*.

РОГОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ — см. *Ороговение*.

РОГОВОЙ СЛОЙ ЭПИДЕРМИСА (stratum corneum, LNH) — поверхностный слой эпидермиса, состоящий из многих рядов ороговевших клеток, содержащих кератин и пузырьки воздуха.

«РОГОВЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» — см. *«Раковые жемчужины»*.

РОД (genus) в биологии — таксономическая категория, объединяющая близкие по происхождению биологические виды.

РОД СМЕРТИ — классификационная категория насильственной смерти: убийство, самоубийство, несчастный случай; определение Р. с. входит в компетенцию правоохранительных органов.

РОДЕНТИЦИДЫ (биол. Rodentia грызуны + лат. caedo убивать; син.: зооциды, ратициды) — вещества, применяемые для истребления грызунов.

РОДЖЕРСА КОСТНЫЙ ШОВ (W. A. Rogers, род. в 1892 г., амер. хирург) — соединение отломков кости серебряной проволокой.

РОДИЛЬНИЦА (puerpera) — женщина в послеродовом периоде.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ — лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания медицинской помощи женщинам и их лечения во время беременности, родов и в послеродовом периоде; в состав Р. д. входят стационар и женская консультация.

РОДИМОЕ ПЯТНО (naevus) — см. *Невус*.

РОДНИЧОК (fonticulus, PNA) — неокостеневший участок свода черепа.

Р. БОЛЬШОЙ (f. major, JNA) — см. *Родничок передний*.

Р. ЗАДНИЙ [f. posterior, PNA; f. occipitalis (minor), BNA; f. minor, JNA; син.: Р. затылочный, Р. малый] — Р., расположенный между затылочной чешуей и теменными костями; закрывается в конце внутриутробного периода или в первые недели после рождения.

Р. ЗАТЫЛОЧНЫЙ (f. occipitalis, BNA) — см. *Родничок задний*.

Р. КЛИНОВИДНЫЙ (f. sphenoidalis, PNA, BNA; f. sphenoideus, JNA; син.: Р. крыловидный, Р. основной) — парный Р., расположенный в месте соединения теменной, лобной, клиновидной и височной костей; закрывается в конце внутриутробного периода или вскоре после рождения.

Р. КРЫЛОВИДНЫЙ — см. *Родничок клиновидный*.

Р. ЛОБНЫЙ (f. frontalis, PNA) — см. *Родничок передний*.

Р. МАЛЫЙ (f. minor, JNA) — см. *Родничок задний*.

Р. ОСНОВНОЙ — см. *Родничок клиновидный*.

Р. ПЕРЕДНИЙ [f. anterior, PNA; f. frontalis (major), BNA; f. major, JNA; син.: Р. большой, Р. лобный, Р. ромбовидный] — Р. ромбовидной формы, расположенный между лобными и теменными костями; закрывается на втором году жизни.

Р. РОМБОВИДНЫЙ — см. *Родничок передний*.

Р. СОСЦЕВИДНЫЙ (f. mastoideus, PNA, BNA, JNA) — парный Р., расположенный между височной, теменной и затылочной костями; закрывается в конце внутриутробного периода или в первые месяцы после рождения.

РОДОВАЯ ГОРЯЧКА — см. *Сепсис послеродовой*.

РОДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (син. родовые силы) — сочетанные сокращения матки и (позже) брюшного пресса во время родов.

Р. Д. ДИСКООРДИНИРОВАННАЯ — Р. д., характеризующаяся расстройством координации и симметричности сокращений разных частей матки.

РОДОВОЗБУЖДЕНИЕ — искусственное вызывание родовой деятельности с помощью лекарственных, в т. ч. гормональных, средств, электростимуляции или механического воздействия.

РОДОВОЙ АКТ — см. *Роды*.

РОДОВОЙ КАНАЛ (canalis parturientis, canalis obstetricus; син. родовые пути) — канал, образуемый костями малого таза и расположенными в нем мягкими тканями, через к-рый перемещается плод в процессе родов.

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ — комплекс медико-социальных и лечебно-профилактических мероприятий, проводимых женщинам во время беременности, в родах и в послеродовом периоде.

РОДОВЫЕ ПУТИ — см. *Родовой канал*.

РОДОВЫЕ СИЛЫ — см. *Родовая деятельность*.

РОДОВЫЕ СХВАТКИ (labores parturientium) — см. *Схватки*.

РОДОПСИН (син. зрительный пурпур) — светочувствительный пигмент фоторецепторов человека и большинства видов животных; представляет собой сложный белок, состоящий из белкового компонента — опсина и небелкового окрашенного в красно-розовый цвет компонента — ретиналя.

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ — искусственное (инструментальное, ручным способом, медикаментозное) завершение родового акта.

РОДОСЛОВНАЯ (син. генеалогия) — описание родственных отношений изучаемого лица, представленное, как правило, в виде схемы с использованием общепринятых условных обозначений.

РОДОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (oxytocica) — лекарственные средства, усиливающие сокращение миометрия и применяемые для стимуляции родовой деятельности (напр., окситоцин).

РОДСТВЕННИКИ КРОВНЫЕ — лица, имеющие хотя бы одного общего предка и, следовательно, обладающие нек-рым количеством идентичных по происхождению аллелей.

РОДСТВЕННЫЙ БРАК (син. инбредный брак) — брак между лицами, имеющими хотя бы одного общего предка.

РОДЫ (partus; син. родовой акт) — физиологический процесс изгнания плода и последа из матки через естественные родовые пути.

Р. БЫСТРЫЕ (p. rapidus) — Р., длительность к-рых составляет от 3 до 5 часов.

Р. ЗАПОЗДАЛЫЕ (p. serotinus) — Р., наступившие после 42-й недели беременности.

Р. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ (p. pathologicus) — Р., при к-рых возникли какие-либо отклонения от нормального течения процесса, обусловлен-

ные, напр., аномалией таза, неправильным вставлением головки, слабостью родовых сил, несвоевременной отслойкой плаценты.

Р. ПРЕЖДЕВРЕ́МЕННЫЕ (p. praematurus) — Р., наступившие между 28-й и 38-й неделями беременности.

Р. ПРЕЖДЕВРЕ́МЕННЫЕ ИСКУ́ССТВЕННЫЕ (p. praematurus artificialis) — Р. п., вызванные каким-либо внешним воздействием с целью прерывания беременности.

Р. САМОПРОИЗВО́ЛЬНЫЕ (p. spontaneus; син. Р. спонтанные) — Р., закончившиеся без медикаментозного или оперативного вмешательства в их течение.

Р. СВОЕВРЕ́МЕННЫЕ — см. *Роды срочные.*

Р. В «СОРО́ЧКЕ» — Р., при к-рых предлежащая часть плода окутана плодными оболочками.

Р. СПОНТА́ННЫЕ — см. *Роды самопроизвольные.*

Р. СРО́ЧНЫЕ (син. Р. своевременные) — Р., наступившие на 39-й или 41-й неделе беременности.

Р. СТРЕМИ́ТЕЛЬНЫЕ (p. praecipitatus) — Р., длительность к-рых составила от 1 до 3 часов.

Р. УПРАВЛЯ́ЕМЫЕ — Р., течение к-рых корригировалось путем оперативного или медикаментозного вмешательства.

РО́ДЫ НЕСОСТОЯ́ВШИЕСЯ — внутриутробная гибель плода при сроке беременности более 28 недель и отсутствии родовой деятельности.

«РО́ДЫ» ПОСМЕ́РТНЫЕ (partus post mortem) — выдавливание плода через родовые пути из матки трупа беременной женщины газами, образовавшимися в брюшной полости при гниении трупа.

РО́ДЫ ПРЕЖДЕВРЕ́МЕННЫЕ УГРОЖА́ЮЩИЕ (partus praematurus imminens) — возникновение нерегулярной родовой деятельности на 28—37-й неделях беременности.

РО́ЖА (erysipelas) — инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком, характеризующаяся четко отграниченным острым воспалением кожи, лихорадкой, явлениями общей интоксикации.

Р. БЛУЖДА́ЮЩАЯ (e. migrans) — см. *Рожа мигрирующая.*

Р. БУЛЛЁЗНАЯ (e. bullosum; син. Р. пузырчатая) — Р., протекающая с образованием эпидермальных пузырей, наполненных серозным экссудатом.

Р. ВТОРИ́ЧНАЯ (e. secundarium; син.: Р. ложная — устар., флегмона рожистая) — Р., возникшая как осложнение нагноившейся раны или другого очага гнойного воспаления.

Р. ГАНГРЕНО́ЗНАЯ (e. gangraenosum) — Р., протекающая с некрозом участков кожи; наблюдается в областях тела, богатых рыхлой подкожной клетчаткой (веки, мошонка), реже как осложнение флегмонозной Р.

Р. ГОРТА́НИ (e. laryngis) — см. *Ларингит рожистый.*

Р. ЛО́ЖНАЯ (устар.; e. spurium) — см. *Рожа вторичная.*

Р. МИГРИ́РУЮЩАЯ (e. migrans; син. Р. блуждающая) — Р., при к-рой стихание воспалительного процесса на первоначально пораженном участке кожи сопровождается его возникновением на других участках кожи.

Р. ПЕРВИ́ЧНАЯ (e. primarium) — Р., возникающая при отсутствии в организме очагов гнойного воспаления.

Р. ПОЛЗУ́ЧАЯ — Р., при к-рой воспалительный процесс постепенно распространяется за пределы первоначальных границ поражения кожи.

Р. ПРИВЫ́ЧНАЯ — см. *Рожа рецидивирующая.*

Р. ПУЗЫ́РЧАТАЯ (e. bullosum) — см. *Рожа буллезная.*

Р. ПУСТУЛЁЗНАЯ (e. pustulosum) — Р., протекающая с образованием эпидермальных пузырей, наполненных гнойным содержимым.

Р. РЕЦИДИВИ́РУЮЩАЯ (e. recurrens; син. Р. привычная) — Р., протекающая в виде повторных вспышек воспалительного процесса, обычно одной и той же локализации, что обусловлено наличием очагов дремлющей инфекции и возникновением специфической сенсибилизации организма.

Р. ФЛЕГМОНО́ЗНАЯ (e. phlegmonosum) — Р., протекающая с развитием флегмоны подкожной клетчатки.

Р. ЭРИТЕМАТО́ЗНАЯ (e. erythematosum) — Р., при к-рой наблюдаются гиперемия и отечность кожи; обычно — начальная стадия развития Р.

«РО́ЖА КАРЦИНОМАТО́ЗНАЯ» (erysipelas carcinomatosum) — асептическое воспаление, внешне напоминающее рожистое, возникающее при поступлении в лимфатические сосуды токсичных веществ, образовавшихся в результате распада белков, напр. при раке.

РО́ЖА СВИНЕ́Й — см. *Эризипелоид.*

РОЖДА́ЕМОСТЬ — демографическая характеристика, отражающая процесс пополнения населения за счет рождения детей; оценивается по коэффициенту Р.

РОЖЕ́ БОЛЕ́ЗНЬ (H. L. Roger, 1809—1891, франц. терапевт; син. Толочинова — Роже болезнь) — врожденный порок сердца: дефект в мышечной части межжелудочковой перегородки, обусловливающий сброс крови из левого желудочка в правый.

РОЖЕ́НИЦА (parturiens) — женщина, у к-рой происходят роды.

РОЖКОВИ́ДНЫЙ БУГОРО́К (tuberculum corniculatum, PNA, BNA, JNA; син. санториниев бугорок) — утолщение задней части черпалонадгортанной складки позади клиновидного бугорка, образующееся за счет расположения в ней одноименного хряща.

РО́ЗА ВЕТРО́В — графическое изображение повторяемости ветров по странам света (румбам) в определенной точке территории; используется в гигиенической практике.

РОЗАНИЛИ́Н — производное анилина, представляющее собой коричневато-красные кристаллы, образующее при воздействии кислот легко растворимые соли; используется в качестве гистологического и гистохимического красителя.

РОЗАНИЛИНБЛА́У (син.: анилиновый синий спирторастворимый, фенилрозанилин) — анилиновый краситель синего цвета, растворимый в спирте и нерастворимый в воде; употребляется в гистологической технике.

РО́ЗАНОВА ОПЕРА́ЦИЯ (В. Н. Розанов, 1872—1934, сов. хирург) — 1) хирургическая операция: рассечение подвздошно слепокишечной складки брюшины с последующим подшиванием конечной части подвздошной кишки к восходящей ободочной кишке; применяется при недостаточности илеоцекального клапана; 2) хирургическая операция: дренирование желудочков мозга лоскутом на ножке из твердой мозговой оболочки; применяется при гидроцефалии.

РОЗА́ЦЕА-БЛЕФАРИ́Т (rosacea-blepharitis) — см. *Блефарит-розацеа.*

РОЗА́ЦЕА-КЕРАТИ́Т (rosacea-keratitis; син. кератит-розацеа) — поражение роговицы при розовых угрях, характеризующееся появлением в ней серовато-белых инфильтратов, к к-рым подходит пучок сосудов в виде треугольника с основанием у лимба.

РОЗА́ЦЕА-КОНЪЮНКТИВИ́Т (rosacea-conjunctivitis) — см. *Конъюнктивит-розацеа.*

РОЗА́ЦЕА-СКЛЕРИ́Т (rosacea-scleritis) — см. *Склерит-розацеа.*

РО́ЗЕ ГЛЮТЕА́ЛЬНЫЙ ФЕНО́МЕН (E. Rose, 1836—1914, нем. хирург) — см. *Розе симптом.*

РО́ЗЕ ГОЛОВНО́Й СТОЛБНЯ́К (E. Rose; син. столбняк лицевой) — клиническая форма столбняка, возникающая при заражении через рану головы или шеи, проявляющаяся параличом лицевого нерва на стороне поражения.

РО́ЗЕ ПОЛОЖЕ́НИЕ (E. Rose) — горизонтальное положение оперируемого на спине с резко откинутой кзади головой; применяется, напр., при операциях в полости рта.

РО́ЗЕ СИМПТО́М (E. Rose; син. Розе глютеальный феномен) — подергивание отдельных мышечных пучков большой ягодичной мышцы при постукивании молоточком по краю крестца; признак поясничнo-крестцового радикулита.

РО́ЗЕ — НА́ЙЛЕНА СИМПТО́М (E. Rose, 1836—1914, нем. хирург; Nylin) — появление нистагма при наклоне головы вперед; признак повышенного внутричерепного давления.

РО́ЗЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (S. Rosen, род. в 1897 г., амер. оториноларинголог) — общее название нек-рых вариантов слухоулучшающих операций при отосклерозе (мобилизация стремени, фенестрация основания стремени).

РОЗЕНБА́ХА ЗАКО́Н (O. Rosenbach, 1851—1907, нем. врач) — закономерность, согласно к-рой при болезнях нервной системы разгибатели поражаются раньше, чем сгибатели.

РОЗЕНБА́ХА РЕА́КЦИЯ (O. Rosenbach) — метод обнаружения билирубина в моче, основанный на появлении желтого окрашивания при взаимодействии с билирубином азотной кислоты, наносимой на пропитанную мочой фильтровальную бумагу.

РОЗЕНБА́ХА СИМПТО́М (O. Rosenbach) — мелкое быстрое дрожание опущенных век; наблюдается при тиреотоксикозе, парезе лицевого нерва, рассеянном склерозе.

РОЗЕНБА́ХА СИНДРО́М (O. Rosenbach) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся приступами пароксизмальной тахикардии, выраженной одышкой, болями в области надчревья и общей слабостью.

РОЗЕНБА́ХА — СЕ́МОНА ЗАКО́Н (O. Rosenbach, 1851—1907, нем. врач; F. Semon, 1849—1921, англ. оториноларинголог) — см. *Семона закон.*

РОЗЕНБЕ́РГА ПРИ́ЗНАК (Н. К. Розенберг, 1876—1933, сов. инфекционист) — см. *Розенберга — Винокурова — Лендорффа симптом.*

РОЗЕНБЕ́РГА — ВИНОКУ́РОВА — ЛЕ́НДОРФФА СИМПТО́М (Н. К. Розенберг, 1876—1933, сов. инфекционист; И. Я. Винокуров, 1863—1928, сов. инфекционист; A. Lehndorff; син. Розенберга признак) — появление энантемы в виде нескольких багрово-красных точечных пятнышек на слизистой оболочке мягкого неба, язычка и передних дужек у больных сыпным тифом на 3-й день болезни.

РОЗЕНГЕ́ЙМА СИМПТО́М (Th. Rosenheim, род. в 1860 г., нем. терапевт)— шум трения брюшины, выслушиваемый в левом подреберье при слипчивом перигастрите.

РОЗЕНМЮ́ЛЛЕРА О́РГАН (J. Ch. Rosenmüller, 1771—1820, нем. анатом и хирург) — см. *Придаток яичника.*

РОЗЕНМЮ́ЛЛЕРА СКЛА́ДКА (J. Ch. Rosenmüller) — см. *Слезная складка.*

РОЗЕНМЮ́ЛЛЕРА Я́МКА (J. Ch. Rosenmüller) — см. *Глоточный карман.*

РОЗЕНМЮ́ЛЛЕРОВ КАРМА́Н (J. Ch. Rosenmüller) — см. *Глоточный карман.*

РОЗЕНТА́ЛЯ ЛЕЙКОДИСТРОФИ́Я (C. Rosenthal, совр. нем. невропатолог и психиатр) — см. *Александера болезнь.*

РОЗЕНТА́ЛЯ ОПЕРА́ЦИЯ (W. Rosenthal, род. в 1884 г., нем. хирург) — пластическая операция при параличе мимических мышц, заключающаяся в подшивании к парализованным мышцам мышечных лоскутов, образованных из височной и жевательной мышц.

РОЗЕНТА́ЛЯ СИНДРО́М (C. Rosenthal, совр. нем. невропатолог и психиатр) — возникающее в виде пароксизмов сочетание ярких зрительных, реже вербальных или тактильных галлюцинаций, аффекта страха и каталептических расстройств, не сопровождающееся помрачением сознания; наблюдается, напр., при нек-рых формах шизофрении.

РОЗЕНШТЕ́ЙНА СПО́СОБ (P. Rosenstein, род. в 1875 г., нем. хирург) — хирургическая операция: пластика мочеиспускательного канала при постгоноройной стриктуре или гипоспадии с использованием слизистой оболочки мочевого пузыря.

РОЗЕНШТРА́УХА — Э́НДЕРА СПО́СОБ (Л. С. Розенштраух, род. в 1918 г., сов. рентгенолог; Л. А. Эндер, сов. рентгенолог) — метод введения газа в средостение при прицельной медиастинографии посредством пункции соответствующего межреберного промежутка с направлением иглы за грудину.

РОЗЕ́ОЛА (roseola; франц. roséole, от лат. rosa роза) — морфологический элемент кожной сыпи, представляющий собой воспалительное пятно небольшого размера (до 1 *см*).

РОЗЕ́ОЛА БРЮШНОТИФО́ЗНАЯ (roseola typhosa) — сыпь при брюшном тифе в виде четко отграниченных розеол, появляющихся в небольшом количестве на 8—10-й день болезни на коже живота и груди.

РОЗЕ́ОЛА СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ (roseola syphilitica; син. сифилид пятнистый) — сыпь при вторичном или третичном сифилисе в виде множественных, как правило, не шелушащихся розеол.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ КРУГОВИ́ДНАЯ (r. syphilitica orbicularis) — Р. с., при к-рой высыпания группируются в виде круга или кольца; наблюдается при рецидивном вторичном сифилисе.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ ЛИВЕДОПОДО́БНАЯ (lividitas racemosa syphilitica) — Р. с., при к-рой высыпания группируются в виде сетки, напоминающей livedo.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ ПРИПОДНИМА́ЮЩАЯСЯ (r. syphilitica elevata) — см. *Розеола сифилитическая уртикарная.*

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ РЕЦИДИ́ВНАЯ (r. syphilitica recidiva) — Р. с. при рецидивном вторичном сифилисе, характеризующаяся малым количеством и относительно крупными размерами пятен, а также тенденцией к их группировке в круги, кольца и дуги.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ СЛИВНА́Я (r. syphilitica confluens) — Р. с., имеющая тенденцию к слиянию пятен.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ ТРЕТИ́ЧНАЯ (r. syphilitica tertiaria; син.: Фурнье третичная розеола, эритема третичная) — Р. с. при третичном сифилисе в виде единичных асимметричных кольцевидных пятен крупных размеров с широким красным ободком.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ УРТИКА́РНАЯ (r. syphilitica urticata; син.: Р. сифилитическая приподнимающаяся, Р. сифилитическая уртикароподобная — нрк) — Р. с., слегка возвышающаяся над уровнем окружающей кожи.

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ УРТИКАРОПОДО́БНАЯ (нрк) — см. *Розеола сифилитическая уртикарная.*

Р. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ ШЕЛУША́ЩАЯСЯ (r. syphilitica desquamativa; син. Р. шелушащаяся) — Р. с. при вторичном сифилисе, отличающаяся незначительным шелушением.

РОЗЕ́ОЛА ТОКСИ́ЧЕСКАЯ (roseola toxica) — сыпь в виде розеол, появляющаяся при токсикодермии и сопровождающаяся зудом и жжением.

РОЗЕ́ОЛА ШЕЛУША́ЩАЯСЯ (roseola desquamativa) — 1) см. *Лишай розовый*; 2) см. *Розеола сифилитическая шелушащаяся.*

РО́ЗЕРА БУЖ (W. Roser, 1817—1888, нем. хирург) — металлический уретральный буж с оливообразным утолщением на рабочем конце.

РО́ЗЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (W. Roser) — пластическая операция при фимозе, заключающаяся в том, что наружный листок крайней плоти рассекают полностью, а из внутреннего листка выкраивают треугольный лоскут, верхушку к-рого подшивают к углу разреза наружного листка.

РО́ЗЕРА СПО́СОБ (W. Roser) — метод бескровного вправления заднего вывиха костей предплечья, при к-ром фиксируют плечо и медленно разгибают предплечье до упора венечного отростка в плечевую кость (т. е. до угла примерно 140°), после чего производят вытяжение предплечья и его сгибание.

РО́ЗЕРА — НЕЛАТО́НА ЛИ́НИЯ (W. Roser, 1817—1888, нем. хирург; A. Nelaton, 1807—1873, франц. хирург; син. Нелатона линия) — линия, проведенная от верхней передней подвздошной ости к седалищному бугру; служит ориентиром при распознавании смещения бедренной кости, поскольку при сгибании бедра под углом 135° большой вертел в норме расположен на этой линии.

РО́ЗОВА НАБО́Р (В. И. Розов, 1877—1960, сов. хирург) — набор хирургических инструментов для пластических операций на сухожилиях кисти и пальцев.

РО́ЗОВА СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШОВ (В. И. Розов) — сухожильный шов, накладываемый с помощью двух нитей, каждую из к-рых одним поперечным стежком укрепляют на одном из отрезков сухожилия, после чего оба ее конца проводят внутриствольно, выводят через плоскость среза и соединяют с соответствующими концами второй нити.

РО́ЗОВА ШИ́НА (В. И. Розов) — приспособление для длительной иммобилизации пальца в положении разгибания ногтевой фаланги при лечении подкожных разрывов сухожилий разгибателей пальцев; представляет собой металлическую пластинку, укрепляемую на кисти полосками липкого пластыря.

РО́ЗЫСК ПОРАЖЁННЫХ (РА́НЕНЫХ) — осмотр территории очага санитарных потерь или района боевых действий с целью обнаружения пораженных (раненых).

РО́ЙЛА — ХА́НТЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (N. D. Royle, умер в 1944 г., австралийский хирург; J. I. Hunter) — хирургическая операция: перерезка межузловых ветвей в поясничном отделе симпатического ствола при резко выраженных спастических параличах.

РОКИТА́НСКОГО ГУМОРА́ЛЬНАЯ ТЕО́РИЯ (истор.; C. Rokitansky, 1804—1878; австрийский патолог) — теория патологии, согласно к-рой причиной болезни является нарушение химического состава крови и других физиологических жидкостей, приводящее к отложению в тканях специфичного для каждого патологического процесса бесструктурного (аморфного) вещества, к-рое, в свою очередь, определяет характер клинических и морфологических проявлений болезни.

РОКИТА́НСКОГО — А́ШОФФА СИ́НУС (C. Rokitansky, 1804—1878, австрийский патолог; L. Aschoff, 1866—1942, нем. патолог) — впячивание слизистой оболочки желчного пузыря между мышечными пучками его стенки; может служить местом локализации возбудителей инфекции.

РОЛА́НДОВ БУГОРО́К (L. Rolando, 1773—1831, итал. анатом) — см. *Тройничный бугорок.*

РОЛА́НДОВА БОРОЗДА́ (L. Rolando) — см. *Борозда центральная.*

РО́ЛЛЕРА ЯДРО́ (Ch. F. W. Roller, 1802—1878, нем. невропатолог и психиатр) — скопление нейронов, расположенное в дорсальной части продолговатого мозга; место окончания нисходящих волокон преддверной части преддверно-улиткового нерва.

РОМА́НО ОПЕРА́ЦИЯ (C. Romano, род. в 1847 г., итал. хирург) — хирургическая операция: устранение лучевой косорукости путем клиновидной резекции периферического конца локтевой кости с последующей фиксацией костных фрагментов шурупами или проволокой.

РОМА́НОВА СИМПТО́М (А. В. Романов, отеч. врач) — боль за грудиной

и в межлопаточной области, усиливающаяся при глотании и запрокидывании головы; признак медиастинита.

РОМАНО́ВСКОГО МЕ́ТОД (Д. Л. Романовский, 1861—1921, отеч. врач) — см. *Романовского — Гимзы окраска.*

РОМАНО́ВСКОГО — ГИ́МЗЫ ОКРА́СКА (Д. Л. Романовский, 1861—1921, отеч. врач; G. Giemsa, 1867—1948, нем. химик и бактериолог; син.: Гимзы окраска, Романовского метод) — метод окраски клеток в мазках и срезах ткани смесью эозина, азура и метиленового синего; ядра окрашиваются в пурпурно-красный цвет, цитоплазма — в синий.

РОМА́ЬИ СИМПТО́М (C. Romaña, бразильский врач; син. синдром окулогландулярный) — одно- или двусторонний конъюнктивит, часто сочетающийся с дакриоциститом, сопровождающийся отеком век и одутловатостью лица; признак американского трипаносомоза, обусловленный проникновением возбудителя через конъюнктиву.

РО́МБЕРГА БОЛЕ́ЗНЬ (M. H. Romberg, 1795—1873, нем. врач) — см. *Гемиатрофия лица прогрессирующая.*

РО́МБЕРГА ПО́ЗА (M. H. Romberg) — поза обследуемого, при к-рой он стоит с плотно сдвинутыми ступнями и вытянутыми вперед руками; используется при исследовании равновесия.

РО́МБЕРГА СИМПТО́М (M. H. Romberg; син. Ромберга феномен) — неустойчивость, пошатывание, тенденция к отклонению или падению в позе Ромберга, к-рые усиливаются при закрытых глазах; признак статической атаксии.

РО́МБЕРГА ФЕНО́МЕН (M. H. Romberg) — см. *Ромберга симптом.*

РОМБОВИ́ДНАЯ ЯМКА (fossa rhomboidea, PNA, BNA, JNA) — углубление на дорсальной поверхности продолговатого мозга и моста, ограниченное нижними, верхними и средними мозжечковыми ножками; является дном IV желудочка.

РО́МХАНЬИ МЕ́ТОД (G. Romhanyi, венгерский патологоанатом) — метод сохранения естественного цвета органов при приготовлении патологоанатомических препаратов, при к-ром в состав фиксирующих жидкостей добавляют никотин и пиридин.

РО́НЫ РЕА́КЦИЯ (P. Rona, род. в 1871 г., нем. химик) — метод определения в сыворотке крови панкреатической липазы, основанный на ее устойчивости к атоксилу, в отличие от липаз, поступающих из других органов и тканей.

РО́ПТРИИ (греч. rhoptron палица, булава) — органоиды у подвижных стадий простейших кл. споровиков в виде ультрамикроскопических утолщенных на концах тяжей у переднего конца клетки; предполагается, что Р. выделяют ферменты, способствующие внедрению паразита в клетку хозяина.

РО́РШАХА ТЕ́СТ (H. Rorschach, 1884—1922, швейц. психиатр) — метод экспериментально-психологического исследования личности, основанный на анализе истолкования испытуемым предъявляемых ему 10 стандартных чернильных пятен различных очертаний.

РО́СКАМА АНГИ́ЙТ (J. Roskam, род. в 1890 г., бельг. гематолог; син. ангиит аллергический диссеминированный) — форма васкулита кожи и слизистых оболочек, сочетающаяся со спонтанными кровоизлияниями и кровотечениями (напр., носовыми), обусловленными конституциональной ломкостью капилляров.

РОСЛА́ВЦЕВА — КО́ЛЕН ЛОКАЛИЗА́ТОР СВЕ́ТО- И ЦВЕТООЩУЩЕ́НИЯ (А. В. Рославцев, 1899—1965, сов. офтальмолог; А. А. Колен, род. в 1893 г., сов. офтальмолог) — прибор для исследования полей зрения (в т. ч. цветового) у лиц, острота зрения к-рых понижена до светоощущения.

РО́ССА И́НДЕКС (R. Ross, 1857—1932, англ. паразитолог) — малярийный индекс, представляющий собой усредненную оценку в баллах увеличения селезенки у обследованных лиц по следующей схеме: селезенка не выступает из-под края реберной дуги — 1, выступает не более чем на 3 пальца — 3, выступает на 4—5 пальцев — 6, выступает более чем на 5 пальцев — 9 баллов.

РО́ССБАХА СИНДРО́М (M. J. Rossbach, 1842—1894, нем. врач) — сочетание периодических приступов болей в надчревной области и рвоты, обусловленное пароксизмальной гиперсекрецией желудка; наблюдается, напр., при язвенной болезни желудка, остром холецистите; ранее рассматривался как самостоятельная нозологическая форма.

РО́ССМАНА ОДНОСТОРО́ННЯЯ ИХТИОЗИФО́РМНАЯ ЭРИТРОДЕРМИ́Я (Rossman) — см. *Ихтиоз односторонний.*

РОССОЛИ́МО НЕВРИ́Т (Г. И. Россолимо, 1860—1928, сов. невропатолог) — форма гипертрофического неврита Дежерина — Сотта, встречающаяся в детском возрасте и характеризующаяся рецидивирующим течением.

РОССОЛИ́МО ПАЛЬЦЕВО́Й РЕФЛЕ́КС (Г. И. Россолимо) — патологический рефлекс: быстрое подошвенное сгибание пальцев стопы в ответ на отрывистый удар по подушечкам пальцев.

РОССОЛИ́МО ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ПРО́ФИЛЬ (истор.; Г. И. Россолимо) — см. *Психологический профиль.*

РОССЬЕ́ ПРИ́ЗНАК (G. Rossier, род. в 1864 г., швейц. врач) — пальпаторно определяемое линейное уплотнение на дне матки после рождения плода; признак отделения плаценты, обусловленный сближением передней и задней стенок матки.

РОСТ в биологии — увеличение массы организма (особи), органа или участка ткани за счет увеличения количества и размеров клеток и неклеточных образований.

Р. АВТОНО́МНЫЙ (син. Р. аллономный) — Р. ткани, происходящий независимо от регуляторных систем организма; характерное свойство опухолей.

Р. АЛЛОНО́МНЫЙ (греч. allos другой, иной + nomos закон) — см. *Рост автономный.*

Р. АППОЗИЦИО́ННЫЙ (лат. appono, appositum прибавлять) — Р., происходящий путем образования новой ткани и наслоения ее на поверхность старой, напр. в мезенхиме, окружающей скелетогенный зачаток.

Р. АТИПИ́ЧЕСКИЙ — Р., в процессе к-рого клетки утрачивают свои исходные (нормальные) морфологические и функциональные признаки.

Р. АУТОХТО́ННЫЙ — Р., при к-ром клетки размножаются в месте их зарождения, напр. при костномозговом кроветворении.

Р. ДЕСТРУКТИ́ВНЫЙ (син.: Р. инвазивный, Р. инфильтративный) — Р., характеризующийся внедрением растущей ткани в окружающие органы и ткани, разрушением их структуры и нарушением их функций; характерен для злокачественных опухолей.

Р. ИНВАЗИ́ВНЫЙ — см. *Рост деструктивный.*

Р. ИНТЕРСТИЦИА́ЛЬНЫЙ (син. Р. интуссусцепционный) — Р., происходящий изнутри ткани; характерен, напр., для хряща.

Р. ИНТУССУСЦЕПЦИО́ННЫЙ (лат. intus изнутри, внутри + suscipio, susceptum принимать) — см. *Рост интерстициальный.*

Р. ИНФИЛЬТРАТИ́ВНЫЙ — см. *Рост деструктивный.*

Р. МУЛЬТИЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ (лат. multus множественный + центр) — Р., при к-ром размножение клеток ткани происходит на многих отдельных ее участках.

Р. ЭКЗОФИ́ТНЫЙ (греч. exō вне, снаружи + phyton нечто вырастающее) — Р. опухоли, при к-ром она прорастает на поверхность органа, в к-ром возникла, чаще — на внутреннюю поверхность полого органа.

Р. ЭКСПАНСИ́ВНЫЙ — Р. ткани, при к-ром она оттесняет и сдавливает окружающие ткани; характерен для доброкачественных опухолей.

Р. ЭНДОФИ́ТНЫЙ (греч. endon внутри + phyton нечто вырастающее) — Р. опухоли, при к-ром она распространяется вглубь пораженного органа, напр. в стенку полого органа.

РОСТКО́ВЫЙ СЛОЙ ЭПИДЕ́РМИСА (stratum cambiale; син. мальпигиев слой) — слой эпидермиса кожи, за счет деления клеток к-рого происходит регенерация и рост эпидермиса; включает весь базальный слой и часть клеток шиповатого слоя.

РОСТОМЕ́Р — прибор для измерения длины тела человека в положении стоя (всей длины) или сидя (без длины нижних конечностей).

РОСТРА́ЛЬНЫЙ БУГОРО́К (tuberculum rostrale, JNA) — см. *Бугорок таламуса передний.*

РОТ (os) — 1) см. *Полость рта*; 2) см. *Ротовое отверстие.*

РОТ КЛЕ́ТОЧНЫЙ — см. *Цитостом.*

РОТ ПЕРВИ́ЧНЫЙ — см. *Бластопор.*

«РОТ РЫБИЙ» — патоморфологический вариант ревматического сужения левого предсердно-желудочкового отверстия, при к-ром створки клапана утолщены по краям и спаяны между собой на значительном протяжении, в связи с чем он имеет воронкообразную форму.

РО́ТА АППАРА́Т (A. Roth) — приспособление для размещения и стандартного равномерного освещения таблиц, применяемых для определения остроты зрения; представляет собой открытый спереди неглубокий ящик, снабженный укрепленным на стойке осветителем и зеркалами на боковых стенках.

РО́ТА МЕДИЦИ́НСКОГО УСИЛЕ́НИЯ (истор.) — см. *Отдельная рота медицинского усиления.*

РО́ТА ПЯ́ТНА (M. Roth, 1839—1914, швейц. патолог) — белые участки в центре кровоизлияний в сетчатку при анемической ретинопатии.
РО́ТА СИМПТО́М (В. К. Рот, 1848—1916, отеч. невропатолог) — см. *Симптом куртки, полукуртки.*
РО́ТА — БЕ́РНГАРДТА БОЛЕ́ЗНЬ (В. К. Рот, 1848—1916,отеч. невропатолог; M. Bernhardt, 1844—1915, нем. невропатолог) — см. *Meralgia paraesthetica.*
РОТАВИ́РУСЫ (Rotavirus) — род вирусов сем. реовирусов (Reoviridae), включающий виды, патогенные для человека, напр. вызывающие вирусную диарею.
РОТА́МЕТР (англ. rotameter) — прибор для измерения расхода жидкости или газа, представляющий собой вертикальную коническую трубку с находящимся внутри нее поплавком, устанавливаемую на пути движения по трубопроводу измеряемого вещества; входит в состав нек-рых аппаратов и приборов медицинского назначения.
РОТА́ЦИЯ (лат. rotatio круговое движение) в физиологии — движение конечности или ее части вокруг продольной оси.
РО́ТБЕРГЕРА СРЕДА́ (истор.; C. J. Rothberger, род, в 1871 г., нем. бактериолог) — плотная питательная среда с нейтральным красным, предназначавшаяся для дифференциации брюшнотифозной и кишечной палочки по способности восстанавливать этот краситель.
РО́ТБЕРГЕРА ТЕО́РИЯ (C. Rothberger) — представление, согласно к-рому мерцательная аритмия и фибрилляция желудочков сердца обусловлены быстрой импульсацией множественных эктопических очагов возбуждения в миокарде.
РО́ТМАННА — МАКА́И СИНДРО́М (M. Rothmann, 1868—1915, нем. врач; E. Makaï, род. в 1894 г., венгерский хирург) — см. *Ротманна — Макаи спонтанный панникулит.*
РО́ТМАННА — МАКА́И СПОНТА́ННЫЙ ПАННИКУЛИ́Т (M. Rothmann; E. Makaï; син. Ротманна — Макаи синдром) — вариант ненагнаивающегося рецидивирующего лихорадящего панникулита, характеризующийся отсутствием лихорадки и быстрой инволюцией узлов без рубцовой атрофии жировой ткани.
РО́ТМУНДА ДИСТРОФИ́Я (A. J. Rothmund, 1830—1906, нем. офтальмолог) — см. *Ротмунда синдром.*
РО́ТМУНДА СИНДРО́М (A. J. Rothmund; син. Ротмунда дистрофия) — наследственно обусловленное сочетание пойкилодермии лица и конечностей, двусторонней катаракты, дистрофии волос, ногтей и зубов с гипогонадизмом, нарушениями эндохондрального окостенения, артериосклерозом, малым ростом; развивается в раннем детском возрасте.
РО́ТНЫЙ МЕДИЦИ́НСКИЙ ПОСТ (РМП) — место для оказания медицинской помощи санитарным инструктором роты в оборонительном бою и временного укрытия пораженных до эвакуации из расположения роты.
РОТОВА́Я О́БЛАСТЬ (regio oralis, PNA, BNA, JNA; син. область рта) — область лица, ограниченная сверху горизонтальной линией, проведенной через основание перепончатой части перегородки носа, снизу подбородочно-губной бороздой, с боков носогубными бороздами.
РОТОВА́Я ПО́ЛОСТЬ (cavum oris) — см. *Полость рта.*
РОТОВА́Я ПО́ЛОСТЬ ПЕРВИ́ЧНАЯ — узкая щель на головном конце зародыша, ограниченная пятью отростками жаберных дуг (непарным лобным и парными верхне- и нижнечелюстными).
РОТОВА́Я ЧАСТЬ ГЛО́ТКИ (pars oralis pharyngis, PNA, BNA, JNA; син.: мезофаринкс, ротоглотка) — средняя часть глотки (между уровнями твердого неба и верхнего края надгортанника), сообщающаяся с полостью рта через зев.
РОТОВА́Я ЩЕЛЬ (rima oris) — см. *Ротовое отверстие.*
РОТОВА́Я Я́МКА (stomodaeum; син. стомодеум) — эктодермальное впячивание на переднем конце тела зародыша, к к-рому прилегает слепо замкнутый передний конец кишечной трубки; место образования ротового отверстия.
РОТОВО́Е ОТВЕ́РСТИЕ (rima oris, PNA, BNA, JNA; син.: рот, ротовая щель) — наружное отверстие полости рта, ограниченное губами.
РОТОГЛО́ТКА — см. *Ротовая часть глотки.*
РО́ТОРА СИНДРО́М (A. B. Rotor, филиппинский терапевт; син. гипербилирубинемия идиопатическая типа Rotor) — наследственная гипербилирубинемия, характеризующаяся умеренно повышенным содержанием связанного билирубина в крови и повышенным выделением копропорфирина с мочой при отсутствии других изменений печени; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.
РОТОРАСШИ́РИТЕЛЬ — инструмент для разведения челюстей и удержания рта открытым при осмотре и лечебных манипуляциях.
РО́ТЧА ПРИ́ЗНАК (Th. M. Rotch, 1848—1914, амер. педиатр) — смещение абсолютной сердечной тупости вправо от грудины в пятом межреберье; симптом экссудативного перикардита.
РО́У МЕ́ТОД (J. H. Roe) — метод определения в крови фруктозы, сахарозы и других кетосахаров, основанный на их способности давать красно-коричневое окрашивание при нагревании с резорцином и концентрированной соляной или серной кислотой.
РО́ФА РЕЗЕ́КЦИЯ (R. Roof) — хирургическая операция при сколиозе, заключающаяся в резекции половины дужки и поперечного отростка и в клиновидной резекции большей части тела позвонка.
РО́ША — ЛЕРИ́ ЛИПОМАТО́З (M. Roch, 1878—1967, швейц. врач; A. Léri, 1875—1930, франц. невропатолог; син. липоматоз симметричный ограниченный) — форма липоматоза, характеризующаяся образованием единичных или множественных симметрично расположенных липоматозных узлов в подкожной клетчатке бедер, плеч, живота и области поясницы.
РОШЕ́ ОПЕРА́ЦИЯ (V. Rochet, 1860—1934, франц. хирург-уролог) — пластическая операция при гипоспадии, заключающаяся в формировании из кожи мошонки трубки, имплантируемой на нижней поверхности полового члена.
РОЭ — см. *Реакция оседания эритроцитов.*
РПГА — см. *Реакция непрямой гемагглютинации.*
РСК — см. *Реакция связывания комплемента.*
РТ — см. *Температура результирующая.*
РТГА — см. *Реакция торможения гемагглютинации.*
РТУ́ТНО-КВА́РЦЕВАЯ ЛА́МПА (нрк) — см. *Лампа ультрафиолетового излучения.*
РТУ́ТНО-НАКА́ЛЬНАЯ ЛА́МПА — источник видимого, инфракрасного и ультрафиолетового излучения, состоящий из ртутной трубчатой горелки и вольфрамовой спирали, заключенных в колбу из увиолевого стекла; применяется для светолечения.
РТУТЬ (Hydrargyrum; Hg) — химический элемент II группы периодической системы Д. И. Менделеева, ат. номер 80, ат. масса 200,59; серебристый жидкий металл; Р. и многие ее соединения токсичны для человека.
РТУТЬ РАДИОАКТИ́ВНАЯ — общее название радиоактивных изотопов ртути с массовыми числами от 189 до 205 и периодом полураспада от долей секунды до 130 суток; нек-рые изотопы используются с диагностической целью.
РУ ГАСТРОЭНТЕРОСТОМИ́Я (C. Roux, 1857—1934, швейц. хирург; син. Ру резекция желудка) — модификация резекции желудка по способу Бильрот-II, при к-рой производят поперечное рассечение тощей кишки, ее отводящий конец вшивают в заднюю стенку культи желудка и образуют анастомоз «конец в бок» между приводящей и отводящей петлями кишки.
РУ ГРЫЖЕСЕЧЕ́НИЕ (C. Roux, 1857—1934, швейц. хирург) — хирургическая операция при паховой грыже, заключающаяся в удалении грыжевого мешка и укреплении передней стенки пахового канала (без его вскрытия) путем подшивания апоневроза наружной косой мышцы и подлежащих мышц в виде складки к паховой связке; применяется при начинающихся косых паховых грыжах, гл. обр. у детей.
РУ ПРИ́НЦИП (W. Roux, 1850—1924, нем. анатом и эмбриолог) — принцип, согласно к-рому направление дифференцирования тканей зародыша зависит от их прямого контакта друг с другом.
РУ РЕЗЕ́КЦИЯ ЖЕЛУ́ДКА (C. Roux, 1857—1934, швейц. хирург) — см. *Ру гастроэнтеростомия.*
РУ ЭЗОФАГОПЛА́СТИКА (C. Roux, 1857—1934, швейц. хирург) — см. *Ру — Герцена операция.*
РУ — ГЕ́РЦЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (C. Roux, 1857—1934, швейц. хирург; П. А. Герцен, 1871—1947, сов. хирург; син. Ру эзофагопластика) — хирургическая операция: создание искусственного пищевода из тонкой кишки, проводимой перед грудиной подкожно.
РУБА́ШКИНА — МАКСИ́МОВА СПО́СОБ (В. Я. Рубашкин, 1876—1932, сов. гистолог; А. А. Максимов, 1874—1928, отеч. гистолог) — способ приготовления гистологических препаратов, заключающийся в последовательном приклеивании серии срезов ткани на одно предметное стекло, предварительно смазанное яичным белком с глицерином.
РУБЕО́З ДИАБЕТИ́ЧЕСКИЙ (rubeosis diabetica; лат. rubeo быть красным, краснеть + *-оз*) — покраснение кожи в

области скул и подбородка у больных сахарным диабетом, обусловленное расширением кровеносных сосудов.

РУБЕ́Ц (РУБЦЫ́) (cicatrix; син. ткань рубцовая — нрк) — плотное образование, состоящее из гиалинизированной, богатой коллагеновыми волокнами соединительной ткани, возникающее в результате репаративной регенерации, как исход воспалительного процесса.

Р. АТРОФИ́ЧЕСКИЙ (с. atrophica) — Р. кожи, образующийся на месте каких-либо элементов сыпи, не сопровождавшейся возникновением дефекта кожи; относится к вторичным морфологическим элементам сыпи.

Р. БЕРЕ́МЕННОСТИ — см. *Striae gravidarum.*

Р. ГЛИО́ЗНЫЙ (с. glialis) — Р., образующийся в исходе мелкоочаговых поражений нервной ткани и обусловленный пролиферацией глиальных клеток.

Р. ГЛИОМЕЗЕНХИ́МНЫЙ (с. gliomesenchymalis) — Р., образующийся в исходе крупноочаговых поражений нервной ткани (напр., очаг размягчения, гумма) и обусловленный пролиферацией как глиальных, так и соединительнотканных элементов.

Р. КЕЛО́ИДНЫЙ (с. keloidea) — см. *Келоид ложный.*

Р. МОЗАИ́ЧНЫЙ (с. mosaica) — пестроокрашенный Р., возникающий на месте бугорковых сифилидов.

Р. ПОСЛЕОСПЕ́ННЫЙ (с. post variolam veram) — Р. округлой формы, образующийся на месте глубокой пустулы при натуральной оспе.

Р. ПОСТИНФА́РКТНЫЙ (с. post infarctum) — Р., образующийся на месте инфаркта какого-либо органа.

РУБЦЫ́ РО́БИНСОНА — ФУРНЬЕ́ — см. *Робинсона — Фурнье рубцы.*

Р. ШТАМПО́ВАННЫЕ — округлые вдавленные Р. кожи одинакового размера, образующиеся на месте бугоркового высыпания.

РУБИВИ́РУСЫ (Rubivirus) — род РНК-содержащих вирусов сем. тогавирусов, к к-рому относится патогенный для человека вирус краснухи.

РУБИ́ДИЙ РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов рубидия с массовыми числами от 79 до 97 и периодом полураспада от 80 сек. до $5 \cdot 10^{10}$ лет; нек-рые изотопы используются с диагностической целью.

РУБИНСТАЙНА — ТЕ́ЙБИ СИНДРО́М (J. H. Rubinstein, род. в 1925 г., амер. педиатр; H. Taybi, род. в 1919 г., амер. рентгенолог)— сочетание карликовости и олигофрении с гипертелоризмом, асимметрией лица, клювовидным носом, аномальным прикусом, гиперметропией, астигматизмом, характерным укорочением и утолщением больших пальцев кистей и стоп, а нередко и с другими аномалиями развития скелета и внутренних органов.

РУ́БНЕРА ЗАКО́Н ИЗОДИНАМИ́И (M. Rubner, 1854—1932, нем. физиолог и гигиенист) — положение, согласно к-рому белки, жиры и углеводы, поступающие в организм, могут в определенных пределах заменять друг друга в качестве источника энергии в соответствии с их энергетической ценностью.

РУ́БНЕРА ЗАКО́Н ПОВЕ́РХНОСТИ ТЕ́ЛА (M. Rubner; син.: закон поверхности тела, Рише — Рубнера правило теплоотдачи) — правило, согласно к-рому интенсивность обмена энергии у теплокровных животных прямо пропорциональна площади поверхности тела; применяется для ориентировочных расчетов обмена энергии.

РУБОМИЦИ́Н (rubomycinum) — антибиотик, продуцируемый Streptomyces coeruleorubidus, обладающий противоопухолевым действием.

РУ́БРО- (лат. ruber красный; анат. nucleus ruber красное ядро)— составная часть сложных слов, означающая: 1) «красный»; 2) «относящийся к красному ядру».

РУБРОМИКО́З (rubromycosis; *рубро- + микоз*) — см. *Руброфития.*

РУБРОСПИНА́ЛЬНЫЙ ПУТЬ (tractus rubrospinalis) — см. *Красноядерно-спинномозговой путь.*

РУБРОФИТИ́Я (rubrophytia; син. рубромикоз) — высококонтагиозный дерматомикоз, вызываемый трихофитоном (Trichophyton rubrum), чаще поражающий ногти и кожу кистей и стоп.

РУБЦЕВА́НИЕ (cicatrisatio) — процесс созревания грануляционной ткани, заканчивающийся образованием рубца; морфологически характеризуется уменьшением числа сосудов и клеточных элементов, образованием фиброцитов и коллагеновых волокон.

РУ́ДА СИНДРО́М (E. Rud, датский врач 20 в.) — *Олигофрения ксеродермическая.*

РУДАКО́ВА МЕ́ТОД (А. В. Рудаков, сов. акушер-гинеколог) — метод определения срока беременности от 28 до 40 недель и веса плода с помощью специальной таблицы по произведению двух величин: расстояния от дна матки до верхнего края лобкового симфиза и поперечного размера матки на уровне пупка, измеренных сантиметровой лентой по поверхности живота.

РУДЖЕ́РИ РЕФЛЕ́КС (R. Ruggeri, род. в 1905 г., итал. врач) — физиологический рефлекс: замедление пульса при конвергенции глаз.

РУ́ДЖИ ОПЕРА́ЦИЯ (G. Ruggi, 1844—1925, итал. хирург) — грыжесечение при бедренной грыже, производимое с вскрытием пахового канала разрезом выше и параллельно паховой связке и, после удаления грыжевого мешка, ушиванием грыжевых ворот швами, соединяющими паховую и верхнюю лобковую связки.

РУДИМЕ́НТ (лат. rudimentum зачаток, начальная ступень) — см. *Орган рудиментарный.*

РУДИМЕНТА́РНЫЙ (rudimentarius; от лат. rudimentum зачаток, начальная ступень) — остаточный, недоразвитый, сохраняющийся в зачаточном состоянии.

РУ́ДИНА ОПЕРА́ЦИЯ (В. В. Рудин, род. в 1849 г., отеч. офтальмолог) — блефарорафия с удалением эпителия свободных краев век.

РУ́ДНЕВА МЕ́ТОД ВАКЦИНОТЕРАПИ́И (Г. П. Руднев, 1899—1970, сов. инфекционист) — метод введения лечебной вакцины, при к-ром назначенную дозу делят на две части (подготавливающую и разрешающую) и вводят больному внутривенно с интервалом в 1,5—2 часа; применяется, напр., при лечении бруцеллеза.

РУЖЕ́ КЛЕ́ТКА (Ch. M. B. Rouget, 1824—1904, франц. физиолог) — см. *Перицит.*

РУЖЕ́-НЕЙМАННОВСКАЯ ОБОЛО́ЧКА (Ch. M. B. Rouget, 1824—1904, франц. физиолог; E. Neumann, 1834—1918, нем. патолог; син.: влагалище пограничное, пограничный матрикс, руже-нейманновское влагалище)— участок основного вещества кости, окружающий остеоцит и его отростки.

РУЖЕ́-НЕЙМАННОВСКОЕ ВЛАГА́ЛИЩЕ (Ch. M. B. Rouget; E. Neumann) — см. *Руже-нейманновская оболочка.*

РУ́ИТЕРА АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ АРТЕРИОЛИ́Т (M. Ruiter, совр. голландский дерматолог; син. Руитера аллергический васкулит кожи) — инфекционно-аллергический васкулит кожи, возникающий при нек-рых инфекционных болезнях и характеризующийся поражением мелких сосудов дермы; проявляется высыпаниями в виде пузырей, пустул, узелков (иногда с некрозом) и геморрагическими пятнами.

РУ́ИТЕРА АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ ВАСКУЛИ́Т КО́ЖИ (M. Ruiter) — см. *Руитера аллергический артериолит.*

РУКА́ — см. *Конечность верхняя свободная.*

РУКА́ ЗАУЭРБРУХА — см. *Зауэрбруха рука.*

РУКА́ КРУ́КЕНБЕРГА — см. *Крукенберга рука.*

РУКА́ МАГНИ́ТНАЯ — см. *Автоматическое хватание.*

РУКА́ МОРВА́НА — см. *Морвана синдром.*

РУКА́ ПРА́ЧКИ — мацерация кожи кистей трупа в виде резкого сморщивания и побеления эпидермиса, развивающаяся на 2-е — 3-и сутки нахождения трупа в воде.

РУКА́ ТАЛАМИ́ЧЕСКАЯ — положение руки, при к-ром предплечье согнуто и пронировано, а кисть согнута, сочетающееся с атетозоподобными движениями согнутых в пястно-фаланговых суставах пальцев, приводящими к возникновению меняющихся вычурных поз кисти; признак поражения таламуса.

РУКОЯ́ТКА ГРУДИ́НЫ (manubrium sterni, PNA, BNA, JNA) — верхняя, самая широкая часть грудины, сочленяющаяся с ключицами и двумя первыми парами ребер.

РУМИНА́ЦИЯ (ruminatio; лат. «пережевывание»; син. мерицизм) — многократное пережевывание периодически проглатываемой и произвольно отрыгиваемой пищи; наблюдается при нек-рых психических расстройствах.

РУМИНА́ЦИЯ ПСИХИ́ЧЕСКАЯ (ruminatio mentalis; лат. ruminatio пережевывание, повторение) — навязчивое состояние в виде многократного или постоянного появления в сознании больного одних и тех же мыслей.

РУ́МПЕЛЯ РЕЗЕ́КЦИЯ КАРДИ́И (Th.Rumpel, 1862—1923, нем. хирург)— хирургическая операция: резекция кардиальной части желудка и абдоминальной части пищевода с последующим наложением эзофагогастроанастомоза; предложена для лечения кардиоспазма.

РУ́МПЕЛЯ — ЛЕ́ЕДЕ СИМПТО́М (Th. Rumpel, 1862—1923, нем. хирург; C. S. Leede, род. в 1882 г., амер. врач)— см. *Кончаловского — Румпеля — Лееде симптом.*

РУ́МПФА СИМПТО́М (H. Th. M. Rumpf, род. в 1851 г., нем. врач) — 1) мышечная фибрилляция и тонические сокращения мышц после внезапного прекращения раздражения сильным фара-

дическим током, наблюдающиеся при коммоционных неврозах; 2) учащение пульса при надавливании на болевую точку, наблюдающееся у нек-рых больных неврастенией.

РУ́НГЕ О́ПЫТ (H. Runge, род. в 1887 г., нем. оториноларинголог)— метод диагностики нарушения подвижности стремени в овальном окне (анкилоз стремени), основанный на том, что при анкилозе стремени заполнение слухового прохода водой не отражается на продолжительности восприятия звучания камертона, установленного на сосцевидном отростке больного.

РУ́ПИЯ (rupia; от лат. rupes скала или от греч. rhypos грязь, нечистоты) — многослойная кровянисто-гнойная корка, покрывающая язву.

РУ́ПИЯ СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ (rupia syphilitica; син. сифилид пустулезный рупиоидный) — пустулезный сифилид в виде язвы, покрытой многослойной коркой; локализуется чаще на конечностях.

РУПТУ́РА (ruptura; лат. «разрыв) — см. *Разрыв.*

РУСАКО́ВА КАРБО́ЛОВЫЙ СПИРТ (А. В. Русаков, 1885—1953, сов. патологоанатом) — 2% раствор карболовой кислоты в 96% этиловом спирте, применяемый в гистологической практике в качестве заменителя абсолютного спирта.

РУСАКО́ВА НЕСОВЕРШЕ́ННЫЙ ДЕСМОГЕНЕ́З (А. В. Русаков) — см. *Десмогенез несовершенный.*

РУСАКО́ВА НЕСОВЕРШЕ́ННЫЙ ХОНДРОГЕНЕ́З (А. В. Русаков) — см. *Хондрогенез несовершенный.*

РУСАКО́ВА ПА́ЗУШНАЯ РЕЗО́РБЦИЯ КО́СТИ (А. В. Русаков) — см. *Резорбция кости пазушная.*

РУСАКО́ВА ФЕНО́МЕН (А. В. Русаков) — засасывание воздуха в брюшинную полость при ее вскрытии; наблюдается, напр., при алиментарной дистрофии, травматическом истощении.

РУСА́НОВА ПРО́БА (С. А. Русанов, род. в 1902 г., сов. хирург) — способ функциональной оценки достаточности коллатерального кровоснабжения конечности, при к-ром сопоставляют длительность активных движений кисти или стопы больного до и во время сдавления магистрального сосуда.

РУСЕ́ЦКОГО КАЧА́ТЕЛЬНЫЙ ТИП КОЛЕ́ННОГО РЕФЛЕ́КСА (Russetzky) — см. *Рефлекс коленный маятникообразный.*

РУ́СИНА ПРИ́ЗНАК (Я. И. Русин, сов. акушер-гинеколог) — возможность при бимануальном исследовании сблизить тело матки с шейкой; ориентировочный признак беременности, наблюдаемый при антефлексии матки.

РУ́ССЕЛЕВСКИЕ ТЕЛЬЦА́ (W. Russell, 1852—1940, шотл. врач) — см. *Фуксинофильные тельца.*

РУ́ССЕЛЯ КРЮЧКОВИ́ДНЫЙ ПУЧО́К [fasciculus uncinatus (Russell)] — см. *Мозжечково-ядерный путь.*

РУССИ́ — ЛЕРМИ́ТТА — ШЕЛЬВЕ́НА СИНДРО́М (G. Roussy, 1874—1948, франц. невропатолог и патологоанатом; J. J. Lhermitte, 1877—1959, франц. невропатолог; Schelven) — сочетание тетраплегии или нижней параплегии с нарушением проприоцептивной чувствительности при сохранности болевой и температурной чувствительности, а также с расстройством координации движений (атаксия, асинергия); наблюдается при повреждении задних рогов и столбов спинного мозга.

РУ́ССКИЙ ЗАМО́К (син. Склифосовского русский замок) — способ соединения костных отломков путем создания на одном из них паза прямоугольной формы, а на другом соответствующего этому пазу шипа с их последующим соединением и фиксацией; применяется, напр., при лечении ложных суставов.

РУССО́ РЕНТГЕ́НОВСКИЙ АППАРА́Т (Ц. Я. Руссо, сов. рентгенолог) — устройство для стереорентгеноскопии, состоящее из рентгеновского аппарата с двумя попеременно включающимися рентгеновскими трубками и экрана для просвечивания, перед к-рым расположены два металлических диска с вырезами; в результате вращения дисков синхронно с переключением трубок на экране быстро сменяются изображения, составляющие стереопару.

РУСТИ́ЦКОГО БОЛЕ́ЗНЬ (О. А. Рустицкий) — см. *Болезнь миеломная.*

РУСТИ́ЦКОГО — КА́ЛЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (О. А. Рустицкий; O. Kahler, 1849—1893, австрийский терапевт)— *Болезнь миеломная.*

РУТЕНБУ́РГА ОПЕРА́ЦИЯ (Д. М. Рутенбург, сов. оториноларинголог) — радикальная операция уха с доступом через наружный слуховой проход; отличается формой разреза, значительно улучшающий ориентацию во время операции.

РУ́ТТИНА ОПЕРА́ЦИЯ (E. Ruttin, 1880—1940, австрийский оториноларинголог) — 1) хирургическая операция при атрезии перепончато-хрящевого отдела наружного слухового прохода, заключающаяся в том, что ниже места прикрепления ушной раковины к коже пришивают разрезанную вдоль и распластанную резиновую трубку, затем участок кожи, соединенный с трубкой, отделяют от окружающих тканей, через заушный разрез удаляют стенозирующие ткани и в просвет слухового прохода вводят трубку вместе с пришитой к ней кожей; через несколько дней трубку удаляют; 2) хирургическая операция при оттопыренных ушных раковинах, заключающаяся в иссечении кожи между двумя дугообразными разрезами, один из к-рых соответствует краю ушной раковины, а другой — переходной складке, а также участка кожи задней поверхности ушной раковины, после чего сшивают края раны.

РУФФИ́НИ ТЕЛЬЦА́ (A. Ruffini, 1864—1929, итал. анатом) — инкапсулированные чувствительные нервные окончания вытянутой формы, расположенные в соединительной ткани кожи.

РУЧНО́Е ВЫДЕЛЕ́НИЕ ПЛАЦЕ́НТЫ — см. *Ручное отделение плаценты.*

РУЧНО́Е ОБСЛЕ́ДОВАНИЕ МА́ТКИ (examinatio uteri manualis) — акушерская операция, заключающаяся в ревизии стенок матки рукой, введенной в ее полость; применяется, напр., при подозрении на задержку частей плода или разрыв матки, при гипотоническом кровотечении.

РУЧНО́Е ОТДЕЛЕ́НИЕ ПЛАЦЕ́НТЫ (separatio placentae manualis; син. ручное выделение плаценты) — акушерская операция, заключающаяся в отделении плаценты от стенок матки рукой, введенной в полость матки, с последующим удалением последа; производится при кровотечении, обусловленном плотным прикреплением плаценты.

РФ — см. *Ревматоидный фактор.*

РЫ́БЫ (Pisces) — общее название двух классов водных позвоночных, дышащих жабрами, обладающих конечностями в виде плавников, двухкамерным сердцем и непостоянной температурой тела; многие Р. употребляются в пищу; нек-рые Р. являются промежуточными хозяевами гельминтов, патогенных для человека; существуют ядовитые Р.

Р. ЯДОВИ́ТЫЕ — Р., имеющие ядовитые вещества во внутренних органах (напр., мурены, кузовок) или в секретах наружных желез (напр., скорпены).

РЫ́БЫ-ЗМЕ́ЙКИ — см. *Дракончики морские.*

РЫ́БЫ-СОБА́КИ — см. *Иглобрюхие.*

РЫВЛИНА АНЕСТЕЗИ́Я (Я. Б. Рывлин) — способ регионарной анестезии, при к-ром раствор анестезирующего вещества вводят в вену конечности дистальнее наложенного жгута.

РЫ́ЖИХА МЕ́ТОД (А. Н. Рыжих, 1897—1967, сов. хирург) — метод оперативного лечения хронического парапроктита, при к-ром после вскрытия и дренирования гнойника иссекают его внутреннее отверстие через прямую кишку.

РЭС — см. *Система макрофагов.*

РЮ́ЛЬФА ИНТЕНЦИО́ННАЯ СУ́ДОРОГА (J. Rülf, нем. врач 20 в.) — гиперкинез в виде тонической судороги, возникающей в мышцах конéчности при неожиданном движении и переходящей в общий судорожный припадок без потери сознания; наблюдается как самостоятельная наследственная болезнь или проявление поражения центральной нервной системы иной этиологии.

РЮМКЕ PRAECOX GEFÜHL (H. C. Rümke, нем. психиатр; лат. praecox скороспелый, ранний; нем. Gefühl чувство, ощущение; син. praecox Gefühl) — метод диагностики шизофрении, основанный не на анализе отдельных симптомов, а на опыте врача, «особом чутье болезни» и интуиции, возникающих у него в непосредственном общении с больным.

РЮО́ТТА ОПЕРА́ЦИЯ (P. Ruotte, род в 1862 г., франц. хирург) — хирургическая операция для создания оттока транссудата при асците, заключающаяся во вшивании центрального конца пересеченной большой подкожной вены бедра в отверстие, образованное в париетальной брюшине.

С

СА́АРМЫ СИМПТО́М (Saarma) — отсутствие речевых реакций у больного при попытке вступить с ним в общение, сменяющееся появлением речи при прекращении общения с ним, напр. при разговоре окружающих между собой; проявление психического негативизма.

САБАНЕ́ЕВА АМПУТА́ЦИЯ (И. Ф. Сабанеев, род. в 1856 г., отеч. хирург) — костно-пластическая ампутация бедра с закрытием поверхности распила бедренной кости клиновидным трансплантатом на сухожильно-мышечной ножке, взятым из переднего отдела бугристости большеберцовой кости.

САБАНЕ́ЕВА ГАСТРОСТОМИ́Я (И. Ф. Сабанеев) — хирургическая операция: создание наружного свища желудка путем выведения на переднюю брюшную стенку трубки, сформированной из лоскута передней стенки желудка во всю ее толщину.

САБАТИ́ СИМПТО́М (Sabathie) — набухание яремных вен при медиастинальном синдроме, обусловленное затруднением оттока крови через верхнюю полую вену.

САБРАЗЕ́ СИМПТО́М (J. E. Sabrazès, 1867—1943, франц. патологоанатом) — боль в области подвздошно-крестцового сочленения, возникающая при закидывании ноги на ногу в положении больного сидя; наблюдается при остром сакроилеите.

САБУРО́ ПЕПТО́ННЫЙ АГА́Р (R. J. A. Sabouraud, 1864—1938, франц. дерматолог) — плотная питательная среда для культивирования паразитических грибков, преимущественно возбудителя фавуса Achorion schönleini; содержит 1% пептона, 4% мальтозы или глюкозы и 1,5—1,8% агара.

САБУРО́ СИНДРО́М (R. J. A. Sabouraud; син. Сабуро — Приера — Тренеля синдром) — наследственно обусловленное сочетание аномалии развития волос (монилетрикса), фолликулярного кератоза и катаракты; развивается в раннем детском возрасте.

САБУРО́ СРЕ́ДЫ . (R. J. A. Sabouraud) — селективные питательные среды для выращивания патогенных грибков, дрожжей и ацидофильных бактерий, а также для длительного хранения их культур.

САБУРО́ — ПРИЕРА — ТРЕНЕ́ЛЯ СИНДРО́М (R. J. A. Sabouraud, 1864—1938, франц. дерматолог; M. Prieur, род. в 1885 г., франц. офтальмолог; M. Trenél, 1866—1932, франц. врач) — см. *Сабуро синдром.*

САВИНЫ́Х ГАСТРОЭЗОФАГОСТОМИ́Я (А. Г. Савиных, 1888—1963, сов. хирург) — хирургическая операция: наложение анастомоза между дном желудка и левой поверхностью нижней части пищевода с одновременной ваготомией; производится трансабдоминально при широком сагиттальном рассечении диафрагмы и перерезке ее левой ножки.

САВИНЫ́Х ДИАФРАГМОТОМИ́Я (А. Г. Савиных) — оперативный доступ к нижней трети пищевода и кардиальной части желудка: лапаротомия, пересечение печеночно-диафрагмальной связки от купола диафрагмы до пищевода и ножек диафрагмы; применяется для мобилизации нижней части пищевода и кардии при их резекции по поводу рака.

САВИ́ЦКОГО МЕ́ТОД (Н. Н. Савицкий, род. в 1892 г., сов. терапевт) — см. *Тахиосциллография.*

САВЧЕ́НКО ПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ (Н. Е. Савченко, род. в 1922 г., сов. хирург-уролог) — пластическая операция при гипоспадии, заключающаяся в формировании мочеиспускательного канала из кожного лоскута, выкроенного на уретральной поверхности полового члена.

САГАЛО́ВИЧА МЕ́ТОД (Б. М. Сагалович, род. в 1923 г., сов. оториноларинголог) — метод дифференциальной диагностики проводниковой и рецепторной тугоухости, основанный на феномене восприятия человеком ультразвука при его проведении через кость.

САГИТТА́ЛЬНЫЙ (sagittalis; от лат. sagitta стрела) в анатомии — расположенный в переднезаднем (дорсовентральном) направлении.

САГИТТА́ЛЬНЫЙ СИ́НУС ВЕ́РХНИЙ (sinus sagittalis superior, PNA, BNA, JNA; син. стреловидный синус верхний) — непарный синус твердой мозговой оболочки, расположенный на своде черепа в одноименных бороздах лобной, теменных и затылочной костей, идущий от слепого отверстия на внутренней поверхности лобной кости до синусного стока; в С. с. в. впадают верхние вены лобных, теменных и затылочных долей большого мозга.

САГИТТА́ЛЬНЫЙ СИ́НУС НИ́ЖНИЙ (sinus sagittalis inferior, PNA, BNA, JNA; син. стреловидный синус нижний) — непарный синус твердой мозговой оболочки, расположенный в нижнем крае серпа большого мозга и впадающий в прямой синус; в С. с. н. впадают вены мозолистого тела и медиальные вены полушарий большого мозга.

СА́ГОВЫЕ ЗЁРНА — см. *Симпексия.*

САДИ́ЗМ (sadismus; по имени франц. писателя маркиза de Sade, 1740—1814; син. альголагния активная) — половое извращение, при к-ром половое удовлетворение достигается в процессе причинения партнеру физической боли.

САДОМАЗОХИ́ЗМ — половое извращение в виде сочетания проявлений садизма и мазохизма.

СА́ЗМЕНА СИМПТО́М (S. Suzman, совр. англ. кардиолог) — появление пульсации межреберных артерий и артерий спины при сильном наклоне стоящего больного; признак коарктации аорты, обусловленный ее сдавлением.

СА́ЙМА ВЫЧЛЕНЕ́НИЕ СТОПЫ (J. Syme, 1799—1870, шотл. хирург) — хирургическая операция: ампутация голени на уровне середины лодыжек или чуть выше хрящевой поверхности голеностопного сустава с сохранением подошвенно-пяточного лоскута кожи.

САЙТ (англ. site местоположение, участок) — точка на хромосоме или на хромосомной карте, соответствующая локализации мутации или хромосомного диска.

САКАГУ́ТИ РЕА́КЦИЯ (T. Sakaguchi) — метод выявления гуанидиновой группы атомов, основанный на ее способности образовывать комплекс красного цвета в щелочной среде в присутствии гипобромида калия; применяется при анализе белков и определении ферментативной активности трансамидиназ.

САККУЛОТОМИ́Я (sacculotomia; анат. sacculus сферический мешочек + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие сферического мешочка перепончатого лабиринта; применяется гл. обр. при болезни Меньера.

САКР- (сакро-; анат. os sacrum крестец) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к крестцу».

САКРАЛИЗА́ЦИЯ (sacralisatio; анат. sacralis крестцовый) — аномалия развития: уподобление V поясничного позвонка по форме I крестцовому, сопровождающееся их частичным или полным срастанием.

САКРО- — см. *Сакр-.*

САКРОДИНИ́Я (sacrodynia; *сакр-* + греч. odynē боль) — боль в области крестца, чаще возникающая при резких движениях или поднятии тяжестей; наблюдается при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника или спондилолистезе на уровне V поясничного позвонка.

САКРОИЛЕ́ЙТ (sacroileitis; *сакро-* + анат. os ilium подвздошная кость + *-ит*) — воспаление крестцово-подвздошного сочленения.

САКТОСА́ЛЬПИНКС (sactosalpinx; греч. saktos наполненный, начиненный + анат. salpinx маточная труба) — скопление жидкости (экссудата, крови) в маточной трубе с образованием ложной опухоли.

СА́ЛИ ЕДИНИ́ЦА (истор.; H. Sahli, 1856—1933, швейц. врач) — единица измерения концентрации гемоглобина в крови по методу Сали; 1 С. е. соответствует 0,167 *г*% (1,67 *г/л*) гемоглобина.

СА́ЛИ МЕ́ТОД (H. Sahli) — колориметрический метод определения концентрации гемоглобина в крови, основанный на образовании окрашенного в бурый цвет солянокислого гематина при взаимодействии гемоглобина с децинормальным раствором соляной кислоты.

САЛИВА́РИЯ (Salivaria) — группа трипаносом млекопитающих, включающая виды, передаваемые через муху це-це при ее укусе, в т. ч. возбудителей африканского трипаносомоза у человека.

САЛИВА́ЦИЯ (лат. salivatio слюноотделение) — см. *Слюноотделение.*

САЛИВОГЛАНДУЛЁЗ ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ (salivoglandulosis epidemica; анат. glandulae salivares слюнные железы; син.: паротит хронический рецидивирующий, паротит хронический эссенциальный) — вирусная болезнь, характеризующаяся значительным увеличением околоушных и, реже, подчелюстных желез без заметного ухудшения общего состояния больного.

САЛИВОГРАФИ́Я (лат. saliva слюна + греч. graphō писать, изображать) — см. *Сиалография.*

САЛИ́НГА АМНИОСКО́П (E. Saling, род. в 1925 г., нем. гинеколог; син. Залинга амниоскоп) — эндоскопический прибор для осмотра передних околоплодных вод, представляющий собой вводимую в канал шейки матки трубку конической формы с мандреном, снабженную источником света (лампой накаливания) на внешнем конце.

САЛИУРЕ́З (saliuresis; лат. sal соль + греч. urēsis мочеиспускание) — см. *Салиурия.*

САЛИУРИ́Я (saliuria; лат. sal соль + греч. uron моча; син.: салиурез, салурия) — избыточное выведение солей с мочой.

САЛООТДЕЛЕ́НИЕ — процесс выделения кожного сала сальными железами.

САЛУРЕ́ТИКИ [saluretica; лат. sal соль + *(ди)уретики*] — мочегонные средства, усиливающие выведение из организма ионов натрия и хлора (напр., дихлотиазид, фуросемид, этакриновая кислота).

САЛУРИ́Я (saluria; лат. sal соль + греч. uron моча) — см. *Салиурия.*

САЛЬМОНЕ́ЛЛА ПАРАТИ́ФА А — см. *Salmonella paratyphi.*

САЛЬМОНЕ́ЛЛА ПАРАТИ́ФА В — см. *Salmonella schottmuelleri,*

САЛЬМОНЕ́ЛЛА ПАРАТИ́ФА С — см. *Salmonella hirschfeldii.*

SALMONÉLLA (Ber; сальмонеллы; D. E. Salmon, 1850—1914, амер. патолог) — род бактерий сем. Enterobacteriaceae, объединяющий грамотрицательные, как правило, подвижные палочки, не образующие спор и капсул, не ферментирующие сахарозу и лактозу; аэробы или факультативные анаэробы; нек-рые виды являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллезов.

S. CHOLERAESÚIS — бактерия рода S., обнаруживаемая при чуме свиней; является возбудителем вторичного сальмонеллеза; может вызывать пищевые токсикоинфекции у человека.

S. ENTERÍTIDIS — см. *Гертнера палочка.*

S. HIRSCHFÉLDII (Ber; син.: палочка паратифа С, сальмонелла паратифа С) — бактерия рода S., образующая на агаре белые гладкие блестящие колонии; возбудитель паратифа С.

S. PARATÝPHI (Ber; син.: палочка паратифа А, сальмонелла паратифа А) — бактерия рода S., образующая на агаре круглые прозрачные колонии, не разлагающая ксилозу; возбудитель паратифа А.

S. SCHÖTTMÜELLERI (Ber; син.: палочка паратифа В, сальмонелла паратифа В, Шоттмюллера бактерия)— бактерия рода S., образующая на агаре круглые голубовато-серые прозрачные колонии; возбудитель паратифа В.

S. TÝPHI — см. *Палочка брюшнотифозная.*

S. TYPHIMÚRIUM — см. *Палочка мышиного тифа.*

САЛЬМОНЕЛЛЁЗ (salmonellosis; *сальмонелла* + *-оз*) — острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella (кроме брюшного тифа и паратифов), попадающими в организм человека с пищевыми продуктами животного происхождения (гл. обр. с мясом, зараженным прижизненно, а также при убое, хранении или кулинарной обработке); протекает в форме острого гастрита, гастроэнтерита или гастроэнтероколита, реже в форме септикопиемии; возможно длительное носительство.

САЛЬМОНЕ́ЛЛЫ — см. *Salmonella.*

САЛЬНИК БОЛЬШО́Й (omentum majus, PNA, BNA, JNA; epiploon) — дупликатура брюшины, спускающаяся с большой кривизны желудка, покрывающая петли тонкой кишки и сращенная с поперечной ободочной кишкой.

САЛЬНИК МАЛЫЙ (omentum minus, PNA, BNA, JNA) — дупликатура брюшины, идущая от нижней поверхности печени к малой кривизне желудка и двенадцатиперстной кишке.

САЛЬНИКОВАЯ ЛЕ́НТА ТО́ЛСТОЙ КИШКИ́ (tenia omentalis, PNA, BNA, JNA) — полоса продольных мышц, по ходу к-рой к поперечной ободочной кишке прикреплен большой сальник.

САЛЬНИКОВАЯ СУ́МКА (bursa omentalis, PNA, BNA, JNA) — часть брюшинной полости, расположенная позади желудка и малого сальника между диафрагмой и брыжейкой поперечной ободочной кишки.

САЛЬНИКОВОЕ ОТВЕ́РСТИЕ [foramen epiploicum (omentale), PNA; син. Винслоу отверстие] — отверстие, соединяющее сальниковую сумку с брюшинной полостью, ограниченное сверху хвостатой долей печени, спереди печеночно-двенадцатиперстной, сзади печеночно-почечной и снизу почечно-двенадцатиперстной связками.

САЛЬНИКОВОЕ УГЛУБЛЕ́НИЕ ВЕ́РХНЕЕ [recessus superior omentalis, PNA, BNA; recessus cranialis (bursae omentalis), JNA; син.: сальниковый карман верхний, углубление сальниковой сумки краниальное] — часть сальниковой сумки, прилегающая к хвостатой доле печени.

САЛЬНИКОВОЕ УГЛУБЛЕ́НИЕ НИ́ЖНЕЕ [recessus inferior omentalis, PNA, BNA; recessus caudalis (bursae omentalis), JNA; син.: сальниковый карман нижний, углубление сальниковой сумки каудальное] — часть сальниковой сумки, расположенная между пилорической частью желудка и поджелудочной железой.

САЛЬНИКОВЫЙ БУГО́Р (tuber omentale, PNA, BNA, JNA) — 1) выступ на передней поверхности поджелудочной железы вблизи места соединения ее тела с головкой; прилежит к сальниковой сумке; 2) возвышение на висцеральной поверхности хвостатой доли печени, обращенное в полость сальниковой сумки.

САЛЬНИКОВЫЙ КАРМА́Н ВЕ́РХНИЙ — см. *Сальниковое углубление верхнее.*

САЛЬНИКОВЫЙ КАРМА́Н НИ́ЖНИЙ — см. *Сальниковое углубление нижнее.*

САЛЬПИНГ- (сальпинго-; греч. salpinx, salpingos труба) — составная часть сложных слов, означающая: 1) относящийся к маточной трубе; 2) относящийся к слуховой (евстахиевой) трубе.

САЛЬПИНГИ́Т (salpingitis; *сальпинг-* + *-ит*) — воспаление маточной трубы; нередко приводит к ее зарощению.

САЛЬПИНГО- — см. *Сальпинг-.*

САЛЬПИНГОГРАФИ́Я (*сальпинго-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография маточных труб после заполнения их контрастным веществом.

САЛЬПИНГОЛИ́ЗИС (salpingolysis; *сальпинго-* + греч. lysis развязывание, освобождение) — хирургическая операция: восстановление проходимости маточных труб.

САЛЬПИНГОМАНИПУЛЯ́ТОР УШНО́Й (*сальпинго-* + *манипулятор*) — эндоскопический прибор для осмотра, бужирования и продувания глоточного устья слуховой (евстахиевой) трубы, а также введения в нее лекарственных средств под контролем зрения.

САЛЬПИНГООТИ́Т (salpingootitis; *сальпинго-* + греч. us, otos ухо + *-ит*) — см. *Тубоотит.*

САЛЬПИНГООФОРИ́Т (salpingoophoritis; *сальпинго-* + анат. oophoron яичник + *-ит*) — см. *Аднексит.*

САЛЬПИНГОСКО́П (истор.; *сальпинго-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — см. *Отосальпингоскоп.*

САЛЬПИНГОСКОПИ́Я (*сальпинго-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — метод исследования слуховой (евстахиевой) трубы путем осмотра ее стенок с помощью отосальпингоскопа, введенного через полость носа или рта.

САЛЬПИНГОСТОМАТОМИ́Я (salpingostomatomia; *сальпинго-* + греч. stoma отверстие + tomē разрез, рассечение) — см. *Сальпингостомия.*

САЛЬПИНГОСТОМАТОПЛА́СТИКА (salpingostomatoplastica; *сальпинго-* + греч. stoma, stomatos отверстие + *пластика*) — см. *Сальпингостомия.*

САЛЬПИНГОСТОМИ́Я (salpingostomia; *сальпинго-* + греч. stoma отверстие; син.: сальпингостоматомия, сальпингостоматопластика) — хирургическая операция: создание отверстия в маточной трубе, соединяющего ее полость с брюшной полостью; производится при атрезии брюшного отверстия маточной трубы с целью восстановления ее проходимости.

С. ПО ЗЕ́ЛЛЬГЕЙМУ — см. *Зельгейма сальпингостомия.*

С. ПО МА́РТИНУ — см. *Мартина сальпингостомия.*

САЛЬПИНГЭКТОМИ́Я (salpingectomia; *сальпинг-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление маточной трубы, напр. при пиосальпинксе, туберкулезном сальпингите, трубной беременности.

САЛЬТА́ЦИЯ (лат. saltatio пляска) — 1) спонтанно возникающая вариация или мутация; 2) внезапное возникновение нового популяционного типа или таксономической единицы из генетически сильно видоизмененных особей.

СА́ЛЮС — ГУННА I (R. Salus, род. в 1877 г., чешский офтальмолог; R. M. Gunn, 1850—1909, англ. офтальмолог) — начальная степень выраженности симптома Салюса — Гунна, при к-рой наблюдается только сужение вены.

СА́ЛЮС — ГУННА II (R. Salus, R. M. Gunn) — вторая степень выраженности симптома Салюса — Гунна, при к-рой наблюдается сужение и дугообразное смещение вены в месте перекреста с артерией.

СА́ЛЮС — ГУННА III (R. Salus, R. M. Gunn) — крайняя степень выраженности симптома Салюса — Гунна, при к-рой вена в месте перекреста с артерией становится невидимой (как бы разорванной), вследствие ее смещения в глубь сетчатки.

СА́ЛЮСА — ГУ́ННА СИМПТО́М (R. Salus; R. M. Gunn; син.: Рельмана—

Гунна — Салюса симптом, феномен патологического артериовенозного перекреста) — сужение вены сетчатки, а затем ее смещение в более глубокие слои сетчатки в месте перекреста с артерией, обусловленное давлением напряженной и уплотненной стенки артерии на вену; наблюдается при офтальмоскопии у больных гипертонической болезнью или атеросклерозом; степень выраженности С.— Г. с. обозначают как Салюс—Гунн I, II или III.

САМО́А — см. *Аластрим.*

САМОВНУШЕ́НИЕ (син. аутосуггестия) — внушение, направленное на какие-либо стороны собственной психической деятельности (мышление, аффекты, волевые процессы), а также на нек-рые функции нервной системы и внутренних органов; может быть причиной ряда патологических явлений при неврозах и психопатиях, напр. парезов, нарушений походки, воображаемой беременности; С. используется при аутогенном тренинге.

САМОДЕ́ГАЗА́ЦИЯ — см. *Дегазация естественная.*

САМО́Е ЗА́ДНЕЕ ПО́ЛЕ (area postrema, PNA, JNA) — участок ромбовидной ямки, расположенный кзади и латерально от треугольника блуждающего нерва; в пределах поля частично проецируются ядра блуждающего нерва.

САМОИЗВОРО́Т ПЛОДА́ (versio spontanea) — самопроизвольное исправление запущенного поперечного положения плода.

САМОИЗВОРО́Т ПЛОДА́ ПО ДУ́ГЛАСУ — см. *Дугласа самоизворот плода.*

САМО́ЙЛОВА ПРО́БА (А. Я. Самойлов, род. в 1897 г., сов. офтальмолог; син. пилокарпиновая скотометрическая проба) — диагностическая проба, основанная на уменьшении размеров слепого пятна при глаукоме после инстилляции в глаз 1% раствора пилокарпина.

САМО́ЙЛОВА — ВЕ́НКЕБАХА ПЕРИО́ДЫ (А. Ф. Самойлов, 1867—1930, сов. физиолог; K. F. Wenckebach, 1864—1940, голландский врач; син. Венкебаха периоды) — повторяющиеся периоды сердечной деятельности, в течение к-рых происходит нарастающее с каждым сердечным циклом увеличение времени проведения импульса возбуждения в каком-либо отделе проводящей системы, достигающее степени полного перерыва проведения, после чего проводимость временно улучшается и описанный процесс повторяется; чаще всего С.-В. п. наблюдают на уровне синусно-предсердного и предсердно-желудочковых узлов.

САМОКОНТРО́ЛЬ в спортивной медицине — наблюдение спортсмена или физкультурника за своим самочувствием в процессе занятий, сопровождаемое измерением ряда простых показателей (веса тела, частоты пульса, силы мышц и др.).

САМОЛЁТ-ЛАБОРАТО́РИЯ в авиационной медицине — самолет, оборудованный регистрирующей аппаратурой для записи параметров полета, движений органами управления самолетом, нек-рых физиологических функций членов экипажа; применяется для исследования деятельности летчика в полете.

САМООГОВО́Р в психиатрии — приписывание себе больным не совершенных им проступков; иногда сопровождается обращением в органы государственной власти с целью понести наказание.

САМООЦЕ́НКА — оценка собственной личности, ее значения, достоинств, недостатков, а также совершенных поступков; у психически больных может изменяться под влиянием преобладающего настроения; сниженная С. наблюдается при депрессиях, повышенная — при маниакальных состояниях.

САМООЧИЩЕ́НИЕ ОКРУЖА́ЮЩЕЙ СРЕ́ДЫ — естественный процесс, происходящий в почве, воде и в воздухе в результате действия природных факторов (биологических, физических, химических), способствующих восстановлению экологического равновесия и освобождению объектов окружающей среды от загрязнения.

САМОПЕРЕВА́РИВАНИЕ (autolysis) — см. *Аутолиз.*

САМОПОВРЕЖДЕ́НИЕ — повреждение, нанесенное самому себе по неосторожности или умышленно.

САМОПО́МОЩЬ — оказание первой помощи самому себе.

САМОПРОИЗВО́ЛЬНОЕ ЗАРОЖДЕ́НИЕ — возникновение животных и растений непосредственно из неживого вещества; концепция С. з. является метафизической и ненаучной.

САМОРЕГИСТРА́ЦИЯ — способ статистического наблюдения, при к-ром обследуемое лицо после инструктажа самостоятельно заполняет регистрационный бланк.

САМОСОЗНА́НИЕ — осознание человеком себя как личности с присущей ей мировоззрением, целями, интересами и мотивами поведения; расстройства С. наблюдаются при многих психических болезнях.

САМОУБИ́ЙСТВО (suicidium; син. суицид) — умышленное лишение себя жизни.

С. АЛЬТРУИСТИ́ЧЕСКОЕ — см. *Самоубийство расширенное.*

С. ДВОЙНО́Е — С., совершаемое одновременно двумя, обычно близкими лицами.

С. РАСШИ́РЕННОЕ (син. С. альтруистическое) — С., к-рому предшествует совершение убийства любимых, в т. ч. ближайших родных самоубийцы с целью избавления их от предполагаемых тяжких страданий.

САМОУНИЧИЖЕ́НИЕ в психиатрии — преуменьшение психически больным своих физических или моральных качеств, признание себя ничтожным.

САМОУТВЕРЖДЕ́НИЕ в психиатрии — стремление больного к утверждению переоцениваемого им значения собственной личности; наблюдается при истерической и паранойяльной психопатии и нек-рых психопатоподобных состояниях.

САМУЭ́ЛЯ ТЕО́РИЯ ВОСПАЛЕ́НИЯ (истор.; S. Samuel, 1833—1899, нем. патолог) — теория воспаления, согласно к-рой ведущим механизмом развития воспалительного процесса являются нервно-трофические нарушения.

САМЮЭЛСА ПРО́БА (S. S. Samuels, род. в 1895 г., амер. хирург) — метод оценки состояния периферического кровообращения в нижних конечностях, заключающийся в том, что пациент лежа производит приподнятыми ногами быстрые сгибательно-разгибательные движения в голеностопных суставах; при скрытом нарушении кровообращения на пораженной ноге через 1—2 минуты отмечается побледнение стопы и продолжение движений становится невозможным.

САНА́ГА (sanaga) — см. *Аластрим.*

САНАРЕ́ЛЛИ — ЗДРОДО́ВСКОГО ФЕНО́МЕН (G. Sanarelli, 1864—1940, итал. иммунолог; П. Ф. Здродовский, 1890—1976, сов. микробиолог; син. Здродовского — Санарелли феномен) — анафилактоидная реакция в виде острого распространенного васкулита с множественными кровоизлияниями, клинически напоминающая затянувшийся анафилактический шок, возникающая у кролика, если ему через сутки после заражения сублетальной дозой холерных вибрионов ввести 0,5—1,0 *мл* фильтрата бульонной культуры нек-рых бактерий (кишечной палочки, протея, холерного вибриона и др.); ранее считался моделью холерного алгида человека.

САНАТО́РИЙ (лат. sano, sanatum лечить, исцелять) — лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для лечения преимущественно природными средствами (климат, минеральные воды, лечебные грязи) в сочетании с диетотерапией, лечебной физкультурой, физио- и фармакотерапией при рациональном режиме лечения и отдыха.

С. ВОЕ́ННЫЙ — С., предназначенный для военнослужащих, членов их семей, пенсионеров и служащих Вооруженных Сил.

С. ДЕ́ТСКИЙ — С., предназначенный для детей в возрасте от 1 года до 14 лет.

С. НОЧНО́Й — см. *Санаторий-профилакторий.*

САНАТО́РИЙ - ПРОФИЛАКТО́РИЙ (син.: профилакторий, санаторий ночной) — лечебно-профилактическое учреждение санаторного типа, организуемое профсоюзными организациями крупных промышленных предприятий для осуществления в свободное от работы время комплекса лечебных и оздоровительных мероприятий для рабочих и служащих, гл. обр. страдающих хроническими заболеваниями.

САНАТО́РНО-КУРО́РТНАЯ КА́РТА — учетный документ, составляемый врачом лечебно-профилактического учреждения при направлении больного на санаторно-курортное лечение; содержит краткие данные о характере заболевания, состоянии больного, проведенных исследованиях, а также заключение о показаниях для санаторно-курортного лечения.

САНАТО́РНО-КУРО́РТНАЯ ПО́МОЩЬ — см. *Лечение санаторно-курортное.*

САНАТО́РНО-ЛЕСНА́Я ШКО́ЛА — загородное детское учреждение системы Министерства просвещения для детей с закрытыми формами туберкулеза, больных ревматизмом (в межприступном периоде) и другими хроническими болезнями, в к-ром проводится комплекс лечебных и оздоровительных мероприятий с одновременным продолжением обучения по программе общеобразовательной школы.

САНАТО́РНО-ОТБО́РОЧНАЯ КОМИ́ССИЯ (СОК) — нештатный орган, создаваемый при военно-лечебных учреждениях или войсковых соединениях с целью отбора больных для санаторно-курортного лечения.

САНАТО́РНЫЙ РЕЖИ́М — система правил, регламентирующих порядок использования лечебных факторов и распорядок жизни больных в санатории.

САНА́ЦИЯ ПО́ЛОСТИ РТА (лат. sanatio оздоровление) — комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на выявление патологических изменений и функциональных нарушений органов полости рта, их устранение и профилактику.

САНГВИНИ́ЧЕСКИЙ ТИП (лат. sanguis, sanguinis кровь) — см. *Тип высшей нервной деятельности сильный уравновешенный подвижный.*

САНДЕРСА СИМПТО́М (J. Sanders, 1777—1843, англ. врач; син. Сендерса симптом — нрк) — видимая пульсация в надчревной области; непостоянный признак констриктивного перикардита.

САНДЕРСОНОВСКАЯ ПОДУ́ШКА (Sanderson) — см. *Фолликулярная подушка.*

САНИТА́Р, САНИТА́РКА (франц. sanitaire, от лат. sanitarius способствующий здоровью) — лицо, не имеющее специального медицинского образования, работающее в лечебно-профилактическом или санитарно-профилактическом учреждении и выполняющее обязанности по уборке помещений и оказанию помощи среднему медицинскому персоналу, напр. в уходе за больными; относится к младшему медицинскому персоналу.

САНИТА́Р БОЕВО́Й — 1) военнослужащий, выделенный на период боя в помощь штатным военным санитарам; 2) на кораблях ВМФ — специально подготовленный матрос из расчета боевого поста, на к-рого в качестве дополнительной обязанности возлагается оказание первой медицинской помощи пораженным и их транспортировка на пост медицинской помощи.

САНИТА́Р ВОЕ́ННЫЙ — лицо рядового состава военно-медицинской службы, обученное оказанию первой медицинской помощи при боевых поражениях, приемам выноса и переноски раненых, их погрузки на санитарный транспорт, а также основным правилам ухода за пораженными и больными.

САНИТА́РИЯ (лат. sanitarius способствующий здоровью, от sanitas здоровье) — совокупность практических мероприятий, направленных на осуществление гигиенических нормативов и требований.

С. ЖИЛИ́ЩНО-КОММУНА́ЛЬНАЯ — область С., включающая комплекс мероприятий по санитарному благоустройству населенных мест, жилых и общественных зданий.

С. ПРОИЗВО́ДСТВЕННАЯ — область С., включающая комплекс мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение воздействия на работающих вредных производственных факторов.

САНИТА́РНАЯ ДВУКО́ЛКА (истор.) — одноосная санитарная повозка для перевозки раненых и больных.

САНИТА́РНАЯ ДРУЖИ́НА (СД) — формирование медицинской службы Гражданской обороны, создаваемое на предприятиях, в учреждениях, на транспорте, в колхозах и совхозах и предназначенное для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения, при стихийных бедствиях, крупных производственных авариях и вспышках инфекционных заболеваний.

САНИТА́РНАЯ ИНСПЕ́КЦИЯ (истор.; син. Государственная санитарная инспекция) — система органов государственного санитарного надзора в СССР в 1933—1960 гг.

САНИТА́РНАЯ ЛЕТУ́ЧКА (истор.) — см. *Перевязочная летучка.*

САНИТА́РНАЯ ЛЯ́МКА (син. носилочная лямка) — приспособление для переноски пораженных без носилок или для облегчения переноски их на носилках, изготовленное из брезента или плотной хлопчатобумажной ткани.

САНИТА́РНАЯ ОБРАБО́ТКА[1] в эпидемиологии — совокупность мероприятий, проводимых с целью освобождения поверхности тела человека, его одежды, вещей постоянного пользования и жилища от возбудителей инфекционных болезней и (или) их переносчиков.

С. О. ПО́ЛНАЯ — С. о., включающая мытье людей (при педикулезе и обработку волосистых покровов), дезинфекцию (дезинсекцию) их одежды и обуви, дезинфекцию и влажную уборку мест их постоянного или временного пребывания, в т. ч. транспортных средств, напр. железнодорожных вагонов.

С. О. ЧАСТИ́ЧНАЯ — С. о., включающая только мытье людей (при педикулезе и обработку волосистых покровов), дезинфекцию (дезинсекцию) их одежды и обуви.

САНИТА́РНАЯ ОБРАБО́ТКА[2] в военной медицине — часть специальной обработки, включающая мероприятия по удалению с поверхности тела человека биологических средств поражения, радиоактивных или отравляющих веществ.

С. О. ПО́ЛНАЯ — С. о., обеспечивающая удаление со всей поверхности тела человека биологических средств поражения, радиоактивных или отравляющих веществ, а также раздражающих кожу продуктов дегазации, проводимая путем мытья со сменой белья.

С. О. ЧАСТИ́ЧНАЯ — С. о., обеспечивающая удаление биологических средств поражения, радиоактивных и отравляющих веществ с открытых участков кожи и прилегающих к ним частей одежды путем механической очистки и (или) обработки специальными жидкостями.

САНИТА́РНАЯ ОХРА́НА — система государственных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения окружающей среды и ограничение воздействия ее неблагоприятных факторов на здоровье населения.

САНИТА́РНАЯ ОХРА́НА ГРАНИ́Ц (устар.)— см. *Санитарная охрана территории.*

САНИТА́РНАЯ ОХРА́НА КУРО́РТОВ — комплекс мероприятий по обеспечению сохранности природных лечебных факторов, недопущению порчи или загрязнения источников минеральных вод, месторождений лечебных грязей, водоемов, лесных насаждений, почвы и воздушной среды курортов.

САНИТА́РНАЯ ОХРА́НА ПИЩЕВЫ́Х ПРОДУ́КТОВ — комплекс мероприятий, осуществляемых органами санитарного надзора и направленных на обеспечение высокой пищевой ценности и безвредности пищевых продуктов.

САНИТА́РНАЯ ОХРА́НА ТЕРРИТО́РИИ (син. санитарная охрана границ — устар.) — комплекс строго регламентированных административных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в международных аэропортах и морских (речных) портах, а также на пограничных железнодорожных станциях и на автодорожных магистралях с целью предупреждения завоза (заноса) в страну карантинных инфекций.

САНИТА́РНАЯ ОЧИ́СТКА (син. очистка населенных мест) — система мероприятий по сбору, хранению, удалению из населенных мест и обезвреживанию отходов.

САНИТА́РНАЯ ПОВО́ЗКА (истор.) — гужевое транспортное средство, специально сконструированное или приспособленное для перевозки раненых и больных.

САНИТА́РНАЯ ПОДГОТО́ВКА ВОЙСК (истор.) — см. *Военно-медицинская подготовка.*

САНИТА́РНАЯ ПОДГОТО́ВКА ЛО́ЖА ВОДОХРАНИ́ЛИЩА — комплекс мероприятий, проводимых на территории, подлежащей затоплению, в целях обеспечения должного качества воды будущего водохранилища как источника питьевого водоснабжения.

САНИТА́РНАЯ ПРИ́СТАНЬ — пристань или подготовленный участок побережья, предназначенные для погрузки (разгрузки) водных средств санитарного транспорта.

САНИТА́РНАЯ ТА́КТИКА (устар.) — см. *Организация и тактика медицинской службы.*

САНИТА́РНАЯ ТЕ́ХНИКА — совокупность технических средств, применяемых для реализации гигиенических требований и осуществления санитарных мероприятий.

САНИТА́РНАЯ УПРЯ́ЖКА НА́РТОВАЯ — вид санитарного транспорта, представляющий собой легкие сани (нарты), перевозимые собаками или оленями.

САНИТА́РНАЯ ХАРАКТЕРИ́СТИКА УСЛО́ВИЙ ТРУДА́ — описание санитарного состояния производственной среды с заключением о степени ее соответствия гигиеническим требованиям и нормативам, предусмотренным санитарным законодательством.

САНИТА́РНАЯ ЧАСТЬ (истор.) — медицинская служба войсковой части (соединения, объединения) Красной Армии в период гражданской войны и в первые годы после ее окончания.

САНИТА́РНО - ГИГИЕНИ́ЧЕСКАЯ ОБСТАНО́ВКА — комплексная характеристика факторов окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность (боеспособность) личного состава войск.

САНИТА́РНО - ГИГИЕНИ́ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ́ЧЕНИЕ — раздел медицинского обеспечения Вооруженных Сил, представляющий собой систему профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, снижение за-

болеваемости и повышение их работоспособности (боеспособности).

САНИТА́РНО - ГИГИЕНИ́ЧЕСКОЕ СОСТОЯ́НИЕ в военной медицине — уровень санитарного благополучия войск, определяемый степенью соответствия гигиеническим требованиям условий питания, водоснабжения, размещения, труда и прочих факторов, способных оказывать влияние на здоровье и работоспособность (боеспособность) личного состава.

САНИТА́РНОЕ ЗАКОНОДА́ТЕЛЬСТВО — совокупность правовых актов, постановлений и распоряжений, издаваемых органами государственной власти, устанавливающих санитарные правила и нормы, а также права и обязанности органов здравоохранения в области организации и проведения государственного санитарного надзора и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

САНИТА́РНОЕ ОБЕСПЕ́ЧЕНИЕ (устар.) — см. *Медицинское обеспечение.*

САНИТА́РНОЕ ОТДЕЛЕ́НИЕ РО́ТЫ (истор.) — медицинское подразделение стрелковой роты Советской Армии в 1933—1945 гг., состоявшее из нескольких санитаров во главе с санитарным инструктором.

САНИТА́РНОЕ ПРОСВЕЩЕ́НИЕ — раздел профилактической деятельности органов и учреждений советского здравоохранения, направленный на гигиеническое обучение и воспитание населения с целью его привлечения к активному участию в охране здоровья.

САНИТА́РНОЕ СОСТОЯ́НИЕ НАСЕЛЕ́НИЯ — см. *Состояние здоровья населения.*

САНИТА́РНОЕ ЧИСЛО́ — показатель санитарного состояния почвы, выражаемый отношением количества азота гумуса ко всему количеству органического азота в пробе почвы.

САНИТА́РНО-ЗАЩИ́ТНАЯ ЗО́НА — территория, отделяющая промышленное предприятие, расположенное в населенном месте, от ближайших жилых домов или зданий общественного назначения с целью ослабления воздействия на население шума, промышленных выбросов и других неблагоприятных факторов; размеры С.-з. з. для различных типов предприятий установлены санитарным законодательством.

САНИТА́РНО-КАРАНТИ́ННЫЙ ОТДЕ́Л, ПУНКТ (СКО, СКП) — подразделение санитарно-эпидемиологической станции, осуществляющее в международных аэропортах, на автодорожных магистралях и в морских (речных) портах медико-санитарный контроль за прибывающими из-за границы людьми, транспортными средствами и грузами и проведение мероприятий, препятствующих заносу на территорию СССР карантинных инфекций.

САНИТА́РНО-КОНТРО́ЛЬНЫЙ ПОСТ (СКП) — подразделение медицинской службы Гражданской обороны, предназначенное для осуществления карантинных или обсервационных мероприятий на коммуникациях, ведущих к очагам инфекционных заболеваний или заражения биологическими средствами.

САНИТА́РНО-КОНТРО́ЛЬНЫЙ ПУНКТ (СКП) — подведомственное Министерству путей сообщения СССР противоэпидемическое учреждение, функционирующее на железнодорожной станции с целью санитарно-противоэпидемического обеспечения перевозок.

САНИТА́РНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ ОТРЯ́Д АРМЕ́ЙСКИЙ, ФРОНТОВО́Й (истор.) — санитарно-эпидемиологическое учреждение армии (фронта), предназначавшееся для организации и проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению войск.

САНИТА́Р-НОСИ́ЛЬЩИК — лицо рядового состава военно-медицинской службы, основная обязанность к-рого состоит в транспортировке пораженных и больных на носилках или с помощью других средств.

САНИТА́Р-НОСИ́ЛЬЩИК ВСПОМОГА́ТЕЛЬНЫЙ — военнослужащий, назначенный для выполнения обязанностей санитара-носильщика на время боя.

САНИТА́РНО-ТАКТИ́ЧЕСКАЯ РАЗВЕ́ДКА (устар.) — см. *Медико-тактическая разведка.*

САНИТА́РНО-ТОКСИКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ПА́СПОРТ — документ, содержащий данные о рецептуре, технологическом регламенте, результатах химических и биологических исследований веществ и материалов, предлагаемых для использования населением в быту; составляется предприятием-изготовителем и утверждается органом, осуществляющим санитарный надзор.

САНИТА́РНО-ТОПОГРАФИ́ЧЕСКОЕ ОПИСА́НИЕ — метод изучения местности, направленный на получение характеристики ее топографических особенностей (рельефа, гидрологических условий и т. п.), а также степени и перспектив ее загрязнения.

САНИТА́РНО-ТРА́НСПОРТНОЕ СУ́ДНО — судно, не входящее в состав Военно-Морского Флота, используемое в военное время для эвакуации пораженных и больных.

САНИТА́РНО-ТРА́НСПОРТНЫЙ ОТРЯ́Д ФЛО́ТА (ФЛОТИ́ЛИИ, ВОЕ́ННО-МОРСКО́Й БА́ЗЫ) ОТДЕ́ЛЬНЫЙ (истор.) — эвакуационно-транспортная часть медицинской службы времен Великой Отечественной войны имевшая в своем составе автомобильный санитарный транспорт и санитарные катера, предназначавшаяся для эвакуации раненых и больных с кораблей, из частей и учреждений флота в лечебные учреждения.

САНИТА́РНО-ХИМИ́ЧЕСКАЯ ЗАЩИ́ТА (истор.) — комплекс мероприятий, выполнявшихся военно-медицинской службой и органами здравоохранения в связи с возможностью применения противником отравляющих веществ и направленных на предупреждение, ослабление и лечение поражений личного состава войск и населения.

САНИТА́РНО-ХИМИ́ЧЕСКАЯ РАЗВЕ́ДКА — вид медицинской разведки, обеспечивающий обнаружение отравляющих веществ и ядов в пищевых продуктах и воде, а также выявление заражения отравляющими веществами районов размещения сил и средств медицинской службы.

САНИТА́РНО-ЭВАКУАЦИО́ННОЕ ОБЕСПЕ́ЧЕНИЕ (нрк) — см. *Лечебно-эвакуационное обеспечение.*

САНИТА́РНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ РАЗВЕ́ДКА (син. эпидемиологическая разведка — нрк) — вид медицинской разведки, обеспечивающий получение сведений о возможных источниках и путях заноса инфекции в войска и выяснение условий возможного распространения инфекционных заболеваний среди личного состава войск.

САНИТА́РНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ СЛУ́ЖБА — система учреждений Министерства здравоохранения СССР, союзных республик и других ведомств, осуществляющих санитарный надзор, а также проведение санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья населения от влияния вредных факторов окружающей среды, ликвидацию и предупреждение загрязнения окружающей среды, снижение инфекционной заболеваемости, улучшение санитарных условий труда и быта.

САНИТА́РНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ СТА́НЦИЯ (СЭС) — учреждение санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющее предупредительный и текущий санитарный надзор, а также организующее проведение санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий на соответствующей территории (республиканская, краевая, областная, окружная, городская, районная СЭС), на водном транспорте (бассейновая, портовая, линейная СЭС), на железнодорожном транспорте (центральная, дорожная, отделенческая, линейная СЭС), на авиационном транспорте (СЭС гражданской авиации).

САНИТА́РНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ОТРЯ́Д (СЭО) — военно-медицинское учреждение, предназначенное для организации и проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению войск.

С.-Э. ОТРЯ́Д ПОДВИЖНО́Й (истор.; ПСЭО) — С.-э. о., способный по своей структуре и оснащенности самостоятельно перемещаться в заданный район, развертываться в полевых условиях с целью организации и проведения мероприятий непосредственно в воинских частях.

САНИТА́РНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ОПИСА́НИЕ — систематизированная сводка материалов, характеризующих санитарное и эпидемическое состояние определенной территории, заболеваемость проживающего в ее пределах населения, а также оснащенность санитарно-профилактическими и противоэпидемическими силами и средствами.

САНИТА́РНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕ́НИЕ — общее название учреждений, осуществляющих текущий и предупредительный санитарный надзор, проводящих санитарно-профилактические и противоэпидемические мероприятия на обслуживаемых территориях и народнохозяйственных, в том числе транспортных объектах; к числу С.-э. у. относятся санитарно-эпидемиологические, дезинфекционные и противочумные станции.

САНИТА́РНО-ЭПИДЕМИ́ЧЕСКОЕ СОСТОЯ́НИЕ ВОЙСК — совокупность данных, характеризующих уровень, структуру и динамику инфекционной заболеваемости личного состава войск, вероятность заноса инфекции в войска, а также наличие или отсутствие условий для распространения инфекционных заболеваний.

С.-Э. СОСТОЯ́НИЕ ВОЙСК БЛАГОПОЛУ́ЧНОЕ — С.-э. с. в., ха-

рактеризующееся отсутствием в части (соединении) инфекционных болезней или единичными, не связанными друг с другом заболеваниями (кроме особо опасных инфекций) при отсутствии условий для заноса или распространения таких заболеваний.

С.-Э. СОСТОЯНИЕ ВОЙСК НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ—С.-э. с. в., характеризующееся появлением в части (соединении) групповых инфекционных заболеваний при наличии условий для их распространения или возникновением единичных заболеваний особо опасными инфекциями.

С.-Э. СОСТОЯНИЕ ВОЙСК НЕУСТОЙЧИВОЕ — С.-э. с. в., характеризующееся превышением уровня спорадической заболеваемости инфекционными болезнями (групповой заболеваемостью) при отсутствии в части (соединении) условий к дальнейшему распространению заболеваний или лишь спорадической заболеваемостью при наличии условий заноса и распространения инфекции.

С.-Э. СОСТОЯНИЕ ВОЙСК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ — С.-э. с. в., характеризующееся быстрым нарастанием инфекционной заболеваемости в части (соединении) или возникновением повторных случаев заболеваний особо опасными инфекциями или поражением части (соединения) биологическими средствами противника с обнаружением в очагах поражения возбудителей особо опасных инфекций.

САНИТА́РНЫЕ КОНВЕ́НЦИИ (истор.) — международные соглашения, регулирующие противоэпидемические мероприятия по предупреждению завоза (вывоза) карантинных инфекций через государственные границы; в 1952 г. заменены Международными медико-санитарными правилами.

САНИТА́РНЫЕ НО́РМЫ — официальные нормативные документы, устанавливающие минимальные и (или) предельные значения нек-рых количественных показателей, характеризующих факторы окружающей среды; служат основой предупредительного и текущего санитарного надзора.

САНИТА́РНЫЕ ПОСЛЕ́ДСТВИЯ ВОЙНЫ́ — общая характеристика ущерба, нанесенного войной численности и составу населения, состоянию его здоровья, санитарному благоустройству населенных мест и системе здравоохранения.

САНИТА́РНЫЕ ПРА́ВИЛА — издаваемые органами государственной власти директивные акты по санитарно-противоэпидемическим вопросам, в к-рых излагаются санитарные требования, обязательные для выполнения всеми ведомствами, предприятиями, учреждениями и отдельными лицами.

САНИТА́РНЫЙ АВТОМОБИ́ЛЬ — автомобиль, специально сконструированный или приспособленный для перевозки больных, а в военное время — для эвакуации пораженных и больных.

САНИТА́РНЫЙ АКТИ́В — представители общественности, содействующие органам здравоохранения и медицинским учреждениям в работе по охране здоровья населения.

САНИТА́РНЫЙ ВЕРТОЛЁТ — вертолет, оборудованный для перевозки больных и пораженных.

САНИТА́РНЫЙ ДЕНЬ — периодически назначаемый день проведения общей уборки и дезинфекции на предприятии (в учреждении).

САНИТА́РНЫЙ ИНСПЕ́КТОР ОБЩЕ́СТВЕННЫЙ — представитель санитарного актива, подготовленный по специальной программе работниками санитарно-эпидемиологической станции для помощи в осуществлении текущего санитарного надзора.

САНИТА́РНЫЙ ИНСТРУ́КТОР — должностное лицо младшего медицинского (сержантского) состава военно-медицинской службы, получившее специальную подготовку.

САНИТА́РНЫЙ КАРАВА́Н (истор.) — группа плавучих средств, выделявшихся в распоряжение медицинской службы порта для эвакуации раненых с кораблей в портовый приемный покой (конец 19 — начало 20 в.).

САНИТА́РНЫЙ КА́ТЕР (син. санитарный катер рейдовый) — самоходное плавучее транспортное средство специальной постройки или переоборудованное для эвакуации пораженных и больных в пределах пункта базирования флота.

САНИТА́РНЫЙ КА́ТЕР РЕ́ЙДОВЫЙ — см. *Санитарный катер.*

САНИТА́РНЫЙ КОНТРО́ЛЬ — мероприятие в системе санитарного надзора, заключающееся в проверке органами санитарно-эпидемиологической службы выполнения (соблюдения) санитарных и противоэпидемических норм и правил ведомствами, предприятиями, учреждениями и отдельными лицами.

САНИТА́РНЫЙ МАНЁВР (устар.) — см. *Маневр силами и средствами медицинской службы.*

САНИТА́РНЫЙ МИ́НИМУМ — специальная подготовка лиц нек-рых профессиональных групп (работников общественного питания, торговли, коммунального хозяйства и др.) по вопросам санитарно-противоэпидемического режима соответствующих объектов.

САНИТА́РНЫЙ НАДЗО́Р — система постоянного наблюдения за выполнением предприятиями, учреждениями и отдельными лицами санитарных и противоэпидемических норм и правил, осуществляемого органами санитарно-эпидемиологической службы.

С. Н. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ — С. н., проводимый при проектировании и строительстве новых объектов промышленного, жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения, при их реконструкции и изменении технологических процессов, а также контроль за соответствием продуктов питания и промышленных изделий санитарным нормам и требованиям.

С. Н. ТЕКУ́ЩИЙ — С. н. за санитарным состоянием населенных мест и действующих объектов, за соблюдением на них санитарных норм и правил.

САНИТА́РНЫЙ ОТРЯ́Д ЛЕТУ́ЧИЙ (истор.) — см. *Перевязочный отряд летучий.*

САНИТА́РНЫЙ ОТРЯ́Д ПО́РТА (истор.) — нештатное подвижное подразделение медицинской службы морского порта, предназначавшееся для оказания медицинской помощи и эвакуации раненых из береговых частей, проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (начало 20 в.).

САНИТА́РНЫЙ ПА́СПОРТ — документ, выдаваемый органами санитарно-эпидемиологической службы, отражающий результаты текущего санитарного надзора за каким-либо объектом.

САНИТА́РНЫЙ ПА́СПОРТ ВОДОИСТО́ЧНИКА — документ военно-медицинского учета, регистрирующий санитарно-техническое состояние водоисточника, границы зон санитарной охраны, динамику качества и дебита воды.

САНИТА́РНЫЙ ПОСТ — 1) медицинское формирование, создаваемое первичной организацией Красного Креста и Красного Полумесяца в производственном или учебном коллективе для оказания первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях, а также для содействия медицинским работникам при проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-просветительных мероприятий; 2) (СП) — формирование медицинской службы Гражданской обороны, организуемое на объектах народного хозяйства для оказания первой помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и в очаге поражения; С. п. могут быть сведены в санитарную дружину.

САНИТА́РНЫЙ ПРОПУСКНИ́К — помещение, специально созданное или приспособленное для проведения санитарной обработки, при к-рой исключается контакт людей и одежды, прошедших обработку, с ожидающими ее.

САНИТА́РНЫЙ САМОЛЁТ — самолет, оборудованный для перевозки пораженных и больных.

САНИТА́РНЫЙ СКЛАД — см. *Медицинский склад военный.*

САНИТА́РНЫЙ ТРА́НСПОРТ — 1) совокупность транспортных средств, специально сконструированных или приспособленных для перевозки больных в мирное время, а в военное время — для эвакуации пораженных и больных; 2) (син. госпитальное судно вспомогательное) — судно, входящее в состав Военно-Морского Флота, приспособленное или переоборудованное для медицинской эвакуации с оказанием в пути неотложной медицинской помощи; 3) (истор.) — санитарно-транспортная часть, входившая в состав медицинской службы действующей армии в конце 19 — начале 20 вв.

САНИТА́РНЫЙ ТРАНСПОРТЁР — моторизованное транспортное средство небольшой вместимости, предназначенное для сбора и вывоза пораженных с поля боя (из очага санитарных потерь) или для перевозки их между отделениями этапа медицинской эвакуации.

САНИТА́РНЫЙ ШЛЮЗ в радиационной гигиене — комплекс помещений и санитарно-технических устройств, размещенный между зонами производственных помещений с различными уровнями радиоактивного загрязнения и предназначенный для предотвращения распространения радиоактивного загрязнения воздуха и поверхностей; в С. ш. персонал надевает и снимает дополнительные средства индивидуальной защиты, проводит санитарную обработку рук, а в случае необходимости — всего тела.

САНО- (лат. sanus здоровый; sano лечить, оздоровлять) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к здоровью, к оздоровлению».

САНОГЕНЕ́З (*сано-* + греч. genesis происхождение, развитие) — механиз-

мы восстановления нарушенной саморегуляции организма на протяжении болезни; введение понятия С., отличного от понятия «патогенез», не является общепринятым.

САНОЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ РАЙО́Н (*сано-* + *экология*) — см. *Медико-географический район.*

СА́НСОМА СИМПТО́М (A. E. Sansom, 1838—1907, англ. врач) — 1) расширение зоны тупого перкуторного звука, соответствующей проекции сердца и сосудистого пучка, определяемое во втором и третьем межреберье при экссудативном перикардите; 2) шум, синхронный сокращениям сердца, выслушиваемый вблизи открытого рта больного при задержке им дыхания; признак аневризмы аорты.

САНТОНИ́НОВАЯ ПРО́БА (истор.) — метод исследования антитоксической функции печени, основанный на способности печени превращать введенный внутривенно сантонин в оксисантонин, выделяемый с мочой и обнаруживаемый по окрашиванию ее в красный цвет при добавлении едкой щелочи.

САНТОРИ́НИЕВ БУГОРО́К (G. D. Santorini, 1681—1737, итал. анатом) — см. *Рожковидный бугорок.*

САНТОРИ́НИЕВ ПРОТО́К (G. D. Santorini) — см. *Проток поджелудочной железы добавочный.*

САНТОРИ́НИЕВ СОСО́ЧЕК (G. D. Santorini) — см. *Малый сосочек двенадцатиперстной кишки.*

САНТОРИ́НИЕВ ХРЯЩ (G. D. Santorini) — см. *Хрящ рожковидный.*

САНТОРИ́НИЕВ ЭМИССА́РИЙ (G. D. Santorini) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1067.*

САНТОРИ́НИЕВА ВЫ́РЕЗКА (G. D. Santorini) — см. *Вырезка хряща слухового прохода.*

САНТОРИ́НИЕВА РА́КОВИНА G. D. Santorini) — см. *Носовая раковина самая верхняя.*

САНФЕЛИ́ЧЕ ЖИ́ДКОСТЬ (F. Sanfelice) — жидкость для фиксации гистологических препаратов, состоящая из растворов хромовой кислоты, формалина и ледяной уксусной кислоты.

САНФИЛИ́ППО СИНДРО́М (S. J. Sanfilippo, амер. педиатр 20 в.) — см. *Мукополисахаридоз III типа.*

САП (malleus) — инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, вызываемая Pseudomonas (Actinobacillus) mallei при внедрении в организм через поврежденную кожу и слизистые оболочки; протекает с образованием специфических гранулем, некрозом и нагноением пораженных тканей, а также с явлениями интоксикации.

С. ВЕ́РХНИХ ДЫХА́ТЕЛЬНЫХ ПУТЕ́Й (нрк) — клиническая форма С., характеризующаяся сочетанным поражением носа, гортани и трахеи с образованием глубоких язв.

С. КО́ЖНЫЙ (нрк: m. cutaneus) — клиническая форма С., характеризующаяся развитием в коже пустул, гнойных язв и абсцессов.

С. ЛЁГОЧНЫЙ (нрк; m. pulmonalis) — клиническая форма С., возникающая при гематогенном распространении возбудителя и характеризующаяся развитием абсцедирующей пневмонии.

С. О́СТРЫЙ (m. acutus) — клиническая форма С., протекающая по типу септикопиемии.

С. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (m. chronicus)— клиническая форма С., характеризующаяся рецидивами и обострениями при наличии вяло текущих воспалительных процессов в коже, слизистых оболочках и внутренних органах в виде глубоких язв, инфильтратов и абсцессов.

САП ЛО́ЖНЫЙ (устар.) — см. *Мелиоидоз.*

САПЕ́ЖКО ОПЕРА́ЦИЯ (К. М. Сапежко, отеч. хирург 19 в.; син. Миллингена — Сапежко способ) — пластическая операция: устранение заворота века, при к-рой участок слизистой оболочки губы пересаживают в разрез по краю века.

САПОЖКО́ВА ГАСТРЭКТОМИ́Я (К. П. Сапожков, 1874—1952, сов. хирург) — хирургическая операция: полное удаление желудка вместе с регионарными лимфатическими узлами, связками и большим сальником; производится при раке желудка.

САПОЖКО́ВА ДЕМУКОЗА́ЦИЯ (К. П. Сапожков) — хирургическая операция: удаление слизистой оболочки из выключенной части кишки с целью ее облитерации; предложена для лечения нек-рых видов кишечных свищей.

САПОЖКО́ВА МЕ́ТОД ЗАКРЫ́ТИЯ КИШЕ́ЧНОГО СВИЩА́ (К. П. Сапожков) — хирургическая операция: закрытие губовидного кишечного свища малого диаметра путем мобилизации слизистой оболочки свищевого хода в виде манжетки, наложения на ее основание кисетного шва и погружения ее в просвет кишки с укреплением мышечного слоя кишки в этом месте вторым рядом швов.

САПОЖКО́ВА ОПЕРА́ЦИЯ (К. П. Сапожков) — хирургическая операция: закрытие слюнного свища, заключающееся в иссечении участка кожи, вокруг свищевого хода и ушивании раны толстой шелковой нитью, проведенной вокруг свищевого хода в подкожной клетчатке.

САПОЖКО́ВА УШИВА́НИЕ КУЛЬТИ́ ДВЕНАДЦАТИПЕ́РСТНОЙ КИШКИ́ (К. П. Сапожков) — способ закрытия культи двенадцатиперстной кишки при резекции желудка на выключение; заключается в пересечении кишки через язву, отслаивании слизистой оболочки и погружении ее кисетным швом в просвет кишки с последующим сшиванием демукозированных стенок кишки двухрядным швом.

САПОНИ́НЫ (лат. sapo, saponis мыло) — гликозиды, молекулы к-рых образованы моносахаридами и тритерпеноидом или стероидом; содержатся во многих растениях, в том числе лекарственных (напр. солодка, кора мыльного дерева); нек-рые С. используются в качестве сырья для получения стероидных гормонов.

САПОНИФИКА́ЦИЯ (лат. sapo, saponis мыло + facio делать) — см. *Омыление трупа.*

САППЕ́Я ВЕ́НЫ (M. Ph. C. Sappey, 1810—1896, франц. анатом) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1289.*

САПРО- (греч. sapros гнилой) — составная часть сложных слов, означающая «гниение».

САПРО́Б (*сапро-* + греч. bios жизнь)— см. *Организм сапробный.*

САПРОБИО́НТ (*сапро-* + греч. biōn, biontos живущий) — см. *Организм сапробный.*

САПРО́БНОСТЬ ВОДОЁМА — характеристика степени загрязненности водоема по видовому составу и массе гидробионтов; различают полисапробные (наиболее загрязненные), α- и β-мезосапробные, и олигосапробные (наименее загрязненные) водоемы.

САПРОПЕ́ЛИ (*сапро-* + греч. pēlos ил, грязь; син.: гиттии, грязи лечебные сапропелевые) — иловые отложения, преимущественно пресноводных водоемов, богатые органическими веществами (более 10%); применяются в качестве лечебных грязей, обладают более высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью, чем сульфидные иловые грязи.

САПРОФА́ГИ (*сапро-* + греч. phagos пожирающий) — животные, питающиеся распадающимися остатками других животных; нек-рые С. являются механическими переносчиками возбудителей инфекционных болезней, нек-рые — хозяевами возбудителей гельминтозов человека.

САПРОФИ́ТЫ (*сапро-* + греч. phyton растение) — микроорганизмы и растения, питающиеся органическими веществами отмерших организмов и выделений животных; нек-рые С. условно патогенны для человека.

САПФИ́ЗМ (Sapphō, древнегреч. поэтесса конца VII в. до н. э.) — см. *Лесбийская любовь.*

САРДОНИ́ЧЕСКАЯ ГРИМА́СА (греч. sardonios язвительный, злобно-насмешливый) — см. *Сардонический смех.*

САРДОНИ́ЧЕСКАЯ УЛЫ́БКА (греч. sardonios язвительный, злобно-насмешливый) — см. *Сардонический смех.*

САРДОНИ́ЧЕСКИЙ СМЕХ (risus sardonicus; греч. sardonios язвительный, злобно-насмешливый; син.: сардоническая гримаса, сардоническая улыбка) — стойкая гримаса, при к-рой углы рта оттянуты книзу и кзади с образованием морщин и складок кожи, брови и крылья носа приподняты, а челюсти крепко сжаты; наблюдается при столбняке и обусловлена судорожным сокращением мимических мышц.

САРКИ́СОВА ВНУТРИКЛЕ́ТОЧНАЯ РЕГЕНЕРА́ЦИЯ (Д. С. Саркисов, род. в 1924 г., сов. патологоанатом) — см. *Регенерация внутриклеточная.*

САРКИ́СОВА МЕ́ТОД (Д. С. Саркисов) — метод приготовления гистологических препаратов, при к-ром вместо заливки окрашенного среза канадским бальзамом и использования покровного стекла их заключают в поливиниловый спирт (для препаратов, окрашенных на липиды) или пластмассу.

САРК- (сарко; греч. sarx, sarkos мясо, плоть) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «мясо», «мясистый»; 2) «относящийся к поперечнополосатым мышечным волокнам»; 3) «относящийся к саркоме».

САРКО- см. *Сарк-.*

САРКОБЛА́СТ (sarcoblastus, LNH; *сарко-* + греч. blastos росток, зародыш; син. миобласт) — малодифференцированная клетка, из к-рой развивается поперечнополосатое мышечное волокно.

САРКО́ДОВЫЕ (Sarcodina) — класс простейших, объединяющий организмы, у к-рых тело не имеет постоянной формы, а органеллами движения и захвата пищи служат псевдоподии; нек-рые представители С. являются паразитами человека и животных, напр. Entamoeba histolytica.

САРКО́ИД (sarcoidum; *сарко-* + греч. -eidēs подобный, похожий; син. люпоид) — общее название поражений кожи при саркоидозе в виде бугорков (собственно в коже) или узлов (в подкожной клетчатке).

САРКО́ИД ДАРЬЕ́ — РУССИ́ — см. *Дарье — Русси саркоид.*

САРКО́ИД ДИССЕМИНИ́РОВАННЫЙ УЗЛОВА́ТЫЙ (sarcoidum nodosum disseminatum) — см. *Дарье — Русси саркоид.*

САРКО́ИД ПОДКО́ЖНЫЙ (sarcoidum subcutaneum) — см. *Дарье — Русси саркоид.*

САРКО́ИД РАССЕ́ЯННЫЙ УЗЛОВА́ТЫЙ (sarcoidum nodosum disseminatum — см. *Дарье — Русси саркоид.*

САРКО́ИД СИМПТОМАТИ́ЧЕСКИЙ (sarcoidum symptomaticum) — общее название высыпаний в виде бугорков и узлов, сходных с поражением кожи при саркоидозе, наблюдаемых при нек-рых инфекционных болезнях, напр., сифилисе, лепре.

САРКО́ИД ШПИ́ГЛЕРА — ФЕ́НДТА — см. *Лимфоцитома кожи.*

САРКОИДО́З (sarcoidosis; *сарко-* + греч. -eidēs подобный + *-оз*; син.: Бека болезнь, Бенье — Бека — Шауманна болезнь, гранулематоз доброкачественный, лимфогранулематоз доброкачественный, ретикулоэндотелиоз эпителиоидно-клеточный хронический, Шауманна доброкачественный лимфогранулематоз) — хроническая болезнь неясной этиологии, характеризующаяся поражением лимфатической системы, внутренних органов и кожи с образованием специфических гранулем, окруженных слоем гиалиноза.

САРКОКАРЦИНО́МА (sarcocarcinoma; *сарко-* + *карцинома*) — см. *Карциносаркома.*

САРКОЛЕ́ММА (sarcolemma, LNH; *сарко-* + греч. lemma корка, оболочка) — оболочка поперечнополосатого мышечного волокна, состоящая из клеточной оболочки и окружающего волокно слоя полисахаридов, в к-рый включены ретикулярные волокна.

САРКО́МА (sarcoma; *сарк-* + *-ома*) — злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов мезенхимы.

С. АДВЕНТИЦИА́ЛЬНАЯ (s. adventitiale; син.: С. диффузная периваскулярная, С. периадвентициальная) — С., развивающаяся из наружной оболочки сосудов; характеризуется диффузным периваскулярным ростом.

С. АНГИОПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (s. angioplasticum) — см. *Ангиосаркома.*

С. БОТРИО́ИДНАЯ (s. botryoideum; греч. botryoeidēs гроздевидный; син.: опухоль мезодермальная смешанная, полип ботриоидный, рабдомиосаркома эмбриональная, С. гроздевидная) — С., содержащая миксоматозную строму, в к-рой расположены круглые или веретенообразные клетки, представляющие собой атипичные саркобласты.

С. ВЕРЕТЕНОКЛЕ́ТОЧНАЯ (s. fusicellulare) — С., состоящая из веретенообразных клеток.

С. ВИРУСНАЯ (s. virale) — общее название С. животных, вызываемых вирусами.

С. ГЕМАНГИОПЕРИЦИТА́РНАЯ — см. *Перицитома.*

С. ГИГАНТОКЛЕ́ТОЧНАЯ (устар.) — см. *Остеобластокластома злокачественная.*

С. ГРОЗДЕВИ́ДНАЯ (s. botryoideum) — см. *Саркома ботриоидная.*

С. ДИФФУ́ЗНАЯ ПЕРИВАСКУЛЯ́РНАЯ (s. diffusum perivasculare) — см. *Саркома адвентициальная.*

С. КРУГЛОКЛЕ́ТОЧНАЯ (s. globocellulare) — С., состоящая из клеток круглой формы.

С. ЛИМФАНГИОЭНДОТЕЛИА́ЛЬНАЯ (s. lymphangioendotheliale) — см. *Лимфангиоэндотелиома.*

С. МА́ТКИ СТРОМА́ЛЬНАЯ (s. uteri stromale) — см. *Саркома эндометриальная.*

С. МЕНИНГЕА́ЛЬНАЯ (s. meningeale; син.: арахноидэндотелиосаркома, менингиома злокачественная) — С., исходящая из клеток паутинной, реже мягкой или твердой мозговых оболочек.

С. МИЕЛОГЕ́ННАЯ (устар.) — см. *Остеобластокластома злокачественная.*

С. МИКСОПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (s. myxoplasticum) — см. *Миксосаркома.*

С. МЯГКИХ ТКА́НЕЙ АЛЬВЕОЛЯ́РНАЯ — С. подкожной клетчатки или мышц, состоящая из полигональных клеток с зернистой цитоплазмой, окруженных соединительнотканными прослойками, придающими ткани опухоли ячеистое строение.

С. НЕЙРОГЕ́ННАЯ (s. neurogenum; син.: нейрофиброма злокачественная, нейрофибросаркома, фибросаркома периневральная, шваннома злокачественная) — С. периферических нервов, исходящая из леммоцитов.

С. ОСТЕОБЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (s. osteoblasticum) — см. *Саркома остеогенная.*

С. ОСТЕОГЕ́ННАЯ (s. osteogenum; син.: остеобластосаркома, остеоидсаркома, остеосаркома, С. остеобластическая, С. остеолитическая) — С. кости, исходящая из остеобластов, продуцирующих атипичное костное вещество.

С. ОСТЕОГЕ́ННАЯ ЭКТОПИ́ЧЕСКАЯ (s. osteogenum ectopicum) — остеогенная С., расположенная в мягких тканях и не связанная с костью.

С. ИЗ ОСТЕОКЛА́СТОВ — см. *Остеобластокластома злокачественная.*

С. ОСТЕОЛИТИ́ЧЕСКАЯ (s. osteolyticum) — см. *Саркома остеогенная.*

С. ПАРОСТА́ЛЬНАЯ (s. parostale; син.: остеома паростальная — устар., С. периостальная оссифицирующая, С. периостальная юкстакортикальная) — медленно растущая С. кости, развивающаяся из камбиального слоя надкостницы.

С. ПЕРИАДВЕНТИЦИА́ЛЬНАЯ (s. periadventitiale; греч. peri вокруг+ анат. adventitia адвентиция) — см. *Саркома адвентициальная.*

С. ПЕРИОСТА́ЛЬНАЯ ОССИФИЦИ́РУЮЩАЯ (s. periostale ossificans) — см. *Саркома паростальная.*

С. ПЕРИОСТА́ЛЬНАЯ ЮКСТАКОРТИКА́ЛЬНАЯ (s. periostale juxtacorticale) — см. *Саркома паростальная.*

С. ПИА́ЛЬНАЯ (s. piae matris) — распространенная С. мягких мозговых оболочек.

С. ПОЛИМО́РФНО - КЛЕ́ТОЧНАЯ (s. polymorphocellulare; син. С. эпителиоидно-клеточная — устар.) — С., состоящая из опухолевых клеток различной величины и формы.

САРКО́МА РА́УСА — см. *Рауса саркома.*

С. РЕТИКУЛОКЛЕ́ТОЧНАЯ (s. reticulocellulare) — см. *Ретикулосаркома.*

С. СИНОВИА́ЛЬНАЯ (s. synoviale; син.: саркоэндотелиома синовиальная, синовиалома злокачественная, синовиома злокачественная) — С., исходящая из элементов сухожильных влагалищ, суставных и слизистых сумок.

С. ЭНДОМЕТРИА́ЛЬНАЯ (s. endometriale; син.: С. матки стромальная, эндометриоз стромальный) — С., развившаяся из клеток стромы эндометрия.

С. ЭПИТЕЛИО́ИДНО - КЛЕ́ТОЧНАЯ (устар.; s. epithelioidocellulare) — см. *Саркома полиморфно-клеточная.*

САРКО́МА ВЕНЕРИ́ЧЕСКАЯ (sarcoma venereum; син.: саркома трансмиссивная венерическая, Штиккера опухоль) — злокачественная опухоль половых органов собак, состоящая из ретикулоэндотелиальных клеток; передается половым путем; используется как модель в экспериментальной онкологии.

САРКО́МА ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКАЯ КА́ПОШИ — см. *Саркома идиопатическая множественная геморрагическая.*

САРКО́МА ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКАЯ МНО́ЖЕСТВЕННАЯ КА́ПОШИ — см. *Саркома идиопатическая множественная геморрагическая.*

САРКО́МА ИДИОПАТИ́ЧЕСКАЯ МНО́ЖЕСТВЕННАЯ ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКАЯ (sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum; син.: Капоши ангиоматоз, Капоши ангиоретикулез, Капоши ангиосаркоматоз, Капоши гемангиосаркома, Капоши геморрагическая саркома, Капоши множественная геморрагическая саркома, Капоши телеангиэктатическая псевдосаркома) — болезнь неясной этиологии с преимущественным поражением кожи, характеризующаяся генерализованным новообразованием кровеносных сосудов и расширением капилляров, образующих многочисленные полости разной формы и величины, выстланные набухшим эндотелием.

САРКО́МА ЛИМФОФОЛЛИКУЛЯ́РНАЯ (sarcoma lymphofolliculare; гист. folliculi lymphatici лимфатические фолликулы) — см. *Лимфома гигантофолликулярная.*

САРКО́МА ТРАНСМИССИ́ВНАЯ ВЕНЕРИ́ЧЕСКАЯ (sarcoma transmissivum venereum) — см. *Саркома венерическая.*

САРКО́МА ХО́ДЖКИНА — см. *Ходжкина саркома.*

САРКО́МА ШМИ́НКЕ — см. *Шминке опухоль.*

САРКО́МА Ю́ИНГА — см. *Юинга опухоль.*

САРКОМЕ́Р (sarcomerus, LNH; *сарко-* + греч. meros часть, доля; син.: инокомма, комма, миофибрилломер) — сегмент миофибриллы, ограниченный двумя телофрагмами и состоящий из одного целого анизотропного диска и двух половин изотропных дисков.

САРКОМИЦИ́Н (sarcomycinum) — антибиотик, продуцируемый Streptomy-

ces erythrochromogenes, подавляющий развитие нек-рых экспериментальных опухолей; терапевтический эффект при опухолях человека отсутствует.

САРКОНЕ́МА (sarconema; *сарко-* + греч. nēma нить) — см. *Микронема.*

САРКОПЛА́ЗМА [sarcoplasma, LNH; *сарко-* + (*цито*) *плазма*] — цитоплазма поперечнополосатого мышечного волокна.

С. МЕЖФИБРИЛЛЯ́РНАЯ (s. interfibrillare, LNH) — С., расположенная в промежутках между миофибриллами.

САРКОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКАЯ СЕТЬ (reticulum sarcoplasmaticum, LNH) — структурный компонент поперечнополосатого мышечного волокна, представляющий собой систему цистерн, окружающих миофибриллы на уровне изотропного диска, и канальцев, отходящих от цистерн в продольном направлении.

САРКОПСИЛЛЁЗ (sarcopsyllosis) — тропическая паразитарная болезнь, вызываемая внедрением в кожу пальцев стоп земляной, или песчаной блохи (Tunga penetrans); характеризуется образованием крупного воспалительного инфильтрата в месте внедрения паразита.

SARCÓPTES SCABIÉI (син.: зудень чесоточный, клещ чесоточный) — клещ сем. Acaridae, надсем. Sarcoptoidea, отр. Acariformes; внутрикожный паразит, вызывающий чесотку у человека.

САРКОСПОРИ́ДИИ (sarcosporidia) — группа простейших кл. споровиков; нек-рые представители рода Sarcocystis вызывают саркоспоридиоз у человека.

САРКОСПОРИДИО́З (sarcosporidiosis; син. саркоцистоз) — протозойная инвазия, вызываемая саркоспоридиями рода Sarcocystis; у человека, как правило, протекает бессимптомно.

С. КИШЕ́ЧНЫЙ — С., вызываемый Sarcocystis suihominis и Sarcocystis bovihominis, обусловленный внедрением их инвазионных стадий в клетки подслизистой основы стенки тонкой кишки; иногда проявляется диспептическими явлениями; распространен широко.

С. МЫ́ШЕЧНЫЙ — С., вызываемый Sarcocystis lindemanni, обусловленный внедрением спорозоитов в мышцы с образованием небольших цист, впоследствии обызвествляющихся; иногда сопровождается недомоганием, мышечными болями, встречается крайне редко.

SARCOCYSTIS — род простейших сем. Sarcocystidae, отр. *Coccidiida*, кл. споровиков, паразитирующих в тканях (чаще в мышцах) млекопитающих; три вида S. являются возбудителями саркоспоридиоза человека.

S. BOVIHÓMINIS — вид саркоспоридий рода S., окончательным хозяином к-рого является человек, а промежуточным хозяином — свиньи; возбудитель кишечного саркоспоридиоза у человека.

S. LÍNDEMANNI — вид саркоспоридий рода S., промежуточным хозяином к-рого является человек, окончательный хозяин не выяснен; возбудитель мышечного саркоспоридиоза у человека.

S. SUIHÓMINIS — вид саркоспоридий рода S., окончательными хозяевами к-рого являются человек и нек-рые обезьяны, промежуточным хозяином — крупный рогатый скот; возбудитель кишечного саркоспоридиоза у человека.

САРКОЦИСТО́З (sarcocystosis) — см. *Саркоспоридиоз.*

САРКОЭНДОТЕЛИО́МА СИНОВИА́ЛЬНАЯ (sarcoendothelioma synoviale; *сарко-* + *эндотелиома*) — см. *Саркома синовиальная.*

SARCÍNA LÚTEA (Ber; сарцина желтая) — микроорганизм рода сарцин сем. Peptococcaceae; грамположительные кокки, образующие на агаре крупные желтоватые колонии; обнаруживается на поверхности кожи человека, условно патогенен.

САРЦИ́НЫ (Sarcinae, Ber; лат. sarcina связка, тюк) — род микроорганизмов сем. Peptococcaceae, объединяющий кокки, образующие комплексы (пакеты), состоящие из восьми и более клеток, возникающие в результате деления клетки в трех взаимноперпендикулярных плоскостях; нек-рые виды С. являются условно-патогенными для человека.

САТАНОФОБИ́Я (греч. satanos сатана + *фобия*) — см. *Демонофобия.*

САТ-ЗО́НЫ (лат. sine acido thymonucleinico без тимонуклеиновой кислоты; син. САТ-перетяжки — устар.) — слабо окрашивающиеся по Фейльгену вторичные хромосомные перетяжки такой же ширины, как и тело хромосомы; участвуют в образовании ядрышек.

САТ-ПЕРЕТЯ́ЖКИ (устар.) — см. *САТ-зоны.*

САТИРИА́ЗИС (satyriasis; греч. satyros сатир) — патологическое повышение полового влечения у мужчин в виде постоянного чувства полового неудовлетворения и безудержного стремления к половым сношениям.

СА́ТО НОЖ (T. Sato, японский хирург) — тонкий нож с резко изогнутой плоской режущей рабочей частью, предназначенный для нанесения несквозных насечек на роговицу при оперативном лечении кератоконуса и астигматизма.

СА́ТТОНА АНГИО́МА (R. L. Sutton, 1878—1952, амер. дерматолог) — см. *Ангиокератома ограниченная невиформная мошонки.*

СА́ТТОНА А́ФТЫ (R. L. Sutton) — см. *Стоматит рубцующийся.*

СА́ТТОНА БОЛЕ́ЗНЬ (R. L. Sutton) — см. *Саттона невус.*

СА́ТТОНА НЕ́ВУС (R. L. Sutton; син.: лейкодерма центробежная приобретенная, Саттона болезнь) — разновидность пигментного невуса, отличающаяся наличием депигментированного ободка.

САТУРА́ТОР (лат. saturo, saturatum насыщать) — аппарат для насыщения жидкости газом; нек-рые виды С. применяются в медицине, напр. при кислородной терапии.

САТУРА́ЦИЯ (лат. saturatio насыщение) в медицине — насыщение жидкостей и тканей организма газом (гл. обр. азотом) в условиях повышенного барометрического давления.

САТУРНИ́ЗМ (лат. Saturnus — название свинца у алхимиков) — хроническое отравление свинцом; характеризуется нарушением обмена порфиринов с явлениями анемии, свинцовым полиневритом (полиневропатией), свинцовыми коликами и другими расстройствами.

САУРИА́З (sauriasis; греч. saura ящерица + *-иаз*) — см. *Ихтиоз.*

СА́УТТЕРА — ПУ́ТТИ ОПЕРА́ЦИЯ (R. Soutter, 1870—1933, амер. хирург; V. Putti, 1880—1940, итал. хирург) — хирургическая операция: поднадкостничное отделение портняжной мышцы и мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра, от подвздошной кости с последующим прикреплением их на 3—4 *см* дистальнее; применяется при сгибательной контрактуре в тазобедренном суставе.

САФРАНЕЛИ́Н — см. *Минервини краска.*

САФРАНИ́Н (арабск. zafaran шафран) — основной анилиновый краситель, применяемый в гистологической технике для выявления клеточных ядер, к-рые окрашиваются в красный цвет.

САХАРА́ — общее название низкомолекулярных углеводов — моно- и олигосахаридов.

САХАРА́ ПРОСТЫ́Е — см. *Моносахариды.*

САХАРА́ЗА — см. *β-Фруктофуранозидаза.*

САХАРИ́МЕТР (сахар + греч. metreō определять, измерять) — оптический прибор для определения концентрации сахаров в растворе по величине угла вращения плоскости поляризации света.

САХА́РНАЯ КРИВА́Я — см. *Гликемическая кривая.*

САХА́РНАЯ НАГРУ́ЗКА — дозированное введение сахара в организм; используется, напр., для исследования инкреторной функции поджелудочной железы.

САХА́РНАЯ ПРО́БА ТУМИО́ТТО — см. *Тумиотто сахарная проба.*

САХА́РНЫЙ УКО́Л — см. *Бернара сахарный укол.*

САХАРО́ЗА — дисахарид, состоящий из остатков глюкозы и фруктозы.

САХАРОМЕ́Р — прибор для определения процентного содержания сахаров в растворе по его плотности; разновидность ареометра.

САХАРОМИКО́З — см. *Криптококкоз.*

СБАЛАНСИ́РОВАННОСТЬ АМИНОКИСЛО́Т — соотношение аминокислот в рационе питания, обеспечивающее максимальное их использование организмом и соответствующее его потребностям.

СБАЛАНСИ́РОВАННОСТЬ ПИЩЕВЫ́Х ВЕЩЕ́СТВ — соотношение пищевых веществ в рационе питания, обеспечивающее максимальную усвояемость пищи и соответствующее потребностям организма.

СБОР (species) — твердая лекарственная форма́, представляющая собой смесь нескольких видов измельченного, реже цельного, лекарственного растительного сырья, иногда с добавлением других лекарственных средств; используется гл. обр. для приготовления настоев и отваров.

СБОР ПОРАЖЁННЫХ — совокупность мероприятий по розыску и выносу (вывозу) пораженных с поля боя (из очагов санитарных потерь).

СВА́ЙНИК-ВЕЛИКА́Н — см. *Dioctophyma renale.*

СВЕ́НСОНА — ХИ́АТТА ОПЕРА́ЦИЯ (O. Swenson, род. в 1909 г., амер. хирург; R. Hiatt) — двухэтапная хирургическая операция при болезни Гиршпрунга, заключающаяся во внутрибрюшинной мобилизации сигмовидной и прямой кишки (первый этап), эвагинации мобилизированной части через прямую

кишку и ее внебрюшинной резекции, включая аганглионарную зону, с наложением анастомоза между оставленными частями сигмовидной и прямой кишки.

СВЕРДЛО́ВА АППАРА́Т (Ю. М. Свердлов, род. в 1914 г., сов. ортопед-травматолог) — ортопедический аппарат для вправления неполного вывиха стопы и восстановления межберцового синдесмоза, накладываемый в области лодыжек и сближающий их.

СВЕРДЛО́ВА ОПЕРА́ЦИЯ (Ю. М. Свердлов) — хирургическая операция: создание из сухожилий ключовидно-плечевой мышцы и длинной головки двуглавой мышцы плеча двух связок, поддерживающих головку плечевой кости; применяется при привычном вывихе плеча.

СВЕРЛОСТРУ́Г — см. *Риханотрепан.*

СВЁРТЫВАНИЕ КРО́ВИ — превращение крови из жидкости в эластичный сгусток в результате перехода фибриногена в нерастворимый фибрин, к-рый, полимеризуясь, образует фибриллярную основу сгустка.

СВЕРХВЫСОКОЧАСТО́ТНЫЕ КОЛЕБА́НИЯ (СВЧ) — электромагнитные колебания частотой от $3 \cdot 10^8$ до $3 \cdot 10^{11}$ *гц*; используются в физиотерапии для локального поверхностного нагрева тканей организма.

СВЕРХДОМИНИ́РОВАНИЕ — бо́льшая приспособленность к условиям внешней среды гетерозиготы по сравнению с обеими соответствующими гомозиготами.

СВЕРХКОМПЕНСА́ЦИЯ в психиатрии — см. *Гиперкомпенсация.*

СВЕ́РХПАСТЕРИЗА́ЦИЯ — см. *Уперизация.*

СВЕРХЦЕ́ННОЕ УВЛЕЧЕ́НИЕ — вид деятельности, обладающий для психически больного особой аффективной насыщенностью и приобретающий доминирующее значение для его личности (напр., коллекционирование, разработка системы мероприятий для сохранения собственного здоровья).

СВЕТ — 1) см. *Излучение видимое*; 2) см. *Излучение оптическое.*

СВЕТИ́ЛЬНИК — устройство для освещения, состоящее из источника света и осветительной арматуры, формирующей световой поток.

С. БЕСТЕНЕВО́Й (син. бестеневая лампа) — С. для равномерного освещения, напр. операционного поля, с различных направлений за счет использования нескольких источников света и (или) многократного отражения света от арматуры.

С. СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ — С., предназначенный для освещения полости рта при осмотре, лечебных манипуляциях или операциях.

СВЕТЛОТА́ — безразмерная величина, характеризующая различие субъективного восприятия яркости двух смежных одноцветных поверхностей.

СВЕ́ТЛЫЙ ПРОМЕЖУ́ТОК — период фазно или приступообразно протекающей психической болезни, во время к-рого полностью или почти полностью отсутствуют симптомы болезни.

СВЕ́ТЛЫЙ ЦЕНТР (centrum lucidum, LNH; син.: реактивный центр, центр размножения) — центральная часть лимфатического фолликула селезенки или лимфатического узла; место наиболее интенсивного деления лимфоцитов.

СВЕТОБОЯ́ЗНЬ (photophobia; син. фотофобия) — повышенная чувствительность глаза к световому раздражению; наблюдается, напр., при воспалительных заболеваниях переднего отдела глаза.

С. РЕТИНА́ЛЬНАЯ (p. retinalis) — С., развивающаяся в результате раздражения светочувствительных элементов сетчатки чрезмерно интенсивным световым потоком.

СВЕТОВО́Й ИМПУЛЬС — количественная характеристика импульсного светового потока, измеряемая общим количеством энергии, падающим за период вспышки на 1 $см^2$ поверхности, перпендикулярной потоку; выражается в $кал/см^2$; применяется для оценки поражающего действия светового излучения ядерных взрывов и других импульсных источников света.

СВЕТОВО́Й КО́НУС (син. рефлекс световой) — наблюдаемое при отоскопии отражение света от барабанной перепонки в виде блестящего треугольника, расположенного в ее передненижнем сегменте и обращенного вершиной к центру; исчезновение С. к. или изменение его формы имеет диагностическое значение.

СВЕТОВО́Й КОЭФФИЦИЕ́НТ — санитарный показатель естественного освещения помещений, представляющий собой отношение площади остекленной поверхности окон к площади пола.

СВЕТОВО́Й УДА́Р — см. *Фотостресс.*

СВЕТОКОАГУЛЯ́ТОР — см. *Фотокоагулятор.*

СВЕТОКОАГУЛЯ́ЦИЯ — см. *Фотокоагуляция.*

СВЕТОЛЕЧЕ́НИЕ (син. фототерапия) — метод физиотерапии, заключающийся в дозированном воздействии на организм больного инфракрасного, видимого или ультрафиолетового излучения.

СВЕТООФТАЛЬМОКОАГУЛЯ́ТОР — см. *Офтальмокоагулятор.*

СВЕТООЩУЩЕ́НИЕ — ощущение, возникающее при воздействии светового излучения на сетчатку.

СВЕТОФИ́ЛЬТР — оптическое устройство, предназначенное для изменения спектрального состава, поляризации и (или) уменьшения величины проходящего через него светового потока; С. широко применяются в оптических медицинских приборах.

С. ИСПРАВЛЯ́ЮЩИЙ — см. *Светофильтр компенсационный.*

С. КОМПЕНСАЦИО́ННЫЙ (син. С. исправляющий) — С., изменяющий спектральный состав света так, чтобы компенсировать отличие спектральной чувствительности используемого в приборе фотоэлемента от спектральной чувствительности глаза человека.

С. НЕЙТРА́ЛЬНЫЙ — С., равномерно ослабляющий проходящий свет во всех участках спектра; применяется, напр., в защитных очках.

С. ПОЛЯРИЗАЦИО́ННЫЙ (син. поляроид) — С. для получения (или гашения) плоскополяризованного света, состоящий из вещества, обладающего выраженным свойством двойного лучепреломления; применяется, напр., в поляриметрах.

СВЕ́ЧИ — см. *Суппозитории ректальные.*

СВИДЕ́ТЕЛЬСТВО О БОЛЕ́ЗНИ — документ военно-медицинского учета, в к-ром оформляются результаты военно-врачебной экспертизы военнослужащего, отражающий состояние его здоровья, годность к дальнейшему прохождению военной службы и связь ранения (поражения, заболевания) с пребыванием на фронте или прохождением военной службы.

СВИДЕ́ТЕЛЬСТВО О ВАКЦИНА́ЦИИ МЕЖДУНАРО́ДНОЕ (син. сертификат) — установленный Международными медико-санитарными правилами документ для лиц, выезжающих за пределы страны, содержащий перечень и число полученных профилактических прививок; предъявляется по прибытии в другую страну.

СВИНЕ́Ц (Plumbum; Pb) — химический элемент IV группы периодической системы Д. И. Менделеева, ат. номер 82, ат. масса 207,2; тяжелый мягкий синевато-серый металл; С. и его соединения токсичны для человека; используется, напр., для защиты от ионизирующего излучения.

СВИ́НКА — см. *Паротит эпидемический.*

СВИНЦО́ВАЯ КАЙМА́ — лилово-серая полоска отложений сульфида свинца по краю десен и зубов при хроническом отравлении свинцом.

СВИНЦО́ВЫЙ ЭКВИВАЛЕ́НТ — показатель защитных свойств материала по отношению к ионизирующему излучению; выражается толщиной слоя свинца, обеспечивающего при заданных условиях такую же противолучевую защиту, как и рассматриваемый материал.

СВИФТА СИНДРО́М (H. Swift, 1858—1937, австралийский врач) — см. *Акродиния.*

СВИЩ (fistula; син. фистула) — отсутствующий в норме канал, выстланный грануляционной тканью или эпителием и соединяющий полости тела (в т. ч. патологические, напр. абсцессы), а также полые органы с внешней средой или между собой.

С. АЛЬВЕОЛЯ́РНЫЙ (f. alveolaris) — бронхоплевральный С., посредством к-рого с плевральной полостью сообщается просвет легочных альвеол, бронхиол или мельчайших ветвей сегментарных бронхов.

С. АОРТОПУЛЬМОНА́ЛЬНЫЙ (f. aortopulmonalis) — врожденный С., соединяющий аорту и легочный ствол; относится к врожденным порокам сердца.

С. АРТЕРИОВЕНО́ЗНЫЙ (f. arteriovenosa; син. анастомоз артериовенозный) — С., посредством к-рого просвет артерии сообщается с просветом сопутствующей вены; возникает, напр., в результате травмы.

С. АСЦИТИ́ЧЕСКИЙ (f. ascitica) — С., соединяющий брюшную полость с внешней средой, через к-рый выделяется асцитическая жидкость; чаще образуется на месте лапароцентеза.

С. БРОНХИА́ЛЬНЫЙ (f. bronchialis; син. С. бронхоторакальный) — наружный С., идущий из просвета бронха через грудную стенку и открывающийся на поверхности кожи или в глубине незаживающей раны; возникает как осложнение ранения легкого, чаще огнестрельного.

С. БРОНХОЖЕЛУ́ДОЧНЫЙ (f. bronchogastrica) — С., посредством к-рого просвет бронха сообщается с просветом желудка; возникает гл. обр. как осложнение сочетанного ра-

ления органов грудной и брюшной полости.

С. БРОНХОЛЁГОЧНЫЙ (f. bronchopulmonalis) — С., посредством к-рого просвет бронха сообщается с патологической полостью (напр., с абсцессом) в легком.

С. БРОНХОПЕЧЁНОЧНЫЙ (f. bronchohepatica) — С., посредством к-рого просвет бронха сообщается с патологической полостью в паренхиме печени или с внутрипеченочными желчными протоками; возникает, напр., при прорыве абсцесса печени в грудную полость через диафрагму.

С. БРОНХОПИЩЕВО́ДНЫЙ (f. bronchoesophagea) — С., посредством к-рого просвет бронха сообщается с просветом пищевода; возникает, напр., при повреждении тканей пищевода инородным телом.

С. БРОНХОПЛЕВРА́ЛЬНЫЙ (f. bronchopleuralis) — внутренний С., посредством к-рого просвет бронха сообщается с плевральной полостью; возникает, напр., при ранении легкого, при прорыве эмпиемы плевры в бронх.

С. БРОНХОПЛЕВРОТОРАКА́ЛЬНЫЙ (f. bronchopleurothoracalis) — бронхиальный С., соединяющий просвет бронха с плевральной полостью, а затем, проходя через грудную стенку, с внешней средой.

С. БРОНХОТОРАКА́ЛЬНЫЙ (f. bronchothoracalis) — см. *Свищ бронхиальный.*

С. БРЮШНОСТЕ́НОЧНО-МА́ТОЧНЫЙ (f. abdominouteralis) — наружный С. матки, проходящий через переднюю брюшную стенку; редкое осложнение абдоминального кесарева сечения.

С. ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ (f. vaginalis) — общее название С., посредством к-рых полость влагалища сообщается с полостью какого-либо соседнего органа, напр. мочевого пузыря, прямой кишки.

С. ВНУ́ТРЕННИЙ (f. interna) — С., соединяющий между собой просветы полых органов или полости тела (в т. ч. патологические) и не открывающийся на поверхности тела.

С. ВРОЖДЁННЫЙ (f. congenita) — С., возникающий как аномалия развития, напр. при незаращении эмбриональных протоков или щелей.

С. ГАСТРОДУОДЕНА́ЛЬНЫЙ (f. gastroduodenalis) — межорганный С., посредством к-рого желудок сообщается с двенадцатиперстной кишкой; возникает чаще как осложнение хирургической операции на желудке.

С. ГНОЙНЫЙ (f. suppurativa) — С., посредством к-рого очаг гнойного воспаления сообщается с внешней средой или какой-либо полостью (полым органом).

С. ГРАНУЛИ́РУЮЩИЙ (f. granulosa) — см. *Свищ несформировавшийся.*

С. ГУБОВИ́ДНЫЙ (f. labiiformis) — наружный С. полого органа, слизистая оболочка к-рого непосредственно переходит в кожу, окружающую отверстие С.

С. ДЕРМО́ИДНЫЙ (f. dermoidea) — врожденный наружный свищ дермоидной кисты; стенки С. д. выстланы эпителием.

С. ДЕСНЕВО́Й (f. gingivalis) — С., посредством к-рого абсцесс в периодонте или в толще челюсти сообщается с полостью рта.

С. ДУОДЕНА́ЛЬНЫЙ (f. duodenalis) — наружный С. двенадцатиперстной кишки, возникающий чаще как осложнение резекции желудка.

С. ЖЕЛУ́ДОЧНО-КИШЕ́ЧНЫЙ (f. gastrointestinalis) — общее название С., посредством к-рых полость желудка сообщается с просветом какого-либо отдела кишечника.

С. ЖЕЛУ́ДОЧНО-ПЛЕВРА́ЛЬНЫЙ (f. gastropleuralis) — С., посредством к-рого полость желудка сообщается с плевральной полостью; возникает, напр., при сочетанном ранении органов грудной и брюшной полости.

С. ЖЕЛУ́ДОЧНЫЙ (f. gastrica) — наружный С. желудка; возникает как осложнение хирургической операции на желудке или проникающего ранения живота.

С. ЖЁЛЧНЫЙ (f. biliaris; син. С. печеночный) — наружный С. желчных путей; возникает как осложнение хирургической операции на желчных путях или проникающего ранения живота.

С. ЗА́ДНЕГО ПРОХО́ДА (f. ani) — наружный С., одно отверстие к-рого находится на слизистой оболочке заднего прохода, а другое открывается на коже около него; возникает, напр., при подкожном парапроктите.

С. ИСКУ́ССТВЕННЫЙ (f. artificialis) — общее название анастомозов и стом, созданных хирургическим путем.

С. ИСКУ́ССТВЕННЫЙ ПИЩЕПРИЁМНЫЙ (f. nutricia artificialis) — наружный искусственный С. желудка или начального отдела тонкой кишки, созданный для введения пищи при невозможности питания через рот.

С. КА́ЛОВЫЙ (f. faecalis) — наружный С. толстой кишки, через к-рый происходит отделение кала.

С. КАРОТИ́ДНО-КАВЕРНО́ЗНЫЙ (f. carotidocavernosa) — С., посредством к-рого внутренняя сонная артерия сообщается с яремной веной; возникает при травмах или опухолях.

С. КИШЕ́ЧНО-ПРОМЕ́ЖНОСТНЫЙ (f. intestinoperinealis) — см. *Свищ ректоперинеальный.*

С. КИШЕ́ЧНО-ПУПО́ЧНЫЙ (f. intestinoumbilicalis; син. С. пупочно-кишечный) — врожденный кишечный С., открывающийся в области пупка; результат незаращения желточного протока.

С. КИШЕ́ЧНЫЙ (f. intestinalis) — наружный С. кишки, проходящий через брюшную стенку; возникает гл. обр. как осложнение хирургической операции на кишечнике или проникающего ранения живота.

С. КИШЕ́ЧНЫЙ КАНАЛОВИ́ДНЫЙ — см. *Свищ кишечный трубчатый.*

С. КИШЕ́ЧНЫЙ НЕПО́ЛНЫЙ (f. intestinalis incompleta) — С. к., через к-рый выделяется лишь часть кишечного содержимого, а остальное перемещается в дистальные отделы кишечника.

С. КИШЕ́ЧНЫЙ ПО́ЛНЫЙ (f. intestinalis completa) — С. к., через к-рый выделяется все содержимое проксимальной части кишечника.

С. КИШЕ́ЧНЫЙ ТРУ́БЧАТЫЙ (f. intestinalis tubularis; син. С. кишечный каналовидный) — С. к., стенки к-рого не выстланы слизистой оболочкой.

С. КОРОНА́РНО-ЖЕЛУ́ДОЧКОВЫЙ (f. coronarioventricularis) — коронарно-сердечный С., посредством к-рого просвет венечной артерии сообщается с полостью желудочка сердца.

С. КОРОНА́РНО-СЕРДЕ́ЧНЫЙ (f. coronariocardiaca) — С., посредством к-рого венечная артерия сообщается с какой-либо полостью сердца; относится к врожденным порокам сердца.

С. КУ́ПЕРОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ (f. glandulae Cooperi) — наружный С. бульбоуретральной железы, возникающий обычно при прорыве ее абсцесса.

С. ЛИГАТУ́РНЫЙ (f. lipaturalis) — гнойный С., возникающий после хирургической операции в связи с возникновением абсцесса в тканях, окружающих нить из нерассасывающегося шовного материала.

С. ЛИ́КВОРНЫЙ (f. liquorica) — С. подпаутинного пространства, через к-рый постоянно истекает цереброспинальная жидкость; возникает, напр., при травме.

С. МА́ТОЧНО-ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ (f. uterovaginalis) — см. *Свищ шеечно-влагалищный.*

С. МА́ТОЧНО-ПУЗЫ́РНЫЙ (f. uterovesicalis) — межорганный С., посредством к-рого полость матки сообщается с полостью мочевого пузыря; возникает, напр., при травмах и опухолях.

С. МА́ТОЧНО-РЕКТА́ЛЬНЫЙ (f. uterorectalis) — межорганный С., посредством к-рого полость матки сообщается с просветом прямой кишки; возникает, напр., при травмах и опухолях.

С. МЕЖО́РГАННЫЙ (f. interorganica) — внутренний С., посредством к-рого сообщаются между собой просветы двух и более полых органов.

С. МОЧЕПОЛОВО́Й (f. urogenitalis) — общее название С., посредством к-рых какой-либо участок мочевых путей сообщается с полостью (просветом) какого-либо полового органа.

С. МОЧЕПУЗЫ́РНЫЙ НАДЛОБКО́ВЫЙ (f. vesicosuprapubica) — искусственный наружный С. мочевого пузыря, открывающийся на коже передней стенки живота в лобковой области; накладывается для выведения мочи из мочевого пузыря.

С. МОЧЕТО́ЧНИКОВО-ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ (f. ureterovaginalis) — см. *Свищ уретеровагинальный.*

С. НАРУ́ЖНОГО У́ХА (f. auris externae) — гнойный наружный С. при перихондрите ушной раковины.

С. НАРУ́ЖНЫЙ (f. externa) — открывающийся на поверхности кожи С., посредством к-рого полость тела (в т. ч. патологическая, напр. абсцесс) или просвет полого органа сообщаются с внешней средой.

С. НЕСФОРМИРОВА́ВШИЙСЯ (син. С. гранулирующий) — наружный С., стенки к-рого образованы грануляционной тканью и не выстланы эпителием.

С. ОКОЛОКО́ПЧИКОВЫЙ (f. paracoccygea) — гнойный С., исходящий из абсцесса (натечника) копчика, открывающийся на коже или в прос-

вет прямой кишки; возникает при остеомиелите, туберкулезе или как аномалия развития.

С. ПАНКРЕАТИ́ЧЕСКИЙ (f. pancreatica) — наружный С. поджелудочной железы; возникает как осложнение хирургической операции или проникающего ранения живота.

С. ПАРАМЕТРИОПУЗЫ́РНЫЙ (f. parametriovesicalis) — С., посредством к-рого абсцесс параметрия сообщается с полостью мочевого пузыря.

С. ПАРАРЕКТА́ЛЬНЫЙ (f. pararectalis) — С., посредством к-рого параректальный абсцесс сообщается с просветом прямой кишки и (или) с внешней средой.

С. ПЕРЕХО́ДНЫЙ — кишечный С., слизистая оболочка к-рого сращена с кожей не по всей окружности отверстия; в последующем может превратиться в губовидный С.

С. ПЕЧЕ́НОЧНЫЙ (f. hepatica) — см. *Свищ желчный.*

С. ПИЩЕВО́ДНО-ТРАХЕА́ЛЬНЫЙ (f. esophagotrachealis; син. С. трахеопищеводный) — С., посредством к-рого просвет пищевода сообщается с просветом трахеи; возникает, напр., как аномалия развития, при ранении или попадании инородного тела.

С. ПИЩЕВО́ДНЫЙ (f. esophagea) — наружный С. пищевода, обычно его шейной части; возникает, напр., как аномалия развития, осложнение ранения пищевода или в результате гнойного дивертикулита.

С. ПЛЕВРА́ЛЬНЫЙ (f. pleuralis) — наружный гнойный С. плевральной полости; возникает чаще как осложнение гнойного плеврита.

С. ПОСЛЕОПЕРАЦИО́ННЫЙ (f. postoperativa) — С., возникающий после хирургической операции как ее осложнение.

С. ПРИОБРЕТЁННЫЙ (f. acquisita) — С., возникший в результате болезни, повреждения или созданный искусственно.

С. ПРОМЕ́ЖНОСТНО-ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ (f. perineovaginalis) — влагалищный С., открывающийся на коже промежности; возникает, напр., при травмах и опухолях.

С. ПРЯМОКИШЕ́ЧНО-ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ (f. rectovaginalis) — влагалищный С., открывающийся в просвет прямой кишки; возникает, напр., при парапроктитах и опухолях.

С. ПУЗЫ́РНО-ВЛАГА́ЛИЩНО-РЕКТА́ЛЬНЫЙ (f. vesicovaginorectalis) — С., посредством к-рого сообщаются между собой полости мочевого пузыря и влагалища, а также просвет прямой кишки; возникает, напр., как осложнение ампутации матки.

С. ПУЗЫ́РНО-ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ (f. vesicovaginalis) — влагалищный С., открывающийся в полость мочевого пузыря; возникает, напр., при травмах и опухолях.

С. ПУЗЫ́РНО-МА́ТОЧНО-ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ (f. vesicouterovaginalis) — С., посредством к-рого сообщаются между собой полости мочевого пузыря, матки и влагалища; возникает, напр., при распаде опухоли.

С. ПУЗЫ́РНО-ПРЯМОКИШЕ́ЧНЫЙ (f. vesicorectalis) — С., посредством к-рого полость мочевого пузыря сообщается с просветом прямой кишки.

С. ПУЗЫ́РНО-ПУПО́ЧНЫЙ (f. vesicoumbilicalis) — врожденный наружный С. мочевого пузыря, открывающийся в области пупка; результат незаращения мочевого протока.

С. ПУЗЫ́РНО-ШЕ́ЕЧНЫЙ (f. vesicocervicalis) — С., посредством к-рого полость мочевого пузыря сообщается с каналом шейки матки; возникает, напр., как осложнение патологических родов.

С. ПУПКА́ ВРОЖДЁННЫЙ (f. umbilici congenita; син. С. пупочный) — общее название пузырно-пупочного и пупочно-кишечного С.

С. ПУПО́ЧНО-КИШЕ́ЧНЫЙ (f. umbilicointestinalis) — см. *Свищ кишечно-пупочный.*

С. ПУПО́ЧНЫЙ (f. umbilicalis) — см. *Свищ пупка врожденный.*

С. РЕКТОВЕСТИБУЛЯ́РНЫЙ (f. rectovestibularis) — С., посредством к-рого полость прямой кишки сообщается с преддверием влагалища; возникает, напр., как аномалия развития.

С. РЕКТОПАРАРЕКТА́ЛЬНЫЙ (f. rectopararectalis) — параректальный С., открывающийся в просвет прямой кишки.

С. РЕКТОПЕРИНЕА́ЛЬНЫЙ (f. rectoperinealis; син. С. кишечно-промежностный) — наружный С. прямой кишки, открывающийся на коже промежности; возникает, напр., в случае атрезии заднего прохода.

С. РЕКТОУРЕТРА́ЛЬНЫЙ (f. rectourethralis) — см. *Свищ уретроректальный.*

С. САЛЬПИНГОПУЗЫ́РНЫЙ (f. salpingovesicalis) — С., посредством к-рого просвет маточной трубы сообщается с полостью мочевого пузыря; возникает, напр., при травмах и опухолях.

С. СЛЮННО́Й (f. salivaria) — С., посредством к-рого патологическая полость в слюнной железе (чаще околоушной) или просвет ее протоков сообщается с полостью рта или (через отверстие на коже) с внешней средой; возникает, напр., как осложнение ранения железы или хирургической операции.

С. СФОРМИРОВА́ВШИЙСЯ (син. С. эпителизированный) — С., стенки к-рого образованы рубцовой тканью и выстланы эпителием.

С. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (f. traumatica) — С., формирующийся на месте раны, особенно в случае возникновения в ее глубине хронического воспалительного процесса (напр., вокруг инородного тела или отверстия в поврежденной кишке).

С. ТРАХЕА́ЛЬНЫЙ (f. trachealis) — наружный С. трахеи; возникает, напр., как позднее осложнение трахеостомии, как аномалия развития или последствие ранения трахеи.

С. ТРАХЕОПИЩЕВО́ДНЫЙ (f. tracheoesophagea) — см. *Свищ пищеводно-трахеальный.*

С. УРЕТЕРОВАГИНА́ЛЬНЫЙ (f. ureterovaginalis; син. С. мочеточниково-влагалищный) — С., посредством к-рого просвет мочеточника сообщается с полостью влагалища; возникает, напр., при опухоли или травмах.

С. УРЕТРА́ЛЬНЫЙ (f. urethralis) — наружный С. мочеиспускательного канала, открывающийся на коже; возникает, напр., в результате его ранения.

С. УРЕТРОВАГИНА́ЛЬНЫЙ (f. urethrovaginalis) — С., посредством к-рого мочеиспускательный канал сообщается с полостью влагалища; возникает, напр., как осложнение патологических родов.

С. УРЕТРОПЕРИНЕА́ЛЬНЫЙ (f. urethroperinealis; син.: фистула промежности, фистула уретроперинеальная) — наружный уретральный С., открывающийся на коже промежности.

С. УРЕТРОРЕКТА́ЛЬНЫЙ (urethrorectalis; син. С. ректоуретральный) — С., посредством к-рого мочеиспускательный канал сообщается с просветом прямой кишки; возникает, напр., как аномалия развития.

С. УРЕТРОПРОСТАТОРЕКТА́ЛЬНЫЙ (f. urethroprostatorectalis) — уретроректальный С., проходящий сквозь ткань предстательной железы; возникает, напр., как осложнение ранения тазовых органов или операций на предстательной железе промежностным доступом.

С. ШЕ́ЕЧНО-ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ (f. cervicovaginalis; син. С. маточно-влагалищный) — С., посредством к-рого просвет канала шейки матки сообщается с полостью влагалища в области его свода; возникает, напр., при травмах и опухолях.

С. ЭПИТЕЛИЗИ́РОВАННЫЙ — см. *Свищ сформировавшийся.*

СВИЩ БРАНХИОГЕ́ННЫЙ (fistula branchiogena; син. свищ жаберный) — аномалия развития: узкий слепой канал, возникающий из остатков жаберных борозд зародыша.

С. БРАНХИОГЕ́ННЫЙ ЭКТОДЕРМА́ЛЬНЫЙ (f. branchiogena ectodermalis; син. свищ шеи боковой) — С. б., открывающийся на коже боковой поверхности шеи в области, ограниченной проекциями грудино-ключично-сосцевидных мышц и подъязычной кости.

С. БРАНХИОГЕ́ННЫЙ ЭНТОДЕРМА́ЛЬНЫЙ (f. branchiogena entodermalis) — С. б., открывающийся на слизистой оболочке боковой поверхности глотки, реже гортани или трахеи.

СВИЩ ЖА́БЕРНЫЙ — см. *Свищ бранхиогенный.*

СВИЩ ШЕ́И БОКОВО́Й — см. *Свищ бранхиогенный эктодермальный.*

СВОД мозга (fornix, PNA, BNA, JNA) — совокупность двух изогнутых тяжей белого вещества головного мозга, расположенных под мозолистым телом, соединенных в средней части в виде тела С., а спереди и сзади расходящихся, образуя соответственно столбы и ножки С.

СВОД ВЛАГА́ЛИЩА (fornix vaginae, PNA, BNA, JNA) — пространство между стенкой влагалища и влагалищной частью шейки матки; различают передний и задний С. в.

СВОД ГЛО́ТКИ (fornix pharyngis, PNA, BNA, JNA) — верхняя стенка глотки, прикрепленная к основанию черепа.

СВОД КОНЪЮНКТИ́ВЫ (fornix conjunctivae, PNA, BNA, JNA) — часть конъюнктивы в местах ее перехода с век на глазное яблоко; различают верхний и нижний С. к.

СВОД ПРЕДДВЕ́РИЯ РТА (fornix vestibuli oris) — часть преддверия рта в области перехода слизистой оболочки

с губ и щек на альвеолярные отростки челюстей.

СВОД СТОПЫ́ — конфигурация скелета стопы в виде свода, опирающегося на пяточный бугор, а также головки I и V плюсневых костей и укрепленного связками и мышцами.

С. СТОПЫ ПОПЕРЕ́ЧНЫЙ — совокупность арок, образующих С. с., идущих в поперечном направлении.

С. СТОПЫ ПРОДО́ЛЬНЫЙ — совокупность арок, образующих С. с., идущих в продольном направлении.

СВОД ЧЕ́РЕПА (calvaria, PNA, BNA, JNA; син.: крыша черепа, черепной свод) — верхняя выпуклая часть мозгового черепа, образованная лобной чешуей, теменными костями, верхним отделом затылочной чешуи, чешуями височных костей и верхним отделом большого крыла клиновидной кости.

СВЧ-ТЕРАПИ́Я — см. *Терапия микроволновая.*

СВЯ́ЗКА (-И) (ligamentum, -a, PNA, BNA, JNA) — соединительнотканное волокнистое образование в виде пучка, тяжа или пластины, соединяющее кости (синдесмоз) или входящее в состав удерживающего (подвешивающего) аппарата внутренних органов; кроме того, С. называют дупликатуры и листки серозных оболочек, соединяющие органы со стенками полостей тела или между собой, а также облитерированные эмбриональные сосуды и протоки.

С. АКРОМИА́ЛЬНО-КЛЮВОВИ́ДНАЯ (l. acromiocoracoideum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *179.*

С. АКРОМИА́ЛЬНО-КЛЮЧИ́ЧНАЯ (l. acromioclaviculare, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *12.*

С. АРА́НЦИЕВА (l. Arantii) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *666.*

С. АРТЕРИА́ЛЬНАЯ (l. arteriosum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *53.*

С. АТЛА́НТА КРЕСТООБРА́ЗНАЯ (l. cruciforme atlantis, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *228.*

С. АТЛА́НТА ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. transversum atlantis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *631.*

С. АТЛАНТООСЕВА́Я КОЛЛАТЕРА́ЛЬНАЯ МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. collaterale atlantoaxiale mediale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *57.*

С. АТЛАНТООСЕВА́Я МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. atlantoaxiale mediale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *57.*

С. АТЛАНТООСЕВА́Я ПЕРЕ́ДНЯЯ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (l. epistrophicoatlanticum anticum superficiale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *260.*

С. БАГРО́ВАЯ (l. subcruentum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *566.*

С. БАРАБА́ННЫХ КО́СТОЧЕК (l. ossiculorum tympani, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *421.*

С. БЕДРА́ ЗОНА́ЛЬНАЯ (l. zonale femoris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *680.*

С. БЕДРА́ КОЛЬЦЕВА́Я (l. annulare femoris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *680.*

С. БЕДРА́ КРУ́ГЛАЯ (l. teres femoris, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *106.*

С. БЕ́ЛОЙ ЛИ́НИИ ТРЕУГО́ЛЬНАЯ (l. triangulare lineae albae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *646.*

С. БЕРТЕ́НОВА (l. Bertini) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *303.*

СВЯЗКА БИ́ГЕЛОУ (l. Bigelowi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *78.*

С. БОЛЬШЕБЕРЦО́ВО - ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ (l. tibionaviculare, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *625.*

С. БОТА́ЛЛОВА (l. Botalli) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *53.*

С. БУГО́РКА РЕБРА́ (l. tuberculi costae, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *649.*

СВЯЗКА ВАЛЬСА́ЛЬВЫ (l. Valsalvae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *61.*

С. ВЕК ВИСО́ЧНАЯ (l. palpebrale temporale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *426.*

С. ВЕК ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. palpebrale laterale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *426.*

С. ВЕК МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. palpebrale mediale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *427.*

С. ВЕК НОСОВА́Я (l. palpebrale nasale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *427.*

С. ВЕНО́ЗНАЯ (l. venosum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *666.*

С. ВЕНО́ЗНОГО ПРОТО́КА (l. ductus venosi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *666.*

С. ВЕРТЛУ́ЖНОЙ ВПА́ДИНЫ ВОЛОКНИ́СТО-ХРЯЩЕВА́Я (l. cotyloideofibrocartilagineum acetabuli) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *201.*

С. ВЕРТЛУ́ЖНОЙ ВПА́ДИНЫ КРУ́ГЛАЯ (l. rotundum acetabuli, l. teres acetabuli) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *106.*

С. ВЕРТЛУ́ЖНОЙ ВПА́ДИНЫ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. transversum acetabuli, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *630.*

С. ВЕРХУ́ШЕЧНАЯ (l. apicum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *568.*

С. ВЕРХУ́ШКИ ЗУ́БА (l. apicis dentis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *38.*

С. ВЕРХУ́ШКИ КО́ПЧИКА (l. apicis coccygis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *490.*

С. ВИСО́ЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНА́Я (l. temporomandibulare, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *362.*

С. ВЛАГА́ЛИЩНАЯ (l. vaginale, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *659.*

С. ВНЕКА́ПСУЛЬНЫЕ (l. extracapsularia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *261.*

С. ВНУТРИКА́ПСУЛЬНЫЕ (l. intracapsularia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *349.*

С. ВНУТРИСУСТАВНЫЕ (l. intraarticularia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *348.*

С. ВОРОНКОТА́ЗОВАЯ (l. infundibulopelvicum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *577.*

С. ВСПОМОГА́ТЕЛЬНЫЕ (l. auxiliaria) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1.*

С. ВЫЙНАЯ (l. nuchae, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *415.*

СВЯЗКА ГЕ́НЛЕ (l. Henle) — см. *Паховый серп.*

СВЯ́ЗКА ГЕ́ССЕЛЬБАХА (l. Hesselbachi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *338.*

С. ГИМБЕРНА́ТОВА (l. Gimbernati) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *359.*

С. ГО́ЛЕНИ КРЕСТООБРА́ЗНАЯ (l. cruciatum cruris, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *495.*

С. ГО́ЛЕНИ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. transversum cruris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *496.*

С. ГОЛО́ВКИ БЕ́ДРЕННОЙ КО́СТИ (l. capitis femoris, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *106.*

С. ГОЛО́ВКИ МАЛОБЕРЦО́ВОЙ КО́СТИ (l. capituli fibulae, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *111.*

С. ГОЛО́ВКИ МАЛОБЕРЦО́ВОЙ КО́СТИ ЗА́ДНЯЯ (l. capitis fibulae posterius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *108.*

С. ГОЛО́ВКИ МАЛОБЕРЦО́ВОЙ КО́СТИ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. capitis fibulae anterius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *107.*

С. ГОЛО́ВКИ МОЛОТО́ЧКА ВЕ́РХНЯЯ (l. capituli mallei superius, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *380.*

С. ГОЛО́ВКИ РЕБРА́ ВНУТРИСУСТАВНА́Я (l. capitis costae intraarticulare, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *103.*

С. ГОЛО́ВКИ РЕБРА́ ЛУЧИ́СТАЯ (l. capitis costae radiatum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *104.*

С. ГОЛО́ВОК ПЛЮСНЕВЫ́Х КОСТЕ́Й ПОПЕРЕ́ЧНЫЕ [l. capitulorum (ossium metatarsalium) transversa, BNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *409.*

С. ГОЛО́ВОК ПЛЮСНЕВЫ́Х КОСТЕ́Й ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. capitulorum ossium metatarsi dorsalia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *118.*

С. ГОЛО́ВОК ПЯСТНЫ́Х КОСТЕ́Й ПОПЕРЕ́ЧНЫЕ [l. capitulorum (ossium metacarpalium) transversa, BNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *404.*

С. ГОЛОСОВА́Я (l. vocale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *673.*

С. ГОЛОСОВА́Я И́СТИННАЯ (l. vocale verum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *673.*

С. ГОЛОСОВА́Я ЛО́ЖНАЯ (l. vocale spurium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *672.*

С. ГОРОХОВИ́ДНОЙ И ГОЛО́ВЧАТОЙ КО́СТИ ЛАДО́ННАЯ (l. volare ossis pisiformis et hamati) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *448.*

С. ГОРОХОВИ́ДНО-КРЮЧКОВИ́ДНАЯ (l. pisohamatum, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *448.*

С. ГОРОХОВИ́ДНО-ПЯ́СТНАЯ (l. pisometacarpeum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *449.*

С. ГОРТА́НИ КОНИ́ЧЕСКАЯ (l. conoides laryngis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *214.*

С. ГРЕБЕШКО́ВАЯ (l. pectineale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *437.*

С. ГРУДИНОКЛЮЧИ́ЧНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. sternoclaviculare posterius,

PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *557*.
С. ГРУДИНОКЛЮЧИ́ЧНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. sternoclaviculare anterius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *556*.
С. ГРУДИНОПЕРИКАРДИА́ЛЬНЫЕ (l. sternopericardiaca, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *561*.
С. ГРУДИНОРЁБЕРНАЯ ВНУТРИСУСТАВНА́Я (l. sternocostale intraarticulare, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *559*.
С. ГРУДИНОРЁБЕРНЫЕ ЛУЧИ́СТЫЕ (l. sternocostalia radiata, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *560*.
С. ГРУДИНОРЁБЕРНАЯ МЕЖСУСТАВНА́Я (l. sternocostale interarticulare, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *559*.
С. ГРУДИНОСЕРДЕ́ЧНЫЕ НИ́ЖНЯЯ И ВЕ́РХНЯЯ (l. sternocardiaca inferius et superius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *561*.
С. ГУ́БНО-ПЛЕЧЕВЫ́Е (l. labiohumeralia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *285*.
С. ДВОЙНА́Я (l. bipartitum, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *77*.
С. ДЕЛЬТОВИ́ДНАЯ (l. deltoideum, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *389*.
С. ДИАФРАГМА́ЛЬНО-ЖЕЛУ́ДОЧНАЯ ЛЕ́ВАЯ (l. phrenicogastricum sinistrum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *281*.
С. ДИАФРАГМА́ЛЬНО-ЖЕЛУ́ДОЧНАЯ ПРА́ВАЯ (l. phrenicogastricum dextrum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *280*.
С. ДИАФРАГМА́ЛЬНО-ОБОДО́ЧНАЯ (l. phrenicocolicum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *440*.
С. ДИАФРАГМА́ЛЬНО-СЕЛЕЗЁНОЧНАЯ (l. phrenicolienale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *445*.
С. ДИАФРА́ГМЫ ВЕ́РХНЯЯ (l. superius diaphragmatis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *567*.
С. ДИАФРА́ГМЫ ДУГООБРА́ЗНАЯ ВНУ́ТРЕННЯЯ (l. arcuatum internum diaphragmatis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *48*.
С. ДИАФРА́ГМЫ ДУГООБРА́ЗНАЯ НАРУ́ЖНАЯ (l. arcuatum externum diaphragmatis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *47*.
С. ДЛИ́ННОГО ОТРО́СТКА МОЛОТО́ЧКА (l. processus longi mallei) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *378*.
С. ДОБА́ВОЧНЫЕ (l. accessoria) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1*.
С. ДУГ (l. arcuum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *269*.
С. ДУГООБРА́ЗНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. arcuatum laterale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *47*.
С. ДУГООБРА́ЗНАЯ МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. arcuatum mediale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *48*.
С. ДУГООБРА́ЗНАЯ НИ́ЖНЯЯ (l. arcuatum inferius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *50*.
С. ДУГООБРА́ЗНАЯ СРЕДИ́ННАЯ (l. arcuatum medianum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *49*.
С. ДУОДЕНА́ЛЬНО-ПЕЧЁНОЧНАЯ (l. duodenohepaticum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *292*.
С. ДУОДЕНА́ЛЬНО-ПО́ЧЕЧНАЯ (l. duodenorenale, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *256*.
С. ЖЁЛТЫЕ (l. flava, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *269*.
С. ЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (l. ventriculare, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *672*.
С. ЖЕЛУ́ДОЧНО-ДИАФРАГМА́ЛЬНАЯ (l. gastrophrenicum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *280*, *281*.
С. ЖЕЛУ́ДОЧНО-ОБОДО́ЧНАЯ (l. gastrocolicum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *275*.
С. ЖЕЛУ́ДОЧНО-ПЕЧЁНОЧНАЯ (l. gastrohepaticum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *295*.
С. ЖЕЛУ́ДОЧНО-СЕЛЕЗЁНОЧНАЯ (l. gastrolienale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *276*.
С. ЖИМБЕРНА́ТОВА (l. Gimbernati) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *359*.
С. ЗА́ГНУТАЯ (l. reflexum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *487*.
С. ЗАДЕ́РЖИВАЮЩИЕ (l. inhibentia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *316*.
С. ЗАДНЕПРОХО́ДНО-КО́ПЧИКОВАЯ (l. anococcygeum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *28*.
С. ЗАПЯ́СТНО-ПЯ́СТНЫЕ ЛАДО́ННЫЕ (l. carpometacarpea palmaria, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *132*.
С. ЗАПЯ́СТНО-ПЯ́СТНЫЕ ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. carpometacarpea dorsalia, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *131*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ДУГООБРА́ЗНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. arcuatum carpi dorsale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *42*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ КОЛЛАТЕРА́ЛЬНАЯ ЛОКТЕВА́Я (l. collaterale carpi ulnare, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *154*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ КОЛЛАТЕРА́ЛЬНАЯ ЛУЧЕВА́Я (l. collaterale carpi radiale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *153*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ КОЛЬЦЕВА́Я ЗА́ДНЯЯ (l. annulare carpi posterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *492*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ КОЛЬЦЕВА́Я ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. annulare carpi anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *128*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ЛАДО́ННАЯ (l. carpi volare, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *128*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ЛАДО́ННАЯ ЛУЧИ́СТАЯ (l. carpi volare radiatum, JNA) — см. 3, Перечень анат. терминов, *126*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ЛАДО́ННАЯ СО́БСТВЕННАЯ (l. carpi volare proprium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *493*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ЛУЧИ́СТАЯ (l. carpi radiatum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *126*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ МЕЖКО́СТНЫЕ (l. carpi interossea) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *321*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ О́БЩАЯ ГЛУБО́КАЯ (l. carpi commune profundum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *153*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. carpi transversum, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *493*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. carpi dorsale, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *492*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ТЫ́ЛЬНАЯ О́БЩАЯ (l. carpi dorsale commune) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *492*.
С. ЗАТЫ́ЛОЧНО-АКСИА́ЛЬНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. occipitoaxiale posterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *419*.
С. ЗЕ́ММЕРРИНГОВА (l. Soemmerringi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *573*.
С. ЗУ́БА КРЫЛОВИ́ДНАЯ (l. alare dentis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *16*.
С. ЗУ́БЧАТАЯ (l. denticulatum, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *248*.
С. КАНА́ЛЬЦЕВ ЛАБИРИ́НТА (l. canaliculorum labyrinthi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *102*.
С. КАУДА́ЛЬНАЯ (l. caudale, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *490*.
С. КВАДРА́ТНАЯ (l. quadratum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *480*.
С. КЛИНОВИ́ДНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНА́Я (l. sphenomandibulare, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *549*.
С. КЛИНОВИ́ДНО-ЧЕЛЮСТНА́Я (l. sphenomaxillare) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *549*.
С. КЛИНОКУБОВИ́ДНАЯ МЕЖКО́СТНАЯ (l. cuneocuboideum interosseum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *237*.
С. КЛИНОКУБОВИ́ДНАЯ ПОДО́ШВЕННАЯ (l. cuneocuboideum plantare, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *238*.
С. КЛИНОКУБОВИ́ДНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. cuneocuboideum dorsale, BNA, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *236*.
С. КЛИНОЛАДЬЕВИ́ДНЫЕ ПОДО́ШВЕННЫЕ (l. cuneonavicularia plantaria, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *241*.
С. КЛИНОЛАДЬЕВИ́ДНЫЕ ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. cuneonavicularia dorsalia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *240*.
С. КЛИНОПЛЮСНЕВЫ́Е МЕЖКО́СТНЫЕ (l. cuneometatarsea interossea, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *239*.
С. КЛИ́ТОРА ПРАЩЕВИ́ДНАЯ (l. fundiforme clitoridis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *271*.
С. КЛЮВОВИ́ДНО-АКРОМИА́ЛЬНАЯ (l. coracoacromiale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *179*.
С. КЛЮВОВИ́ДНО-КЛЮЧИ́ЧНАЯ (l. coracoclaviculare, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *181*.
С. КЛЮВОВИ́ДНО-КЛЮЧИ́ЧНАЯ ВНУ́ТРЕННЯЯ (l. coracoclaviculare internum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *178*.
С. КЛЮВОВИ́ДНО-КЛЮЧИ́ЧНАЯ НАРУ́ЖНАЯ (l. coracoclaviculare externum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *643*.
С. КЛЮВОВИ́ДНО-ПЛЕЧЕВА́Я (l. coracohumerale, PNA, BNA,

JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *184*.
С. КЛЮЧИ́ЦЫ РОМБОВИ́ДНАЯ (l. rhomboides claviculae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *188*.
С. КЛЮЧИ́ЧНАЯ КАПСУЛЯ́РНАЯ НАРУ́ЖНАЯ (l. capsulare clavicularе externum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *12*.
СВЯ́ЗКА КО́КСА (l. Koksi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *121*.
С. КОЛЕ́НА ДОБА́ВОЧНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. accessorium laterale genus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *155*.
С. КОЛЕ́НА ДОБА́ВОЧНАЯ МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. accessorium mediale genus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *157*.
С. КОЛЕ́НА ДУГООБРА́ЗНАЯ (l. arcuatum genus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *456*.
С. КОЛЕ́НА КРЕСТООБРА́ЗНЫЕ (l. cruciatum genus, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *220*.
С. КОЛЕ́НА КРЕСТООБРА́ЗНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. cruciatum genu posterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *226*.
С. КОЛЕ́НА КРЕСТООБРА́ЗНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. cruciatum genu anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *221*.
С. КОЛЕ́НА ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. transversum genus, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *634*.
С. КОЛЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ (l. collateralia, PNA, BNA, JNA) — 1) межфаланговых суставов кисти — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *161*; 2) межфаланговых суставов стопы — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *162*; 3) плюснефаланговых суставов — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *160*; 4) пястнофаланговых суставов — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *159*.
С. КОЛЛАТЕРА́ЛЬНАЯ БОЛЬШЕБЕРЦО́ВАЯ (l. collaterale tibiale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *157*.
С. КОЛЛАТЕРА́ЛЬНАЯ ЛОКТЕВА́Я (l. collaterale ulnare, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *158*.
С. КОЛЛАТЕРА́ЛЬНАЯ ЛУЧЕВА́Я (l. collaterale radiale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *156*.
С. КОЛЛАТЕРА́ЛЬНАЯ МАЛОБЕРЦО́ВАЯ (l. collaterale fibulare, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *155*.
СВЯ́ЗКА КО́ЛЛИСА (l. Collesi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *487*.
С. КОЛЬЦЕВЫ́Е (l. annularia, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *25*.
С. КОЛЬЦЕВЫ́Е (ТРАХЕА́ЛЬНЫЕ) [l. annularia (trachealia)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *36*.
С. КОНИ́ЧЕСКАЯ 1) (l. conoideum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *178*; 2) (l. conicum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *214*.
С. КОРО́ТКОГО ОТРО́СТКА НАКОВА́ЛЬНИ (l. processus brevis incudis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *309*.
С. КРЕСТООБРА́ЗНАЯ (l. cruciforme, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *498*.
С. КРЕСТООБРА́ЗНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. cruciatum posterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *226*.
С. КРЕСТООБРА́ЗНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. cruciatum anterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *221*.
С. КРЕСТЦО́ВО-БУГО́РНАЯ (l. sacrotuberale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *538*.
С. КРЕСТЦО́ВО-КО́ПЧИКОВАЯ ВЕНТРА́ЛЬНАЯ (l. sacrococcygeum ventrale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *517*.
С. КРЕСТЦО́ВО-КО́ПЧИКОВАЯ ДОРСА́ЛЬНАЯ ГЛУБО́КАЯ (l. sacrococcygeum dorsale profundum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *512*.
С. КРЕСТЦО́ВО-КО́ПЧИКОВАЯ ДОРСА́ЛЬНАЯ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (l. sacrococcygeum dorsale superficiale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *513*.
С. КРЕСТЦО́ВО-КО́ПЧИКОВАЯ ЗА́ДНЯЯ ГЛУБО́КАЯ (l. sacrococcygeum posterius profundum, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *512*.
С. КРЕСТЦО́ВО-КО́ПЧИКОВАЯ ЗА́ДНЯЯ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (l. sacrococcygeum posterius superficiale, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *513*.
С. КРЕСТЦО́ВО-КО́ПЧИКОВАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. sacrococcygeum laterale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *514*.
С. КРЕСТЦО́ВО-КО́ПЧИКОВАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. sacrococcygeum anterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *517*.
С. КРЕСТЦО́ВО-МА́ТОЧНАЯ (l. sacrouterinum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *486*.
С. КРЕСТЦО́ВО-ОСТИ́СТАЯ (l. sacrospinale, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *534*.
С. КРЕСТЦО́ВО-ПОДВЗДО́ШНЫЕ ВЕНТРА́ЛЬНЫЕ (l. sacroiliaca ventralia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *525*.
С. КРЕСТЦО́ВО-ПОДВЗДО́ШНЫЕ ДОРСА́ЛЬНЫЕ (l. sacroiliaca dorsalia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *523*.
С. КРЕСТЦО́ВО-ПОДВЗДО́ШНАЯ ЗА́ДНЯЯ ДЛИ́ННАЯ (l. sacroiliacum posterius longum, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *523*.
С. КРЕСТЦО́ВО-ПОДВЗДО́ШНАЯ ЗА́ДНЯЯ КОРО́ТКАЯ (l. sacroiliacum posterius breve, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *523*.
С. КРЕСТЦО́ВО-ПОДВЗДО́ШНЫЕ МЕЖКО́СТНЫЕ (l. sacroiliaca interossea, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *524*.
С. КРЕСТЦО́ВО-ПОДВЗДО́ШНЫЕ ПЕРЕ́ДНИЕ (l. sacroiliaca anteriora, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *525*.
С. КРЕСТЦО́ВО-СЕДА́ЛИЩНАЯ ВНУ́ТРЕННЯЯ (МА́ЛАЯ) [l. sacroischiadicum internum (minus)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *534*.
С. КРЕСТЦО́ВО-СЕДА́ЛИЩНАЯ БОЛЬША́Я (l. sacroischiadicum majus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *538*.
С. КРЫЛОВИ́ДНЫЕ (l. alaria, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *16*.
С. КРЫЛОВИ́ДНАЯ БОЛЬША́Я (l. alare majus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *16*.
С. КРЫЛООСТИ́СТАЯ (l. pterygospinale, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *461*.
С. КРЮЧКОВИ́ДНО-ПЯСТНАЯ (l. hamatometacarpeum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *288*.
С. КУБОВИ́ДНО-КЛИНОВИ́ДНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. cubocuneiforme dorsale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *236*.
С. КУБОВИ́ДНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ КОСА́Я (l. cubonaviculare obliquum, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *234*.
С. КУБОВИ́ДНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ МЕЖКО́СТНАЯ (l. cuboideonaviculare interosseum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *233*.
С. КУБОВИ́ДНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ ПОДО́ШВЕННАЯ (l. cuboideonaviculare plantare, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *234*.
С. КУБОВИ́ДНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. cuboideonaviculare dorsale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *232*.
С. КУПЕРОВА (l. Cooperi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *467*.
С. ЛАДО́НИ ДОБА́ВОЧНЫЕ (l. accessoria volaria, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *425*.
С. ЛАДО́ННЫЕ (l. palmaria, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *425*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-КЛИНОВИ́ДНЫЕ (l. scaphoideocuneiformia dorsalia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *240*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-КЛИНОВИ́ДНАЯ ВНУ́ТРЕННЯЯ (l. scaphoideocuneiforme internum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *241*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-КЛИНОВИ́ДНАЯ НАРУ́ЖНАЯ (l. scaphoideocuneiforme externum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *241*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-КЛИНОВИ́ДНЫЕ ПОДО́ШВЕННЫЕ (l. navicularicuneiformia plantaria, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *241*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-КЛИНОВИ́ДНАЯ СРЕ́ДНЯЯ (l. scaphoideocuneiforme medium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *241*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-КЛИНОВИ́ДНЫЕ ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. navicularicuneiformia dorsalia, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *240*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-КУБОВИ́ДНАЯ МЕЖКО́СТНАЯ (l. naviculocuboideum interosseum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *414*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-КУБОВИ́ДНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. scaphocuboideum dorsale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *232*.
С. ЛАДЬЕВИ́ДНО-ПОЛУЛУ́ННАЯ (l. navicularilunatum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *413*.
С. ЛАКУНА́РНАЯ (l. lacunare, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *359*.
С. ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. laterale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *362*.

С. ЛАТЕРА́ЛЬНОЙ ЛОДЫ́ЖКИ ЗА́ДНЯЯ (l. malleoli lateralis posterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *621*.
С. ЛАТЕРА́ЛЬНОЙ ЛОДЫ́ЖКИ МЕЖКО́СТНАЯ (l. malleoli lateralis interosseum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *384*.
С. ЛАТЕРА́ЛЬНОЙ ЛОДЫ́ЖКИ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. malleoli lateralis anterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *620*.
С. ЛЕ́ВОЙ ПО́ЛОЙ ВЕ́НЫ (l. venae cavae sinistrae, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *665*.
С. ЛЁГКОГО ШИРО́КАЯ (l. latum pulmonis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *477*.
С. ЛЁГОЧНАЯ (l. pulmonale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *477*.
С. ЛО́БКА ДУГООБРА́ЗНАЯ (l. arcuatum pubis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *50*.
С. ЛО́БКА ДУГООБРА́ЗНАЯ ВЕ́РХНЯЯ (l. arcuatum superius pubis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *467*.
С. ЛО́БКА КОЛЬЦЕВА́Я (l. annulare pubis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *23*.
С. ЛО́БКА НИ́ЖНЯЯ (l. pubis inferius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *50*.
С. ЛО́БКА ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. transversum pubis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *467*.
С. ЛОБКО́ВАЯ (l. pubicum, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *467*.
С. ЛОБКО́ВАЯ ВЕ́РХНЯЯ (l. pubicum superius, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *467*.
С. ЛОБКО́ВАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. pubicum posterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *466*.
С. ЛОБКО́ВАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. pubicum anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *464*.
С. ЛОБКО́ВО-БЕ́ДРЕННАЯ (l. pubofemorale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *470*.
С. ЛОБКО́ВО-КАПСУЛЯ́РНАЯ (l. pubocapsulare., PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *470*.
С. ЛОБКО́ВО-ПРЕДСТА́ТЕЛЬНАЯ (ЛОБКОВО-ПУЗЫРНАЯ) [l. puboprostaticum (pubovesicale), PNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *473*.
С. ЛОБКО́ВО-ПРЕДСТА́ТЕЛЬНАЯ (ЛОБКО́ВО-ПУЗЫ́РНАЯ) ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ [l. puboprostaticum (pubovesicale) laterale, BNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *473*.
С. ЛОБКО́ВО-ПРЕДСТА́ТЕЛЬНАЯ (ЛОБКО́ВО-ПУЗЫ́РНАЯ) СРЕ́ДНЯЯ [l. puboprostaticum (pubovesicale) medium (BNA)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *473*.
С. ЛОБКО́ВО-ПУЗЫ́РНЫЕ (l. pubovesicalia, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *473*.
С. ЛОКТЕВА́Я ДОБА́ВОЧНАЯ (l. accessorium ulnare) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *158*.
С. ЛОКТЕЗАПЯ́СТНАЯ ЛАДО́ННАЯ (l. ulnocarpeum palmare, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *651*.
С. ЛО́КТЯ ДОБА́ВОЧНАЯ (l. accessorium cubiti) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *6*.
С. ЛОПА́ТКИ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. transversum scapulae, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *640*.
С. ЛОПА́ТКИ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ВЕ́РХНЯЯ (l. transversum scapulae superius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *640*.
С. ЛОПА́ТКИ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ НИ́ЖНЯЯ (l. transversum scapulae inferius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *639*.
С. ЛУЧЕВА́Я ДОБА́ВОЧНАЯ (l. accessorium radiale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *156*.
С. ЛУЧЕВО́Й КО́СТИ КОЛЬЦЕВА́Я (l. annulare radii) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *32*.
С. ЛУЧЕЗАПЯ́СТНАЯ ЛАДО́ННАЯ (l. radiocarpeum palmare, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *482*.
С. ЛУЧЕЗАПЯ́СТНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. radiocarpeum dorsale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *481*.
С. МАЛОБЕРЦО́ВОГО МЕНИ́СКА (l. menisci fibularis, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *393*.
С. МАЛОБЕРЦО́ВО-ПЯ́ТОЧНАЯ (l. fibulocalcaneare) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *90*.
С. МАЛОБЕРЦО́ВО-ТАРА́ННАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. fibulotalare posterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *592*.
С. МАЛОБЕРЦО́ВО-ТАРА́ННАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. fibulotalare anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *591*.
С. МА́ТКИ ГЛА́ВНЫЕ (КАРДИНА́ЛЬНЫЕ) (l. cardinalia uteri) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *121*.
С. МА́ТКИ КРУ́ГЛАЯ (l. teres uteri, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *612*.
С. МА́ТКИ ШИРО́КАЯ (l. latum uteri, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *365*.
С. МА́ТОЧНО-КРЕ́СТЦО́ВЫЕ (l. uterosacralia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *486*.
С. МЕДИА́ЛЬНАЯ (ДЕЛЬТОВИ́ДНАЯ) [l. mediale (deltoideum)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *389*.
С. МЕЖБЕРЦО́ВАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. tibiofibulare posterius, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *621*.
С. МЕЖБЕРЦО́ВАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. tibiofibulare anterius, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *620*.
С. МЕЖБЕРЦО́ВАЯ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. tibiofibulare transversum) — см. т. 3. Перечень анат. терминов, *622*.
С. МЕЖДУ́ЖКОВЫЕ (l. interarcualia, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *269*.
С. МЕЖЗАПЯ́СТНЫЕ ЛАДО́ННЫЕ (l. intercarpea palmaria, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *323*.
С. МЕЖЗАПЯ́СТНЫЕ МЕЖКО́СТНЫЕ (l. intercarpea interossea, BNA, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *321*.
С. МЕЖЗАПЯ́СТНЫЕ МЕЖСУСТА́ВНЫЕ (l. intercarpea interarticularia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *321*.
С. МЕЖЗАПЯ́СТНЫЕ ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. intercarpea dorsalia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *320*.
С. МЕЖКЛИНОВИ́ДНЫЕ МЕЖКО́СТНЫЕ (l. intercuneiformia interossea, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *336*.
С. МЕЖКЛИНОВИ́ДНЫЕ ПОДО́ШВЕННЫЕ (l. intercuneiformia plantaria, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *337*.
С. МЕЖКЛИНОВИ́ДНЫЕ ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. intercuneiformia dorsalia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *335*.
С. МЕЖКЛЮЧИ́ЧНАЯ (l. interclaviculare, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *329*.
С. МЕЖКОЛЬЦЕВЫ́Е (l. interannularia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *36*.
С. МЕЖОСТИ́СТЫЕ (l. interspinalia, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *344*.
С. МЕЖПЯ́СТНЫЕ (l. intermetacarpalia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *401*.
С. МЕЖПОДЪЯЗЫ́ЧНЫЕ (l. interhyoidea) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *340*.
С. МЕЖПОЗВОНО́ЧНАЯ ШЕ́ЙНАЯ (l. intervertebrale cervicale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *347*.
С. МЕЖПОПЕРЕ́ЧНЫЕ (l. intertrans versaria, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *346*.
С. МЕЖРЁБЕРНЫЕ (l. intercostalia, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *330*.
С. МЕЖРЁБЕРНЫЕ ВНУ́ТРЕННИЕ (l. intercostalia interna, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *334*.
С. МЕЖРЁБЕРНЫЕ НАРУ́ЖНЫЕ (l. intercostalia externa, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *333*.
С. МЕЖХРЯЩЕВЫ́Е (l. intercartilaginea) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *333*.
С. МЕЖЪЯМОЧКОВАЯ (l. interfoveolare, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *338*.
С. МЕНИСКОБЕ́ДРЕННАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. meniscofemorale posterius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *393*.
С. МЕНИСКОБЕ́ДРЕННАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. meniscofemorale anterius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *392*.
С. МЕНИСКОВИСО́ЧНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. meniscotemporale posterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *397*.
С. МЕНИСКОВИСО́ЧНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. meniscotemporale anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *396*.
С. МЕНИСКОНИЖНЕЧЕЛЮСТНА́Я ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. meniscomandibulare laterale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *394*.
С. МЕНИСКОНИЖНЕЧЕЛЮСТНА́Я МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. meniscomandibulare mediale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *395*.
С. МОЛОТО́ЧКА ВЕ́РХНЯЯ (l. mallei superius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *380*.
С. МОЛОТО́ЧКА ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. mallei laterale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *379*.

С. МОЛОТО́ЧКА ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. mallei anterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *378*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА (l. patellae, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *430*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА ВНУ́ТРЕННЯЯ (l. patellae internum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *506*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА НАРУ́ЖНАЯ (l. patellae externum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *505*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА ПОДДЕ́РЖИВАЮЩАЯ БОЛЬШЕБЕРЦО́ВАЯ (retinaculum patellae tibiale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *507*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА ПОДДЕ́РЖИВАЮЩАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (retinaculum patellae laterale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *505*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА ПОДДЕ́РЖИВАЮЩАЯ МАЛОБЕРЦО́ВАЯ (retinaculum patellae fibulare, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *505*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА ПОДДЕ́РЖИВАЮЩАЯ МЕДИА́ЛЬНАЯ (retinaculum patellae mediale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *506*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА СО́БСТВЕННАЯ (l. patellae proprium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *430*.
С. НАДКОЛЕ́ННИКА СРЕ́ДНЯЯ (l. patellae medium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *430*.
С. НАДОСТИ́СТЫЕ (l. supraspinalia, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *568*.
С. НАКОВА́ЛЬНИ ВЕ́РХНЯЯ (l. incudis superius, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *310*.
С. НАКОВА́ЛЬНИ ЗА́ДНЯЯ (l. incudis posterius, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *309*.
С. НАРУ́ЖНОЙ ЛОДЫ́ЖКИ ВЕ́РХНЯЯ (l. malleoli externi superius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *382*.
С. НАРУ́ЖНОЙ ЛОДЫ́ЖКИ НИ́ЖНЯЯ (l. malleoli externi inferius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *381*.
С. ОСНОВА́НИЙ ПЛЮСНЕВЫ́Х КОСТЕ́Й МЕЖКО́СТНЫЕ [l. basium (ossium metatarsalium) interossea, BNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *407*.
С. ОСНОВА́НИЙ ПЛЮСНЕВЫ́Х КОСТЕ́Й ПОДО́ШВЕННЫЕ [l. basium (ossium metatarsalium) plantaria, BNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *408*.
С. ОСНОВА́НИЙ ПЛЮСНЕВЫ́Х КОСТЕ́Й ТЫ́ЛЬНЫЕ [l. basium (ossium metatarsalium) dorsalia, JNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *406*.
С. ОСНОВА́НИЙ ПЯ́СТНЫХ КОСТЕ́Й ЛАДО́ННЫЕ [l. basium (ossium metacarpi) volaria, JNA] — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *403*.
С. ОСНОВА́НИЙ ПЯ́СТНЫХ КОСТЕ́Й МЕЖКО́СТНЫЕ [l. basium (ossium metacarpalium) interossea, BNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *402*.
С. ОСНОВА́НИЙ ПЯ́СТНЫХ КОСТЕ́Й ТЫ́ЛЬНЫЕ [l. basium (ossium metacarpalium) dorsalia, BNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *401*.
С. ОСНОВА́НИЯ СТРЕ́МЕНИ КОЛЬЦЕВА́Я (l. annulare baseos stapedis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *33*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ КОЛЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ (l. collateralia digitorum manus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *161*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ КОЛЬЦЕВЫ́Е (l. annularia digitorum manus, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *26*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ КОРО́ТКИЕ (l. brevia digitorum manus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *81*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ КОСЫ́Е (l. obliqua digitorum manus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *418*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ КРЕСТООБРА́ЗНЫЕ (l. cruciata digitorum manus, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *217*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ КОЛЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ (l. collateralia digitorum pedis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *162*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ КОЛЬЦЕВЫ́Е (l. annularia digitorum pedis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *25*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ КРЕСТООБРА́ЗНЫЕ (l. cruciata digitorum pedis, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *218*.
С. ПА́ХОВАЯ (l. inguinale, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *312*.
С. ПА́ХОВАЯ ЗА́ГНУТАЯ (l. inguinale reflexum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *487*.
С. ПА́ХОВО-ПОЛОВА́Я (l. genitoinguinale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *282*.
С. ПЕРЕПО́НЧАТЫХ ПОЛУКРУ́ЖНЫХ ПРОТО́КОВ (l. ductuum semicircularium membranaceorum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *254*.
С. ПЕРИОДОНТА́ЛЬНАЯ (l. periodontale, LNH) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *438*.
С. ПЕРСТНЕВИ́ДНО-ГЛО́ТОЧНАЯ (l. cricopharyngeum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *207*.
С. ПЕРСТНЕТРАХЕА́ЛЬНАЯ (l. cricotracheale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *215*.
С. ПЕРСТНЕЧЕРПАЛОВИ́ДНАЯ ДОРСА́ЛЬНАЯ (l. cricoarytaenoideum dorsale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *206*.
С. ПЕРСТНЕЧЕРПАЛОВИ́ДНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. cricoarytenoideum posterius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *206*.
С. ПЕРСТНЕЩИТОВИ́ДНАЯ (l. cricothyreoideum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *214*.
С. ПЕРСТНЕЩИТОВИ́ДНЫЕ ЗА́ДНИЕ (l. cricothyreoidea posteriora) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *141*.
С. ПЕРСТНЕЩИТОВИ́ДНЫЕ ЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ (l. cricothyreoidea lateralia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *140*.
С. ПЕРСТНЕЩИТОВИ́ДНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. cricothyreoideum anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *142*.
С. ПЕРСТНЕЩИТОВИ́ДНАЯ СРЕ́ДНЯЯ [l. cricothyreoideum (medium), BNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *214*.
С. ПЕРСТНЕЩИТОВИ́ДНОГО СУСТА́ВА (l. articuli cricothyreoidei, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *54*.
С. ПЕ́ЧЕНИ ВЕНЕ́ЧНАЯ (l. coronarium hepatis, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *187*.
С. ПЕ́ЧЕНИ КРУ́ГЛАЯ (l. teres hepatis, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *611*.
С. ПЕ́ЧЕНИ СЕРПОВИ́ДНАЯ (l. falciforme hepatis, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *262*.
С. ПЕЧЕ́НОЧНО-ДУОДЕНА́ЛЬНАЯ (l. hepatoduodenale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *292*.
С. ПЕЧЕ́НОЧНО-ЖЕЛУ́ДОЧНАЯ (l. hepatogastricum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *295*.
С. ПЕЧЕ́НОЧНО-КАВА́ЛЬНО-ДУОДЕНА́ЛЬНАЯ (l. hepatocavoduodenale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *289*.
С. ПЕЧЕ́НОЧНО-ОБОДО́ЧНАЯ (l. hepatocolicum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *290*.
С. ПЕЧЕ́НОЧНО-ПО́ЧЕЧНАЯ (l. hepatorenale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *296*.
С. ПЕЧЕ́НОЧНО-ПУЗЫ́РНО-ОБОДО́ЧНАЯ (l. hepatocystocolicum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *291*.
С. ПЕЧЕ́НОЧНО-ПУПО́ЧНАЯ (l. hepatoumbilicale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *611*.
С. ПЛЕЧА́ ДОБА́ВОЧНАЯ (l. accessorium humeri) — см. т. 3, Перечень анат. терминов *184*.
С. ПЛЮСНЕВЫ́Е МЕЖКО́СТНЫЕ (l. metatarsea interossea, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *407*.
С. ПЛЮСНЕВЫ́Е ПОДО́ШВЕННЫЕ (l. metatarsea plantaria, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *408*.
С. ПЛЮСНЕВА́Я ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ГЛУБО́КАЯ (l. metatarseum transversum profundum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *409*.
С. ПЛЮСНЕВА́Я ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (l. metatarseum transversum superficiale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *410*.
С. ПЛЮСНЕВЫ́Е ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. metatarsea dorsalia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *406*.
С. ПЛЮСНЕВЫ́Х КОСТЕ́Й МЕЖКО́СТНЫЕ (l. interossea ossium metatarsalium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *407*.
С. ПЛЮСНЕФАЛА́НГОВОГО СУСТА́ВА КОЛЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ (l. collateralia articulationis metatarsophalangeae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *160*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ КЛИ́ТОР (l. suspensorium clitoridis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *571*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ МОЛОТО́ЧЕК (l. suspensorium mallei, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *380*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ МОЧЕВО́Й ПУЗЫ́РЬ (l. suspensorium vesicae urinariae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *655*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ ПЕ́ЧЕНЬ (l. suspensorium hepatis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *262*.

С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ ПОЛОВО́Й ЧЛЕН (l. suspensorium penis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *579*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ ПОЛОВО́Й ЧЛЕН, ГЛУБО́КАЯ (l. suspensorium penis profundum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *580*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ ПОЛОВО́Й ЧЛЕН, ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (l. suspensorium penis superficiale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *579*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ СЕЛЕЗЁНКУ (l. suspensorium lienis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *445*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ СЛЁЗНУЮ ЖЕЛЕЗУ́ (l. suspensorium glandulae lacrimalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *573*.
С., ПОДВЕ́ШИВАЮЩАЯ ЯИ́ЧНИК (l. suspensorium ovarii, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *577*.
С. ПОДВЗДО́ШНО-БЕ́ДРЕННАЯ (l. iliofemorale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *303*.
С. ПОДВЗДО́ШНО-ГРЕБЕШКО́ВАЯ (l. iliopectineum, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *307*.
С. ПОДВЗДО́ШНО-ЛОБКО́ВАЯ (l. iliopubicum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *312*.
С. ПОДВЗДО́ШНО-ПОЯСНИ́ЧНАЯ (l. iliolumbale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *304*.
С. ПОДВЗДО́ШНО-РЁБЕРНАЯ (l. iliocostale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *372*.
С., ПОДДЕ́РЖИВАЮЩАЯ БЕДРО́ (l. suspensorium femoris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *303*.
С., ПОДДЕ́РЖИВАЮЩИЕ МОЛО́ЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ́ (l. suspensoria mammae, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *569*.
С., ПОДДЕ́РЖИВАЮЩАЯ ТАЗ (l. suspensorium pelvis)—см. т. 3, Перечень анат. терминов, *303*.
С. ПОДКОЛЕ́ННАЯ ДУГООБРА́ЗНАЯ (l. popliteum arcuatum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *455*.
С. ПОДКОЛЕ́ННАЯ КОСА́Я (l. popliteum obliquum, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *456*.
С. ПОДО́ШВЕННЫЕ (l. plantaria, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *453*.
С. ПОДО́ШВЕННАЯ ДЛИ́ННАЯ (l. plantare longum, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *452*.
С. ПОДО́ШВЕННЫЕ ДОБА́ВОЧНЫЕ (l. accessoria plantaria, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *453*.
С. ПОДО́ШВЫ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (l. plantae transversum superficiale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *410*.
С. ПОДЪЯЗЫ́ЧНО-НАДГО́РТА́ННАЯ (l. hyoepiglotticum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *299*.
С. ПОДЪЯЗЫ́ЧНО-ЩИТОВИ́ДНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. hyothyreoideum laterale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *616*.
С. ПОДЪЯЗЫ́ЧНО-ЩИТОВИ́ДНАЯ СРЕ́ДНЯЯ (l. hyothyreoideum medium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *617*.
С. ПОЗВОНКО́В О́БЩАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. commune vertebrarum posterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *371*.
С. ПОЗВОНКО́В О́БЩАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. commune vertebrarum anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *368*.
С. ПОЛОВО́ГО ЧЛЕ́НА ПРАЩЕВИ́ДНАЯ (l. fundiforme penis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *274*.
С. ПОКРО́ВНАЯ (l. tectorium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *606*.
С. ПОПЕРЕ́ЧНО-РЁБЕРНАЯ (l. transversocostale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *197*.
С. ПО́ЧЕЧНО-СЕЛЕЗЁНОЧНАЯ (l. renolienale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *366*.
С. ПОЯСНИ́ЧНО-РЁБЕРНАЯ (l. lumbocostale, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *372*.
С. ПРАЩЕВИ́ДНАЯ (ТЫЛА СТОПЫ́) [l. fundiforme (dorsi pedis), JNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *270*.
С. ПРЕДДВЕ́РИЯ (l. vestibulare, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *672*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЕ-ПЛЮСНЕВЫ́Е МЕЖКО́СТНЫЕ (l. tarsometatarsea interossea, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *239*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЕ-ПЛЮСНЕВЫ́Е ПОДО́ШВЕННЫЕ (l. tarsometatarsea plantaria, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *605*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЕ-ПЛЮСНЕВЫ́Е ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. tarsometatarsea dorsalia, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *603*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЫ ГЛУБО́КИЕ (l. tarsi profunda, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *601*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЫ КОЛЬЦЕВА́Я ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. annulare anterius tarsi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *495*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЫ МЕЖКО́СТНЫЕ (l. tarsi interossea, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *336*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЫ ПОДО́ШВЕННЫЕ (l. tarsi plantaria, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *337*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЫ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (МЕДИА́ЛЬНАЯ И ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ) [l. tarseum transversum (mediale et laterale)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *597*.
С. ПРЕДПЛЮ́СНЫ ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. tarsi dorsalia, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *598*.
С. ПРЕУРЕТРА́ЛЬНАЯ (l. praeurethrale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *636*.
С. ПРИВРА́ТНИКА (l. pylori, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *479*.
С. ПРИДА́ТКА ЯИ́ЧКА ВЕ́РХНЯЯ (l. epididymidis superius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *259*.
С. ПРИДА́ТКА ЯИ́ЧКА НИ́ЖНЯЯ (l. epididymidis inferius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *258*.
С. ПРОДО́ЛЬНАЯ (l. longitudinale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *568*.
С. ПРОДО́ЛЬНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. longitudinale posterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *371*.
С. ПРОДО́ЛЬНАЯ О́БЩАЯ ВЕНТРА́ЛЬНАЯ (l. longitudinale commune ventrale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *368*.
С. ПРОДО́ЛЬНАЯ О́БЩАЯ ДОРСА́ЛЬНАЯ (l. longitudinale commune dorsale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *371*.
С. ПРОДО́ЛЬНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. longitudinale anterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *368*.
С. ПРОМЕ́ЖНОСТИ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. transversum perinei, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *636*.
С. ПРЯМОКИШЕ́ЧНО-МА́ТОЧНЫЕ (l. rectouterina) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *486*.
С. ПУЗЫ́РНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. vesicale laterale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *654*.
С. ПУЗЫ́РНАЯ СРЕ́ДНЯЯ (l. vesicale medium) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *655*.
С. ПУЗЫ́РНО-МА́ТОЧНЫЕ (l. vesicouterina) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *671*.
С. ПУПА́РТОВА (l. Pouparti) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *312*.
С. ПУПО́ЧНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. umbilicale laterale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *654*.
С. ПУПО́ЧНАЯ МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. umbilicale medium, BNA)—см. т. 3, Перечень анат. терминов, *655*.
С. ПУПО́ЧНАЯ СРЕДИ́ННАЯ (l. umbilicale medianum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *655*.
С. ПЯ́СТНАЯ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ГЛУБО́КАЯ (l. metacarpeum transversum profundum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *404*.
С. ПЯ́СТНАЯ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (l. metacarpeum transversum superficiale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *405*.
С. ПЯ́СТНО-ФАЛА́НГОВОГО СУСТА́ВА КОЛЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ (l. collateralia articulationis metacarpophalangeae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *160*.
С. ПЯ́СТНЫЕ ЛАДО́ННЫЕ (l. metacarpea palmaria, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *403*.
С. ПЯ́СТНЫЕ МЕЖКО́СТНЫЕ (l. metacarpea interossea, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *402*.
С. ПЯ́СТНЫЕ ТЫ́ЛЬНЫЕ (l. metacarpea dorsalia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *401*.
С. ПЯ́ТОЧНО-БОЛЬШЕБЕРЦО́ВАЯ (l. calcaneotibiale, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *618*.
С. ПЯ́ТОЧНО-КУБОВИ́ДНАЯ (l. calcaneocuboideum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *84*.
С. ПЯ́ТОЧНО-КУБОВИ́ДНАЯ ВЕ́РХНЯЯ (l. calcaneocuboideum superius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *85*.
С. ПЯ́ТОЧНО-КУБОВИ́ДНАЯ ПОДО́ШВЕННАЯ (l. calcaneocuboide-

um plantare, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *86*.
С. ПЯ́ТОЧНО-КУБОВИ́ДНАЯ ПОДО́ШВЕННАЯ КОСА́Я (l. calcaneocuboideum plantare obliquum, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *87*.
С. ПЯ́ТОЧНО-КУБОВИ́ДНАЯ ПОДО́ШВЕННАЯ ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. calcaneocuboideum plantare transversum, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *88*.
С. ПЯ́ТОЧНО-КУБОВИ́ДНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. calcaneocuboideum dorsale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *85*.
С. ПЯ́ТОЧНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ — 1) (l. calcaneonaviculare, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *92*; 2) (pars calcaneonaviculare, JNA)—см. т. 3, Перечень анат. терминов, *92*.
С. ПЯ́ТОЧНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ ВЕ́РХНЯЯ (l. calcaneoscaphoideum superius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *93*.
С. ПЯ́ТОЧНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ МЕЖКО́СТНАЯ (l. calcaneonaviculare interosseum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *92*.
С. ПЯ́ТОЧНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ НИ́ЖНЯЯ (l. calcaneoscaphoideum inferius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *95*.
С. ПЯ́ТОЧНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ ПОДО́ШВЕННАЯ (l. calcaneonaviculare plantare, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *95*.
С. ПЯ́ТОЧНО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. calcaneonaviculare dorsale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *93*.
С. ПЯ́ТОЧНО-МАЛОБЕРЦО́ВАЯ (l. calcaneofibulare, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *90*.
С. РА́ДУЖКИ ГРЕБЕ́НЧАТАЯ (l. pectinatum iridis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *435*.
С. РА́ДУЖНО-РОГОВИ́ЧНОГО УГЛА́ ГРЕБЕ́НЧАТАЯ (l. pectinatum anguli iridocornealis, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *435*.
С. РАЗДВОЕ́ННАЯ (l. bifurcatum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *77*.
С. РАСЩЕПЛЁННАЯ (l. laciniatum, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *499*.
С. РАСЩЕПЛЁННАЯ НАРУ́ЖНАЯ (ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ) [l. laciniatum externum (laterale)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *357*.
С. РЁБЕР ДОБА́ВОЧНЫЕ (l. accessoria costarum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *2*.
С. РЁБЕРНО-ГРУДИ́ННЫЕ (l. costosternalia) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *560*.
С. РЁБЕРНО-КЛЮЧИ́ЧНАЯ (l. costoclaviculare, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *188*.
С. РЁБЕРНО-МЕЧЕВИ́ДНЫЕ (l. costoxiphoidea, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *200*.
С. РЁБЕРНО-ПОЗВОНО́ЧНАЯ МЕЖКО́СТНАЯ (l. costovertebrale interosseum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *103*.
С. РЁБЕРНО-ПОЗВОНО́ЧНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. costovertebrale anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *104*.
С. РЁБЕРНО-ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. costotransversarium, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *191*.
С. РЁБЕРНО-ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ВЕ́РХНЯЯ (l. costotransversarium superius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *197*.
С. РЁБЕРНО-ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ВНУ́ТРЕННЯЯ (l. costotransversarium internum, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *197*.
С. РЁБЕРНО-ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ЗАДНЯЯ (l. costotransversarium posterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *195*.
С. РЁБЕРНО-ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. costotransversarium laterale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *195*.
С. РЁБЕРНО-ПОПЕРЕ́ЧНАЯ НАРУ́ЖНАЯ (l. costotransversarium externum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *195*.
С. РЁБЕРНО-ПОПЕРЕ́ЧНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. costotransversarium anterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *197*.
С. РЕСНИ́ЧНАЯ — см. *Ресничный поясок*.
С. РОЖКОВИ́ДНО-ГЛО́ТОЧНАЯ (l. cornicupharyngeum, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *185*.
С. РОЖКОПЕРСТНЕВИ́ДНЫЕ ЗА́ДНИЕ (l. ceratocricoidea posteriora, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *141*.
С. РОЖКОПЕРСТНЕВИ́ДНЫЕ ЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ (l. ceratocricoidea lateralia, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *140*.
С. РОЖКОПЕРСТНЕВИ́ДНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. ceratocricoideum anterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *142*.
СВЯЗКА САНТОРИ́НИ (l. Santorini) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *207*.
С. СЕДА́ЛИЩНО-БЕ́ДРЕННАЯ (l. ischiofemorale, PNA)—см. т. 3, Перечень анат. терминов, *352*.
С. СЕДА́ЛИЩНО-КА́ПСУЛЬНАЯ (l. ischiocapsulare, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *352*.
С. СЕЛЕЗЁНОЧНО-ЖЕЛУ́ДО́ЧНАЯ (l. splenicogastricum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *276*.
С. СЕЛЕЗЁНОЧНО-ПО́ЧЕЧНАЯ (l. lienorenale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *366*.
С. СЛУХОВЫХ КО́СТОЧЕК (l. ossiculorum auditus, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *421*.
С. СОЕДИНЯ́ЮЩАЯ (l. jugale) — 1) см. т. 3, Перечень анат. терминов, *634*; 2) см. т. 3, Перечень анат. терминов, *354*.
С. СПИННО́ГО МО́ЗГА ЗУ́БЧАТАЯ (l. serratum medullae spinalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *248*.
С. СТЕБЕ́ЛЬКА НАДГОРТА́ННИКА (l. petioli epiglottidis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *615*.
С. СТОПЫ ДЕЛЬТОВИ́ДНАЯ (l. deltoideum pedis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *389*.
С. СТОПЫ ПРАЩЕВИ́ДНАЯ (l. fundiforme pedis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *270*.
С. СТРЕ́МЕНИ КОЛЬЦЕВА́Я (l. annulare stapedis, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *33*.
С. СУСТА́ВА СТОПЫ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ ВНУ́ТРЕННЯЯ (l. laterale internum articuli pedis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *389*.
С. СУСТА́ВНО-ПЛЕЧЕВЫ́Е (l. glenohumeralia, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *285*.
С. ТА́ЗА ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (l. transversum pelvis, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *636*.
С. ТАРА́ННО-БОЛЬШЕБЕРЦО́ВАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. talotibiale posterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *628*.
С. ТАРА́ННО-БОЛЬШЕБЕРЦО́ВАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. talotibiale anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *626*.
С. ТАРА́ННО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ (l. talonaviculare, PNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *593*.
С. ТАРА́ННО-ЛАДЬЕВИ́ДНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (l. talonaviculare dorsale, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *593*.
С. ТАРА́ННО-МАЛОБЕРЦО́ВАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. talofibulare posterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *592*.
С. ТАРА́ННО-МАЛОБЕРЦО́ВАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. talofibulare anterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *591*.
С. ТАРА́ННО-ПЯ́ТОЧНАЯ БОЛЬШЕБЕРЦО́ВАЯ (l. talocalcaneare tibiale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *589*.
С. ТАРА́ННО-ПЯ́ТОЧНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. talocalcaneum posterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *590*.
С. ТАРА́ННО-ПЯ́ТОЧНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. talocalcaneum laterale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *588*.
С. ТАРА́ННО-ПЯ́ТОЧНАЯ МАЛОБЕРЦО́ВАЯ (l. talocalcaneare fibulare, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *588*.
С. ТАРА́ННО-ПЯ́ТОЧНАЯ МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. talocalcaneum mediale, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *589*.
С. ТАРА́ННО-ПЯ́ТОЧНАЯ МЕЖКО́СТНАЯ (l. talocalcaneum interosseum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *587*.
С. ТАРА́ННО-ПЯ́ТОЧНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. talocalcaneum anterius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *586*.
С. ТВЁРДОЙ МОЗГОВО́Й ОБОЛО́ЧКИ ДОРСОЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ (l. dorsolateralia durae matris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *250*.
С. ТВЁРДОЙ МОЗГОВО́Й ОБОЛО́ЧКИ КРАНИА́ЛЬНАЯ (l. craniale durae matris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *202*.
С. ТВЁРДОЙ МОЗГОВО́Й ОБОЛО́ЧКИ ПЕРЕ́ДНИЕ (l. anteriora durae matris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *30*.
С. ТВЁРДОЙ МОЗГОВО́Й ОБОЛО́ЧКИ ПОЯСНИ́ЧНО-КРЕСТЦО́ВАЯ (l. lumbosacrale durae matris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *377*.
С. ТВЁРДОЙ МОЗГОВО́Й ОБОЛО́ЧКИ ШЕ́ЙНАЯ (l. cervicale durae matris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *143*.
С. ТРАПЕЦИЕВИ́ДНАЯ (l. trapezoideum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *643*.
С. ТРЕУГО́ЛЬНАЯ (l. triangulare) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *487*.

С. ТРЕУГО́ЛЬНАЯ ЛЕ́ВАЯ (l. triangulare sinistrum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *647*.
С. ТРЕУГО́ЛЬНАЯ ПРА́ВАЯ (l. triangulare dextrum, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *645*.
С. ТРЁХГРА́ННАЯ (l. triquetrum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *206*.
С. УЛИ́ТКИ СПИРА́ЛЬНАЯ (l. spirale cochleae, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *551*.
С. УШНО́Й РА́КОВИНЫ (l. auricularia, PNA , JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *61*.
С. УШНО́Й РА́КОВИНЫ ВЕ́РХНЯЯ (l. auriculare superius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *60*.
С. УШНО́Й РА́КОВИНЫ ЗА́ДНЯЯ (l. auriculare posterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *59*.
С. УШНО́Й РА́КОВИНЫ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. auriculare anterius, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *58*.
С. ФАЛЛО́ПИЕВА (l. Fallopii) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *312*.
С. ФИБРО́ЗНАЯ ЗА́ДНЯЯ (l. fibrosum posticum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *466*.
С. ФИБРО́ЗНАЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. fibrosum anticum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *464*.
С. ХРЯЩЕГРУДИ́ННАЯ МЕЖСУСТА́ВНАЯ (l. interarticulare chondrosternale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *559*.
С. ХРЯЩА́ ВЕ́РХНЕГО И НИ́ЖНЕГО ВЕ́КА (l. tarsi superioris et inferioris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *602*.
С. ЧЕЛЮСТНА́Я ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. maxillare laterale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *362*.
С. ЧЕЛЮСТНА́Я МЕДИА́ЛЬНАЯ (l. maxillare mediale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *549*.
С. ЧЕ́РЕПА (l. cranii, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *203*.
С. ШЕ́ЙКИ РЕБРА́ (l. colli costae, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *191*.
С. ШЕ́ЙКИ РЕБРА́ ЗА́ДНЯЯ (l. colli costae posterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *195*.
С. ШЕ́ЙКИ РЕБРА́ ПЕРЕ́ДНЯЯ (l. colli costae anterius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *197*.
С. ШЕ́ЙНО-БАЗИЛЯ́РНАЯ (l. cervicobasilare) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *606*.
С. ШИЛОВЕРХНЕЧЕЛЮСТНА́Я (l. stylomaxillare) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *564*.
С. ШИЛОНИ́ЖНЕЧЕЛЮСТНА́Я (l. stylomandibulare, PNA, BNA, JNA)—см. т. 3, Перечень анат. терминов, *564*.
С. ШИЛОПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ (l. stylohyoideum, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *563*.
С. ЩИТОВИ́ДНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. thyreoideum laterale) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *616*.
С. ЩИТОВИ́ДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ (СРЕ́ДНЯЯ И БОКОВЫ́Е) [l. glandulae thyreoideae (medium et lateralia)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *283*.
С. ЩИТОНАДГОРТА́ННАЯ (l. thyreopiglotticum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *613*.
С. ЩИТОПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ (l. thyrohyoideum laterale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *616*.
С. ЩИТОПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ СРЕДИ́ННАЯ (l. thyrohyoideum medianum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *617*.
С. ЭЛАСТИ́ЧЕСКИЕ (l. elastica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *257*.
С. ЯИ́ЧКА МОШО́НОЧНАЯ (l. scrotale testis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *282*.
С. ЯИ́ЧНИКА СО́БСТВЕННАЯ (l. ovarii proprium, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *423*.
С. ЯИ́ЧНИКОВО-ТА́ЗОВАЯ (l. ovaricopelvicum) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *577*.

СВЯ́ЗКА ЯИ́ЧКА НАПРАВЛЯ́ЮЩАЯ [gubernaculum testis, PNA, JNA; gubernaculum testis (Hunteri), BNA; син.: Гунтера пучок, гунтерова связка)] — соединительнотканный тяж, соединяющий у зародыша нижний полюс яичка с мошонкой; принимает участие в опускании яичка в мошонку.

СВЯ́ЗКА ЯИ́ЧНИКА НАПРАВЛЯ́ЮЩАЯ (mesenchyma gubernaculare, LNE) — соединительнотканный тяж, соединяющий у зародыша яичник с каудальной частью стенки брюшной полости и обусловливающий опускание яичника по мере роста зародыша; преобразуется в собственную связку яичника и круглую связку матки.

СВЯ́ЗЫВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА́ — лекарственные вещества, входящие в состав пилюльной массы для придания ей необходимой вязкости (напр., экстракты солодкового корня, корня одуванчика или валерианы).

СГИБА́НИЕ (flexio; син. флексия) — движение в суставе вокруг его фронтальной оси, приводящее к уменьшению угла между сочленяющими костями и сегментами конечностей.

СГИБА́ТЕЛЬ (musculus flexor; син. флексор) — мышца, при сокращении к-рой происходит сгибание какой-либо части тела.
С. БОЛЬШЕБЕРЦО́ВЫЙ (m. f. tibialis) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *497*.
С. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ ДЛИ́ННЫЙ (m. f. pollicis longus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *508*.
С. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ КОРО́ТКИЙ (m. f. pollicis brevis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *507*.
С. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА СТОПЫ́ ДЛИ́ННЫЙ (m. f. hallucis longus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *505*.
С. БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА СТОПЫ́ КОРО́ТКИЙ (m. f. hallucis brevis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *504*.
С. ГО́ЛЕНИ НАРУ́ЖНЫЙ (m. f. cruris externus) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *373*.
С. ДОБА́ВОЧНЫЙ (m. f. accessorius, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *720*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ЛОКТЕВО́Й (m. f. carpi ulnaris, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *488*.
С. ЗАПЯ́СТЬЯ ЛУЧЕВО́Й (m. f. carpi radialis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *487*.
С. КИ́СТИ ЛУЧЕВО́Й (m. f. manus radialis) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *487*.
С. МА́ЛОГО ПА́ЛЬЦА СТОПЫ́ КОРО́ТКИЙ (m. f. digiti minimi brevis pedis, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *491*.
С. МИЗИ́НЦА КИ́СТИ КОРО́ТКИЙ (m. f. digiti minimi brevis manus, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *490*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ (m. f. digitorum superficialis manus, PNA, JNA; f. digitorum sublimis, BNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *503*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ КИ́СТИ ГЛУБО́КИЙ (m. f. digitorum profundus manus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *500*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ ДЛИ́ННЫЙ (m. f. digitorum longus pedis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *497*.
С. ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ КОРО́ТКИЙ (m. f. digitorum brevis pedis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *495*.
С. ПРЕДПЛЕ́ЧЬЯ ЛОКТЕВО́Й (m. antibrachii ulnaris) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *376*.
С. ПРЕДПЛЕ́ЧЬЯ ЛУЧЕВО́Й (m. antibrachii radialis) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *371*.
С. ПЯ́ТОГО ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ (m. digiti quinti manus, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *490*.
С. ПЯ́ТОГО ПА́ЛЬЦА СТОПЫ́ КОРО́ТКИЙ (m. f. digiti quinti brevis, pedis, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *491*.

СГИБА́ТЕЛЬНЫЕ БО́РОЗДЫ — см. *Флексорные линии*.

СГУ́СТОК (coagulum) — продукт посмертного свертывания крови, плазмы или серозного экссудата, представляющий собой эластичное, с блестящей гладкой поверхностью образование желтого или красного цвета, расположенное в просвете сосуда или полости тела.

СГУЩЕ́НИЕ КРО́ВИ — см. *Гемоконцентрация*.

СД — см. *Санитарная дружина*.

$СД_{50}$ — см. *Доза половинной выживаемости*.

СДАВЛЕ́НИЕ (compressio) в медицине — повреждение органов или тканей, вызванное давлением извне или со стороны соседних органов и тканей.

СДАВЛЕ́НИЕ ГОЛОВНО́ГО МО́ЗГА (compressio cerebri; син. компрессия головного мозга) — сочетание признаков повышенного внутричерепного давления с очаговыми неврологическими симптомами, обусловленное наличием в полости черепа объемного образования (напр., опухоли, гематомы).

СДАВЛЕ́НИЕ ГРУДИ́ (compressio thoracis) — патологическое состояние, обусловленное повышением внутригрудного давления в результате воздействия извне; характеризуется уменьшением объема грудной полости без нарушения целости костей грудной клетки.

СДАВЛЕ́НИЕ ЛЁГКОГО (pneumocompressio; син. пневмопрессия) — на-

рушение вентиляционной функции легкого в результате сжатия легочной ткани при пневмотораксе или гемотораксе, эмпиеме плевры, хирургической операции.

СДАВЛЕ́НИЕ НЕ́РВА (compressio nervi) — повреждение нерва в результате длительного давления на него (напр., рубца, костной мозоли, опухоли).

СДАВЛЕ́НИЕ СПИННО́ГО МО́ЗГА (compressio medullae spinalis) — сочетание неврологических симптомов, обусловленных смещением и деформацией вещества спинного мозга каким-либо объемным образованием (напр., опухолью, гематомой) или смещенным позвонком.

СЕ — см. *Стрэнциевая единица.*

СЕА́НС ОБЛУЧЕ́НИЯ — совокупность процедур, получаемых больным при одном посещении кабинета лучевой терапии или физиотерапевтического кабинета.

СЕБО- (лат. sebum сало) — составная часть сложных слов, означающая «содержащий сало, жир», «относящийся к сальным железам».

СЕБОБЕЗОА́Р (*себо-* + *безоар*) — инородное тело в желудке, состоящее из комка плотного жира, склеенного слизью.

СЕБОРЕ́ИД (seborrheidum; *себорея* + греч. -eidēs подобный) — дерматоз, характеризующийся ограниченными эритематозно-сквамозными очагами, развивающимися на фоне себореи.

СЕБОРЕ́ЙНАЯ КОРО́НА У́ННЫ — см. *Унны себорейная корона.*

СЕБОРЕ́Я (seborrhoea; *себо-* + греч. rhoia течение, истечение; син.: гиперстеатоз, стеатоз) — патологическое изменение кожи (обычно лица, волосистой части головы, межлопаточной области), обусловленное дисфункцией (чаще гиперфункцией) сальных желез.

С. ГУСТА́Я (s. densa) — С., характеризующаяся умеренным отделением кожного сала, обилием комедонов, уплотненными сливными угрями.

С. ЖИ́ДКАЯ (s. liquida) — С., обусловленная гиперфункцией сальных желез и характеризующаяся жидкой консистенцией кожного сала, капельками покрывающего блестящую кожу.

С. ЖИ́РНАЯ (s. oleosa) — С., обусловленная гиперфункцией сальных желез и характеризующаяся лоснящейся уплотненной кожей с зияющими отверстиями сальных желез и комедонами.

С. СМЕ́ШАННАЯ (s. mixta) — С., характеризующаяся сочетанием признаков нескольких видов С., чаще жирной и густой.

С. СУХА́Я (s. sicca; син.: питириаз отрубевидный, питириаз простой, питириаз сухой, С. чешуйчатая) — С., обусловленная гипофункцией сальных желез и характеризующаяся повышенной кератинизацией, сухостью и мелким шелушением кожи.

С. ЧЕШУ́ЙЧАТАЯ (s. squamosa) — см. *Себорея сухая.*

СЕБОРЕ́Я КОНГЕСТИ́ВНАЯ (seborrhoea congestiva) — см. *Волчанка красная дискоидная.*

СЕБОРЕ́Я ПСОРИАЗИФО́РМНАЯ (seborrhoea psoriasiformis) — см. *Лишай асбестовидный.*

СЕБОЦИСТОМАТО́З (sebocystomatosis; *себо-* + *киста* + *-ома* + *-оз*) — см. *Стеатоцистоматоз.*

СЕБОЦИ́Т (sebocytus, LNH; *себо-* + гист. cytus клетка; син. клетка сальная) — секреторная клетка сальной железы.

СЕ́БРЕЛЛА СИНДРО́М — сочетание хейлита, глоссита и дерматита при арибофлавинозе.

СЕВЕ́СТРА — ЖАКЕ́ ПОСТЭРОЗИ́ВНЫЙ СИФИЛО́ИД (L. A. Sevestre, 1843—1907, франц. врач, L. M. L. Jacquet, 1860—1914, франц. дерматолог) — см. *Сифилоид постэрозивный кругообразный.*

СЕГЛА́ ЗРИ́ТЕЛЬНЫЕ ВЕРБА́ЛЬНЫЕ ГАЛЛЮЦИНА́ЦИИ (J. E. Séglas, 1856—1939, франц. психиатр) — см. *Галлюцинации зрительные вербальные.*

СЕГМЕ́НТ[1] тела (лат. segmentum отрезок, кусок) — см. *Метамер.*

СЕГМЕ́НТ[2] хромосомы — любой по величине и месту расположения отрезок хромосомы, условно (в зависимости от цели и метода исследования) принимаемый за единое целое.

С. ИНТЕРСТИЦИА́ЛЬНЫЙ — С., расположенный между центромерой и местом разрыва хромосомы, приведшего к реципрокной транслокации.

С. МЕЖЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ — С., расположенный между центромерами дицентрической хромосомы.

СЕГМЕ́НТ ЛЁГКОГО (segmentum pulmonis) — см. *Бронхолегочный сегмент.*

СЕГМЕ́НТ ПЕ́ЧЕНИ (segmentum hepatis) — участок печени, соответствующий крупной ветви воротной вены, а также сопровождающим ее ветвям печеночной артерии и желчным протокам; различают 8 постоянных С. п.

СЕГМЕ́НТ СПИННО́ГО МО́ЗГА (segmentum medullae spinalis) — участок спинного мозга, дающий начало одной паре спинномозговых нервов; границы С. с. м. определяют по выходу переднего и заднего корешков спинномозгового нерва; у человека выделяют 31 С. с. м.

СЕГМЕ́НТ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРА́ММЫ — отрезок электрокардиограммы, заключенный между двумя ее зубцами.

СЕГМЕНТА́РНО-РЕФЛЕКТО́РНОЕ ВОЗДЕ́ЙСТВИЕ (син. терапия сегментарно-рефлекторная) — метод лечебного воздействия, основанный на вызывании сегментарных вегетативных рефлексов раздражением рецепторов в пределах одной зоны сегментарной иннервации с помощью каких-либо физических факторов.

СЕГМЕНТА́РНЫЕ РАССТРО́ЙСТВА — двигательные, чувствительные и (или) вегетативные расстройства, локализованные в определенной зоне сегментарной иннервации; свидетельствуют о поражении соответствующего сегмента спинного мозга.

СЕГМЕНТАЦИО́ННАЯ ПО́ЛОСТЬ — см. *Бластоцель.*

СЕГМЕ́НТНАЯ НО́ЖКА — см. *Нефротом.*

СЕГМЕНТЭКТОМИ́Я (segmentectomia; *сегмент* + *эктомия*; син. резекция легкого сегментарная) — хирургическая операция: удаление сегмента легкого.

СЕГРЕГА́ТОР (лат. segrego, segregatum отделять) в урологии — см. *Сепаратор.*

СЕГРЕГАЦИО́ННОЕ БРЕ́МЯ — см. *Сегрегационный груз.*

СЕГРЕГАЦИО́ННЫЙ ГРУЗ (син. сегрегационное бремя) — доля общего генетического груза, обусловленная локусами со сверхдоминантностью.

СЕГРЕГА́ЦИЯ (лат. segregatio отделение, удаление) в генетике — 1) расхождение родительских хромосом в мейозе; 2) см. *Расщепление.*

СЕДА́ЛИЩНАЯ ВЫРЕЗКА БОЛЬША́Я (incisura ischiadica major, PNA, BNA, JNA) — полукруглая выемка задней части крыла подвздошной кости и заднего края тела седалищной кости выше седалищной ости, участвующая в формировании большого седалищного отверстия.

СЕДА́ЛИЩНАЯ ВЫ́РЕЗКА МА́ЛАЯ (incisura ischiadica minor, PNA, BNA, JNA) — небольшая выемка заднего края тела седалищной кости ниже седалищной ости, участвующая в формировании малого седалищного отверстия.

СЕДА́ЛИЩНАЯ О́БЛАСТЬ (regio ischiadica) — см. *Ягодичная область.*

СЕДА́ЛИЩНАЯ ОСТЬ (spina ischiadica, PNA, BNA; spina ossis ischii, JNA) — выступ седалищной кости, разделяющий большую и малую седалищные вырезки.

СЕДА́ЛИЩНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ БОЛЬШО́Е (foramen ischiadicum majus, PNA, BNA, JNA) — парное отверстие в заднenижнем отделе стенки малого таза, образованное большой седалищной вырезкой и крестцово-остистой связкой; место прохождения грушевидной мышцы, верхних и нижних ягодичных, внутренних половых артерий и вен, а также нервов крестцового сплетения.

СЕДА́ЛИЩНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ МА́ЛОЕ (foramen ischiadicum minus, PNA, BNA, JNA) — парное отверстие в заднenижнем отделе стенки малого таза, образованное малой седалищной вырезкой и крестцово-бугорной связкой; через С. о. м. половой нерв, внутренние половые артерия и вена снова входят в полость малого таза.

СЕДА́ЛИЩНО-ПРЯМОКИШЕ́ЧНАЯ Я́МКА (fossa ischiorectalis, PNA, BNA, JNA) — заполненное жировой клетчаткой парное углубление в области промежности, ограниченное медиально диафрагмой таза, а латерально седалищным бугром и фасцией внутренней запирательной мышцы; место прохождения внутренних половых артерий, вены и нерва.

СЕДА́ЛИЩНЫЙ БУГО́Р (tuber ischiadicum, PNA, BNA; tuber ossis ischii, JNA) — выступающее книзу утолщение седалищной кости в месте соединения ее тела и ветвей; место прикрепления крестцово-бугорной связки, полусухожильной, полуперепончатой и двуглавой мышц бедра.

СЕДА́НА СИМПТО́М (J. Sédan, 1891—1967, франц. офтальмолог) — расходящееся косоглазие, возникающее при попытке конвергенции глаз, крайне затрудняющее чтение; наблюдается при поражении заднего продольного пучка.

СЕДАТИ́ВНЫЕ СРЕ́ДСТВА (sedativa; лат. sedo, sedatum успокаивать; син. успокаивающие средства) — лекарственные средства, оказывающие общее успокаивающее действие на центральную нервную систему (напр., препараты валерианы и пустырника, бромиды, барбитураты в малых дозах).

СЕ́ДДОНА РАХИОТОМИ́Я (H. J. Seddon, род. в 1903 г., англ. невропато-

лог) — хирургическая операция при туберкулезном спондилите, заключающаяся в резекции дужки пораженного позвонка с одновременным удалением некротических масс из тела позвонка и эпидурального пространства.

СЕ́ДЕРБЕРГА СИМПТО́М (G. Söderbergh, род. в 1878 г., шведский невропатолог) — см. *Симптом узды.*

СЕДИЙО́ ПЛА́СТИКА ГУБЫ́ (C. E. Sedillot, 1804—1883, франц. хирург) — пластическая операция: замещение дефекта верхней губы двумя прямоугольными лоскутами, выкроенными во всю толщу щеки в вертикальном направлении с основанием у крыла носа, повернутыми на 90° и сшитыми друг с другом.

СЕДИМЕНТАЦИО́ННЫЙ ме́тод в гигиене — способ выделения пыли из воздуха путем ее естественного осаждения под действием силы тяжести.

СЕДИМЕНТА́ЦИЯ (лат. sedimentum оседание) — процесс оседания мелких частиц или макромолекул в жидкости или газе под действием силы тяжести или центробежной силы; используется, напр., при лабораторных исследованиях, при изготовлении лекарственных средств.

СЕЗАРИ́ РЕТИКУЛЁЗ (A. Sézary, 1880—1956, франц. дерматолог) — см. *Сезари синдром.*

СЕЗАРИ́ СИНДРО́М (A. Sézary; син.: Сезари ретикулез, эритродермия ретикулярная) — разновидность ретикулеза кожи, характеризующаяся зудящей эритродермией с шелушением, меланодермией, лимфаденопатией, алопецией, а также лейкоцитозом с наличием в крови атипичных макрофагов.

СЕЗАРИ́ — МОРИА́КА ХРОНИ́ЧЕСКАЯ ВЕГЕТИ́РУЮЩАЯ ПИОДЕРМИ́Я (A. Sézary, 1880—1956, франц. дерматолог; Ch. M. T. Mauriac, 1832—1905, франц. венеролог) — см. *Пиодермия хроническая вегетирующая.*

СЕ́ЙБИНА ОКРА́СКА (F. R. Sabin, род. в 1871 г., амер. анатом) — метод выявления гранул и митохондриальной зернистости в клетках путем окрашивания мазков смесью нейтрального красного и януса зеленого.

СЕ́ЙБИНА ТРИА́ДА (A. B. Sabin, род. в 1906 г., амер. вирусолог) — сочетание гидроцефалии, хориоретинита и обнаруживаемых рентгенологически очагов обызвествления в головном мозге, характерное для больных токсоплазмозом.

СЕ́ЙЕРСА ме́тод (G. Sayers, род. в 1914 г., амер. эндокринолог) — метод оценки активности адренокортикотропного гормона в каком-либо субстрате; заключается в сравнении содержания аскорбиновой кислоты в надпочечниках у крыс с удаленным гипофизом после парентерального введения изучаемого субстрата и стандартного гормонального препарата.

СЕ́ЙКА СИМПТО́М (Seyk) — отсутствие зависимости границ относительной и абсолютной сердечной тупости от фаз дыхания; наблюдается при спаечном перикардите или слипчивом плеврите.

СЕ́ЙЛЯ СИМПТО́М (L. Sale, род. в 1881 г., амер. хирург) — одностороннее ослабление дыхательных шумов, обнаруживаемое при аускультации легких в случае острого воспалительного процесса в брюшной полости.

СЕ́ЙНТА СИНДРО́М (Ch. F. M. Saint, совр. южноафриканский патолог; син.: Сейнта триада, Сена синдром — нрк, Сента синдром — нрк) — сочетание грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, желчнокаменной болезни и дивертикулеза толстой кишки.

СЕ́ЙНТА ТРИА́ДА (Ch. F. M. Saint) — см. *Сейнта синдром.*

СЕЙСМОКАРДИОГРАФИ́Я (греч. seismos сотрясение, колебание + *кардиография*) — см. *Баллистокардиография сейсмическая.*

СЕЙСМО́МЕТР (истор.; греч. seismos сотрясение, колебание + metreō измерять) — прибор для исследования ощущения дрожания, возникающего при воздействии на кожу камертонами; разработан В. М. Бехтеревым.

СЕКВЕ́СТР (sequestrum; лат. sequestro откладывать, отделять) — участок некротизированной ткани, длительное время не подвергающийся аутолизу, напр. в связи с большой плотностью ткани.

СЕКВЕСТРА́ЛЬНАЯ БОРОЗДА́ (sulcus sequestralis) — линейное углубление на поверхности кости, отделяющее костный секвестр от живой ткани.

СЕКВЕСТРА́ЛЬНАЯ КА́ПСУЛА (capsula sequestralis; син. секвестральная коробка) — уплотненный слой костного вещества, отграничивающий здоровую ткань от рассасывающегося секвестра.

СЕКВЕСТРА́ЛЬНАЯ КОРО́БКА — см. *Секвестральная капсула.*

СЕКВЕСТРА́ЦИЯ (sequestratio; лат. «отделение, обособление») — отторжение некротизированного участка от сохранивших жизнеспособность тканей, происходящее в результате демаркационного воспаления.

СЕКВЕСТРА́ЦИЯ КРО́ВИ — выключение из кровотока значительной части перелитой иммунологически несовместимой крови в результате ее депонирования в органах и тканях.

СЕКВЕСТРА́ЦИЯ ЛЁГОЧНАЯ (sequestratio pulmonalis) — аномалия развития легкого, при к-рой участок его ткани формируется изолированно от бронхиальной системы и снабжается аберрантной артерией, отходящей от аорты.

С. ЛЁГОЧНАЯ ВНЕДОЛЕВА́Я — С. л., при к-рой аномальный участок легкого расположен вне легкого, в грудной или брюшной полости.

С. ЛЁГОЧНАЯ ВНУТРИДОЛЕВА́Я — С. л., при к-рой аномальный участок легкого расположен в одной из его долей, чаще в заднебазальном отделе нижней доли.

СЕКВЕСТРОТОМИ́Я (sequestrotomia; *секвестр* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция; вскрытие секвестральной капсулы с целью удаления секвестра.

СЕКВЕСТРЭКТОМИ́Я (sequestrectomia; *секвестр* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление секвестров, напр. при хроническом остеомиелите.

СЕКВО́ИЗ — аллергический альвеолит, вызываемый вдыханием грибков, вегетирующих на опилках красного дерева (напр., секвойи).

SECLÚSIO PUPÍLLAE (лат. secludo, seclusum запирать, изолировать; син. сращение зрачка) — круговое сращение зрачкового края радужки с передней капсулой хрусталика, возникающее в результате спаечного процесса при иридоциклите и нередко приводящее к нарушению оттока водянистой влаги из задней камеры в переднюю.

СЕКРЕ́Т (лат. secerno, secretum отделять, выделять) в физиологии — специфический продукт жизнедеятельности гландулоцита, выполняющий в организме определенную функцию.

СЕКРЕТИ́Н (лат. secerno, secretum отделять, выделять) — гормон, вырабатываемый слизистой оболочкой тонкой кишки и стимулирующий внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы.

СЕКРЕТИ́Н ЖЕЛУ́ДОЧНЫЙ — см. *Гастрин.*

СЕКРЕТИ́НОВЫЙ ТЕСТ — метод исследования внешнесекреторной функции поджелудочной железы, при к-ром в качестве стимулятора используют секретин.

СЕКРЕТО́РНЫЙ (лат. secerno, secretum отделять, выделять) — относящийся к процессу или продуктам секреции.

СЕКРЕТО́РНЫЙ КОМПОНЕ́НТ ИММУНОГЛОБУЛИ́НА А — полипептид, синтезируемый клетками железистого эпителия, присоединяющийся к молекуле иммуноглобулина А, после чего последняя приобретает способность проникать в различные секреты.

СЕКРЕТО́РНЫЙ ПОТЕНЦИА́Л — разность электрических потенциалов между внутренней и внешней поверхностями клеточной оболочки, обусловленная секреторной активностью клетки.

СЕКРЕТО́РНЫЙ СТА́ТУС (status secretorius) — совокупность параметров секреторной деятельности железы, характерная для данного индивидуума.

СЕКРЕТО́РНЫЙ ЦИКЛ — совокупность регулярно повторяющихся изменений структуры и обмена веществ в гландулоците, происходящих в процессе образования и выделения секрета.

СЕКРЕ́ЦИЯ (secretio; лат. «отделение», «выделение») — процесс выработки гландулоцитом секрета и выделения его на поверхность эпителия или во внутреннюю среду организма.

С. АПОКРИ́ННАЯ (греч. apokrinō отделять) — С., сопровождающаяся отторжением цитоплазматического выступа верхушки гландулоцита, напр. С. молока, пота.

С. ВНЕ́ШНЯЯ (син. С. экзокринная) — С. с выделением секрета на поверхность эпителия, напр. С. пищеварительных соков.

С. ВНУТРЕННЯЯ (incretio; син.: инкреция — устар., С. эндокринная) — С. с выделением секрета (гормона) во внутреннюю среду организма.

С. ГОЛОКРИ́ННАЯ (греч. holos весь + krinō отделять) — С., сопровождающаяся полным разрушением гландулоцита, напр. С. кожного сала.

С. МЕРОКРИ́ННАЯ (греч. meros часть + krinō отделять; син. С. морфостатическая) — С., происходящая без повреждения гландулоцита, напр. С. слюны.

С. МОРФОКИНЕТИ́ЧЕСКАЯ (греч. morphē форма + kinētos движущийся, подверженный изменениям) — С., сопровождающаяся частичным или полным разрушением гландулоцита; различают апокринную и голокринную С. м.

С. МОРФОСТАТИ́ЧЕСКАЯ (греч. morphē форма + statos неподвижный) — см. *Секреция мерокринная.*

С. ПАРАЛИТИ́ЧЕСКАЯ — непрерывная С., наступающая после денервации железы.

С. ЭКЗОКРИ́ННАЯ (греч. exō вне, наружу + krinō отделять) — см. *Секреция внешняя.*

С. ЭНДОКРИ́ННАЯ (incretio; греч. endon внутри, внутрь + krinō отделять) — см. *Секреция внутренняя.*

СЕКС- (сексо-; лат. sexus пол) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к полу, к половой жизни».

СЕКС-ДУ́КЦИЯ (*секс-* + лат. ductio ведение, отведение) — см. *F-дукция.*

СЕКСО- — см. *Секс-.*

СЕКСОЛО́ГИЯ (*сексо-* + греч. logos учение, наука) — наука, изучающая половую жизнь в ее физиологическом, психологическом и социальном аспектах.

СЕКСОПАТОЛО́ГИЯ (*сексо-* + *патология*) — область клинической медицины, изучающая половые расстройства и разрабатывающая методы их диагностики, лечения и профилактики.

СЕКСУ́АЛЬНАЯ ФО́РМУЛА — характеристика индивидуальных особенностей половой жизни на основе ответов обследуемого на предъявляемую ему анкету; выражается в виде последовательности чисел (баллов), в к-рые эти ответы переводят с помощью специальных шкал; различают мужскую (СФМ) и женскую (СФЖ) сексуальные формулы.

СЕКСУА́ЛЬНЫЕ И́ГРЫ — 1) действия детей, представляющие собой проявление эротизма, напр. взаимная демонстрация половых органов; 2) действия сексуальных партнеров, направленные на взаимное возбуждение, осуществляемые в предварительной стадии подготовительных ласк.

СЕКСУА́ЛЬНЫЙ ЭКСЦЕ́СС — совершение мужчиной более одного полового акта (с эякуляцией) в пределах суток.

СЕКС-ФА́КТОР — см. *F-фактор.*

SÉCTIO ÁLTA (лат. «высокое сечение») — см. *Цистостомия высокая.*

СЕКЦИО́ННАЯ (лат. sectio, sectionis разрезание, рассечение) — помещение, предназначенное для вскрытия трупов, оснащенное соответствующим оборудованием и инструментами.

СЕ́КЦИЯ (sectio; лат. «разрезание, рассечение») — см. *Вскрытие трупа.*

СЕЛЕЗЁНКА [lien (splen), PNA, BNA, JNA, LNH] — орган лимфатической системы, расположенный в брюшной полости (в левой подреберной области), выполняющий функции кроветворения, выработки антител, разрушения эритроцитов и тромбоцитов.

СЕЛЕЗЁНКА БЛУЖДА́ЮЩАЯ (lien mobilis) — селезенка, чрезмерно смещающаяся вследствие слабости ее связочного аппарата; чаще аномалия развития.

СЕЛЕЗЁНКА ВЕТЧИ́ННАЯ — см. *Селезенка сальная.*

СЕЛЕЗЁНКА ГЛАЗУ́РНАЯ — селезенка с резко утолщенной фиброзной капсулой, как бы покрытой глазурью; морфологический признак хронического полисерозита.

СЕЛЕЗЁНКА ДОБА́ВОЧНАЯ (lien accessorius) — разрастание селезеночной ткани вне селезенки: является аномалией развития или возникает в результате травматической (напр., при хирургической операции) имплантации клеток паренхимы селезенки на соседние органы (напр., брюшину).

СЕЛЕЗЁНКА ДО́ЛЬЧАТАЯ (lien lobatus) — аномалия развития: селезенка с глубокими втяжениями, как бы разделяющими ее на отдельные доли.

СЕЛЕЗЁНКА ДО́ЛЬЧАТАЯ СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ — см. *Спленит сифилитический гуммозный.*

СЕЛЕЗЁНКА МАЛЯРИ́ЙНАЯ (lien malaricus) — плотная, значительно увеличенная селезенка с мелкоочаговой серой пигментацией на разрезе; морфологический признак малярии, обусловленный гемосидерозом и накоплением малярийного пигмента в макрофагах синусов.

СЕЛЕЗЁНКА ПОРФИ́РНАЯ (lien porphyricus) — увеличенная плотная селезенка с множеством серых узелков на разрезе; морфологический признак генерализованного лимфогранулематоза.

СЕЛЕЗЁНКА ПЯТНИ́СТАЯ (lien maculatus) — увеличенная дряблая селезенка, имеющая на разрезе пятнистый вид вследствие неравномерного кровенаполнения; наблюдается при острой кровопотере и шоке.

СЕЛЕЗЁНКА САГОВАЯ — увеличенная плотная селезенка, имеющая на разрезе желтовато-серые участки, напоминающие зерна саго; наблюдается при очаговых отложениях амилоида, преимущественно в лимфоидных фолликулах.

СЕЛЕЗЁНКА САЛЬНАЯ (lien lardaceus; син. селезенка ветчинная) — увеличенная плотная селезенка, поверхность разрезов к-рой суховата и имеет характерный сальный блеск; наблюдается при диффузном отложении амилоида.

СЕЛЕЗЁНКА В СЕЛЕЗЁНКЕ (lien in liene) — аномалия развития, при к-рой в центре селезенки обнаруживают вторую селезенку, имеющую свою капсулу.

СЕЛЕЗЁНКА СЕПТИ́ЧЕСКАЯ (lien septicus) — увеличенная дряблая селезенка, на разрезе к-рой можно получить обильный соскоб пульпы; морфологический признак сепсиса, обусловленный гиперплазией лимфоидной ткани, полнокровием синусов и скоплением в них лейкоцитов.

СЕЛЕЗЁНКА ТИФО́ЗНАЯ (lien typhosus) — септическая селезенка при брюшном тифе, характеризующаяся гиперплазией ретикулярных клеток пульпы и образованием брюшнотифозных гранулем.

СЕЛЕЗЁНОЧНЫЕ ВЕ́ТВИ (rami lienales, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *405.*

СЕЛЕЗЁНОЧНОЕ УГЛУБЛЕ́НИЕ (recessus lienalis, PNA, BNA; син. селезеночный карман) — выпячивание сальниковой сумки влево к воротам селезенки.

СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ ИЗГИ́Б (flexura lienalis) — см. *Изгиб ободочной кишки левый.*

СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ И́НДЕКС — см. *Малярийный индекс селезеночный.*

СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ КАРМА́Н (recessus lienalis) — см. *Селезеночное углубление.*

СЕЛЕ́КЦИЯ ВИ́РУСОВ — процесс отбора вирусных клонов, обладающих определенными наследственными признаками.

СЕЛЕ́КЦИЯ РАДИАЦИО́ННАЯ — процесс выведения организмов с использованием радиационного мутагенеза и последующего отбора; применяют при селекции бактерий.

СЕЛЕ́Н (Selenium; Se) — химический элемент VI группы периодической системы Д. И. Менделеева; ат. номер 34, ат. масса 78,96; С. и все его соединения токсичны для человека.

СЕЛЕ́Н РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — группа радиоактивных изотопов селена с массовыми числами от 70 до 86 и периодом полураспада от 17 сек. до $6{,}5 \cdot 10^4$ лет; отдельные изотопы используются в радиоизотопной диагностике, напр. болезней поджелудочной железы.

СЕЛЕ́ЦКОГО ТА́ЗОВЫЙ ФЕНО́МЕН (В. В. Селецкий, отеч. невропатолог и психиатр) — приподнимание нижней части туловища лежащим на спине больным при сгибании и прижатии голени к бедру, связанное с резкой болью в области поясницы; наблюдается при пояснично-крестцовом радикулоневрите.

СЕЛИ́ТЕБНАЯ ЗО́НА — часть территории населенного пункта, занятая жилыми зданиями, спортивными сооружениями, зелеными насаждениями и местами кратковременного отдыха населения, а также предназначенная для их размещения в будущем.

СЕЛИ́ТЕБНАЯ ТЕРРИТО́РИЯ — часть территории, занятая городами и поселками городского типа, а также предназначенная для городского строительства.

СЕ́ЛЛЕРСА ЗАКРЫ́ТАЯ ВАЛЬВУЛОТОМИ́Я (A. M. Sellers, род. в 1924 г., амер. хирург) — хирургическая операция: рассечение стенозированного клапана легочного ствола с помощью вальвулотома, введенного через разрез левой легочной артерии.

СЕЛЬДИ́НГЕРА МЕ́ТОД (S. Seldinger, шведский хирург) — метод введения катетера в кровеносный сосуд путем чрескожной пункции.

СЕЛЬЕ́ АДАПТАЦИО́ННЫЙ СИНДРО́М (H. Selye, род. в 1907 г., канадский патолог) — см. *Синдром адаптационный.*

СЕЛЬЕ́ ОКРА́СКА (H. Selye) — метод окраски гистологических препаратов миокарда красителем, содержащим фуксин; основан на предположении, что фуксин задерживается лишь подвергшимися ишемии участками миокарда.

СЕЛЬЕ́ УЧЕ́НИЕ (H. Selye) — учение, согласно к-рому при действии на организм различных чрезвычайных и патологических раздражителей в нем возникает стереотипное состояние напряжения (стресс), клинически проявляющееся адаптационным синдромом.

СЕМЕ́ЙСТВО (familia) в биологии — таксономическая категория, объединяющая близкие по происхождению роды животных и растений.

СЕМЕННА́Я ЖИ́ДКОСТЬ (sperma) — см. *Сперма.*

СЕМЕННИ́К — мужская половая железа; С. у человека является яичко.

СЕМЕННО́Й БУГОРО́К (colliculus seminalis) — см. *Семенной холмик.*

СЕМЕННО́Й КАНА́ТИК (funiculus spermaticus, PNA, BNA, JNA) — анатомическое образование, расположенное в мошонке и паховом канале, представляющее собой идущие параллельно друг другу семявыносящий проток, его артерии и вены, яичковую артерию и вену, выносящие лимфатические сосуды, лозовидное венозное сплетение и яичковое нервное сплетение, окруженные общими оболочками, представленными мышцей, поднимающей яичко, и несколькими фасциями.

СЕМЕННО́Й ПРОТО́К — см. *Семявыносящий проток.*

СЕМЕННО́Й ПУЗЫРЁК (vesicula seminalis, PNA, BNA; glandula vesiculosa, JNA) — парная железа мужской половой системы, расположенная между дном мочевого пузыря и прямой кишкой; вырабатывает секрет, входящий в состав спермы.

СЕМЕННО́Й ХО́ЛМИК (colliculus seminalis, PNA, BNA, JNA; син.: горный дротик — устар., куликова головка — устар., семенной бугорок) — возвышение на середине задней стенки предстательной части мужской уретры, на вершине к-рого находится отверстие предстательной маточки.

СЕМЕ́ННЫЕ КАНА́ЛЬЦЫ ИЗВИ́ТЫЕ (tubuli seminiferi contorti, PNA, BNA; tubuli contorti, JNA) — длинные, сильно извитые трубчатые образования, выстланные эпителием и образующие паренхиму яичка.

СЕМЕ́ННЫЕ КАНА́ЛЬЦЫ ПРЯМЫ́Е (tubuli seminiferi recti, PNA, BNA) — короткие трубчатые образования, являющиеся продолжением извитых семенных канальцев и соединяющие их с сетью яичка.

СЕМЕРА́У-СЕМЯНО́ВСКОГО ПАРОКСИЗМА́ЛЬНЫЙ КОЛЛА́ПС (M. Semerau-Siemianowski, польский врач) — внезапный коллапс, сопровождающийся оцепенением и резкой слабостью без потери сознания, заканчивающийся полиурией или поносом; наблюдается у женщин с гипофункцией яичников.

СЕМИ- (лат. semi-) — приставка, означающая «полу-», «наполовину».

СЕМИКО́ПНОГО ПРИБО́Р (И. Д. Семикопный, сов. офтальмолог) — прибор для исследования сумеречного зрения, позволяющий изучать динамику световой чувствительности как в первые минуты темновой адаптации, так и при переходе от оптимального освещения к слабому.

СЕМИНО́МА (seminoma; лат. semen, seminis семя + *-ома*; син.: семинома яичка, сперматогониома, сперматоцитома) — злокачественная опухоль, исходящая из клеток сперматогенного эпителия яичка.

СЕМИНО́МА ЯИ́ЧКА (seminoma testis) — см. *Семинома.*

СЕМИНО́МА ЯИ́ЧНИКА (seminoma ovarii) — см. *Дисгерминома.*

СЕМИОЛО́ГИЯ (semiologia; греч. sēmeion знак, признак + logos учение) — см. *Семиотика.*

СЕМИО́ТИКА (греч. sēmeiōtikon; син.: семиология, симптоматология) в медицине — учение о признаках (симптомах) болезней и патологических состояний.

СЕ́МОНА ЗАКО́Н (F. Semon, 1849—1921, англ. оториноларинголог; син. Розенбаха — Семона закон) — закономерность, согласно к-рой при сдавлении возвратного гортанного нерва в первую очередь возникают параличи мышц, расширяющих голосовую щель.

СЕМЯВЫБРА́СЫВАЮЩИЙ ПРОТО́К (ductus ejaculatorius, PNA, BNA, JNA; син. семяизвергающий проток) — проток, образующийся при слиянии семявыносящего протока и выделительного протока семенного пузырька, проходящий через предстательную железу и открывающийся на семенном бугорке в предстательной части мочеиспускательного канала.

СЕМЯВЫНОСЯ́ЩИЕ КАНА́ЛЬЦЫ — см. *Канальцы яичка выносящие.*

СЕМЯВЫНОСЯ́ЩИЙ ПРОТО́К (ductus deferens, PNA, BNA, JNA; син. семенной проток) — продолжение протока придатка яичка; входит в состав семенного канатика и у основания предстательной железы переходит в семявыбрасывающий проток.

СЕМЯИЗВЕРГА́ЮЩИЙ ПРОТО́К (ductus ejaculatorius) — см. *Семявыбрасывающий проток.*

СЕМЯИЗВЕРЖЕ́НИЕ (ejaculatio) — см. *Эякуляция.*

СЕМЯПРОВО́Д — проток, по к-рому мужские половые клетки выводятся из половой железы; у человека — семявыносящий и семявыбрасывающий протоки.

СЕ́НА СИНДРО́М (нрк; Ch. F. M. Saint, совр. южноафриканский патолог) — см. *Сейнта синдром.*

СЕ́НДЕРСА СИМПТО́М (нрк; J. Sanders, 1777—1843, англ. врач) — см. *Сандерса симптом.*

СЕНЕСТОПАТИ́Я (coenaesthopathia; франц. cénesthopathie от греч. koinos общий + aisthēsis чувство, ощущение + pathos страдание, болезнь) — психопатологический симптом: тягостное ощущение (напр., натяжения, жжения), локализуемое больным на каком-либо участке поверхности тела или во внутренних органах, возникающее при отсутствии изменений в тканях и органах, выявляемых современными методами исследования.

СЕНЕСТОПАТИ́ЧЕСКИ-ИПОХО́НДРИ́ЧЕСКОЕ РАССТРО́ЙСТВО — см. *Вернике соматопсихоз.*

СЕНИЛИ́ЗМ (лат. senilis старческий) — см. *Слабоумие старческое.*

СЕНИ́ЛЬНЫЙ (senilis) — старческий; относящийся к старости, типичный для старости.

СЕНИ́РА — А́ШЕРА СИНДРО́М (F. E. Senear, 1889—1958, амер. дерматолог; B. Usher, род. в 1899 г., канадский дерматолог) — см. *Пузырчатка себорейная.*

СЕ́ННА — РИ́ККЕТСА КО́СТНЫЙ ШОВ (истор.; N. Senn, 1844—1908, амер. хирург; Rickets) — соединение костных отломков с помощью полых цилиндров, изготовленных из бедренной кости быка.

СЕНСИБИЛИЗА́ЦИЯ (франц. sensibilisation от лат. sensibilis чувствительный) — повышение чувствительности организма или отдельных возбудимых образований, напр. органов чувств, к воздействию какого-либо фактора окружающей или внутренней среды.

С. АКТИ́ВНАЯ — С. к антигену (аллергену), возникающая при его попадании в организм.

С. МОНОВАЛЕ́НТНАЯ — С. к одному аллергену.

С. ПАССИ́ВНАЯ — С. к антигену путем введения в интактный организм сыворотки крови или лимфоидных клеток от активно сенсибилизированного донора.

С. ПЕРЕКРЁСТНАЯ — С. к антигенам, имеющим общие детерминанты с аллергеном, вызвавшим сенсибилизацию.

С. ПОЛИВАЛЕ́НТНАЯ — С. к нескольким аллергенам.

СЕНСИТИ́ВНОСТЬ (англ. sensitivity чувствительность от лат. sensus чувство) — особенность личности, выражающаяся в повышенной чувствительности и ранимости, неуверенности в себе, повышенной совестливости и склонности к сомнениям, фиксации на своих переживаниях.

СЕНСО- (лат. sensus чувство, ощущение, восприятие) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к чувству, к ощущению, к восприятию».

СЕНСОПАТИ́И (sensopathiae; *сенсо-* + греч. pathos страдание, болезнь) — нарушения чувственного познания (ощущений, восприятий, представлений) при психических болезнях.

СЕНСО́РНАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ (англ. sensory чувствительный, сенсорный, от лат. sensus чувство) — см. *Депривация сенсорная.*

СЕНСО́РНЫЙ ЭЛЕМЕ́НТ в кибернетике — элемент системы, преобразующий поступающую информацию в сигнал, специфичный для ее каналов связи, напр. преобразующий звук в сочетания электрических импульсов.

СЕ́НТА СИНДРО́М (нрк; Saint, южноафриканский патолог) — см. *Сейнта синдром.*

СЕНТО́НА СИМПТО́М (P. Sainton, франц. невропатолог) — приподнимание верхнего века при попытке больного фиксировать взгляд на предмете, перемещаемом сверху вниз; наблюдается при тиреотоксикозе.

СЕ́НХАУЗА — КИ́РКСА СИНДРО́М (Senhouse; Kirkes) — шоковое состояние, возникающее в результате кровоизлияний в надпочечники или их токсико-аллергического повреждения; проявляется тошнотой, рвотой, поносом, судорогами, гипотонией, тахикардией, акроцианозом, гипотермией, увеличением количества остаточного азота в крови.

СЕПАРА́ТОР (истор.; лат. separator отделитель; син. сегрегатор) в урологии — двойной уретральный катетер, снабженный диафрагмой, делящей полость мочевого пузыря на две части; предназначался для раздельного получения мочи, поступающей из мочеточников; вышел из употребления в связи с изобретением катетеризационного цистоскопа.

СЕПАРА́ТОР ЗУБО́В — см. *Сепаратор стоматологический.*

СЕПАРА́ТОР СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ (устар.; син. сепаратор зубов) — инструмент для раздвигания зубов.

СЕ́ПСИС (sepsis; греч. sēpsis гниение; син.: заражение крови — устар., инфекция общая — нрк, инфекция общая гнойная) — патологическое состояние, обусловленное непрерывным или периодическим поступлением в кровь микроорганизмов из очага гнойного воспаления, характеризующееся несоответствием тяжелых общих расстройств местным изменениям и часто образованием новых очагов гнойного воспаления в различных органах и тканях.

С. АНАЭРО́БНЫЙ (s. anaërobica) — С., вызванный возбудителями анаэробной инфекции.

С. ГНИЛОСТНЫЙ (s. putrida) — С., вызванный возбудителями гнилостной инфекции.

С. ГОНОКО́ККОВЫЙ (s. gonococcica; син. гоносепсис) — С., обусловленный генерализацией гонококковой инфекции.

С. ГРИБКО́ВЫЙ (s. mycotica) — С., вызванный паразитическими грибками.

С. КАНДИДАМИКОТИ́ЧЕСКИЙ (s. candidamycotica; син.: кандидоз генерализованный, септицемия кандидамикозная) — С., обусловленный генерализацией кандидоза; характеризуется множественным метастазированием во внутренние органы.
С. КИШЕ́ЧНЫЙ (s. intestinalis) — С. новорожденного, при к-ром первичным очагом гнойного воспаления является кишечник.
С. КО́ЖНЫЙ (s. cutanea) — С. новорожденного, при к-ром первичный очаг гнойного воспаления находится в коже или подкожной клетчатке.
С. КО́ЛИ-БАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ (s. colibacterialis; син.: Жильбера синдром — устар., С. коли-бациллярный) — С., обусловленный генерализацией коли-инфекции; наблюдается чаще у новорожденных или ослабленных детей.
С. КО́ЛИ-БАЦИЛЛЯ́РНЫЙ (s. colibacillaris) — см. *Сепсис коли-бактериальный.*
С. КРИПТОГЕ́ННЫЙ (s. cryptogena) — С., при к-ром первичный очаг гнойного воспаления остался нераспознанным.
С. ЛЁГОЧНЫЙ (s. pulmonalis) — С. новорожденного, при к-ром первичный очаг гнойного воспаления расположен в легких.
С. МЕНИНГОКО́ККОВЫЙ СВЕРХО́СТРЫЙ — см. *Менингококкемия молниеносная.*
С. МОЛНИЕНО́СНЫЙ (s. fulminans) — см. *Сепсис острейший.*
С. НЕОНАТА́ЛЬНЫЙ (s. neonatorum; греч. neos новый + лат. natus рожденный) — см. *Сепсис новорожденных.*
С. НОВОРОЖДЁННЫХ (s. neonatorum; син.: С. неонатальный, С. фетальный) — С., развивающийся в период новорожденности; обусловлен инфицированием плода при родах или в период внутриутробного развития.
С. ОДОНТОГЕ́ННЫЙ (s. odontogena; греч. odus, odontos зуб + -genēs порожденный, возникший) — С., при к-ром первичный очаг гнойного воспаления расположен в зубах.
С. ОСТРЕ́ЙШИЙ (s. peracuta, s. superacuta; син. С. молниеносный) — клиническая форма С., обусловленная распространением высокопатогенных микроорганизмов и характеризующаяся крайне тяжелым и быстрым течением.
С. О́СТРЫЙ (s. acuta) — клиническая форма С., характеризующаяся быстрым (несколько дней) развитием выраженной клинической картины болезни и отсутствием ремиссий.
С. ОТОГЕ́ННЫЙ (s. otogena) — С., при к-ром первичный очаг гнойного воспаления расположен в среднем ухе.
С. ПЕРИТОНЕА́ЛЬНЫЙ (s. peritonealis) — острейший С., возникший при остром гнойном перитоните.
СЕ́ПСИС ПИРОГО́ВА — ПАСТЕ́РА — ЛИ́СТЕРА — см. *Лихорадка гнойно-резорбтивная.*
С. ПОДО́СТРЫЙ (s. subacuta) — клиническая форма С., характеризующаяся преимущественно возникновением метастатических абсцессов и менее выраженными, чем при остром С., общими нарушениями.
С. ПОСЛЕАБО́РТНЫЙ (s. postabortiva) — С., развивающийся как осложнение аборта, чаще криминального.
С. ПОСЛЕРОДОВО́Й (s. puerperalis; син.: родовая горячка, С. пуэрперальный) — С., развившийся у женщин как осложнение послеродовой инфекции.
С. ПУПО́ЧНЫЙ (s. umbilicalis) — С. новорожденных, при к-ром первичный очаг гнойного воспаления расположен в пупочных сосудах или пупочной ямке.
С. ПУЭРПЕРА́ЛЬНЫЙ (s. puerperalis; лат. puerperalis послеродовой) — см. *Сепсис послеродовой.*
С. РАНЕВО́Й (s. vulneralis) — С., при к-ром первичным очагом гнойного воспаления является инфицированная рана.
С. РИНОГЕ́ННЫЙ (s. rhinogena; греч. rhis, rhinos нос + -genēs порожденный, возникший) — С., при к-ром первичный очаг гнойного воспаления расположен в носу; возникновению С. р., как правило, предшествует тромбофлебит пещеристого или верхнего сагиттального синуса твердой мозговой оболочки.
С. РОТОВО́Й (s. oralis; син. С. стоматогенный) — С., при к-ром первичный очаг гнойного воспаления расположен в тканях, окружающих ротовую полость.
С. СА́ПНЫЙ (s. malleica) — острый С., вызванный возбудителем сапа; клиническая форма сапа с тяжелым течением.
С. СИБИРЕЯ́ЗВЕННЫЙ ВТОРИ́ЧНЫЙ (s. anthracica secundaria) — острый С., вызванный распространением сибиреязвенной палочки из первичного аффекта; клиническая форма сибирской язвы с тяжелым течением.
С. СИБИРЕЯ́ЗВЕННЫЙ ПЕРВИ́ЧНЫЙ (s. anthracica primaria) — острейший С. при гематогенном распространении сибиреязвенной палочки без образования выраженного первичного аффекта; клиническая форма сибирской язвы с крайне тяжелым течением.
С. СТОМАТОГЕ́ННЫЙ (s. stomatogena) — см. *Сепсис ротовой.*
С. ТОНЗИЛЛОГЕ́ННЫЙ (s. tonsillogena; лат. tonsilla миндалина + греч. -genēs порожденный, возникший) — С., при к-ром первичный очаг гнойного воспаления расположен в миндалине, околоминдаликовом или окологлоточном клетчаточном пространстве.
С. ТРОМБОФЛЕБИТИ́ЧЕСКИЙ (s. thrombophlebitica) — С., обусловленный распространением возбудителя из очага гнойного тромбофлебита, чаще из вен малого таза, с преимущественным метастазированием в легкие и почки.
С. ФЕТА́ЛЬНЫЙ (s. fetalis) — см. *Сепсис новорожденных.*
С. ФУЗОСПИРОХЕ́ТНЫЙ — гнилостный С., вызванный веретенообразной бактерией Плаута — Венсана (спирохетой Венсана).
С. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (s. chronica; син. хрониосепсис — устар.) — медленно текущий С. с длительными (до нескольких месяцев и лет) периодами ремиссии между образованием очагов гнойного воспаления в различных органах и тканях.

СЕ́ПСИС ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ О́СТРЫЙ (sepsis tuberculosa acuta) — форма милиарного туберкулеза, характеризующаяся возникновением множества очагов некроза в различных органах, резкой лейкопенией и тяжелой анемией; встречается чаще у детей младшего возраста.
SÉPSIS LÉNTA (лат. «сепсис затяжной») — см. *Эндокардит септический подострый.*
СЕПТА́ЛЬНЫЙ (septalis; лат. septum перегородка) — относящийся к перегородке, напр. сердца.
СЕ́ПТИК (греч. sēptikos вызывающий гниение, гнилостный) — см. *Септик-тенк.*
СЕПТИК- (септико-, септиц; греч. sēpsis гниение, sēptikos вызывающий гниение, гнилостный) — составная часть сложных слов, означающая «подверженный гниению», «гноящийся», «вызывающий гниение», «септический».
СЕПТИКО- — см. *Септик-.*
СЕПТИКОГРАНУЛЕМАТО́З НОВОРОЖДЁННЫХ (septicogranulomatosis neonatorum; *септико-* + *гранулематоз*; син. гранулематоз новорожденных) — форма листериоза, наблюдающаяся у новорожденных при трансплацентарном или трансвагинальном заражении, характеризующаяся диссеминацией возбудителя с возникновением специфических гранулем и абсцессов во внутренних органах.
СЕПТИКОПИЕМИ́Я (septicopyaemia; *септико-* + *пиемия*; син. гнилогнойнокровие — устар.) — форма сепсиса, при к-рой наряду с явлениями интоксикации организма происходит образование метастатических абсцессов в различных тканях и органах.
СЕПТИКТЕ́НК (*септик-* + англ. tank резервуар; син. септик) — сооружение для предварительной очистки сточных вод; в С. происходит осветление воды и распад осевших органических веществ; применяется в небольших системах канализации.
СЕПТИЦ- — см. *Септик-.*
СЕПТИЦЕМИ́Я (septicaemia; *септиц-* + греч. haima кровь; син. гнилокровие — устар.) — форма сепсиса, при к-рой наличие патогенных микроорганизмов в крови не сопровождается образованием метастатических очагов гнойного воспаления.
СЕПТИЦЕМИ́Я ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКАЯ (septicaemia haemorrhagica) — см. *Пастереллез.*
СЕПТИЦЕМИ́Я КАНДИДАМИКО́ЗНАЯ (septicaemia candidamycotica) — см. *Сепсис кандидамикотический.*
СЕПТИЦЕМИ́Я МОРФИНИ́СТОВ (устар.) — см. *Мелиоидоз.*
СЕ́РА (Sulfur; S) — химический элемент VI группы периодической системы Д. И. Менделеева; атомный номер 16, атомная масса 32,06; твердое кристаллическое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде; используется при изготовлении нек-рых лекарственных средств; соединения С. широко распространены в живой природе.
СЕ́РА РАДИОАКТИ́ВНАЯ — общее название группы радиоактивных изотопов серы с массовым числом от 31 до 38 и периодом полураспада от 2,4 сек. до 87,1 суток; изотоп ^{35}S используется для исследования обмена серы в организме.

СЕ́РАЯ ПОЛО́СКА (fasciola cinerea, BNA) — см. *Извилина ленточная.*

СЕ́РАЯ СПА́ЙКА спинного мозга (commissura grisea, PNA; commissura grisea anterior, BNA) — перемычка, соединяющая серое вещество правой и левой половины спинного мозга на всем его протяжении.

СЕРВЕ́ЛЛА СИНДРО́М (M. Servelle) — врожденное сочетание остеопороза, укорочения костей голени и наличия на нижних конечностях узлов варикозно расширенных вен, содержащих известковые конкременты.

СЕРДЕ́ЧНАЯ ГО́НКА — см. *Сердцебиение.*

СЕРДЕ́ЧНАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ (insufficientia cordis; син. декомпенсация сердечной деятельности — нрк) — неспособность сердца обеспечить адекватное кровоснабжение органов без участия дополнительных компенсаторных механизмов, не приводимых в действие при тех же обстоятельствах, если функциональные возможности сердца находятся в пределах нормы.

С. Н. ЛАТЕ́НТНАЯ (i. c. latens) — см. *Субкомпенсация сердечной деятельности.*

С. Н. ЛЕВОЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ — см. *Левожелудочковая недостаточность.*

С. Н. ПРАВОЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ — см. *Правожелудочковая недостаточность.*

С. Н. ТОТА́ЛЬНАЯ (i. c. totalis) — сочетание лево- и правожелудочковой С. н. без четкого превалирования какой-либо из этих форм; встречается при диффузных поражениях миокарда, при тампонаде сердца и констриктивном перикардите.

С. Н. ЭНЕРГОДИНАМИ́ЧЕСКАЯ (син. синдром энергодинамической недостаточности сердца) — С. н., обусловленная быстрой истощаемостью миокарда.

СЕРДЕ́ЧНАЯ ПА́УЗА — период между аускультативно регистрируемыми тонами сердца; различают малую С. п., соответствующую систоле желудочков, и большую С. п., соответствующую диастоле желудочков.

СЕРДЕ́ЧНАЯ СОРО́ЧКА — см. *Перикард.*

СЕРДЕ́ЧНАЯ ТРУ́БКА (cor tubulare simplex, LNE) — закладка сердца у эмбриона, имеющая вид трубки, образованной эндотелием.

СЕРДЕ́ЧНАЯ ТУ́ПОСТЬ (obtusio cardiaca) — участок передней стенки грудной клетки, на к-ром определяется укорочение перкуторного звука, обусловленное близко расположенным сердцем.

С. Т. АБСОЛЮ́ТНАЯ (o. c. absoluta; син.: С. т. малая, С. т. поверхностная) — С. т., обнаруживаемая при тихой (тишайшей) перкуссии; примерно соответствует проекции на переднюю стенку грудной клетки части сердца, не прикрытой легкими.

С. Т. БОЛЬША́Я — см. *Сердечная тупость относительная.*

С. Т. ГЛУБО́КАЯ — см. *Сердечная тупость относительная.*

С. Т. МА́ЛАЯ — см. *Сердечная тупость абсолютная.*

С. Т. ОТНОСИ́ТЕЛЬНАЯ (o. c. relativa; син.: С. т. большая, С. т. глубокая) — С. т., обнаруживаемая при перкуссии, проводимой по межреберным промежуткам с применением резких перкуторных ударов строго в сагиттальном направлении; примерно соответствует проекции на переднюю стенку грудной клетки всего сердца, включая часть, прикрытую легкими.

С. Т. ПОВЕ́РХНОСТНАЯ — см. *Сердечная тупость абсолютная.*

СЕРДЕ́ЧНО-АРТЕРИА́ЛЬНЫЙ ИНТЕРВА́Л — см. *Кардиоартериальный интервал.*

СЕРДЕ́ЧНОЕ ВДАВЛЕ́НИЕ 1) легкого [impressio cardiaca, PNA; impressio cardiaca (pulmonis), JNA] — углубление на медиальной поверхности правого легкого, соответствующее месту прилегания сердца; 2) печени [impressio cardiaca, PNA, JNA; impressio cardiaca (hepatis), BNA]—углубление на верхней части диафрагмальной поверхности печени, соответствующее расположению сердца.

СЕРДЕ́ЧНО-ЛЁГОЧНАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ (insufficientia cardiopulmonalis; син.: кардиопульмональная недостаточность, синдром кардиопульмональный, синдром сердечно-легочный) — недостаточность функции внешнего дыхания, обусловленная уменьшением поверхности альвеол при патологических изменениях легких, вызванных хронической левожелудочковой и левопредсердной недостаточностью.

СЕРДЕ́ЧНО-ЛЁГОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕ́НТ (син. Мартина индекс) — отношение поперечника сердца, установленного по данным телерентгенографии, к поперечнику грудной клетки; увеличен при заболеваниях сердца, ведущих к расширению его рентгеновской тени, уменьшен при эмфиземе легких.

СЕРДЕ́ЧНО-СОСУ́ДИСТАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ (insufficientia cardiovascularis) — сочетание сердечной и сосудистой недостаточности, объединенных общностью этиологии или патогенеза.

СЕРДЕ́ЧНО-СОСУ́ДИСТЫЕ СРЕ́ДСТВА (cardiovascularia) — лекарственные средства, применяемые при болезнях сердца и сосудов (напр., кардиотонические, противоаритмические, антиангинальные, гипотензивные).

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ВЕ́КТОР — вектор электродвижущей силы электрического поля сердца.

С. В. ДЕПОЛЯРИЗА́ЦИИ (син. вектор деполяризации) — С. в. в период деполяризации миокарда (обычно миокарда желудочков).

С. В. МОМЕ́НТНЫЙ — 1) С. в. в данный момент времени; 2) вектор электродвижущей силы элементарного сердечного диполя в данный момент времени.

С. В. РЕПОЛЯРИЗА́ЦИИ (син. вектор реполяризации) — С. в. в период реполяризации миокарда (обычно желудочков).

С. В. САГИТТА́ЛЬНЫЙ — проекция С. в. на сагиттальную плоскость тела.

С. В. ФРОНТА́ЛЬНЫЙ — проекция С. в. на фронтальную плоскость тела.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ВЫ́БРОС — см. *Минутный объем сердца.*

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ВЫ́БРОС МИНУ́ТНЫЙ — см. *Минутный объем сердца.*

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ВЫСТУ́П (prominentia cardiaca, LNE) — выступ на брюшной стороне зародыша, возникающий вследствие выпячивания стенки тела разрастающимся и уже функционирующим сердцем.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ДИПО́ЛЬ СУММА́РНЫЙ (син. сердечный мультиполь) — отображение электрического поля сердца в виде якобы создавшего его диполя (пары электрических зарядов равной величины и противоположного знака).

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ДИПО́ЛЬ ЭЛЕМЕНТА́РНЫЙ — окруженная электрическим полем пара электрических зарядов равной величины, но противоположного знака, расположенных в функционирующем миокарде на минимально возможном расстоянии один от другого.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ И́НДЕКС (син. минутный индекс) — показатель функции сердца, представляющий собой отношение минутного объема сердца к площади поверхности тела; выражается в $л/мин \cdot м^2$.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ КОЛЛО́ИД — вещество, выявляемое в клетках миокарда при их окраске фуксином по методу Селье; предполагается, что С. к. образуется при ишемии.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ МУЛЬТИПО́ЛЬ — см. *Сердечный диполь суммарный.*

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ТОЛЧО́К (ictus cordis) — пальпируемое, а иногда видимое сотрясение участка передней стенки грудной клетки, вызванное сокращением сердца.

С. Т. ВЕРХУ́ШЕЧНЫЙ (i. c. apicalis) — см. *Верхушечный толчок.*

С. Т. КУПОЛООБРА́ЗНЫЙ — верхушечный толчок, напоминающий подкатывание шара под пальпирующие пальцы; наблюдается при значительной гипертрофии левого желудочка.

С. Т. РЕЗИСТЕ́НТНЫЙ (i. c. resistens) — верхушечный толчок, оказывающий значительное сопротивление пальпирующей руке при надавливании; наблюдается при стенозе устья аорты.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ТОЛЧО́К ДОБА́ВОЧНЫЙ ПРОТОДИАСТОЛИ́ЧЕСКИЙ (ictus cordis accessorius protodiastolicus) — сотрясение грудной стенки, следующее сразу за верхушечным толчком и обусловленное быстрым выбросом скопившейся в левом предсердии крови в левый желудочек в начале диастолы; наблюдается при митральной недостаточности.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ТОЛЧО́К ОТРИЦА́ТЕЛЬНЫЙ (ictus cordis negativus) — ритмичное втяжение грудной стенки во время систолы желудочков; наблюдается при спаечном перикардите.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ЦИКЛ (cyclus cardiacus) — совокупность электрофизиологических, биохимических и биофизических процессов, происходящих в сердце на протяжении одного сокращения; началом С. ц. принято считать появление на электрокардиограмме зубца *P* или потенциала деполяризации, обусловленного возбуждением гетеротопного источника ритма.

СЕРДЕ́ЧНЫЙ ШУМ (murmur cardiacum) — см. *Шум сердца.*

СЕ́РДЦЕ (cor, PNA, BNA, JNA) — фиброзно-мышечный орган кровеносной системы, расположенный в среднем средостении, в околосердечной сумке и содержащий систему полостей (предсердия и желудочки); сокращения С. обеспечивают продвижение крови по сосудам.

СЕ́РДЦЕ АСТЕ́НИКА (cor asthenicum; син.: сердце висячее, сердце ка-

пельное) — конституциональный вариант формы сердца, характеризующийся приближающимся к вертикальному положением анатомической оси и относительно небольшими линейными размерами рентгеновской тени; наблюдается обычно у лиц астенического телосложения.

СЕ́РДЦЕ БАЗЕ́ДОВО-ТИРЕОТОКСИ́ЧЕСКОЕ — см. *Сердце тиреотоксическое.*

СЕ́РДЦЕ БЫ́ЧЬЕ (cor bovinum) — значительная степень кардиомегалии.

СЕ́РДЦЕ ВИСЯ́ЧЕЕ (cor pendulum) — см. *Сердце астеника.*

СЕ́РДЦЕ ВОЛОСА́ТОЕ (cor hirsutum) — см. *Сердце ворсинчатое.*

СЕ́РДЦЕ ВОРСИ́НЧАТОЕ (cor villosum; син. сердце волосатое) — сердце, поверхность к-рого сплошь покрыта склерозирующимися и свежими волокнами фибрина; наблюдается при массивном фибринозном перикардите.

СЕ́РДЦЕ ГИПЕРСТЕ́НИКА (син. сердце лежачее) — конституциональный вариант формы сердца, характеризующийся приближающимся к горизонтальному положением анатомической оси и относительно большими линейными размерами рентгеновской тени; наблюдается у лиц гиперстенического телосложения или при высоком стоянии диафрагмы.

СЕ́РДЦЕ ГИПОТИРЕО́ИДНОЕ (cor hypothyreoideum; син. сердце микседематозное) — сочетание расширения границ сердца, глухости его тонов, брадикардии, низкого вольтажа зубцов электрокардиограммы с отсутствием зубцов *P* и *T*, наблюдаемое у больных гипотиреозом.

СЕ́РДЦЕ ГЛАЗУ́РНОЕ — сердце с резко утолщенным перикардом, имеющим вид беловатой полупрозрачной пластинки; наблюдается при хроническом серозном перикардите.

СЕ́РДЦЕ ДЕТРЕНИРО́ВАННОЕ — патологическое состояние сердца, возникающее при длительной общей гиподинамии (напр., после длительного пребывания на постельном режиме); проявляется снижением переносимости физической нагрузки.

СЕ́РДЦЕ ЖИ́РНОЕ (cor adiposum) — сердце с массивными жировыми отложениями под эпикардом; наблюдается при нарушениях жирового обмена.

СЕ́РДЦЕ ИСКУ́ССТВЕННОЕ (cor artificiale) — имплантируемый аппарат, полностью замещающий насосную функцию сердца и действующий за счет автономного или внешнего источника энергии; находится в процессе разработки.

СЕ́РДЦЕ КА́ПЕЛЬНОЕ — см. *Сердце астеника.*

СЕ́РДЦЕ КИФОСКОЛИОТИ́ЧЕСКОЕ (cor kyphoscolioticum) — легочное сердце у больных кифосколиозом, развивающееся в связи с деформацией грудной клетки, сдавлением легких и частым развитием легочной патологии у таких больных.

СЕ́РДЦЕ ЛЁГОЧНОЕ (cor pulmonale) — патологическое состояние, характеризующееся гипертрофией и (или) дилатацией правого желудочка сердца в результате легочной гипертензии; возникает, как правило, при поражениях бронхов, легких, легочных сосудов, диафрагмы, плевры и грудной клетки.

С. ЛЁГОЧНОЕ ДЕКОМПЕНСИ́РОВАННОЕ (c. pulmonale decompensatum; син. легочно-сердечная недостаточность) — С. л., характеризующееся выраженной недостаточностью кровообращения и внешнего дыхания.

С. ЛЁГОЧНОЕ О́СТРОЕ (c. pulmonale acutum) — С. л., характеризующееся внезапным и стремительным развитием правожелудочковой недостаточности; возникает при внезапном и резком повышении кровяного давления в системе легочного ствола, чаще при эмболии легочного ствола или его крупных ветвей.

С. ЛЁГОЧНОЕ ПОДО́СТРОЕ (c. pulmonale subacutum) — С. л., характеризующееся появлением признаков перегрузки правых отделов сердца за несколько дней, а правожелудочковой недостаточности за несколько недель; возникает при быстром повышении сосудистого сопротивления в малом круге кровообращения или развитии легочной гипертензии (напр., при повторной эмболии мелких ветвей легочного ствола, вдыхании паров иприта).

С. ЛЁГОЧНОЕ ХРОНИ́ЧЕСКОЕ (c. pulmonale chronicum) — С. л., развивающееся постепенно на протяжении многих лет при хронических заболеваниях легких, напр. диффузном пневмосклерозе, эмфиземе легких, хронической пневмонии.

СЕ́РДЦЕ ЛЕЖА́ЧЕЕ — см. *Сердце гиперстеника.*

СЕ́РДЦЕ МИКСЕДЕМАТО́ЗНОЕ — см. *Сердце гипотиреоидное.*

СЕ́РДЦЕ ПА́НЦИРНОЕ (cor testaceum) — сердце с резко утолщенным, уплотненным и обызвествленным перикардом; наблюдается в исходе спаечного перикардита.

СЕ́РДЦЕ ПИВНО́Е — тяжелая форма алкогольной миокардиодистрофии, характеризующаяся выраженной дилатацией всех отделов сердца, нарушениями его ритма и проводимости, сердечной недостаточностью.

СЕ́РДЦЕ СПОРТИ́ВНОЕ — сердце у лиц, длительно занимающихся спортом, характеризующееся гипертрофией левого, а затем и правого желудочка, умеренной дилатацией, повышенной сократительной способностью миокарда, брадикардией в покое.

СЕ́РДЦЕ СТА́РЧЕСКОЕ (cor senile) — сочетание изменений сердца, свойственных старению: диффузного мелкоочагового кардиосклероза, атрофически-дистрофических изменений миокарда, липоматоза стенок сердца; проявляется нарушениями проводимости и снижением сократительной способности миокарда.

СЕ́РДЦЕ ТИГРО́ВОЕ (cor tigrinum) — сердце, на разрезе к-рого под эндокардом, в особенности на сосочковых и гребенчатых мышцах, различимы тонкие желто-белые полоски, напоминающие тигровую шкуру; наблюдается при резкой степени жировой дистрофии миокарда.

СЕ́РДЦЕ ТИРЕОТОКСИ́ЧЕСКОЕ (cor thyreotoxicum; син. сердце базедово-тиреотоксическое) — миокардиодистрофия у больных тиреотоксикозом, характеризующаяся тахикардией, увеличением минутного объема сердца, аритмией (пароксизмальной тахикардией, мерцательной аритмией), позже — развитием сердечной недостаточности.

СЕ́РДЦЕ ЮНОШЕ́СКОЕ (cor juvenum) — общее название преходящих нарушений деятельности сердца, обусловленных функциональной перестройкой эндокринной и других систем организма в период полового созревания; проявляется тахикардией, иногда экстрасистолией и (или) появлением систолического шума.

СЕРДЦЕБИЕ́НИЕ (palpitatio cordis; син. сердечная гонка) — ощущение учащения или усиления деятельности сердца.

СЕРЕ́БРЕННИКОВА ГАСТРОСТОМИ́Я (Л. В. Серебренников, сов. хирург) — модификация гастростомии по Кадеру, при к-рой помимо наложения кисетных швов на стенку желудка, создающих канал вокруг резиновой трубки, отдельными швами инвагинируют стенку желудка в его просвет.

СЕРЕБРО́ (Argentum; Ag) — химический элемент I группы периодической системы Д. И. Менделеева; атомный номер 47, атомная масса 107, 868; пластичный металл белого цвета; С. обладает бактерицидными свойствами.

СЕРЕБРО́ РАДИОАКТИ́ВНОЕ — общее название группы радиоактивных изотопов серебра с массовыми числами от 102 до 117 и периодом полураспада от 5 сек. до 253 суток; отдельные изотопы используются в лучевой терапии.

СЕРЕ́ЙСКОГО СИНДРО́М (М. Я. Серейский, 1885—1957, сов. психиатр; син. синдром трех «А») — сочетание аспонтанности, адинамии и абулии, наблюдаемое при поражении лобного полюса большого мозга.

СЁРЕНСЕНА МЕ́ТОД (S. P. L. Sørensen, 1868—1939, датский химик) — метод количественного определения содержания белка, основанный на связывании его аминных групп формальдегидом с последующим титрованием карбоксильных групп щелочью.

СЕРЖА́НА СИМПТО́М (E. E. Sergent, 1867—1943, франц. терапевт) — 1) стойкий красный дермографизм; признак повышенной лабильности вегетативной нервной системы; 2) белый дермографизм на коже живота; признак недостаточности надпочечников и артериальной гипотензии.

СЕРЖА́НА СИНДРО́М (E. E. Sergent) — сочетание синдрома Бернара — Горнера и пареза или паралича мышц гортани, в т. ч. и голосовой складки; наблюдается на стороне поражения блуждающего нерва и шейного отдела симпатического ствола при туберкулезе или при опухоли верхушки легкого.

СЕРИ́Н — заменимая в питании человека аминокислота (α-амино- β-оксипропионовая кислота), входящая в состав белков (в т. ч. активных центров многих ферментов) и пек-рых фосфатидов; промежуточный продукт биосинтеза цистеина и глицина.

СЕРИНФОСФАТИ́ДЫ (син. фосфатидилсерины) — фосфатиды, содержащие в молекуле остаток серина; входят в состав биологических мембран, в большом количестве содержатся в нервной ткани.

СЕРИО́ГРАФ — аппарат для рентгенографии, обеспечивающий возможность получения серии рентгенограмм через заданные промежутки времени.

СЕРКЛЯ́Ж (франц. cerclage, от cercle круг, обруч) — метод соединения костных отломков путем проведения шовного материала (металлическая лента, проволока, синтетическая лента и пр.) вокруг кости; применяется гл. обр. при косых и спиральных переломах.

СЕ́РНАЯ ПРО́БКА — скопление ушной серы в наружном слуховом проходе, обтурирующее его просвет; наблюдается при гиперсекреции серных желез.

СЕ́РНЫЕ КИСЛО́ТЫ ПА́РНЫЕ (син. эфиросерные кислоты парные) — продукты обезвреживания фенола, крезола и других ароматических соединений, образующиеся в печени в результате ферментативных реакций при их взаимодействии с серной кислотой.

СЕ́РНЫЙ ЭФИ́Р — см. *Этиловый эфир.*

СЕРО- (лат. serum сыворотка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сыворотке крови».

СЕРО́ВА АМИЛОИДОБЛА́СТЫ (В. В. Серов, род. в 1924 г., сов. патологоанатом) — клон ретикулоэндотелиоцитов, синтезирующий фибриллярный белок амилоида.

СЕРОДИАГНО́СТИКА (*серо-* + *диагностика*; син. диагностика серологическая) — диагностика, основанная на серологических исследованиях.

СЕ́РОЕ ВЕЩЕСТВО́ (substantia grisea, PNA, BNA, JNA) — часть ц. н. с., образованная гл. обр. телами нейронов; представлено серыми столбами спинного мозга, ядрами головного мозга, корой большого мозга и мозжечка.

СЕ́РОЕ ВЕЩЕСТВО́ ЦЕНТРА́ЛЬНОЕ (substantia grisea centralis, PNA; stratum griseum centrale, BNA, JNA) — скопление серого вещества вокруг водопровода мозга; в составе С. в. ц. выделяют ядра глазодвигательного и блокового нервов.

СЕ́РОЕ КРЫЛО́ (ala grisea) — см. *Треугольник блуждающего нерва.*

СЕРОЗИ́М (нрк) — см. *Фактор VII.*

СЕРОЗИ́Т (serositis; анат. tunica serosa серозная оболочка + *-ит*) — воспаление серозной оболочки (брюшины, перикарда, плевры и др.).

С. РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ (s. rheumatica) — С., развивающийся при ревматической атаке.

С. УРЕМИ́ЧЕСКИЙ (s. uraemica) — С., возникающий при уремии как реакция на азотемию.

СЕРО́ЗНАЯ ЖИ́ДКОСТЬ (liquor serosus) — жидкость, вырабатываемая серозными оболочками.

СЕРО́ЗНАЯ ОБОЛО́ЧКА (tunica serosa, LNH) — оболочка, выстилающая стенки полостей туловища, покрывающая расположенные в них органы и состоящая из плотной волокнистой соединительной ткани, покрытой мезотелием; к С. о. относят брюшину, плевру, серозный перикард и влагалищную оболочку яичка.

СЕРО́ЗНОЕ ПОЛУЛУ́НИЕ (semilunium serosum, LNH; син. Джаннуцци полулуние) — скопление сероцитов, расположенное между мукоцитами и базальной мембраной концевого отдела серозно-слизистой слюнной железы (поднижнечелюстной или подъязычной), имеющее на срезе полулунную форму.

СЕРОЗОЦИ́Т — см. *Сероцит.*

СЕРОЛЕЧЕ́БНИЦА (истор.) — функциональное подразделение нек-рых лечебно-профилактических учреждений (иногда самостоятельное учреждение), предназначавшееся для проведения лечебных процедур с применением сульфидных минеральных вод.

СЕРОЛОГИ́ЧЕСКАЯ РЕА́КЦИЯ — реакция антиген — антитело, регистрируемая на основе одного из феноменов, сопровождающих формирование иммунного комплекса (преципитация, агглютинация, связывание комплемента).

СЕРОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ИССЛЕ́ДОВАНИЕ — исследование антигенов и антител с помощью серологических реакций с целью диагностики (гл. обр. инфекционных болезней), определения групп крови или видовой принадлежности белка.

СЕРОЛО́ГИЯ (*серо-* + греч. logos учение, наука) — раздел иммунологии, изучающий механизмы серологических реакций, разрабатывающий методы их применения в биологии и медицине.

СЕРОПНЕВМОПЕРИКА́РД (seropneumopericardium; *серо-* + греч. pneuma воздух + *перикард*) — скопление серозной жидкости и газа в перикардиальной полости, напр. при проникающих ранениях.

СЕРОПРОФИЛА́КТИКА (*серо-* + *профилактика*) — специфическая профилактика инфекционных болезней путем введения иммунных сывороток или гамма-глобулинов лицам с высоким риском заражения.

СЕРОТЕРАПИ́Я (*серо-* + *терапия*) — метод лечения, основанный на введении больному препаратов, содержащих антитела к возбудителю болезни или его токсинам.

СЕРОТОНИ́Н — биологически активное вещество из группы биогенных аминов; содержится во всех тканях, преимущественно пищеварительного тракта и центральной нервной системы, а также в тромбоцитах; играет роль медиатора в нек-рых синапсах и в развитии нек-рых аллергических реакций.

СЕРОТОНИНОПЕКСИ́Я (нрк; серотонин + греч. pēxis закрепление) — связывание серотонина белками плазмы крови, приводящее к его инактивации.

СЕРОЦИ́Т (serocytus, LNH; *серо-* + гист. cytus клетка; син. сероцит) — секреторная клетка серозной железы, напр. околоушной.

СЕРП БОЛЬШО́ГО МО́ЗГА (falx cerebri, PNA, BNA, JNA; син. серповидный отросток большой) — отросток твердой оболочки головного мозга, расположенный в срединной плоскости и вдающийся в продольную щель между полушариями большого мозга.

СЕРП МОЗЖЕ́ЧКА (falx cerebelli, PNA, BNA, JNA; син. серповидный отросток малый) — отросток твердой оболочки головного мозга, расположенный в срединной плоскости и вдающийся в вырезку между полушариями мозжечка.

СЕРП ПЕРЕГОРО́ДКИ (falx septi, PNA) — см. *Заслонка овального отверстия.*

СЕРПЕНТА́РИЙ (лат. serpens, serpentis змея) — питомник для содержания змей с целью получения от них яда.

СЕРПОВИ́ДНЫЙ ОТРО́СТОК (processus falciformis, PNA, BNA, JNA) — пучок соединительнотканных волокон, проходящий в виде узкой полосы по внутреннему краю нижних ветвей седалищной и лобковой костей; является продолжением крестцово-бугорной связки.

СЕРПОВИ́ДНЫЙ ОТРО́СТОК БОЛЬШО́Й (processus falciformis major) — см. *Серп большого мозга.*

СЕРПОВИ́ДНЫЙ ОТРО́СТОК МА́ЛЫЙ (processus falciformis minor) — см. *Серп мозжечка.*

СЕРРАЦИО́З (serratiosis) — малоизученная инфекционная болезнь человека, вызываемая условно-патогенной бактерией Serratia marcescens («чудесная палочка»), протекающая по типу сепсиса с поражением различных органов и систем, чаще мочевыводящих путей.

СЕРТИФИКА́Т (франц. certificat свидетельство, удостоверение) в эпидемиологии — см. *Свидетельство о вакцинации международное.*

СЕРТО́ЛИ КЛЕ́ТКИ (E. Sertoli, 1842—1910, итал. гистолог) — см. *Сустентоциты.*

СЕРТО́ЛИЕВ СИНЦИ́ТИЙ (E. Sertoli) — синцитий, образованный слоем сустентоцитов в извитых семенных канальцах яичек.

СЕРУМБА́НК (лат. serum сыворотка + англ. bank хранилище, запас) — коллекция образцов сыворотки крови, полученных в определенные периоды времени от представительных выборок различных групп населения на определенной территории; несет информацию об иммунологической структуре населения, чем может способствовать расшифровке заболеваний невыясненной этиологии.

СЕ́РЫЕ СТОЛБЫ́ спинного мозга (columnae griseae, PNA, BNA, JNA) — парные продольные выступы серого вещества спинного мозга; различают передние, задние и боковые столбы.

СЕ́РЫЙ БУГО́Р (tuber cinereum, PNA, BNA, JNA) — отдел гипоталамуса, образующий полый выступ нижней стенки третьего желудочка, расположенный впереди сосцевидных тел и соединяющийся посредством воронки с гипофизом; в С. б. находятся ядра серого вещества, являющиеся высшими центрами вегетативных функций (обмена веществ, теплорегуляции).

СЕ́ССЕЛЯ КАРМА́Н (Sessel) — см. *Сесселя карман.*

СЕСТА́НА — ШЕНЕ́ СИНДРО́М (E. J. M. Cestan, 1872—1933, франц. невролог; L. J. Chenais, 1872—1950, франц. врач) — бульбарный альтернирующий синдром: сочетание паралича мышц мягкого неба и голосовой складки и синдрома Бернара — Горнера на стороне очага поражения с гемипарезом или гемиплегией, гемиатаксией и снижением болевой и температурной чувствительности на противоположной стороне.

СЕСТРА́ МИЛОСЕ́РДИЯ (истор.) — лицо среднего медицинского персонала в дореволюционной России, получившее подготовку в общинах сестер милосердия или на курсах общества Красного Креста; предшественница медицинской сестры.

СЕСТРА́ ПО УХО́ДУ ЗА БОЛЬНЫ́МИ — см. *Медицинская сестра младшая.*

СЕСТРА́-ХОЗЯ́ЙКА — работник лечебно-профилактического учреждения, отвечающий за состояние, содержание и хранение белья, инвентаря и оборудования учреждения или его отделения; работает под руководством старшей медицинской сестры.

СЕТЕВИ́ДНАЯ ФОРМА́ЦИЯ (formatio reticularis) — см. *Ретикулярная формация.*

СЕТЕ́НА КРАХМА́ЛЬНАЯ ПОВЯ́ЗКА (истор.; L. J. B. Seutin, 1793—1862, бельг. хирург) — медленно затвердевающая повязка из тугопакрахмаленных, смоченных бинтов, применяв-

шаяся для иммобилизации конечности.

СЕ́ТЧАТАЯ МЕМБРА́НА (membrana reticularis, LNH; син.: ретикулярная мембрана, сетчатая перепонка) — перепонка, расположенная на апикальной поверхности клеток спирального органа, через многочисленные отверстия к-рой проходят волоски рецепторных слуховых клеток.

СЕ́ТЧАТАЯ ОБОЛО́ЧКА — см. *Сетчатка.*

СЕ́ТЧАТАЯ ПЕРЕПО́НКА — см. *Сетчатая мембрана.*

СЕТЧА́ТКА (retina, PNA, BNA, JNA; син. сетчатая оболочка) — внутренняя оболочка глазного яблока, содержащая фотосенсорные клетки и являющаяся периферической частью зрительного анализатора.

СЕ́ТЧАТО-СПИННОМОЗГОВО́Й ПУТЬ (tractus reticulospinalis) — см. *Ретикулоспинномозговой путь.*

СЕ́ТЧАТЫЙ СЛОЙ кожи (stratum reticulare, LNH) — слой дермы, расположенный под сосочковым слоем и образованный плотной неоформленной соединительной тканью.

СЕТЬ КАНА́ЛА ПОДЪЯЗЫ́ЧНОГО НЕ́РВА (rete canalis nervi hypoglossi, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *903.*

СЕТЬ ОВА́ЛЬНОГО ОТВЕ́РСТИЯ (rete foraminis ovalis, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1097.*

СЕТЬ ЯИ́ЧКА [rete testis, PNA, JNA; rete testis (Halleri), BNA] — совокупность переплетающихся и сообщающихся между собой трубчатых образований, расположенных в средостении яичка; в С. я. открываются прямые семенные канальцы, от С. я. отходят выносящие канальцы яичка.

СЕЦЕ́ССИЯ (лат. secessio отход, отделение) — общее название процессов (генные и хромосомные мутации, нарушения митоза и др.), обусловливающих возникновение мозаицизма соматических клеток.

СЕЧЕ́НИЕ МОЧЕВО́ГО ПУЗЫРЯ́ (cystotomia) — см. *Цистотомия.*

СЕ́ЧЕНОВА ФЕНО́МЕН (И. М. Сеченов, 1829—1905, отеч. физиолог; син. сеченовский эффект) — ускоренное восстановление работоспособности утомленных органов и систем под влиянием активного отдыха.

СЕ́ЧЕНОВСКИЙ ЭФФЕ́КТ (И. М. Сеченов) — см. *Сеченова феномен.*

СЕ́ЧЕНОВСКОЕ ТОРМОЖЕ́НИЕ (И. М. Сеченов) — торможение или увеличение латентного периода спинномозговых рефлексов при химическом раздражении таламической области мозга лягушки; эксперимент, ставший важнейшей предпосылкой к построению учения об интегративной деятельности ц. н. с.

СЕЮ́НКЦИЯ (sejunctio; лат. «отделение, расхождение») — см. *Вернике сеюнкция.*

СИАЛ- (сиало-; греч. sialon слюна) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к слюне, к слюнной железе».

СИАЛАДЕНИ́Т (sialadenitis; *сиал-* + греч. adēn железа + *-ит*) — воспаление слюнной железы.

СИАЛАДЕНИ́Т СЕРО́ЗНЫЙ НЕЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ — см. *Паротит серозный острый.*

СИАЛАДЕНЭКТОМИ́Я (sialadenectomia; *сиал-* + греч. adēn железа + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление слюнной железы (чаще поднижнечелюстной или подъязычной).

СИАЛО- — см. *Сиал-.*

СИА́ЛОВАЯ ПРО́БА — метод определения степени активности воспалительного процесса при ревматизме, основанный на фотометрическом измерении содержания сиаловых кислот в сыворотке крови.

СИА́ЛОВЫЕ КИСЛО́ТЫ — одноосновные полиоксиаминокислоты, являющиеся производными нейраминовой кислоты и входящие в состав гликопротеидов и гликолипидов.

СИАЛОГЛИКОЛИПИ́ДЫ — см. *Ганглиозиды.*

СИАЛОГРАФИ́Я (*сиало-* + греч. graphō писать, изображать; син. саливография) — рентгенография слюнной железы после заполнения ее протоков контрастным веществом.

СИАЛОДОХИ́Т (sialodochitis; *сиало-* + греч. dochos содержащий, вмещающий + *-ит*) — воспаление протока слюнной железы.

СИАЛОЛИТИ́АЗ (sialolithiasis; *сиало-* + греч. lithos камень + *-иаз*) — см. *Болезнь слюнно-каменная.*

СИАЛОРЕ́Я (*сиало-* + греч. rhoia течение, истечение) — см. *Гиперсаливация.*

СИАЛОСКАНОГРАФИ́Я (*сиало-* + *сканография*; син. сиалосцинтиграфия) — радиоизотопное сканирование слюнных желез.

СИАЛОСТА́З (sialostasis; *сиало-* + *стаз*; син. стаз слюнной) — прекращение выделения слюны, возникающее при закупорке протока слюнной железы конкрементом, инородным телом, сужении или заращении протока, напр. после ранения.

СИАЛОСЦИНТИГРАФИ́Я (*сиало-* + *сцинтиграфия*) — см. *Сиалосканография.*

СИ́БСЫ (англ. sibs брат или сестра) — родные братья и сестры; термин применяется гл. обр. в генетике.

СИВА́ТТА СЕ́ТЧАТАЯ ПИГМЕ́НТНАЯ ПОЙКИЛОДЕРМИ́Я (A. Civatte, 1877—1956, франц. дерматолог) — см. *Риля меланоз.*

СИВАША́ КОМПРЕССИО́ННО-ДИСТРАКЦИО́ННЫЙ АППАРА́Т (К. М. Сиваш, род. в 1924 г., сов. хирург-ортопед) — шарнирное устройство для репозиции и фиксации отломков кости при помощи введенных в них спиц, имеющее встроенный спиценатягиватель и ходовые винты с разнонаправленной резьбой.

СИВАША́ КО́СТНЫЙ ШОВ (К. М. Сиваш) — соединение костных отломков при переломах верхней трети бедренной кости, осуществляемое с помощью толстого металлического штифта с винтовой нарезкой (в виде штопора).

СИВАША́ НАБО́Р ДЛЯ ОСТЕОСИ́НТЕЗА (К. М. Сиваш) — набор инструментов и приспособлений для осуществления накостного остеосинтеза; включает костодержатели двух размеров со сближающим устройством для создания одномоментной компрессии отломков, пластины, винты, сверла и нек-рые другие предметы.

СИВАША́ ОПЕРА́ЦИЯ (К. М. Сиваш) — хирургическая операция: замещение тазобедренного сустава эндопротезом Сиваша путем закрепления дистальной части протеза в костномозговом канале бедренной кости, а проксимальной — на месте вертлужной впадины.

СИВАША́ ПРОТЕ́З (К. М. Сиваш) см. *Сиваша эндопротез.*

СИВАША́ ШИ́НА (К. М. Сиваш) — ортопедический аппарат для восстановления функции тазобедренного и коленного суставов, представляющий собой многошарнирную конструкцию, позволяющую самому больному с помощью рукояток и тросов производить необходимые физические упражнения.

СИВАША́ ЭЛЕКТРОПИЛА́ (К. М. Сиваш) — аппарат для осуществления сложного фигурного распила кости, представляющий собой пилу, режущие элементы к-рой шарнирно соединены между собой, образуя замкнутую цепь; пила приводится в движение электродвигателем.

СИВАША́ ЭНДОПРОТЕ́З (К. М. Сиваш; син. Сиваша протез) — общее название искусственных коленного и тазобедренного суставов, изготовленных из высокопрочного коррозиостойкого металла и имплантируемых для восстановления утраченной функции конечности.

СИВУ́ШНОЕ МА́СЛО — токсичная маслянистая жидкость, образующаяся в качестве побочного продукта при производстве этилового спирта методом брожения; представляет собой смесь одноатомных спиртов, альдегидов, органических кислот и др.

СИ́ВЦЕВА — ГОЛОВИ́НА ТАБЛИ́ЦЫ (Д. А. Сивцев, 1875—1940, сов. офтальмолог; С. С. Головин, 1866—1931, сов. офтальмолог) — см. *Головина — Сивцева таблицы.*

СИ́ГАЛЯ — КАТТА́НА — МАМУ́ БОЛЕ́ЗНЬ (S. Siegal, совр. амер. врач; R. Cattan, совр. франц. врач; H. Mamou, род. в 1903 г., франц. эндокринолог) — см. *Болезнь периодическая.*

СИГВАТЕ́РА (исп. siguatera; син.: сигуатера, чигуатера) — болезнь, развивающаяся при употреблении в пищу нек-рых видов тропических и субтропических рыб, в тканях и внутренней среде к-рых содержится токсин неустановленного состава.

СИГМАТИ́ЗМ [Σ (сигма) — греч. буква, обозначающая звук «с»] — вид косноязычия, при к-ром нарушено произнесение шипящих и свистящих звуков.

СИГМО- (сигмоид-, сигмоидо-; анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сигмовидной ободочной кишке».

СИГМОВИ́ДНЫЙ СИ́НУС (sinus sigmoideus, PNA; sinus sigmoides, JNA) — парный синус твердой мозговой оболочки, расположенный в одноименной борозде на задней поверхности пирамиды височной кости и на затылочной кости; является продолжением поперечного синуса и переходит в луковицу внутренней яремной вены; в С. с. впадают вены мозжечка.

СИГМОИД- — см. *Сигмо-.*

СИГМОИДИ́Т (sigmoiditis; *сигмоид-* + *-ит*) — воспаление сигмовидной ободочной кишки.

С. ГЕМАТОГЕ́ННЫЙ (s. haematogena) — С., обусловленный проникновением возбудителя инфекции в стенку кишки с током крови.

С. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (s. haemorrhagica) — С., характеризующийся наличием точечных кровоизлия-

ний на поверхности слизистой оболочки кишки.

С. ГНОЙНО-ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (s. purulenta haemorrhagica) — геморрагический С., характеризующийся наличием гноя на поверхности слизистой оболочки кишки.

С. КАТАРА́ЛЬНЫЙ (s. catarrhalis; син. С. слизистый) — С., характеризующийся гиперемией слизистой оболочки кишки и слизистыми выделениями на ее поверхности.

С. О́СТРЫЙ (s. acuta) — С., характеризующийся внезапным началом, болью в левой половине живота, нерегулярным стулом и лихорадкой.

С. СЛИ́ЗИСТЫЙ (s. mucosa) — см. *Сигмоидит катаральный.*

С. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (s. chronica) — С., характеризующийся постепенным началом, болью в левой половине живота, длительным течением с чередованием ремиссий и обострений.

С. Я́ЗВЕННЫЙ (s. ulcerosa) — С., характеризующийся образованием язв в слизистой оболочке кишки.

СИГМОИДО- — см. *Сигмо-.*

СИГМОИДОСКО́П (*сигмоидо-* + греч. skopeō наблюдать, исследовать) — см. *Ректороманоскоп.*

СИГМОИДОСКО́П МА́РКУСА — см. *Маркуса сигмоидоскоп.*

СИГМОПЛИКА́ЦИЯ (*сигмо-* + лат. plica складка) — хирургическая операция: наложение гофрирующих швов на стенку сигмовидной ободочной кишки для уменьшения ее длины.

СИГМОПРОКТОСТОМИ́Я (*сигмо-* + греч. prōktos задний проход + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между прямой и сигмовидной ободочной кишкой.

СИГМОСТОМИ́Я (*сигмо-* + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: создание наружного свища сигмовидной ободочной кишки.

СИГНА́Л в кибернетике — знак или процесс физической или химической природы (напр., нервный импульс), несущий сообщение.

СИГНАЛИЗА́ТОР МОЧЕИСПУСКА́НИЯ — прибор, подающий звуковой и (или) световой сигнал при увлажнении простыни (пеленки), в контакте с к-рой находится датчик прибора.

СИГНАТУ́РА (signatura; лат. signo, signatum обозначать, указывать) — 1) копия рецепта, выдаваемая больному в аптеке вместо оригинала; 2) часть рецепта, в к-рой указан способ приема лекарственного средства.

СИГУАТЕ́РА — см. *Сигватера.*

СИ́ДЕНГАМА БОЛЕ́ЗНЬ (Th. Sydenham, 1624—1689, англ. врач) — см. *Хорея малая.*

СИДЕРО- (греч. sidēros железо) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к железу», «содержащий железо».

СИДЕРОБЛА́СТ (sideroblastus; *сидеро-* + греч. blastos росток, зародыш) — 1) незрелая ядросодержащая клетка костного мозга — предшественница эритроцитов, в цитоплазме к-рой при окраске выявляются гранулы железа, расположенные диффузно или вокруг ядра; увеличение количества С. наблюдается, напр., при сидеробластных анемиях; 2) — см. *Сидерофаг.*

СИДЕРОДРОМОФОБИ́Я (siderodromophobia; *сидеро-* + греч. dromos бег, место для бега + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь железнодорожного транспорта.

СИДЕРО́З[1] (siderosis; *сидеро-* + *-оз*) — пневмокониоз, развивающийся в результате систематического вдыхания пыли железа или его соединений.

С. КРА́СНЫЙ (s. rubra) — С., характеризующийся бурым окрашиванием ткани легких окислами железа.

С. ЧЁРНЫЙ (s. nigra) — С., характеризующийся черным окрашиванием ткани легких закисью, карбонатом или фосфатом железа.

СИДЕРО́З[2] (siderosis) — отложение соединений железа в тканях и органах.

С. МЕ́СТНЫЙ (s. localis) — 1) С. ограниченного участка ткани; 2) — см. *Гемосидероз местный.*

С. О́БЩИЙ (s. totalis) — см. *Гемосидероз общий.*

С. ТРАНСФУЗИО́ННЫЙ (s. transfusionalis) — см. *Гемосидероз трансфузионный.*

С. ЭКЗОГЕ́ННЫЙ (s. exogena) — С., обусловленный поступлением железа в организм извне.

СИДЕРОПЕНИ́Я (sideropenia; *сидеро-* + греч. penia бедность, недостаток) — пониженное содержание железа в плазме крови; наблюдается, напр., при железодефицитной анемии.

СИДЕРОСИЛИКО́З (siderosilicosis; *сидеро-* + *силикоз*; син. силикосидероз) — пневмокониоз, развивающийся в результате систематического вдыхания железорудной пыли, содержащей железо и свободную двуокись кремния.

СИДЕРОСКО́П (истор.; *сидеро-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — прибор, применявшийся для обнаружения и уточнения локализации в глазу магнитного инородного тела.

СИДЕРОСКОПИ́Я (*сидеро-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — метод обнаружения внутриглазного магнитного инородного тела по отклонению магнитной стрелки сидероскопа.

СИДЕРОФА́Г (siderophagus; *сидеро-* + греч. phagein пожирать, поглощать; син.: гемосидерофаг, сидеробласт) — фагоцит, поглощающий и накапливающий соединения, содержащие железо; в цитоплазме С. железосодержащие пигменты превращаются в гемосидерин.

СИДЕРОФАГИ́Я (siderophagia; *сидеро-* + греч. phagein пожирать, поглощать) — процесс поглощения сидерофагами соединений, содержащих железо.

СИДЕРОФИБРО́ЗНЫЕ УЗЕЛКИ́ ГА́НДИ—ГА́МНЫ — см. *Ганди — Гамны сидерофиброзные узелки.*

СИДЕРОФИЛИ́Н (*сидеро-* + греч. phileō любить) — см. *Трансферрин.*

СИДЕРОФИЛИ́Я (siderophilia; *сидеро-* + греч. phileō любить) — см. *Гемохроматоз.*

СИДЕРОЦИ́Т (siderocytus; *сидеро-* + гист. cytus клетка) — эритроцит, в к-ром при окраске выявляются гранулы железа; значительное увеличение С. наблюдается, напр., при сидеробластных анемиях или после спленэктомии.

СИКА́РА СИМПТО́М — заметное на глаз волнообразное перемещение крови по подкожным венам к периферии конечности при покашливании; признак недостаточности венных клапанов при варикозном расширении подкожных вен ноги.

СИКА́РА СИМПТО́М (J. A. Sicard, 1872—1929, франц. невропатолог) — см. *Говерса симптом.*

СИКА́РА СИНДРО́М (R. Sicard, франц. невропатолог 20 в.; син.: Вейзенбурга — Сикара — Робино синдром, невралгия глоссофарингеальная, Сикара — Робино синдром) — невралгия языкоглоточного нерва, проявляющаяся внезапным возникновением боли с одной стороны корня языка, глотки и мягкого неба во время приема горячей, холодной или твердой пищи, во время речи, при зевании или кашле.

СИКА́РА — КОЛЛЕ́ СИНДРО́М (J. A. Sicard, 1872—1929, франц. невропатолог; F.-J. Collet, 1870—1966, франц. врач; син. Колле синдром) — сочетание одно- или двусторонних параличей мышц голосовой складки, мягкого неба и грудино-ключично-сосцевидной мышцы с анестезией гортани, глотки, мягкого неба и корня языка; обусловлен поражением языкоглоточного, блуждающего, добавочного и подъязычного нервов при переломах и опухолях основания черепа.

СИКА́РА — РОБИНО́ СИНДРО́М (R. Sicard, франц. невропатолог 20 в.; M. Robineau, 1870—1960, франц. анатом) — см. *Сикара синдром.*

СИКО́З (sycosis; греч. sykosis, от sykon плод фигового дерева + *-оз*) — гнойное воспаление фолликулов волос в области усов и бороды, реже век, бровей, подмышечных ямок и лобка, распространяющееся на ткани, окружающие фолликулы.

СИКО́З ЛЮПО́ИДНЫЙ (sycosis lupoides; греч. sykon инжир; син.: Брока люпоидный сикоз, Гоффманна сикозиформный атрофический фолликулит, ulerythema sycosiforme, эритема рубцовая сикозиформная) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся возникновением на одной щеке фолликулярных папул, сгруппированных на красной инфильтрированной бляшке с возвышенными краями; в центральной части бляшки развивается рубцовая атрофия.

СИКО́З НЕПАРАЗИТА́РНЫЙ (sycosis non parasitaria) — см. *Сикоз обыкновенный.*

СИКО́З ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ (sycosis vulgaris; син.: сикоз непаразитарный, сикоз простой, сикоз стафилогенный) — сикоз, вызываемый стафилококками, протекающий в виде множественных рецидивирующих папулопустулезных высыпаний в области бороды, усов и ноздрей.

СИКО́З ПАРАЗИТА́РНЫЙ (sycosis parasitaria) — инфильтративно-нагноительная трихофития, при к-рой поражена кожа подбородка и верхней губы.

СИКО́З ПРОСТО́Й (sycosis vulgaris) — см. *Сикоз обыкновенный.*

СИКО́З СТАФИЛОГЕ́ННЫЙ (sycosis staphylogena) — см. *Сикоз обыкновенный.*

СИ́ЛА АККОМОДА́ЦИИ — см. *Объем аккомодации.*

СИ́ЛА МЫ́ШЦЫ — показатель сократительной способности мышцы, измеряемый величиной максимального груза, к-рый она поднимает, или максимальным усилием, развиваемым в условиях изометрического сокращения; выражается в килограммах на 1 *см*^{2} поперечного сечения мышцы.

СИ́ЛА «Я» — употребляемое в психоанализе обозначение степени самостоя-

тельности человека, направленности его стремлений и желаний, сопротивляемости внешнему влиянию.

СИЛБЕРА — ПОРТЕРА МЕТОД (R. H. Silber; C. C. Porter) — метод определения в крови и моче свободных 17-оксикортикостероидов, основанный на их способности образовывать при реакции с фенилгидразином окрашенные вещества.

СИЛИКАГЕЛЬ — высокопористый сорбент, получаемый прокаливанием геля поликремниевой кислоты; применяется для осушки, очистки и разделения веществ, напр. аминокислот, витаминов, антибиотиков.

СИЛИКАТО́З (silicatosis; силикат + *-оз*) — общее название пневмокониозов, вызываемых систематическим вдыханием пыли силикатов (солей кремниевых и алюмокремниевых кислот).

СИЛИКО- (лат. silex, silicis кремень) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к кремнию или его соединениям».

СИЛИКОАНТРАКО́З (*силико-* + *-антракоз*; син. антракосиликоз) — пневмокониоз, вызываемый систематическим вдыханием угольной пыли с частицами свободной двуокиси кремния.

СИЛИКОАРТРИ́Т (silicoarthritis; *силико-* + *артрит*) — см. *Каплана синдром.*

СИЛИКО́З (silicosis; *силико-* + *-оз*; син. литоз — устар.) — пневмокониоз, вызываемый систематическим вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись кремния в высоких концентрациях.

СИЛИКОЗОГЕ́ННОСТЬ (*силикоз* + греч. -genēs порождающий, вызывающий) — способность пыли вызывать силикоз, зависящая от ее концентрации во вдыхаемом воздухе и содержания в ней свободной двуокиси кремния.

СИЛИКОЗООПА́СНОСТЬ — свойство производственной среды представлять угрозу возникновения силикоза у работающих в связи с наличием в воздухе рабочей зоны высоких концентраций пыли, содержащей свободную двуокись кремния.

СИЛИКО́НЫ — высокомолекулярные биологически инертные кислородсодержащие кремнийорганические соединения; используются, напр., в качестве конструктивных материалов и покрытий для технических изделий медицинского назначения.

СИЛИКОСИДЕРО́З (silicosiderosis; *силико-* + *сидероз*) — см. *Сидеросиликоз.*

СИЛИКОТУБЕРКУЛЁЗ (silicotuberculosis; *силико-* + *туберкулез*; син. чахотка черная) — осложнение силикоза туберкулезом легких, для к-рого силикоз является предрасполагающим фактором.

СИ́ЛЫ И СРЕ́ДСТВА МЕДИЦИ́НСКОЙ СЛУ́ЖБЫ — личный состав военно-медицинской службы (медицинской службы Гражданской обороны) и находящиеся в ее распоряжении лечебно-профилактические учреждения, а также транспорт, оборудование и имущество, организационно объединенные в разного рода медицинские формирования.

СИ́ЛЬВЕРШЕЛЬДА БОЛЕ́ЗНЬ (N. Silfverskjöld, шведский ортопед 20 в.) — хондродисплазия, характеризующаяся укорочением проксимальных и средних сегментов конечностей, утолщением эпифизов, искривлением позвоночника, карликовым ростом, косолапостью и седловидным носом.

СИ́ЛЬВЕРШЕЛЬДА ОПЕРА́ЦИЯ (N. Silfverskjöld) — хирургическая операция: отсечение мышц, сгибающих голень, от седалищного бугра и перемещение точки их прикрепления на заднюю поверхность бедра; предложена для уменьшения сгибания нижних конечностей при их спастических параличах.

СИЛЬВЕ́СТРА СПО́СОБ ИСКУ́ССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯ́ЦИИ ЛЁГКИХ (истор.; H. R. Silvester, 1829—1908, англ. врач) — способ искусственной вентиляции легких, при к-ром вдох вызывают отведением за голову рук пострадавшего, лежащего на спине, а выдох — сдавлением его грудной клетки при приведении рук.

СИЛЬВЕСТРО́НИ-БЬЯ́НКО СИНДРО́М (E. Silvestroni, совр. итал. врач; J. Bianco, совр. итал. врач) — см. *Талассемия малая.*

СИ́ЛЬВИЕВ ВОДОПРОВО́Д [F. Sylvius (De le Boë), 1614—1672, голландский анатом, физиолог и врач] — см. *Водопровод мозга.*

СИ́ЛЬВИЕВА БОРОЗДА́ (F. Sylvius) — см. *Борозда латеральная.*

СИ́ЛЬВИЕВА Я́МКА (F. Sylvius) — см. *Ямка большого мозга латеральная.*

СИМ- — см. *Син-.*

СИМАНО́ВСКОГО ЛО́БНЫЙ РЕФЛЕ́КТОР (Н. П. Симановский, 1854—1922, отеч. оториноларинголог) — см. *Лобный рефлектор.*

СИМАНО́ВСКОГО — ПЛА́УТА — ВЕНСА́НА АНГИ́НА (Н. П. Симановский, 1854—1922, отеч. оториноларинголог; H. K. Plaut, 1858—1928, нем. врач; J. H. Vincent, 1862—1950, франц. бактериолог и эпидемиолог; син.: ангина язвенно-пленчатая, Венсана ангина, Венсана — Симановского ангина, финляндская жаба) — ангина, вызываемая находящимися в симбиозе веретенообразной бактерией Плаута — Венсана и спирохетой Венсана; характеризуется поверхностными язвами миндалин, покрытыми грязно-зеленым налетом, имеющим гнилостный запах.

СИМБАМАТОПАТИ́Я (устар.; греч. symbama, symbamatos случайное событие + pathos страдание, болезнь) — психогения, возникающая при внезапной катастрофе (землетрясение, наводнение, пожар и др.); рассматривается как реактивный психоз.

СИМБИО́З (*сим-* + греч. biōsis жизнь) — тип взаимоотношения двух биологических видов, при к-ром они совместно регулируют отношения с внешней средой и извлекают из этого обоюдную выгоду.

СИМБИО́НТЫ (*сим-* + греч. biōn, biontos живущий) — организмы разных биологических видов, находящиеся в отношениях симбиоза.

СИМБЛЕ́ФАРОН (symblepharon, *сим-* + греч. blepharon веко) — рубцовое сращение конъюнктивы века с конъюнктивой глазного яблока.

С. ЗА́ДНИЙ (s. posterius) — С., при к-ром сращение локализуется в области сводов конъюнктивы.

С. ПЕРЕ́ДНИЙ (s. anterius) — С., при к-ром образовавшиеся перемычки или тяжи расположены вне сводов конъюнктивы.

СИМБОЛОФОБИ́Я (symbolophobia; греч. symbolon знак, значение + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь предметов, явлений, событий, сновидений, в к-рых якобы скрыт неблагоприятный для больного смысл.

СИМВО́ЛИКА СИМПТО́МА — употребляемое в психоанализе обозначение скрытого, замаскированного смысла симптомов, к-рые рассматриваются как выражение подсознательных, вытесняемых желаний и стремлений.

СИМВОЛИ́ЧЕСКИЕ ДЕ́ЙСТВИЯ — см. *Ритуал.*

СИ́МЕНСА АКРОМЕЛАНО́З (H. W. Siemens, 1891—1969, нем. дерматолог) — см. *Акромеланоз с белыми пятнами.*

СИ́МЕНСА МНОГОФО́РМНЫЙ КЕРАТО́З (H. W. Siemens) — см. *Ядассона — Левандовского синдром.*

СИ́МЕНСА СИНДРО́М (H. W. Siemens; син.: дисплазия эктодермальная врожденная ангидротическая, кератоз идиопатический многоформный, Криста — Сименса синдром) — врожденное сочетание отсутствия потовых желез, частичного или полного отсутствия зубов, гипотрихоза, деформации костей носа, хейлита и синеватой пигментации кожи.

СИ́МЕНСА — БЛО́ХА ПИГМЕ́НТНЫЙ ДЕРМАТО́З (H. W. Siemens, 1891—1969, нем. дерматолог; B. Bloch, 1878—1933, швейц. дерматолог) — см. *Incontinentia pigmenti.*

СИММЕ́ТРИЯ ДВУСТОРО́ННЯЯ — см. *Билатеральность.*

СИ́ММОНДСА БОЛЕ́ЗНЬ (M. Simmonds, 1855—1925, нем. патолог) — см. *Кахексия гипофизарная.*

СИ́ММОНДСА — ГЛИ́НСКОГО БОЛЕ́ЗНЬ (M. Simmonds, 1855—1925, нем. патолог; L. K. Glinski, 1870—1918, польский патологоанатом) — см. *Кахексия гипофизарная.*

СИ́МОНА ГНАТОСТА́Т (P. W. Simon) — прибор для определения положения зубных рядов по отношению к сагиттальной, горизонтальной и фронтальной плоскостям, состоящий из оттискной ложки, на к-рой укреплена вертикальная штанга с перемещающейся по ней градуированной дугой, снабженной четырьмя стрелками, устанавливаемыми против определенных антропометрических точек лица.

СИ́МОНА РАЗРЕ́З (G. Simon, 1824—1876, нем. хирург) — оперативный доступ к почке путем продольного разреза от XII ребра до подвздошного гребня и тупого раздвигания мышц.

СИ́МОНА ТРЕУГО́ЛЬНИК — участок кожи живота и бедер, ограниченный линией, соединяющей верхние передние подвздошные ости, и линиями, соединяющими эти точки с коленными суставами; область возможного появления продромальной сыпи при натуральной оспе.

СИМОНА́РА ТЯЖИ́ (P. J. C. Simonart, 1817—1847, бельг. гинеколог) — см. *Амниотические перетяжки.*

СИ́МОНСА СИНДРО́М (A. Simons, род. в 1877 г., нем. врач) — см. *Липодистрофия прогрессирующая сегментарная.*

СИМПАТ- (симпатико-, симпато-; анат. pars sympathica симпатическая часть вегетативной нервной системы) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к симпатической части вегетативной нервной системы».

СИМПАТАЛГИ́Я (sympathalgia; *симпат-* + греч. algos боль) — синдром по-

ражения образований симпатической части вегетативной нервной системы, характеризующийся жгучими болями и трофическими нарушениями тканей (отек и изменение цвета кожи, местная потливость и др.).

СИМПАТАЛГИ́Я ВОСХОДЯ́ЩАЯ (sympathalgia ascendens; *симпат-* + греч. algos боль) — см. *Неврит восходящий.*

СИМПАТИКО- — *Симпат-.*

СИМПАТИКОТОМИ́Я (sympathicotomia; *симпатико-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: пересечение симпатического ствола.

СИМПАТИКОТОНИ́Я (sympathicotonia; *симпатико-* + греч. tonos напряжение) — преобладание тонуса симпатической части вегетативной нервной системы над тонусом ее парасимпатической части.

СИМПАТИКОТРИПСИ́Я (sympathicotripsia; *симпатико-* + греч. tripsis растирание, раздавливание) — хирургическая операция: раздавливание симпатического ствола.

СИМПАТИКОЦИТО́МА (*симпатико-* + гист. cytus клетка + *-ома*) — см. *Ганглионеврома.*

СИМПАТИ́ЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЕГЕТАТИ́ВНОЙ НЕ́РВНОЙ СИСТЕ́МЫ (pars sympathica, PNA; син. система нервная симпатическая) — часть вегетативной нервной системы, представленная серым веществом боковых рогов спинного мозга от VIII шейного до III поясничного сегмента, двумя симметричными симпатическими стволами с их ганглиями, межузловыми и соединительными ветвями, а также ветвями и ганглиями, участвующими в образовании нервных сплетений.

СИМПАТИ́ЧЕСКИЙ СТВОЛ (truncus sympathicus, PNA, BNA, JNA; син. симпатический ствол пограничный) — парная цепочка симпатических нервных ганглиев, соединенных межузловыми ветвями, расположенная сбоку от позвоночного столба на протяжении от верхних шейных позвонков до копчика.

СИМПАТИ́ЧЕСКИЙ СТВОЛ ПОГРАНИ́ЧНЫЙ — см. *Симпатический ствол.*

СИМПАТО- — см. *Симпат-.*

СИМПАТОБЛАСТО́МА (устар.; sympathoblastoma; *симпато-* + *бластома*) — см. *Нейробластома.*

СИМПАТОГАНГЛИОНИ́Т (sympathoganglionitis; *симпато-* + *ганглий* + *-ит*) — воспаление симпатического ганглия.

СИМПАТОГО́НИИ (sympathogonia; *симпато-* + греч. gonē зарождение, потомство) — эмбриональные клетки симпатической части вегетативной нервной системы; имеют округлые или слегка вытянутые ядра.

СИМПАТОГОНИО́МА (устар.; sympathogonioma; *симпатогонии* + *-ома*) — см. *Нейробластома.*

СИМПАТОЛИ́ТИКИ (sympatholytica; *симпато-* + греч. lytikos способный растворять, ослаблять) — см. *Симпатолитические средства.*

СИМПАТОЛИТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (sympatholytica; *симпато-* + греч. lytikos способный растворять, ослаблять; син. симпатолитики) — лекарственные средства, блокирующие передачу нервных импульсов в адренергических синапсах на уровне пресинаптической мембраны (напр., октадин, орнид, резерпин).

СИМПАТЭКТОМИ́Я (sympathectomia; *симпат-* + *эктомия*; син. десимпатизация) — хирургическая операция на симпатической части вегетативной нервной системы, заключающаяся в удалении какого-либо ее элемента.

С. ВЕРХНЕГРУДНА́Я ПО ШУМА́ХЕРУ — см. *Шумахера верхнегрудная симпатэктомия.*

С. ГАНГЛИОНА́РНАЯ (s. ganglionaris; син. ганглиэктомия) — С., при к-рой удаляют симпатические ганглии.

С. ПО ГА́СКУ — РО́ССУ — см. *Гаска — Росса симпатэктомия.*

С. ПО ГЕ́НРИ — А́ДСОНУ — см. *Генри — Адсона симпатэктомия.*

С. ГРУДНА́Я (s. pectoralis) — С., при к-рой удаляют 2—3 грудных симпатических ганглия.

С. ПЕРИАРТЕРИА́ЛЬНАЯ (s. periarterialis; син.: денервация артерии, денудация артерии, Лериша операция) — С., при к-рой рассекают ветви нервов, подходящие к артерии, или удаляют адвентициальную оболочку определенного участка сосуда.

С. ПОСТГАНГЛИОНА́РНАЯ (s. postganglionaris) — С., при к-рой производят рассечение постганглионарных симпатических волокон.

С. ПО́ЧЕЧНАЯ (s. renalis) — периартериальная С. почечной артерии.

С. ПОЯСНИ́ЧНАЯ (s. lumbalis) — С., при к-рой удаляют 2—3 поясничных симпатических ганглия.

С. ТРУНКУЛЯ́РНАЯ (s. truncularis; от лат. truncus ствол) — С., при к-рой резецируют симпатический ствол.

СИМПЕКСИ́Я (греч. sympēxis соединение, крепкая связь; син. саговые зерна) — конкремент в семенных пузырьках и сперме.

СИМПЛА́СТ (symplastus; *сим-* + греч. plastos сформированный, образованный) — форма организации живого вещества, при к-рой оно состоит из оболочки, цитоплазмы и большого числа ядер (напр., поперечнополосатое мышечное волокно).

СИ́МПСОНА ИГЛА́ (истор.; J. Y. Simpson, 1811—1870, шотл. гинеколог) — хирургическая игла для наложения шва металлической проволокой, представляющая собой металлическую прямую или изогнутую трубку, слегка расплющенную и заостренную на конце, вставленную в рукоятку и снабженную отверстиями, через к-рые проходит металлическая лигатура.

СИ́МПСОНА — ФЕНОМЕ́НОВА ЩИПЦЫ́ (J. Y. Simpson, 1811—1870, шотл. гинеколог; Н. Н. Феноменов, 1855—1918, отеч. акушер-гинеколог) — акушерский инструмент для извлечения плода за головку, представляющий собой изогнутые щипцы с двумя браншами, перекрестно сочлененными посредством скользящего замка, снабженные ребристыми рукоятками с выступами для пальцев.

СИ́МПТОМ (symptomum, symptoma; греч. symptōma совпадение, признак) — признак патологического состояния или болезни.

СИМПТО́М АВТОМАТИ́ЧЕСКОГО ПРИПОДНИМА́НИЯ РУКИ́ — при вытягивании рук вперед и закрытых глазах рука больного на стороне поражения полушария мозжечка несколько приподнимается.

СИМПТО́М АВТОМАТИ́ЧЕСКОЙ ПРОНА́ЦИИ — см. *Бабинского симптом автоматической пронации.*

СИМПТО́М АКЦЕССО́РНЫЙ (лат. accessorius добавочный) — см. *Симптом вторичный.*

СИМПТО́М АМПУТА́ЦИИ ЛОХА́НКИ — обнаруживаемый на рентгенограмме дефект наполнения почечной лоханки, напр. при ее опухоли или кисте.

СИМПТО́М АПЕЛЬСИ́НОВОЙ КО́РКИ — см. *Симптом лимонной корки.*

СИМПТО́М БА́БОЧКИ — наличие эритемы на спинке носа и на щеках (обычно в области скуловых дуг), по своим очертаниям напоминающей бабочку; характерен для красной волчанки.

СИМПТО́М БАЛКО́НА — см. *Фрей симптом.*

СИМПТО́М БАЛЛОТИ́РОВАНИЯ ПО́ЧКИ — определяемые при двуручной пальпации подвижность и увеличение почки; наблюдается при ее перерастяжении мочой, кровью, опухолью.

СИМПТО́М БАРАБА́ННЫХ ПА́ЛОЧЕК — см. *Пальцы барабанные.*

СИМПТО́М БЕ́ЛОГО ПЯТНА́ — появление длительно не исчезающего белого пятна на коже тыла стопы или кисти больного после надавливания пальцем; наблюдается при сосудистой недостаточности в дистальных отделах конечностей, нарушении симпатической иннервации.

СИМПТО́М БОКОВО́ГО КАЧА́НИЯ ГО́ЛЕНИ — патологическая смещаемость голени в сторону, обнаруживаемая при фиксации бедра выпрямленной ноги и пассивном покачивании голени; признак повреждения коллатеральной связки коленного сустава на стороне, противоположной направлению смещения.

СИМПТО́М БОЛТА́ЮЩЕЙСЯ КИ́СТИ — чрезмерная амплитуда пассивных движений кисти, возникающих при встряхивании исследующим предплечья больного; признак хореи, обусловленный мышечной гипотонией.

СИМПТО́М БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ (син. Бехтерева симптом большого пальца кисти) — непроизвольное сгибание и приведение I пальца при пассивном разгибании согнутых II — V пальцев кисти, а также разгибание и отведение I пальца при пассивном сгибании разогнутых II — V пальцев; признак поражения пирамидных путей.

СИМПТО́М БРИ́ТВЫ — хрустящий, с тимпаническим оттенком звук, возникающий при сбривании волосков с кожи вокруг раны; возможный ранний признак эмфизематозной формы анаэробной инфекции; наблюдается и в других случаях подкожной эмфиземы.

СИМПТО́М БРИ́ТЬЯ — внезапное выпадение бритвы из рук бреющегося больного при повороте головы с одновременным ее запрокидыванием; признак преходящего нарушения мозгового кровообращения в бассейне внутренней сонной артерии.

СИМПТО́М БУДИ́ЛЬНИКА — понос, возникающий только ночью или утром; наблюдается при лямблиозе и нек-рых других болезнях кишечника.

СИМПТО́М БУЛЬБОФАЦИА́ЛЬНЫЙ ТОНИ́ЧЕСКИЙ — см. *Мондонези симптом.*

СИМПТО́М БУТЫ́ЛОЧНЫХ НОГ — форма ног, напоминающая перевернутые бутылки; признак невральной наследственной амиотрофии, обусловленный атрофией мышц голени.

СИМПТО́М ВЕ́ЕРА — 1) патологический рефлекс: веерообразное расхож-

дение II — V пальцев стопы при штриховом раздражении наружного края подошвы; наблюдается при поражении пирамидных путей; 2) патологический рефлекс: веерообразное расхождение пальцев кисти при сжимании исследующим сухожилий сгибателей пальцев больного в области гороховидной кости; наблюдается при поражении пирамидных путей.

СИМПТО́М ВИ́ДИМЫХ МЫ́СЛЕЙ — непроизвольное возникновение какой-либо мысли, сопровождаемое появлением соответствующего зрительного образа; наблюдается при идеаторном автоматизме.

СИМПТО́М ВИШНЁВОЙ КО́СТОЧКИ — наблюдаемое при офтальмоскопии четкое выделение темно-красной центральной ямки на фоне бледной мутной сетчатки; признак острой непроходимости центральной артерии сетчатки.

СИМПТО́М ВОЖЖЕ́Й — 1) напряжение длинных мышц спины, выпячивающихся в виде двух натянутых шнуров, особенно заметных при наклоне больного вперед; признак поражения грудного позвонка (позвонков), расположенного выше участка напряжения мышц; 2) см. *Корнева симптом вожжей.*

СИМПТО́М ВОЗДУ́ШНОЙ ПОДУ́ШКИ (син. Дюпре синдром) — длительно сохраняющееся положение приподнятой головы на нек-ром удалении от подушки у лежащего на спине больного; признак кататонического ступора.

СИМПТО́М ВОЗНИКА́ЮЩЕГО ПУЗЫ́РЯ — появление на слизистой оболочке рта напряженных пузырей с серозным или геморрагическим содержимым после ее поскабливания шпателем; признак доброкачественной неакантолитической пузырчатки слизистой оболочки полости рта.

СИМПТО́М ВО́ЛОСА — ощущение во рту инородного тела (напр., волоса, нитки), вызывающее попытки освободиться от него с помощью движений языка и губ; характерен для отравлений тетраэтилсвинцом и нек-рыми другими ядами.

СИМПТО́М ВРЕ́ЗЫВАНИЯ НИ́ТИ (син. Мельникова проба) — врезывание в мягкие ткани нити, завязанной вокруг конечности; признак анаэробной инфекции, обусловленный быстрым развитием отека или эмфиземы тканей.

СИМПТО́М ВСТАВА́НИЯ (син. симптом лестницы) — вставание больного из положения лежа на спине путем последовательного выполнения следующих действий: поворот на живот, приподнимание на четвереньки, разгибание ног в коленных суставах, удерживаясь руками за голени, выпрямление туловища с упором руками в бедра; наблюдается при миопатии.

СИМПТО́М ВТОРИ́ЧНЫЙ (син. симптом акцессорный) в психиатрии — признак психической болезни, психологически выводимый из другого ее признака.

СИМПТО́М ВТЯЖЕ́НИЯ КО́ЖИ — см. *Симптом умбиликации.*

СИМПТО́М ВЫДВИЖНО́ГО Я́ЩИКА — патологическая смещаемость голени кпереди, когда конечность согнута в коленном суставе; признак повреждения передней крестообразной связки.

СИМПТО́М ВЫПАДЕ́НИЯ — 1) в психиатрии — общее название негативных психических симптомов, отражающих стойкое оскудение и упрощение психической деятельности (утрата интересов и прежних форм познавательной, мыслительной деятельности, эмоциональное обеднение, ослабление памяти; 2) в неврологии — общее название симптомов, возникающих в результате поражения путей или центров нервной системы.

СИМПТО́М ВЫСО́КОЙ ПЯ́ТКИ (син.: Калитовского симптом, симптом цыпочек) — сгибание одной ноги при вставании на носки, вследствие чего ее пятка оказывается поднятой выше, чем пятка другой ноги; признак поясничнокрестцового радикулита.

СИМПТО́М ВЯ́ЛЫХ ПЛЕЧ — см. *Симптом свободных надплечий.*

СИМПТО́М ГВОЗДЯ́ — боль в области темени, описываемая больным как ощущение вбитого в темя гвоздя; признак истерии.

СИМПТО́М ГЕТЕРОНО́МНЫЙ (греч. heteros другой, иной + nomos закон) — психопатологическое явление, не имеющее аналогии в нормальной психической деятельности (напр., психический автоматизм, первичный бред отношения, деменция).

СИМПТО́М ГИПОТОНИ́И ВЕК — см. *Боголепова симптом.*

СИМПТО́М ГЛАЗ И ЯЗЫКА́ — неспособность больного одновременно удерживать глаза закрытыми, а язык высунутым; проявление гиперкинеза мышц лица и языка, напр. при малой хорее.

СИМПТО́М ГОЛОВЫ́ КО́БРЫ — обнаруживаемое при экскреторной урографии овальное расширение конечного отдела мочеточника, по своим очертаниям напоминающее голову кобры; признак ахалазии мочеточника, иногда наблюдается при уретероцеле.

СИМПТО́М ГОЛУБЫ́Х СКЛЕР (син. лептосклерия) — серовато-голубая окраска склер глазных яблок; признак синдрома Ван-дер-Хуве, полицитемии, диссеминированного лентикулярного дерматофиброза и ряда других болезней, характеризующихся истончением склер.

СИМПТО́М ГОМОНО́МНЫЙ (греч. homos тот же самый, одинаковый + nomos закон) — психопатологическое явление, сходное с нек-рым проявлением нормальной психической деятельности, но отличающееся от него степенью выраженности (напр., приподнятое настроение, тревога).

СИМПТО́М ГРАММОФО́НА — постоянное повторение больным одних и тех же коротких рассказов (спонтанно или в ответ на обращение); вид речевой стереотипии, связанный с утраченным или сниженным пониманием чужой речи; наблюдается, напр., при болезни Пика.

СИМПТО́М ГРУ́ШИ — образование на коже и (или) слизистых оболочках пузырей грушевидной формы; признак обыкновенной пузырчатки, обусловленный давлением экссудата на клетки шиповатого слоя эпидермиса, измененные акантолизом.

СИМПТО́М ГРЫЖЕВО́Й НО́ЖКИ — см. *Линденбратена симптом.*

СИМПТО́М ГРЫЖЕВЫ́Х ВОРО́Т — расположение части рентгеновской тени желудка над диафрагмой; признак диафрагмальной грыжи, чаще грыжи пищеводного отверстия.

СИМПТО́М ГРЯ́ЗНЫХ ЛОКТЕ́Й — см. *Бера симптом.*

СИМПТО́М ГУБЫ́ — см. *Симптом козырька.*

СИМПТО́М ДВИ́ГАТЕЛЬНОГО НЕГАТИВИ́ЗМА — см. *Противодержание.*

СИМПТО́М ДВУЗУ́БЦА — выявляемая при ирригоскопии сигмообразная форма рентгеновской тени в области илеоцекального угла; признак илеоцекальной инвагинации кишок, обусловленный заполнением контрастной массой просвета между стенкой слепой кишки и внедрившейся в нее подвздошной кишкой.

СИМПТО́М ДИСЛОКАЦИО́ННЫЙ — симптом, возникший при каком-либо патологическом процессе в головном или спинном мозге, не характерный для его локализации, а обусловленный вызванным им смещением или сдавлением нек-рого участка мозга на отдалении (напр., расстройство обоняния при опухоли лобной доли).

СИМПТО́М ЖГУТА́ — см. *Кончаловского — Румпеля — Лееде симптом.*

СИМПТО́М ЖЕЛОБКА́ — см. *Симптом клавишей.*

СИМПТО́М ЗА́ДНЕГО ХО́ДА — см. *Лозинского симптом заднего хода.*

СИМПТО́М ЗА́НАВЕСА — смещение задней стенки глотки в сторону при фонации или надавливании шпателем на язык; признак поражения противоположного языкоглоточного нерва или его ядра.

СИМПТО́М ЗАНАВЕ́СКИ — обнаруживаемое при цистоскопии щелевидное сужение шейки мочевого пузыря; признак аденомы предстательной железы.

СИМПТО́М ЗАПРУ́ДЫ (син. синдром запруды) — сочетание высокого зубца *R*, отсутствия зубца *S*, пониженного сегмента *S — T* и глубокого отрицательного зубца *T* в отведении V электрокардиограммы, причем эти изменения в отведениях V — V последовательно уменьшаются; признак резкой гипертрофии и перегрузки левого желудочка сердца.

СИМПТО́М ЗАХЛО́ПЫВАЮЩЕЙСЯ ДВЕ́РИ — резкое усиление второго тона сердца над легочным стволом и в точке Боткина — Эрба; признак митрального порока сердца, обусловленный легочной гипертензией.

СИМПТО́М ЗЕ́РКАЛА — длительное рассматривание больным себя в зеркало, часто сопровождаемое гримасничанием; признак шизофрении, невроза навязчивых состояний, психопатии, реактивного состояния и нек-рых других психических болезней, обусловленный наличием навязчивой, сверхценной или бредовой идеи.

СИМПТО́М ЗРАЧКА́ — расширение и заполнение прозрачной слизью наружного отверстия матки; признак наступления середины менструального цикла (13—14-й день).

СИМПТО́М ЗУ́БЧАТОГО КОЛЕСА́ — возникновение при исследовании тонуса мышц конечностей ощущения прерывистости, ступенчатости движения в виде равномерных толчков; проявление экстрапирамидной ригидности мышц при паркинсонизме.

СИМПТО́М ИЗВИ́ЛИСТОСТИ ПИЩЕВО́ДА — неровность, извилистость рентгеновской тени пищевода; признак эзофагоспазма.

СИМПТО́М ИЛЛЮ́ЗИИ ДВОЙНИКО́В — см. *Капгра симптом.*

СИМПТО́М КАПЮШО́НА — поза больного, при к-рой плечи приподняты, голова наклонена вперед и на нее натянуты халат или одеяло; проявление кататонического ступора.

СИМПТО́М КА́СКИ (син.: симптом неврастенической каски, Шарко симптом) — ощущение сжимания головы металлической каской или обручем; наблюдается при неврастении.

СИМПТО́М КАТА́НИЯ ПИЛЮ́ЛЬ (син. симптом счета монет) — ритмическое дрожание II, III и противопоставленного им I пальца кисти; наблюдается при паркинсонизме.

СИМПТО́М КАЧА́НИЯ — см. *Лещенко синкинезия.*

СИМПТО́М КАШЛЕВО́ГО ТОЛЧКА́ — восприятие пальцем исследующего, введенным в предполагаемые грыжевые ворота, толчка при кашле больного; признак наружной грыжи живота.

СИМПТО́М КАШЛЕВО́Й — появление или усиление боли в животе при покашливании; признак перитонита.

СИМПТО́М КИСЕ́ТА — сужение ротового отверстия с образованием вокруг него глубоких морщин; признак системной склеродермии, обусловленный склерозом и атрофией кожи в области рта.

СИМПТО́М КЛА́ВИШЕЙ (син.: симптом желобка, феномен желобка, феномен клавишей) — появление мышечных валиков и впадин при перкуссии передней поверхности грудной клетки сверху вниз от ключицы по среднеключичной линии; признак повышенной возбудимости мышц, напр. при тиреотоксикозе, гипопаратиреозе, миотонии.

СИМПТО́М КЛА́ПАНА ЛОХА́НОЧНО-МОЧЕТО́ЧНИКОВОГО СЕГМЕ́НТА — см. *Симптом пустого мочеточника.*

СИМПТО́М КОГТИ́СТОЙ РУКИ́ — см. *Птичья лапа.*

СИМПТО́М КОЗЫРЬКА́ (син.: симптом губы, симптом шпоры) — рентгенологически фиксируемая отслойка обызвествленной надкостницы и ее смещение под острым углом к длиннику кости на границе с опухолевым узлом, чаще остеогенной саркомой.

СИМПТО́М КОЛЕ́ННОЙ ЧА́ШКИ — резко увеличенная подвижность надколенника у стоящего больного; признак поражения бедренного нерва, обусловленный гипотонией и слабостью четырехглавой мышцы бедра.

СИМПТО́М КОЛЕ́НЧАТОГО УЗЛА́ — см. *Дежерина — Сука — Сикара синдром.*

СИМПТО́М КОРНЕОМАНДИБУЛЯ́РНЫЙ — см. *Рефлекс корнеомандибулярный.*

СИМПТО́М КОРОМЫ́СЛА — неодновременность верхушечного толчка и сердечного толчка в прекордиальной области; признак аневризмы левого желудочка сердца.

СИМПТО́М КРА́Я ПОЯСНИ́ЧНОЙ МЫ́ШЦЫ — искажение формы рентгеновской тени почечной лоханки, при к-ром ее медиальный край выглядит косо срезанным; признак гидронефроза, обусловленный смещением атоничной стенки почечной лоханки латеральным краем большой поясничной мышцы.

СИМПТО́М КРОКОДИ́ЛОВЫХ СЛЁЗ (син. Богорада симптом) — возникновение во время еды слезотечения на стороне поражения лицевого нерва.

СИМПТО́М КУ́КОЛЬНЫХ ГЛАЗ (син. Ароповича симптом) — движение глазных яблок кверху при наклоне головы вперед и движение их книзу при откидывании головы; наблюдается при паркинсонизме.

СИМПТО́М КУЛАКА́ — см. *Леви симптом.*

СИМПТО́М КУЛИ́С — рентгенологический феномен, обусловленный частичным наложением друг на друга изображений патологических образований, расположенных на разной глубине, в результате чего контур получаемого изображения приобретает ступенчатый вид, напоминая театральные кулисы.

СИМПТО́М КУРЕ́НИЯ ТРУ́БКИ — см. *Симптом паруса.*

СИМПТО́М КУ́РТКИ, ПОЛУКУ́РТКИ (син. Рота симптом) — диссоциированное расстройство болевой и температурной чувствительности на туловище и конечностях, зона к-рого по конфигурации напоминает куртку или полукуртку; признак сирингомиелии, обусловленный поражением задних рогов и белой спайки спинного мозга на уровне нижних шейных и верхних грудных сегментов.

СИМПТО́М ЛАДО́ННО-ПОДБОРО́ДОЧНЫЙ (син.: Маринеску — Радовича рефлекс, симптом пальмоментальный) — рефлекс орального автоматизма: сокращение подбородочной мышцы со смещением кожи подбородка кверху при штриховом раздражении кожи в области возвышения I пальца кисти на той же стороне тела; наблюдается при поражении корково-ядерных путей.

СИМПТО́М ЛАТЕРАЛИЗАЦИО́ННЫЙ — симптом, наличие к-рого позволяет определить сторону локализации очага патологического процесса в головном мозге.

СИМПТО́М ЛЕ́СТНИЦЫ — см. *Симптом вставания.*

СИМПТО́М ЛИ́КВОРНОГО ТОЛЧКА (син. Раздольского симптом) — возникновение или резкое усиление боли в зоне иннервации каких-либо корешков спинномозговых нервов, наблюдаемое при сдавлении яремных вен; признак наличия опухоли спинного мозга на соответствующем уровне.

СИМПТО́М ЛИМО́ННОЙ КО́РКИ (син. симптом апельсиновой корки) — утолщение и отек кожи молочной железы с резким выступанием на ней порозных желез; признак рака молочной железы.

СИМПТО́М ЛОБКО́ВО-ЭКСТЕ́НЗОРНЫЙ — патологический рефлекс: разгибание большого пальца стопы при надавливании на область лобкового симфиза; признак поражения пирамидных путей.

СИМПТО́М ЛО́ЖНОЙ ЯЗВЕННОЙ НИ́ШИ — выпячивание рентгеновской тени полого органа, напоминающее нишу, но обусловленное не наличием язвенного кратера, а, напр., складчатостью слизистой оболочки, рубцовым натяжением или дивертикулом стенки органа.

СИМПТО́М ЛО́ЖНЫХ УЗНАВА́НИЙ — см. *Капгра симптом.*

СИМПТО́М ЛУЧЕВО́Й — см. *Бабинского лучевой симптом.*

СИМПТО́М ЛЯГУША́ЧЬИХ ЛАП — см. *Волковича симптом.*

СИМПТО́М МА́СКИ КЛО́УНА — отсутствие покраснения парализованной стороны лица при плаче; наблюдается при неврите лицевого нерва.

СИМПТО́М МЕ́ДНОЙ ПРО́ВОЛОКИ — наблюдаемый при офтальмоскопии желтоватый отблеск артерий сетчатки; признак гипертонической ангиопатии сетчатки.

СИМПТО́М МЕНИНГЕА́ЛЬНЫЙ — общее название симптомов, обусловленных раздражением мозговых оболочек в результате травмы, воспаления или развития опухоли.

СИМПТО́М МЁРТВЫХ ПА́ЛЬЦЕВ — см. *Акроасфиксия.*

СИМПТО́М МИШЕ́НИ — избирательное действие психотропных средств на отдельные симптомы или их сочетания вне зависимости от нозологической принадлежности.

СИМПТО́М МО́КРОЙ ТРЯ́ПКИ — уменьшение жгучих болей в конечности при обертывании ее влажной тканью; признак каузалгии.

СИМПТО́М МОНОЛО́ГА — безостановочная речь психически больного в ответ на любой заданный ему вопрос без учета внимания собеседника; наблюдается при шизофрении.

СИМПТО́М МОРЩИ́НИСТОСТИ КО́ЖИ — появление при захвате кожи молочной железы в складку неглубоких морщин, направленных перпендикулярно этой складке; признак рака молочной железы.

СИМПТО́М МУЛЯЖА́ — стойкая задержка контрастного вещества в петлях тонкой кишки при рентгенологическом обследовании; признак спру.

СИМПТО́М МЫ́ШЕЧНОЙ ЗАЩИ́ТЫ (син. défense musculaire) — напряжение мышц передней брюшной стенки при перитоните.

СИМПТО́М МЮССЕ́ (по имени больного — франц. поэта 19 в. А. Мюссе) — синхронное с ритмом сердца покачивание головы вперед — назад; признак недостаточности клапана аорты, обусловленный резким изменением кровенаполнения артерий головы.

СИМПТО́М НАТЯЖЕ́НИЯ — общее название болей, возникающих при пассивных движениях конечностей и обусловленных натяжением корешков спинномозговых нервов, самих нервов или окружающих тканей.

СИМПТО́М НЕВРАСТЕНИ́ЧЕСКОЙ КА́СКИ — см. *Симптом каски.*

СИМПТО́М НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ВТОРИ́ЧНЫЙ — общее название признаков нарушения деятельности нервной системы, обусловленных сопутствующими основному патологическому процессу явлениями (напр., внутричерепной гипертензией, сосудистыми нарушениями, отеком мозга).

СИМПТО́М НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ГНЁЗДНЫЙ — см. *Симптом неврологический очаговый.*

СИМПТО́М НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ КОНТРАЛАТЕРА́ЛЬНЫЙ — признак нарушения деятельности нервной системы, наблюдаемый на стороне тела, противоположной очагу поражения или раздражения цнс, а также месту проявления какого-либо другого симптома.

СИМПТО́М НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ОБЩЕМОЗГОВО́Й (син. симптом неврологический общий) — общее на-

зование признаков нарушения деятельности нервной системы, обусловленных влиянием патологического процесса (напр., повышения внутричерепного давления или интоксикации) на весь головной мозг.

СИМПТО́М НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ О́БЩИЙ — см. *Симптом неврологический общемозговой.*

СИМПТО́М НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ОЧАГО́ВЫЙ (син.: симптом неврологический гнездный, симптом очаговый) — общее название признаков нарушения деятельности нервной системы, обусловленных локальным воздействием патологического процесса на ее пути или центры.

СИМПТО́М НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ПЕРВИ́ЧНЫЙ — общее название признаков нарушения деятельности нервной системы, обусловленных непосредственным влиянием патологического процесса на нервную ткань.

СИМПТО́М НЕСПАДЕ́НИЯ СТЕ́НОК ПИЩЕВО́ДА — наблюдаемое при рентгенологическом исследовании расширение просвета и отсутствие перистальтики пищевода; признак ахалазии кардии.

СИМПТО́М НЕФРОГРАФИ́И — наличие на экскреторной урограмме четкой рентгеновской тени почки при отсутствии контрастного вещества в почечной лоханке и ее чашечках; признак окклюзии мочеточника, напр. при почечнокаменной болезни.

СИМПТО́М НО́ЖНИЦ — см. *Вредена симптом ножниц.*

СИМПТО́М НОСОВЫ́Х ГРЕБЕШКО́В — бугристость в месте соединения костной и хрящевой части носа, определяемая пальпаторно у ребенка; признак врожденного сифилиса.

СИМПТО́М ОБГОРЕ́ЛОГО ДЕ́РЕВА — выявляемые при артериографии почки сужения и изломанность ветвей почечной артерии и отсутствие теней мелких ветвей; признак нефросклероза.

СИМПТО́М ОБИРА́НИЯ — однообразные движения снимания чего-то с поверхности своего тела; наблюдается при мусситирующем делирии.

СИМПТО́М ОБЛИГА́ТНЫЙ — признак болезни, наблюдаемый при ней всегда и обусловленный ее природой.

СИМПТО́М ОБРУ́БЛЕННЫХ ВЕ́ТОК — рентгеновское изображение бронхов, полученное при бронхографии, напоминающее силуэт дерева с обрубленными ветвями; признак полного бронхостеноза, обусловленный задержкой контрастного вещества перед суженными участками бронхов.

СИМПТО́М ОБУ́ХОВСКОЙ БОЛЬНИ́ЦЫ — баллонообразное расширение ампулы прямой кишки, определяемое пальцевым исследованием; признак заворота сигмовидной кишки.

СИМПТО́М ОБЪЕКТИ́ВНЫЙ — симптом, выявленный при обследовании больного (при осмотре, пальпации, перкуссии, аускультации и др.).

СИМПТО́М ОДЕЯ́ЛА — настойчивые попытки больного с помраченным или спутанным сознанием удерживать стягиваемое с него одеяло; признак менингита.

СИМПТО́М ОКЦИПИТОТРИГЕМИНА́ЛЬНЫЙ (анат. nervus occipitalis затылочный нерв + nervus trigeminus тройничный нерв) — болезненность в области точек выхода затылочного и надглазничного нервов на одной стороне головы; признак гнойного эпитимпанита.

СИМПТО́М ОПУ́ЩЕННОЙ ГОЛОВЫ́ — см. *Зограбяна симптом.*

СИМПТО́М ОСТАНО́ВКИ МЫ́СЛЕЙ — см. *Шперрунг.*

СИМПТО́М ОСТИ́СТОГО ОТРО́СТКА (син. Раздольского симптом) — болезненность при постукивании и надавливании на остистый отросток; признак повреждения позвонка или поражения его патологическим процессом.

СИМПТО́М ОТВЕДЕ́НИЯ БЕДРА́ (син. Раздольского симптом) — непроизвольное сгибание и отведение бедра в ответ на щипок кожи передней поверхности бедра или при поколачивании по сухожилию четырехглавой мышцы бедра, по подвздошному гребню или по передней поверхности голени; признак опухоли лобной доли большого мозга.

СИМПТО́М ОТДА́ЧИ — см. *Стоарта — Холмса симптом.*

СИМПТО́М ОТКРЫ́ТОГО РТА — полуоткрытый рот у больного, находящегося без сознания, причем степень открытия рта меняется синхронно с дыханием; наблюдается при апоплектической или эпилептической коме.

СИМПТО́М ОТКРЫ́ТОСТИ — убежденность психически больного в том, что окружающим известны все его мысли и чувства; одно из ранних проявлений синдрома Кандинского — Клерамбо.

СИМПТО́М ОЧАГО́ВЫЙ — см. *Симптом неврологический очаговый.*

СИМПТО́М ОЧКО́В — наличие кровоподтеков вокруг глаз; признак перелома основания черепа, обусловленный происходящим при этом кровоизлиянием в окологлазничную клетчатку.

СИМПТО́М ПА́ДАЮЩЕЙ КА́ПЛИ — см. *Вильмса симптом падающей капли.*

СИМПТО́М ПАЛЬМОМЕНТА́ЛЬНЫЙ (анат. palma ладонь + mentum подбородок) — см. *Симптом ладонно-подбородочный.*

СИМПТО́М ПАЛЬЦЕВО́ГО ВДАВЛЕ́НИЯ — см. *Де Кервена симптом.*

СИМПТО́М ПА́РУСА (син. симптом курения трубки) — пассивное раздувание щеки в такт дыханию у больного, находящегося в коматозном состоянии; наблюдается на стороне, противоположной очагу поражения головного мозга при инсульте.

СИМПТО́М ПАТОГНОМОНИ́ЧНЫЙ (греч. pathos страдание, болезнь + gnōmonikos способный к суждению, знающий) — симптом, характерный исключительно для определенной болезни и дающий основание поставить окончательный диагноз.

СИМПТО́М ПЕРВИ́ЧНЫЙ в п с и х и а т р и и — признак психической болезни, непосредственно вытекающий из ее существа и не выводимый из других психических расстройств.

СИМПТО́М ПЕРГА́МЕНТНОГО ХРУ́СТА — см. *Дюпюитрена симптом.*

СИМПТО́М ПЕТИ́ТОВА ТРЕУГО́ЛЬНИКА — болезненность при надавливании над подвздошным гребнем в области поясничного треугольника справа; возможный признак хронического аппендицита.

СИМПТО́М ПЛА́ВАЮЩЕГО ЛЬДА — см. *Гарсии — Соджерса симптом.*

СИМПТО́М ПЛА́ВАЮЩЕЙ ЛИ́ЛИИ — см. *Гарсии — Соджерса симптом.*

СИМПТО́М ПЛА́ВАЮЩЕЙ ЛЬДИ́НЫ — внезапное наталкивание на плотную поверхность увеличенной печени пальцами кисти, свободно погружавшимися в брюшную полость, при пальпации в правом подреберье; признак гепатомегалии, сочетающейся с асцитом.

СИМПТО́М ПЛА́ВАЮЩИХ ГЛАЗ — горизонтальные, медленные, иногда неассоциированные движения глазных яблок у больного в коматозном состоянии; наблюдается при кровоизлиянии в головной мозг, чаще с прорывом крови в желудочки мозга, или при тяжелой травме головного мозга.

СИМПТО́М ПЛАКУ́ЧЕЙ И́ВЫ — выявляемое при пиелографии необычное положение почечных чашек, при к-ром они обращены кнаружи и книзу; признак нефроптоза.

СИМПТО́М ПЛОЩА́ДКИ — наличие на коже молочной железы участка, потерявшего эластичность, не расправляющегося после кратковременного ущемления; признак опухоли молочной железы.

СИМПТО́М ПОВТОРЯ́ЕМОСТИ — восприятие больным всех новых воздействий на него как повторений только что имевших место воздействий (больному кажется, что его многократно спрашивают об одном и том же, многократно измеряют температуру и т. п.); признак острой акрихиновой интоксикации.

СИМПТО́М ПОВЫ́ШЕННОЙ ОТКЛИКА́ЕМОСТИ — повторение психически больным слов и фраз, произнесенных окружающими, с последующим ответом на них; наблюдается, напр., при старческом слабоумии.

СИМПТО́М ПОДВЕ́ШИВАНИЯ (син. Лесажа симптом) — сгибание ребенком ног в коленных и тазобедренных суставах с удержанием их в этом положении, наблюдаемое при поднимании ребенка за подмышечные впадины; признак менингита у детей грудного возраста.

СИМПТО́М ПОДКЛЮЧИ́ЧНЫЙ — отсутствие пульса на верхней конечности; признак окклюзии подключичной артерии дистальнее отхождения ее основных ветвей.

СИМПТО́М ПОДНИМА́НИЯ ПО ЛЕ́СТНИЦЕ — см. *Зинченко симптом.*

СИМПТО́М ПОКЛО́НА — см. *Нери симптом.*

СИМПТО́М ПОПЕРЕ́ЧНОГО СМЕ́ХА — отсутствие подтягивания углов рта кверху при смехе; признак миопатии, обусловленный атрофией соответствующих мимических мышц.

СИМПТО́М ПОСА́ДКИ — неспособность сесть в постели из положения лежа на спине без сгибания ног в коленных и тазобедренных суставах; признак пояснично-крестцового радикулита.

СИМПТО́М ПОСЛЕ́ДНЕГО СЛО́ВА — неожиданное произнесение психически больным, не вступавшим до этого в беседу, какого-нибудь слова при расставании с собеседником; наблюдается при шизофрении.

СИМПТО́М ПРИЛИ́ПШЕЙ ПЯ́ТКИ — см. *Горшевской симптом.*

СИМПТО́М ПРИСЕДА́НИЯ — см. *Шерешевского симптом.*

СИМПТО́М ПРОСТЫНИ́ — предпочтение больным сна в прохладном помещении, сняв всю одежду и укрывшись

лишь простыней; признак тиреотоксикоза, обусловленный повышенной теплопродукцией.

СИМПТО́М ПРОТИВОДЕРЖА́НИЯ — см. *Противодержание*.

СИМПТО́М ПСИХИ́ЧЕСКИЙ НЕГАТИ́ВНЫЙ (син. минус-симптом) — общее название наблюдаемых при психических болезнях признаков обеднения личности больного, изменения ее склада, ослабления психической деятельности.

СИМПТО́М ПСИХИ́ЧЕСКИЙ ПОЗИТИ́ВНЫЙ (син. плюс-симптом) — общее название наблюдаемых при психических болезнях признаков патологически повышенной продуктивности психической деятельности (напр., бреда, галлюцинаций, аффектов).

СИМПТО́М ПУСТО́ГО МОЧЕТО́ЧНИКА (син.: Лихтенберга симптом, симптом клапана лоханочно-мочеточникового сегмента) — выявляемое при ретроградной уретеропиелографии заполнение почечной лоханки контрастным веществом при отсутствии его в прилоханочном отделе мочеточника; признак нарушения проходимости мочеточника, к-рое обусловлено аномалией развития (наличие клапана).

СИМПТО́М ПУСТО́ГО ПА́ЛЬЦА, ПУСТО́Й ПЯ́ТКИ — появление после легкого надавливания на кожу ноги вмятины, сохраняющейся в течение нек-рого времени после прекращения давления; признак облитерирующего эндартериита, обусловленный патологическими изменениями подкожной клетчатки; лучше проявляется на пальцах и пятках.

СИМПТО́М РАЗДЕ́ЛЬНОГО ЗАЖМУ́РИВАНИЯ ГЛАЗ — см. *Ревийо симптом*.

СИМПТО́М РАЗДРАЖЕ́НИЯ — общее название симптомов, возникающих в результате раздражения путей или центров нервной системы при отсутствии их поражения.

СИМПТО́М РАЗМА́ТЫВАНИЯ ВОСПОМИНА́НИЙ — см. *Воспоминания насильственные*.

СИМПТО́М РАСПО́РКИ (син. симптом треножника) — вынужденная опора больного на вытянутые руки при переходе из положения лежа в положение сидя; наблюдается при полиневрите и пояснично-крестцовом радикулите.

СИМПТО́М РАССТРО́ЙСТВА АДАПТА́ЦИИ — см. *Шарпантье феномен*.

СИМПТО́М РАСХОДЯ́ЩИХСЯ ЛУЧЕ́Й — обнаруживаемые при ретроградной уретрографии узкие тени контрастного вещества, расходящиеся из одной точки в парауретральной клетчатке или в губчатом теле полового члена; признак перфорации стенки мочеиспускательного канала, обусловленный уретровенозным рефлюксом.

СИМПТО́М РА́ШПИЛЯ — грубый шум трения брюшины, определяемый при аускультации; непостоянный признак туберкулезного мезаденита.

СИМПТО́М РЕСНИ́Ц — отсутствие погружения ресниц в кожную складку века при зажмуривании глаза; признак пареза лицевого нерва, обусловленный слабостью круговой мышцы глаза.

СИМПТО́М РОГОВИ́ЧНОГО КОЛЬЦА́ (син. Кайзера — Флейшера кольцо) — желтовато-зеленая или зеленовато-коричневая пигментация по периферии роговицы; признак гепатоцеребральной дистрофии, обусловленный отложением пигмента, содержащего медь.

СИМПТО́М РОТИ́РОВАННОЙ СТОПЫ́ — см. *Боголепова симптом*.

СИМПТО́М САЛЬНОГО ЛИЦА́ — повышенная секреция сальных желез кожи лица при паркинсонизме.

СИМПТО́М СВОБО́ДНЫХ НАДПЛЕ́ЧИЙ (син. симптом вялых плеч) — резкое поднятие надплечий ребенка при его приподнимании за подмышечные впадины; признак миопатии, обусловленный слабостью мышц плечевого пояса.

СИМПТО́М СДА́ВЛИВАНИЯ ПОВЯ́ЗКОЙ — ощущение сдавливания конечности повязкой, в действительности лежащей свободно; ранний признак анаэробной инфекции.

СИМПТО́М СЕДА́ЛИЩНЫЙ — см. *Вартенберга седалищный симптом*.

СИМПТО́М СЕРЕ́БРЯНОЙ ПРО́ВОЛОКИ — наблюдаемый при офтальмоскопии серебристо-белый отблеск артерий сетчатки; признак гипертонической ангиопатии сетчатки.

СИМПТО́М СЕРПА́ — обнаруживаемая при рентгенологическом исследовании органов брюшной полости узкая серповидная полоска просветления между печенью и диафрагмой; признак перфорации желудка или кишки, обусловленный наличием газа в брюшной полости.

СИМПТО́М СЖА́ТИЯ ПА́ЛЬЦЕВ В КУЛА́К — затрудненное разгибание и разведение в стороны пальцев, сжатых в кулак; признак миотонии.

СИМПТО́М СИНКИНЕТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Гунна симптом*.

СИМПТО́М СКЛАДНО́ГО НОЖА́ — ощущение сопротивления, испытываемое исследующим при попытке согнуть конечность больного в коленном или локтевом суставе, причем после преодоления начального сопротивления конечность сгибается свободно; наблюдается при центральном параличе.

СИМПТО́М СКРЕЩЁННЫХ РУК — непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах при скрещивании рук больного на груди; признак менингита.

СИМПТО́М СМЫКА́НИЯ ВЕК (син. Кохановского симптом) — одностороннее прищуривание, усиливающееся при попытке поднять веко больного; наблюдается на стороне поражения лобной доли большого мозга.

СИМПТО́М СОДРУ́ЖЕСТВЕННОГО ОТВЕДЕ́НИЯ ЛО́КТЯ — непроизвольное отведение локтя от туловища при поднимании надплечья; синкинезия, наблюдаемая на стороне гемипареза.

СИМПТО́М СОЛЯ́РНОГО ГВОЗДЯ́ (анат. устар. plexus solaris чревное сплетение) — резкая боль в подложечной области, иррадиирующая в спину или низ живота и вызывающая задержку дыхания и активных движений, в связи с чем больной принимает вынужденное положение — туловище наклонено вперед, а колени приведены к животу; наблюдается при воспалении чревного сплетения.

СИМПТО́М СОПРОТИВЛЕ́НИЯ — см. *Противодержание*.

СИМПТО́М СПИНА́ЛЬНЫЙ — общее название признаков нарушения деятельности спинного мозга.

СИМПТО́М СТОЯ́ЧИЙ — общее название признаков психических болезней в виде стереотипно повторяющихся, не обусловленных ситуацией бессмысленных высказываний, действий или движений больного.

СИМПТО́М СТРУНЫ́ — отсутствие физиологических изгибов рентгеновской тени мочеточника при урографии или ретроградной пиелографии; признак туберкулеза почки и мочевыводящих путей, обусловленный ригидностью пораженной стенки мочеточника.

СИМПТО́М СЧЁТА МОНЕ́Т — см. *Симптом катания пилюль*.

СИМПТО́М СУБЪЕКТИ́ВНЫЙ — симптом, выявленный при опросе больного: жалобы на какие-либо неприятные (напр., боль) или необычные ощущения и переживания.

СИМПТО́М ТВЁРДОГО ОТЁКА — напряженность и плотность тканей кожи на ногах и глянцевитость ее поверхности, не сопровождающиеся образованием вмятины на месте надавливания пальцем; наблюдается при травмах спинного мозга и миелитах.

СИМПТО́М ТЕЛЕГРА́ФНОГО СТОЛБА́ — тремор туловища и конечностей в положении больного стоя; наблюдается при диффузном токсическом зобе.

СИМПТО́М ТОЛКА́НИЯ — см. *Фуа — Тевенара симптом*.

СИМПТО́М ТОПТА́НИЯ — вынужденное непрерывное переступание с ноги на ногу в положении стоя; ранний признак наследственной невралыной амиотрофии.

СИМПТО́М ТРЕЗУ́БЦА — имеющая форму трезубца рентгеновская тень кишечника в области илеоцекального угла, выявляемая при ирригоскопии; признак илеоцекальной инвагинации кишок, обусловленный заполнением контрастной массой как просвета между стенкой слепой кишки и внедрившейся подвздошной кишкой, так и просвета последней.

СИМПТО́М ТРЕНО́ЖНИКА — см. *Симптом распорки*.

СИМПТО́М ТРЕПЕТА́НИЯ ВЕК (син. Зильберласт — Занд симптом) — дрожание век при приближении пальца исследующего к глазам больного; наблюдается в острой стадии энцефалита.

СИМПТО́М ТРЕ́СНУВШЕГО ГОРШКА́ (син. Макъюина симптом) — возникновение при перкуссии черепа звука, напоминающего звук при постукивании по глиняной посуде, имеющей трещину; признак повышенного внутричерепного давления.

СИМПТО́М УЗДЫ́ (син. Седерберга симптом) — недоведение движения до конца при выполнении пальценосовой пробы; проявление брадителекинезии при поражении мозжечка.

СИМПТО́М УКАЗА́ТЕЛЬНОГО ПА́ЛЬЦА — см. *Де Кервена симптом*.

СИМПТО́М УМБИЛИКА́ЦИИ (лат. umbilicus пупок; син. симптом втяжения кожи) — пупкообразное втяжение кожи над опухолью молочной железы.

СИМПТО́М ФАКУЛЬТАТИ́ВНЫЙ — необязательный признак болезни, имеющий второстепенное диагностическое значение.

СИМПТО́М ФИЗИОГЕ́ННЫЙ — симптом психической болезни, непосредственно вызванный лежащими в ее основе патологическими изменениями органов и тканей.

СИМПТО́М ФИКСА́ЦИИ ВЗО́РА — плавное смещение глазных яблок в сто-

рону, противоположную пассивному повороту головы больного, обусловленное непроизвольной фиксацией взора на лице исследующего; дифференциально-диагностический признак истерической слепоты.

СИМПТО́М ФИ́СТУЛЬНЫЙ — появление нистагма при попеременном повышении и понижении давления воздуха в наружном слуховом проходе; признак ограниченного гнойного лабиринтита, обусловленный наличием фистулы лабиринта.

СИМПТО́М ХЛОПКА́ — см. *Германа симптом.*

СИМПТО́М ХОБОТКА́ — тоническое сокращение мышц вокруг рта, при к-ром губы постоянно вытянуты вперед; признак кататонии.

СИМПТО́М ХОЛЕЦИСТОКОРОНА́РНЫЙ — см. *Боткина симптом.*

СИМПТО́М ХОЛО́ДНОЙ ВОДЫ́ — внезапное побледнение, похолодание пальцев конечностей и снижение их чувствительности при опускании в холодную воду; признак болезни Рейно.

СИМПТО́М ХОРЕ́ИЧЕСКОЙ РУКИ́ — патологическое положение кисти, при к-ром она несколько согнута в лучезапястном суставе, а пальцы находятся в положении гиперэкстензии в пястно-фаланговых суставах и разогнуты или слегка согнуты в межфаланговых суставах; признак малой хореи.

СИМПТО́М ЦВЕТКА́ МАРГАРИ́ТКИ — выявляемое при урографии или ретроградной пиелографии расширение и округление контуров рентгеновской тени почечных чашек, смещение их по тени почки в положение, напоминающее лепестки цветка; признак инфильтративно-кавернозного туберкулеза почки.

СИМПТО́М ЦЫ́ПОЧЕК — см. *Симптом высокой пятки.*

СИМПТО́М ЧЕРВЯЧКА́ — пальпаторно определяемая плотность и извилистость артерии при ее атеросклеротическом поражении.

СИМПТО́М ШЕ́ЙНО-КОРЕШКО́ВЫЙ — см. *Адесмана симптом.*

СИМПТО́М ШЕ́ЙНО-ПОДО́ШВЕННЫЙ (син. Мараньона симптом) — разгибание большого пальца стопы при пассивном приведении головы к груди больного, лежащего на спине с выпрямленными ногами; наблюдается при поражении пирамидных путей, при раздражении оболочек головного мозга.

СИМПТО́М ШНУРА́ — 1) резкое сужение рентгеновской тени участка подвздошной кишки при терминальном илеите; 2) резкое сужение рентгеновской тени участка толстой кишки при ее поражении туберкулезом.

СИМПТО́М ШПО́РЫ — см. *Симптом козырька.*

СИМПТО́М ШТО́ПОРА — см. *Гвиста симптом.*

СИМПТО́М ЩИПКА́ — см. *Гехта симптом.*

СИМПТО́М ЭКСПИРАТО́РНОГО ВЗДУ́ТИЯ — сохранение в фазе выдоха повышенной прозрачности и увеличенного объема пораженного легкого (или доли легкого) со смещением рентгеновской тени средостения в сторону спадающегося при выдохе второго легкого; признак вентильного бронхостеноза.

СИМПТО́М ЭРЕКТИ́ЛЬНЫЙ — спадение опухоли при надавливании на нее и увеличение ее плотности при кашле или крике; признак кавернозной гемангиомы.

СИМПТО́М ЮГУЛЯ́РНЫЙ — см. *Равич-Щербо симптом.*

СИМПТО́М ЯГОДИ́ЧНЫЙ — см. *Бонне ягодичный симптом.*

СИМПТО́М ЯЗЫКА́ — обнаруживаемое при цистографии наличие контрастного вещества в задней части уретры; признак недостаточности сфинктера мочевого пузыря.

СИМПТОМА́ТИКА — совокупность признаков определенной болезни или группы болезней.

СИМПТОМАТОЛО́ГИЯ [*симптом* (основа symptomat-) + греч. logos учение] — см. *Семиотика.*

СИМПТОМОКО́МПЛЕКС — см. *Синдром.*

СИМПТОМОКО́МПЛЕКС АНГИОНЕВРОТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Дистония вегетативно-сосудистая.*

СИМПТОМОКО́МПЛЕКС ВАРИКО́ЗНЫЙ — дерматоз, обусловленный варикозным расширением вен нижних конечностей и проявляющийся возникновением на них язв и вегетаций, гемосидерозом, экзематизацией и склерозированием кожи.

СИ́МПУС (sympus; *сим-* + лат. pus, podos нога) — см. *Сиреномелия.*

СИ́МСА ЗЕ́РКАЛО (J. M. Sims, 1813—1883, амер. гинеколог) — двустороннее влагалищное зеркало в виде изогнутой металлической пластины, имеющей на концах две желобоватые ложки разного размера.

СИМУЛЯ́ЦИЯ (лат. simulatio притворство) — имитация человеком симптомов болезни, к-рой у него нет.

С. ПРЕВЕНТИ́ВНАЯ — С. с целью подготовки объяснения последующего общественно опасного деяния (преступления) болезненным состоянием.

СИМФАЛАНГИ́Я (symphalangia; *сим-* + греч. phalanx, phalangos фаланга пальца) — см. *Ортодактилия.*

СИМФИ́З (symphysis, PNA, BNA, JNA; *сим-* + греч. phyō расти; син.: гемиартроз, полусустав) — соединение костей посредством хряща, в к-ром имеется щелевидная полость.

С. ЛОБКО́ВЫЙ (s. pubica PNA; s. ossium pubis, BNA, JNA; син.: лобковое сращение, лонное сращение, сочленение лонное) — С., посредством к-рого правая и левая лобковые кости соединены между собой.

С. МЕЖПОЗВОНО́ЧНЫЙ (s. intervertebralis, PNA) — С. между телами позвонков, образованный хрящевыми межпозвоночными дисками.

СИМФИ́ЗИОН (symphysion) — см. *Лобковая точка.*

СИМФИЗИОТОМИ́Я (symphysiotomia; *симфиз* + греч. tomē разрез, рассечение; син. лоносечение) — хирургическая операция: рассечение лобкового симфиза при узком тазе с целью увеличения его размеров при родах.

СИМФИЗИ́Т (symphysitis; *симфиз* + *-ит*) — воспаление лобкового симфиза.

СИМФИЗЭКТОМИ́Я (symphysectomia; *симфиз* + *эктомия*) — хирургическая операция: иссечение лобкового симфиза, напр. при его новообразовании или обширном туберкулезном поражении.

СИМХО́ВИЧА НОСОПОДБОРО́ДОЧНЫЙ РЕФЛЕ́КС — см. *Рефлекс носоподбородочный.*

СИН- (сим-; греч. syn-, sym-) — приставка, означающая «совместность действия», «одновременность», «взаимодействие».

СИНАЛЬБУМИ́Н (*син-* + *альбумин*) — альбумин сыворотки крови, являющийся по физиологическому действию антагонистом инсулина.

СИНА́НТРОПЫ (Sinanthropus; лат. Sina Китай + греч. anthrōpos человек) — ископаемые люди, относящиеся к архантропам, существовавшие около 400 тыс. лет назад.

SYNANCÉJA VERRUCÓSA (бородавчатка) — вид ядовитых рыб сем. бородавчатковых, отр. скорпенообразных, распространенный в прибрежных водах тропических морей; колючки спинного плавника S. v. снабжены железами, выделяющими опасный для человека яд.

СИ́НАПС (synapsis; греч. «соприкосновение», «соединение») — специализированная структура, обеспечивающая передачу нервного импульса с нервного волокна на какую-либо клетку или мышечное волокно, а также с рецепторной клетки на нервное волокно.

С. АДРЕНЕРГИ́ЧЕСКИЙ (s. adrenergica) — С., в к-ром медиатором является норадреналин.

С. АКСО-АКСОНА́ЛЬНЫЙ (s. axoaxonalis, LNH) — С. между двумя аксонами.

С. АКСОДЕНДРИТИ́ЧЕСКИЙ (s. axodendritica, LNH) — С. между аксоном одного нейрона и дендритом другого.

С. АКСОМЫ́ШЕЧНЫЙ (s. axomuscularis, LNH) — см. *Синапс нервно-мышечный.*

С. АКСОСОМАТИ́ЧЕСКИЙ (s. axosomatica, LNH) — С. между аксоном одного нейрона и телом другого.

С. АКСОЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЙ (s. axoepithelialis, LNH; син. С. нейросекреторный) — С. между секреторным нервным волокном и гландулоцитом.

С. ВОЗБУЖДА́ЮЩИЙ — С., в к-ром в результате деполяризации постсинаптической мембраны генерируется возбуждающий постсинаптический потенциал.

С. ДЕНДРО-ДЕНДРИТИ́ЧЕСКИЙ (s. dendrodendritica, LNH) — С. между дендритами двух или нескольких нейронов.

С. МЕЖНЕЙРО́ННЫЙ (s. interneuronalis, LNH) — общее название С. между какими-либо элементами двух нейронов.

С. НЕЙРОМУСКУЛЯ́РНЫЙ — см. *Синапс нервно-мышечный.*

С. НЕЙРОСЕКРЕТО́РНЫЙ (s. neurosecretoria) — см. *Синапс аксоэпителиальный.*

С. НЕ́РВНО-МЫ́ШЕЧНЫЙ (s. neuromuscularis; син.: аппарат нервно-мышечный, бляшка двигательная — устар., бляшка моторная — устар., нервно-мышечное соединение, С. аксомышечный, С. нейромускулярный) — С. между аксоном мотонейрона и поперечнополосатым мышечным волокном.

С. ТО́РМОЗНЫЙ — 1) С., в пресинаптических окончаниях к-рого выделяется медиатор, гиперполяризующий постсинаптическую мембрану и вызывающий возникновение тормозного постсинаптического потенциала;

2) аксо-аксональный С., обеспечивающий пресинаптическое торможение.

С. ХОЛИНЕРГИ́ЧЕСКИЙ (s. cholinergica) — С., в к-ром медиатором является ацетилхолин.

СИ́НАПС АКСОВАСКУЛЯ́РНЫЙ (synapsis axovascularis, LNH; син. синапс вазоневральный) — контакт нервного волокна, входящего в состав надзрительно-гипофизарного пути, со стенкой капилляра, обеспечивающий поступление нейрогормона в кровь.

СИ́НАПС ВАЗОНЕВРА́ЛЬНЫЙ — см. *Синапс аксоваскулярный.*

СИНАПТИ́ЧЕСКАЯ ЗАДЕ́РЖКА — временной интервал между приходом импульса в пресинаптическое окончание и началом постсинаптического ответа; обусловлена малой скоростью диффузии медиатора по сравнению со скоростью прохождения импульса по нервному волокну.

СИНАПТИ́ЧЕСКАЯ ПЕРЕДА́ЧА — процесс одностороннего проведения возбуждения через синапс.

СИНАПТИ́ЧЕСКАЯ ЩЕЛЬ (fissura synaptica, LNH) — пространство, разделяющее пресинаптическую и постсинаптическую мембраны синапса.

СИНАПТИ́ЧЕСКИЙ ПУЗЫРЁК — см. *Пресинаптический пузырек.*

СИНАРТРО́З (synarthrosis, BNA, JNA; греч. synarthrōsis неподвижное сочленение, от *син-* + arthrōsis соединение, сочленение) — непрерывное соединение костей с помощью плотной волокнистой соединительной ткани (синдесмоз), хрящевой ткани (синхондроз) или костной ткани (синостоз).

СИНГАМИДО́З (syngamidosis) — гельминтоз из группы нематодозов, вызываемый Syngamus laryngeus, паразитирующим в гортани, трахее и бронхах; характеризуется развитием ларингита, трахеобронхита.

СИНГЕНО́ТА (*син-* + греч. genos род, происхождение) — бактериальная клетка, частично диплоидная по какому-либо фрагменту хромосомы в результате трансдукции или конъюгации.

СИНДАКТИЛИ́Я (syndactylia; *син-* + греч. daktylos палец) — аномалия развития: полное или частичное сращение соседних пальцев кисти или стопы.

С. КО́ЖНАЯ (s. cutanea) — С. с наличием толстой перемычки, состоящей из кожи и подлежащих мягких тканей, чаще на всем протяжении пальцев.

С. КО́ЖНАЯ ПЕРЕПО́НЧАТАЯ (s. cutanea membranacea) — С., чаще неполная, с наличием тонкой кожной перепонки.

С. КОНЦЕВА́Я (s. terminalis) — С. только на уровне концевых фаланг.

С. КО́СТНАЯ (s. ossea) — С., при к-рой сращены и фаланги пальцев.

СИНДЕСМИ́Т ОССИФИЦИ́РУЮЩИЙ (syndesmitis ossificans; греч. syndesmos связка + *-ит*) — воспаление связки, сопровождающееся отложением в ней солей кальция или появлением очагов остеогенеза.

СИНДЕСМО́З (syndesmosis, PNA, BNA, JNA; греч. syndesmos связка) — соединение костей посредством плотной волокнистой соединительной ткани.

СИНДЕСМОЛО́ГИЯ (syndesmologia; греч. syndesmos связка + logos учение) — раздел анатомии, изучающий соединения костей.

СИНДРО́М (syndromum; греч. syndromē стечение признаков болезни, от syndromos вместе бегущий; син. симптомокомплекс) — совокупность симптомов, объединенных единым патогенезом; иногда этим термином обозначают самостоятельные нозологические единицы или стадии (формы) какой-либо болезни.

СИНДРО́М ВПУ — см. *Вольффа — Паркинсона — Уайта синдром.*

СИНДРО́М КЛК — см. *Клерка — Леви — Кристеско синдром.*

СИНДРО́М CRST — вариант системной склеродермии, характеризующийся сочетанием кальциноза (С), синдрома Рейно (R), склеродактилии (S) и телеангиэктазии (Т) при редком поражении внутренних органов; выделяется в нек-рых зарубежных классификациях.

СИНДРО́М «S» — см. *Кандинского — Клерамбо синдром.*

WPW-СИНДРО́М — см. *Вольффа — Паркинсона — Уайта синдром.*

СИНДРО́М АБДОМИНА́ЛЬНЫЙ (нрк; syndromum abdominale) — см. *Синдром псевдоабдоминальный.*

СИНДРО́М АБСТИНЕ́НТНЫЙ (syndromum abstinentiae) — см. *Абстиненция.*

СИНДРО́М АБСТИНЕ́НТНЫЙ АЛКОГО́ЛЬНЫЙ (syndromum abstinentiae alcoholicum) — см. *Синдром похмельный.*

СИНДРО́М АБУЛИ́ЧЕСКИ-АКИНЕТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum abulioakineticum) — сочетание слабости или отсутствия желаний, потребностей, инициативы и интереса к окружающему с молчаливостью, малоподвижностью, вплоть до полной обездвиженности; встречается при органических поражениях центральной нервной системы.

СИНДРО́М АГАСТРА́ЛЬНЫЙ (syndromum agastricum) — см. *Синдром постгастрорезекционный.*

СИНДРО́М АГАСФЕ́РА (по имени библейского персонажа Агасфера, осужденного на вечное скитание) — систематическое посещение больным лечебных учреждений с упорным вымоганием рецептов на наркотические вещества путем сообщения ложных сведений о себе или своих болезнях, а иногда путем нанесения себе каких-либо повреждений; проявление наркомании.

СИНДРО́М АДАПТАЦИО́ННЫЙ (syndromum adaptationis; син.: Селье адаптационный синдром, синдром адаптационный общий) — совокупность взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг друга изменений в организме, возникающих в ответ на действие любого чрезвычайного или патологического раздражителя и направленных на повышение неспецифической резистентности организма; основную роль в развитии С. а. играет гипофизарно-надпочечниковая система.

СИНДРО́М АДАПТАЦИО́ННЫЙ МЕ́СТНЫЙ (syndromum adaptationis locale) — комплекс местных реакций организма, возникающих в ответ на действие чрезвычайного или патологического раздражителя; типичным С. а. м. является воспаление.

СИНДРО́М АДАПТАЦИО́ННЫЙ О́БЩИЙ (syndromum adaptationis generale) — см. *Синдром адаптационный.*

СИНДРО́М АДРЕНОГЕНИТА́ЛЬНЫЙ (syndromum adrenogenitale; лат. adrenalis надпочечниковый + genitalis половой, детородный; син.: Апера — Галле синдром, дисфункция коры надпочечников вирилизирующая, Крука — Апера — Галле синдром) — патологическое состояние, обусловленное дисфункцией коры надпочечников с чрезмерной секрецией андрогенов, проявляющееся чаще всего признаками вирилизации.

СИНДРО́М АДРЕНОГЕНИТА́ЛЬНЫЙ С ПОТЕ́РЕЙ СОЛЕ́Й (син.: Дебре — Фибигера синдром, интоксикация интерреналовая андрогенная, недостаточность коры надпочечников парадоксальная, псевдоаддисонов синдром, псевдопилоростеноз, синдром сольтеряющий) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением биосинтеза кортикостероидных гормонов; характеризуется дегидратацией, сердечно-сосудистой недостаточностью, метаболическим ацидозом, гиперкалиемией, потерей натрия с мочой; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

СИНДРО́М АКИНЕ́ТИКО-РИГИ́ДНЫЙ (syndromum akineticorigidum; син.: синдром амиостатический, синдром гипокинетически-гипертонический, синдром паллидарный, синдром паллидонигральный) — сочетание экстрапирамидной ригидности, бради- и олигокинезии, нарушения походки (выпадение содружественных движений, латеро-, ретро- и пропульсия) с общей скованностью и ритмичным дрожанием малой амплитуды; наблюдается при поражении медиальной части бледного шара и черного вещества, напр. в хронической стадии эпидемического энцефалита, при болезни Паркинсона, атеросклерозе сосудов головного мозга.

СИНДРО́М АКРОДИНИ́ЧЕСКИЙ — см. *Акродиния.*

СИНДРО́М «АЛИ́СЫ В СТРАНЕ́ ЧУДЕ́С» — сочетание явлений деперсонализации с иллюзорным восприятием окружающего пространства и времени, нарушением схемы тела и психосенсорными расстройствами; наблюдается, напр., при эпилепсии, интоксикациях, опухолях головного мозга.

СИНДРО́М АЛЬВЕОЛЯ́РНО-КАПИЛЛЯ́РНОГО БЛО́КА — сочетание резкой одышки, диффузного цианоза и признаков острой эмфиземы легких, наблюдающееся при альвеолярно-капиллярном блоке.

СИНДРО́М АЛЬТЕРНИ́РУЮЩИЙ (syndromum alternans) — сочетание одних симптомов на стороне очага поражения ц. н. с. с другими симптомами на противоположной стороне.

С. АЛЬТЕРНИ́РУЮЩИЙ БУЛЬБА́РНЫЙ (s. alternans bulbare; анат. устар. bulbus medullae продолговатый мозг) — общее название стволовых С. а., возникающих при поражении продолговатого мозга.

С. АЛЬТЕРНИ́РУЮЩИЙ ПОНТИ́ННЫЙ (s. alternans pontis; анат. pons мост мозга) — общее название стволовых С. а., возникающих при поражении моста мозга (варолиева моста).

С. АЛЬТЕРНИ́РУЮЩИЙ ПЕДУНКУЛЯ́РНЫЙ (s. alternans pedunculare; анат. pedunculus cerebri ножка мозга) — общее название стволовых С. а., возникающих при поражении ножки мозга.

С. АЛЬТЕРНИ́РУЮЩИЙ СТВОЛОВО́Й (s. alternans truncale) — общее название С. а., возникающих при поражении ствола головного мозга, ха-

рактеризующихся нарушением функции черепных нервов на стороне очага поражения и проводниковыми (чувствительными, двигательными) расстройствами на противоположной стороне.

С. АЛЬТЕРНИ́РУЮЩИЙ ЭКСТРАЦЕРЕБРА́ЛЬНЫЙ (s. alternans extracerebrale)— общее название С. а., возникающих при нарушении кровообращения в артериях, снабжающих головной мозг и другие органы (напр., сетчатку, внутреннее ухо) и характеризующихся сочетанием признаков поражения этих органов с гемиплегией или гемипарезом на противоположной стороне тела.

СИНДРО́М АМАВРО́ТИКО-ГЕМИПЛЕГИ́ЧЕСКИЙ (syndromum amauroticohemiplegicum) — см. *Синдром оптико-гемиплегический.*

СИНДРО́М АМЕНТИ́ВНЫЙ — см. *Аменция.*

СИНДРО́М АМИОСТАТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum amyostaticum) — см. *Синдром акинетико-ригидный.*

СИНДРО́М АМНЕСТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum amnesticum) — см. *Корсаковский синдром.*

СИНДРО́М АМНЕ́СТИКО-ОРГАНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum amnesticum organicum)— сочетание грубого нарушения памяти, преимущественно на текущие события, с дезориентировкой во времени и окружающей обстановке, а также с конфабуляциями; разновидность органического психосиндрома.

СИНДРО́М АНОРЕКТА́ЛЬНЫЙ (syndromum anorectale) — 1) задержка дефекации, обусловленная стойким спазмом мышц заднего прохода; наблюдается при проктитах; 2) сочетание ощущений боли, жжения и зуда в прямой кишке с признаками воспаления кожи вокруг заднего прохода; наблюдается, напр., как результат побочного действия лекарственных средств.

СИНДРО́М АНОЭТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum anoëticum; греч. отрицательная приставка *a-* + noētikos способный к мышлению) — сочетание резкого ослабления или прекращения всех видов интеллектуальной деятельности с отсутствием нарушений сознания, сохранностью внимания и нек-рых аффективных реакций; обусловлен блокадой активирующего влияния ретикулярной формации ствола мозга на кору полушарий большого мозга.

СИНДРО́М АПАЛЛИ́ЧЕСКИЙ (syndromum apallicum; греч. отрицательная приставка *a-* + анат. pallium плащ головного мозга) — полная аспонтанность с отсутствием реакции на вопросы и фиксации взора на окружающих предметах при сохранении реакций на болевые раздражения и глотательного рефлекса; следствие глубокого нарушения функций коры больших полушарий.

СИНДРО́М АПА́ТИКО-АБУЛИ́ЧЕСКИЙ (syndromum apathicoabulicum) — см. *Синдром апатический.*

СИНДРО́М АПАТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum apathicum; син. синдром апатико-абулический) — сочетание аспонтанности с безразличием к окружающему; наблюдается, напр., при кахексии.

СИНДРО́М АПОПЛЕКТИФО́РМНЫЙ (syndromum apoplectiforme; греч. apoplēktikos пораженный ударом + лат. -formis подобный) — сочетание внезапно развивающихся общемозговых и очаговых неврологических симптомов, напоминающее геморрагический инсульт, но обусловленное какой-либо другой причиной (напр., обширным инфарктом головного мозга).

СИНДРО́М АПРАКТОАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Экзнна апрактоагностический синдром.*

СИНДРО́М АРЛЕКИ́НА (по имени персонажа итальянской «комедии масок», носившего костюм из пестрых лоскутков) — резкая разница в окраске обеих половин тела новорожденного в положении на боку; наблюдается при родовой травме с поражением диэнцефальной области.

СИНДРО́М АРТЕ́РИИ АДАМКЕ́ВИЧА — см. *Синдром артерии поясничного утолщения спинного мозга.*

СИНДРО́М АРТЕ́РИИ ПОЯСНИ́ЧНОГО УТОЛЩЕ́НИЯ СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum arteriae intumescentiae lumbalis medullae spinalis; син. синдром артерии Адамкевича) — сочетание периферической параплегии нижних конечностей с парестезией, расстройствами поверхностной чувствительности книзу от VI — XII грудных сегментов и нарушениями функций тазовых органов; обусловлен нарушением кровообращения в спинномозговых артериях, идущих к пояснично-крестцовому утолщению; наблюдается, напр., при остеохондрозе позвоночника, экстрамедуллярных опухолях, тромбозе брюшной аорты.

СИНДРО́М АРТЕ́РИИ СОСУ́ДИСТОГО СПЛЕТЕ́НИЯ (syndromum arteriae plexus vasculosi; син. синдром передней ворсинчатой артерии) — сочетание гемиплегии с гемианестезией и вазомоторными нарушениями в области парализованных конечностей, иногда с гемианопсией; обусловлен поражением двух задних третей задней ножки внутренней капсулы, иногда ее зачечевицеобразной части, частично хвостатого ядра и медиальной части бледного шара при нарушении кровообращения в передней ворсинчатой артерии.

СИНДРО́М АСТЕНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum asthenicum) — см. *Астения.*

СИНДРО́М АСТЕНОАДИНАМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum asthenoadynamicum) — сочетание молчаливости и бездеятельности, обусловленное выраженной психической и физической истощаемостью; наблюдается при симптоматических и интоксикационных психозах, а также при органических поражениях центральной нервной системы.

СИНДРО́М АСТЕНОВЕГЕТАТИ́ВНЫЙ (syndromum asthenovegetativum; син. синдром вегетоастенический) — сочетание астении с вегетативными расстройствами, преимущественно вагонотического характера; наблюдается при различных нервных и психических болезнях.

СИНДРО́М АСТЕНОДЕПРЕССИ́ВНЫЙ (syndromum asthenodepressivum) — сочетание астении со стойким снижением настроения; наблюдается при многих болезнях (нервных, психических, эндокринных и др.).

СИНДРО́М АСТЕНОДИСТИ́МИЧЕСКИЙ (syndromum asthenodysthymicum) — см. *Депревсия астеническая.*

СИНДРО́М АСТЕНОИПОХОНДРИ́ЧЕСКИЙ (syndromum asthenohypochondriacum) — сочетание астении с чрезмерным вниманием к своему здоровью, отдельными сенестопатиями.

СИНДРО́М АСТМО́ИДНЫЙ (syndromum asthmoideum) — симптомокомплекс, напоминающий приступ бронхиальной астмы, но патогенетически не связанный с аллергией; наблюдается, напр., при хроническом бронхите, грыже пищеводного отверстия диафрагмы.

СИНДРО́М АСФИКТИ́ЧЕСКИХ МЕМБРА́Н — см. *Болезнь гиалиновомембранная новорожденных.*

СИНДРО́М АСФИКТИ́ЧЕСКОГО УЩЕМЛЕ́НИЯ — сочетание асфиксии и гемодинамических нарушений у новорожденных и грудных детей, обусловленное повышением внутригрудного давления в результате перемещения кишечника в плевральную полость при врожденной ложной диафрагмальной грыже.

СИНДРО́М АУРИКУЛОТЕМПОРА́ЛЬНЫЙ (syndromum auriculotemporale; анат. nervus auriculotemporalis ушно-височный нерв; син.: гипергидроз околоушно-височный, синдром ушно-височного нерва, Фрей синдром, Фрей — Байярже синдром) — сочетание гиперемии кожи и усиленного потоотделения в околоушно-височной области во время еды или при представлении о приеме пищи, а также при физической работе; наблюдается при поражении ушно-височного нерва.

СИНДРО́М АФФЕКТИ́ВНО-БРЕДО́ВОЙ (syndromum affectivum deliricum) — сочетание аффективного синдрома с параноидным или парафренным бредом; наблюдается при многих психических болезнях.

СИНДРО́М АФФЕКТИ́ВНЫЙ (syndromum affectivum; син. синдром эмоциональный) — общее название синдромов, главным проявлением к-рых является расстройство настроения; наблюдаются при многих психических болезнях.

СИНДРО́М БАЗА́ЛЬНО-ЛО́БНЫЙ (syndromum basofrontale) — см. *Кеннеди синдром.*

СИНДРО́М БАЗИЛЯ́РНОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae basilaris; син. синдром основной артерии) — общее название различных сочетаний нарушения сознания, центральных параличей (парезов) конечностей, проводниковых расстройств чувствительности, симптомов псевдобульбарного паралича и поражения черепных нервов, обусловленных расстройством кровообращения в базилярной артерии или отдельных ее ветвях.

СИНДРО́М БАРАБА́ННОГО СПЛЕТЕ́НИЯ (syndromum plexus tympanici) — см. *Рейхерта синдром.*

СИНДРО́М БЕ́ДРЕННОГО НЕ́РВА (syndromum nervi femoralis) — сочетание ограничения сгибания бедра и разгибания голени с атрофией мышц передней поверхности бедра, отсутствием коленного рефлекса, снижением поверхностной чувствительности на средней и нижней трети передней поверхности бедра и внутренней поверхности голени; наблюдается при поражении бедренного нерва.

СИНДРО́М БЕ́ДРЕННО-ПОЛОВО́ГО НЕ́РВА (syndromum nervi genitofemoralis) — нарушение чувствительности на передней и внутренней поверхности верхней трети бедра, а у мужчин — и отсутствие кремастерного рефлекса; наблюдается при поражении бедренно-полового нерва.

СИНДРО́М БЕЗЫМЯ́ННОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae anonymae) — сочетание признаков расстройства кровообращения в правой руке и правом полушарии головного мозга; наблюдается при стенозе или окклюзии плечеголовного ствола (безымянной артерии).

СИНДРО́М БЕ́ЛЫХ ПА́ЛЬЦЕВ — см. *Болезнь вибрационная.*

СИНДРО́М БЛИЗНЕЦО́В ТРАНСФУЗИО́ННЫЙ (syndromum transfusionale geminorum) — сочетание анемии у одного из однояйцовых близнецов с плеторой у другого, обусловленное несоответствием артериального притока венозному оттоку по соответствующим анастомозам пупочных сосудов.

СИНДРО́М БЛО́КА (син.: Нонне компрессионный синдром, синдром ликворной блокады, Фруэна синдром, Фруэна — Нонне синдром) — сочетание повышенного содержания белка в цереброспинальной жидкости с незначительным цитозом или его отсутствием и ксантохромией, обусловленное нарушением проходимости субарахноидального пространства спинного мозга; наблюдается, напр., при экстрамедуллярных опухолях, пахименингите.

СИНДРО́М БЛО́КОВОГО НЕ́РВА (syndromum nervi trochlearis) — сочетание нарушения движений глазного яблока кнаружи и вниз, сходящегося косоглазия и диплопии при взгляде вниз; наблюдается при поражении блокового нерва или его ядра.

СИНДРО́М БЛУЖДА́ЮЩЕГО НЕ́РВА (syndromum nervi vagi) — сочетание дисфагии и дисфонии с парезом мышц мягкого неба и голосовой мышцы, отсутствием рефлекса с мягкого неба и глоточного рефлекса на стороне поражения; иногда сопровождается изменением частоты сердечных сокращений и дыхания; наблюдается при одностороннем поражении блуждающего нерва или его ядер.

СИНДРО́М БОКО́ВОГО РО́ГА СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum cornus lateralis medullae spinalis) — сочетание односторонних расстройств потоотделения с пиломоторными, вазомоторными и трофическими нарушениями в тех же зонах сегментарной иннервации; наблюдается на стороне поражения при патологических процессах в боковом роге спинного мозга.

СИНДРО́М БОКО́ВОГО СТОЛБА́ СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum columnae lateralis medullae spinalis) — сочетание одностороннего центрального паралича с проводниковыми расстройствами поверхностной чувствительности на противоположной стороне; наблюдается при опухолях и травмах спинного мозга с поражением его бокового столба.

СИНДРО́М БОЛЬШЕБЕРЦО́ВОГО НЕ́РВА (syndromum nervi tibialis) — сочетание периферического пареза (паралича) сгибателей стопы и пальцев с атрофией икроножных мышц, отсутствием ахиллова рефлекса, вазомоторными, трофическими и чувствительными расстройствами на задней поверхности голени и подошвенной поверхности стопы и пальцев; наблюдается при поражении большеберцового нерва.

СИНДРО́М БОЛЬШО́ГО ЗАТЫ́ЛОЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi occipitalis majoris) — сочетание гиперестезии и нарушения поверхностной чувствительности в затылочной области с болезненностью в точке, расположенной на середине расстояния между сосцевидным отростком и верхними шейными позвонками; наблюдается при поражении большого затылочного нерва.

СИНДРО́М БОЛЬШО́ГО УШНО́ГО НЕ́РВА (syndromum nervi auricularis magni) — сочетание расстройств чувствительности в области угла нижней челюсти и ушной раковины; наблюдается при поражении большого ушного нерва.

СИНДРО́М БОЛЬШО́Й в психиатрии — общее название сочетаний различных психических расстройств (бредовых, депрессивных, маниакальных, паранойяльных и др.), развивающихся в результате генерализации и утяжеления психоза.

СИНДРО́М БОРОДА́ТЫХ ЖЕ́НЩИН — см. *Ашара — Тьера синдром.*

СИНДРО́М БРАДИКАРДИ́ЧЕСКИ-ГИПОТОНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum bradycardiacohypotonicum) — см. *Синдром вазовагальный.*

СИНДРО́М БРА́ДИ-, ТАХИКАРДИ́И — см. *Синдром слабости синусного узла.*

СИНДРО́М БУЛЬБА́РНЫЙ (syndromum bulbare) — см. *Паралич бульбарный.*

СИНДРО́М ВАЗОВАГА́ЛЬНЫЙ (syndromum vasovagale; лат. vas сосуд + анат. nervus vagus блуждающий нерв; син.: Льюиса синдром, синдром брадикардически-гипотонический) — сочетание брадикардии, бледности кожных покровов, артериальной гипотензии и снижения ударного объема сердца, обусловленное рефлекторным повышением тонуса блуждающего нерва и наблюдающееся как первая кратковременная фаза реакции организма на массивную острую кровопотерю.

СИНДРО́М ВАН-ГО́ГА (по имени больного — голландского художника 19 в. Ван-Гога) — нанесение психически больным самому себе калечащего повреждения (отрезание части тела, обширные разрезы) или предъявление врачу настойчивых требований произвести ему хирургическое вмешательство, обусловленное наличием ипохондрического бреда, галлюцинаций, импульсивных влечений.

СИНДРО́М ВАРО́ЛИЕВА МОСТА́ (syndromum pontis Varolii; син. синдром моста мозга) — сочетание альтернирующего синдрома Мийяра — Гюблера, Бриссо — Сикара, Фовилля или Раймона — Сестана с признаками псевдобульбарного паралича, нистагмом, иногда — расширением зрачков; наблюдается при патологических процессах, напр., нарушениях мозгового кровообращения, в области моста мозга (варолиева моста).

СИНДРО́М ВЕГЕТОАСТЕНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum vegetoasthenicum) — см. *Синдром астеновегетативный.*

СИНДРО́М ВЕНТРИКУЛЯ́РНОЙ ГЕМОРРАГИИ (syndromum haemorrhagiae ventricularis) — сочетание апоплектической комы с глазодвигательными расстройствами (плавающие движения глазных яблок, расходящееся косоглазие), горметонией, менингеальным синдромом, брадикардией, нарушениями дыхания; наблюдается при кровоизлиянии в желудочки мозга или в мозг с прорывом крови в желудочки мозга.

СИНДРО́М ВЕ́РХНЕГО ШЕ́ЙНОГО ОТДЕ́ЛА СПИННО́ГО МО́ЗГА — сочетание центральной тетраплегии с утратой всех видов чувствительности (по проводниковому типу) книзу от уровня поражения и нарушением функций тазовых органов; наблюдается при поражении спинного мозга выше шейного утолщения — на уровне I—IV шейных сегментов.

СИНДРО́М ВЕ́РХНЕГО ШЕ́ЙНОГО СИМПАТИ́ЧЕСКОГО УЗЛА́ — сочетание гиперемии, нарушения потоотделения в области лица и шеи и синдрома Бернара — Горнера на стороне поражения верхнего шейного ганглия.

СИНДРО́М ВЕ́РХНЕЙ ГЛАЗНИ́ЧНОЙ ЩЕ́ЛИ (syndromum fissurae orbitalis superioris; син. синдром сфеноидальной щели) — сочетание полной офтальмоплегии с анестезией роговицы, верхнего века и гомолатеральной половины лба, обусловленное поражением глазодвигательного, блокового, отводящего и глазного нервов; наблюдается при опухолях, арахноидитах, менингитах в области верхней глазничной щели.

СИНДРО́М ВЕ́РХНЕЙ МОЗЖЕЧКО́ВОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae cerebelli superioris; син. Милла синдром) — сочетание хореического гиперкинеза или атетоза в конечностях и симптомов поражения мозжечка на стороне патологического очага с нарушением болевой и температурной чувствительности на противоположной стороне; наблюдается при закупорке верхней мозжечковой артерии.

СИНДРО́М ВЕ́РХНЕЙ ПО́ЛОЙ ВЕ́НЫ (syndromum venae cavae superioris) — сочетание расширения вен грудной клетки, цианоза и отека лица с повышением внутричерепного давления, обусловленное сдавлением или тромбозом верхней полой вены.

СИНДРО́М ВЕ́РХНЕЙ ПО́ЧЕЧНОЙ ЧА́ШЕЧКИ (syndromum calycis renalis superioris) — общее название патологических состояний (чаще — проявлений хронического пиелонефрита), обусловленных аномалиями развития, приведшими к нарушению проходимости верхней почечной чашки, напр. при ее кисте, стриктуре.

СИНДРО́М ВЕ́РХНЕЙ ЧА́СТИ ПЛЕЧЕВО́ГО СПЛЕТЕ́НИЯ — см. *Дюшенна — Эрба паралич.*

СИНДРО́М ВЕРХНЕМЕДИАСТИНА́ЛЬНЫЙ (syndromum mediastinale superius) — сочетание болей в груди и одышки с отеком лица, шеи и плечевого пояса, иногда с другими проявлениями синдрома верхней полой вены, а также с признаками сдавления трахеи, пищевода и (или) нервных стволов, расположенных в верхних отделах средостения; наблюдается при загрудинном зобе, опухолях средостения и аневризме аорты.

СИНДРО́М ВЕРХУ́ШКИ ЛЁГКОГО (syndromum apicis pulmonis) — см. *Панкоста синдром.*

СИНДРО́М ВЕРШИ́НЫ ОРБИ́ТЫ (syndromum apicis orbitae) — сочетание синдрома верхней глазничной щели с признаками поражения зрительного нерва (атрофией диска зрительного нерва, снижением остроты зрения и сужением границ поля зрения); наблюда-

ется при локализации воспалительного процесса или опухоли в задней части глазницы.

СИНДРО́М ВЕСТИБУЛЯ́РНЫЙ (syndromum vestibulare) — сочетание головокружения, нистагма, тошноты, рвоты, сердечно-сосудистых и других расстройств при поражении вестибулярного анализатора.

СИНДРО́М ВЕСТИБУЛЯ́РНЫЙ ШЕ́ЙНЫЙ (syndromum vestibulare cervicale) — вестибулярный синдром, сопровождающийся нарушением слуха, появляющийся или усиливающийся при поворотах головы; наблюдается при остеохондрозе шейного отдела позвоночника со сдавлением позвоночной артерии.

СИНДРО́М ВИБРАЦИО́ННЫЙ — см. *Болезнь вибрационная.*

СИНДРО́М ВИРИЛИЗИ́РУЮЩИЙ — см. *Вирилизм.*

СИНДРО́М ВИРИ́ЛЬНЫЙ (syndromum virile) — см. *Вирилизм.*

СИНДРО́М ВИСО́ЧНОЙ ДО́ЛИ (syndromum lobi temporalis) — сочетание обонятельных, вкусовых и слуховых галлюцинаций со снижением слуха, преимущественно на противоположной очагу поражения стороне, квадрантной гемианопсией, приступами deja vu или jamais vu, нарушениями речи (при поражении доминантного полушария), расстройствами памяти, иногда припадками психомоторной эпилепсии; наблюдается при поражении височной доли большого мозга.

СИНДРО́М ВИСО́ЧНО-ТЕМЕННО́Й (syndromum temporoparietale) — см. *Пика — Вернике височно-теменной синдром.*

СИНДРО́М ВЛИЯ́НИЯ — см. *Кандинского — Клерамбо синдром.*

СИНДРО́М ВНЕЧЕРЕПНО́Й ЗАКУ́ПОРКИ ВНУ́ТРЕННЕЙ СО́ННОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum obturationis extracranialis arteriae carotidis internae) — сочетание оптико-гемиплегического синдрома с ослаблением пульсации сонной артерии и понижением давления в центральной артерии сетчатки; наблюдается на стороне внечерепной закупорки внутренней сонной артерии.

СИНДРО́М ВНЕ́ШНЕГО ВОЗДЕ́ЙСТВИЯ — см. *Кандинского — Клерамбо синдром.*

СИНДРО́М ВНУ́ТРЕННЕГО ЛО́БНОГО ГИПЕРОСТО́ЗА (syndromum hyperostosis frontalis internae) — см. *Морганьи синдром.*

СИНДРО́М ВНУ́ТРЕННЕГО СЛУХОВО́ГО ПРОХО́ДА (syndromum meatus acustici interni) — сочетание одностороннего периферического паралича мимических мышц со снижением слуха, иногда шумом в ухе и возбудимости вестибулярного анализатора, обусловленное одновременным поражением лицевого и преддверно-улиткового нервов; наблюдается при опухолях и травмах в области пирамиды височной кости.

СИНДРО́М ВНУ́ТРЕННЕЙ КА́ПСУЛЫ (syndromum capsulae internae) — сочетание центральной гемиплегии с центральным парезом мышц, иннервируемых лицевым и подъязычным нервами, понижением чувствительности на противоположной стороне, а иногда с гемианопсией, при к-рой выпадает поле зрения на стороне паралича конечностей; наблюдается гл. обр. при поражениях сосудов головного мозга.

СИНДРО́М ВНУТРИГРУДНО́ГО НАПРЯЖЕ́НИЯ (syndromum tensionis intrathoracalis) — сочетание нарушений дыхания и кровообращения, обусловленных сдавлением легкого и смещением средостения в противоположную сторону; наблюдается при скоплении газа и (или) жидкости в плевральной полости, при опухоли или кисте легкого, а также при нек-рых аномалиях развития (напр., при врожденной локализованной эмфиземе легких, диафрагмальных грыжах).

СИНДРО́М ВНУТРИЧЕРЕПНО́Й ЗАКУ́ПОРКИ ВНУ́ТРЕННЕЙ СО́ННОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum obturationis intracranialis arteriae carotidis internae) — сочетание гемиплегии и гемианестезии с гемианопсией, иногда с нарушением сознания, а в случае поражения доминантного полушария — с тотальной афазией; наблюдается на стороне, противоположной внутричерепной закупорке внутренней сонной артерии.

СИНДРО́М ВОЗВРА́ТНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi laryngei recurrentis; син. синдром нижнего гортанного нерва) — 1) нарушение фонации, обусловленное односторонним поражением возвратного гортанного нерва; 2) сочетание нарушений фонации и дыхания при двустороннем поражении возвратного гортанного нерва.

СИНДРО́М ВТОРЖЕ́НИЯ — см. *Кандинского — Клерамбо синдром.*

СИНДРО́М ГАЛЛЮЦИНАТО́РНО-ПАРАНО́ИДНЫЙ (syndromum hallucinatorium paranoideum) — сочетание бреда преследования со слуховыми галлюцинациями или псевдогаллюцинациями; наблюдается при шизофрении и нек-рых шизофреноподобных психозах.

СИНДРО́М ГАЛЛЮЦИНАТО́РНЫЙ (syndromum hallucinatorium) — см. *Галлюциноз.*

СИНДРО́М ГА́ССЕРОВА УЗЛА́ (syndromum ganglii Gasseri; син. синдром тройничного узла) — сочетание болей, расстройств чувствительности и герпетических высыпаний на лице в области иннервации тройничного нерва, преимущественно глазной ветви; наблюдается при поражении ганглия тройничного нерва.

СИНДРО́М ГАСТРОГЕПАТОЭНТЕРА́ЛЬНЫЙ (syndromum gastrohepatoenterale) — нарушение функции печени, обусловленное развитием гастроэнтерита.

СИНДРО́М ГАСТРОИНТЕСТИНА́ЛЬНЫЙ (syndromum gastrointestinale) — см. *Василенко гастроинтестинальный синдром.*

СИНДРО́М ГАСТРОКАРДИА́ЛЬНЫЙ (syndromum gastrocardiale; син.: Ремхельда синдром, синдром желудочно-сердечный) — сочетание сердцебиения, болей в области сердца, изменений сердечного ритма с повышением или понижением артериального давления, возникающее при переполнении желудка или метеоризме.

СИНДРО́М ГЕБЕФРЕНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hebephrenicum) — сочетание двигательного и речевого возбуждения с эйфорией, дурашливостью, пуэрильным поведением; наблюдается при шизофрении.

СИНДРО́М ГЕБО́ИДНЫЙ (syndromum heboideum; син.: маттоид, синдром психопатоподобный) — сочетание аффективно-волевых нарушений с относительной сохранностью интеллектуальных функций, проявляющееся грубостью, негативизмом, ослаблением самоконтроля, извращенным характером эмоциональных реакций и влечений, что приводит к антиобщественному поведению и выраженной социальной дезадаптации; встречается в подростковом и юношеском возрасте при шизофрении и, реже, при нек-рых формах психопатии.

СИНДРО́М ГЕМОЛИ́ТИКО-УРЕМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum haemolyticouraemicum) — см. *Гассера болезнь.*

СИНДРО́М ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (syndromum haemorrhagicum) — патологическая кровоточивость, характеризующаяся внутренними и наружными кровотечениями, возникновением кровоизлияний; наблюдается, напр., при тромбоцитопатиях, нарушениях свертывающей системы крови, изменениях сосудистой проницаемости.

СИНДРО́М ГЕНИТОАНОРЕКТА́ЛЬНЫЙ (syndromum genitoanorectale) — сочетанное поражение женских половых органов, прямой кишки и заднего прохода, напр. при злокачественных новообразованиях.

СИНДРО́М ГЕПАТОКАРДИА́ЛЬНЫЙ (syndromum hepatocardiale) — общее название нарушений сердечной деятельности (гипотония, тахикардия и др.), обусловленных болезнями печени или желчевыводящих путей.

СИНДРО́М ГЕПАТОЛИЕНА́ЛЬНЫЙ (syndromum hepatolienale; син. синдром печеночно-селезеночный) — сочетанное увеличение печени и селезенки; наблюдается при циррозах печени, инфекционных болезнях, лейкозах и др.

СИНДРО́М ГЕПАТОЛИЕНОМЕДУЛЛЯ́РНЫЙ (syndromum hepatolienomedullare) — см. *Широкогорова синдром.*

СИНДРО́М ГЕПАТОРЕНА́ЛЬНЫЙ (syndromum hepatorenale; син.: гепатонефрит, гепатонефроз, синдром печеночно-почечный, синдром почечно-печеночный) — сочетание желтухи, нарушения свертываемости крови, признаков гипопротеинемии и уремии, обусловленное развитием острой печеночной и почечной недостаточности; наблюдается при нек-рых острых отравлениях (напр., четыреххлористым углеродом), инфекционных болезнях (напр., при лептоспирозе) и повреждениях печени.

СИНДРО́М ГЕПАТОЦЕРЕБРА́ЛЬНЫЙ (syndromum hepatocerebrale; син. Коновалова гепатоцеребральный синдром) — сочетание нервно-психических нарушений (неврозоподобных расстройств, депрессии, экстрапирамидных нарушений) с признаками поражения печени; наблюдается при хронических прогрессирующих болезнях печени.

СИНДРО́М ГИАЛИ́НОВЫХ МЕМБРА́Н (syndromum membranarum hyaloidearum) — см. *Болезнь гиалиново-мембранная новорожденных.*

СИНДРО́М ГИАЛИНОПОДО́БНЫХ МЕМБРА́Н (syndromum membranarum hyaloidearum) — см. *Болезнь гиалиново-мембранная новорожденных.*

СИНДРО́М ГИДРАЛАЗИ́НОВЫЙ — см. *Болезнь гидралазиновая.*

СИНДРО́М ГИДРОПЕКСИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hydropexicum; греч. hydōr вода + pēxis прикрепление, закрепление; син.: Пархона синдром, синдром гипергидропексический) — синдром неясной этиологии, характеризующийся

повышенной активностью антидиуретического гормона и проявляющийся признаками задержки жидкости в организме (транзиторным изменением веса, отеками, периодической олигурией).

СИНДРО́М ГИДРОЦЕФА́ЛЬНЫЙ (syndromum hydrocephalicum) — сочетание головных болей, головокружений и застойного соска с истончением костей черепа, уплощением его основания и повышением давления цереброспинальной жидкости; наблюдается при гидроцефалии.

СИНДРО́М ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИО́ННЫЙ — 1) усиленная легочная вентиляция в покое; наблюдается при поражениях сердца и ц. н. с., нек-рых инфекционных болезнях; 2) сочетание симптомов гипокапнии и метаболического алкалоза, наблюдаемое при гипервентиляции.

СИНДРО́М ГИПЕРГИДРОПЕКСИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hyperhydropexicum) — см. *Синдром гидропексический.*

СИНДРО́М ГИПЕРГЛИКЕМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hyperglycaemicum) — сочетание сухости кожи и слизистых оболочек с полиурией и жаждой, развивающееся при увеличении концентрации глюкозы в крови выше 180 *мг*/100 *мл*; наблюдается, напр., при сахарном диабете, циррозе печени, поражении гипофиза.

СИНДРО́М ГИПЕРГОНАДОТРО́ПНЫЙ (syndromum hypergonadotropicum; греч. hyper- сверх + лат. gonas, gonadis половая железа + греч. tropos направление) — сочетание признаков преждевременного полового созревания с признаками нарушения физического и, часто, психического развития, обусловленное избыточной секрецией гонадотропных гормонов.

СИНДРО́М ГИПЕРКИНЕ́ТИКО-ГИПОТОНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hyperkineticohypotonicum; син.: синдром гипотонически-гиперкинетический, синдром полосатого тела, синдром стриарный) — сочетание гиперкинеза, чаще хореического или атетоидного, с мышечной гипотонией; наблюдается при поражении полосатого тела.

СИНДРО́М ГИПЕРКИНЕТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hyperkineticum) — психопатологическое расстройство в виде двигательного возбуждения с преобладанием непроизвольных и экспрессивных (мимика, жестикуляция) движений.

СИНДРО́М ГИПЕРОФТАЛЬМОПАТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hyperophthalmopathicum) — см. *Экзофтальм злокачественный.*

СИНДРО́М ГИПЕРСОМНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypersomnicum) — сочетание приступов гиперсомнии и катаплексии с нарушением ночного сна; наблюдается при поражении гипоталамуса.

СИНДРО́М ГИПЕРСПЛЕНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypersplenicum; греч. hyper сверх + анат. splen селезенка; син. гиперспленизм) — сочетание увеличения селезенки с увеличением количества клеточных элементов в костном мозге и уменьшением форменных элементов в периферической крови; наблюдается, напр., при малярии, саркоидозе.

СИНДРО́М ГИПЕРТЕНЗИ́ВНЫЙ (syndromum hypertensivum) — сочетание головных болей, часто приступообразных, рвоты, нарушений сознания, застойного соска, нередко с нарушением зрения, и рентгенологических изменений черепа (усиление пальцевых вдавлений, расхождение черепных швов и др.), обусловленное повышенным внутричерепным давлением.

СИНДРО́М ГИПЕРТЕРМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hyperthermicum) — патологическое состояние, характеризующееся внезапным значительным повышением температуры тела (до 40° и более) вследствие нарушения функции центра терморегуляции в гипоталамусе, напр. при черепно-мозговой травме, кровоизлиянии в мозг.

СИНДРО́М ГИПОГЛИКЕМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypoglycaemicum) — сочетание чувства голода, мышечной слабости, двигательного и психического возбуждения, тахикардии, дрожания конечностей, обусловленное уменьшением концентрации глюкозы в крови (ниже 70 *мг*/100 *мл*).

СИНДРО́М ГИПОГОНАДОТРО́ПНЫЙ (syndromum hypogonadotropicum; греч. hypo- ниже + лат. gonas, gonadis половая железа + греч. tropos направление) — см. *Гипогонадизм вторичный.*

СИНДРО́М ГИПОКИНЕТИ́ЧЕСКИ-ГИПЕРТОНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypokineticohypertonicum) — см. *Синдром акинетикоригидный.*

СИНДРО́М ГИПОПАТИИ (*гипо-* + греч. pathos страдание, болезнь) — симптомокомплекс эмоциональных расстройств в виде утраты способности адекватного восприятия окружающего, сомнений в реальности происходящих и воспринимаемых событий, наблюдается при энцефалитах.

СИНДРО́М ГИПОТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypothalamicum; син. синдром диэнцефальный) — общее название различных сочетаний вегетативных, эндокринных, обменных и трофических расстройств, обусловленных поражением гипоталамуса.

СИНДРО́М ГИПОТЕНЗИ́ВНЫЙ (syndromum hypotensivum) — сочетание головных болей сжимающего характера, тошноты и рвоты с раздражительностью, быстрой утомляемостью и сонливостью, обусловленное стойким понижением внутричерепного давления.

СИНДРО́М ГИПОТОНИ́ЧЕСКИ-ГИПЕРКИНЕТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypotonicohyperkineticum) — см. *Синдром гиперкинетико-гипотонический.*

СИНДРО́М ГИПОТОНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypotonicum) — см. *Гипотензия симптоматическая.*

СИНДРО́М ГИПОХЛОРЕМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypochloraemicum) — патологическое состояние, характеризующееся пониженным содержанием хлоридов в крови и проявляющееся постепенным развитием немотивированной усталости и вялости с присоединением жажды и олигурии, появлением частого малого пульса, артериальной гипотензии, поверхностного учащенного дыхания, адинамии, фибриллярных подергиваний мышц; в тяжелых случаях заканчивается комой; наблюдается, напр., при болезнях, сопровождающихся частой рвотой и поносами, гепаторенальным синдромом, при поражении коры надпочечников.

СИНДРО́М ГЛАЗОДВИ́ГАТЕЛЬНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi oculomotorii) — сочетание одностороннего птоза, отсутствия движений глазного яблока вверх, вниз и кнутри, расходящегося косоглазия, мидриаза, отсутствия прямой и содружественной реакции зрачка на свет; наблюдается при поражении глазодвигательного нерва.

СИНДРО́М ГЛАЗОЗУБОПАЛЬЦЕВО́Й (syndromum oculodentodigitale) — см. *Мейер-Швиккерата синдром.*

СИНДРО́М ГЛАУКОМОЦИКЛИ́ЧЕСКИХ КРИ́ЗОВ — см. *Познера — Шлоссмана синдром.*

СИНДРО́М ГОЛУБЫ́Х ПЕЛЁНОК — см. *Синдром синих пеленок.*

СИНДРО́М ГОРМЕТОНИ́ЧЕСКИЙ ДАВИДЕ́НКОВА — см. *Гормегония.*

СИНДРО́М ГРЕЗОПОДО́БНЫЙ — острое, изменчивое по содержанию психопатологическое состояние, включающее сценоподобный образный бред с иллюзорным восприятием окружающего, нарушением самосознания и лабильным настроением.

СИНДРО́М ГРУДНО́ГО ОТДЕ́ЛА СПИННО́ГО МО́ЗГА — сочетание нижней центральной параплегии и параанестезии с вегетативными нарушениями ниже уровня поражения и расстройствами функций тазовых органов (задержкой и периодическим недержанием мочи и кала); наблюдается при поражении спинного мозга на уровне II—XII грудных сегментов.

СИНДРО́М ДЕВЯ́ТОГО ДНЯ (истор.; син.: лихорадка девятого дня, лихорадка сальварсанная, Милиана синдром) — патологическое состояние, возникавшее иногда на девятый день после парентерального введения препаратов мышьяка и характеризовавшееся лихорадкой (до 39—40°), тошнотой, рвотой, гиперемией зева, болью в суставах, болезненностью и увеличением печени и селезенки.

СИНДРО́М ДЕЛИРИО́ЗНЫЙ (syndromum deliriosum) — см. *Делирий.*

СИНДРО́М ДЕНТОБРОНХИА́ЛЬНЫЙ (syndromum dentobronchiale; лат. dens, dentis зуб; син. дентобронхит) — хронический бронхит, развивающийся у детей, страдающих экссудативным диатезом и множественным кариесом молочных зубов; выздоровление наступает после лечения кариеса.

СИНДРО́М ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИО́ННО - ДЕРЕАЛИЗАЦИО́ННЫЙ — сочетание расстройства самосознания (отчуждение, раздвоение «Я») с ощущением изменения всего окружающего (бесцветность, призрачность, нереальность); наблюдается при эндогенных депрессиях.

СИНДРО́М «ДЕПИГМЕНТА́ЦИЯ — ОТЁК» — см. *Квашиоркор.*

СИНДРО́М ДЕПРЕССИ́ВНО-ПАРАНО́ИДНЫЙ (syndromum depressivoparanoideum) — сочетание тревожной депрессии с ажитацией или ступором, бредом обвинения, иллюзорным галлюцинозом и вербальными галлюцинациями соответствующего бреду содержания, двойной ориентировкой, образным бредом; наблюдается при шизофрении, маниакально-депрессивном психозе, инволюционной депрессии.

СИНДРО́М ДЕПРЕССИ́ВНЫЙ (syndromum depressivum) — см. *Депрессия.*

СИНДРО́М ДЕРМА́ЛЬНО-МЕЗОДЕРМА́ЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИ́И — см. *Раушкольба — Туми синдром.*

СИНДРО́М ДЕФИЦИ́ТА АНТИТЕ́Л — см. *Агаммаглобулинемия.*

СИНДРО́М ДИАГОНИСТИ́ЧЕСКОЙ ДИСПРАКСИ́И (греч. diagōnios иду-

щий от угла к углу, диагональный; dys- приставка, означающая «расстройство», «нарушение» + praxis действие) — несогласованность действий правой и левой руки, обусловленная поражением мозолистого тела.

СИНДРО́М ДИАФРАГМА́ЛЬНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi phrenici) — парез (паралич) диафрагмы, проявляющийся ослаблением кашлевого толчка, а также высоким стоянием и неподвижностью диафрагмы, что выявляется при рентгенологическом исследовании, парадоксальным типом дыхательных движений брюшной стенки (западение подложечной области при вдохе и ее выпячивание при выдохе); наблюдается при поражении диафрагмального нерва, передних рогов и передних корешков III—IV шейных сегментов спинного мозга.

СИНДРО́М ДИСГАРМОНИ́ЧЕСКИЙ БАРРЕ́ — см. *Барре дисгармонический синдром.*

СИНДРО́М ДИСКОГЕ́ННЫЙ (syndromum discogenum) — общее название неврологических синдромов поражения корешков или вещества спинного мозга при остеохондрозе, обусловленных выпадением межпозвоночного диска.

СИНДРО́М ДИСЛОКАЦИО́ННЫЙ — общее название различных сочетаний неврологических симптомов, характерных для смещения мозговых структур, напр. при отеке мозга, его сдавлении опухолью или гематомой.

СИНДРО́М ДИСФУ́НКЦИИ СИ́НУСНОГО УЗЛА́ — см. *Синдром слабости синусного узла.*

СИНДРО́М ДИЭНЦЕФА́ЛЬНО-КАРДИА́ЛЬНЫЙ (syndromum diencephalocardiale) — гипоталамический синдром с преобладанием нарушений сердечной деятельности, напр. аритмий, лабильности артериального давления, кардиалгии.

СИНДРО́М ДИЭНЦЕФА́ЛЬНЫЙ (syndromum diencephalicum) — см. *Синдром гипоталамический.*

СИНДРО́М ДЛИ́ТЕЛЬНОГО РАЗДА́ВЛИВАНИЯ — см. *Токсикоз травматический.*

СИНДРО́М ДОБА́ВОЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi accessorii) — сочетание невозможности поднять руку выше горизонтального уровня с затруднением поворота головы в противоположную сторону, обусловленное парезом (параличом) грудино-ключично-сосцевидной мышцы, а также средней и нижней частей трапециевидной мышцы; наблюдается при поражении ядра, корешков или ствола добавочного нерва.

СИНДРО́М ДРЯ́БЛОЙ КО́ЖИ — см. *Эллиса — Ван-Кревельда синдром.*

СИНДРО́М ДУГИ́ АО́РТЫ (syndromum arcus aortae) — см. *Такаясу синдром.*

СИНДРО́М ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ПЛЕВРА́ЛЬНЫЙ (syndromum glandulopleurale)—осложнение туберкулезного бронхаденита экссудативным плевритом.

СИНДРО́М ЖЕЛТУ́ШНО-АСЦИТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum icteroascitic-um) — сочетание асцита и желтухи при циррозе печени, обусловленное дистрофией печеночных клеток с их «набуханием» и сдавливанием ими желчных протоков и кровеносных сосудов системы воротной вены.

СИНДРО́М ЖЕЛУ́ДОЧНО-СЕРДЕ́ЧНЫЙ (syndromum gastrocardiacum) — см. *Синдром гастрокардиальный.*

СИНДРО́М ЖЖЕ́НИЯ НОГ (син.: Гопалана синдром, мелалгия алиментарная) — сочетание приступов мучительных жгучих болей в стопах (обычно ночью) с акроцианозом; наблюдается, напр., при сахарном диабете, хроническом алкоголизме, болезнях печени; предположительно обусловлен недостаточностью пантотеновой кислоты.

СИНДРО́М ЗА́ДНЕГО КАНА́ТИКА СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum funiculi posterioris medullae spinalis) — сочетание проводниковых расстройств глубокой и, в меньшей степени, тактильной чувствительности с обусловленной ими локомоторной и статической атаксией; наблюдается ниже уровня поражения задних канатиков спинного мозга при tabes dorsalis, funiculare myelosis или экстрамедуллярных опухолях спинного мозга, расположенных у его задней поверхности.

СИНДРО́М ЗА́ДНЕГО КО́ЖНОГО НЕ́РВА БЕДРА́ (syndromum nervi cutanei posterioris femoris) — сочетание нарушений поверхностной чувствительности в нижней части ягодичной области и по задней поверхности бедра; наблюдается при поражении заднего кожного нерва бедра.

СИНДРО́М ЗА́ДНЕГО ПРОДО́ЛЬНОГО ПУЧКА́ (syndromum fasciculi longitudinalis posterioris) — см. *Синдром медиального продольного пучка.*

СИНДРО́М ЗА́ДНЕГО РО́ГА СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum cornus posterioris medullae spinalis) — сочетание сегментарных расстройств болевой и температурной чувствительности на уровне поражения заднего рога при сирингомиелии, гематомиелии, интрамедуллярной опухоли.

СИНДРО́М ЗА́ДНЕЙ МОЗГОВО́Й АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae cerebri posterioris) — сочетание гомонимной полной или квадрантной гемианопсии с сохранностью центрального зрения, иногда с расстройствами памяти типа корсаковского синдрома; наблюдается при окклюзии корковых ветвей задней мозговой артерии.

СИНДРО́М ЗА́ДНЕЙ СПИННОМОЗГОВО́Й АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae spinalis posterioris) — сочетание сегментарных нарушений поверхностной чувствительности на уровне очага ишемии спинного мозга (чаще его шейного отдела) с проводниковыми расстройствами глубокой чувствительности ниже уровня поражения; обусловлен окклюзией задней спинномозговой артерии или ее сдавлением, напр., при дискозе, врожденном синостозе, спайках оболочек спинного мозга.

СИНДРО́М ЗА́ДНЕЙ ЦЕНТРА́ЛЬНОЙ ИЗВИ́ЛИНЫ (syndromum gyri posterioris centralis) — парестезии и (или) расстройства глубокой, реже болевой чувствительности на стороне тела, противоположной поражению постцентральной извилины большого мозга.

СИНДРО́М ЗА́ДНЕЙ ЧЕРЕПНО́Й ЯМКИ (syndromum fossae cranii posterioris) — сочетание признаков внутричерепной гипертензии и поражения VI—XII черепных нервов с мозжечковыми нарушениями и, часто, признаками сдавления ствола мозга; наблюдается при опухолях и воспалительных процессах в области задней черепной ямки.

СИНДРО́М ЗА́ДНЕСТОЛБОВО́Й СОСУ́ДИСТЫЙ (syndromum columnae posterioris vasculare) — внезапное развитие стойких нарушений глубокой чувствительности, обусловленное нарушением кровоснабжения задних канатиков спинного мозга в его шейном отделе.

СИНДРО́М ЗА́ДНИЙ ШЕ́ЙНЫЙ СИМПАТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Барре — Льеу синдром.*

СИНДРО́М ЗА́ДНИХ КОРЕШКО́В СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum radicum dorsalium medullae spinalis) — сочетание нарушений всех видов чувствительности сегментарного характера с болями в зоне иннервации пораженных задних корешков спинного мозга.

СИНДРО́М ЗАПИРА́ТЕЛЬНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi obturatorii) — сочетание пареза приводящих мышц бедра с нарушением чувствительности по его внутренней поверхности, обусловленное поражением запирательного нерва, напр. при опухолях в области таза, осложненных родах.

СИНДРО́М ЗАПРУ́ДЫ — см. *Симптом запруды.*

СИНДРО́М ЗАПЯ́СТНЫЙ (syndromum carpale; син. синдром канала запястья) — сочетание парестезий и болей в кисти, иногда — нарушений поверхностной чувствительности с двигательными расстройствами, обусловленное сдавлением срединного нерва в суженном канале запястья между удерживателем сгибателей и сухожилиями сгибателей пальцев; наблюдается при нек-рых эндокринных болезнях или нарушениях обмена веществ.

СИНДРО́М ЗАТЫ́ЛОЧНОГО ОТВЕ́РСТИЯ (syndromum foraminis occipitalis) — см. *Ларюэлля синдром.*

СИНДРО́М ЗАТЫ́ЛОЧНОЙ ДО́ЛИ (syndromum lobi occipitalis) — сочетание гомонимной или квадрантной гемианопсии с нарушением цветовых ощущений в противоположных полях зрения, иногда с фотопсиями, зрительными галлюцинациями, зрительной агнозией; наблюдается при очаговом поражении затылочной доли большого мозга.

СИНДРО́М ЗВЕ́ЗДЧАТОГО УЗЛА́ (syndromum ganglii stellati; син. синдром шейно-грудного узла) — сочетание болей в области шеи, в грудной клетке до уровня V—VI ребер и в руке (за исключением внутренней поверхности плеча) со снижением болевой чувствительности, нарушением потоотделения и пилоаррекции в этих областях, а также с синдромом Бернара — Горнера и тахика́рдией; наблюдается при поражении звездчатого узла.

СИНДРО́М ЗЕРКА́ЛЬНОГО ДВИЖЕ́НИЯ РУК — см. *Джонстона синдром.*

СИНДРО́М ЗРИ́ТЕЛЬНОГО БУГРА́ (syndromum thalami; син.: Дежерина — Русси синдром, синдром таламический) — сочетание резких постоянных или приступообразно усиливающихся болей, гиперпатии и гемигипестезии со снижением поверхностной и выпадением глубокой чувствительности, сенситивной гемиатаксией, типичным положением руки (таламическая рука) и нарушением мимики при смехе и плаче при сохранности произвольных движений мимических мышц; наблюдается при поражении таламуса.

СИНДРО́М ЗРИ́ТЕЛЬНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi optici) — сочетание снижения остроты зрения и патологического изменения полей зрения с ослаблением зрачковой реакции на свет,

обусловленное поражением зрительного нерва.

СИНДРО́М ЗРИТЕ́ЛЬНОГО ТРА́КТА (syndromum tractus optici) — сочетание гомонимной гемианопсии с симптомом Вернике, обусловленное поражением зрительного тракта.

СИНДРО́М ИЛЕОЦЕКА́ЛЬНЫЙ (syndromum ileocaecale) — копрологический синдром: выделение пенистых испражнений с кислым запахом, большим количеством переваренной и непереваренной клетчатки, зернышками крахмала; наблюдается, напр., при болезни Крона.

СИНДРО́М ИПОХОНДРИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypochondriacum; син. ипохондрия) — убежденность в наличии тяжелого заболевания, проявляющаяся навязчивыми сверхценными идеями или бредом.

С. ИПОХОНДРИ́ЧЕСКИЙ ГАЛЛЮЦИНАТО́РНО - ПАРАНО́ИДНЫЙ (s. hypochondriacum hallucinatorioparanoideum; син. ипохондрия персекуторная) — С. и. с бредом преследования и воздействия, сенестопатиями, висцеральными, тактильными и другими галлюцинациями; наблюдается при эндогенных и органических психозах.

С. ИПОХОНДРИ́ЧЕСКИЙ ПАРАНОИ́ЯЛЬНЫЙ (s. hypochondriacum paranoiale) — С. и. с систематизированным интерпретативным ипохондрическим бредом, бредовой активностью, направленной на самолечение и медицинское обследование; наблюдается гл. обр. при шизофрении.

С. ИПОХОНДРИ́ЧЕСКИЙ ПАРАФРЕ́ННЫЙ (s. hypochondriacum paraphrenicum)— С. и. с бредом фантастического содержания (напр., разрушение внутренних органов, необычные физиологические отправления); наблюдается при шизофрении, инволюционной депрессии, органических психозах.

С. ИПОХОНДРИ́ЧЕСКИЙ ПЕРИОДИ́ЧЕСКИЙ (s. hypochondriacum periodicum) — С. и., возникающий приступообразно, обычно при периодических депрессиях.

С. ИПОХОНДРИ́ЧЕСКИЙ РЕАКТИ́ВНЫЙ (s. hypochondriacum reactivum) — С. и., возникающий в качестве реакции на какую-либо действительную болезнь (собственную или окружающих лиц) или в результате ятрогении; наблюдается при пограничных состояниях и вяло протекающих психических заболеваниях.

СИНДРО́М ИПОХОНДРИ́ЧЕСКИ-СЕНЕСТОПАТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hypochondriacum senesthopathicum) — ипохондрический синдром, сопровождающийся различными неприятными или тягостными ощущениями.

СИНДРО́М ИСТЕРИ́ЧЕСКИЙ (syndromum hystericum) — общее название различных сочетаний двигательных, чувствительных, вегетативных и психических расстройств, возникающих при истерии.

СИНДРО́М ИСТОЩЕ́НИЯ РЕМИССИО́ННЫЙ — астения, развивающаяся в период ремиссии после лечения психоза психофармакологическими средствами.

СИНДРО́М КАНА́ЛА ЗАПЯ́СТЬЯ — см. *Синдром запястный.*

СИНДРО́М КАРДИОПУЛЬМОНА́ЛЬНЫЙ (syndromum cardiopulmonale) — см. *Сердечно-легочная недостаточность.*

СИНДРО́М КАРДИОЦЕРЕБРА́ЛЬНЫЙ (syndromum cardiocerebrale) — общее название нарушений функций головного мозга, наблюдаемых при болезнях сердца и обусловленных ухудшением кровоснабжения мозга, эмболией в сосуды мозга или рефлекторными влияниями на них со стороны сердца.

СИНДРО́М КАРОТИ́ДНОГО СИ́НУСА (syndromum sinus carotici) — сочетание брадикардии с артериальной гипотензией и наклонностью к обморокам, обусловленное раздражением барорецепторов сонных гломусов; наблюдается, напр., при атеросклеротическом поражении общей или внутренней сонной артерии.

СИНДРО́М КАРЦИНО́ИДНЫЙ (syndromum carcinoideum; син. синдром энтеродерматокардиопатический) — сочетание хронического энтерита, фиброзного вальвулита клапана сердца, телеангиэктазий и пигментации кожи, периодически сопровождающееся вазомоторными расстройствами и иногда астмоподобными приступами; обусловлен избыточным поступлением в кровь серотонина, вырабатываемого карциноидом.

СИНДРО́М КАСПА́РА ХА́УЗЕРА (по имени больного, жившего в Германии в 18 в.) — состояние искаженного и задержанного психического развития у лиц, выросших в полной изоляции от людей.

СИНДРО́М КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum catatonicum; син. кататония) — психическое расстройство с преобладанием двигательных нарушений в форме возбуждения, ступора или их последовательного чередования; наблюдается чаще при шизофрении.

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ВТОРИ́ЧНЫЙ (s. catatonicum secundarium; син.: кататония последовательная, С. кататонический привитой) — люцидный С. к., сменяющий в течении болезни предшествующие синдромы (напр., параноидные или галлюцинаторно-параноидные); наблюдается при непрерывно-прогредиентном течении шизофрении.

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ИНВОЛЮЦИО́ННЫЙ — см. *Синдром кататонический поздний.*

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ЛЮЦИ́ДНЫЙ (s. catatonicum lucidum; лат. lucidus ясный) — С. к. при ясном сознании с сохранностью восприятия окружающего и воспоминаний о происшедших в это время событиях; может сопровождаться бредом и галлюцинациями.

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ОНЕЙРО́ИДНЫЙ (s. catatonicum oneiroideum) — С. к., сочетающийся с онейроидным помрачением сознания.

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ПАРАКИНЕТИ́ЧЕСКИЙ (s. catatonicum parakineticum) — С. к. с преобладанием манерного поведения (неестественность, вычурность движений).

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ПЕРИОДИ́ЧЕСКИЙ (s. catatonicum periodicum) — С. к., чаще онейроидный, возникающий периодически при приступообразной форме течения шизофрении.

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ПЕРНИЦИО́ЗНЫЙ (s. catatonicum perniciosum) — см. *Синдром кататонический фебрильный.*

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ПО́ЗДНИЙ (s. catatonicum tardum; син. С. кататонический инволюционный) — С. к. с возникновением кататонического ступора впервые в возрасте старше 45—50 лет.

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ПРИВИТО́Й — см. *Синдром кататонический вторичный.*

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ПРОСКИНЕТИ́ЧЕСКИЙ (s. catatonicum proskineticum; греч. prosō вперед + kinēsis движение) — С. к. с повышенной готовностью к двигательной стереотипии, эхопраксии, эхолалии или, наоборот, к негативизму.

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ СМЕРТЕ́ЛЬНЫЙ (s. catatonicum letale) — см. *Синдром кататонический фебрильный.*

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ ФЕБРИ́ЛЬНЫЙ (s. catatonicum febrile; син.: С. кататонический перниционозный, С. кататонический смертельный) — С. к., протекающий с неистовым возбуждением, временами прерывающийся ступором с интенсивно выраженными вегетативными расстройствами (повышение температуры тела, сердечно-сосудистые нарушения и др.).

СИНДРО́М КАУЗАЛГИ́ЧЕСКИЙ — см. *Каузалгия.*

СИНДРО́М КА́ШЛЕВО-МОЗГО́ВОЙ — см. *Беттолепсия.*

СИНДРО́М КА́ШЛЕВО-О́БМОРОЧНЫЙ — см. *Беттолепсия.*

СИНДРО́М КИТА́ЙСКОГО РЕСТОРА́НА — патологическое состояние, возникающее при приеме с пищей больших доз глутамата натрия, применяемого в качестве приправы, и проявляющееся чувством жжения в области желудка, болями в груди, гиперемией лица, легким головокружением и учащением пульса, тошнотой.

СИНДРО́М КЛИМАКТЕРИ́ЧЕСКИЙ (syndromum climactericum) — патологическое состояние, возникающее у части женщин в климактерическом периоде и характеризующееся нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и обменно-трофическими расстройствами.

СИНДРО́М КО́ЖНО-СЛИ́ЗИСТО-КИШЕ́ЧНЫЙ (syndromum cutaneomucosointestinale) — см. *Дегоса синдром.*

СИНДРО́М КОЛЕ́НЧАТОГО ГА́НГЛИЯ (syndromum ganglii geniculati) — см. *Ханта синдром.*

СИНДРО́М КОЛИДИСТА́ЛЬНЫЙ (syndromum colidistale; греч. kolon толстая кишка + *дистальный*) — сочетание частых позывов на дефекацию с выделением жидкого кала, смешанного с кровью, слизью и гноем; наблюдается, напр., при неспецифическом язвенном колите.

СИНДРО́М КОММОЦИО́ННО-КОНТУЗИО́ННЫЙ (устар.; syndromum commotiocontusionale; лат. commotio сотрясение + contusio ушиб, контузия) — нарушение функций головного мозга в результате черепно-мозговой травмы; проявляется сочетанием общемозговых неврологических симптомов, обусловленных сотрясением мозга, с очаговыми неврологическими симптомами, связанными с развитием контузионных очагов.

СИНДРО́М КОМПРЕССИО́ННЫЙ НО́ННЕ — см. *Синдром блока.*

СИНДРО́М КО́НСКОГО ХВОСТА́ (syndromum caudae equinae) — сочета-

ние асимметричных периферических параличей стоп, отсутствия ахилловых рефлексов, гипестезии и болей в области ног и промежности с нарушением функций тазовых органов, обусловленное поражением корешков спинного мозга, входящих в состав конского хвоста.

СИНДРО́М КО́НУСА (syndromum coni) — сочетание симметричных диссоциированных расстройств чувствительности в промежности с отсутствием анального рефлекса, нарушением функций тазовых органов (недержанием мочи и кала) и образованием пролежней, обусловленное поражением III, IV и V крестцовых сегментов спинного мозга.

СИНДРО́М КОПРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ (syndromum coprologicum) — совокупность изменений кала, характерных для определенной болезни, для поражения определенного органа (отдела) пищеварительного тракта или для нарушения определенной его функции.

СИНДРО́М КОРЕШКО́ВЫЙ (syndromum radiculare) — сочетание болей и нарушений чувствительности с периферическими парезами, снижением или отсутствием сухожильных рефлексов, непроизвольными подергиваниями отдельных мышечных пучков и мышечными атрофиями, определяющееся в пределах одного или нескольких соседних сегментов и обусловленное поражением соответствующих корешков спинного мозга.

СИНДРО́М КОРОНА́РНО-ЦЕРЕБРА́ЛЬНЫЙ (syndromum coronariocerebrale) — кардиоцеребральный синдром, обусловленный недостаточностью коронарного кровообращения.

СИНДРО́М КОРО́ТКОЙ ШЕ́И — см. *Клиппеля — Фейля болезнь.*

СИНДРО́М КО́РТИКО-ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (syndromum corticoviscerale) — общее название синдромов, обусловленных нарушением корково-подкорковых взаимоотношений и нейрогуморальной регуляции функций внутренних органов, к-рое поддерживается по принципу порочного круга.

СИНДРО́М КОША́ЧЬЕГО КРИ́КА — см. *Болезнь кошачьего крика.*

СИНДРО́М КРАНИОСПИНА́ЛЬНЫЙ (syndromum craniospinale) — сочетание симптомов одностороннего поражения верхних шейных корешков спинного мозга, языкоглоточного и подъязычного нервов с гемипарезом на противоположной стороне или перекрестным гемипарезом; наблюдается при поражении верхнего отдела спинного мозга и отделов головного мозга, расположенных в задней черепной ямке, обычно при опухолях, локализующихся в области большого затылочного отверстия.

СИНДРО́М КРА́СНОГО ЯДРА́ ВЕ́РХНИЙ (syndromum nuclei rubri superius) — сочетание интенционного тремора, атаксии и хореоатетоза на одной стороне тела, обусловленное поражением верхних отделов красного ядра на противоположной стороне при нарушении кровообращения в ветвях задней мозговой артерии.

СИНДРО́М КРА́СНОГО ЯДРА́ НИ́ЖНИЙ (syndromum nuclei rubri inferius) — сочетание глазодвигательного паралича на стороне поражения ц. н. с. с атаксией, интенционным тремором, иногда хореоатетозом конечностей на противоположной стороне, обусловленное поражением нижних отделов красного ядра, чаще при нарушении кровообращения в ветвях задней мозговой артерии.

СИНДРО́М КРЕСТЦО́ВОЙ Ёлочки — сочетание нарастающих болей в области крестца и промежности с нарушениями чувствительности в этой области и расстройством функций органов таза (при отсутствии двигательных и рефлекторных нарушений в нижних конечностях), обусловленное поражением корешков спинного мозга при опухоли крестца.

СИНДРО́М КРЫЛОВИ́ДНЫЙ — см. *Птеригиум-синдром.*

СИНДРО́М КРЫЛОНЁБНОГО УЗЛА́ (syndromum ganglii pterygopalatini) — см. *Сладера симптомокомплекс.*

СИНДРО́М ЛАСТЕНИ́ ДЕ ФЕРЖЬО́ЛЬ (по имени персонажа повести Барбе д'Оревильи «Повесть без заглавия») — упорная тенденция психически больного вызывать у себя кровотечения, напр., из носа или геморроидальных узлов, сопровождающаяся противодействием мерам остановки кровотечения.

СИНДРО́М ЛЁГОЧНО-ПО́ЧЕЧНЫЙ НАСЛЕ́ДСТВЕННЫЙ (syndromum pulmonorenale hereditarium; син. Гудпасчера синдром) — наследственная болезнь, характеризующаяся легочными кровотечениями (кровохарканьем) и диффузным поражением почек с гематурией и протеинурией.

СИНДРО́М ЛЕ́СТНИЧНОЙ МЫ́ШЦЫ (syndromum musculi scaleni) — см. *Синдром передней лестничной мышцы.*

СИНДРО́М ЛЕТАРГИ́ЧЕСКИЙ (syndromum lethargicum) — см. *Синдром периодической спячки.*

СИНДРО́М ЛИ́КВОРНОЙ БЛОКА́ДЫ — см. *Синдром блока.*

СИНДРО́М ЛИПО́ИДНО-НЕФРОТИ́ЧЕСКИЙ (устар.; syndromum lipoidonephroticum) — см. *Синдром нефротический.*

СИНДРО́М ЛО́БНОЙ ДО́ЛИ (syndromum lobi frontalis) — сочетание лобной атаксии с астазией-абазией, хватательными рефлексами, психическими нарушениями, обусловленное поражением лобной доли большого мозга.

СИНДРО́М ЛО́БНЫЙ (syndromum frontale) — сочетание резкого снижения интеллекта, в первую очередь памяти и критики, с адинамией, абулией и нарушениями эмоций от беспечности или мории до состояния злобной раздражительности; наблюдается при болезни Пика, опухолях и травмах с поражением лобной доли большого мозга.

СИНДРО́М ЛОКТЕВО́ГО НЕ́РВА (syndromum nervi ulnaris) — сочетание положения кисти в форме «птичьей лапы» с гипо- или анестезией ладонной поверхности V и локтевой половины IV пальца, трофическими и вазомоторными расстройствами, обусловленное поражением локтевого нерва.

СИНДРО́М ЛУЧЕВО́ГО НЕ́РВА (syndromum nervi radialis) — 1) сочетание невозможности разгибания кисти и пальцев и отведения большого пальца с расстройствами чувствительности по задней поверхности плеча, предплечья и, частично, тыльной поверхности кисти, обусловленное поражением лучевого нерва; 2) сочетание перечисленных изменений с нарушением разгибания (в меньшей степени сгибания) предплечья и отсутствием рефлекса трехглавой мышцы, обусловленное поражением лучевого нерва в верхней трети плеча или в подмышечной впадине.

СИНДРО́М ЛУЧЕВО́Й О́СТРЫЙ — см. *Болезнь лучевая острая.*

СИНДРО́М ЛЬЮИСОВА ТЕ́ЛА — см. *Гемибаллизм.*

СИНДРО́М МАЛОБЕРЦО́ВОГО НЕ́РВА (syndromum nervi peronei) — сочетание отвисания стопы, невозможности ее тыльного сгибания и отведения кнаружи с перонеальной походкой и атрофией мышц переднепаружной поверхности голени, тыла стопы и пальцев, обусловленное поражением малоберцового нерва.

СИНДРО́М МА́ЛОГО ЗАТЫ́ЛОЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi occipitalis minoris) — расстройство чувствительности на задней поверхности головы и ушной раковины, иногда сочетающееся с болями в затылочной области, наблюдаемое на стороне поражения малого затылочного нерва.

СИНДРО́М МА́ЛОЙ ГРУДНО́Й МЫ́ШЦЫ (syndromum musculi pectoralis minoris) — см. *Райта синдром.*

СИНДРО́М МА́ЛЫЙ (syndromum parvum) в психиатрии — психопатологическое расстройство, проявляющееся в виде только одного нарушения (астения, навязчивое состояние, депрессия, мания, бред и др.).

СИНДРО́М МА́ЛЫХ ПРИ́ЗНАКОВ — сочетание немотивированной слабости, снижения работоспособности, утомляемости, депрессии со снижением аппетита, похуданием, явлениями «желудочного дискомфорта», наблюдаемое при раке желудка; термин предложен А. И. Савицким.

СИНДРО́М МАЛЬАБСО́РБЦИИ (лат. malus плохой + *абсорбция*; син. мальабсорбция) — сочетание гиповитаминоза, анемии и гипопротеинемии, обусловленное нарушением всасывания в тонкой кишке.

СИНДРО́М МАНИАКА́ЛЬНО-ПАРАФРЕ́ННЫЙ (syndromum maniacoparaphrenicum) — сочетание маниакального синдрома с бредовыми идеями грандиозного, фантастического содержания (величия, эпохальных открытий и др.); наблюдается, напр., при черепно-мозговых травмах, прогрессивном параличе, нек-рых интоксикациях.

СИНДРО́М МАНИАКА́ЛЬНЫЙ (syndromum maniacale; син. мания) — сочетание приподнятого жизнерадостного настроения с хорошим самочувствием, отсутствием сознания болезни, повышенной психической активностью, склонностью к необдуманным поступкам, переоценкой своих возможностей, расторможенностью влечений, ускорением ассоциативного процесса до степени скачки идей и повышенной отвлекаемостью; наблюдается при маниакально-депрессивном психозе и нек-рых других психических болезнях.

СИНДРО́М МАССИ́ВНЫХ ГЕМОТРАНСФУ́ЗИЙ — осложнение, возникающее при переливании за короткий период времени (до 24 час.) донорской крови в количестве, превышающем 40—50% объема циркулирующей крови, проявляющееся нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы, печени, почек и состояния свертывающей системы крови, а также сдвигами кислотно-щелочного равновесия.

СИНДРО́М МЕДИА́ЛЬНОГО КО́ЖНОГО НЕ́РВА ПЛЕЧА́ (syndromum nervi cutanei medialis brachii) — нарушение чувствительности в области подмышечной впадины и медиальной поверхности плеча, наблюдаемое на стороне поражения медиального кожного нерва плеча.

СИНДРО́М МЕДИА́ЛЬНОГО КО́ЖНОГО НЕ́РВА ПРЕДПЛЕ́ЧЬЯ (syndromum nervi cutanei medialis antebrachii) — нарушение чувствительности кожи медиальной поверхности предплечья, наблюдаемое при поражении медиального кожного нерва предплечья.

СИНДРО́М МЕДИА́ЛЬНОГО ПРОДО́ЛЬНОГО ПУЧКА́ (syndromum fasciculi longitudinalis medialis; син. синдром заднего продольного пучка) — сочетание невозможности движения глаза кнутри с горизонтальным нистагмом при его отведении, обусловленное односторонним поражением медиального продольного пучка в стволе мозга.

СИНДРО́М МЕДИА́ЛЬНОЙ ПЕ́ТЛИ (syndromum lemnisci medialis) — 1) сочетание расстройств проприоцептивной и тактильной чувствительности с сенситивной гемиатаксией на стороне, противоположной поражению медиальной петли в продолговатом мозге выше уровня ее перекреста и в мосте мозга; 2) сочетание расстройств проприоцептивной, тактильной, болевой и температурной чувствительности с сенситивной гемиатаксией на стороне, противоположной поражению медиальной петли на уровне среднего мозга.

СИНДРО́М МЕДИАСТИНА́ЛЬНЫЙ (syndromum mediastinale) — сочетание боли в грудной клетке, периферического лимфостаза и стенотического дыхания, обусловленное сдавлением органов средостения, напр. опухолью, воспалительным инфильтратом, аневризмой аорты.

СИНДРО́М МЕЗЭНЦЕФА́ЛЬНЫЙ (syndromum mesencephalicum) — сочетание неврологических (паралич взора, мышечная ригидность, центральные парезы) и психопатологических (изменения сознания, нарушения эмоций, галлюцинации) расстройств, наблюдаемое при поражениях среднего мозга.

СИНДРО́М МЕ́НЕДЖЕРА (англ. manager управляющий) — форма неврастении с выраженными вегетативными нарушениями, развивающаяся при выполнении непосильной работы, связанной с большой ответственностью, конфликтами и эмоциональным напряжением; термин применяется зарубежными, гл. обр. американскими, психиатрами.

СИНДРО́М МЕНИНГЕА́ЛЬНЫЙ (syndromum meningeale)—сочетание упорных диффузных головных болей, обычно сопровождаемых тошнотой и рвотой, с общей кожной гиперестезией и повышенной чувствительностью к световым и звуковым раздражителям, характерной позой больного, ригидностью затылочных мышц, а также с различными менингеальными симптомами; обусловлено раздражением мозговых оболочек, напр. при менингите или кровоизлиянии в субарахноидальное пространство.

СИНДРО́М МИЕЛИТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum myeliticum) — сочетание сегментарных нарушений движений и чувствительности на уровне поражения спинного мозга с проводниковыми расстройствами ниже этого уровня.

СИНДРО́М МИОРЕНА́ЛЬНЫЙ (syndromum myorenale) — см. *Токсикоз травматический.*

СИНДРО́М МОЗЖЕЧКО́ВОГО НАМЁТА (syndromum tentorii cerebelli; син.: Бурденко — Крамера синдром, синдром тенториальный) — сочетание головной боли и боли в глазных яблоках, светобоязни, блефароспазма и слезотечения с менингеальными симптомами; наблюдается, напр., при опухолях червя мозжечка, вклинении и ущемлении ствола мозга и мозжечка между краем намета мозжечка и спинкой турецкого седла (тенториальное отверстие).

СИНДРО́М МОЗЖЕЧКО́ВЫЙ (syndromum cerebellare) — сочетание признаков нарушения координации и синергии движений (атаксия, мышечная гипотония, адиадохокинез, гиперметрия, симптом отсутствия обратного толчка, промахивание при указательной пробе), обусловленное поражением мозжечка.

СИНДРО́М МОЗО́ЛИСТОГО ТЕ́ЛА (syndromum corporis callosi) — 1) сочетание левосторонней апраксии с несогласованностью движений левой и правой руки, обусловленное поражением задних отделов мозолистого тела; 2) сочетание психических расстройств (нарушение ориентировки в пространстве, конфабуляции и др.), обусловленное поражением передних отделов мозолистого тела.

СИНДРО́М МОЗО́ЛИСТО-КРАЕВО́Й АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae callosomarginalis) — сочетание пареза ноги, преимущественно стопы, на стороне, противоположной очагу поражения, с левосторонней апраксией, обусловленное нарушением кровообращения в мозолисто-краевой артерии — ветви передней мозговой артерии.

СИНДРО́М МОЛО́ЧНО-ЩЕЛОЧНО́Й — см. *Бернетта синдром.*

СИНДРО́М МОСТА́ МО́ЗГА (syndromum pontis encephali) — см. *Синдром варолиева моста.*

СИНДРО́М МЫШЕЧНО-КО́ЖНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi musculocutanei) — сочетание ограничения сгибания предплечья в положении супинации и нарушения супинации предплечья со снижением или отсутствием рефлекса с двуглавой мышцы плеча и гипестезией кожи латеральной половины передней поверхности предплечья; обусловлено поражением мышечно-кожного нерва.

СИНДРО́М МЮНХГА́УЗЕНА (по имени персонажа ряда литературных произведений; син. лапаратомофилия) — психическое расстройство, выражающееся в непрерывном потоке неправдоподобных жалоб на состояние здоровья, на мучительные, разрывающие весь организм боли, часто с настойчивыми требованиями произвести для их устранения полостную операцию.

СИНДРО́М НАРКОЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum narcolepticum) — см. *Нарколепсия симптоматическая.*

СИНДРО́М НАРУ́ЖНОГО КО́ЖНОГО НЕ́РВА БЕДРА́ (syndromum nervi cutanei femoris lateralis) — сочетание нарушения чувствительности кожи наружной поверхности бедра с трофическими расстройствами и отсутствием пилоаррекции, а в нек-рых случаях с парестезиями и болями в той же области; наблюдается при поражении латерального кожного нерва бедра, напр. при meralgia paraesthetica.

СИНДРО́М НАРУ́ЖНОЙ СТЕ́НКИ ПЕЩЕ́РИСТОГО СИ́НУСА (syndromum parietis externi sinus cavernosi) — см. *Синдром пещеристого синуса.*

СИНДРО́М «НЕГНУ́ЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕ́КА» — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся прогрессирующим нарастанием ригидности мышц, гл. обр. туловища, и их болезненными спазмами, приводящими к ограничению подвижности, в первую очередь, позвоночника.

СИНДРО́М NAIL — PATÉLLA (англ. nail ноготь; лат. patella надколенник) — наследственная болезнь, характеризующаяся отсутствием или недоразвитием ногтей, надколенника и явлениями нефрита; наследуется по доминантному типу.

СИНДРО́М НЕЙРОКУТА́ННЫЙ (syndromum neurocutaneum; греч. neuron нерв + лат. cutis кожа) — см. *Стерджа — Вебера — Краббе синдром.*

СИНДРО́М НЕЙРОЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum neurolepticum; син. Делея — Деникера синдром) — общее название сочетаний вегетативных, неврологических и психических расстройств, возникающих в период лечения нейролептическими средствами.

СИНДРО́М НЕЙРОТОКСИ́ЧЕСКИЙ (syndromum neurotoxicum; син. нейротоксикоз) — патологическое состояние, возникающее у детей раннего возраста при нек-рых острых инфекционных болезнях и характеризующееся гипертермией, угнетением сознания, судорогами, менингеальными симптомами.

СИНДРО́М НЕФРОТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum nephroticum; син. синдром липоидно-нефротический — устар.) — сочетание отеков с массивной протеинурией, гипо- и диспротеинемией, гиперхолестеринемией; наблюдается при поражениях почек.

С. НЕФРОТИ́ЧЕСКИЙ ВРОЖДЁННЫЙ (s. nephroticum congenitum; син. нефроз врожденный) — 1) общее название С. н., обнаруживаемых у новорожденных; 2) наследственная болезнь почек, обусловленная их микрокистозом и проявляющаяся С. н. с первых дней или недель жизни; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

С. НЕФРОТИ́ЧЕСКИЙ ПЕРСИСТИ́РУЮЩИЙ (s. nephroticum persistens) — С. н., развивающийся при хроническом гломерулонефрите, сахарном диабете или амилоидозе почек, характеризующийся постепенным нарастанием почечной недостаточности.

С. НЕФРОТИ́ЧЕСКИЙ РЕЦИДИВИ́РУЮЩИЙ (s. nephroticum recidivum) — С. н., периоды проявления к-рого чередуются с ремиссиями.

С. НЕФРОТИ́ЧЕСКИЙ СЕМЕ́ЙНЫЙ (s. nephroticum familiare; син. нефроз семейный) — наследственный гломерулонефрит, наблюдающийся у нескольких членов одной семьи, проявляющийся С. н. в сочетании с признаками недостаточности функции почечных канальцев (полиурия, ацидоз) и ранним повышением артериального давления.

С. НЕФРОТИ́ЧЕСКИЙ ЭПИЗОДИ́ЧЕСКИЙ — С. н., развивающийся в начале нек-рых заболеваний и бы-

стро подвергающийся обратному развитию независимо от течения основного заболевания.

СИНДРО́М НИ́ЖНЕГО ГОРТА́ННОГО НЕ́РВА (syndromum nervi laryngei inferioris) — см. *Синдром возвратного нерва.*

СИНДРО́М НИ́ЖНЕГО ЯГОДИ́ЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi glutei inferioris) — сочетание нарушения разгибания бедра с затруднением вставания из положения сидя, выпрямления предварительно согнутого туловища и ходьбы по лестнице; наблюдается при поражении нижнего ягодичного нерва.

СИНДРО́М НИ́ЖНЕЙ ДОПОЛНИ́ТЕЛЬНОЙ КОРЕШКО́ВО-СПИННОМОЗГОВО́Й АРТЕ́РИИ — сочетание параличей мышц голени и ягодичных мышц с сегментарными расстройствами чувствительности в зоне V поясничного и крестцовых сегментов и нарушениями функций тазовых органов; наблюдается при закупорке или сдавлении ветви подвздошно-поясничной, поясничной или крестцовой артерии, кровоснабжающей крестцовый отдел спинного мозга.

СИНДРО́М НИ́ЖНЕЙ ПО́ЛОЙ ВЕ́НЫ (syndromum venae cavae inferioris) — сочетание симптомов застоя крови в печени и значительного асцита, не сопровождающееся общими отеками; наблюдается при сдавлении нижней полой вены.

СИНДРО́М НИ́ЖНЕЙ ЧА́СТИ ПЛЕЧЕВО́ГО СПЛЕТЕ́НИЯ — см. *Дежерин-Клюмпке паралич.*

СИНДРО́М НИЖНЕМЕДИАСТИНА́ЛЬНЫЙ (syndromum inferiomediastinale) — сочетание болей в груди, одышки и цианоза с синдромом нижней полой вены, признаками сдавления пищевода и других органов нижнего средостения; наблюдается при опухолях и инфильтратах, расположенных в средостении ниже места впадения верхней полой вены в правое предсердие.

СИНДРО́М НОСОВО́ГО НЕ́РВА (syndromum nervi nasalis) — см. *Чарлина синдром.*

СИНДРО́М НОСОРЕСНИ́ЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi nasociliaris) — см. *Чарлина синдром.*

СИНДРО́М ОБОНЯ́ТЕЛЬНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi olfactorii) — односторонняя гипо- или аносмия при сохранности тактильного и вкусового восприятия; наблюдается при поражении периферической части обонятельного анализатора.

СИНДРО́М ОВЛАДЕ́НИЯ — см. *Кандинского — Клерамбо синдром.*

СИНДРО́М ОГЛУШЕ́НИЯ СОЗНА́НИЯ — см. *Оглушение.*

СИНДРО́М ОККЛЮЗИО́ННЫЙ (syndromum occlusionis) — гипертензивный синдром, обусловленный окклюзией путей циркуляции цереброспинальной жидкости.

СИНДРО́М ОКУЛОГЛАНДУЛЯ́РНЫЙ (syndromum oculoglandulare) — см. *Романьи симптом.*

СИНДРО́М ОКУЛОЦЕРЕБРОРЕНА́ЛЬНЫЙ (syndromum oculocerebrorenale) — см. *Лоу синдром.*

СИНДРО́М ОНЕЙРО́ИДНЫЙ (syndromum oneiroideum; син.: онейроид, синдром сноподобной оглушенности, сновидное изменение сознания) — помрачение сознания с наплывом непроизвольно возникающих фантастических сновидно-бредовых представлений в виде законченных по содержанию картин, следующих в определенной последовательности и образующих единое целое; сопровождается частичной или полной отрешенностью от окружающего, расстройством самосознания, депрессивным или маниакальным аффектом, признаками кататонии, сохранением в сознании содержания переживаний при амнезии на окружающее; наблюдается при шизофрении, интоксикационных и органических психозах.

СИНДРО́М ОПЕРКУЛЯ́РНЫЙ (syndromum operculare; анат. operculum insulae cerebri покрышка островка большого мозга) — приступы жевательных или глотательных движений, облизывания губ, причмокивания, нередко предшествующие развитию общего судорожного припадка; наблюдается при поражении покрышечной части нижней лобной извилины большого мозга.

СИНДРО́М О́ПТИКО-ГЕМИПЛЕГИ́ЧЕСКИЙ (syndromum opticohemiplegicum; син.: синдром амавротико-гемиплегический, синдром оптико-пирамидный) — альтернирующий синдром: сочетание снижения зрения или слепоты на стороне поражения с центральным гемипарезом (гемиплегией) на противоположной стороне; наблюдается при тромбозе внутренней сонной артерии и обусловлен нарушением кровообращения в ее ветвях (в глазной и средней мозговой артериях).

СИНДРО́М О́ПТИКО-ПИРАМИ́ДНЫЙ (syndromum opticopyramidalis) — см. *Синдром оптико-гемиплегический.*

СИНДРО́М ОПУЩЕ́НИЯ МИНДА́ЛИН МОЗЖЕ́ЧКА́ (syndromum descensus tonsillarum cerebelli; син. синдром ущемления миндалин мозжечка) — сочетание резких головных болей в затылочной области и вынужденного положения головы с нарушением функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; возникает при опущении миндалин мозжечка и их ущемлении в большом затылочном отверстии со сдавлением продолговатого мозга, преимущественно при опухолях задней черепной ямки.

СИНДРО́М ОРГАНИ́ЧЕСКОЙ ПСИХОПАТИ́И (syndromum psychopathiae organicae) — см. *Психопатия органическая.*

СИНДРО́М ОРТОСТАТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum orthostaticum) — патологическое состояние, иногда возникающее после быстрого перехода из горизонтального положения в вертикальное или при длительном стоянии, характеризующееся головокружением и сердцебиением, реже обмороком.

СИНДРО́М ОСЕВО́Й (syndromum axiale) — синдром, закономерно и регулярно проявляющийся при какой-либо психической болезни или группе болезней, напр. помрачение сознания при острых экзогенных психозах.

СИНДРО́М ОСНОВНО́Й АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae basilaris) — см. *Синдром базилярной артерии.*

СИНДРО́М ОТВОДЯ́ЩЕГО НЕ́РВА (syndromum nervi abducentis) — сочетание отсутствия движения глаза кнаружи со сходящимся косоглазием и диплопией, обусловленное параличом наружной прямой мышцы глазного яблока; наблюдается при поражении отводящего нерва, напр. при базальных менингитах, арахноидитах, патологических процессах в области глазницы или пирамиды височной кости.

СИНДРО́М ОТВОДЯ́ЩЕЙ ПЕ́ТЛИ — позднее осложнение резекции желудка или гастроэнтеростомии, обусловленное нарушением проходимости отводящей кишечной петли и проявляющееся возникновением тошноты и рвоты после еды.

СИНДРО́М ОТЁЧНЫЙ НОВОРОЖДЁННЫХ (syndromum oedematicum neonatorum) — отек больших половых губ у новорожденной девочки или мошонки и полового члена у мальчика, иногда распространяющийся на лобковую область и нижние конечности; обусловлен функциональной недостаточностью почек и накоплением в организме новорожденного альдостерона, поступившего от матери в период родов.

СИНДРО́М ОТООКУЛОРЕНА́ЛЬНЫЙ (syndromum otooculorenale) — см. *Альпорта синдром.*

СИНДРО́М ОТРЫ́ВА ОТ ДО́МА — см. *Госпитализм.*

СИНДРО́М ОТЧУЖДЕ́НИЯ — см. *Кандинского — Клерамбо синдром.*

СИНДРО́М ОШПА́РЕННОЙ КО́ЖИ — см. *Некролиз эпидермальный токсический.*

СИНДРО́М ПАЛЛИДА́РНЫЙ (анат. globus pallidus бледный шар) — см. *Синдром акинетико-ригидный.*

СИНДРО́М ПАЛЛИДОНИГРА́ЛЬНЫЙ (анат. globus pallidus бледный шар + substantia nigra черное вещество) — см. *Синдром акинетико-ригидный.*

СИНДРО́М ПАНАСТЕНИ́И (syndromum panastheniae; греч. pan все + *астения*) — см. *Иценко синдром панастении.*

СИНДРО́М ПАНКРЕА́ТИКО-БИЛИА́РНЫЙ (syndromum pancreaticobiliare) — см. *Бара — Пика синдром.*

СИНДРО́М ПАРАМЕДИА́ННЫХ АРТЕ́РИЙ СТВОЛА́ МО́ЗГА (syndromum arteriarum paramedianarum trunci cerebri) — общее название различных сочетаний симптомов поражения отдельных структур ствола мозга, обусловленных закупоркой или сдавлением ветвей базилярной артерии.

СИНДРО́М ПАРАНЕОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum paraneoplasticum; греч. para около + *неоплазма*) — общее название синдромов, обусловленных опосредованным (гуморальным и др.) влиянием опухоли на обмен веществ, механизмы иммунитета и функциональную активность регуляторных систем организма (напр., развитие аутоиммунной гемолитической анемии при хроническом лимфолейкозе).

СИНДРО́М ПАРАНО́ИДНЫЙ (syndromum paranoideum) — см. *Параноид.*

СИНДРО́М ПАРАНОЙЯ́ЛЬНЫЙ (syndromum paranoiale) — сочетание паранойяльного бреда с бредовым поведением, бредовой обстоятельностью мышления и аффективными расстройствами (субдепрессивными и гипоманиакальными); наблюдается при шизофрении, интоксикационных и органических психозах.

СИНДРО́М ПАРАТРИГЕМИНА́ЛЬНЫЙ (syndromum paratrigeminale) — см. *Редера синдром.*

СИНДРО́М ПАРАФРЕ́ННЫЙ (syndromum paraphrenicum)— см. *Парафрения.*

СИНДРО́М ПАРОКСИЗМА́ЛЬНЫЙ ДЖЕЙНУЭЯ — МО́ЗЕНТАЛЯ — см. *Болезнь периодическая.*

СИНДРО́М ПЕ́РВОГО КРЕСТЦО́ВОГО КОРЕШКА́ (syndromum radiculi sacralis primi) — сочетание периферического пареза ягодичных мышц, трехглавой мышцы голени и сгибателей пальцев стопы со снижением ахиллова рефлекса, болями в средней ягодичной области, по задненаружной или задней поверхности бедра, голени, наружному краю стопы и нарушением чувствительности в этой области; наблюдается при сдавлении I крестцового корешка спинного мозга, напр. при остеохондрозе с поражением диска между V поясничным и I крестцовым позвонками.

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНЕЙ ВОРСИ́НЧАТОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae choroideae anterioris) — см. *Синдром артерии сосудистого сплетения.*

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНЕЙ ГРУДНО́Й СТЕ́НКИ (syndromum parietis pectoralis anterioris; син. Принцметала — Массуми синдром) — продолжительные (до нескольких часов) приступы болей в груди, напоминающие приступ стенокардии, но отличающиеся от него отсутствием иррадиации болей, вегетативных реакций, изменений электрокардиограммы, а также лечебного эффекта от нитроглицерина при эффективности аналгезирующих средств; развивается через несколько недель или месяцев от момента возникновения инфаркта миокарда.

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНЕЙ ЛЕ́СТНИЧНОЙ МЫ́ШЦЫ (syndromum musculi scaleni anterioris; син.: Наффцигера синдром, синдром лестничной мышцы, скаленус-синдром) — сочетание болей в области шеи, надплечья и руки по локтевой стороне, периферического пареза руки (преимущественно в дистальных отделах) с болезненностью при пальпации мест прикрепления передней лестничной мышцы, ослаблением пульса на лучевой артерии и местными вегетативно-сосудистыми нарушениями, обусловленное сдавлением подключичной артерии и подключичной части плечевого сплетения между шейным ребром или аномально расположенным I ребром и сокращенной передней лестничной мышцей.

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНЕЙ МОЗГОВО́Й АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae cerebri anterioris) — 1) сочетание центрального гемипареза контралатеральных конечностей (проксимального отдела руки и дистального отдела ноги) с хватательным рефлексом, задержкой или недержанием мочи; наблюдается при одностороннем нарушении кровообращения в передней мозговой артерии; 2) сочетание параличей конечностей с рефлексами орального автоматизма и психическими нарушениями (снижение критики, ослабление памяти); наблюдается при двустороннем нарушении кровообращения в передних мозговых артериях.

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНЕЙ НИ́ЖНЕЙ АРТЕ́РИИ МОЗЖЕ́ЧКА́ (syndromum arteriae cerebelli inferioris anterioris) — сочетание мозжечковых нарушений на одной стороне тела с выпадением болевой и температурной чувствительности на противоположной стороне, обусловленное закупоркой передней нижней артерии мозжечка с развитием инфаркта в каудальной части покрышки моста мозга.

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНЕЙ СПА́ЙКИ СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum commissurae anterioris medullae spinalis) — двустороннее симметричное выпадение болевой и температурной чувствительности по сегментарному типу, обусловленное поражением спиноталамических путей в области их перекреста в передней спайке спинного мозга; наблюдается, напр., при сирингомиелии.

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНЕЙ ЦЕНТРА́ЛЬНОЙ ИЗВИ́ЛИНЫ (syndromum gyri centralis anterioris) — 1) сочетание монопареза руки или ноги (иногда отдельной группы мышц конечности) с центральным парезом мышц, иннервируемых лицевым и подъязычным нервами, обусловленное односторонним поражением коры большого мозга в области предцентральной извилины; 2) сочетание клонических и тонических судорог в определенной мышце (группе мышц) конечности с поворотом глаз и головы в противоположную сторону, обусловленное односторонним раздражением коры большого мозга в области предцентральной извилины.

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНИХ КОРЕШКО́В СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum radiculorum anteriorum medullae spinalis) — сочетание периферических параличей (по сегментарному типу) с фасцикулярными подергиваниями в парализованных мышцах, обусловленное поражением передних корешков спинного мозга; наблюдается, напр., при патологических процессах в оболочках спинного мозга, травмах и опухолях позвоночника.

СИНДРО́М ПЕРЕ́ДНИХ РОГО́В СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum cornuum anteriorum medullae spinalis) — сочетание периферических параличей (по сегментарному типу) с фибриллярными подергиваниями в парализованных мышцах, обусловленное поражением передних рогов спинного мозга; наблюдается, напр., при полиомиелите, боковом амиотрофическом склерозе, весенне-летнем клещевом энцефалите.

СИНДРО́М ПЕРЕКРЕ́СТА ЗРИТЕ́ЛЬНЫХ НЕ́РВОВ (syndromum chiasmatis optici) — см. *Синдром хиазмы.*

СИНДРО́М ПЕРЕНАПРЯЖЕ́НИЯ СЕ́РДЦА — патологическое состояние, характеризующееся различными нарушениями ритма и проводимости сердца, развивающееся после чрезмерной физической нагрузки.

СИНДРО́М ПЕРЕХО́ДНЫЙ (син.: Вика переходный синдром, синдром промежуточный) — общее название психопатологических синдромов (аффективных, бредовых и др.), возникающих при развитии органического психоза либо до, либо после периода помрачения сознания.

СИНДРО́М ПЕРИНЕОАНА́ЛЬНЫЙ (syndromum perineoanale) — сочетание болей в области промежности, усиливающихся при мочеиспускании и дефекации, с периферическим парезом ног и расстройствами функций тазовых органов; наблюдается при травмах нижней части конского хвоста спинного мозга.

СИНДРО́М ПЕРИОДИ́ЧЕСКОЙ СПЯ́ЧКИ (син. синдром летаргический) — периодически возникающие приступы сна продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней или недель, к-рые не удается прервать внешними воздействиями, сопровождающиеся мышечной гипотонией, сухожильной арефлексией, артериальной гипотензией, отсутствием контроля над функциями тазовых органов; наблюдается при поражении промежуточного мозга, особенно гипоталамуса.

СИНДРО́М ПЕРИОРА́ЛЬНЫЙ (syndromum periorale; греч. peri вокруг, около + лат. os, oris рот) — см. *Фишера — Брюгге синдром.*

СИНДРО́М ПЕЧЁНОЧНО-ПО́ЧЕЧНЫЙ (syndromum hepatorenale) — см. *Синдром гепаторенальный.*

СИНДРО́М ПЕЧЁНОЧНО-СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ (syndromum hepatolienale) — см. *Синдром гепатолиенальный.*

СИНДРО́М ПЕЩЕ́РИСТОГО СИ́НУСА (syndromum sinus cavernosi; син.: синдром наружной стенки пещеристого синуса, Фуа синдром) — сочетание полной офтальмоплегии с болями в области лба и глазницы, обусловленное поражением глазодвигательного, блокового, отводящего и глазного нервов, проходящих в латеральной стенке пещеристого синуса твердой мозговой оболочки; наблюдается при опухолях гипофиза, краниофарингиомах, базальных менингиомах, аневризмах внутренней сонной артерии.

СИНДРО́М ПИ́КВИКСКИЙ — патологическое состояние, возникающее при ожирении у лиц низкого роста и проявляющееся частым поверхностным дыханием, сонливостью и общей слабостью.

СИНДРО́М ПИРАМИ́ДНЫЙ (syndromum pyramidale) — сочетание центральных параличей (парезов) конечностей с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, а также с патологическими рефлексами, обусловленное поражением пирамидных путей; иногда признаки паралича отсутствуют или наблюдается расщепление С. п.

СИНДРО́М ПИЩЕВО́Й ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИ́И — см. *Бернетта синдром.*

СИНДРО́М ПЛЕЧА́ — см. *Синдром плечевой.*

СИНДРО́М ПЛЕЧЕВО́ГО СПЛЕТЕ́НИЯ (syndromum plexus brachialis) — сочетание болей в руке, периферического парапича (пареза) мышц плечевого пояса и руки с нарушением всех видов чувствительности в этой области, обусловленное поражением плечевого сплетения, напр., при травмах.

СИНДРО́М ПЛЕЧЕВО́Й (syndromum brachiale; син. синдром плеча) — боли в области плечевого сустава (чаще левого), иногда сочетающиеся с умеренной атрофией окружающих его мышц и дистрофическими изменениями суставных поверхностей; разновидность постинфарктного синдрома.

СИНДРО́М ПЛЕЧЕ́КИСТЕВО́Й (syndromum brachiomanuale; син. Стейнброккера синдром) — сочетание болей с вегетативными и трофическими расстройствами в области плечевого сустава и кисти; наблюдается, напр., при шейном остеохондрозе, периартрите плечевого сустава.

СИНДРО́М ПЛЮРИГЛАНДУЛЯ́РНЫЙ (syndromum pluriglandulare; лат. plus, pluris больше + glandula железа) — см. *Гужеро — Фальты синдром.*

СИНДРО́М ПЛЯ́ШУЩИХ ГЛАЗ — см. *Опсоклонус.*

СИНДРО́М ПОДКРЫЛЬЦО́ВОГО НЕ́РВА (syndromum nervi axillaris; син. синдром подмышечного нерва) — сочетание периферического пареза (паралича) дельтовидной мышцы (нарушение или невозможность отведения руки в сторону, вперед и назад) с нарушением чувствительности на задней и боковой поверхности плеча, обусловленное поражением подмышечного нерва.

СИНДРО́М ПОДМЫ́ШЕЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi axillaris) — см. *Синдром подкрыльцового нерва.*

СИНДРО́М ПОДЪЯЗЫ́ЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi hypoglossi) — сочетание атрофии и фибриллярных подергиваний мышц языка с отклонением его в сторону атрофированных мышц; возникает при поражении подъязычного нерва или его ядра на стороне выявления этих симптомов.

СИНДРО́М ПОЗВОНО́ЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi vertebralis) — см. *Барре — Льеу синдром.*

СИНДРО́М ПОЗВОНО́ЧНОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae vertebralis) — см. *Барре — Льеу синдром.*

СИНДРО́М ПОЛИГЛАНДУЛЯ́РНЫЙ (syndromum polyglandulare; греч. poly- много + лат. glandula железа) — общее название синдромов, обусловленных одновременным поражением нескольких эндокринных желез.

СИНДРО́М ПОЛОВИ́ННОГО ПОРАЖЕ́НИЯ СПИННО́ГО МО́ЗГА — см. *Броун-Секара синдром.*

СИНДРО́М ПОЛОСА́ТОГО ТЕ́ЛА (syndromum corporis striati) — см. *Синдром гиперкинетико-гипотонический.*

СИНДРО́М ПОПЕРЕ́ЧНОГО ПОРАЖЕ́НИЯ СПИННО́ГО МО́ЗГА — сочетание сегментарных расстройств с проводниковыми нарушениями ниже их уровня в виде параличей конечностей, утраты всех видов чувствительности, нарушения функций тазовых органов; наблюдается при поражении всех структур спинного мозга на одном уровне.

СИНДРО́М ПОСТВАГОТОМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum postvagotomicum; лат. post после + *ваготомия*) — общее название поздних осложнений ваготомии (нарушения функции желудка, кишечника, печени и др.).

СИНДРО́М ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИО́ННЫЙ (syndromum postgastroresectionale; лат. post после + греч. gastēr желудок + *резекция*; син.: астения агастральная, синдром агастральный) — позднее послеоперационное осложнение резекции желудка; характеризуется нарушением желудочного пищеварения и эвакуации из желудка и проявляется общей слабостью, диспептическими явлениями, иногда нарушениями углеводного обмена.

СИНДРО́М ПОСТГАСТРОЭНТЕРОСТОМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum postgastroenterostomicum; лат. post после + *гастроэнтеростомия*) — см. *Прибрама болезнь.*

СИНДРО́М ПОСТГАСТРЭКТОМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum postgastrectomicum; лат. post после + *гастроэктомия*; син. Ламблена синдром) — поздние послеоперационное осложнение гастрэктомии, обусловленное поступлением пищи из пищевода непосредственно в кишечник с соответствующими нарушениями пищеварения и проявляющееся резким исхуданием, поносами, отеками, анемией и гипопротеинемией.

СИНДРО́М ПОСТИНФА́РКТНЫЙ (syndromum postinfarcticum; лат. post после + *инфаркт*) — общее название поздних осложнений инфаркта миокарда, напр. синдрома Дресслера, плечевого синдрома, синдрома передней грудной стенки.

СИНДРО́М ПОСТКАРДИОТО́МНЫЙ (syndromum posttardiotomicum; лат. post после + *кардиотомия*; син. синдром посткомиссуротомный) — сочетание признаков асептического фибринозного полисерозита (перикардита и плеврита), возникающего после операции на сердце в срок от нескольких дней до нескольких месяцев и обусловленного аутоиммунными реакциями.

СИНДРО́М ПОСТКАСТРАЦИО́ННЫЙ (syndromum postcastracionicum; лат. post после + *кастрация*) — сочетание астении с вегетативными расстройствами и нарушением обмена веществ (ожирение и др.), обусловленное внезапным выпадением эндокринной функции половых желез.

СИНДРО́М ПОСТКОМИССУРОТО́МНЫЙ (syndromum postcommissurotomicum; лат. post после + *комиссуротомия*) — см. *Синдром посткардиотомный.*

СИНДРО́М ПОСТКОММОЦИО́ННЫЙ (лат. post после + commotio сотрясение) — сочетание раздражительной слабости, физической и психической истощаемости, головных болей, вегетативных расстройств (потливость, сосудистые нарушения), головокружений и др., возникающее через несколько недель или месяцев, реже через год после закрытой черепно-мозговой травмы.

СИНДРО́М ПОСТТАХИКАРДИ́ЧЕСКИЙ (лат. post после + *тахикардия*) — сочетание слабости и неприятных ощущений в области сердца с наличием электрокардиографических признаков метаболических изменений в миокарде, наблюдаемое после затяжного пароксизма тахикардии или мерцательной тахиаритмии.

СИНДРО́М ПОСТТРЕПАНАЦИО́ННЫЙ (лат. post после + *трепанация*) — сочетание болезненности в области дефекта черепа с головными болями при изменениях атмосферного давления, обусловленное рубцовым сращением оболочек головного мозга после трепанации черепа.

СИНДРО́М ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum postthrombophlebiticum; лат. post после + *тромбофлебит*) — сочетание признаков хронической функциональной недостаточности вен, обычно нижних конечностей (отеки, боли, быстрая утомляемость, трофические расстройства, компенсаторное варикозное расширение вен), развивающейся после тромбофлебита с поражением глубоких вен конечности.

СИНДРО́М ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum postcholecystectomicum; лат. post после + *холецистэктомия*; син. синдром холецистэктомический) — общее название поздних осложнений холецистэктомии (сужение общего желчного протока, развитие дискинезии желчных путей и др.).

СИНДРО́М ПОТЕ́РИ СОЛЕ́Й (син. синдром солевого истощения) — сочетание артериальной гипотензии с адинамией, эксикозом, фибриллярными подергиваниями мышц, расстройством сердечной деятельности и нарушениями психики, обусловленное обеднением организма солями, преимущественно натрия и калия, напр. при обильной рвоте, полиурии.

СИНДРО́М ПОХМЕ́ЛЬНЫЙ (syndromum abstinentiae; син. синдром абстинентный алкогольный) — сочетание вегетативных, неврологических и психических расстройств, обусловленных абстиненцией при хроническом алкоголизме.

СИНДРО́М ПО́ЧЕЧНО-ПЕЧЁНОЧНЫЙ (syndromum hepatorenale) — см. *Синдром гепаторенальный.*

СИНДРО́М ПОЯСНИ́ЧНОГО УТОЛЩЕ́НИЯ СПИННО́ГО МО́ЗГА (syndromum intumescentiae lumbalis medullae spinalis) — сочетание периферического пареза (паралича) ног с расстройствами чувствительности в области поясничных и крестцовых сегментов и нарушением функций тазовых органов, обусловленное поражением спинного мозга в области его поясничного утолщения.

СИНДРО́М ПРЕДМЕНСТРУА́ЛЬНЫЙ (syndromum praemenstruale; син. предменструальное напряжение) — патологическое состояние, возникающее у части женщин во второй половине менструального периода (за 3—14 дней до наступления менструации) и характеризующееся различными нервно-психическими, вегетососудистыми и обменными нарушениями.

СИНДРО́М ПРЕЖДЕВРЕ́МЕННОГО ВОЗБУЖДЕ́НИЯ ЖЕЛУ́ДОЧКОВ — см. *Вольффа — Паркинсона — Уайта синдром.*

СИНДРО́М ПРИВОДЯ́ЩЕЙ ПЕ́ТЛИ — позднее осложнение резекции желудка, обусловленное нарушениями прохождения содержимого приводящей кишечной петли в отводящую и проявляющееся болями в правом подреберье и рвотой с желчью.

СИНДРО́М ПРОГРЕССИ́РУЮЩЕГО СУПРАНУКЛЕА́РНОГО ПАРАЛИЧА́ (син. Стила — Ричардсона — Ольшевского синдром) — постепенно развивающееся сочетание офтальмоплегии, гл. обр. нарушения движений глазного яблока вверх — вниз, псевдобульбарного паралича, повышения или понижения тонуса задних мышц шеи, обусловленное поражением базальных ядер и ствола головного мозга.

СИНДРО́М ПРОДОЛГОВА́ТОГО МО́ЗГА (syndromum medullae oblongatae) — сочетание бульбарного паралича с бульбарными альтернирующими синдромами и часто с нарушениями кровообращения и дыхания, обусловленное поражением продолговатого мозга.

СИНДРО́М ПРОДОЛГОВА́ТОГО МО́ЗГА ЛАТЕРА́ЛЬНЫЙ (syndromum medullae oblongatae laterale) — см. *Валленберга — Захарченко синдром.*

СИНДРО́М ПРОЛАБИ́РОВАНИЯ СТВО́РОК МИТРА́ЛЬНОГО КЛА́ПАНА (син. клик-синдром) — сочетание приступообразных или длительных ноющих болей в области сердца, систолического шума, измененного первого тона, появления короткого экстратона в середине систолы (ме-

зосистолический щелчок) на верхушке сердца с различными желудочковыми или предсердными аритмиями; наблюдается при западении створки или створок левого предсердно-желудочкового клапана в полость левого предсердия в период систолы, обусловленном врожденной слабостью хорд или поражением папиллярных мышц.

СИНДРО́М ПРОМЕЖУ́ТОЧНЫЙ — см. *Синдром переходный*.

СИНДРО́М ПРЯМО́Й СПИ́НЫ — аномалия развития: отсутствие физиологического кифоза в грудном отделе позвоночника и уменьшение поясничного лордоза, что в связи с уменьшением переднезаднего размера грудной клетки приводит к сдавлению сердца и крупных сосудов.

СИНДРО́М ПСЕВДОАБДОМИНА́ЛЬНЫЙ (syndromum pseudoabdominale; греч. pseudēs ложный + *абдоминальный*; син. синдром абдоминальный — прк) — совокупность симптомов, характерных для острого заболевания органов брюшной полости, но возникших при иной локализации патологического процесса, напр. при пневмонии, инфаркте миокарда.

СИНДРО́М ПСЕВДОБУЛЬБА́РНЫЙ (syndromum pseudobulbare; греч. pseudēs ложный + *бульбарный*) — сочетание псевдобульбарного паралича с рефлексами орального автоматизма, выраженным нижнечелюстным рефлексом, насильственным смехом или плачем; наблюдается при двустороннем поражении волокон корково ядерных путей, идущих к ядрам языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов.

СИНДРО́М ПСЕВДОГИПОПАРАТИРЕО́ИДНЫЙ (syndromum pseudohypoparathyreoideum; греч. pseudēs ложный + гипопаратиреоидизм) — см. *Мартина — Олбрайта псевдогипопаратиреоидный синдром*.

СИНДРО́М ПСЕВДОНЕВРАСТЕНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum pseudoneurasthenicum; греч. pseudēs ложный + *неврастения*) — сочетание расстройств, характерных для неврастении (повышенная возбудимость, истощаемость, нарушения сна, снижение работоспособности и др.) с признаками органического психосиндрома (ослабление памяти, снижение уровня суждений и умственной продуктивности и др.); наблюдается при органических поражениях головного мозга или после тяжелых истощающих болезней.

СИНДРО́М ПСЕВДОПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum pseudoparalyticum; греч. pseudēs ложный + *паралич*; син. псевдопаралич) — сочетание психических и неврологических расстройств, сходное или тождественное встречающимся при прогрессивном параличе, но наблюдаемое при других болезнях центральной нервной системы.

С. ПСЕВДОПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ АЛКОГО́ЛЬНЫЙ (s. pseudoparalyticum alcoholicum) — разновидность хронической алкогольной энцефалопатии, клинически проявляющаяся С. п., чаще в виде аффективных и бредовых расстройств.

С. ПСЕВДОПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ АТРОФИ́ЧЕСКИЙ (s. pseudoparalyticum atrophicum) — С. п. с аффективными и бредовыми расстройствами, возникающий в начальном, реже — в развернутом периоде пресенильного (при болезни Пика, хорее Гентингтона) и старческого слабоумия и отличающийся выраженными расстройствами памяти.

С. ПСЕВДОПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ ОПУХОЛЕВЫЙ (s. pseudoparalyticum tumorale) — С. п. с легким оглушением сознания, наблюдающийся при опухолях преимущественно лобных долей большого мозга.

С. ПСЕВДОПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЙ (s. pseudoparalyticum syphiliticum) — С. п., развивающийся по типу паралитического слабоумия и наблюдающийся преимущественно при сифилитическом эндартериите мелких сосудов коры большого мозга; может сопровождаться злобностью.

С. ПСЕВДОПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ СОСУ́ДИСТЫЙ (s. pseudoparalyticum vasculare) — С. п., возникающий при нарушениях мозгового кровообращения и отличающийся лабильностью эмоций, насильственным смехом и плачем, иногда наличием очаговых корковых расстройств.

С. ПСЕВДОПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (s. pseudoparalyticum traumaticum) — С. п., чаще в виде аффективных и бредовых расстройств, возникающий либо в остром периоде черепно-мозговой травмы в качестве переходного синдрома с регредиентным течением, либо в отдаленном ее периоде (в результате повторных черепно-мозговых травм или перенесенного травматического психоза) с прогредиентным течением.

СИНДРО́М ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИ́ВНЫЙ (syndromum pseudoexfoliativum; греч. pseudēs ложный + *эксфолиация*) — см. *Синдром эксфолиативный*.

СИНДРО́М ПСИХИ́ЧЕСКОГО АВТОМАТИ́ЗМА — см. *Кандинского — Клерамбо синдром*.

СИНДРО́М ПСИХООРГАНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum psychoorganicum) — см. *Психосиндром органический*.

СИНДРО́М ПСИХОПАТОПОДО́БНЫЙ — см. *Синдром гебоидный*.

СИНДРО́М ПЯ́ТОГО ПОЯСНИ́ЧНОГО КОРЕШКА́ (syndromum radicis quintae lumbalis) — сочетание пареза малоберцовых мышц с болями и понижением болевой чувствительности в верхней части ягодичной области, по наружной поверхности бедра и голени, II и III пальцев стопы; наблюдается при патологических изменениях диска между IV и V поясничными позвонками.

СИНДРО́М РАЗДА́ВЛИВАНИЯ — см. *Токсикоз травматический*.

СИНДРО́М РАЗДРАЖЕ́НИЯ — общее название синдромов, обусловленных раздражением проводящих путей и (или) центров нервной системы при каких-либо патологических процессах.

СИНДРО́М РАЗДРАЖЁННОЙ ТО́ЛСТОЙ КИШКИ́ — см. *Колика слизистая*.

СИНДРО́М РАЗМОЗЖЕ́НИЯ — см. *Токсикоз травматический*.

СИНДРО́М РЕТРА́КЦИИ ГЛАЗНО́ГО Я́БЛОКА (syndromum retractionis bulbi oculi) — см. *Штиллинга — Тюрка — Дуэйна синдром*.

СИНДРО́М РЕТРООЛИВА́РНЫЙ (syndromum retroolivare; лат. retro позади + *олива*) — см. *Валленберга — Захарченко синдром*.

СИНДРО́М РЕТРОСФЕНОИДА́ЛЬНОГО ПРОСТРА́НСТВА (syndromum spatii retrosphenoidalis; лат. retro позади + анат. os sphenoidale клиновидная кость) — см. *Жако синдром*.

СИНДРО́М РУБРОТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum rubrothalamicum; анат. nucleus ruber красное ядро + *таламус*) — сочетание крупно-размашистого дрожания конечностей с астенией, дисметрией, нередко с хореоатетозом и характерным положением руки (таламическая рука), обусловленное поражением таламуса и красного ядра или их проводящих путей на противоположной стороне.

СИНДРО́М САНФИЛИ́ППО — см. *Мукополисахаридоз III типа*.

СИНДРО́М САХА́РНОГО ДИАБЕ́ТА — см. *Диабет сахарный транзиторный новорожденных*.

СИНДРО́М СБРА́СЫВАНИЯ — см. *Демпинг-синдром*.

СИНДРО́М СДАВЛЕ́НИЯ ДНА РОМБОВИ́ДНОЙ ЯМКИ (syndromum compressionis fundi fossae rhomboideae) — сочетание диплопии, одностороннего пареза мимической мускулатуры, снижения слуха и шума в ушах, головокружения, спонтанного нистагма, нарушения глотания и дизартрии, иногда сопровождающееся проявлениями гипертензивного синдрома, обусловленное поражением ядер черепных нервов (отводящего, лицевого, преддверно-улиткового, подъязычного), расположенных под дном четвертого желудочка.

СИНДРО́М СЕДА́ЛИЩНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi ischiadici) — сочетание периферического паралича сгибателей голени, сгибателей и разгибателей стопы и пальцев с сильными болями по задней поверхности бедра, задней и наружной поверхности голени, с нарушениями чувствительности в той же области, снижением или отсутствием ахиллова рефлекса, симптомами натяжения, вазомоторными и трофическими расстройствами, обусловленное поражением седалищного нерва до деления его на ветви.

СИНДРО́М СЕНСО́РНО-ПО́ТОВЫЙ (syndromum sensoriohidroticum) — общее название сочетанных расстройств потоотделения и чувствительности; выявление С. с.-п. используют для топической диагностики поражения нервной системы.

СИНДРО́М СЕНСО́РНО-ПРОТОПАТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum sensorioprotopathicum; греч. лат. sensorium центральный орган чувств + prōtos первый, первичный + pathos страдание, болезнь) — сочетание болей, сенестопатий, вегетативных нарушений, эмоциональных и гностических расстройств, периодически возникающее как аура, эпилептический припадок или после припадка.

СИНДРО́М СЕРДЕ́ЧНО-ДИАФРАГМА́ЛЬНЫЙ (syndromum cardiodiaphragmaticum) — сочетание аритмии сердца с болями в области проекции сердца на переднюю грудную стенку, наблюдаемое при нек-рых поражениях диафрагмы (напр., при диафрагмальной грыже).

СИНДРО́М СЕРДЕ́ЧНО-ЛЁГОЧНЫЙ — см. *Сердечно-легочная недостаточность.*

СИНДРО́М СИДЕРОПЕНИ́ЧЕСКИЙ (syndromum sideropeniae) — см. *Пламмера — Винсона синдром.*

СИНДРО́М СИ́НИХ ПЕЛЁНОК (син. синдром голубых пеленок) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением всасывания триптофана и гиперкальциемией; характеризуется повышенным содержанием индикана и индол-β-уксусной кислоты в моче, вследствие чего пеленки больных детей окрашиваются в синий цвет.

СИНДРО́М СИ́НУС-БРОНХИА́ЛЬНЫЙ (син. синобронхит) — осложнение хронического синусита хроническим бронхитом; характеризуется длительным волнообразным течением.

СИНДРО́М СКО́ВАННОСТИ — сочетание замедленности движений с нарушением синергизма, обусловленное экстрапирамидной ригидностью; наблюдается при паркинсонизме.

СИНДРО́М СЛА́БОСТИ СИ́НУСНОГО УЗЛА́ (син.: синдром бради-, тахикардии, синдром дисфункции синусного узла) — сочетание электрокардиографических признаков синусной брадикардии или синоаурикулярной блокады с развивающимися на их фоне приступами различных аритмий (напр., мерцания и трепетания предсердий, суправентрикулярной тахикардии); может наблюдаться при поражении синусно-предсердного узла и прилежащих к нему участков миокарда.

СИНДРО́М СНОПОДО́БНОЙ ОГЛУШЁННОСТИ — см. *Синдром онейроидный.*

СИНДРО́М СОЛЕВО́ГО ИСТОЩЕ́НИЯ — см. *Синдром потери солей.*

СИНДРО́М СО́ЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕ́НИЯ (syndromum plexus solaris; син. синдром чревного сплетения) — приступы сильных болей в подложечной области, иррадиирующих в спину, сопровождающихся нарушениями функции пищеварительного тракта и почек, колебаниями уровня артериального давления, адинамией, чувством тоски и страха; обусловлен поражением чревного сплетения, напр. при травмах живота, заболеваниях органов брюшной полости, солярите.

СИНДРО́М СОЛЬТЕРЯ́ЮЩИЙ — см. *Синдром адреногенитальный с потерей солей.*

СИНДРО́М СПАСТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum spasticum) — сочетание приступообразных болей в животе с чередованием запоров и поносов или спастическим запором; наблюдается при нек-рых формах энтероколитов и колитов.

СИНДРО́М СРЕДИ́ННОГО НЕ́РВА (syndromum nervi mediani) — сочетание нарушений сгибания и пронации кисти, сгибания I и II пальцев и противопоставления I пальца с атрофией мышц возвышения I пальца (атрофическая кисть Арана — Дюшенна), расстройствами чувствительности на лучевой половине кисти с ладонной стороны и тыльной поверхности концевых фаланг II и III пальцев, а также с болями, трофическими и вазомоторными нарушениями в той же области; обусловлен поражением срединного нерва.

СИНДРО́М СРЕ́ДНЕГО МО́ЗГА (syndromum mesencephali)— общее название синдромов поражения структур среднего мозга, напр. синдромов Вебера, Парино, красного ядра.

СИНДРО́М СРЕ́ДНЕЙ ДО́ЛИ (syndromum lobi medii pulmonis dextri) — уменьшение и уплотнение рентгеновской тени средней доли правого легкого; термин употребляется при формулировании предварительного рентгенологического диагноза в случаях, требующих дальнейшего уточнения.

СИНДРО́М СРЕ́ДНЕЙ МОЗГОВО́Й АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae cerebri mediae) — сочетание гемиплегии, гемианестезии, гемианопсии, центрального пареза мышц, иннервируемых лицевым и подъязычным нервами, обусловленное закупоркой ствола средней мозговой артерии на противоположной стороне до отхождения ее глубоких ветвей; при поражении доминантного полушария сопровождается тотальной или смешанной афазией.

СИНДРО́М СТРИА́РНЫЙ (syndromum striatum; анат. corpus striatum полосатое тело) — см. *Синдром гиперкинетико-гипотонический.*

СИНДРО́М СУБКЛАВИОВЕРТЕБРА́ЛЬНЫЙ (syndromum subclaviovertebrale, анат. arteria subclavia подключичная артерия + arteria vertebralis позвоночная артерия) — сочетание понижения температуры кожи руки, ослабления пульса на лучевой артерии и снижения артериального давления на той же руке с явлениями вертебробазилярной недостаточности, возникающее при окклюзии подключичной артерии в месте отхождения от нее позвоночной артерии.

СИНДРО́М СУБКЛАВИОКАРОТИ́ДНЫЙ (syndromum subclaviocaroticum анат. arteria subclavia подключичная артерия + arteria carotis общая сонная артерия) — сочетание понижения температуры кожи руки, ослабления пульса на лучевой артерии, снижения артериального давления, шума в ухе, преходящих нарушений зрения в глазу на той же стороне с нарушениями чувствительности и преходящими парезами противоположных конечностей, обусловленными расстройствами кровообращения в подключичной и общей сонной артериях, напр. при их атеросклеротическом поражении вблизи дуги аорты.

СИНДРО́М СУХО́Й — см. *Гужеро — Шегрена синдром.*

СИНДРО́М СФЕНОИДА́ЛЬНОЙ ЩЕ́ЛИ (syndromum fissurae sphenoidalis; греч. sphēnoeidēs клиновидный) — см. *Синдром верхней глазничной щели.*

СИНДРО́М ТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum thalamicum) — см. *Синдром зрительного бугра.*

СИНДРО́М ТАЛАМОКОЛЕ́НЧАТОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae thalamogeniculatae) — сочетание синдрома зрительного бугра с атетозом или хореоатетозом, гемиатаксией, трофическими и вегетативными нарушениями, обусловленное поражением ветви задней мозговой артерии, снабжающей область таламуса.

СИНДРО́М ТАЛАМОПЕРФОРИ́РУЮЩЕЙ АРТЕ́РИИ (syndromum arteriae thalamoperforantis) — сочетание верхнего синдрома красного ядра с характерным положением руки (таламическая рука), обусловленное поражением ветви задней мозговой артерии, снабжающей верхнюю часть красного ядра.

СИНДРО́М ТЕМЕННО́Й ДО́ЛИ (syndromum lobi temporalis) — общее название синдромов поражения различных областей теменной доли большого мозга (напр., синдрома угловой извилины).

СИНДРО́М ТЕНТОРИА́ЛЬНЫЙ (syndromum tentoriale; анат. tentorium намет) — см. *Синдром мозжечкового намета.*

СИНДРО́М ТЕСТИКУЛЯ́РНОЙ ДИСГЕНЕ́ЗИИ (syndromum dysgenesiae testicularis; анат. testis яичко) — см. *Дель Кастильо синдром.*

СИНДРО́М ТЕСТИКУЛЯ́РНОЙ ФЕМИНИЗА́ЦИИ (syndromum feminisationis testicularis; син. феминизация тестикулярная) — форма ложного гермафродитизма, характеризующаяся развитием наружных половых органов по женскому типу, наличием рудиментарных матки и маточных труб в сочетании с недоразвитием яичек, локализующихся в брюшной полости или в толще больших половых губ; при С. т. ф. сохраняется мужской кариотип и не обнаруживается половой хроматин.

СИНДРО́М ТЕТАНО́ИДНЫЙ (syndromum tetanoideum) — повторяющиеся приступы тонических судорог мышц конечностей, лица, гортани, иногда дыхательных мышц и гладкой мускулатуры внутренних органов, обусловленные нарушением минерального обмена, гл. обр. кальция, и кислотно-щелочного равновесия; наблюдаются при поражении паращитовидных желез, при нек-рых инфекционных болезнях и отравлениях.

СИНДРО́М ТОКСИ́ЧЕСКИЙ (syndromum toxicum)— общее название различных сочетаний симптомов, возникновение к-рых обусловлено интоксикацией.

СИНДРО́М ТОНЗИЛЛОКАРДИА́ЛЬНЫЙ (syndromum tonsillocardiacum) — симптомы миокардиодистрофии у больного хроническим тонзиллитом, обусловленные интоксикацией.

СИНДРО́М ТРЕВО́ЖНО-ПАРАНО́ИДНЫЙ (syndromum anxietoparanoideum) — сочетание аффекта тревоги, сопровождаемого ажитацией и растерянностью, с бредом отношения или преследования, вербальными иллюзиями и галлюцинациями; наблюдается при шизофрении и органических психозах.

СИНДРО́М ТРЕ́ТЬЕГО ЖЕЛУ́ДОЧКА (syndromum ventriculi tertii) — сочетание гипертензивного синдрома с отдельными проявлениями синдрома зрительного бугра, гипоталамических и экстрапирамидных синдромов, а часто и с двусторонними двигательными расстройствами, появляющимися или усиливающимися на высоте приступов головных болей; наблюдается при патологических процессах в области III желудочка головного мозга.

СИНДРО́М ТРЁХ «А» — см. *Серейского синдром.*

СИНДРО́М ТРЁХСИМПТО́МНЫЙ ГУЖЕРО́ — ДЮПЕРРА́ — см. *Гужеро — Дюперра трехсимптомная болезнь.*

СИНДРО́М ТРОЙНИ́ЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi trigemini) — сочетание болей в области лица с нарушением поверхностной чувствительности в той же области, параличом (парезом) жевательных мышц, утратой роговичного и конъюнктивального рефлексов,

наблюдаемое на стороне поражения тройничного нерва.

СИНДРО́М ТРОЙНИ́ЧНОГО УЗЛА́ (syndromum ganglii trigeminalis) — см. *Синдром гассерова узла.*

СИНДРО́М ТРОМБО́ЗА ВЕ́РХНЕГО САГИТТА́ЛЬНОГО СИ́НУСА (syndromum thrombosis sinus sagittalis superioris; син. синдром тромбоза верхней продольной пазухи) — сочетание головных болей, головокружения и рвоты с судорогами мышц нижних конечностей, нарушениями сознания, гемиили тетраплегией, отеком век, висков, лба, извитостью вен в этих областях, обусловленное тромбозом верхнего сагиттального синуса.

СИНДРО́М ТРОМБО́ЗА ВЕ́РХНЕЙ ПРОДО́ЛЬНОЙ ПА́ЗУХИ — см. *Синдром тромбоза верхнего сагиттального синуса.*

СИНДРО́М ТРОМБО́ЗА ЗА́ДНЕЙ НИ́ЖНЕЙ МОЗЖЕЧКО́ВОЙ АРТЕ́РИИ (syndromum thrombosis arteriae cerebelli inferioris posterioris) — см. *Валленберга — Захарченко синдром.*

СИНДРО́М ТРОМБО́ЗА КАВЕРНО́ЗНОГО СИ́НУСА (syndromum thrombosis sinus cavernosi) — см. *Синдром тромбоза пещеристого синуса.*

СИНДРО́М ТРОМБО́ЗА ПЕЩЕ́РИСТОГО СИ́НУСА (syndromum thrombosis sinus cavernosi; син.: Бонне синдром пещеристого синуса, синдром тромбоза кавернозного синуса) — сочетание полной офтальмоплегии с экзофтальмом, болями в области лба и глазницы, отеком век и лица, наблюдаемое на стороне тромбоза пещеристого синуса.

СИНДРО́М ТРОМБО́ЗА ПОПЕРЕ́ЧНОГО И СИГМОВИ́ДНОГО СИ́НУСОВ (syndromum thrombosis sinuum transversi et sigmoidei) — сочетание отека мягких тканей на шее в области яремной вены и сосцевидного отростка, болезненности при повороте головы, а также застойного соска, наблюдаемое на стороне тромбоза поперечного и сигмовидного синусов.

СИНДРО́М ТРОМБОЭМБОЛИ́ЧЕСКИЙ (syndromum thromboembolicum) — повторное возникновение эмболий различных артерий тромботическими массами, обусловленное наличием очага тромбообразования (напр., при подостром септическом эндокардите) или значительным повышением свертываемости крови.

СИНДРО́М УВЕОМЕНИНГЕА́ЛЬНЫЙ (syndromum uveomeningeale) — общее название различных синдромов, характеризующихся сочетанием менингеального синдрома с увеитом (напр., синдром Фогта — Коянаги).

СИНДРО́М УГЛОВО́Й ИЗВИ́ЛИНЫ (syndromum gyri angularis; син. Герстманна синдром) — сочетание пальцевой агнозии, аграфии и акалькулии с нарушением способности различать правую и левую стороны тела, обусловленное поражением коры доминантного полушария большого мозга в области нижней теменной и средней затылочной извилин.

СИНДРО́М УРЕТРООКУЛОСИНОВИА́ЛЬНЫЙ (syndromum urethrooculosynoviale) — см. *Рейтера болезнь.*

СИНДРО́М У́ТРЕННИЙ — периодическая утренняя рвота, преимущественно слизью; наблюдается при хроническом алкогольном гастрите.

СИНДРО́М У́ШНО-ВИСО́ЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi auriculotemporalis) — см. *Синдром аурикулотемпоральный.*

СИНДРО́М УЩЕМЛЕ́НИЯ МИНДА́ЛИН МОЗЖЕЧКА́ — см. *Синдром опущения миндалин мозжечка.*

СИНДРО́М ФЛОККУЛОНОДУЛЯ́РНЫЙ (syndromum flocculonodulare; анат. flocculus cerebelli клочок мозжечка + nodulus cerebelli узелок мозжечка) — статическая атаксия с нарушением походки при отсутствии гипотонии и динамической атаксии; признак поражения нижних отделов червя мозжечка.

СИНДРО́М ФРЕ́ЙБУРГСКИЙ — сочетание грязно-коричневой окраски кожных покровов (преимущественно на открытых местах) и гипертрихоза с адинамией, спонтанными переломами костей, образованием остеофитов на фалангах и пястных костях, обусловленное поражением надпочечников при острой форме пеллагры.

СИНДРО́М ХИАЗМА́ЛЬНЫЙ (syndromum chiasmale) — см. *Синдром хиазмы.*

СИНДРО́М ХИА́ЗМЫ (syndromum chiasmatis; син.: синдром перекреста зрительных нервов, синдром хиазмальный) — выпадение полей зрения при поражении зрительного перекреста, напр. при опухоли гипофиза или основания мозга, при оптохиазмальном арахноидите.

СИНДРО́М ХОЛЕЦИСТЭКТОМИ́ЧЕСКИЙ (syndromum cholecystectomicum) — см. *Синдром постхолецистэктомический.*

СИНДРО́М ХОРЕ́ЙЧЕСКИЙ (syndromum choreicum)— см. *Гиперкинез хорейческий.*

СИНДРО́М ХРОНИ́ЧЕСКОЙ ГИПЕРТРОФИ́ЧЕСКОЙ АКРОАСФИКСИИ (syndromum acroasphyxiae hypertrophicae chronicae) — см. *Кассирера синдром.*

СИНДРО́М ЦЕНТРА́ЛЬНОГО ПАРАЛИ́ЧА (syndromum paralysis centralis) — см. *Паралич центральный.*

СИНДРО́М ЧЕРВЯ́ МОЗЖЕЧКА́ (syndromum vermis cerebelli) — сочетание статической атаксии с атаксией при ходьбе; признак поражения червя мозжечка.

СИНДРО́М ЧЕТВЕРОХО́ЛМИЯ (син. Нотнагеля синдром) — сочетание мозжечковой атаксии, птоза, паралитического мидриаза, расходящегося косоглазия, нарушения движения глаз вверх, односторонней или двусторонней центральной глухоты, иногда хореического гиперкинеза или атетоза, обусловленное поражением или сдавлением покрышки и крыши среднего мозга, чаще при опухолях шишковидного тела.

СИНДРО́М ЧЕТВЕРОХО́ЛМНОЙ АРТЕ́РИИ — сочетание глазодвигательных расстройств, напр. нарушения движения глаз вверх, с симптомами поражения мозжечка и (или) нарушением сознания, обусловленное расстройством кровообращения в ветви задней мозговой артерии, кровоснабжающей четверохолмие.

СИНДРО́М ЧЕТВЁРТОГО ЖЕЛУ́ДОЧКА (syndromum ventriculi quarti) — сочетание гипертензивного синдрома с сердечно-сосудистыми расстройствами и нарушениями дыхания, часто с вынужденным положением головы, иногда с парезами отводящего и лицевого нервов; наблюдается при окклюзии IV желудочка головного мозга.

СИНДРО́М ЧРЕ́ВНОГО СПЛЕТЕ́НИЯ (syndromum plexus celiaci) — см. *Синдром солнечного сплетения.*

СИНДРО́М ШЕ́ЙНО-ГЛАЗОАКУСТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum cervicooculoacusticum) — см. *Вилдерванка синдром.*

СИНДРО́М ШЕ́ЙНО-ГРУДНО́ГО УЗЛА́ (syndromum ganglii cervicothoracici) — см. *Синдром звездчатого узла.*

СИНДРО́М ШИЗОФРЕНОПОДО́БНЫЙ — общее название психопатологических синдромов, сходных с проявлениями шизофрении, но возникающих при других психозах.

СИНДРО́М ЭЗОФАГЕА́ЛЬНОГО КОЛЬЦА́ — сочетание загрудинной боли, изжоги, отрыжки, рвоты (с примесью крови) и скрытых пищеводных кровотечений, обусловленное желудочно-пищеводным рефлюксом при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.

СИНДРО́М ЭКЗОГЕ́ННЫЙ (syndromum exogenum) — см. *Экзогенные типы реакций.*

СИНДРО́М ЭКСПАНСИ́ВНО-КОНФАБУЛЯТО́РНЫЙ — сочетание симптомов экспансивной и конфабуляторной парафрении.

СИНДРО́М ЭКСТРАПИРАМИ́ДНЫЙ (syndromum extrapyramidale) — общее название различных сочетаний признаков поражения экстрапирамидной системы (напр., акинетико-ригидный синдром).

СИНДРО́М ЭКСФОЛИАТИ́ВНЫЙ (syndromum exfoliativum; син. синдром псевдоэксфолиативный) — сочетание псевдокапсулярной эксфолиации с симптомами дистрофии радужки и ресничного тела, помутнения хрусталика и нарушений гидродинамики глаза; наблюдается при нек-рых болезнях глаз в пожилом и старческом возрасте.

СИНДРО́М ЭЛЬПЕНО́РА (по имени спутника Одиссея) — сочетание затрудненного восприятия окружающего, дезориентировки, бесцельного блуждания и расстройств координации движений; наблюдается при переходе от сна к бодрствованию после алкогольного или наркотического опьянения.

СИНДРО́М ЭМОЦИОНА́ЛЬНЫЙ (syndromum emotionale) — см. *Синдром аффективный.*

СИНДРО́М ЭНЕРГОДИНАМИ́ЧЕСКОЙ НЕДОСТА́ТОЧНОСТИ СЕ́РДЦА — см. *Сердечная недостаточность энергодинамическая.*

СИНДРО́М ЭНТЕРА́ЛЬНЫЙ (syndromum entericum) — общее название различных сочетаний признаков нарушения всасывания пищевых веществ в кишечнике; наблюдается при энтерите.

СИНДРО́М ЭНТЕРОГЕПАТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum enterohepaticum) — см. *Абрами синдром.*

СИНДРО́М ЭНТЕРОДЕРМАТОКАРДИОПАТИ́ЧЕСКИЙ (syndromum enterodermatocardiopathicum)— см. *Синдром карциоидный.*

СИНДРО́М ЭПИКО́НУСА (syndromum epiconicum; греч. epi над + анат. conus medullaris мозговой конус) — сочетание симметричных периферических парезов (параличей) стоп с отсутствием ахилловых рефлексов, диссоцированными расстройствами чувствительности по задненаружной поверхности бедра, голени, наружному краю стопы, у мужчин — нарушением эрекции, обусловленное поражением I и II крестцовых сегментов спинного мозга.

СИНДРО́М ЭПИЛЕПТИФО́РМНЫЙ (syndromum epileptiforme) — общее название пароксизмальных расстройств при различных органических поражениях головного мозга, сходных, а часто неотличимых от пароксизмальных расстройств, присущих эпилепсии.

СИНДРО́М ЯДРА́ ЛЬЮИСА — см. *Гемибаллизм.*

СИНДРО́М ЯЗЫКОГЛО́ТОЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi glossopharyngei) — сочетание дисфагии, ацестезии верхней половины глотки и одностороннего выпадения глоточного рефлекса с болями в области небных миндалин и боковых отделов глотки, возникающими при глотании и речи, а также с нарушениями слюноотделения и вкусовой чувствительности на задней трети языка; обусловлен поражением языкоглоточного нерва.

СИНДРО́М ЯЗЫ́ЧНОГО НЕ́РВА (syndromum nervi lingualis) — сочетание парестезий и нарушения поверхностной, а иногда и вкусовой чувствительности на передних двух третях половины языка; обусловлен поражением язычного нерва.

СИНДРО́М ЯРЕ́МНОГО ОТВЕ́РСТИЯ (syndromum foraminis jugularis; син. Верне — Сикара — Колле синдром) — сочетание пареза (паралича) мышц мягкого неба, гортани, грудиноключично-сосцевидной и трапециевидной мышц, дисфагии, расстройства вкусовой чувствительности на задней трети языка, гипестезии мягкого неба, задней стенки глотки и гортани, обусловленное поражением языкоглоточного, блуждающего и добавочного нервов при патологических процессах у основания черепа в области яремного отверстия.

СИНЕКРЫ́ЛЫ — см. *Paederus.*

СИНЕРГИ́ЗМ (греч. synergos вместе действующий) — 1) в физиологии (син. синергия) — совместное, сочетанное действие каких-либо органов или систем; 2) в фармакологии — совместное действие лекарственных веществ, взаимно усиливающее эффект действия каждого из них.

СИНЕРГИ́ЗМ АДДИТИ́ВНЫЙ — см. *Аддитивный эффект лекарственных веществ.*

СИНЕРГИ́Я (греч. synergia взаимодействие) — см. *Синергизм.*

СИНЕРГОАНТАГОНИ́ЗМ — взаимодействие двух лекарственных веществ, характеризующееся тем, что при одних дозах оно имеет форму синергизма, а при других — антагонизма.

СИНЕРГО́МЕТРЫ (истор.; *синергия* + греч. metreō измерять) — приборы для измерения синергии различных мышечных групп; разработаны Г. И. Россолимо.

СИНЕРЕ́ЗИС (греч. synairēsis сжатие, уменьшение)—самопроизвольное уменьшение объема студней и гелей за счет выделения части жидкой дисперсионной среды; С. наблюдается, напр., при образовании сгустка крови.

СИНЕСТЕЗИАЛГИ́Я (synaesthesialgia; *син-* + греч. aisthēsis ощущение, чувство + algos боль) — возникновение приступа боли при раздражении любого участка тела; симптом тяжелой формы каузалгии.

СИНЕСТЕЗИ́Я (synaesthesia; *син-* + греч. aisthēsis ощущение, чувство; син. соощущения) — возникновение при раздражении органа чувств наряду с адекватными каких-либо других ощущений (напр., ощущение цвета при слушании музыки).

СИНЕ́ХИИ (synechiae; греч. synecheia непрерывность, связанность, от *син-* + echō держать, иметь) — см. *Спайка(-и).*

СИНЕ́ХИИ ЗА́ДНИЕ в офтальмологии — см. *Спайки радужки задние.*

СИНЕ́ХИИ ПЕРЕ́ДНИЕ в офтальмологии — см. *Спайки радужки передние.*

СИНЕХИОТО́М (*синехия* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургический инструмент для пересечения спаек радужки, представляющий собой серпообразный нож на стержне, укрепленном в ручке.

СИНЕХОТОМИ́Я (synechotomia; *синехия* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение спаек радужки (чаще передних).

СИНИСТРО- (лат. sinister левый) — составная часть сложных слов, означающая «левый, левосторонний».

СИНИСТРОВЕ́РСИЯ МА́ТКИ (sinistroversio uteri; *синистро-* + лат. verto, versum вертеть, поворачивать) — положение матки, характеризующееся наклоном ее тела влево, а шейки вправо по отношению к оси малого таза.

СИНИСТРОВЕ́РСИЯ СЕ́РДЦА (sinistroversio cordis) — аномалия развития: расположение верхушки сердца в горизонтальной плоскости за грудиной вблизи средней линии тела; причем полые вены и правое предсердие расположены слева от средней линии; почти всегда сочетается с дефектами межпредсердной или межжелудочковой перегородки и стенозом легочной артерии.

СИНИСТРОПОЗИ́ЦИЯ МА́ТКИ (sinistropositio uteri; *синистро-* + лат. positio установка, положение) — положение матки, характеризующееся ее смещением от срединной линии таза влево.

СИНКАИНОГЕНЕ́З — см. *Криз половой новорожденных.*

СИНКАРДОНОТЕРАПИ́Я — метод физиотерапии, заключающийся в согласованном с систолой сердца ритмичном сдавливании тканей руки или ноги (с помощью пневматической манжеты) с целью улучшения периферического кровообращения при его недостаточности.

СИНКА́РИОН (syncaryon; *син-* + греч. karyon ядро) — см. *Амфикарион.*

СИНКИНЕЗИ́Я (synkinesia; *син-* + греч. kinēsis движение) — рефлекторное содружественное движение конечности (или иной части тела), сопутствующее произвольному движению другой конечности (части тела).

С. ГЛОБА́ЛЬНАЯ (s. globalis; син. С. спастическая) — патологическая С. в виде усиления сгибательной контрактуры в парализованной руке и разгибательной контрактуры в парализованной ноге при попытке движения парализованными конечностями или при активных движениях здоровыми конечностями, напряжении мускулатуры туловища и шеи, при кашле или чиханье; наблюдается при центральной гемиплегии.

С. ИМИТАЦИО́ННАЯ (s. imitationis) — патологическая С. в виде непроизвольного повторения парализованными конечностями произвольных движений здоровых конечностей другой стороны тела; наблюдается при центральной гемиплегии.

С. КООРДИНАТО́РНАЯ (s. coordinatoria) — патологическая С. в виде выполнения парализованными конечностями в процессе сложного целенаправленного двигательного акта таких движений, к-рые они не могут произвести изолированно; наблюдается при центральных параличах и парезах.

СИНКИНЕЗИ́Я ЛЕ́ЩЕНКО — см. *Лещенко синкинезия.*

С. ПАЛЬПЕБРОМАНДИБУЛЯ́РНАЯ (s. palpebromandibularis; анат. palpebra веко + mandibula нижняя челюсть) — см. *Гунна симптом.*

С. ПАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (s. pathologica) — общее название С. в парализованных конечностях, сопровождающих произвольные движения здоровых конечностей, и наблюдающихся у больных с центральными параличами.

С. СПАСТИ́ЧЕСКАЯ (s. spastica) — см. *Синкинезия глобальная.*

С. ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (s. physiologica) — общее название С., наблюдаемых при произвольных движениях у здорового человека.

СИНКОПЕ́ (syncope; греч. synkopē обморок) — см. *Обморок.*

СИНОБРОНХИ́Т (sinobronchitis) — см. *Синдром синус-бронхиальный.*

СИНОВИАЛО́МА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (synovialoma malignum; анат. membrana synovialis синовиальная оболочка + *-ома*) — см. *Саркома синовиальная.*

СИНОВИА́ЛЬНАЯ ЖИ́ДКОСТЬ (synovia, PNA, BNA, JNA; син. синовия) — вязкая жидкость, выделяемая синовиальной оболочкой в полость сустава и осуществляющая смазку и питание суставного хряща.

СИНОВИА́ЛЬНАЯ МЕМБРА́НА (membrana synovialis, PNA) — см. *Синовиальная оболочка.*

СИНОВИА́ЛЬНАЯ ОБОЛО́ЧКА (membrana synovialis, PNA; stratum synoviale, LNH; син.: синовиальная мембрана, синовиальный слой)— слой эндотелиальных клеток и подлежащей рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани, выстилающий полость сустава, сухожильное влагалище или синовиальную сумку.

СИНОВИА́ЛЬНАЯ СУ́МКА (bursa synovialis, PNA, JNA; bursa mucosa, BNA; син. слизистая сумка) — щелевидная полость, выстланная синовиальной оболочкой и содержащая синовиальную жидкость; С. с. расположены в местах наибольшего трения под кожей, мышцами, фасциями и сухожилиями.

СИНОВИА́ЛЬНОЕ СОЕДИНЕ́НИЕ — см. *Сустав.*

СИНОВИА́ЛЬНЫЙ СЛОЙ (stratum synoviale, LNH) — см. *Синовиальная оболочка.*

СИНОВИОАРТРИ́Т (synoviarthritis; анат. membrana synovialis синовиальная оболочка + греч. arthron сустав + *-ит*) — воспаление сустава с преимущественной локализацией патологического процесса в синовиальной оболочке.

СИНОВИО́МА (synovioma; анат. membrana synovialis синовиальная оболочка + *-ома*; син.: мезотелиома сустава, эндотелиома синовиальная) — опухоль, исходящая из клеток сухожильных влагалищ или синовиальных слизистых сумок.

С. ГИГАНТОКЛЕ́ТОЧНАЯ (s. gigantocellulare) — см. *Опухоль гигантоклеточная сухожильных влагалищ.*
С. ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (s. benignum) — см. *Опухоль гигантоклеточная сухожильных влагалищ.*
С. ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (s. malignum) — см. *Саркома синовиальная.*
С. КСАНТОМАТО́ЗНАЯ (s. xanthomatosum) — см. *Опухоль гигантоклеточная сухожильных влагалищ.*

СИНОВИОЭНДОТЕЛИО́МА (synovioendothelioma; анат. membrana synovialis синовиальная оболочка + *эндотелиома*) — см. *Опухоль гигантоклеточная сухожильных влагалищ.*

СИНОВИ́Т (synovitis; анат. membrana synovialis синовиальная оболочка + *-ит*) — воспаление синовиальной оболочки, не распространяющееся на остальные ткани и элементы сустава.
С. ВОРСИ́НЧАТЫЙ (s. villosa) — хронический С., при к-ром синовиальные ворсинки резко увеличены и сильно выдаются в полость сустава.
С. КРИСТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ — хронический С., обусловленный образованием кристаллических конкрементов в тканях или в полости сустава; обычно наблюдается при подагре или псевдоподагре.
С. РЕАКТИ́ВНЫЙ (s. reactiva) — С., вызванный токсическим или механическим воздействием или представляющий собой проявление аллергической реакции.
С. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ ГИПЕРПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (s. chronica hyperplastica) — хронический С., характеризующийся отеком, утолщением и фиброзным перерождением синовиальной оболочки.

СИНОВИ́Т ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (synovitis haemorrhagica) — см. *Синовит пигментный виллезонодулярный.*

СИНОВИ́Т ПИГМЕ́НТНЫЙ ВИЛЛЁЗОНОДУЛЯ́РНЫЙ (synovitis pigmentosa villosonodularis; син. синовит геморрагический) — ограниченная или диффузная гиперплазия синовиальных сухожильных влагалищ или синовиальных сумок суставов, характеризующаяся наличием в строме гистиоцитов, чаще с отложениями гемосидерина, ксантомных или многоядерных гигантских клеток.

СИНО́ВИЯ (synovia; вероятно, от *син-* + лат. ovum яйцо) — см. *Синовиальная жидкость.*

СИНОВЭКТОМИ́Я (synovectomia; анат. membrana synovialis синовиальная оболочка + *эктомия*) — хирургическая операция: иссечение синовиальной оболочки сустава, напр. при его туберкулезном поражении.

СИНОКАРОТИ́ДНАЯ ЗО́НА — рефлексогенная зона, расположенная в месте разветвления общей сонной артерии на наружную и внутреннюю, воспринимающая растяжение артериальной стенки и изменения концентрации кислорода и двуокиси углерода в крови; участвует в регуляции артериального давления и газового состава крови.

СИНОПСИ́Я (synopsia; *син-* + греч. opsis зрение) — возникновение определенных цветовых ощущений при прослушивании определенных звуков, чаще музыки; разновидность синестезии.

СИНОПТОФО́Р (греч. synoptikos обозревающий все вместе + phoros несущий; син. тропоскоп) — прибор для диагностики и лечения двигательных и сенсорных расстройств при косоглазии и гетерофории.

СИНОРХИ́ДИЯ (synorchidia; *син-* + греч. orchidion яичко) — аномалия развития: неопущение яичек в мошонку, обусловленное их срастанием с забрюшинной клетчаткой.

СИНОСТО́З (synostosis; *син-* + греч. osteon кость + *-оз*) — сращение отдельных костей между собой.
С. ВРОЖДЁННЫЙ (s. congenita) — С., образовавшийся как аномалия развития; встречается, напр., в костях предплечья или предплюсны, в позвонках, ребрах.
С. ИСКУ́ССТВЕННЫЙ (s. artificialis) — С., создаваемый с помощью хирургической операции.
С. ПОСТТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (s. posttraumatica) — С., образующийся после перелома рядом расположенных костей с формированием общей костной мозоли для всех отломков.

СИНОСТОЗИ́РОВАНИЕ — соединение костных отломков с целью создания оптимальных условий для сращения перелома.

СИНОТИ́Я (synotia; *син-* + греч. us, ōtos ухо) — аномалия развития: сращение слуховых косточек — молоточка, наковальни и стремени.

СИНПСИХАЛГИ́Я (*син-* + греч. psychē душевное состояние + algos боль) — возникновение болевого приступа под влиянием эмоций; симптом каузалгии.

СИ́НТЕЗ (греч. synthesis соединение) в психологии — психический процесс объединения отображаемых предметов и явлений в единое целое; совместно с анализом обеспечивает формирование понятий и мышление.

СИ́НТЕЗ АНТИТЕ́Л — см. *Антителообразование.*

СИ́НТЕЗ ФЕРМЕ́НТА ИНДУКЦИО́ННЫЙ — биосинтез какого-либо фермента в клетке, происходящий только при наличии веществ, превращения к-рых он катализирует.

СИ́НТЕЗ ФЕРМЕ́НТА КОНСТИТУТИ́ВНЫЙ — биосинтез какого-либо фермента в клетке, происходящий независимо от наличия веществ, превращения к-рых он катализирует.

СИНТЕЗА́ТОР ЭЛЕКТРОКАРДИОГРА́ММ (истор.) — специализированное электронное устройство, предназначавшееся для искусственного получения кривой, сходной по основным параметрам с электрокардиограммой человека при определенных вариантах нормы или при нек-рых часто встречающихся болезнях сердца.

СИНТЕТА́ЗЫ — см. *Лигазы.*

СИНТО́ННОСТЬ (греч. syntonia созвучность, согласованность) — особенность склада личности: сочетание внутренней уравновешенности с эмоциональной отзывчивостью и общительностью.

СИНТО́ННОСТЬ РЕГРЕССИ́ВНАЯ — повышенная общительность и откровенность больного, постоянная готовность излагать свои переживания, даже интимного характера, всем окружающим без учета ситуации и своего положения в обществе; особенность патологического склада личности, наблюдающаяся на поздних этапах развития шизофрении.

СИНТОПИ́Я (*син-* + греч. topos место, положение) — топографическое отношение органа к соседним анатомическим образованиям.

СИНТРОФИ́ЗМ (*син-* + греч. trophē питание) — способность двух ауксотрофных штаммов микроорганизмов расти на синтетической питательной среде, не содержащей необходимой аминокислоты, лишь при их совместном культивировании.

СИНТРОФОБЛА́СТ (syntrophoblastus; *син-* + *трофобласт*) — см. *Синцитиотрофобласт.*

СИ́НУС АО́РТЫ (sinus aortae, PNA, BNA, JNA) — общее название трех выпячиваний стенки аорты, соответствующих полулунным заслонкам клапана аорты.

СИ́НУС ЛЁГОЧНОГО СТВОЛА́ (sinus trunci pulmonalis, PNA) — общее название трех выпячиваний стенки легочного ствола, соответствующих полулунным заслонкам его клапана.

СИ́НУС МА́ЛОГО КРЫЛА́ (sinus alae parvae) — см. *Клиновидно-теменной синус.*

СИ́НУС ПО́ЛЫХ ВЕН (sinus venarum cavarum, PNA, BNA, JNA) — часть правого предсердия, в к-рую открываются устья верхней и нижней полых вен.

СИ́НУС СЕЛЕЗЁНКИ (sinus lienis, PNA) — общее название расширенных начальных отделов внутриорганной венозной системы селезенки, расположенных в красной пульпе; в С. с. депонируется кровь.

СИ́НУС ТВЁРДОЙ МОЗГО́ВОЙ ОБОЛО́ЧКИ (sinus durae matris, PNA, BNA, JNA; син. пазуха твердой мозговой оболочки) — общее название неспадающих каналов, образованных расщеплением твердой оболочки головного мозга, куда оттекает кровь из вен головного мозга и попадает во внутреннюю яремную вену; С. т. м. о. сообщаются с диплоическими венами и венами свода черепа.

СИНУСИ́Т (sinusitis; анат. sinus paranasalis околоносовая пазуха + *-ит*; син. синусит параназальный) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких околоносовых пазух.
С. ВАЗОМОТО́РНЫЙ (s. vasomotoria) — С., характеризующийся быстро преходящим отеком слизистой оболочки и транссудацией серозной жидкости.
С. ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНО́Й (s. maxillaris) — см. *Гайморит.*
С. ПАРАНАЗА́ЛЬНЫЙ (s. paranasalis) — см. *Синусит.*

СИ́НУСНО-ПРЕДСЕ́РДНЫЙ У́ЗЕЛ (nodus sinuatrialis; син.: Киса — Флека узел, синусный узел) — скопление проводящих сердечных миоцитов, расположенное под эпикардом между ушком правого предсердия и местом впадения верхней полой вены; начальная часть проводящей системы сердца, содержащая у человека номотопный очаг автоматизма сердца.

СИ́НУСНЫЙ СТОК (confluens sinuum, PNA, BNA, JNA; син. Герофила жом) — соединение поперечных, верхнего сагиттального, затылочного и прямого синусов твердой мозговой оболочки, расположенное на внутренней поверхности чешуи затылочной кости вблизи внутреннего затылочного выступа.

СИ́НУСНЫЙ У́ЗЕЛ — см. *Синусно-предсердный узел.*

СИ́НУСОВЫЙ И́МПУЛЬС — импульс возбуждения миокарда, возникающий в синусно-предсердном узле.

СИНУСОГРАФИ́Я (анат.. sinus duraе matris синус твердой мозговой оболочки + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография синусов твердой мозговой оболочки и вен головного мозга после введения в них контрастного вещества.

С. КАТЕТЕРИЗАЦИО́ННАЯ — С., при к-рой синусы заполняют контрастным веществом через тонкий катетер, введенный в одну из поверхностных вен головы или шеи.

С. ПРЯМА́Я — С. у детей раннего возраста, при к-рой контрастное вещество вводят путем пункции незаросшего родничка.

С. ПУНКЦИО́ННАЯ — С., при к-рой контрастное вещество вводят путем пункции синуса при операции на головном мозге или через специально наложенное трепанационное отверстие.

С. РЕТРОГРА́ДНАЯ — С., при к-рой контрастное вещество вводят через вены шеи или мягких покровов черепа.

СИНУСО́ИДЫ ПЕ́ЧЕНИ (vasa hemocapillaria sinusoidea, LNH) — синусоидные капилляры, ответвляющиеся от междольковых вен и проходящие в дольках печени.

СИНУСОПНЕВМОПАТИ́Я (анат. sinus пазуха + греч. pneumōn легкое + pathos страдание, болезнь) — см. *Аденосинусопневмопатия.*

СИНУСОСКОПИ́Я (анат. sinus пазуха + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — см. *Антроскопия.*

СИНУСОТОМИ́Я (sinusotomia; анат. sinus пазуха + греч. tomē разрез, рассечение) в офтальмологии — хирургическая операция при лечении глаукомы, заключающаяся во вскрытии наружной стенки венозного синуса склеры по линии его проекции на поверхность глазного яблока.

СИНУСОТРАБЕКУЛОТОМИ́Я (sinusotrabeculotomia; *синусотомия* + *трабекулотомия*)— хирургическая операция при лечении глаукомы, представляющая собой сочетание синусотомии и трабекулотомии.

СИНУСТРОМБО́З (sinusothrombosis; анат. sinus пазуха + *тромбоз*) — тромбофлебит сигмовидного синуса; возникает как осложнение гнойного среднего отита.

СИНФАЛАНГИ́Я (synphalangia; *син-* + греч. phalanx, phalangos фаланга пальца) — аномалия развития: сращение фаланг пальцев рук или ног.

СИНХЕЙЛИ́Я (syncheilia; *син-* + греч. cheilos губа) — срастание верхней и нижней губ; возникает как аномалия развития или в результате рубцевания поврежденных или пораженных патологическим процессом тканей.

СИ́НХИ МЕ́ТОД (G. B. Sinha) — ориентировочный способ определения скорости кровотока в системе воротной вены, основанный на быстром всасывании паров этилового эфира слизистой оболочкой толстой кишки и заключающийся в регистрации времени, через к-рое исследуемый ощущает запах эфира после введения его паров в прямую кишку.

SYNCHÝSIS SCINTÍLLANS (греч. synchysis смешение, разрушение; лат. scintillans сверкающий, мерцающий) — наблюдаемое в свете щелевой лампы перемещение золотистых блестящих точек в стекловидном теле, обусловленное его разжижением с образованием кристаллов холестерина и солей кальция на сохранившихся обрывках фибрилл.

СИНХОНДРО́З (synchondrosis, PNA, BNA, JNA; *син-* + греч. chondros хрящ + *-оз*; син. хрящевое соединение) — непрерывное соединение костей (или частей одной кости) посредством хрящевой ткани.

СИНЦИТИА́ЛЬНЫЙ СЛОЙ ТРОФОБЛА́СТА — см. *Синцитиотрофобласт.*

СИНЦИ́ТИЙ (syncytium; *син-* + гист. cytus клетка; син. соклетие) — сетевидная структура, состоящая из клеток, контактирующих друг с другом цитоплазматическими отростками.

С. СЕРТО́ЛИЕВ — см. *Сертолиев синцитий.*

С. СКЕЛЕТОГЕ́ННЫЙ (s. skeletogenum) — образованный клетками мезенхимы С., из к-рого развивается хрящевая ткань.

СИНЦИ́ТИЙ ТРОФОБЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (нрк) — см. *Синцитиотрофобласт.*

СИНЦИ́ТИЙ ХОРИА́ЛЬНЫЙ (нрк) — см. *Синцитиотрофобласт.*

СИНЦИТИОТРОФОБЛА́СТ (syncytiotrophoblastus, LNE; *синцитий* + *трофобласт*; син.: плазмодиотрофобласт, синтрофобласт, синцитиальный слой трофобласта, синцитий трофобластический — нрк, синцитий хориальный — нрк) — поверхностный слой трофобласта зародыша человека, представляющий собой симпласт с гигантскими и фрагментированными ядрами; выполняет функцию всасывания питательных веществ из крови матери и вырабатывает гистолитические ферменты, способствующие внедрению ворсин хориона в ткани матки.

СИНЬОРЕ́ЛЛИ ПРИ́ЗНАК (A. Signorelli, 1876—1952, итал. врач) — болезненность при пальпации в ретромандибулярной точке; признак менингита.

СИНЯ́К — см. *Кровоподтек.*

СИРЕ́НА (siren; греч. seirēn сирена) — см. *Сиреномелия.*

СИРЕНОМЕЛИ́Я (sirenomelia; греч. seirēn сирена + melos часть тела, конечность; син.: симпус, сирена) — аномалия развития: сращение нижних конечностей.

СИРЕ́ТТА — см. *Шприц-тюбик.*

СИРИНГ- (сиринго-; греч. syrinx, syringos трубка, трубчатая полость) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к какому-либо полому образованию, напр. каналу или свищу».

СИРИНГО- — см. *Сиринг-.*

СИРИНГОАДЕНО́МА (syringoadenoma; *сиринго-* + *аденома*; син.: невус сирингоцистаденоматозный, невус эккринный, сирингоцистаденома, сирингоцистаденома невиформная, сирингоцистома) — аденома выводного протока потовой железы; локализуется на волосистой части головы.

СИРИНГОБУЛЬБИ́Я [syringobulbia; *сиринго*(*миелия*) + анат. устар. bulbus medullae продолговатый мозг] — вариант сирингомиелии, характеризующийся поражением продолговатого мозга; проявляется диссоциированным расстройством чувствительности на лице в зонах Зельдера и постепенно нарастающими признаками бульбарного паралича.

СИРИНГО́МА (syringoma; *сиринг-* + + *-ома*) — аномалия развития, при к-рой потовые железы состоят из мелких кист, соединенных короткими тяжами из небольших темных клеток.

СИРИНГОМИЕ́ЛИЯ (syringomyelia; *сиринго-* + греч. myelos мозг) — хроническая болезнь нервной системы с преимущественным поражением спинного мозга, характеризующаяся образованием в нем полостей и разрастаний глии; проявляется диссоциированным расстройством поверхностной чувствительности, периферическими параличами и трофическими нарушениями.

СИРИНГОЦИСТАДЕНО́МА (syringocystadenoma; *сиринго-* + *цистаденома*) — см. *Сирингоаденома.*

СИРИНГОЦИСТАДЕНО́МА НЕВИФО́РМНАЯ (syringocystadenoma naeviforme) — см. *Сирингоаденома.*

СИРИНГОЦИСТО́МА (syringocystoma; *сиринго-* + *кистома*) — см. *Сирингоаденома.*

СИРИНГОЭПИТЕЛИО́МА АПА́ТЕНКО (*сиринго-* + *эпителиома*) — см. *Апатенко сирингоэпителиома.*

СИ́РМАИ МЕ́ТОД (E. Szirmai, род. в 1922 г., венгерский терапевт) — метод определения содержания свободного гепарина в плазме крови по степени укорочения тромбинового времени после введения в исследуемую пробу красителя толуидинового синего, связывающего и тем самым инактивирующего гепарин.

СИ́РОП (sirupus) в фармации — жидкая лекарственная форма, представляющая собой смесь лекарственного средства с концентрированным раствором сахара или иного сладкого компонента.

СИРОТИ́НИНА МЕ́ТОД (Н. Н. Сиротинин, род. в 1896 г., сов. патофизиолог) — см. *Оксигенация энтеральная беззондовая.*

СИРОТИ́НИНА — КУКОВЕ́РОВА СИМПТО́М (В. Н. Сиротинин, отеч. терапевт; Н. Г. Куковеров, отеч. терапевт) — появление (или усиление) систолического шума в точке выслушивания аортального клапана при поднятых больным руках (напр., при положении кистей рук на затылке); признак атеросклероза восходящего отдела грудной аорты.

СИРО́ТСКИЙ ДОМ (истор.) — см. *Воспитательный дом.*

СИСТЕ́МА[1] (греч. systēma целое, составленное из частей; соединение) — совокупность каких-либо элементов, связанных между собой и рассматриваемых как единое и функциональное структурное целое.

СИСТЕ́МА[2] организма — совокупность органов и (или) тканей, взаимосвязанных анатомически и (или) функционально, как правило, имеющих общее происхождение и общие черты строения.

С. АТРИОВЕНТРИКУЛЯ́РНАЯ — см. *Система предсердно-желудочковая.*

С. АФФЕРЕ́НТНАЯ — часть нервной С., функцией к-рой является преобразование энергии раздражения в нервные импульсы и их проведение в центральную первную С.

С. ВЕСТИБУЛОМОЗЖЕЧКО́ВАЯ — часть нервной С., включающая вестибулярные ядра ствола головного мозга, вестибулярный отдел мозжечка и их проводящие пути; выполняет функции регуляции положения тела и его частей в прост-

ранстве, сохранения равновесия тела и координации движений.

С. ГИПОТАЛА́МО-ГИПО́ФИЗА́РНАЯ — С., включающая гипоталамус и гипофиз: участвует в регуляции функций щитовидной железы, надпочечников, половых желез, а также процессов роста и развития организма.

С. ДЫХА́ТЕЛЬНАЯ (s. respiratorium, JNA) — см. *Аппарат дыхательный.*

С. КРОВЕНО́СНАЯ — С., состоящая из сердца и кровеносных сосудов; осуществляет транспорт веществ с кровью.

С. ЛИМБИ́ЧЕСКАЯ — часть центральной нервной С., включающая участки коры полушарий большого мозга, расположенные преимущественно на их медиальной поверхности, тесно связанные с ними подкорковые образования (базальные ядра, часть ядер таламуса, гипоталамус, поводок), а также многочисленные проводящие пути; участвует в регуляции сна и бодрствования, эмоций, мотиваций и других наиболее общих состояний и реакций организма.

С. ЛИМФАТИ́ЧЕСКАЯ (s. lymphaticum, PNA, BNA; vasa lymphacea, JNA) — С., состоящая из лимфатических сосудов и расположенных по их ходу лимфатических узлов; осуществляет всасывание из тканей воды, коллоидных растворов, эмульсий и взвесей нерастворимых частиц и перемещение лимфы в кровеносное русло.

С. МАКРОФА́ГОВ [s. macrophagorum, LNH; син.: аппарат ретикулоэндотелиальный, ретикулоэндотелий, ретотелий, система мононуклеарных фагоцитов, С. ретикулоэндотелиальная (РЭС), ткань ретикулоэндотелиальная] — С., включающая все клетки организма, способные поглощать из крови коллоидные частицы, фагоцитировать бактерии и откладывать их в цитоплазме в виде характерных зерен; С. м. участвует в формировании иммунитета и поддержании постоянства внутренней среды организма.

С. МОНОНУКЛЕА́РНЫХ ФАГОЦИ́ТОВ — см. *Система макрофагов.*

С. МОЧЕПОЛОВА́Я (s. urogenitale, JNA) — см. *Аппарат мочеполовой.*

С. МЫ́ШЕЧНАЯ (s. musculorum, JNA) — С., состоящая из скелетных мышц их вспомогательного аппарата; осуществляет активные движения тела и его частей.

С. НЕ́РВНАЯ (s. nervosum, PNA; s. nervorum, JNA) — С. нейронов и вспомогательных элементов (гл. обр. нейроглии), осуществляющая в тесной связи с эндокринной С. регуляцию и координацию функций всех других органов и систем, обеспечивая единство организма и его приспособление к условиям окружающей среды.

С. НЕ́РВНАЯ АВТОНО́МНАЯ (s. nervosum autonomicum, PNA) — см. *Система нервная вегетативная.*

С. НЕ́РВНАЯ ВЕГЕТАТИ́ВНАЯ (s. nervosum autonomicum, PNA; син.: С. нервная автономная, С. нервная висцеральная — устар.) — отдел нервной С., иннервирующий внутренние органы, гладкие мышцы, железы, кровеносные и лимфатические сосуды, а также осуществляющий адаптационно-трофическую функцию по отношению ко всем тканям и органам; С. н. в. разделяют на симпатическую и парасимпатическую части.

С. НЕ́РВНАЯ ВИСЦЕРА́ЛЬНАЯ (устар.) — см. *Система нервная вегетативная.*

С. НЕ́РВНАЯ ПАРАСИМПАТИ́ЧЕСКАЯ (s. nervorum parasympathicum, JNA) — см. *Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы.*

С. НЕ́РВНАЯ ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКАЯ (s. nervosum periphericum, PNA; s. nervorum periphericum, BNA, JNA) — часть нервной С., включающая нервы, внеорганные и внутриорганные нервные узлы и сплетения, чувствительные и двигательные нервные окончания.

С. НЕ́РВНАЯ СИМПАТИ́ЧЕСКАЯ (s. nervorum sympathicum, BNA, JNA) — см. *Симпатическая часть вегетативной нервной системы.*

С. НЕ́РВНАЯ ТРОФОТРО́ПНАЯ (греч. trophē питание + tropos поворот, направление) — часть вегетативной нервной С., выделяемая по функциональному признаку и не относимая к определенной структурной базе; осуществляет регуляцию анаболизма и поддержание гомеостаза в периоды отдыха.

С. НЕ́РВНАЯ ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ (s. nervosum centrale, PNA; s. nervorum centrale, BNA, JNA) — часть нервной С., включающая у человека головной и спинной мозг.

С. НЕ́РВНАЯ ЭРГОТРО́ПНАЯ (греч. ergon действие + tropos направление) — часть вегетативной нервной С., выделяемая по функциональному признаку и не относимая к определенной структурной базе; осуществляет регуляцию катаболических процессов, обеспечивая приспособление к изменению условий окружающей среды, физическую и психическую деятельность.

С. ОПТИ́ЧЕСКАЯ ГЛА́ЗА (син. аппарат светопреломляющий глаза) — С., состоящая из оптических сред глаза (роговицы, водянистой влаги, жидкости, хрусталика, стекловидного тела), обеспечивающая формирование изображений на сетчатке.

С. ПАЛЛИДОСТРИА́ЛЬНАЯ (анат. globus pallidus бледный шар + corpus striatum полосатое тело) — см. *Система стриопаллидарная.*

С. ПИРАМИ́ДНАЯ — С., состоящая из проекционных эфферентных нервных путей, начинающихся в коре предцентральных извилин и идущих к двигательным ядрам черепных нервов и к мотонейронам передних рогов спинного мозга (пирамидных путей); участвует в осуществлении произвольных движений.

С. ПИЩЕВАРИ́ТЕЛЬНАЯ (s. digestorium, JNA) — см. *Аппарат пищеварительный.*

С. ПРЕДСЕ́РДНО-ЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (s. atrioventriculare; син. С. атриовентрикулярная) — часть проводящей С. сердца, состоящая из предсердно-желудочковых узлов, предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса) и его разветвлений, по к-рым возбуждение распространяется на миокард желудочков.

С. РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИА́ЛЬНАЯ (s. reticuloendotheliale, LNH) — см. *Система макрофагов.*

С. РЕТИКУЛЯ́РНАЯ АКТИВИРУЮЩАЯ — С., включающая ретикулярную формацию продолговатого и среднего мозга, оказывающая активирующее влияние на кору полушарий большого мозга.

С. СЕНСО́РНАЯ — С., включающая афферентную систему и органы чувств, обеспечивающая преобразование энергии раздражения в энергию нервных импульсов и их проведение в центральную нервную С.

С. СЕРДЕ́ЧНО-СОСУ́ДИСТАЯ (s. cardiovasculare, LNH) — С., объединяющая кровеносную и лимфатическую С.

С. СЕ́РДЦА ПРОВОДЯ́ЩАЯ (s. conducens cardiacum, LNH) — С. проводящих сердечных миоцитов, передающая импульсы возбуждения из очага автоматизма сердца к миокарду предсердий и желудочков.

С. СТРИОПАЛЛИДА́РНАЯ (анат. corpus striatum полосатое тело + globus pallidus бледный шар; син.: С. паллидостриальная, стриопаллидум) — часть экстрапирамидной С., включающая ядра полосатого тела с их афферентными и эфферентными путями.

С. ХРОМАФФИ́ННАЯ — см. *Ткань хромаффинная.*

С. ЭКСТРАПИРАМИ́ДНАЯ — С., состоящая из проекционных эфферентных нервных путей, начинающихся в коре большого мозга, включающая ядра полосатого тела, нек-рые ядра ствола мозга и мозжечок; осуществляет координацию движений и регуляцию мышечного тонуса.

С. ЭНДОКРИ́ННАЯ — С., включающая железы внутренней секреции; наряду с нервной С. осуществляет регуляцию и координацию функций всех других органов и систем, обеспечивая единство организма и его приспособление к условиям окружающей среды.

С. ЭФФЕ́КТОРНАЯ — С., включающая эфферентную С. и исполнительные органы и ткани (мышцы, железы и др.).

С. ЭФФЕРЕ́НТНАЯ — часть нервной С., функцией к-рой является передача нервных импульсов из центральной нервной С. к исполнительным органам и тканям (мышцам, железам и др.).

Т-СИСТЕ́МА — см. *Поперечная трубочка.*

СИСТЕ́МА АДАПТИ́ВНАЯ — система, автоматически изменяющая алгоритмы своего функционирования и (или) структуру для достижения оптимального состояния при изменении внешних условий; различают самонастраивающиеся, самообучающиеся и самоорганизующиеся С. а.; живые организмы и их сообщества могут рассматриваться как С. а.

СИСТЕ́МА АДЕНИ́ЛОВАЯ — совокупность аденилловой кислоты и ее производных, взаимные превращения к-рых играют важную роль в процессах энергетического и нек-рых других видов обмена в организме.

СИСТЕ́МА АДРЕНОРЕАКТИ́ВНАЯ — см. *Адренорецепторы.*

СИСТЕ́МА АНТИСВЁРТЫВАЮЩАЯ КРО́ВИ — совокупность содержащихся в крови веществ, препятствующих образованию кровяного сгустка и его ретракции.

СИСТЕ́МА БЕСКЛЕ́ТОЧНАЯ — смесь веществ, содержащая отдельные клеточные компоненты или структуры, напр. рибосомы; различные С. б. используются для изучения отдельных биохимических реакций или процессов синтеза макромолекул.

СИСТЕ́МА БИОТЕХНИ́ЧЕСКАЯ — система, включающая биологические объекты и технические устройства, напр. бортовая С. б. космического корабля, технологические системы в микробиологической промышленности.

СИСТЕ́МА БУ́ФЕРНАЯ — совокупность находящихся в растворе веществ, благодаря к-рым при разбавлении или концентрировании раствора, а также при добавлении к нему небольших количеств кислот или щелочей водородный показатель (pH) раствора сохраняется (в известных пределах) постоянным; С. б. крови играет важную роль в поддержании гомеостаза организма.

СИСТЕ́МА ВАКУОЛЯ́РНАЯ — совокупность вакуолей и канальцев в цитоплазме, включающая эндоплазматическую сеть и пластинчатый комплекс (комплекс Гольджи).

СИСТЕ́МА ДЕПРЕССО́РНАЯ (лат. deprimo, depressum угнетать, подавлять) — совокупность физиологических механизмов, снижающих артериальное давление в случае его повышения и тем самым поддерживающих оптимальный уровень артериального давления.

СИСТЕ́МА ДРЕНА́ЖНАЯ КЛА́ПАННАЯ — приспособление для отведения цереброспинальной жидкости из боковых желудочков головного мозга в кровеносное русло или в брюшную полость, состоящее из катетеров, соединительных деталей и клапанного устройства, препятствующего обратному току жидкости; накладывается, напр., при гидроцефалии.

СИСТЕ́МА ЖИЗНЕОБЕСПЕ́ЧЕНИЯ — комплекс технических, физико-химических и биологических средств, обеспечивающих создание и поддержание необходимых условий для жизнедеятельности человека (снабжение кислородом, водой, пищевыми веществами, удаление вредных продуктов обмена и др.) в изолированных обитаемых сооружениях (напр., в подводных лодках, космических кораблях, орбитальных станциях).

СИСТЕ́МА ИММЕРСИО́ННАЯ (лат. immergo, immersum погружать, окунать) — оптическая система микроскопа, рассчитанная на заполнение пространства между объектом и первой линзой объектива специальной жидкостью, что позволяет повышать разрешающую способность прибора.

СИСТЕ́МА ИНФОРМАЦИО́ННО-ПОИСКО́ВАЯ — совокупность средств хранения, поиска и выдачи по запросу нужной информации; различные С. и.-п. применяются в автоматизированных системах управления здравоохранением, при научных исследованиях и др.

СИСТЕ́МА КАЛЛИКРЕЙН-КИНИ́НОВАЯ — совокупность веществ, находящихся в тканях организма, являющихся предшественниками кининов и калликреинов, а также активаторами и ингибиторами их превращений, приводящих к образованию и последующему разрушению кининов; С. к.-к. участвует в регуляции тонуса и проницаемости сосудистой стенки и играет важную роль в патогенезе воспаления и аллергических реакций.

СИСТЕ́МА КУ́БА (син. кубическая система отведений векторкардиограммы) — система отведений векторкардиограммы, позволяющая зарегистрировать проекцию сердечного вектора на три взаимно перпендикулярные плоскости — фронтальную, сагиттальную и горизонтальную.

СИСТЕ́МА ЛЕЧЕ́НИЯ НА МЕ́СТЕ (истор.) — способ организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск, при к-ром преобладает лечение раненых и больных вблизи района боевых действий с максимальным ограничением их эвакуации за пределы действующей армии.

СИСТЕ́МА НЕСТЕСНЕ́НИЯ — система содержания психически больных, при к-рой им предоставлена свобода перемещения внутри больничного отделения и исключено применение насилия (механическая фиксация, смирительные рубашки, помещение в изолятор и др.).

СИСТЕ́МА ОТКРЫ́ТЫХ ДВЕРЕ́Й — система содержания психически больных, при к-рой им предоставлена свобода перемещения за пределы больничного отделения по территории больницы.

СИСТЕ́МА ПИРАМИ́ДАЛЬНАЯ АКУЛИ́НИЧЕВА — см. *Акулиничева пирамидальная система.*

СИСТЕ́МА ПОВОРО́ТНО-ПРОТИВОТО́ЧНАЯ — физиологический механизм реабсорбции воды и ионов натрия в петле нефрона, основанный на различной проницаемости для них стенок восходящего и нисходящего колен петли и заключающийся в том, что реабсорбция воды в восходящем колене способствует реабсорбции натрия в нисходящем и наоборот.

СИСТЕ́МА ПРИЛИ́ВНАЯ МОНРО́ — см. *Монро приливная система.*

СИСТЕ́МА ПРОПЕРДИ́НОВАЯ — система, состоящая из содержащихся в сыворотке крови пропердина, комплемента, ионов магния и кальция, обладающая бактерицидным действием, особенно в отношении грамотрицательных бактерий, и вируснейтрализующим действием; один из механизмов естественного иммунитета.

СИСТЕ́МА ПРОПРИОЦЕПТИ́ВНОГО ОБЛЕГЧЕ́НИЯ — см. *Кабата метод.*

СИСТЕ́МА РЕНИ́Н-АНГИОТЕНЗИ́Н-АЛЬДОСТЕРО́НОВАЯ (син. система ренин-ангиотензинная) — совокупность последовательно образующихся в организме биологически активных веществ, участвующих в регуляции водно-солевого обмена и артериального давления; включает ренин, ангиотензиноген, ангиотензины и альдостерон.

СИСТЕ́МА РЕНИ́Н-АНГИОТЕНЗИ́ННАЯ — см. *Система ренин-ангиотензин-альдостероновая.*

СИСТЕ́МА СВЁРТЫВАЮЩАЯ КРО́ВИ — 1) совокупность содержащихся в плазме форменных элементах крови (гл. обр., в тромбоцитах) и в тканях (печени, селезенки, сосудистой стенки, костного мозга и др.) веществ, обусловливающих образование кровяного сгустка и его ретракцию; 2) в широком смысле — совокупность факторов, участвующих в процессах свертывания крови или воздействующих на их протекание.

СИСТЕ́МА СИГНА́ЛЬНАЯ ВТОРА́Я — свойственная человеку система условнорефлекторных связей, формирующихся в высших отделах ц. н. с. при воздействии речевых сигналов; возникает на базе первой сигнальной системы.

СИСТЕ́МА СИГНА́ЛЬНАЯ ПЕ́РВАЯ — система условнорефлекторных связей, формирующихся в коре полушарий большого мозга животных и человека при воздействии конкретных раздражителей (свет, звук и др.).

СИСТЕ́МА ФИБРИНОЛИТИ́ЧЕСКАЯ КРО́ВИ — совокупность содержащихся в крови веществ (плазминоген, плазмин, фибринокиназы), обеспечивающая растворение фибринового сгустка, напр. при восстановлении проходимости тромбированных сосудов.

СИСТЕ́МА ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ по П. К. Анохину — динамическая саморегулирующаяся система, состоящая из различно локализованных структур и протекающих в них физиологических процессов, все составные компоненты к-рой содействуют достижению определенного результата, полезного для системы и организма в целом.

СИСТЕ́МА ЦИКЛА́ЗНАЯ — система, состоящая из содержащихся в клетке аденозинциклофосфата, аденилатциклазы и фосфодиэстеразы, регулирующая проницаемость клеточных мембран; участвует в регуляции многих обменных процессов живой клетки, опосредует действие нек-рых гормонов.

СИСТЕ́МА ЧЕЛОВЕ́К—МАШИ́НА — система управления, в к-рой человек (группа людей) управляет техническим устройством для достижения определенной цели (напр., производства материальных ценностей); С. ч.— м. является предметом изучения в эргономике и инженерной психологии.

СИСТЕ́МА ЭКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (син. экосистема) — природный комплекс животных, растений и элементов среды их обитания (вода, воздух, почва), связанных между собой обменом веществ и энергии; С. э. могут быть различного типа — лесной массив, озера и т. д.

СИСТЕМА́ТИКА (греч. systēmatikos соединенный в целое, упорядоченный) в биологии — наука, изучающая сходство и различие всех организмов, а также родственные связи между ними, разделяющая их на соподчиненные группы (таксоны) с целью построения полной системы (классификации) органического мира.

СИСТЕМАТИ́ЧЕСКАЯ КАТЕГО́РИЯ в биологии — см. *Таксономическая категория.*

СИСТЕ́МНЫЙ ПОДХО́Д — направление методологии научного познания и практики, в основе к-рого лежит рассмотрение сложного объекта как целостного множества элементов со всеми отношениями и связями между ними.

СИСТЕМОГЕНЕ́З (*система* + греч. genesis происхождение, развитие) — процесс формирования функциональных систем и их отдельных частей в ходе фило- и онтогенеза.

СИСТЕМОТЕ́ХНИКА МЕДИЦИ́НСКАЯ — теория проектирования, испытания и эксплуатации сложных технических систем медицинского назначения.

СИ́СТОЛА (греч. systolē, от systellō сокращать, стягивать; син. С. сердца)— фаза сердечного цикла, состоящая из последовательно протекающих сокращений миокарда предсердий и желудочков.

С. ЖЕЛУ́ДОЧКОВ — сокращение миокарда желудочков, в результате чего кровь из сердца поступает в большой и малый круг кровообращения и в венечные артерии сердца.

С. ПРЕДСЕ́РДИЙ — сокращение миокарда предсердий, в результате чего кровь из предсердий поступает в желудочки.

С. СЕ́РДЦА — см. *Систола.*

СИСТОЛИ́ЧЕСКАЯ ЭКСПА́НСИЯ ПРЕДСЕ́РДИЯ — расширение рентгеновской тени предсердия при систоле желудочков, обусловленное возвратом крови через дефект предсердно-желудочкового клапана; признак недостаточности этого клапана.

СИСТОЛИ́ЧЕСКИЙ И́НДЕКС (син. систолический показатель) — показатель функционального состояния сердца: отношение ударного объема сердца к поверхности тела исследуемого, выраженное в *мл/м²*.

СИСТОЛИ́ЧЕСКИЙ ОБЪЁМ КРО́ВИ — см. *Ударный объем сердца.*

СИСТОЛИ́ЧЕСКИЙ ОБЪЁМ СЕ́РДЦА — см. *Ударный объем сердца.*

СИСТОЛИ́ЧЕСКИЙ ПОКАЗА́ТЕЛЬ — см. *Систолический индекс.*

СИСТОЛИ́ЧЕСКОЕ ДАВЛЕ́НИЕ — см. *Артериальное давление систолическое.*

СИСТОЛИ́ЧЕСКОЕ ДРОЖА́НИЕ — пальпаторно определяемое в фазе систолы дрожание грудной клетки в прекордиальной области; наблюдается при выраженных пороках сердца, сопровождаемых грубым систолическим шумом.

СИТЕ́НКО ОПЕРА́ЦИЯ (М. И. Ситенко, 1885—1940, сов. хирург) — хирургическая операция: восстановление крестообразных связок коленного сустава путем пересадки со здоровой ноги полоски широкой фасции бедра, к-рую укрепляют в области надмыщелков бедра.

СИ́ТИ — см. *Беджель.*

СИТИОМАНИ́Я (греч. sition пища + *мания*) — см. *Ситомания.*

СИТКО́ВСКОГО МЕ́ТОД (П. П. Ситковский, 1882—1933, сов. хирург) — метод сухой стерилизации кетгута парами йода.

СИТКО́ВСКОГО СИМПТО́М (П. П. Ситковский) — усиление боли в правой подвздошной области после поворота лежащего больного на левый бок; признак острого аппендицита.

СИТОМАНИ́Я (sitomania; греч. sitos пища + *мания*; син.: ситиомания, эстиомания) — резко повышенная потребность в пище, осознаваемая как проявление болезни.

СИТОФОБИ́Я (sitophobia; греч. sitos пища + *фобия*) — 1) боязнь приема пищи, напр. при тяжелом эзофагите, язвенной болезни, упорном поносе; 2) навязчивый страх — боязнь приема пищи; наблюдается гл. обр. при неврозах, психопатиях; 3) полный или частичный отказ от пищи по бредовым мотивам при наличии сохранного аппетита; наблюдается при психозах.

SÍTUS RÁRIOR (лат. «редкое расположение») — см. *Situs viscerum inversus.*

SÍTUS TRANSVÉRSUS (лат. «поперечное расположение») — см. *Situs viscerum inversus.*

SÍTUS VÍSCERUM INVÉRSUS (лат. «извращенное положение внутренностей»; син.: situs rarior, situs transversus, транспозиция органов) — аномалия развития: расположение внутренних органов, противоположное нормальному относительно сагиттальной плоскости (печень находится слева, сердце — справа и т. п.).

СИФАЦИО́З (syphaciosis) — гельминтоз крыс и мышей, вызываемый нематодой Syphacia obvelata, паразитирующей в кишечнике; человек заражается редко, при проглатывании яиц гельминта с загрязненной пищей.

СИФИЛИ́Д (syphilidum; *сифилис* + греч. -eidēs подобный) — сыпь при сифилисе.

С. БУГОРКО́ВЫЙ (s. tuberculosum) — С. при третичном сифилисе в виде полушаровидных бугорков синюшно-красного цвета; после С. б. остается мозаичный рубец.

С. ВЕЗИКУЛЁЗНЫЙ (s. vesiculosum) — С. при вторичном сифилисе в виде бляшки, на поверхности к-рой сгруппированы пузырьки.

С. ГИПЕРКЕРАТОТИ́ЧЕСКИЙ (s. hyperkeratoticum) — см. *Мозоль сифилитическая.*

С. ГУММО́ЗНЫЙ (s. gummosum) — см. *Гумма сифилитическая.*

С. ЛИВЕДОПОДО́БНЫЙ (s. livedoideum; лат. livedo синяк, кровоподтек) — С. в виде розеолы, на поверхности к-рой наблюдается сетевидное расширение капилляров.

С. ЛИХЕНО́ИДНЫЙ (s. lichenoideum; *лихен* + греч. -eidēs подобный) — см. *Сифилид папулезный милиарный.*

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ (s. papulosum) — С. при вторичном сифилисе в виде папулезной сыпи медно-красного цвета с появляющимся в стадии регрессирования папулы шелушащимся венчиком.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ БЛЯШКОВИ́ДНЫЙ (s. papulosum placatum) — С. в виде бляшек, образующихся в результате слияния монетовидных папул.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ ВЕГЕТИ́РУЮЩИЙ (s. papulosum vegetans) — см. *Кондилома широкая.*

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ КЕРИОНОФО́РМНЫЙ (s. papulosum kerionoforme; греч. kerion медовые соты + лат. -formis подобный) — С. в виде инфильтрированных бляшек с нагнаивающимися изъязвлениями на поверхности.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ ЛАДО́НЕЙ И ПОДО́ШВ (s. papulosum palmarum et plantarum)— С. в виде резко очерченных лентикулярных, реже монетовидных папул на ладонях и подошвах.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ ЛЕНТИКУЛЯ́РНЫЙ (s. papulosum lenticulare) — С. в виде лентикулярных папул.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ ЛЕНТИКУЛЯ́РНЫЙ КОКАРДОПОДО́БНЫЙ (син. С. папулезный лентикулярный коримбиформный)— С. п. л., при к-ром множественные лентикулярные папулы расположены кольцом вокруг бляшки.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ ЛЕНТИКУЛЯ́РНЫЙ КОРИМБИФО́РМНЫЙ (s. papulosum lenticulare corymbiforme; лат. corymbus гроздь цветов, гирлянда + -formis подобный) — см. *Сифилид папулезный лентикулярный кокардоподобный.*

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ ЛЕНТИКУЛЯ́РНЫЙ ПСОРИАЗИФО́РМНЫЙ (s. papulosum lenticulare psoriasiforme) — С. п. л., при к-ром наблюдается шелушение папул, напоминающее псориаз.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ МИЛИА́РНЫЙ (s. papulosum miliare; син. С. лихеноидный) — С. в виде милиарных папул, рассеянных на коже туловища и конечностей.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ МИЛИА́РНЫЙ ГЕРПЕТИФО́РМНЫЙ (s. papulosum miliare herpetiforme) — форма С. п. м., характеризующаяся очаговым расположением отечных папул.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ МО́КНУЩИЙ (s. papulosum madidans) — С. п., подверженный мацерации с возникновением эрозий и мокнутия; наблюдается чаще в складках кожи.

С. ПАПУЛЁЗНЫЙ МОНЕТОВИ́ДНЫЙ (s. papulosum nummiforme) — С. в виде немногочисленных сгруппированных монетовидных папул.

С. ПИГМЕ́НТНЫЙ (s. pigmentosum) — см. *Лейкодерма сифилитическая.*

С. ПСОРИАЗИФО́РМНЫЙ ЛАДО́НЕЙ И ПОДО́ШВ (s. psoriasiforme palmarum et plantarum; син. кератоз сифилитический) — форма папулезного С., обычно рецидивного, в виде многочисленных лентикулярных папул на ладонях и подошвах.

С. ПУСТУЛЁЗНЫЙ (s. pustulosum) — С. при вторичном сифилисе в виде пустул, не сопровождающихся болезненностью и отеком кожи.

С. ПУСТУЛЁЗНЫЙ ИМПЕТИГИНО́ЗНЫЙ (s. pustulosum impetiginosum; син. импетиго сифилитическое) — С. п., клинически сходный с импетиго.

С. ПУСТУЛЁЗНЫЙ ОСПЕННОВИ́ДНЫЙ (s. pustulosum varioliforme) — С. п., при к-ром пустулы имеют полушаровидную форму с вдавлением в центре.

С. ПУСТУЛЁЗНЫЙ РУПИО́ИДНЫЙ (s. pustulosum rupioideum) — см. *Рупия сифилитическая.*

С. ПУСТУЛЁЗНЫЙ УГРЕВИ́ДНЫЙ (s. pustulosum acneforme; син. угри сифилитические) — С. п., при к-ром небольшие конические пустулы расположены на поверхности мелких фолликулярных папул.

С. ПУСТУЛЁЗНЫЙ ЭКТИМАТО́ЗНЫЙ (s. pustulosum ectimatosum) — см. *Эктима сифилитическая.*

С. ПЯТНИ́СТЫЙ (s. maculatum) — см. *Розеола сифилитическая.*

СИФИЛИДОЛО́ГИЯ (*сифилис* + греч. logos учение, наука) — раздел венерологии, посвященный изучению патогенеза, симптоматики и течения сифилиса и разработке методов его диагностики, лечения и профилактики.

СИ́ФИЛИС [syphilis; по имени пастуха Сифилуса (Syphilus), героя поэмы врача Дж. Фракасторо; вероятно, от греч. sys свинья + philos друг; син. люэс] — хроническая венерическая болезнь, вызываемая бледной трепонемой, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы.

С. БЫТОВО́Й — С., заражение к-рым произошло внеполовым путем.

С. ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (s. visceralis) — С., при к-ром поражены внутренние органы, напр. сердце, головной и (или) спинной мозг, легкие, печень, желудок, почки.

С. ВРОЖДЁННЫЙ (s. congenita) — С., заражение к-рым произошло от

больной матери в период внутриутробного развития.

С. ВРОЖДЁННЫЙ ПО́ЗДНИЙ (s. congenita tarda) — С. в. у детей старше 4 лет, проявляющийся триадой Гетчинсона, а также поражением кожи, внутренних органов и костей по типу третичного сифилиса.

С. ВРОЖДЁННЫЙ РА́ННИЙ (s. congenita praecox) — С. в. у плода и детей до 4 лет, проявляющийся сифилитической пузырчаткой, диффузной папулезной инфильтрацией кожи, поражением слизистых оболочек, внутренних органов, костной ткани, нервной системы, глаз.

С. ВТОРИ́ЧНЫЙ (s. secundaria) — стадия С., обусловленная гематогенным распространением возбудителей из первичного очага и характеризующаяся полиморфными высыпаниями (папулы, пятна, пустулы) на коже и слизистых оболочках; иногда протекает латентно.

С. ВТОРИ́ЧНЫЙ РЕЦИДИ́ВНЫЙ (s. secundaria recidiva) — период С. в., следующий за свежим С. в., характеризующийся немногочисленными полиморфными сгруппированными высыпаниями и нередко поражением нервной системы.

С. ВТОРИ́ЧНЫЙ СВЕ́ЖИЙ (s. secundaria recens) — начальный период С. в., характеризующийся многочисленными полиморфными высыпаниями на коже и слизистых оболочках, полиаденитом; нередко при этом можно наблюдать остаточные признаки твердого шанкра.

С. ГУММО́ЗНЫЙ (s. gummosa) — см. *Сифилис третичный.*

С. ЗЛОКАЧЕСТВЕ́ННЫЙ — тяжело протекающий С. с массивным поражением внутренних органов и нервной системы, характерным для третичного С. на первом году болезни.

С. ЛАТЕ́НТНЫЙ (s. latens) — см. *Сифилис скрытый.*

С. ОБЕЗГЛА́ВЛЕННЫЙ (s. decapitata) — С., заражение к-рым произошло при попадании возбудителя непосредственно в кровяное русло (напр., через рану, при переливании крови); характеризуется отсутствием твердого шанкра.

С. ПЕРВИ́ЧНЫЙ (s. primaria)— начальная стадия С., характеризующаяся появлением твердого шанкра и увеличением регионарных лимфатических узлов.

С. ПЕРВИ́ЧНЫЙ СЕРОНЕГАТИ́ВНЫЙ (s. primaria seronegativa; лат. serum сыворотка + negativus отрицательный) — С. п. с отрицательными серологическими реакциями.

С. ПЕРВИ́ЧНЫЙ СЕРОПОЗИТИ́ВНЫЙ (s. primaria seropositiva; лат. serum сыворотка + positivus положительный) — С. п. с положительными серологическими реакциями.

С. СЕРОРЕЗИСТЕ́НТНЫЙ (s. seroresistens; лат. serum сыворотка + resisto стоять, сопротивляться) — С., при к-ром серологические реакции стойко положительны, несмотря на проводимое специфическое лечение.

С. СКРЫ́ТЫЙ (s. latens; син. С. латентный) — С., при к-ром серологические реакции положительны, но отсутствуют признаки поражения кожи, слизистых оболочек и внутренних органов.

С. СКРЫ́ТЫЙ ПО́ЗДНИЙ (s. latens tarda) — С. с., с момента заражения к-рым прошло 2 года или более.

С. СКРЫ́ТЫЙ РА́ННИЙ (s. latens praecox) — С. с., с момента заражения к-рым прошло менее 2 лет.

С. ТРАНСФУЗИО́ННЫЙ (s. transfusionalis) — С., заражение к-рым произошло в результате переливания крови больного С.

С. ТРЕТИ́ЧНЫЙ (s. tertiaria; син. С. гуммозный) — стадия С., следующая за вторичным С. и характеризующаяся деструктивными поражениями внутренних органов и нервной системы с возникновением в них гумм.

С. ЭКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНЫЙ (s. experimentalis) — С. у экспериментальных животных (напр., обезьян, кроликов), возникший в результате их искусственного заражения.

СИ́ФИЛИС АРА́БСКИЙ — см. *Беджель.*

СИ́ФИЛИС НЕВЕНЕРИ́ЧЕСКИЙ (syphilis non venerica) — см. *Фрамбезия.*

СИ́ФИЛИС НЕВЕНЕРИ́ЧЕСКИЙ ДЕ́ТСКОГО ВО́ЗРАСТА — см. *Беджель.*

СИ́ФИЛИС ТРОПИ́ЧЕСКИЙ (syphilis tropica) — см. *Фрамбезия.*

СИ́ФИЛИС ЭНДЕМИ́ЧНЫЙ (syphilis endemica) — см. *Беджель.*

СИФИЛО́ИД ПОСТЭРОЗИ́ВНЫЙ КРУГООБРА́ЗНЫЙ (syphiloidum circiforme posterosivum; *сифилис* + греч. eidos вид, подобие; син. Семестра — Жаке сифилоид постэрозивный) — разновидность стрептококкового импетиго у грудных детей, характеризующаяся фликтенами и поверхностными эрозиями с последующим возникновением на их месте пигментных пятен (гл. обр., на ягодицах).

СИФИЛО́МА ПЕРВИ́ЧНАЯ (syphiloma primarium; *сифилис* + *-ома*) — см. *Шанкр твердый.*

СИФИЛО́МА ТРЕТИ́ЧНАЯ (syphiloma tertiarium) — см. *Гумма сифилитическая.*

СИФИЛОНИХИ́Я (syphilonychia; *сифилис* + греч. onyx, onychos ноготь) — см. *Онихия сифилитическая.*

СИФИЛОФОБИ́Я (syphilophobia; *сифилис* + *фобия*) — навязчивый страх: боязнь заболеть сифилисом.

СКАБИОФОБИ́Я (scabiophobia; лат. scabies чесотка + *фобия*)— см. *Акарофобия.*

СКАЛЕ́НУС-СИНДРО́М (анат. musculus scalenus лестничная мышца) — см. *Синдром передней лестничной мышцы.*

СКА́ЛЬПЕЛЬ (лат. scalpellum ножичек) — небольшой хирургический нож для рассечения тканей с коротким лезвием и длинной рукояткой.

С. БРЮШИ́СТЫЙ — С. с плавно изогнутой округлой режущей кромкой и почти прямым обушком.

С. ГЛАЗНО́Й — С. небольшого размера с малым углом заточки (20°), предназначенный для офтальмологических операций.

С. ОСТРОКОНЕ́ЧНЫЙ — С., у к-рого режущая кромка и обушок имеют одинаковую кривизну, а острый конец лезвия расположен на осевой линии.

С. ПРЯМО́Й (устар.) — С. с прямолинейной режущей кромкой.

С. РЕЗЕКЦИО́ННЫЙ — см. *Нож резекционный.*

С. СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ — остроконечный С. с отогнутым под углом 80° к рукоятке обоюдоострым лезвием, предназначенный для стоматологических операций.

«СКА́ЛЬПЕЛЬ СВЕТОВО́Й» (син. нож лазерный) — лазер, предназначенный для рассечения тканей при хирургических операциях.

СКАЛЬПИ́РОВАНИЕ — открытое механическое повреждение, сопровождающееся отрывом значительного участка кожи.

СКА́НЕР (англ. scanner; син. скенер — прк) в медицине — прибор для получения графического изображения распределения радиоактивного изотопа, введенного в организм человека с диагностической, лечебной или исследовательской целью; сканирование органа, части тела или всего тела человека осуществляется с помощью подвижных детекторов излучения.

СКА́НЕР УЛЬТРАЗВУКОВО́Й — прибор для двухмерной ультразвуковой эхографии; сканирование исследуемого органа (части тела) осуществляется пучком ультразвукового излучения; при этом изображения органа получают на экране электронно-лучевой трубки.

СКАНИ́РОВАНИЕ (англ. scanning, от scan внимательно смотреть, рассматривать) — управляемое пространственное перемещение пучка излучения (или детектора излучения) с целью последовательного исследования различных участков нек-рого объекта.

С. МНОГОВЕ́КТОРНОЕ — см. *Стереосканирование.*

С. ПОЛИПОЗИЦИО́ННОЕ — см. *Стереосканирование.*

С. РАДИОИЗОТО́ПНОЕ в медицине и биологии — С. органа или части тела после введения в организм радиофармацевтических препаратов, производимое с помощью сканера для получения информации о размерах, форме, положении и функциональном состоянии исследуемого органа.

С. РАДИОИЗОТО́ПНОЕ ИМПУЛЬСНОЕ—С. р., при к-ром распределение в организме радиофармацевтического препарата устанавливается по сумме импульсов, зарегистрированных детектором излучения.

С. РАДИОИЗОТО́ПНОЕ ПРО́ФИЛЬНОЕ — С. р., при к-ром детектор излучения перемещается прямолинейно над исследуемым объектом.

С. РАДИОИЗОТО́ПНОЕ РОТАЦИО́ННОЕ — С. р., при к-ром детектор излучения перемещается над исследуемым объектом по кривой, равноудаленной от него.

С. РАДИОИЗОТО́ПНОЕ ЦВЕТНО́Е — С. р., при к-ром получают цветное изображение, на к-ром разные промежутки между изодозными кривыми распределения радиофармацевтического препарата окрашены в различные цвета.

С. СЕ́РДЦА СЕ́КТОРНОЕ — ультразвуковое С. сердца, при к-ром датчик ультразвуковых импульсов перемещают по поверхности грудной клетки так, что он описывает дугу, а эхокардиограмму регистрируют на движущейся ленте; применяется для исследования анатомических соотношений внутрисердечных структур.

С. УЛЬТРАЗВУКОВО́Е — см. *Эхография ультразвуковая двухмерная.*

СКАНОГРА́ММА (*сканирование* + греч. gramma запись, изображение)— изображение распределения в органе, части тела или во всем теле введенного в организм радиофармацевтического препарата, получаемое при радиоизотопном сканировании.

СКАПУЛЯ́РНЫЙ (scapularis; анат. scapula лопатка) — относящийся к лопатке.

СКА́ПЫ (Stenotomus) — род костных рыб отряда окунеобразных, имеющих острые плавники, снабженные железами, к-рые выделяют ядовитое вещество; обитают в западной части Атлантического океана.

СКАРИФИКА́ТОР (лат. scarifico, scarificatum царапать, надрезать) — 1) инструмент для скарификации перикарда, рабочая часть к-рого имеет зубчатую нарезку; 2) инструмент для скарификации кожи, представляющий собой пластинку с острыми зубцами.

СКАРИФИКА́ТОР ГРЕ́ФЕ — см. *Графе скарификатор.*

СКАРИФИКА́ТОР-КОПЬЁ — инструмент одноразового использования для прокалывания кожи пальца с целью взятия пробы крови, представляющий собой полоску из нержавеющей стали с заостренным концом.

СКАРИФИКАЦИО́ННАЯ ПРО́БА— см. *Кожная проба скарификационная.*

СКАРИФИКА́ЦИЯ (scarificatio; лат. царапание, надрезание) — нанесение мелких насечек на поверхность ткани, напр. при накожной вакцинации.

СКАРЛАТИ́НА (scarlatina; итал. scarlattina, от лат. scarlatum ярко-красный цвет) — острая инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком, продуцирующим эритрогенный токсин; передается воздушно-капельным путем; характеризуется лихорадкой, интоксикацией, острым тонзиллитом с регионарным лимфаденитом, мелкоточечной сыпью.

С. ГИПЕРТОКСИ́ЧЕСКАЯ (s. hypertoxica) — см. *Скарлатина молниеносная.*

С. МОЛНИЕНО́СНАЯ (s. fulminans; син. С. гипертоксическая) — наиболее тяжелая форма С., характеризующаяся бурной интоксикацией с гипертермией и развитием коматозного состояния.

С. ПОСЛЕОЖО́ГОВАЯ (s. post combustionem) — экстрафарингеальная С., при к-рой входными воротами инфекции служит обожженная кожа.

С. ПУЭРПЕРА́ЛЬНАЯ (s. puerperalis) — экстрафарингеальная С. у рожениц, при к-рой входными воротами инфекции служит поврежденная слизистая оболочка родовых путей.

С. РАНЕВА́Я (s. vulneralis) — экстрафарингеальная С., при к-рой входными воротами инфекции служит поверхность раны.

С. СЕПТИ́ЧЕСКАЯ (s. septica) — тяжелая форма С., характеризующаяся некротическими изменениями зева и носоглотки с выраженным регионарным лимфаденитом и склонностью к развитию метастатических абсцессов (напр., в сосцевидном отростке, околоносовых пазухах, суставах).

С. ТОКСИКО-СЕПТИ́ЧЕСКАЯ (s. toxicosеptica) — тяжелая форма С., характеризующаяся сочетанием проявлений токсической и септической С.

С. ТОКСИ́ЧЕСКАЯ (s. toxica) — тяжелая форма С., характеризующаяся явлениями резкой интоксикации со значительной гипертермией и выраженными сердечно-сосудистыми расстройствами.

С. ЭКСТРАБУККА́ЛЬНАЯ (s. extrabuccalis; лат. extra вне + bucca щека) — см. *Скарлатина экстрафарингеальная.*

С. ЭКСТРАФАРИНГЕА́ЛЬНАЯ (s. extrapharyngealis; лат. extra вне + греч. pharynx, pharyngos глотка; син. С. экстрабуккальная) — общее название форм С., при к-рых входными воротами инфекции являются не зев, а поврежденная кожа или слизистые оболочки и отсутствует острый тонзиллит.

СКА́РПОВСКИЙ ТРЕУГО́ЛЬНИК (A. Scarpa, 1752—1832, итал. анатом и хирург) — см. *Бедренный треугольник.*

СКА́РПЫ ГА́НГЛИЙ (A. Scarpa) — 1) см. *Ганглий преддверный*; 2) см. *Ганглий височный.*

СКА́РФФА ОПЕРА́ЦИЯ (J. E. Scarff, род. в 1898 г., амер. нейрохирург) — хирургическая операция перфорации дна III желудочка головного мозга с подходом со стороны переднего рога бокового желудочка под контролем вентрикулоскопа; производится при окклюзионной гидроцефалии для создания пути оттока цереброспинальной жидкости по подпаутинным цистернам основания головного мозга.

СКАТ ч е р в я́ м о з ж е ч к а (declive, PNA, BNA, JNA) — долька червя мозжечка, к-рая переходит в простую дольку полушария мозжечка.

СКАТ ч е́ р е п а (clivus, PNA, BNA; син. блюменбахов скат) — широкий желоб, образованный телом клиновидной кости и базилярной частью затылочной кости, расположенный между спинкой турецкого седла и большим затылочным отверстием.

СКАТО́Л — гетероциклическое соединение с неприятным запахом, образующееся из триптофана при гниении белков, напр. при их разложении в толстой кишке.

СКАТОФАГИ́Я (scatophagia; греч. skōr, skatos кал + phagein есть, пожирать) — см. *Копрофагия.*

СКАТОФИЛИ́Я (scatophilia; греч. skōr, skatos кал + philia любовь, влечение; син.: копромания, копрофилия) — патологическое влечение к манипуляции каловыми массами.

СКА́ТЫ (Batomorpha) — надотряд рыб класса хрящевых (Chondrichthyes); представители отряда хвостоколообразных снабжены ядовитыми шипами, а отряда электрических скатов — способны создавать сильные электрические разряды; обитают преимущественно в тропических и субтропических морях.

СКАФАЛОЦЕФАЛИ́Я (scaphalocephalia) — см. *Скафоцефалия.*

СКАФА́НДР (франц. scaphandre, от греч. skaphē ладья + anēr, andros человек, мужчина) — индивидуальное герметичное снаряжение, обеспечивающее возможность жизнедеятельности человека в условиях, резко отличающихся от обычных (напр., под водой, в космосе); оболочка скафандра повторяет форму тела человека.

СКАФОЦЕФАЛИ́Я (scaphocephalia; греч. skaphē ладья + kephalē голова; син. скафалоцефалия) — аномалия развития: удлиненный череп с выступающим гребнем на месте преждевременно заросшего сагиттального шва.

СКА́ЧКА ИДЕ́Й (fuga idearum; син. вихрь идей) — резкое ускорение мышления с непрерывной сменой одной незаконченной мысли другой; проявление маниакального состояния.

СКВАЛЕ́Н (син. спинацен) — промежуточный продукт биосинтеза холестерина, стероидных гормонов и нек-рых других биологически активных соединений, относящихся к алифатическим углеводородам.

СКВАМО́ЗНЫЙ (squamosus; лат. squama чешуя) — относящийся к чешуе; покрытый чешуйками.

СКЕЛЕ́Т (skeleton, PNA, BNA; греч. skeletos высушенный) — система плотных, соединительнотканных, гл. обр. костных, образований, составляющих остов человека и животного и выполняющих функции опоры, а также защиты внутренних органов от механических воздействий.

С. ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (s. viscerale; син. С. жаберный) — совокупность элементов С., закладывающихся на стенках первичной глотки; производными С. в. у человека являются хрящи и кости лицевого черепа и хрящи гортани.

С. ВОЛОКНИ́СТЫЙ — см. *Ткань интерстициальная.*

С. ЖА́БЕРНЫЙ — см. *Скелет висцеральный.*

С. КО́СТНЫЙ — С., состоящий из костной ткани; характерен для высших позвоночных.

С. ОСЕВО́Й (s. axiale, PNA) — часть С. позвоночных, расположенная по продольной оси тела; объединяет позвоночный столб, грудную клетку и мозговой череп.

С. ПЕРЕПО́НЧАТЫЙ — С. зародыша, представленный хордой и сгущениями мезенхимы в сегментах тела и зачатках конечностей; первая стадия развития С. позвоночных.

С. ХРЯЩЕВО́Й — С. зародыша, представленный хрящевыми закладками костей.

СКЕЛЕТИ́РОВАНИЕ — отделение надкостницы от компактного вещества кости; оперативный прием многих хирургических операций на костях.

СКЕЛЕТИ́РОВАНИЕ ТРУ́ПА — разрушение мягких тканей (кожи, мышц, внутренних органов) трупа с обнажением скелета.

СКЕЛЕТОТОПИ́Я (*скелет* + греч. topos место, положение) — расположение органов в теле человека относительно элементов скелета.

СКЕ́НЕР (нрк) — см. *Сканер.*

СКЕ́ПЕНСА ДИАТЕРМОКОАГУЛЯ́ТОР (C. L. Schepens) — аппарат для электрокоагуляции склеры, позволяющий с помощью набора сменных наконечников дозировать интенсивность коагуляции, а также ее площадь и глубину; применяется гл. обр. при операциях по поводу отслойки сетчатки.

СКЕ́ПЕНСА ОФТАЛЬМОСКО́П — см. *Офтальмоскоп бинокулярный.*

СКЕПТОФИЛАКСИ́Я (истор.; skeptophylaxia; греч. skeptomai рассматривать, предусматривать + phylaxis защита) — ослабление токсического действия яда предварительным введением в организм небольшой его дозы.

СКИА- (греч. skia тень) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к тени, к теневому изображению».

СКИАГРАФИ́Я (истор.; *скиа-* + греч. graphō писать, изображать) — графическое воспроизведение рентгеновского изображения путем обводки его контура на экране.

СКИАЛО́ГИЯ (*скиа-* + греч. logos учение, наука) — раздел рентгенологии, изучающий закономерности образования рентгеновского изображения и разрабатывающий правила истолкования его теней и просветлений как объективного отображения строения и функции исследуемой части тела или органа и имеющихся в них патологических изменений.

СКИАМЕ́ТР (*скиа* + греч. metreō измерять) — прибор для измерения жесткости (проникающей способности) рентгеновского излучения.

СКИАСКО́П (*скиа-* + греч. skopeō наблюдать, исследовать) — прибор для определения рефракции глаза методом скиаскопии, представляющий собой плоское зеркало с центральным отверстием.

СКИАСКОПИ́ЧЕСКАЯ ЛИНЕ́ЙКА — приспособление для определения рефракции глаза методом скиаскопии, представляющее собой рамку с набором последовательно возрастающих по оптической силе рассеивающих или собирательных линз.

СКИАСКОПИ́Я (*скиа-* + греч. skopeō наблюдать, исследовать; син.: диоптроскопия, пупиллоскопия, теневая проба) — метод определения клинической рефракции глаза путем наблюдения за перемещением тени в освещенном зрачке при поворачивании зеркала; осуществляется с помощью зеркального офтальмоскопа или скиаскопа и скиаскопических линеек.

СКИ́НА ПРОТО́КИ (A. J. Ch. Skene, 1838—1900, амер. гинеколог) — см. *Парауретральные протоки.*

СКИ́НА ХОДЫ́ (A. J. Ch. Skene) — см. *Парауретральные протоки.*

СКИНЕ́ИТ (skeneitis; *Скина ходы* + *-ит*) — воспаление парауретральных протоков.

СКИ́ННЕРА МЕ́ТОД (B. F. Skinner, род. в 1904 г., амер. психолог) — экспериментальный метод изучения поведения животного путем помещения его в камеру, устройство к-рой предусматривает предоставление животному возможности выбора величины и качества подкрепления (раздражения).

СКИ́РР (skirrhus; греч. skirrhos твердый, твердая опухоль) — см. *Рак фиброзный.*

СКЛАД МЕ́ДИКО-САНИТА́РНОГО ИМУ́ЩЕСТВА (устар.) — см. *Медицинский склад военный.*

СКЛАД МЕДИЦИ́НСКОГО ИМУ́ЩЕСТВА (устар.) — см. *Медицинский склад военный.*

СКЛА́ДКА ГОЛО́ВКИ ПРИДА́ТКА ЯИ́ЧКА (plica capitis epididymidis, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *259.*

СКЛА́ДКА ЛЕ́ВОЙ ПО́ЛОЙ ВЕ́НЫ (plica venae cavae sinistrae, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *665.*

СКЛА́ДКА МА́ТКИ ШИРО́КАЯ (plica lata uteri, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *365.*

СКЛА́ДКА НОСОСЛЁЗНОГО КАНА́ЛА (plica ductus nasolacrimalis, JNA) — см. *Слезная складка.*

СКЛА́ДКА ХВОСТА́ ПРИДА́ТКА ЯИ́ЧКА (plica caudae epididymidis, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *258.*

СКЛА́ДКИ ПРЯМО́Й КИШКИ́ ПОПЕРЕ́ЧНЫЕ (plicae transversales recti, PNA, BNA; plicae transversae, JNA; син. Хаустона складки) — три поперечные или косые складки слизистой оболочки прямой кишки, вдающиеся в просвет ее ампулы.

СКЛЕР- (склеро-; греч. sklēros твердый, плотный) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «твердый», «уплотненный»; 2) «относящийся к склере».

СКЛЕ́РА (sclera, BNA, PNA, JNA; греч. sklēros твердый, плотный; син. белочная оболочка глаза) — непрозрачная часть фиброзной оболочки глазного яблока.

СКЛЕРАДЕНИ́Т СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЙ (scleradenitis syphilitica; *склер-* + *аденит*) — см. *Лимфаденит сифилитический.*

СКЛЕРА́ЛЬНАЯ ШПО́РА — см. *Швальбе заднее пограничное кольцо.*

СКЛЕРА́ЛЬНЫЙ ВА́ЛИК — циркулярный выступ внутренней поверхности склеры, расположенный на уровне радужно-роговичного угла.

СКЛЕРА́ЛЬНЫЙ КАНА́Л — см. *Венозный синус склеры.*

СКЛЕРЕДЕ́МА ВЗРО́СЛЫХ (scleroedema adultorum; *склер-* + греч. oidema отек; син.: Бушке болезнь, склерема апоневротическая доброкачественная, склеродермия отечная) — диффузный, быстро развивающийся болезненный плотный отек лица и шеи, возникающий после какого-либо инфекционного заболевания и распространяющийся на верхнюю часть туловища, плечи и предплечья; характеризуется набуханием коллагеновых волокон в глубоких слоях дермы и в подкожной жировой клетчатке.

СКЛЕРЕ́МА АПОНЕВРОТИ́ЧЕСКАЯ ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (sclerema aponeuroticum benignum) — см. *Склередема взрослых.*

СКЛЕРЕ́МА УЗЛОВА́ТАЯ НОВОРОЖДЁННЫХ (sclerema neonatorum nodosum) — см. *Адипонекроз подкожный новорожденных.*

СКЛЕРИ́Т (scleritis; *склер-* + *-ит*) — воспаление склеры.

С. ГНОЙНЫЙ (s. purulenta) — С., обусловленный гематогенным метастазированием в склеру возбудителей гнойной инфекции и протекающий в виде абсцесса.

С. ГРАНУЛЕМАТО́ЗНЫЙ (s. granulomatosa; син. С. негнойный) — С., характеризующийся инъекцией глубоких сосудов склеры и образованием гранулем; локализуется в переднем отделе склеры.

С. ГРАНУЛЕМАТО́ЗНЫЙ ГЛУБО́КИЙ (s. granulomatosa profunda) — С. г., осложненный иридоциклитом.

С. ЗА́ДНИЙ (s. posterior; син. склеротенонит) — С., поражающий заднюю часть склеры и сопровождающийся воспалением влагалища глазного яблока (теноновой капсулы); наблюдается, напр., при гриппе, ревматизме.

С. МЯСИ́СТЫЙ — см. *Склерит студенистый.*

С. НЕГНО́ЙНЫЙ (s. non purulenta) — см. *Склерит гранулематозный.*

С. СТУДЕНИ́СТЫЙ (син. С. мясистый) — токсико-аллергический С., характеризующийся резко выраженной гиперемией, значительной инфильтрацией и разрыхлением ткани склеры, а также распространением инфильтрации на роговицу.

СКЛЕРИ́Т-РОЗА́ЦЕА (scleritis-rosacea; син. розацеа-склерит) — поражение склеры при розовых угрях, характеризующееся образованием узелков в эписклере.

СКЛЕРО- — см. *Склер-.*

СКЛЕРОДАКТИЛИ́Я (sclerodactylia; *склеро-* + греч. daktylos палец) — поражение пальцев рук при системной склеродермии: они полусогнуты, тонки, кожа на них атрофична, а движения в межфаланговых суставах ограничены.

СКЛЕРОДЕ́РМА (устар.; scleroderma; *склеро-* + греч. derma кожа) — см. *Склеродермия.*

СКЛЕРОДЕРМИ́Я (sclerodermia; *склеро-* + греч. derma кожа; син. склеродерма — устар.) — поражение кожи, характеризующееся ее диффузным или ограниченным уплотнением с последующим развитием фиброза и атрофии пораженных участков.

СКЛЕРОДЕРМИ́Я БЛЯ́ШЕЧНАЯ (sclerodermia placata) — форма очаговой склеродермии, при к-рой участки поражения имеют вид крупных (до ладони величиной) округлых плотных бляшек, окруженных полоской сиреневого цвета.

СКЛЕРОДЕРМИ́Я ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННАЯ (sclerodermia generalisata) — см. *Склеродермия системная.*

СКЛЕРОДЕРМИ́Я ДИФФУ́ЗНАЯ (sclerodermia diffusa) — см. *Склеродермия системная.*

СКЛЕРОДЕРМИ́Я КАПЛЕВИ́ДНАЯ (sclerodermia guttata; син.: болезнь белых пятен, лихен атрофический первичный, лихен плоский атрофический, лихен склеротический атрофический, Цумбуша белый лихен, Чиллага болезнь) — форма очаговой склеродермии, при к-рой участки поражения имеют вид многочисленных мелких округлых, слегка запавших перламутровобелых пятен, локализующихся на верхней части туловища.

СКЛЕРОДЕ́РМИЯ КОЛЬЦЕВИ́ДНАЯ (sclerodermia anularis) — форма очаговой склеродермии, при к-рой участки поражения имеют вид колец, локализующихся на коже нижней части голеней; сопровождается слоновостью.

СКЛЕРОДЕРМИ́Я ЛИНЕ́ЙНАЯ (sclerodermia linearis) — форма очаговой склеродермии, при к-рой участки поражения имеют вид полос уплотнения и побледнения кожи, обычно в области лба.

СКЛЕРОДЕРМИ́Я ОГРАНИ́ЧЕННАЯ (sclerodermia circumscripta) — см. *Склеродермия очаговая.*

СКЛЕРОДЕРМИ́Я ОТЕ́ЧНАЯ (sclerodermia oedematica) — см. *Склередема взрослых.*

СКЛЕРОДЕРМИ́Я ОЧАГО́ВАЯ (sclerodermia focalis; син. склеродермия ограниченная) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся поражением ограниченных участков кожи в виде склеродермии.

СКЛЕРОДЕРМИ́Я СИСТЕ́МНАЯ (sclerodermia systemica; син.: склеро-

дермия генерализованная, склеродермия диффузная, склеродермия универсальная, склероз системный прогрессирующий) — болезнь, обусловленная системной прогрессирующей дезорганизацией соединительной ткани с преобладанием фиброзно-атрофических изменений кожи (в виде склеродермии) и внутренних органов, а также поражений сосудов, напоминающих облитерирующий эндартериит.

СКЛЕРОДЕРМИ́Я УНИВЕРСА́ЛЬНАЯ (sclerodermia universalis) — см. *Склеродермия системная.*

СКЛЕРО́З (sclerosis; греч. sklērōsis затвердение, уплотнение) — уплотнение органа, обусловленное заменой его погибших функциональных элементов соединительной (обычно фиброзной) тканью или гомогенной гиалиноподобной массой.

С. АНГИОГЕ́ННЫЙ (s. angiogena; син. С. васкулярный) — С., обусловленный недостаточным кровоснабжением органа или ткани.

С. БЕСКЛЕ́ТОЧНЫЙ (s. non cellularis) — см. *Склероз прямой.*

С. ВАСКУЛЯ́РНЫЙ (s. vascularis) — см. *Склероз ангиогенный.*

С. ВОЗРАСТНО́Й (s. praesenilis) — диффузный ангиогенный С., обусловленный прогрессирующим атеросклерозом у лиц пожилого возраста.

С. ВОСПАЛИ́ТЕЛЬНЫЙ (s. inflammatoria) — С., возникающий в исходе воспалительного процесса.

С. ДИСТАНЦИО́ННЫЙ — клеточный С., при к-ром волокнистые структуры образуются на нек-ром удалении от фибробластов, но при их участии.

С. ДИФФУ́ЗНО-ОЧАГО́ВЫЙ (s. diffusa focalis) — сочетание периваскулярного С. с образованием крупных рубцов; чаще встречается в миокарде.

С. ДИФФУ́ЗНЫЙ (s. diffusa) — С., характеризующийся разрастанием соединительной ткани во всем объеме органа; наблюдается в исходе хронического воспаления или хронической недостаточности кровоснабжения органа.

С. ИЗОМО́РФНЫЙ (s. isomorpha) — 1) С., имеющий одинаковый патогенез во всех отделах органа или ткани; 2) С. с разрастанием специфичной для данного органа соединительной ткани.

С. КЛЕ́ТОЧНЫЙ (s. cellularis; син. С. непрямой) — С., при к-ром волокнистые структуры соединительной ткани продуцируются фибробластами или функционально подобными им клетками.

С. «ЛУ́КОВИЧНЫЙ» — см. *Феномен луковичной шелухи.*

С. НЕПРЯМО́Й (s. indirecta) — см. *Склероз клеточный.*

С. ОЧАГО́ВЫЙ (s. focalis) — С., характеризующийся местным развитием соединительной ткани в очаге воспаления или некроза.

С. ПЕРИБРОНХИА́ЛЬНЫЙ (s. peribronchialis) — С. тканей, окружающих бронхи, возникающий на почве хронического бронхита и (или) бронхопневмонии

С. ПЕРИВАСКУЛЯ́РНЫЙ (s. perivascularis) — диффузный ангиогенный или воспалительный С. тканей, окружающих внутриорганные сосуды.

С. ПРЯМО́Й (s. directa; син.: С. бесклеточный, склероз-гиалиноз) — С., при к-ром на месте плазматического пропитывания или фибриноидного некроза тканей образуется гомогенная гиалиноподобная масса.

С. РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ (s. rheumatica) — очаговый С. при ревматизме с образованием мелких рубчиков на месте очагов фибриноидной дезорганизации и гранулем, преимущественно в миокарде.

С. СЕ́ТЧАТЫЙ (s. reticulata) — диффузный С., возникающий при интерстициальном воспалении (чаще легкого) или при гипоксии, характеризующийся подчеркнуто сетчатым рисунком органа вследствие огрубления его соединительнотканного каркаса.

СКЛЕРО́З БОКОВО́Й АМИОТРОФИ́ЧЕСКИЙ (sclerosis amyotrophica lateralis; син. Шарко болезнь) — хроническая прогрессирующая болезнь нервной системы неясной этиологии, характеризующаяся поражением двигательных нейронов головного и спинного мозга, дегенерацией корково-спинномозговых и корково-ядерных волокон; проявляется сочетанием центральных и периферических параличей (парезов) мышц конечностей и туловища, а также расстройствами двигательных функций тройничного, языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов.

СКЛЕРО́З ДИФФУ́ЗНЫЙ ИНФАНТИ́ЛЬНЫЙ КРА́ББЕ — см. *Краббе — Бенеке болезнь.*

СКЛЕРО́З ИНТЕРГЛОБУЛЯ́РНЫЙ СИММЕТРИ́ЧНЫЙ (sclerosis interglobularis symmetrica) — см. *Шильдера болезнь.*

СКЛЕРО́З КОМБИНИ́РОВАННЫЙ (sclerosis combinata) — см. *Миелоз funiculyarnyй.*

СКЛЕРО́З КО́СТИ (osteosclerosis) — см. *Остеосклероз.*

СКЛЕРО́З ЛАМИНА́РНЫЙ КО́РКОВЫЙ (sclerosis laminaris corticalis) — см. *Мореля болезнь.*

СКЛЕРО́З ЛЁГКИХ (pneumosclerosis) — см. *Пневмосклероз.*

СКЛЕРО́З ЛОБА́РНЫЙ (sclerosis lobaris) — атрофия и сморщивание полушария большого мозга или отдельных его участков, развивающиеся преимущественно в детском возрасте после воспалительных, сосудистых или генетически обусловленных дистрофических процессов в головном мозге; клинические проявления С. л. зависят от локализации патологических изменений.

СКЛЕРО́З МНО́ЖЕСТВЕННЫЙ (sclerosis multiplex) — см. *Склероз рассеянный.*

СКЛЕРО́З НЕ́РВНОЙ СИСТЕ́МЫ ДИФФУ́ЗНЫЙ (sclerosis systematis nervosi diffusa) — см. *Шильдера болезнь.*

СКЛЕРО́З НОДУЛЯ́РНЫЙ (sclerosis nodularis; лат. nodulus узелок) — гистологический вариант лимфогранулематоза; характеризуется массивным разрастанием соединительной ткани, делящей ткань, напр. лимфатического узла, на множество неправильной формы долек и ячеек, внутри к-рых находится разросшаяся лимфоидная ткань с большим количеством клеток Березовского — Штернберга.

СКЛЕРО́З РАССЕ́ЯННЫЙ (sclerosis disseminata; син.: склероз множественный, Шарко — Вюльпиана болезнь) — хроническая прогрессирующая болезнь нервной системы, по-видимому вирусной этиологии; характеризуется возникновением рассеянных очагов демиелинизации с образованием склеротических бляшек преимущественно в белом веществе головного и спинного мозга, интермиттирующим течением с симптоматикой, соответствующей локализации поражений, напр. с двигательными расстройствами, нарушениями функций тазовых органов, координации движений, зрения, психическими расстройствами.

СКЛЕРО́З СЕ́РДЦА (нрк; cardiosclerosis) — см. *Кардиосклероз.*

СКЛЕРО́З СИСТЕ́МНЫЙ ПРОГРЕССИ́РУЮЩИЙ (sclerosis progressiva systemica) — см. *Склеродермия системная.*

СКЛЕРО́З СИСТЕ́МНЫЙ ПРОГРЕССИ́РУЮЩИЙ БЕЗ СКЛЕРОДЕРМИ́И — форма системной склеродермии, при к-рой отсутствуют поражения кожи.

СКЛЕРО́З ТУБЕРО́ЗНЫЙ (sclerosis tuberosa; син.: Бурневилля болезнь, Бурневилля — Прингла болезнь, эпилойя) — наследственная болезнь из группы факоматозов, характеризующаяся сочетанием судорожных припадков, слабоумия и поражений кожи (фибромы, аденомы сальных желез, пигментированные пятна кофейного цвета); наследуется по аутосомно-доминантному типу.

СКЛЕРО́З ЭНДОКА́РДА ВРОЖДЁННЫЙ (sclerosis endocardii congenita) — см. *Фиброэластоз субэндокардиальный.*

СКЛЕРО́З-ГИАЛИНО́З (sclerosis-hyalinosis) — см. *Склероз прямой.*

СКЛЕРОЛА́МПА (*склеро-* + лампа) — светильник специальной конструкции, предназначенный для исследований глаза методом диафаноскопии.

СКЛЕРО́МА (scleroma; греч. sklērōma отвердение, уплотнение; син. риносклерома) — хроническая инфекционная болезнь, вызываемая палочкой Фриша — Волковича; характеризуется образованием в стенках верхних дыхательных путей (гл. обр. носа) гранулем, подвергающихся в дальнейшем фиброзу и рубцовому сморщиванию, приводящему к стенозированию отдельных участков дыхательных путей.

СКЛЕРО́МА ГОРТА́НИ — см. *Ларингосклерома.*

СКЛЕРОМАЛЯ́ЦИЯ ПРОБОДНА́Я (scleromalacia perforans) — некроз склеры с последующей ее перфорацией, наблюдаемый при тяжелых формах склерита.

СКЛЕРОНИХИ́Я (scleronychia; *склер-* + греч. onyx, onychos ноготь; син. ноготь гипертрофированный) — гипертрофия ногтевых пластинок с их утолщением, уплотнением, изменением цвета, легким отделением от ногтевого ложа.

СКЛЕРООТИ́Т (sclerootitis; *склеро-* + *отит*) — см. *Тимпаносклероз.*

СКЛЕРОПЛА́СТИКА (scleroplastica; *склеро-* + *пластика*) — общее название хирургических операций на склере, направленных на замещение ее дефектов или изменение формы глазного яблока (напр., при лечении близорукости).

СКЛЕРОПРОТЕИ́НЫ (*склеро-* + *протеины*: син. протеиноиды — ус-

тар.) — общее название белков, образующих волокна соединительной ткани (коллаген, эластин), роговой слой эпидермиса, волосы, ногти (кератины).

СКЛЕРОТЕНОНИ́Т (sclerotenonitis; *склеро-* + анат. устар. capsula Tenoni влагалище глазного яблока + *-ит*) — см. *Склерит задний.*

СКЛЕРОТО́М (sclerotomus, LNE; *склеро-* + греч. tomos отрезок, пластинка, слой) — вентромедиальный участок сомита, образующий скелетогенную мезенхиму.

СКЛЕРОТОМИ́Я (sclerotomia; *склеро-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение склеры.

С. ЗА́ДНЯЯ (s. posterior) — С., производимая в заднем отделе глаза, напр. при лечении отслойки собственно сосудистой оболочки.

С. ПЕРЕ́ДНЯЯ (s. anterior) — С., производимая в переднем отделе глаза, напр., при глаукоме, с целью понижения внутриглазного давления.

СКЛЕРОУВЕ́ИТ (sclerouveitis; *склеро-* + анат. устар. uvea сосудистая оболочка глазного яблока + *-ит*) — сочетанное воспаление склеры и сосудистой оболочки глазного яблока.

СКЛЕРО́ЦИЙ (греч. sklēros твердый) — плотное образование у некрых грибов (напр., у спорыньи), обеспечивающее их сохранение в неблагоприятных условиях и представляющее собой переплетение гифов, снабженных толстыми оболочками.

СКЛЕРЭКТАЗИ́Я (sclerectasia; *склер-* + греч. ektasis расширение, растяжение) — растяжение и истончение склеры в результате травмы, воспалительного или дистрофического процесса.

СКЛЕРЭКТАЗИ́Я ЗА́ДНЯЯ И́СТИННАЯ — см. *Стафилома склеры истинная.*

СКЛЕРЭКТОМИ́Я (sclerectomia; *склер-* + *эктомия*) — хирургическая операция: иссечение участка склеры.

СКЛИФОСО́ВСКОГО КО́СТНЫЙ ШОВ (устар.; Н. В. Склифосовский, 1836—1904, отеч. хирург) — соединение костных отломков с помощью медной проволоки, проведенной в двух местах через просверленные в кости отверстия после предварительной обработки концов отломков по типу «русского замка».

СКЛИФОСО́ВСКОГО ОПЕРА́ЦИЯ (Н. В. Склифосовский) — 1) хирургическая операция: удаление камней из полости мочевого пузыря посредством его чрезбрюшинного сечения; 2) хирургическая операция: замещение дефектов дужек позвонков при их незаращении свободным костным трансплантатом, взятым из лопатки и поэтому покрытым надкостницей с двух сторон; 3) хирургическая операция при лечении геморроя, заключающаяся в том, что геморроидальные узлы прошивают у основания лигатурой и перевязывают без последующего их отсечения; рассчитана на самостоятельное отторжение узлов; 4) (истор.) хирургическая операция: иссечение грыжевого мешка при черепно-мозговой грыже без последующей пластики костного дефекта; 5) см. *Склифосовского — Рена — Делорма — Бира операция.*

СКЛИФОСО́ВСКОГО РУ́ССКИЙ ЗАМО́К (Н. В. Склифосовский) — см. *Русский замок.*

СКЛИФОСО́ВСКОГО — РЕ́НА — ДЕЛО́РМА — БИ́РА ОПЕРА́ЦИЯ (Н. В. Склифосовский, 1836—1904, отеч. хирург; L. Rehn, 1849—1930, нем. хирург; E. Delorme, 1836—1929, франц. хирург; A. K. G. Bier, 1861—1949, нем. хирург; син.: Бира резекция слизистой оболочки прямой кишки, Делорма операция, Рена операция, Склифосовского операция) — хирургическая операция при выпадении прямой кишки, заключающаяся в иссечении ее слизистой оболочки в области заднего прохода, после чего обнаженный мышечный слой прошивают продольными гофрирующими швами, образующими циркулярный мышечный валик, и ушивают дефект слизистой оболочки.

СКЛО́ВСКОГО СИМПТО́М (истор.; E. L. Sklowsky, нем. врач) — опорожнение везикулы при надавливании сначала кожи вокруг нее, а затем сдавлении самой везикулы; наблюдается при ветряной оспе и отсутствует при натуральной оспе.

СКО — см. *Санитарно-карантинный отдел.*

СКО́БКИ МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЕ — 1) (син. Мишеля скобки) приспособления для сшивания кожи в виде металлических пластинок с острыми шипами на концах; 2) приспособления для сшивания тканей (кровеносных сосудов, органов) с помощью сшивающих аппаратов, представляющие собой П-образные кусочки металлической проволоки с заостренными краями.

СКО́ЛЕКС (греч. skōlēx червь) — головная часть цестоды, снабженная присосками и крючьями, к-рыми гельминт прикрепляется к тканям хозяина.

СКОЛИО́ГРАФ (греч. skolios кривой, skoliōsis искривление + греч. graphō писать, изображать) — прибор для измерения боковых искривлений позвоночника путем получения его изображения во фронтальной плоскости.

СКОЛИО́З (scoliosis; греч. skoliōsis искривление) — дугообразное искривление позвоночника во фронтальной плоскости.

С. АНТАЛГИ́ЧЕСКИЙ (s. antalgica) — см. *Сколиоз рефлекторно-болевой.*

С. НЕВРОГЕ́ННЫЙ (s. neurogena) — С., обусловленный нарушением функции нервной системы.

С. ПАРАЛИТИ́ЧЕСКИЙ (s. paralytica) — С., обусловленный односторонним парезом или параличом мышц спины и живота после перенесенного полиомиелита.

С. ПРОФЕССИОНА́ЛЬНЫЙ (s. professionalis) — С., развивающийся вследствие систематического пребывания в рабочей позе, характеризующейся статическим напряжением мышц спины преимущественно с одной стороны.

С. РАХИТИ́ЧЕСКИЙ (s. rhachitica) — С. у ребенка, больного рахитом, обусловленный поражением тел позвонков.

С. РЕФЛЕКТО́РНО-БОЛЕВО́Й (s. reflectoria dolorosa; син. С. антальгический) — С., обусловленный рефлекторным сокращением мышц спины и живота на стороне, противоположной локализации патологического процесса, сопровождаемого болью.

С. РУБЦО́ВЫЙ (s. cicatricalis) — С., обусловленный односторонней рубцовой контрактурой мягких тканей спины после их воспаления, травмы или в результате хирургического вмешательства.

С. S-ОБРА́ЗНЫЙ (s. S-formis) — С., при к-ром какой-либо отдел позвоночника искривлен в одну сторону, а выше- или нижележащий отдел — в противоположную.

С. СПАСТИ́ЧЕСКИЙ (s. spastica) — С., обусловленный односторонним центральным параличом мышц спины и живота.

С. СТАТИ́ЧЕСКИЙ (s. statica) — С., обусловленный систематической односторонней статической нагрузкой на мышцы спины и живота (напр., профессиональный или функциональный С.).

С. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (s. traumatica) — С., обусловленный травмой позвоночника.

С. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ ВТОРИ́ЧНЫЙ (s. traumatica secundaria) — С. т., развивающийся на почве вызванных травмой изменений в теле позвонка, обусловливающий его неправильный рост и раннее синостозирование апофизов.

С. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ ПЕРВИ́ЧНЫЙ (s. traumatica primaria) — С. т., развившийся непосредственно после переломовывиха позвоночника.

С. ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ (s. functionalis) — С., развивающийся как компенсаторное приспособление при укорочении нижней конечности.

СКОЛИОЗО́МЕТР МИКУ́ЛИЧА — см. *Микулича сколиозометр.*

СКОЛИОЗО́МЕТР ШУ́ЛЬТЕССА — см. *Шультесса сколиозометр.*

СКОЛИОЗОМЕТРИ́Я (*сколиоз* + греч. metreō измерять) — измерение величины (степени) сколиоза.

С. ПО ДЕ́ЙЧЛЕНДЕРУ — см. *Дейчлендера сколиозометрия.*

СКОЛОПЕ́НДРЫ (Scolopendromorpha) — отряд членистоногих кл. многоножек (Myriapoda); ногочелюсти С. снабжены железами, продуцирующими ядовитые для человека вещества; распространены в странах с жарким климатом, а в СССР — на Кавказе, в Крыму и Средней Азии.

СКОПОФИЛИ́Я (scopophilia; греч. skopeō рассматривать + philia любовь, влечение) — см. *Вуайеризм.*

СКОПОФОБИ́Я (scopophobia; греч. skopeō смотреть + *фобия*; син. скоптофобия) — навязчивый страх: боязнь выглядеть смешным.

СКОПТОФОБИ́Я (scoptophobia; греч. skōptō шутить, насмехаться + *фобия*) — см. *Скопофобия.*

СКОПУЛЯРИОПСИО́З (scopulariopsiosis) — хронический микоз, вызываемый паразитическим грибком Scopulariopsis brevicaulis, характеризующийся поражением ногтевых пластинок больших пальцев стоп, реже — кожи, подкожной клетчатки и внутренних органов.

SCOPULARIÓPSIS BREVICÁULIS — паразитический грибок рода Scopulariopsis (сем. Moniliaceae, кл. несовершенных грибов), характеризующийся крупными двуконтурными конидиями с бородавчатой поверхностью; возбудитель скопулариопсиоза у человека.

СКОР АМИНОКИСЛО́ТНЫЙ [англ. score счет (очков в игре); син. скор белковый] — показатель биологической ценности белка, представляющий собой процентное отношение доли определенной незаменимой аминокислоты

в общем содержании таких аминокислот в исследуемом белке к стандартному (рекомендуемому) значению этой доли.

СКОР БЕЛКО́ВЫЙ — см. *Скор аминокислотный.*

СКО́РБУТ (scorbutus; голландск. scheurbuik, нем. skorbut) — см. *Цинга.*

СКО́РБУТ АЛЬПИ́ЙСКИЙ — см. *Пеллагра.*

СКОРЛУПА́ чечевицеобразного ядра (putamen, PNA, BNA, JNA) — латеральный членик чечевицеобразного ядра, отделенный от бледного шара латеральной мозговой пластинкой.

СКО́РОСТЬ КОРОНА́РНОГО КРОВООБРАЩЕ́НИЯ — см. *Время коронарного кровообращения.*

СКО́РОСТЬ КРОВОТО́КА ЛИНЕ́ЙНАЯ — гемодинамический показатель: скорость движения крови в кровеносном сосуде, определяемая как отношение объемной скорости кровотока к площади поперечного сечения сосуда.

СКО́РОСТЬ КРОВОТО́КА ОБЪЕ́МНАЯ — гемодинамический показатель: количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда за 1 мин.

СКО́РОСТЬ ОСЕДА́НИЯ ЭРИТРОЦИ́ТОВ — см. *Реакция оседания эритроцитов.*

СКО́РОСТЬ РАСПРОСТРАНЕ́НИЯ ПУ́ЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ́ — гемодинамический показатель: скорость перемещения волны давления, вызванной систолой сердца, по аорте и крупным артериям.

СКОРПИ́ЛЯ О́ПУХОЛЬ — см. *Опухоль мукоэпидермоидная.*

СКОРПИО́НЫ (Scorpiones) — отряд членистоногих кл. паукообразных (Arachnoidea); железы, расположенные на последнем членике брюшка С., продуцируют вещество, богатое нейротоксинами, к-рое при введении с жалом в кожу человека вызывает резкую боль.

СКОТОЛО́ЖСТВО — см. *Зоофилия.*

СКОТО́МА (scotoma; греч. skotos темнота, слепота) — дефект поля зрения, не сливающийся с его периферическими границами.

С. АБСОЛЮ́ТНАЯ (s. absolutum) — С., в пределах к-рой полностью отсутствует восприятие света.

С. БИНАЗА́ЛЬНАЯ (s. binasale; лат. bi- два + nasus нос) — двусторонняя С., расположенная в медиальных (носовых) половинах поля зрения.

С. БИТЕМПОРА́ЛЬНАЯ (s. bitemporale; лат. bi- два + tempus, temporis висок) — двусторонняя С., расположенная в латеральных (височных) половинах полей зрения.

СКОТО́МА БЬЕ́РРУМА — см. *Бьеррума скотома.*

С. ГЕМИАНОПИ́ЧЕСКАЯ (s. hemianopticum) — двусторонняя С., локализующаяся только в одной половине поля зрения.

С. ГЛАУКОМАТО́ЗНАЯ (s. glaucomatosum) — С., наблюдающаяся при глаукоме и представляющая собой увеличенное слепое пятно измененной формы.

С. ДВУСТОРО́ННЯЯ (s. bilaterale) — С., обладающая сходными характеристиками в поле зрения как правого, так и левого глаза.

С. ДУГООБРА́ЗНАЯ (s. arcuatum) — С., включающая слепое пятно и дугообразно огибающая точку фиксации взора; наблюдается чаще при глаукоме.

СКОТО́МА ЗЕ́ЙДЕЛЯ — см. *Зейделя скотома.*

СКОТО́МА ЙЕ́НСЕНА — см. *Йенсена скотома.*

С. КЛИНОВИ́ДНАЯ (s. cuneiforme) — С. в форме клина, суживающегося от периферии к слепому пятну и не связанного с ним; наблюдается гл. обр. при околососочковом ретинохориоидите.

С. КОЛЬЦЕВИ́ДНАЯ (s. anulare) — С. в виде кольца, окружающая точку фиксации и не захватывающая периферию поля зрения; наблюдается, напр., при пигментной дегенерации сетчатки.

С. КРУ́ГЛАЯ (s. circinatum) — С., имеющая круглые очертания; наблюдается при ограниченных очаговых поражениях сетчатки и (или) сосудистой оболочки.

С. ЛЕТУ́ЧАЯ — С., форма, размеры и локализация к-рой быстро изменяются.

С. МЕРЦА́ТЕЛЬНАЯ (s. scintillans; син. мигрень глазная) — периодически возникающая гемианопическая скотома, характеризующаяся ощущением мерцания и сопровождающаяся мигренеподобными головными болями; признак расстройства кровообращения в сосудах зрительных проводящих путей выше хиазмы.

С. ОБЪЕКТИ́ВНАЯ (s. objectivum) — см. *Скотома отрицательная.*

С. ОДНОСТОРО́ННЯЯ (s. unilaterale) — С., наблюдаемая в поле зрения лишь одного глаза.

С. ОТНОСИ́ТЕЛЬНАЯ (s. relativum) — С., в пределах к-рой зрительное восприятие нарушено неполностью, напр. ослаблено лишь цветоощущение.

С. ОТРИЦА́ТЕЛЬНАЯ (s. negativum; син. С. объективная) — С., не замечаемая больным и выявляемая лишь с помощью периметрии, кампиметрии или скотометрии.

С. ПАРАЦЕКА́ЛЬНАЯ (s. paracaecale) — С., примыкающая к слепому пятну с какой-либо стороны.

С. ПАРАЦЕНТРА́ЛЬНАЯ (s. paracentrale) — С., примыкающая к точке фиксации взора с какой-либо стороны.

С. ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКАЯ (s. periphericum) — С., расположенная вне зоны центрального зрения.

С. ПЕРИЦЕКА́ЛЬНАЯ (s. pericaecale) — С., окружающая слепое пятно.

С. ПЕРИЦЕНТРА́ЛЬНАЯ (s. pericentrale) — С., окружающая точку фиксации взора в непосредственной близости от нее.

С. ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНАЯ (s. positivum; син. С. субъективная) — С., замечаемая самим больным (обычно в виде темного пятна в поле зрения).

С. ПОЛУЛУ́ННАЯ (s. semilunare) — см. *Зейделя скотома.*

С. СОСУ́ДИСТАЯ (angioscotoma) — см. *Ангиоскотома.*

С. СУБЪЕКТИ́ВНАЯ (s. subjectivum) — см. *Скотома положительная.*

С. ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ (s. functionale) — С. в поле зрения косящего глаза (при содружественном косоглазии), обусловленная компенсаторным центральным подавлением зрительного восприятия, вследствие чего исчезает диплопия.

С. ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ (s. centrale) — С., расположенная в области точки фиксации взора; сопровождается резким снижением остроты зрения.

С. ЦЕНТРОЦЕКА́ЛЬНАЯ (s. centrocaecale) — С., расположенная между точкой фиксации взора и слепым пятном, сливающаяся с ним; наблюдается, напр., при эмболии ветвей центральной артерии сетчатки.

СКОТО́МА ПСИХИ́ЧЕСКАЯ (scotoma psychicum) — непризнание или отрицание больным каких-либо действительных переживаний или фактов; наблюдается, напр., при психогениях.

СКОТО́МА ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (scotoma physiologicum) — общее название естественных дефектов поля зрения (слепого пятна, ангиоскотом и др.).

СКОТО́МЕТР (*скотома* + греч. metreō измерять, определять) — прибор для обнаружения и исследования скотом в центральной части поля зрения.

СКОТОМЕТРИ́Я (scotometria; *скотома* + греч. metreō измерять, определять) — определение формы и размеров скотом.

СКОТОМИЗА́ЦИЯ ПА́МЯТИ (греч. skotos темнота) — выпадение каких-либо воспоминаний, обусловленное особо эмоциональным отношением к ним больного, не сопровождающееся общим нарушением памяти; наблюдается при психогениях.

СКОТОФОБИ́Я (scotophobia; греч. skotos темнота + *фобия*) — см. *Никтофобия.*

СКО́ТТА ОПЕРА́ЦИЯ (M. Scott, род. в 1906 г., амер. нейрохирург) — хирургическая операция по поводу открытой гидроцефалии, заключающаяся в соединении подпаутинного пространства спинного мозга с брюшной полостью полиэтиленовой трубкой, снабженной клапаном, пропускающим цереброспинальную жидкость только под определенным давлением; включает широкую резекцию сальника с целью предупреждения закрытия брюшного конца трубки.

СКП — 1) см. *Санитарно-карантинный отдел, пункт;* 2) см. *Санитарно-контрольный пункт;* 3) см. *Санитарно-контрольный пост.*

СКРЕ́БЕНЬ-ВЕЛИКА́Н — см. *Macracanthorhynchus hirudinaceus.*

СКРЕ́БЕНЬ ЧЕ́ТКОВИ́ДНЫЙ — см. *Moniliformis moniliformis.*

СКРЕ́БНИ (Acanthocephala; син.: акантоцефалы, колючеголовые) — класс паразитических раздельнополых червей, характеризующихся отсутствием полости тела и пищеварительной системы, наличием хоботка с крючьями для закрепления в тканях хозяина; взрослые С. обитают в кишечнике позвоночных (изредка — человека), а их личинки поражают ракообразных и насекомых.

СКРЕ́ПИ (англ. scrapie) — инфекционная болезнь овец, относящаяся к группе медленных инфекций, вызываемая одноименным вирусом; отличается очень продолжительным инкубационным периодом, преимущественным поражением ц. н. с.; к С. восприимчивы многие виды животных, в т. ч. обезьяны.

СКРЕЩЁННЫЕ ЦИЛИ́НДРЫ (син.: бицилиндры, кроссцилиндры) — прибор для определения положения осей астигматизма и его степени, состоящей из двух цилиндрических линз равной преломляю-

щей силы (обычно ± 0,25 или ± 0,5 *дптр*) с взаимно перпендикулярными осями.

СКРЕ́ЩИВАНИЕ — спаривание двух генотипически различных животных, напр. при изучении механизмов наследственности.

С. ВОЗВРА́ТНОЕ (син. беккросс) — С. гибрида первого поколения с одним из родителей.

С. МЕЖВИДОВО́Е — С. особей, принадлежащих к двум различным биологическим видам.

С. МОНОГИБРИ́ДНОЕ — С., при к-ром особи различаются по одной паре аллелей одного гена.

С. ПОЛИГИБРИ́ДНОЕ — С., при к-ром особи различаются по аллелям нескольких генов.

С. ПРОВЕ́РОЧНОЕ — С. двух фенотипически сходных особей, генотип одного из к-рых известен, а другого — неизвестен, с тем, чтобы в гибридах второго поколения установить, одними и теми же или разными генами обусловлен фенотип исходных особей.

СКРИ́НИНГ (англ. screening, от screen просеивать, сортировать, отбирать) — 1) в медицине — массовое обследование населения с целью выявления лиц с определенной болезнью, напр. для выявления сердечно-сосудистой патологии; 2) в фармакологии — отбор новых продуктов химического или биологического синтеза, перспективных для применения в качестве лекарственных средств.

СКРОТА́ЛЬНЫЙ (scrotalis; лат. scrotum мошонка) — относящийся к мошонке.

СКРОФУЛ- (скрофуло-; мед. лат. scrofulae набухшие лимфатические узлы шеи) — составная часть сложных слов, означающая «характеризующийся увеличением лимфатических узлов».

СКРОФУЛО- — см. *Скрофул-*.

СКРОФУЛОДЕ́РМА (scrofuloderma; *скрофуло-* + греч. derma кожа) — см. *Туберкулез кожи колликвативный.*

СКРОФУЛОДЕ́РМА МИЛИА́РНАЯ (scrofuloderma miliare) — см. *Туберкулез кожи лихеноидный.*

СКРОФУЛОТУБЕРКУЛЁЗ (scrofulotuberculosis; *скрофуло-* + *туберкулез*) — форма первичного туберкулеза у детей, характеризующаяся блефаритом, фликтенулезным кератоконъюнктивитом, хроническим ринитом и лимфаденитом.

СКРО́ФУЛЮС (устар.; scrofulosis; син. золотуха) — общее название лимфатико-гипопластического и экссудативно-катарального диатеза.

СКРУ́ПУЛ (истор.; лат. scrupulum) — старинная мера аптекарского веса, равная 1,25 *г*.

СКРЫ́ТЫЙ ПЕРИО́Д инфекционной болезни — см. *Инкубационный период.*

СКУЛОВА́Я ДУГА́ (arcus zygomaticus, PNA, BNA, JNA) — часть лицевого черепа, образованная соединенными скуловым отростком височной кости и височным отростком скуловой кости; место прикрепления височной фасции и жевательной мышцы.

СКУЛОВА́Я О́БЛАСТЬ (regio zygomatica, PNA, BNA, JNA) — участок лица, соответствующий скуловой кости и скуловой дуге.

СКУЛОВА́Я ТО́ЧКА (zygion) — антропометрическая точка: наиболее выступающая кнаружи точка скуловой дуги.

СКУЛОВИСО́ЧНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (foramen zygomaticotemporale, PNA, BNA, JNA) — отверстие на височной поверхности скуловой кости, к-рым открывается внутрикостный канал; место прохождения скуловисочного нерва.

СКУЛОВО́Й БУГО́Р (tuber zygomaticum) — выступающая часть латеральной поверхности скуловой кости.

СКУЛОВО́Й ОТРО́СТОК (processus zygomaticus, PNA, BNA, JNA) — общее название отростков верхней челюсти, лобной и височной костей, посредством к-рых они соединяются со скуловой костью.

СКУЛОГЛАЗНИ́ЧНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (foramen zygomaticoorbitale, PNA, BNA, JNA) — отверстие на глазничной поверхности скуловой кости, к-рым открывается внутрикостный канал; место прохождения скулового нерва.

СКУЛОЛИЦЕВО́Е ОТВЕ́РСТИЕ (foramen zygomaticofaciale, PNA, BNA, JNA) — отверстие на лицевой поверхности скуловой кости, к-рым открывается внутрикостный канал; место прохождения скулолицевого нерва.

СЛАБИ́ТЕЛЬНЫЕ СРЕ́ДСТВА (laxantia, laxativa) — лекарственные средства, усиливающие перистальтику кишечника и ускоряющие его опорожнение (корень ревеня, касторовое масло, фенолфталеин, сульфат натрия и др.).

СЛАБОВИ́ДЯЩИЕ — лица, у к-рых острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией очками составляет 0,05—0,2; нуждаются в постоянном наблюдении офтальмолога и в создании специальных условий для учебы и работы.

СЛАБОСИ́ЛЬНАЯ КОМА́НДА (истор.) — воинское подразделение или отделение госпиталя в русской армии до 1914 г., предназначавшееся для восстановления боеспособности военнослужащих после завершения лечения; прообраз команды выздоравливающих.

СЛА́БОСТЬ РОДОВО́Й ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ — см. *Слабость родовых сил.*

СЛА́БОСТЬ РОДОВЫ́Х СИЛ (inertia uterina; син. слабость родовой деятельности) — недостаточная сократительная способность мускулатуры матки, клиническим проявлением к-рой являются замедленное раскрытие шейки матки и отсутствие продвижения плода по родовому каналу.

С. РОДОВЫХ СИЛ ВТОРИ́ЧНАЯ (i. u. secundaria) — С. р. с., развившаяся после нек-рого периода нормальной родовой деятельности и обусловленная, напр., несоответствием размеров плода и таза роженицы.

С. РОДОВЫХ СИЛ ПЕРВИ́ЧНАЯ (i. u. primaria) — С. р. с., наблюдаемая с самого начала родов.

СЛАБОУ́МИЕ (dementia; син.: анойя — устар., афронезия — устар., деменция) — стойкое оскудение и упрощение психической деятельности, характеризующееся ослаблением познавательных процессов, обеднением эмоций и нарушением поведения.

С. АЛКОГО́ЛЬНОЕ (d. alcoholica) — форма парциального С. с преобладанием расстройств интеллекта, памяти, эмоций и воли; развивается при хроническом алкоголизме, сочетающемся с органическими поражениями головного мозга (нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма и др.) или осложненном ме́таллокогольными психозами (тяжелый делирий, корсаковский психоз и др.).

С. АМНЕСТИ́ЧЕСКОЕ (d. amnestica) — С. с преобладанием глубоких расстройств памяти и дезориентировкой, сопровождающееся иногда конфабуляциями; наблюдается при органических, чаще сосудистых поражениях головного мозга.

С. АПАТИ́ЧЕСКОЕ (d. apathica) — С. с преобладанием полной бездеятельности больного и обеднением его эмоций.

С. АПОПЛЕКТИ́ЧЕСКОЕ (d. apoplectica; син. С. постинсультное) — парциальное или очаговое, реже псевдопаралитическое С., возникающее после инсульта или инфаркта головного мозга.

С. АРТЕРИОСКЛЕРОТИ́ЧЕСКОЕ (d. arteriosclerotica) — парциальное, очаговое или псевдопаралитическое С., развивающееся при атеросклерозе сосудов головного мозга.

С. АФФЕКТИ́ВНОЕ (d. affectiva) — С. с преобладанием аффективной тупости.

С. ВТОРИ́ЧНОЕ (истор.; d. secundaria) — С., рассматривавшееся как конечная стадия «единого психоза».

С. ГЛОБА́РНОЕ — см. *Слабоумие тотальное.*

С. ДИСМНЕСТИ́ЧЕСКОЕ (d. dysmnestica) — см. *Слабоумие парциальное.*

С. ДИФФУ́ЗНОЕ (d. diffusa) — см. *Слабоумие тотальное.*

С. КОНЦЕНТРИ́ЧЕСКОЕ (d. concentrica) — С., протекающее с постепенным сужением и оскудением всех видов психической деятельности, распространяющимся, в основном, на окружающее и, в меньшей степени, на явления, связанные с больным непосредственно; наблюдается, гл. обр., при эпилепсии.

С. ЛАКУНА́РНОЕ — см. *Слабоумие парциальное.*

С. МИОКЛОНИ́ЧЕСКОЕ (d. myoclonica) — эпилептическое С. с преобладанием капризности, злобности, угрюмости или дурашливо-эйфорического настроения; наблюдается при миоклонической эпилепсии.

С. НАРАСТА́ЮЩЕЕ (d. progrediens) — см. *Слабоумие прогредиентное.*

С. ОБРАТИ́МОЕ (d. regrediens) — см. *Слабоумие регредиентное.*

С. ОРГАНИ́ЧЕСКОЕ (d. organica) — общее название вариантов С., возникающих при органических поражениях головного мозга: нарушениях кровообращения, травмах, опухолях, воспалительных или дистрофических процессах в ткани мозга.

С. О́СТРОЕ (d. acuta) — 1) С., быстро развивающееся после массивного повреждения мозговой ткани (напр., травма, инсульт); 2) (истор.) — любое острое расстройство психической деятельности, сопровождавшееся глубоким нарушением умственной деятельности (аментивное состояние и др.).

С. ОЧАГО́ВОЕ (d. focalis) — С., сопровождающееся очаговыми нарушениями функций коры большого мозга (афазия, апраксия, агнозия и др.).

С. ПАРАЛИТИ́ЧЕСКОЕ (d. paralytica; син. С. паретическое) — тотальное С. при прогрессивном параличе, характеризующееся преобладa-

нием эйфории, усилением влечений и полной утратой индивидуальных свойств личности.

С. ПАРЕТИ́ЧЕСКОЕ (d. paretica) — см. *Слабоумие паралитическое.*

С. ПАРЦИА́ЛЬНОЕ (d. partialis; син.: С. дисмнестическое, С. лакунарное, С. частичное) — С. с неравномерно выраженными симптомами выпадения (памяти, интеллекта, эмоций и т. д.) при наличии сознания болезни, а в ряде случаев с сохранением критического отношения к своему состоянию; наблюдается чаще при нарушениях мозгового кровообращения, черепно-мозговой травме.

С. ПОДКО́РКОВОЕ (d. subcorticalis) — С., развивающееся при поражениях подкорковых областей головного мозга и характеризующееся преобладанием назойливости, расстройств влечений и признаками общего снижения уровня личности.

С. ПОЛИСКЛЕРОТИ́ЧЕСКОЕ (d. polysclerotica) — псевдопаралитическое С., возникающее в поздних стадиях рассеянного склероза.

С. ПОСТИНСУ́ЛЬТНОЕ (d. postinsultum) — см. *Слабоумие апоплектическое.*

С. ПРЕСЕНИ́ЛЬНОЕ (d. praesenilis) — тотальное С., сочетающееся с очаговыми расстройствами (афазия, апраксия, агнозия и др.); развивается преимущественно в возрасте 50—60 лет при болезнях Альцгеймера, Пика и других формах атрофии ткани головного мозга.

С. ПРОГРЕДИЕ́НТНОЕ (d. progrediens; син. С. нарастающее) — С. с неуклонно нарастающими явлениями распада психической деятельности.

С. ПРОСТО́Е (d. simplex) — С., к-рым исчерпывается клиническая картина заболевания; встречается при любой психической болезни с прогредиентным течением.

С. ПСЕВДОПАРАЛИТИ́ЧЕСКОЕ (d. pseudoparalytica) — С., по своим проявлениям напоминающее паралитическое С., но этиологически не связанное с прогрессивным параличом.

С. ПСЕВДОСТА́РЧЕСКОЕ (d. pseudosenilis) — см. *Слабоумие сенильноподобное.*

С. ПСИХОМОТО́РНОЕ (d. psychomotoria) — С., возникающее при органических поражениях головного мозга, для к-рых характерны двигательные расстройства (напр., при малой хорее).

С. РЕГРЕДИЕ́НТНОЕ (d. regrediens; син. С. обратимое) — С., при к-ром имеет место обратное развитие его проявлений или компенсация образовавшегося психического дефекта; наблюдается, напр., при поддающихся лечению органических поражениях головного мозга.

С. СЕНИЛЬНОПОДО́БНОЕ (d. pseudosenilis; син. С. псевдостарческое) — С., при к-ром изменения психической деятельности напоминают характерные для старческого слабоумия изменения личности, но не достигают тотального С., напр. включают лишь частичные нарушения памяти.

С. СТАЦИОНА́РНОЕ (d. stationaria) — С., стабилизировавшееся на нек-ром сниженном уровне психической деятельности.

С. ТАБЕТИ́ЧЕСКОЕ (нрк; d. tabetica) — парциальное С. при различных сифилитических поражениях ц. н. с.

С. ТАЛАМИ́ЧЕСКОЕ (d. thalamica) — С. при поражении дорсального медиального ядра таламуса, характеризующееся преобладанием обеднения эмоций (аспонтанность, эмоциональная тупость).

С. ТОТА́ЛЬНОЕ (s. totalis; син.: С. глобарное, С. диффузное) — С., охватывающее все виды психической деятельности и завершающееся их полным распадом; наблюдается, напр., при прогрессивном параличе, при старческом слабоумии.

С. ТРАВМАТИ́ЧЕСКОЕ (d. traumatica) — С., развивающееся после тяжелой черепно-мозговой травмы и характеризующееся преобладанием апатии, расстройств эмоций, эйфорией или эксплозивностью и расстройствами памяти.

С. ХОРЕАТИ́ЧЕСКОЕ (d. choreatica) — С. при хорее Гентингтона, отличающееся сравнительно медленным и неравномерным нарастанием патологических изменений с преобладанием в начальном периоде эксплозивности, усиления влечений, капризности.

С. ЧАСТИ́ЧНОЕ (d. partialis) — см. *Слабоумие парциальное.*

С. ШИЗОФРЕНИ́ЧЕСКОЕ (d. schizophrenica) — С., развивающееся на конечном этапе течения шизофрении и отличающееся относительной сохранностью памяти, знаний и навыков, а также наличием остаточных бредовых и кататонических расстройств.

С. ЭПИЛЕПТИ́ЧЕСКОЕ (d. epileptica) — концентрическое С. с вязкостью, тугоподвижностью и обстоятельностью мышления, олигофазией и выраженными изменениями личности (мелочная придирчивость, педантизм, эгоцентризм, взрывчатость, ханжеская угодливость и др.).

С. ЭРЕТИ́ЧЕСКОЕ (d. erethica) — С., сопровождающееся повышенной раздражительностью, возбудимостью, назойливостью, постоянным двигательным беспокойством, иногда выраженными гиперкинезами; наблюдается, напр., при эпилепсии.

СЛАБОУ́МИЕ БОЛЬНИ́ЧНОЕ (dementia hospitalis) — форма госпитализма, проявляющаяся нарастающей апатией, утратой интересов, усилением аутизма, интеллектуальным снижением, в нек-рых случаях регрессом поведения.

СЛАБОУ́МИЕ ВРОЖДЁННОЕ (dementia congenita) — см. *Олигофрения.*

СЛАБОУ́МИЕ ВЫ́СШЕЕ — см. *Конституциональная глупость.*

СЛАБОУ́МИЕ ОТНОСИ́ТЕЛЬНОЕ (dementia relativa) — см. *Конституциональная глупость.*

СЛАБОУ́МИЕ ПАРАНО́ИДНОЕ (устар.; dementia paranoidea) — см. *Шизофрения параноидная.*

СЛАБОУ́МИЕ ПОСТИНФЕКЦИО́ННОЕ (dementia postinfectiosa) — форма переходного синдрома, возникающая как осложнение нек-рых инфекционных болезней и проявляющаяся преходящим снижением психической активности, обусловленным тяжелой астенией.

СЛАБОУ́МИЕ РА́ННЕЕ — см. *Шизофрения.*

СЛАБОУ́МИЕ САЛО́ННОЕ — см. *Конституциональная глупость.*

СЛАБОУ́МИЕ СЕНИ́ЛЬНОЕ (dementia senilis) — см. *Слабоумие старческое.*

СЛАБОУ́МИЕ СТА́РЧЕСКОЕ (dementia senilis; син.: психоз сенильный — устар., психоз старческий, сенилизм, слабоумие сенильное) — психическая болезнь, начинающаяся преимущественно в старческом возрасте, обусловленная атрофией головного мозга и проявляющаяся постепенно нарастающим распадом психической деятельности до степени тотального слабоумия с утратой особенностей личности больного и развитием старческого маразма.

С. СТА́РЧЕСКОЕ КОНФАБУЛЯТО́РНОЕ (d. senilis confabulatoria) — см. *Пресбиофрения.*

С. СТА́РЧЕСКОЕ ПСИХОТИ́ЧЕСКОЕ (d. senilis psychotica) — С. с., отличающееся относительно медленным развитием и возникновением на начальных этапах болезни депрессивных или паранойяльных расстройств (напр., бреда ущерба, ревности).

СЛАБОУ́МИЕ ТРАНЗИТО́РНОЕ (dementia transitoria) — общее название остро развивающихся и в значительной степени обратимых психопатологических состояний, характеризующихся общим ослаблением и обеднением психической деятельности; наблюдаются при нек-рых органических поражениях головного мозга и интоксикациях.

СЛА́ДЕРА СИМПТОМОКО́МПЛЕКС (G. Sluder, 1868—1928, амер. оториноларинголог; син. синдром крылонебного узла) — невралгия крылонебного ганглия в виде сочетания приступообразных болей в области глаза, корня носа и верхней челюсти с сильным насморком, гиперемией слизистой оболочки носа и глаз, отеком кожи лица, светобоязнью, расстройством аккомодации, головокружением, тошнотой и приступами удушья.

СЛЕД ЖЕЛТО́ЧНОГО СТЕ́БЛЯ — см. *Дивертикул подвздошной кишки.*

СЛЕДОВА́Я РЕА́КЦИЯ — реакция, сохраняющаяся более или менее продолжительное время после завершения действия вызвавшего ее фактора.

СЛЕДОВО́Й ПОТЕНЦИА́Л в нейрофизиологии — медленное изменение мембранного потенциала относительно исходного потенциала покоя, происходящее после окончания потенциала действия и обусловленное восстановительными процессами в возбудимых образованиях.

С. П. ОТРИЦА́ТЕЛЬНЫЙ (син. деполяризация следовая) — С. п. в форме понижения мембранного потенциала относительно уровня потенциала покоя.

С. П. ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ (син. гиперполяризация следовая) — С. п. в форме повышения мембранного потенциала относительно уровня потенциала покоя.

СЛЕДОВО́Й ПРИ́ЗНАК — см. *Вестигий.*

СЛЕЗА́ (lacrima) — см. *Слезная жидкость.*

СЛЁЗНАЯ БОРОЗДА́ (sulcus lacrimalis, PNA, BNA, JNA) — линейные углубления на слезной кости и на носовой поверхности тела верхней челюсти, к-рые совместно образуют носослезный канал.

СЛЁЗНАЯ ВЫ́РЕЗКА (incisura lacrimalis, PNA, BNA, JNA) — выемка на медиальном крае глазничной поверхности верхней челюсти; место ее соединения со слезной костью.

СЛЁЗНАЯ ЖИ́ДКОСТЬ (син. слеза)— прозрачная бесцветная жидкость, постоянно смачивающая роговицу и конъюнктиву, представляющая собой смесь продуктов секреции слезной железы, добавочных слезных желез и желез хряща век.

СЛЁЗНАЯ СКЛА́ДКА (plica lacrimalis, PNA, BNA; plica ductus nasolacrimalis, JNA; син.: Гаснера складка, Розенмюллера складка, складка носослезного канала) — складка слизистой оболочки носовой полости, расположенная в нижнем носовом ходе у устья носослезного протока.

СЛЁЗНАЯ ТО́ЧКА (punctum lacrimale, PNA, BNA, JNA) — отверстие на крае века у медиального угла глаза, ведущее в слезный каналец.

СЛЁЗНАЯ ЧАСТЬ КРУГОВО́Й МЫ́ШЦЫ ГЛА́ЗА (pars lacrimalis musculi orbicularis oculi, PNA, BNA; pars sacci lacrimalis, JNA; син. Горнера мышца) — совокупность мышечных пучков круговой мышцы глаза, охватывающих спереди и сзади слезный мешок и расширяющих его при своем сокращении.

СЛЁЗНОЕ МЯСЦО́ (caruncula lacrimalis, PNA, BNA, JNA) — возвышение у медиального угла глаза, состоящее из соединительной ткани и покрытое плоским эпителием и островками слизистой оболочки.

СЛЁЗНОЕ О́ЗЕРО (lacus lacrimalis, PNA, BNA, JNA) — расширение глазной щели у медиального угла глаза, куда поступает слезная жидкость из конъюнктивального мешка.

СЛЁЗНО-НОСОВА́Я ПРО́БА — см. *Канальцевая проба.*

СЛЁЗНО-НОСОВО́Й ПРОТО́К — см. *Носослезный проток.*

СЛЁЗНЫЕ ПУТИ́ (син. слезоотводящие пути) — совокупность анатомических образований, по к-рым слезная жидкость движется в конъюнктивальном мешке и отводится в полость носа; включают слезный ручей, слезное озеро, слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток.

СЛЁЗНЫЙ КАНА́ЛЕЦ (canaliculus lacrimalis, PNA; ductus lacrimales, BNA; ductuli lacrimales, JNA; син. слезный проток) — общее название двух узких протоков, берущих начало от верхней и нижней слезных точек и соединяющих слезное озеро со слезным мешком.

СЛЁЗНЫЙ МЕШО́К (saccus lacrimalis, PNA, BNA, JNA) — расширенный верхний конец носослезного протока, расположенный у медиального угла глазницы в ямке слезного мешка; в С. м. впадают слезные канальцы.

СЛЁЗНЫЙ ОТРО́СТОК (processus lacrimalis, PNA, BNA, JNA) — передний выступ верхнего края нижней носовой раковины, посредством к-рого она соединяется со слезной костью.

СЛЁЗНЫЙ ПРОТО́К — см. *Слезный каналец.*

СЛЁЗНЫЙ РУЧЕ́Й (rivus lacrimalis, PNA, BNA, JNA) — пространство между краем нижнего века и глазным яблоком, по к-рому слезная жидкость перемещается к слезному озеру.

СЛЁЗНЫЙ СОСО́ЧЕК (papilla lacrimalis, PNA, BNA, JNA) — небольшое возвышение края века у медиального угла глаза, на к-ром находится слезная точка.

СЛЕЗОВЫДЕЛЕ́НИЕ — см. *Слезоотделение.*

СЛЕЗООТВЕДЕ́НИЕ — отведение слезной жидкости из конъюнктивального мешка в полость носа по слезным путям.

СЛЕЗООТВОДЯ́ЩИЕ ПУТИ́ — см. *Слезные пути.*

СЛЕЗООТДЕЛЕ́НИЕ (син. слезовыделение) — секреция слезной жидкости слезными железами.

СЛЕЗОТЕЧЕ́НИЕ (lacrimatio) — истечение слезной жидкости из конъюнктивального мешка на кожу лица.

С. ГИПЕРСЕКРЕТО́РНОЕ (син. лакримация) — С., обусловленное избыточным слезоотделением.

С. РЕТЕНЦИО́ННОЕ (син. эпифора) — С., обусловленное нарушением слезоотведения.

СЛЕ́ПНИ (Tabanidae) — семейство кровососущих двукрылых насекомых; представители С. являются специфическими переносчиками лоаоза; могут механически переносить возбудителей сибирской язвы и туляремии.

СЛЕПОГЛУХОНЕМОТА́ (caecosurdomutitas) — сочетание слепоты с глухонемотой; возникает как аномалия развития или последствие нек-рых болезней раннего возраста.

СЛЕПОГЛУХОТА́ (caecosurditas) — сочетание слепоты и глухоты.

СЛЕПО́Е ОТВЕ́РСТИЕ (foramen cecum, PNA; foramen caecum, BNA, JNA) — отверстие на верхней поверхности носовой части лобной кости, расположенное позади лобного гребешка и ведущее в короткий слепой канал, содержащий отросток твердой мозговой оболочки; иногда через С. о. проходит вена от слизистой оболочки носа.

СЛЕПО́Е ОТВЕ́РСТИЕ ЯЗЫКА́ (foramen cecum linguae, PNA; foramen caecum linguae, BNA, JNA; син. морганиево отверстие) — углубление на верхней поверхности языка, расположенное по средней линии на границе тела и корня языка; остаток эмбрионального щитоязычного протока.

СЛЕПО́Е ПЯТНО́ (macula caeca; син. Мариотта пятно) — абсолютная скотома, являющаяся проекцией в поле зрения диска зрительного нерва, не имеющего световоспринимающих элементов.

СЛЕПОТА́ (caecitas; син.: слепота абсолютная, слепота медицинская, слепота полная) — стойкое отсутствие светоощущения на оба глаза.

СЛЕПОТА́ АБСОЛЮ́ТНАЯ (caecitas absoluta) — см. *Слепота.*

СЛЕПОТА́ ВЕРБА́ЛЬНАЯ — см. *Алексия.*

СЛЕПОТА́ ГРАЖДА́НСКАЯ — см. *Слепота практическая.*

СЛЕПОТА́ ДУШЕ́ВНАЯ — см. *Агнозия зрительная.*

СЛЕПОТА́ КО́РКОВАЯ (caecitas corticalis) — слепота, обусловленная поражением зрительных центров в коре большого мозга.

СЛЕПОТА́ КУРИ́НАЯ — см. *Гемералопия.*

СЛЕПОТА́ МЕДИЦИ́НСКАЯ — см. *Слепота.*

СЛЕПОТА́ МУЗЫКА́ЛЬНАЯ (alexia musicalis) — вид агнозии: утрата способности понимания нотного письма.

СЛЕПОТА́ НЕПО́ЛНАЯ (caecitas incompleta; син. слепота частичная) — резкое понижение остроты зрения, при к-ром она не превышает 0,04 на лучше видящем глазу (с коррекцией очками), но светоощущение сохранено.

СЛЕПОТА́ НО́ЧНАЯ — см. *Гемералопия.*

СЛЕПОТА́ ПО́ЛНАЯ (caecitas completa) — см. *Слепота.*

СЛЕПОТА́ ПРАКТИ́ЧЕСКАЯ (син. слепота гражданская) — понижение функциональной способности зрительного анализатора до уровня, не дающего возможности осуществлять большинство видов профессиональной деятельности и ограничивающего возможность передвижения и самообслуживания.

СЛЕПОТА́ ПРОФЕССИОНА́ЛЬНАЯ (caecitas professionalis) — понижение функциональной способности зрительного анализатора до уровня, не дающего возможности заниматься привычной профессиональной деятельностью.

СЛЕПОТА́ ПСИХОГЕ́ННАЯ (caecitas psychogena) — см. *Амблиопия истерическая.*

СЛЕПОТА́ РЕФЛЕКТО́РНАЯ (caecitas reflectoria) — отсутствие зрения, обусловленное рефлекторным спазмом круговых мышц глаза, приводящим к закрытию глазной щели; наблюдается, напр., при тяжелых кератитах.

СЛЕПОТА́ СЛОВЕ́СНАЯ (caecitas verbalis) — см. *Алексия.*

СЛЕПОТА́ СНЕ́ЖНАЯ — см. *Офтальмия снежная.*

СЛЕПОТА́ УРЕМИ́ЧЕСКАЯ (caecitas uraemica) — слепота, обусловленная поражением сетчатки при уремии.

СЛЕПОТА́ ЦВЕТОВА́Я — см. *Ахроматопсия.*

СЛЕПОТА́ ЧАСТИ́ЧНАЯ — см. *Слепота неполная.*

СЛЕ́ПОЧНЫЕ МАТЕРИА́ЛЫ — см. *Оттискные материалы.*

СЛИВНА́Я СТА́НЦИЯ — сооружение на канализационном коллекторе, предназначенное для приема жидких бытовых отходов, доставляемых в бочках и автоцистернах из неканализованных районов (населенных мест).

СЛИЗЕОБРАЗОВА́НИЕ — продуцирование слизи железами мерокринного типа.

СЛИ́ЗИСТАЯ ОБОЛО́ЧКА (tunica mucosa, JNA) — внутренний слой стенки полых органов пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем, состоящий из соединительной и гладкомышечной ткани, выстланный эпителием, поверхность к-рого покрыта слизью, вырабатываемой расположенными в С. о. слизистыми железами.

СЛИ́ЗИСТАЯ СУ́МКА (bursa mucosa) — см. *Синовиальная сумка.*

СЛИ́ЗИСТОЕ ПЕРЕРОЖДЕ́НИЕ (degeneratio mucosa) — см. *Дистрофия слизистая.*

СЛИ́ЗИСТЫЙ БАРЬЕ́Р — совокупность мукоцитов желудка и выделяемого ими слоя вязкого секрета, выполняющая функцию защиты стенки желудка от действия физических и химических повреждающих факторов.

СЛИЗЬ (mucus) — вязкая жидкость, секретируемая слизистыми железами и представляющая собой водный раствор гликопротеидов.

СЛИ́ЯНИЕ ХРОМОСО́М — образование из двух или более хромосом одной хромосомы; С. х., происходящее в области центромер (центрическое С. х.), играет роль в эволюции кариотипов.

СЛОВЕ́СНАЯ ОКРО́ШКА (син. словесный салат) — речь, состоящая из набора слов, лишенных смысловой и грамматической связи; наблюдается

при шизофрении, при нек-рых формах помрачения сознания.

СЛОВЕ́СНЫЙ ПОРТРЕ́Т — метод идентификации личности, основанный на описании внешности человека при помощи стандартных словесных обозначений.

СЛОВЕ́СНЫЙ САЛА́Т — см. *Словесная окрошка.*

СЛОЙ ГРУШЕВИ́ДНЫХ НЕЙРО́НОВ (stratum ganglionare, LNH; син. ганглионарный слой) — средний цитоархитектонический слой коры мозжечка, образованный одним рядом грушевидных нейронов (клеток Пуркинье).

СЛОЙ КО́РНЯ ДЕНТИ́ННЫЙ ЗЕРНИ́СТЫЙ (stratum granulosum dentini radicis, LNH; син. Томса зернистый слой) — слой дентина корня зуба, состоящий из мелких дентинных шаров и расположенный на границе с цементом.

СЛОЙ МИЕЛИ́НА (stratum myelini, LNH; син. миелиновая оболочка) — внутренняя часть глиальной оболочки нервного волокна, содержащая миелин.

СЛОЙ ПОЛОВИ́ННОГО ОСЛАБЛЕ́НИЯ (СПО; син. слой полуослабления) — толщина слоя поглотителя, ослабляющего плотность потока энергии (интенсивность) рентгеновского и гамма-излучения в два раза; показатель используется в лучевой терапии и в радиационной гигиене.

СЛОЙ ПОЛУОСЛАБЛЕ́НИЯ — см. *Слой половинного ослабления.*

СЛОЙ РАЗМНОЖА́ЮЩИХСЯ ХОНДРОЦИ́ТОВ (stratum chondrocytorum multiplicantium, LNH; син.: замыкательная пластинка эпифиза, хрящевая пластинка роста) — участок эпифизарного хряща, в к-ром происходит размножение хондроцитов в период роста кости.

СЛОНО́ВОСТЬ (elephantiasis; син. элефантиаз) — значительное увеличение объема нижних конечностей, иногда мошонки и половых губ, сопровождающееся склерозом и трофическими расстройствами кожи и подкожной клетчатки; обусловлено стойким лимфостазом.

СЛОНО́ВОСТЬ ЛО́ЖНАЯ (elephantiasis falsa) — см. *Слоновость нейрофиброматозная.*

СЛОНО́ВОСТЬ НЕЙРОФИБРОМАТО́ЗНАЯ (elephantiasis neurofibromatosa; син.: псевдоэлефантиаз, слоновость ложная) — значительное увеличение объема нижних конечностей, обусловленное развитием в них множественных нейрофибром.

СЛУ́ЖБА КРО́ВИ — специализированная организация в составе военно-медицинской службы или медицинской службы Гражданской обороны, осуществляющая заготовку консервированной крови и препаратов крови, а также снабжение ими медицинских подразделений, частей, учреждений и формирований.

СЛУХ (auditus) — восприятие звуковых колебаний, осуществляемое органом слуха и слуховым анализатором.

С. БИНАУРА́ЛЬНЫЙ (a. binauralis, лат. bini по два, пара + auris ухо) — С. при восприятии обоими ушами; обеспечивает способность определять направление на источник звука.

С. МОНОАУРА́ЛЬНЫЙ (a. monoauralis; греч. monos один + лат. auris ухо) — С. при восприятии одним ухом, т. е. при глухоте на другое ухо или искусственном выключении его функции.

СЛУХ АБСОЛЮ́ТНЫЙ (auditus absolutus) — вид музыкального слуха: способность определять на слух высоту звука.

СЛУХ БОЛЕ́ЗНЕННЫЙ (acusalgia) — см. *Акузалгия.*

СЛУХ ВЕРБА́ЛЬНЫЙ — способность распознавать на слух слова.

СЛУХ МУЗЫКА́ЛЬНЫЙ — способность человека воспринимать оттенки музыкальных звуков и функциональные связи между ними.

СЛУХ ТОНА́ЛЬНЫЙ (auditus tonalis) — способность различать звуки по высоте.

СЛУХ ФОНЕМАТИ́ЧЕСКИЙ (auditus phonematicus) — способность распознавания на слух минимальных различительных элементов речи (фонем).

СЛУХ ЦВЕТНО́Й — см. *Фонопсия.*

СЛУХОВА́Я КА́ПСУЛА (capsula otica, LNE) — хрящевое образование, развивающееся вокруг слухового пузырька; зачаток костного лабиринта внутреннего уха.

СЛУХОВА́Я ЛУЧИ́СТОСТЬ (radiatio acustica, PNA) — пучок нервных волокон, идущий от медиального коленчатого тела через внутреннюю капсулу к коре верхней височной извилины; относится к слуховым путям.

СЛУХОВА́Я ПЕ́ТЛЯ (lemniscus acusticus) — см. *Латеральная петля.*

СЛУХОВА́Я ТРУБА́ (tuba auditiva, PNA, BNA; tuba pharyngotympanica, JNA; син.: барабанно-глоточная труба, евстахиева труба) — костно-хрящевой канал, соединяющий барабанную полость с носовой частью глотки.

СЛУХОВА́Я ЯМКА (fovea otica, LNE) — углубление в области головы зародыша, возникающее в результате впячивания дорсолатеральной (статоакустической) плакоды; из С. я. образуется слуховой пузырек.

СЛУХОВО́Е ОТВЕ́РСТИЕ ВНУ́ТРЕННЕЕ (porus acusticus internus, PNA, BNA, JNA) — отверстие на задней поверхности пирамиды височной кости, ведущее во внутренний слуховой проход; место прохождения лицевого, промежуточного и преддверно-улиткового нервов, артерии и вен лабиринта.

СЛУХОВО́Е ОТВЕ́РСТИЕ НАРУ́ЖНОЕ (porus acusticus externus, PNA, BNA, JNA) — отверстие на латеральной поверхности височной кости, ограниченное сверху чешуей, сзади сосцевидной, спереди и снизу барабанной частью височной кости и ведущее в наружный слуховой проход.

СЛУХОВО́Е ПО́ЛЕ — см. *Преддверное поле.*

СЛУХОВО́Й ПРОХО́Д ВНУ́ТРЕННИЙ (meatus acusticus internus, PNA, BNA, JNA) — канал височной кости, расположенный внутри пирамиды, начинающийся на ее задней поверхности внутренним слуховым отверстием и ведущий к внутреннему уху; содержит лицевой, промежуточный и преддверно-улитковый нервы, артерию и вены лабиринта; на дне С. п. в. начинается лицевой канал.

СЛУХОВО́Й ПРОХО́Д НАРУ́ЖНЫЙ (meatus acusticus externus, PNA, BNA, JNA) — костно-хрящевой канал, выстланный кожей и идущий от ушной раковины к барабанной полости; является частью наружного уха, проводит воздушные колебания к барабанной перепонке.

СЛУХОВО́Й ПУЗЫРЁК (vesicula otica, LNE; син.: статоакустический пузырек, статоциста) — выстланная эпителием полость, возникающая у зародыша в результате отшнуровывания от кожной эктодермы дорсолатеральной (статоакустической) плакоды; зачаток перепончатого лабиринта внутреннего уха.

СЛУХОВЫ́Е ВОЛО́СКИ (pili acustici, LNH; син. стереоцилии) — фибриллярные структуры, отходящие от кутикулы апикальной поверхности волосковых клеток слухового и вестибулярного рецепторных аппаратов.

СЛУХОВЫ́Е ЗУ́БЧИКИ (dentes acustici, LNH) — гребневидные выросты губы преддверного края костной спиральной пластинки улиткового протока.

СЛУХОВЫ́Е ПОЛО́СКИ — см. *Мозговые полоски четвертого желудочка.*

СЛУХОВЫ́Е ПУТИ́ — совокупность нервных волокон, проводящих нервные импульсы от спирального органа улитки к подкорковым и корковым центрам слуха.

СЛУХОВЫ́Е ПЯ́ТНА — см. *Статические пятна.*

СЛУХОВЫ́Е СТРУ́НЫ (fibrae acusticae, LNH; син.: волокна слуховые, Ретциуса опорные нити) — тонкие коллагеновые волокна в составе базальной мембраны, натянутые по всему ходу улиткового канала между спиральной костной пластинкой и спиральной связкой; колебания С. с. передаются спиральному органу и обусловливают восприятие звука.

СЛУХОНЕМОТА́ (audimutitas) — задержка формирования речи у ребенка при ненарушенном слухе.

СЛУХОПРОТЕЗИ́РОВАНИЕ — комплекс мероприятий по улучшению слуха при тугоухости, включающий подбор слухового аппарата, обучение и тренировку в пользовании им.

СЛЮНА́ (saliva) — секрет слюнных желез; содержит пищеварительные ферменты, гл. обр. амилазу.

СЛЮ́ННЫЕ ТЕЛЬЦА́ (corpuscula salivaria, LNH) — лейкоциты в составе слюны; появляются в результате миграции из слизистой оболочки ротовой полости.

СЛЮНООТДЕЛЕ́НИЕ (salivatio; син. саливация) — выделение слюны из слюнных желез в ротовую полость.

СЛЮНООТСО́С — см. *Отсасыватель слюны.*

СМЕ́ГМА (греч. smegma мазь; син. препуциальная смазка) — секрет желез крайней плоти, скапливающийся под ее внутренним листком и в венечной борозде полового члена.

СМЕГМОЛИ́Т (*смегма* + греч. lithos камень) — см. *Конкремент препуциальный.*

СМЕ́ЛЛИ ПРИЁМ (W. Smellie, 1697—1763, англ. акушер) — акушерский ручной прием, применяемый при тазовом предлежании плода во время рождения головки и заключающийся в дополнительном сгибании головки пальцем, вводимым в рот плода.

СМЕ́ЛЛИ — ЗИГЕМУНДИН ПРИЁМ (W. Smellie, 1697—1763, англ. акушер; J. Siegemundin, 1648—1705, нем. акушерка; син. двойной ручной прием) — акушерский поворот плода на ножку, при к-ром одна рука акушера, введенная в матку, отталкивает головку вверх, а другая тянет ножку за пет-

лю бинта, предварительно наложенную на голеностопный сустав плода.

СМЕРТЕ́ЛЬНОСТЬ — см. *Летальность.*

СМЕ́РТНОСТЬ — убыль населения в связи со смертью; оценивается по коэффициентам смертности.

С. АНТЕНАТА́ЛЬНАЯ (лат. ante перед, раньше + natus рождение) — С. жизнеспособных плодов до начала родовой деятельности у матери.

С. ДЕ́ТСКАЯ РА́ННЯЯ (син.: С. неонатальная, С. новорожденных) — С. детей на первом месяце жизни.

С. ИНТРАНАТА́ЛЬНАЯ (лат. intra внутри, в течение + natus рождение) — С. жизнеспособных плодов во время родов.

С. МАТЕРИ́НСКАЯ — С. женщин после 28 недель беременности (кроме случаев смерти от абортов и внематочной беременности), а также во время родов и в послеродовом периоде.

С. НЕОНАТА́ЛЬНАЯ (греч. neos новый + лат. natus рождение) — см. *Смертность детская ранняя.*

С. НОВОРОЖДЁННЫХ — см. *Смертность детская ранняя.*

С. ПЕРИНАТА́ЛЬНАЯ (греч. peri вокруг + лат. natus рождение) — С. жизнеспособных плодов и новорожденных детей; включает антенатальную, интранатальную и постнатальную С.

С. ПОСТНАТА́ЛЬНАЯ (лат. post после + natus рождение) — С. детей на первой неделе жизни.

СМЕРТЬ (mors; син. смерть биологическая) — необратимое прекращение жизнедеятельности организма, являющееся неизбежной заключительной стадией его индивидуального существования.

С. БИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — см. *Смерть.*

С. ВНЕЗА́ПНАЯ (m. subita) — см. *Смерть скоропостижная.*

С. ВНУТРИУТРО́БНАЯ (m. intrauterina) — С. зародыша или плода, наступившая внутри организма матери на любом этапе внутриутробной жизни, в т. ч. в родах.

С. ЕСТЕ́СТВЕННАЯ (m. naturalis; син. С. физиологическая) — С. в результате естественной возрастной инволюции организма и постепенного прекращения функционирования его тканей, органов и систем.

«С. В КОЛЫБЕ́ЛИ» — скоропостижная С. внешне здорового ребенка в возрасте от недели до одного года.

«С. ПОД ЛУЧО́М» — С., наступившая во время воздействия на организм понизирующего излучения в очень большой дозе.

С. МОЗГОВА́Я — С., наступившая в результате несовместимого с жизнью поражения головного мозга.

С. НАСИ́ЛЬСТВЕННАЯ — С., наступившая в результате воздействия на организм человека механических, физических или химических факторов.

С. НЕНАСИ́ЛЬСТВЕННАЯ — С., наступившая в результате недопошенности, болезни или старения.

С. СКОРОПОСТИ́ЖНАЯ (m. subita; син. С. внезапная) — ненасильственная С., неожиданно наступившая на фоне кажущегося здоровья.

С. СОМАТИ́ЧЕСКАЯ (m. somatica) — С., наступившая в результате необратимого, несовместимого с жизнью поражения каких-либо органов.

С. ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (m. physiologica) — см. *Смерть естественная.*

СМЕРТЬ КЛИНИ́ЧЕСКАЯ (mors clinicalis) — терминальное состояние, наступающее после прекращения сердечной деятельности и дыхания и продолжающееся до наступления необратимых изменений в высших отделах ц. н. с.

СМЕРТЬ МО́ЗГА (син. деанимация — устар.) — тотальный некроз головного мозга при сохраненной деятельности сердца и газообмене, обеспеченном с помощью непрерывной искусственной вентиляции легких.

СМЕ́ТА МЕДИЦИ́НСКОГО УЧРЕЖДЕ́НИЯ — документ, содержащий годовой план расходов медицинского учреждения, распределенных по отдельным их видам (статьям).

СМЕ́ШАННЫЕ СОСТОЯ́НИЯ — психопатологические синдромы, в к-рых сочетаются отдельные признаки депрессии и мании, напр. психическое возбуждение с аффектом тоски, двигательное торможение с наплывом мыслей, двигательное возбуждение с интеллектуальным торможением, двигательное и психическое торможение с гипертимией.

СМЕ́ШЕНИЕ ЦВЕТО́В — комбинирование двух или более цветовых раздражителей таким образом, чтобы они воспринимались как одноцветный объект.

С. ЦВЕТО́В БИНОКУЛЯ́РНОЕ — С. ц., при к-ром один из двух цветовых раздражителей воздействует на сетчатку правого глаза, а другой — на корреспондирующую область сетчатки левого глаза.

С. ЦВЕТО́В ВРЕМЕНИ́ОЕ — С. ц. при быстром последовательном предъявлении цветовых раздражителей.

С. ЦВЕТО́В ПРОСТРА́НСТВЕННОЕ — С. ц., при к-ром цветовой раздражитель представляет собой объект, состоящий из разноцветных элементов, угловые размеры к-рых ниже порога различения (напр., тонкая решетка).

СМЕЩЕ́НИЕ в популяционной генетике — изменение частоты аллелей в популяции в результате действия отбора.

СМЕЩЕ́НИЕ ПОЛОВО́ГО ЧЛЕ́НА (ectopia penis; син. дислокация полового члена) — аномалия развития, при к-рой половой член расположен не на обычном месте, напр. позади мошонки.

СМИРИ́ТЕЛЬНАЯ РУБА́ШКА (истор.) — особая одежда, связывающая движения конечностей и туловища психически больного с выраженным двигательным возбуждением; применялась в 19 в.

СМИРНО́ВА ПЛАНТОГРАФИ́Я (Е. В. Смирнов, сов. хирург) — способ определения степени плоскостопия, основанный на получении отпечатка (на бумаге) подошвы, окрашенной чернилами, и оценке соотношения закрашенной и незакрашенной частей перпендикуляра, восстановленного из середины прямой линии, касающейся внутреннего края отпечатка.

СМИ́ТА БОЛЕ́ЗНЬ (C. H. Smith, род. в 1895 г., амер. педиатр) — см. *Лимфоцитоз инфекционный острый.*

СМИ́ТА КЕСАРЕ́ВО СЕЧЕ́НИЕ (A. J. Smith, англ. акушер 19 в.) — низкое абдоминальное кесарево сечение, при к-ром после вскрытия париетальной брюшины (над мочевым пузырем и в пузырно-маточном углублении) ее листки сшивают для предупреждения инфицирования брюшной полости.

СМИ́ТА МЕ́ТОД (H. W. Smith, род. в 1895 г., амер. физиолог) — метод исследования почечного кровотока по клиренсу диодраста, к-рый полностью секретируется почечными канальцами.

СМИ́ТА ПЕРЕЛО́М (R. W. Smith, 1807—1873, ирланд. хирург) — сгибательный перелом дистального эпифиза лучевой кости со смещением периферического отломка в ладонную сторону и его пронацией; возникает при падении на тыльную поверхность кисти.

СМИ́ТА — ДИ́ТРИХА СПО́СОБ (J. L. Smith, 1861—1931, англ. врач; A. Dietrich, 1873—1961, нем. патолог) — метод выявления липидов в гистологических препаратах путем их окраски уксуснокислым гематоксилином после обработки раствором бихромата калия; липиды, гл. обр. фосфатиды, окрашиваются при этом в черный цвет.

СМИ́ТА — ФИ́ШЕРА СИМПТО́М (E. Smith, 1835—1914, англ. врач; L. Fischer, 1864—1944, амер. педиатр) — выслушивание сосудистых шумов над областью рукоятки грудины при откинутой назад голове больного; признак туберкулезного бронхаденита, обусловленный сдавлением плечеголовных вен увеличенными лимфатическими узлами.

СМИ́ТВИКА ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; R. H. Smithwick, род. в 1899 г., амер. хирург) — хирургическая операция: пересечение чревных нервов и двусторонняя симпатэктомия от I грудного до II поясничного ганглиев; была предложена для лечения гипертонической болезни.

СМИТ-ПЕ́ТЕРСЕНА АРТРОДЕ́З (M. N. Smith-Petersen, 1886—1953, амер. хирург) — артродез крестцово-подвздошного сустава при его туберкулезном поражении, производимый путем удаления хрящевого покрытия суставной поверхности крестца под выкроенным прямоугольным фрагментом подвздошной кости с последующим удалением хряща с этого фрагмента и укладыванием его на прежнее место.

СМИТ-ПЕ́ТЕРСЕНА МЕ́ТОД (M. N. Smith-Petersen) — метод остеосинтеза при переломах шейки бедренной кости, заключающийся в проведении через отломки трехлопастного гвоздя по направляющей спице, предварительно введенной в шейку и головку бедренной кости после закрытой репозиции.

СМИТ-ПЕ́ТЕРСЕНА ТРЕХЛО́ПАСТНЫЙ ГВОЗДЬ (M. N. Smith-Petersen) — стержень из антикоррозийного металла, имеющий по длине три выступающих плоских ребра; предназначен для остеосинтеза при переломах шейки бедренной кости.

СМОГ (англ. smog, сокращение от smoke дым, копоть и fog туман; син. токсический туман) — туман с высоким содержанием выхлопных газов и промышленных выбросов, образующийся в атмосфере городов при определенных сочетаниях метеорологических условий; может быть причиной обострения хронических болезней органов дыхания и кровообращения.

СМОЛЬЯННИКОВА СПО́СОБ (А. В. Смольянников, род. в 1913 г.,

сов. патологоанатом) — способ предварительной обработки кино- и рентгенопленки для получения из нее целлоидина, заключающийся в кипячении пленки в воде и последующем выдерживании в течение 2—3 дней в 10% растворе едкого кали или едкого натра.

СМОЛЯ́НОВА МОЛОТО́К (А. А. Смолянов, 1897—1958, сов. нейрофизиолог) — инструмент для неврологического обследования, представляющий собой металлический молоток с резиновым наконечником для исследования сухожильных рефлексов, снабженный иглой и кисточкой для исследования болевой и тактильной чувствительности.

СНА́ППЕРА ме́тод (I. Snapper, род. в 1889 г., голландский врач) — метод обнаружения крови в кале, основанный на переводе гемоглобина в гемохромоген и спектроскопическом определении последнего.

СНЕГИРЁВА КОЛЬПОПЕКСИ́Я (истор.; В. Ф. Снегирев, 1847—1916, отеч. гинеколог) — хирургическая операция: внебрюшинная фиксация влагалища к паховой связке или к крестцово-остистой связке, предложенная для лечения опущения стенок влагалища.

СНЕГИРЁВА КОЛЬПОПОЭЗ (истор.; В. Ф. Снегирев) — хирургическая операция: образование искусственного влагалища из участка прямой кишки с наложением anus praeternaturalis на месте удаляемого копчика.

СНЕГИРЁВА ме́тод (В. Ф. Снегирев) — метод остановки маточного кровотечения в послеродовом периоде путем перегибания тела матки в области нижнего сегмента; одной рукой, расположенной в заднем влагалищном своде, шейку матки отводят кпереди, а другой рукой, охватывающей матку через переднюю брюшную стенку, ее сгибают кпереди.

СНЕГИРЁВА ПРИ́ЗНАК (В. Ф. Снегирев) — уплотнение и уменьшение матки при ее механическом раздражении рукой; признак беременности малых сроков.

СНЕ́ДДОНА — УИ́ЛКИНСОНА СИНДРО́М (J. B. Sneddon, совр. англ. дерматолог; D. S. Wilkinson, совр. англ. дерматолог) — см. *Дерматоз субкорнеальный пустулезный.*

СНЕ́ЛЛЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (H. Snellen, 1834—1908, голландский офтальмолог) — хирургическая операция: устранение рубцового заворота век и трихиаза, заключающееся в частичном удалении хряща века.

СНЕ́ЛЛЕНА ПИНЦЕ́Т (H. Snellen) — кровоостанавливающий зажим, применяющийся при операциях на веках, отличающийся своеобразной формой рабочих губок, позволяющей пережать кровеносные сосуды и одновременно защитить глазное яблоко от повреждения.

СНЕ́ЛЛЕНА ПИНЦЕ́Т-ЗАЖИ́М (H. Snellen) — см. *Пинцет-зажим.*

СНЕ́ЛЛЕНА ТАБЛИ́ЦЫ (H. Snellen) — таблицы для определения остроты зрения, состоящие из нескольких рядов различных по величине букв латинского алфавита, цифр или оптотипов в виде буквы Ш (крючков Снеллена), обращенных в разные стороны; размер каждого знака в 5 раз превышает толщину образующих его линий; С. т. используются также в гигиене для оценки прозрачности воды (шрифт Снеллена).

СНЕ́САРЕВА ме́тод (П. Е. Снесарев, 1876—1954, сов. нейроморфолог) — 1) метод выявления нейроглии в гистологических препаратах, основанный на последовательной окраске фиксированных срезов ткани мозга смесью эозина с метиленовым синим (краска Мая — Грюнвальда) и эритрозином: волокна глии окрашиваются в голубой цвет, ядра клеток — в синий и розовый; 2) модификация метода выявления ретикулярных волокон по Бильшовскому, отличающаяся применением для фиксации срезов растворов железных квасцов и нитрата серебра.

СНИЖЕ́НИЕ У́РОВНЯ ЛИ́ЧНОСТИ — сочетание обеднения и ослабления психической активности, снижения умственной работоспособности и утраты интересов с нерезко выраженными расстройствами памяти и сглаживанием индивидуальных особенностей личности; наблюдается при развитии или после психической болезни.

СНОВИДЕ́НИЯ (somnia) — субъективно переживаемые психические явления (образы, идеи), периодически возникающие во время сна.

С. ВНУШЁННЫЕ (s. suggesta) — С., вызванные внушением в состоянии гипноза.

С. КОШМА́РНЫЕ — С. крайне неприятного, устрашающего содержания; психопатологический симптом, встречающийся в продромальном состоянии, непосредственно перед возникновением или в течение остро протекающих болезней, в т. ч. психозов.

С. МУЧИ́ТЕЛЬНЫЕ — см. *Онироидизм.*

С. СДЕ́ЛАННЫЕ — С., в отношении к-рых у больных имеется бредовая убежденность, что они вызваны кем-то искусственно; проявление синдрома Кандинского — Клерамбо.

С. ЭРОТИ́ЧЕСКИЕ — С., содержание к-рых носит сексуальный характер; обычно сопровождаются объективными проявлениями — от сексуального возбуждения до оргазма.

СНОВИДЕ́НИЯ НАЯВУ́ — см. *Фантазирование истерическое.*

СНОВИ́ДНОЕ ИЗМЕНЕ́НИЕ СОЗНА́НИЯ — см. *Синдром онейроидный.*

СНОТВО́РНЫЕ СРЕ́ДСТВА (hypnotica; син. гипнотические средства) — лекарственные средства, применяемые с целью облегчения наступления сна и обеспечения его достаточной продолжительности (барбамил, нитразепам и др.).

СНОХОЖДЕ́НИЕ (somnambulismus) — см. *Сомнамбулизм.*

СОА́ВЕ ОПЕРА́ЦИЯ (F. Soave) — хирургическая операция при болезни Гиршспрунга, заключающаяся в мобилизации пораженного участка прямой и сигмовидной кишок, выведении его из промежности через канал, сформированный путем отслаивания слизистой оболочки прямой кишки, и последующей резекции выведенной части.

СОБА́ЧЬЯ Я́МКА (fossa canina, PNA, BNA, JNA; син. клыковая ямка) — углубление на передней поверхности тела верхней челюсти; место, где начинается мышца, поднимающая угол рта.

СО́БСТВЕННО КО́ЖА — см. *Дерма.*

СО́БСТВЕННО СОСУ́ДИСТАЯ ОБОЛО́ЧКА глаза (choroidea, PNA; chorioidea, BNA; chorioides, JNA) — задняя часть сосудистой оболочки глазного яблока, богатая кровеносными сосудами и пигментом; С. с. о. препятствует прохождению света через склеру.

СОВЕРШЕННОЛЕ́ТИЕ — достижение возраста 18 лет, с к-рым закон связывает наступление полной дееспособности гражданина СССР; установление факта С. в спорных случаях входит в компетенцию судебно-медицинской экспертизы.

СОВЕ́Т ВРАЧЕ́БНЫХ КОЛЛЕ́ГИЙ (истор.) — первый советский государственный орган управления здравоохранением, объединивший работу врачебных коллегий при различных ведомствах; существовал с 24 января до 11 июля 1918 г.

СОВЕ́Т МЕДИЦИ́НСКИХ СЕСТЁР — совещательный орган при главном враче больницы, действующий на общественных началах, занимающийся вопросами организации работы среднего медицинского персонала, повышения его квалификации, улучшения качества и культуры медицинской помощи и ухода за больными, осуществляющий общественный контроль за работой средних медицинских работников.

СОВОКУПЛЕ́НИЕ (coitus) — см. *Коитус.*

СОДО́КУ (японское sodoku крысиный яд) — острая инфекционная болезнь, из числа болезней от укуса крыс, вызываемая бактерией Spirillum minor, характеризующаяся повторными пароксизмами лихорадки, мышечными болями, воспалительно-некротическими изменениями тканей в месте укуса, регионарным лимфангиитом и лимфаденитом; пароксизмы могут повторяться в течение нескольких месяцев.

СОДОМИ́Я — см. *Зоофилия.*

СОЕДИНЕ́НИЕ F — см. *Гидрокортизон.*

СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ ОБОЛО́ЧКА ГЛА́ЗА (tunica conjunctiva) — см. *Конъюнктива.*

СОЕДИНИ́ТЕЛЬНОЕ ПЛЕ́ЧИКО — см. *Мозжечковая ножка верхняя.*

СОЕДИНЯ́ЮЩИЙ ПРОТО́К (ductus reuniens, PNA, BNA, JNA; син. Гензена проток) — небольшой канал, расположенный во внутреннем ухе и соединяющий сферический мешочек с улитковым протоком.

СОЗНА́НИЕ — высшая, свойственная лишь человеку форма отражения действительности, представляющая собой совокупность психических процессов, позволяющих ему ориентироваться в окружающем мире, времени, собственной личности, обеспечивающих преемственность опыта, единство и многообразие поведения.

СОЗНА́НИЕ АКТИ́ВНОСТИ «Я» — осознание активного характера всех видов собственной психической деятельности; основной элемент самосознания, нарушающийся при нек-рых психических болезнях.

СОЗНА́НИЕ АЛЬТЕРНИ́РУЮЩЕЕ (син. раздвоение сознания) — расстройство сознания, при к-ром больной осознает себя то одной, то другой личностью и, находясь в одном состоянии, совершенно забывает о другом; наблюдается при истерическом психозе.

СОЗНА́НИЕ АФФЕКТИ́ВНО-СУ́ЖЕННОЕ (син. сознание суженное) — остро развивающееся резкое ограничение объема сознания с сохранением лишь эмоционально значимых связей

с окружающим; наблюдается при психогениях.

СОЗНА́НИЕ БРЕДОВО́Е — этап развития бреда; убежденность в особом значении каких-либо событий или явлений.

СОЗНА́НИЕ ДЕМАРКА́ЦИИ «Я» — осознание наличия границы между «Я» и не «Я»; элемент самосознания, нарушающийся при многих психозах.

СОЗНА́НИЕ ИДЕНТИ́ЧНОСТИ «Я» (син. чувство «Я») — осознание тождества «Я» в различные моменты времени; нарушается при нек-рых психических болезнях.

СОЗНА́НИЕ СВЕРХБО́ДРСТВУЮЩЕЕ — сочетание облегченного потока ассоциаций, необычной образности и живости представлений и мыслительной деятельности, повышенной, но малопродуктивной активности; наблюдается, напр., после приема большой дозы нек-рых психостимулирующих средств.

СОЗНА́НИЕ СУ́ЖЕННОЕ — см. *Сознание аффективно-суженное.*

СОЗНА́НИЕ ЦЕ́ЛОСТНОСТИ «Я» — осознание единства, взаимосвязанности и принадлежности к «Я» всех видов собственной психической деятельности; нарушается при нек-рых психических болезнях.

СОЗО́Н-ЯРОШЕ́ВИЧА ДО́СТУП (А. Ю. Созон-Ярошевич, сов. хирург) — оперативный доступ к плечевому сплетению, при к-ром разрез проводят от середины заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы через середину ключицы к нижнему краю большой грудной мышцы.

СОЗО́Н-ЯРОШЕ́ВИЧА ПЕРФОРА́ЦИЯ МОЗО́ЛИСТОГО ТЕ́ЛА (А. Ю. Созон-Ярошевич) — пункция мозолистого тела на границе его задней и средней трети при лечении гидроцефалии.

СОКЛЕ́ТИЕ — см. *Синцитий.*

СОКОЛО́ВА ОПЕРА́ЦИЯ (Н. Н. Соколов, род. в 1900 г., сов. хирург) — хирургическая операция: низведение яичка в мошонку при крипторхизме, завершающаяся прошиванием низведенного яичка за белочную оболочку через кожу мошонки (лигатуру фиксируют к гипсовой лонгете, наложенной на бедро).

СОКОЛО́ВА ПРО́БА (Ю. Н. Соколов) — метод рентгенологической диагностики хронической эмфиземы легких, основанный на получении трех отдельных рентгенограмм небольшого участка легкого— в фазе максимального вдоха, дыхательной паузы и максимального выдоха при одинаковых условиях экспозиции и проявления; степень различия оптической плотности рентгенограмм позволяет оценить выраженность эмфиземы легких.

СОКОЛО́ВА — ЛАЙО́НА КРИТЕ́РИИ (M. Sokolow; T. P. Lyon) — совокупность 11 основных электрокардиографических признаков, характерных для гипертрофии левого и (или) правого желудочков сердца и определяемых в стандартных, грудных отведениях электрокардиограммы и усиленных отведениях от конечностей.

СОКОЛО́ВСКОГО АППАРА́Т (М. П. Соколовский, род. в 1887 г., сов. хирург) — ортопедический аппарат для устранения смещения отломков костей предплечья по длине и под углом путем вытяжения грузом, подвешенным через блок к дуге, укрепленной на II — V пальцах кисти, при фиксации плеча второй дугой, укрепленной на неподвижной стойке.

СОКОЛО́ВСКОГО ОПЕРА́ЦИЯ (М. П. Соколовский) — способ предампутационного выключения нервных стволов конечности и профилактики послеампутационных болей; заключается в обнажении нервного ствола отдельным разрезом на расстоянии 10—25 *см* выше уровня предполагаемой ампутации и перевязке его после эндоневральной анестезии двумя кетгутовыми лигатурами на расстоянии 3—4 *см* одна от другой.

СОКО́ЛЬСКОГО — БУЙО́ БОЛЕ́ЗНЬ (Г. И. Сокольский, 1807—1886, отеч. терапевт; J. B. Bouillaud, 1796—1881, франц. врач) — см. *Ревматизм.*

СОКРАТИ́МОСТЬ — способность мышечных волокон укорачиваться или изменять свое напряжение.

СОКРАТИ́ТЕЛЬНАЯ ПЛА́ЗМА (истор.) — см. *Киноплазма.*

СОКРАЩЕ́НИЕ мышечное — укорочение или изменение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу.

С. ИЗОМЕТРИ́ЧЕСКОЕ — С., при к-ром длина мышечных волокон остается неизменной, а напряжение их возрастает.

С. ИЗОТОНИ́ЧЕСКОЕ — С., при к-ром мышечные волокна укорачиваются и утолщаются, а их напряжение практически не изменяется.

С. МАКСИМА́ЛЬНОЕ — С., при к-ром одновременно возбуждено максимально возможное число мышечных волокон.

С. ОДИНО́ЧНОЕ — С., состоящее из фаз сокращения и последующего расслабления, возникающее при воздействии одиночного стимула.

С. ТЕТАНИ́ЧЕСКОЕ — см. *Тетанус.*

СО́КСЛЕТА АППАРА́Т (F. R. Soxhlet, 1848—1926, нем. химик) — прибор для определения содержания жира и липоидов в пищевых продуктах путем экстрагирования.

СОЛАНИ́Н (Solanum паслен) — токсичный глюкозид, обладающий антихолинэстеразным действием и содержащийся в ботве, зеленых ягодах и клубнях пасленовых; значительные количества С. накапливаются в клубнях проросшего картофеля, хранящегося на свету.

СОЛЕВО́Й БАЛА́НС — соотношение количества поступающих в организм и выделяемых им минеральных веществ, обеспечивающее сохранение их постоянного уровня в тканях и внутренних средах организма.

СОЛЕРЕ́СА АСИНКЛИТИ́ЗМ (точнее Солейре; F. L. J. Solayrès, 1737—1772, франц. гинеколог) — неправильное вставление головки плода при родах: сагиттальный шов располагается в одном из косых размеров таза; наблюдается при кососуженном тазе.

СОЛИТА́РИЗМ СТА́РЧЕСКИЙ (solitarismum senilis; лат. solitarius склонный к одиночеству) — склонность к замкнутому образу жизни у лиц пожилого возраста.

СОЛИТЁР — см. *Цепень.*

СО́ЛЛЮКС-ЛА́МПА (лат. sol солнце + lux свет; син. лампа-соллюкс) — светильник в виде укрепленной на штативе лампы накаливания с рефлектором; применяется для светотеплолечения.

СО́ЛНЕЧНАЯ АКТИ́ВНОСТЬ — регулярное возникновение на Солнце особых образований (солнечных пятен и др.), сопровождающееся усилением корпускулярного излучения Солнца; С. а. оказывает воздействие на многие, в т. ч. биологические, процессы на Земле.

СО́ЛНЕЧНАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ (син.: голодание световое, голодание солнечное, голодание ультрафиолетовое, ультрафиолетовая недостаточность) — нарушение трофических и обменных процессов в организме, обусловленное длительным отсутствием воздействия на него ультрафиолетового излучения Солнца.

СО́ЛНЕЧНЫЙ УДА́Р (apoplexia solaris; син. гелиоз) — тепловой удар, вызванный интенсивным или длительным воздействием на организм прямого солнечного излучения.

СОЛНЦЕЛЕЧЕ́НИЕ (heliotherapia) — см. *Гелиотерапия.*

СОЛОВО́ВА ПЛА́СТИКА УРЕ́ТРЫ (П. Д. Соловов, 1875—1940, сов. хирург и уролог) — пластическая операция: инвагинация мобилизованного дистального отдела мочеиспускательного канала в его проксимальный отдел; применяется при сужении задней части мочеиспускательного канала.

СОЛОВЬЁВА И́НДЕКС (Г. А. Соловьев) — ориентировочный показатель разницы между наружными и внутренними размерами женского таза, к-рая связана с индивидуальными различиями толщины костей; представляет собой длину (в *см*) окружности руки в области лучезапястного сустава.

СОЛОДО́ВЫЙ СА́ХАР — см. *Мальтоза.*

СОЛЬВАТА́ЦИЯ — образование непрочных химических соединений (сольватов) между молекулами растворителя и молекулами или ионами растворенного вещества.

СОЛЬПУ́ГИ (Solifugae; син. фаланги)— отряд членистоногих кл. паукообразных, представители к-рого распространены в степных и пустынных районах жарких стран, не имеют ядовитых желез, но способны нанести болезненный укус.

СОЛЯ́РИЙ (лат. solarius солнечный) — площадка, оборудованная для приема солнечных ванн.

СОЛЯРИ́Т (solaritis; анат. устар. plexus solaris чревное сплетение + *-ит*) — воспаление чревного сплетения.

СО́МА (греч. sôma тело) — 1) тело, туловище; 2) совокупность всех клеток организма, за исключением репродуктивных клеток.

СОМАТИЗА́ЦИЯ (греч. sôma, sômatos, тело) — 1) в психиатрии — патоморфоз нек-рых психических болезней, при к-ром вегетативные расстройства преобладают над психопатологическими; 2) в психосоматике — возникновение болезней внутренних органов в результате психических конфликтов.

СОМАТИ́ЧЕСКИЙ НАБО́Р ХРОМОСО́М — см. *Диплоидный набор хромосом.*

СОМАТИ́ЧЕСКОЕ ЧИСЛО́ — количество хромосом в соматических клетках, характерное для данного биологического вида.

СОМАТО- (греч. sōma, sōmatos тело) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к телу».

СОМАТОГЕНИ́Я (*сомато-* + греч. -genēs порожденный) — см. *Соматогенная реакция.*

СОМАТОГЕ́ННАЯ РЕА́КЦИЯ (син. соматогения) в психиатрии — устаревшее обозначение психических расстройств (астенический синдром, экзогенные типы реакций, переходные синдромы), возникающих в период каких-либо болезней внутренних органов и других (не психических) болезней.

СОМАТОЛО́ГИЯ (*сомато-* + греч. logos учение) в антропологии — раздел антропоморфологии, изучающий индивидуальную и групповую изменчивость телосложения человека.

СОМАТОМЕТРИ́Я (*сомато-* + греч. metreō измерять) — совокупность методов определения наружных размеров и массы тела человека.

СОМАТОПЛЕ́ВРА (somatopleura; *сомато-* + *плевра*) — см. *Мезодерма соматическая.*

СОМАТОПСИХО́З ВЕ́РНИКЕ (*сомато-* + *психоз*) — см. *Вернике соматопсихоз.*

СОМАТОСКОПИ́Я (*сомато-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — совокупность методов точного описания внешних особенностей строения тела человека.

СОМАТОТРОПИ́Н (somatotropinum; *сомато-* + греч. tropos поворот, направление) — см. *Гормон соматотропный.*

СОМАТОТРОПОЦИ́Т (somatotropocytus; *сомато-* + греч. tropos поворот, направление + гист. cytus клетка) — ацидофильная клетка аденогипофиза, окрашивающаяся оранжем L, секретирующая соматотропный гормон.

СОМАТОФРЕНИ́Я (устар.; *сомато-* + греч. phrēn душа, ум, разум; син. Бехтерева соматофрения) — психоз, проявляющийся выраженными сенестопатиями, ипохондрическим синдромом, пониженным настроением и сопровождающийся вегетативными нарушениями; ныне рассматривается как приступ шизофрении или атипичная форма депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза.

СОМИ́Т (somitus, LNE; греч. sōma тело; син. спинной сегмент) — метамерный участок дорсальной части мезодермы, дифференцирующийся в дальнейшем на дерматом, миотом и склеротом.

СО́ММА — КРА́ЙЛА КО́СТНЫЙ ШОВ (истор.) — остеосинтез с применением шелковой нити.

СОМНАМБУЛИ́ЗМ (somnambulismus; лат. somnus сон + ambulo бродить; син.: автоматическое блуждание, лунатизм, снохождение) — сумеречное помрачение сознания в форме блуждания во сне с выполнением привычных движений и действий; сопровождается амнезией.

СОМНАМБУЛИ́ЗМ ГИПНОТИ́ЧЕСКИЙ (somnambulismus hypnoticus) — выполнение в глубокой стадии гипноза сложных движений и действий, внушенных гипнотизирующим.

СОМНОЛЕ́НТНОСТЬ (somnolentia; лат. somnolentus сонливый) — см. *Гиперсомния.*

СОН (somnus) — физиологическое состояние, периодически сменяющее бодрствование и характеризующееся у человека отсутствием сознательной психической деятельности, значительным снижением реакций на внешние раздражения.

С. АКТИВИ́РОВАННЫЙ — см. *Сон быстрый.*

С. БЫСТРЫЙ (син.: С. активированный, С. парадоксальный) — фаза физиологического С., характеризующаяся наличием на электроэнцефалограмме быстрых низкоамплитудных колебаний, быстрыми движениями глаз, понижением тонуса мышц лица и шеи и наличием сновидений; возникает через правильные промежутки времени, составляя 20—25% общей продолжительности сна.

С. ГИПНОТИ́ЧЕСКИЙ (s. hypnoticus; син.: С. парциальный, С. частичный) — С., вызванный гипнотическим воздействием.

С. ДИССОЦИИ́РОВАННЫЙ (s. dissociatus) — используемый в лечебных целях медикаментозный С., прерываемый в течение суток несколькими небольшими периодами бодрствования.

С. МЕДИКАМЕНТО́ЗНЫЙ (s. medicamentosus; син. С. наркотический) — С., вызванный действием седативных или наркотических лекарственных средств.

С. МЕ́ДЛЕННЫЙ (син. С. ортодоксальный) — фаза физиологического С., характеризующаяся наличием на электроэнцефалограмме медленных высокоамплитудных колебаний (дельта-волн) и веретенообразных серий быстрых колебаний (сонных веретен); составляет по продолжительности бо́льшую часть сна.

С. НАРКОТИ́ЧЕСКИЙ (s. narcoticus) — см. *Сон медикаментозный.*

С. ОРТОДОКСА́ЛЬНЫЙ — см. *Сон медленный.*

С. ПАРАДОКСА́ЛЬНЫЙ — см. *Сон быстрый.*

С. ПАРЦИА́ЛЬНЫЙ (s. partialis) — см. *Сон гипнотический.*

С. ПРОЛОНГИ́РОВАННЫЙ (s. prolongatus) — С., продолжительность к-рого увеличена путем применения лекарственных средств; используется с лечебной целью.

С. ТЕРМИНА́ЛЬНЫЙ (s. terminalis) — глубокий С., наступающий по окончании нек-рых патологических состояний, напр. большого эпилептического припадка, алкогольного делирия, патологического опьянения.

С. УСЛОВНОРЕФЛЕКТО́РНЫЙ — С., вызванный по механизму условного рефлекса; используется с целью снижения возможного токсического действия снотворных средств или предотвращения привыкания к ним.

С. ЧАСТИ́ЧНЫЙ (s. partialis) — см. *Сон гипнотический.*

СОН ЛЕТАРГИ́ЧЕСКИЙ — см. *Летаргия.*

СОН МЕСМЕРИ́ЧЕСКИЙ — см. *Гипноз.*

СОН-ДЕПРИВА́ЦИЯ — искусственное лишение сна созданием помех засыпанию; применяется в условиях научного эксперимента.

СОНЛИ́ВОСТЬ (somnolentia) — потребность заснуть, сочетающаяся с общим снижением активности, замедленностью течения психических процессов, ослаблением мышечного тонуса.

СО́ННАЯ БОРОЗДА́ (sulcus caroticus, PNA, BNA, JNA; син. борозда внутренней сонной артерии) — линейное углубление на боковой поверхности тела клиновидной кости; место прохождения внутренней сонной артерии.

СО́ННАЯ ЯМКА (fossa carotica, BNA) — см. *Сонный треугольник.*

СО́ННО-БАРАБА́ННЫЕ ВЕ́ТВИ (rami caroticotympanici, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *88.*

СО́ННО-БАРАБА́ННЫЕ КАНА́ЛЬЦЫ (canaliculi caroticotympanici, PNA, BNA, JNA) — узкие каналы в пирамиде височной кости, соединяющие сонный канал с барабанной полостью; место прохождения ветвей внутреннего сонного сплетения и кровеносных сосудов.

СО́ННЫЙ БУГОРО́К (tuberculum caroticum, PNA, BNA, JNA; син. Шассеньяка бугорок) — передний выступ поперечного отростка VI шейного позвонка; к С. б. прижимают общую сонную артерию для временной остановки кровотечения.

СО́ННЫЙ КАНА́Л (canalis caroticus, PNA, BNA, JNA) — канал в пирамиде височной кости, открывающийся отверстиями на нижней поверхности пирамиды и у ее вершины; место прохождения внутренней сонной артерии.

СО́ННЫЙ КЛУБО́К (glomus caroticum, LNH) — см. *Гломус сонный.*

СО́ННЫЙ СИ́НУС (sinus caroticus, PNA; син. каротидный синус) — расширенная часть артериального русла в области бифуркации общей сонной и начала внутренней сонной артерии.

СО́ННЫЙ ТРЕУГО́ЛЬНИК (trigonum caroticum, PNA, JNA; fossa carotica, BNA; trigonum omohyoideum; син.: Жерди подъязычная ямка, сонная ямка) — участок передней области шеи, ограниченный сзади грудино-ключично-сосцевидной мышцей, снизу лопаточно-подъязычной мышцей, сверху — задним брюшком двубрюшной мышцы; место расположения сосудисто-нервного пучка шеи, удобное для перевязки сонных артерий.

СОНОТЕРАПИ́Я (лат. sonus звук + *терапия*) — см. *Терапия ультразвуковая.*

СОНОФОРЕ́З (лат. sonus звук + греч. phorēsis несение, перенос) — см. *Фонофорез.*

СООБЩА́ЮЩАЯСЯ ВЕТВЬ мало-берцовой артерии — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *173.*

SOOR (нем., от древнесакс. sohren засыхать) — см. *Стоматит кандидозный.*

СООЩУЩЕ́НИЯ — см. *Синестезия.*

СО́ПОР (sopor; лат. «беспамятство»; син.: сопорозное состояние, субкома) — глубокая стадия оглушения, при к-рой отсутствуют реакции на словесное обращение и сохранены лишь реакции на болевое раздражение.

СОПОРО́ЗНОЕ СОСТОЯ́НИЕ (status soporosus) — см. *Сопор.*

СОПРОТИВЛЕ́НИЕ БРОНХИА́ЛЬНОЕ — сопротивление бронхов и трахеи потоку воздуха при дыхании; величина С. б. зависит гл. обр. от суммарного поперечного сечения дыхательных путей.

СОПРОТИВЛЕ́НИЕ СОСУ́ДОВ О́БЩЕЕ ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКОЕ — сопротивление, оказываемое сосудами большого круга кровообращения (гл. обр. артериолами и капиллярами) перемещению крови из левого желудочка

и правый желудочек; рассчитывается как отношение разности средних давлений крови в аорте и в полой вене к среднему объему крови, протекающей за 1 сек.; иногда термин применяют и для малого круга кровообращения.

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ — см. *Резистентность.*

СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВЫСТРЕЛА — см. *Дополнительные факторы выстрела.*

СОРБИТ — шестиатомный спирт, используемый в качестве заменителя сахара для больных сахарным диабетом; содержится, напр., в морских водорослях, в плодах рябины.

СОРБОЗА — моносахарид, являющийся промежуточным продуктом промышленного синтеза аскорбиновой кислоты; содержится в ряде растений.

СОРБЦИЯ (лат. sorbeo поглощать) — поглощение твердым телом или жидкостью (сорбентами) каких-либо веществ из окружающей среды; основные виды С.— адсорбция, абсорбция и хемосорбция.

СОРЕЗИ СИМПТОМ (A. Z. Soresi, род. в 1877 г., амер. хирург) — болезненность в правой паховой области при надавливании в правой подреберной области у больного, лежащего на спине; возможный признак хронического аппендицита.

СОРРЕЛЯ АРТРОДЕЗ (истор.; E. Sorrel) — внесуставной артродез тазобедренного сустава прямоугольным трансплантатом из крыла подвздошной кости, отогнутым кнаружи и фиксированным отсеченным большим вертелом; применялся при коксите.

СОРТИРОВКА МЕДИЦИНСКАЯ — распределение поступающих пораженных и больных на группы нуждающихся в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях в зависимости от характера и тяжести поражения (заболевания) с определением очередности и места оказания медицинской помощи каждой группе, очередности и способа эвакуации, а также назначения в то или иное лечебное учреждение.

С. МЕДИЦИНСКАЯ ВНУТРИПУНКТОВАЯ — С. м., определяющая порядок прохождения пораженных (больных) внутримедицинского пункта (учреждения), устанавливающая очередность и место оказания им медицинской помощи на данном этапе.

С. МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАЯ — С. м., определяющая порядок направления пораженных (больных) за пределы данного этапа, устанавливающая очередность и способ их эвакуации, а также место назначения.

СОРТИРОВОЧНАЯ БРИГАДА — возглавляемая врачом группа медицинского персонала, осуществляющая медицинскую сортировку пораженных и больных на этапе медицинской эвакуации.

СОРТИРОВОЧНАЯ МАРКА (син. сортировочный талон) — жетон (или талон) определенного цвета и формы, предназначенный для обозначения результатов внутрипунктовой или эвакуационно-транспортной медицинской сортировки; прикрепляется на видном месте к одежде пораженного (больного), повязке или к ручкам носилок.

СОРТИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА — место, отведенное для временного размещения пораженных и больных, поступающих на этап медицинской эвакуации, и их медицинской сортировки.

СОРТИРОВОЧНО - ЭВАКУАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (син. приемно-эвакуационное отделение — устар.) — функциональное подразделение этапа медицинской эвакуации, предназначенное для приема, медицинской сортировки поступающих пораженных и больных и для подготовки их к дальнейшей эвакуации.

СОРТИРОВОЧНЫЙ ПОСТ (СП) — пост, выставляемый при въезде на этап медицинской эвакуации для встречи прибывающих пораженных и больных и их предварительной сортировки на основные потоки (тяжело и легко пораженных и больных) в пределах данного этапа.

СОРТИРОВОЧНЫЙ ТАЛОН — см. *Сортировочная марка.*

СОСАЛЬЩИКИ ДИГЕНЕТИЧЕСКИЕ — см. *Трематоды.*

СОСАНИЕ — совокупность координированных непроизвольных (рефлекторных) движений грудного ребенка, обеспечивающих поступление жидкой пищи в ротовую полость.

СОСКОВАЯ ЛИНИЯ (linea mamillaris) — см. *Срединно-ключичная линия.*

СОСКОВЫЙ ОТРОСТОК (processus mamillaris, PNA, BNA, JNA) — парный отросток поясничного позвонка, отходящий в верхнезаднем направлении от верхнего суставного отростка.

СОСОК ГРУДНОЙ (papilla mammae, PNA, BNA, JNA) — пигментированное возвышение конической или цилиндрической формы на поверхности молочной железы; на вершине С. г. открываются млечные протоки; у мужчин С. г. недоразвит.

СОСОК ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (устар.; papilla nervi optici, BNA) — см. *Диск зрительного нерва.*

СОСОЧЕК ВОЛОСА (papilla pili, PNA, BNA, JNA, LNH; син. волосяной сосочек) — соединительнотканное образование конической формы, вдающееся из глубины кожи в фолликул волоса, содержащее кровеносные сосуды и нервные волокна.

СОСОЧЕК ЗУБА (papilla dentis, PNA, BNA) — эмбриональный зачаток пульпы зуба, расположенный внутри эмалевого (зубного) органа.

СОСОЧКИ ДЕРМЫ (papillae, LNH; син. кожные сосочки) — соединительнотканные образования конической формы, вдающиеся из сосочкового слоя дермы в эпидермис.

СОСОЧКИ ЯЗЫКА (papillae linguales, PNA, BNA, JNA) — выросты слизистой оболочки языка, в к-рых расположены рецепторы, в частности вкусовые.

СОСОЧКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ (foramina papillaria, PNA, BNA; foramina papillarum, JNA) — отверстия сосочковых протоков на поверхности почечных пирамид; через С. о. моча поступает в полость малых почечных чашек.

СОСОЧКОВЫЙ ОТРОСТОК (processus papillaris, PNA, BNA, JNA) — выступ на переднем крае хвостатой доли печени.

СОСОЧКОВЫЙ ПРИЗНАК — обнаруживаемое при рентгенологическом исследовании выбухание большого сосочка двенадцатиперстной кишки; признак обострения хронического панкреатита.

СОСОЧКОВЫЙ ПРОТОК (ductus papillaris, LNH) — узкий канал в почечной пирамиде, образуемый слиянием собирательных почечных трубочек и открывающийся в полость малой почечной чашки.

СОСОЧКОВЫЙ СЛОЙ кожи (stratum papillare, LNH) —слой дермы, образованный рыхлой волокнистой соединительной тканью и расположенный непосредственно под эпидермисом.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (син. санитарное состояние населения) — комплексная социально-гигиеническая характеристика здоровья населения, содержащая или обобщающая ряд демографических показателей, уровень заболеваемости и физического развития населения.

СОСУД(-Ы) [vas(-a), PNA, BNA, JNA] в анатомии — трубчатое образование, по к-рому движется кровь или лимфа.

С. АНАСТОМОТИЧЕСКИЙ (v. anastomoticum, PNA, BNA; v. communicans, JNA; син. анастомоз — устар.) — С., посредством к-рого сообщаются два кровеносных или лимфатических С.

С. ВЫНОСЯЩИЙ (v. efferens, PNA, BNA; arteriola efferens, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *252.*

С. КОЛЛАТЕРАЛЬНЫЙ (v. collaterale, PNA, BNA, JNA; син. коллатераль сосудистая)— кровеносный С., по к-рому происходит движение крови в обход основного С.

С. КРОВЕНОСНЫЙ (v. sanguineum) — С., по к-рому движется кровь; к С. к. относят артерии, артериолы, капилляры, венулы и вены.

С. ЛИМФАТИЧЕСКИЙ (v. lymphaticum, PNA, BNA) — С., по к-рому движется лимфа.

С. ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ВЫНОСЯЩИЙ (v. lymphaticum efferens, LNH) — С. л., несущий лимфу от лимфатического узла.

С. ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПРИНОСЯЩИЙ (v. lymphaticum afferens, LNH) — С. л., приносящий лимфу к лимфатическому узлу.

С. МЛЕЧНЫЕ (устар.; v. chylifera, v. lactea; син. Азелли сосуды) — лимфатические С. брыжейки тонкой кишки, к-рые во время пищеварения заполняются похожей на молоко эмульсией всосавшегося жира.

С. ПРИНОСЯЩИЙ (v. afferens, PNA, BNA; arteriola afferens, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, 7.

С. СОСУДОВ (v. vasorum, PNA, BNA, JNA) — мелкие кровеносные С., разветвляющиеся в стенках артерий и вен.

СОСУДИСТАЯ ЛАКУНА (lacuna vasorum, PNA, BNA, JNA) — медиальная часть пространства между паховой связкой и тазовой костью, ограниченная спереди паховой связкой, сзади гребенчатой связкой, латерально подвздошно-гребешковой дугой, медиально лакунарной связкой; содержит бедренную артерию и вену, лимфатический узел, клетчатку.

СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (insufficientia vascularis) — патологическое состояние, характеризующееся артериальной гипотензией и нарушением перфузии жизненно важных органов, обусловленными снижением

тонуса стенок артерий; различают острую С. н., проявляющуюся обмороком, коллапсом или шоком, и хроническую С. н., проявляющуюся в форме симптоматической или первичной артериальной гипотензии.

СОСУ́ДИСТАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ МОЗГОВА́Я (insufficientia cerebralis vascularis) — преходящее нарушение кровоснабжения головного мозга в бассейне сосудов, наиболее пораженных атеросклерозом, возникающее при понижении артериального давления в большом круге кровообращения, кровопотере, перераспределении крови в организме или при ослаблении сердечной деятельности.

СОСУ́ДИСТАЯ ОБОЛО́ЧКА ГЛАЗНО́ГО Я́БЛОКА (tunica vasculosa bulbi oculi, PNA; tunica vasculosa oculi, BNA; tunica media oculi, JNA; син. увеальный тракт) — слой соединительной ткани, расположенный под фиброзной оболочкой глазного яблока, содержащий густую сеть кровеносных сосудов, большое количество пигментных клеток и гладкие мышечные клетки; в составе С. о. г. я. различают собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку.

СОСУ́ДИСТАЯ ПЛАСТИ́НКА (lamina vasculosa, LNH) — слой собственно сосудистой оболочки глазного яблока, расположенный между надсосудистой и хориокапиллярной пластинками, содержащий многочисленные артерии и вены, а также рыхлую волокнистую соединительную ткань с большим количеством пигментных клеток.

СОСУ́ДИСТАЯ СЕТЬ (rete vasculosum, BNA, JNA) — совокупность кровеносных или лимфатических сосудов какой-либо части тела или органа, соединенных между собой хорошо развитыми анастомотическими сосудами.

СОСУ́ДИСТОЕ КОЛЬЦО́ ЗРИ́ТЕЛЬНОГО НЕ́РВА (circulus vasculosus nervi optici, PNA, BNA; circulus vasculosus fasciculi optici, JNA; син.: Галлера венчик, цинново сосудистое кольцо) — сосудистое сплетение, образованное задними короткими ресничными артериями вокруг места выхода зрительного нерва из глазного яблока.

СОСУ́ДИСТОЕ СПЛЕТЕ́НИЕ желудочков мозга (plexus choroideus, PNA; plexus chorioideus, BNA, JNA; син.: ворсинчатое сплетение, сосудисто-эпителиальное сплетение, хориоидное сплетение) — ворсинчатое образование в желудочках головного мозга, являющееся производным мягкой мозговой оболочки, содержащее большое количество кровеносных сосудов и чувствительных нервных окончаний; продуцирует цереброспинальную жидкость.

СОСУ́ДИСТО - ЭПИТЕЛИА́ЛЬНОЕ СПЛЕТЕ́НИЕ — см. *Сосудистое сплетение.*

СОСУДОРАСШИРЯ́ЮЩИЕ СРЕ́ДСТВА (vasodilatantia) — лекарственные средства, снижающие тонус сосудистой стенки и тем самым расширяющие просвет сосудов; применяются для понижения артериального давления и регуляции регионарного кровообращения.

СОСУДОСУ́ЖИВАЮЩИЕ СРЕ́ДСТВА (vasoconstrictiva) — лекарственные средства, повышающие тонус сосудистой стенки и тем самым сужающие просвет сосудов; применяются для повышения артериального давления (напр., мезатон, норадреналин).

СОСЦЕВИ́ДНАЯ ВЫРЕ́ЗКА (incisura mastoidea, PNA, BNA, JNA) — борозда, расположенная на медиальной поверхности сосцевидного отростка височной кости; от С. в. начинается двубрюшная мышца.

СОСЦЕВИ́ДНАЯ О́БЛАСТЬ (regio mastoidea, BNA, JNA; син. область сосцевидного отростка) — область головы, расположенная позади ушной раковины и приблизительно соответствующая очертаниям сосцевидного отростка височной кости.

СОСЦЕВИ́ДНАЯ ПЕЩЕ́РА (antrum mastoideum, PNA, JNA; antrum tympanicum, BNA) — полость в сосцевидном отростке височной кости, сообщающаяся с его ячейками и, через вход в пещеру, с барабанной полостью.

СОСЦЕВИ́ДНАЯ Я́МКА (fossa mastoidea) — см. *Надпроходная ямочка.*

СОСЦЕВИ́ДНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (foramen mastoideum, PNA, BNA, JNA) — отверстие на наружной поверхности височной кости, расположенное позади сосцевидного отростка; место прохождения эмиссарной вены.

СОСЦЕВИ́ДНОЕ ТЕ́ЛО (corpus mamillare, PNA, BNA, JNA; син. мамиллярное тело) — парное округлое возвышение на основании головного мозга (в области гипоталамуса), в к-ром под поверхностным слоем белого вещества содержатся ядра, относящиеся к подкорковым обонятельным центрам.

СОСЦЕВИ́ДНЫЕ ВЕ́ТВИ (rami mastoidei, PNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *438.*

СОСЦЕВИ́ДНЫЙ КАНА́ЛЕЦ (canaliculus mastoideus, PNA, BNA, JNA) — костный канал, соединяющий яремную ямку с барабанно-сосцевидной щелью; место прохождения ушной ветви блуждающего нерва.

СОСЦЕВИ́ДНЫЙ ОТРО́СТОК (processus mastoideus, PNA, BNA; processus mastoides, JNA) — направленный вниз отросток височной кости, расположенный позади наружного слухового прохода, имеющий в своей толще воздухоносные полости; место прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы, ременной и длиннейшей мышц головы.

СОСЦЕВИ́ДНЫЙ ПРИДА́ТОК (adnexum mastoideum, PNA) — общее название относимых к среднему уху полостей, расположенных в сосцевидном отростке (сосцевидная пещера, сосцевидные ячейки).

СОСЦЕВИ́ДНЫЕ ЯЧЕ́ЙКИ (cellulae mastoideae, PNA, BNA, JNA) — многочисленные небольшие полости в толще сосцевидного отростка височной кости, сообщающиеся между собой и с сосцевидной пещерой.

СО́ТЖИУ — ТУМИО́ТТО ПРО́БА (G. Sotgiu; G. Tumiotto) — см. *Тумиотто сахарная проба.*

СОТО́НА СРЕДА́ (B. Sauton, умер в 1916 г., франц. микробиолог) — жидкая синтетическая питательная среда для культивирования микобактерий туберкулеза, содержащая аспарагин; применяется при производстве туберкулина и вакцины БЦЖ.

СОТРЯСЕ́НИЕ (commotio) — закрытое механическое повреждение тканей и органов, характеризующееся нарушением их функций без явно выраженных морфологических изменений; чаще встречается С. головного, спинного мозга и грудной клетки.

СОУ́СТЬЕ (anastomosis) — см. *Анастомоз.*

СОУ́СТЬЕ АРТЕРИОСИ́НУСНОЕ (anastomosis arteriosinualis) — врожденный или приобретенный анастомоз, посредством к-рого сообщаются между собой артерии черепа или головного мозга и синусы твердой мозговой оболочки.

СОУ́СТЬЕ КАРОТИ́ДНО-КАВЕРНО́ЗНОЕ (anastomosis caroticocavernosa) — артериосинусное соустье, посредством к-рого внутренняя сонная артерия сообщается с пещеристым синусом.

СОУ́СТЬЕ КАРОТИ́ДНО-ЮГУЛЯ́РНОЕ (anastomosis caroticojugularis) — см. *Аневризма каротидно-югулярная.*

СОУ́СТЬЕ МЕНИНГОКАВЕРНО́ЗНОЕ (anastomosis meningocavernosa) — артериосинусное соустье, посредством к-рого оболочечные артерии сообщаются с пещеристым синусом.

СОУ́СТЬЕ МЕНИНГОСИ́НУСНОЕ (anastomosis meningosinualis) — артериосинусное соустье, посредством к-рого оболочечные артерии сообщаются с каким-либо синусом твердой мозговой оболочки.

СОУ́СТЬЕ ОКЦИПИТОСИ́НУСНОЕ (anastomosis occipitosinualis) — артериосинусное соустье, посредством к-рого затылочная артерия сообщается с поперечным или сигмовидным синусом.

СОЦИА́Л-ГИГИЕНИ́СТ — ОРГАНИЗА́ТОР ЗДРАВООХРАНЕ́НИЯ — врач-специалист, получивший подготовку по вопросам изучения состояния здоровья населения и влияния на него социальных факторов, а также по медицинской статистике, организации и управлению здравоохранением, экономике и планированию здравоохранения.

СОЦИА́Л-ДАРВИНИ́ЗМ — см. *Дарвинизм социальный.*

СОЦИА́ЛЬНОЕ ОБЕСПЕ́ЧЕНИЕ — система государственных и общественных мероприятий, направленных на обеспечение материальных и культурно-бытовых потребностей престарелых, нетрудоспособных граждан, многодетных семей, а также нек-рых других контингентов населения.

СОЦИА́ЛЬНОЕ СТРАХОВА́НИЕ — система государственного материального обеспечения трудящихся гл. обр. в случаях временной нетрудоспособности.

СОЦИОТЕРАПИ́Я (син. терапия социальная) — комплекс мероприятий, проводимых с целью повышения эффективности лечения психически больных путем создания оптимальных условий их общения, включает, напр., трудовую терапию или трудоустройство больного, групповую психотерапию.

СОЧЛЕНЕ́НИЕ — см. *Сустав.*

СОЧЛЕНЕ́НИЕ ЛО́ННОЕ — см. *Симфиз лобковый.*

СОЧЛЕНО́ВНАЯ ПОВЕ́РХНОСТЬ — см. *Суставная поверхность.*

СОШНИ́К (vomer, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *158.*

СОШНИКО́ВО-ВЛАГА́ЛИЩНАЯ БОРОЗДА́ (sulcus vomerovaginalis, PNA) — линейное углубление между влагалищным отростком клиновидной кости и крылом сошника.

СОШНИКО́ВО-ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ КАНА́Л (canalis vomerovaginalis, PNA;

canalis basipharyngeus, BNA; canalis basipharyngicus, JNA; син. основно-глоточный канал) — щель на нижней поверхности клиновидной кости между ее телом и влагалищным отростком.

СП — 1) см. *Санитарный пост*; 2) см. *Сортировочный пост.*

СПАДЕ́НИЕ МО́ЗГА — см. *Коллапс мозга.*

СПАЗМ (spasmus; от греч. spasmos или spasma) — непроизвольное сокращение поперечнополосатых или гладких мышц, не сопровождающееся немедленным расслаблением.

С. АККОМОДА́ЦИИ (s. accomodationis; син. циклоспазм) — С. ресничной мышцы, приводящий к усилению преломляющей силы оптической системы глаза и к явлениям ложной близорукости; наблюдается, напр., при перенапряжении аккомодации, при травмах и заболеваниях ц. н. с.

С. ВЗО́РА — см. *Судорога взора.*

С. ГУБОЯЗЫ́ЧНЫЙ (s. labiolingualis) — см. *Шарко — Бриссо симптом.*

С. КАРПОПЕДА́ЛЬНЫЙ (s. carpopedalis; анат. carpus запястье + pes, pedis стопа) — сочетанный С. мышц кистей (с формированием «кисти акушера») и сгибателей стоп; наблюдается при тетании.

С. ЛОКАЛИЗО́ВАННЫЙ (s. localisatus) — С., повторно возникающий в одной и той же мышце или группе мышц.

С. МИОТОНИ́ЧЕСКИЙ (s. myotonicus) — С. поперечнополосатых мышц с последующим медленным расслаблением их; наблюдается при миотонии.

С. МОБИ́ЛЬНЫЙ (s. mobilis; син. С. подвижный) — С., охватывающий попеременно различные группы поперечнополосатых мышц; наблюдается при торсионной дистонии.

С. ПОДВИ́ЖНЫЙ (s. mobilis) — см. *Спазм мобильный.*

С. РЕФЛЕКТО́РНЫЙ (s. reflectorius) — С., развивающийся по механизму рефлекса.

СПАЗМ ПИ́СЧИЙ (spasmus scriptorius, graphospasmus; син.: графоспазм, могиграфия, судорога писчая) — расстройство синергизма мышц руки, приводящее к нарушению акта письма при сохранении способности производить другие тонкие движения кистью и пальцами; наблюдается при неврозах у лиц, профессионально занятых письмом.

СПАЗМ ТОРСИО́ННЫЙ (spasmus torsionis) — см. *Дистония торсионная.*

СПАЗМАТИ́ЧЕСКИЙ (spasmaticus) — относящийся к спазму; характеризующийся спазмом.

СПАЗМОГЕ́ННЫЙ (spasmogenus; *спазм* + греч. -genēs порождающий, вызывающий) — вызывающий спазм.

СПАЗМОЛИ́ТИКИ (spasmolytica; *спазм* + греч. lytikos способный растворять, ослабляющий) — см. *Спазмолитические средства.*

СПАЗМОЛИТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (spasmolytica; син.: антиспазматические средства, спазмолитики) — лекарственные средства, снимающие спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (атропин, папаверин, теофиллин и др.).

СПАЗМОФИЛИ́Я (spasmophilia; *спазм* + греч. philia любовь, склонность; син.: диатез спазмофилический, тетания детская, тетания явная) — сочетание признаков повышенной нервно-мышечной возбудимости (симптомов Хвостека, Труссо, Эрба, Маслова) со склонностью к ларингоспазму, карпопедальному спазму и клоникотоническим судорогам; наблюдается у детей при состояниях, характеризующихся алкалозом и гипокальциемией.

СПА́SMUS NÚTANS (лат. nuto качать, кивать; син.: судорога кивательная, судорога приветствия, судорога салаамова, тик салаамов) — ритмические движения головы вперед и назад, сопровождающиеся качательными движениями туловища в том же направлении и иногда разгибанием рук; чаще наблюдается при олигофрении, иногда как эквивалент эпилептического припадка.

СПАЙК (англ. spike) — см. *Потенциал действия.*

СПАЙКА(-И)[1] [commissura(-ae); син.: комиссура, синехия, шварта] в патологии — фиброзный тяж, образовавшийся между смежными поверхностями органов в исходе травмы или воспалительного процесса.

С. АМНИОТИ́ЧЕСКИЕ — см. *Амниотические перетяжки.*

С. ВИТРЕОКОРНЕА́ЛЬНЫЕ (c. vitreocorneales; анат. corpus vitreum стекловидное тело + cornea роговица) — С. между роговицей и стекловидным телом, возникающие в случае выпадения стекловидного тела в переднюю камеру глаза после экстракции катаракты.

С. ВИТРЕОРЕТИНА́ЛЬНЫЕ (c. vitreoretinales; анат. corpus vitreum стекловидное тело + retina сетчатка) — С. между стекловидным телом и сетчаткой, возникающие, напр., после кровоизлияния в сетчатку.

С. РА́ДУЖКИ ЗА́ДНИЕ (synechiae iridis posteriores; син. синехии задние) — С. зрачкового края радужки с передней поверхностью сумки хрусталика, возникающие чаще при иритах и иридоциклитах.

С. РА́ДУЖКИ ПЕРЕ́ДНИЕ (synechiae iridis anteriores; син. синехии передние) — С. радужки с роговицей, возникающие после хирургических операций на глазном яблоке, проникающих ранений или перфорации язвы роговицы.

СПА́ЙКА[2] (commissura, PNA) в анатомии — анатомическое образование, соединяющее между собой парные органы или другие образования, гл. обр. нервной системы.

С. АММО́НОВА (устар.; c. Ammonis) — см. *Спайка свода.*

С. ВЕ́РХНИХ ХО́ЛМИКОВ (c. colliculorum cranialium, PNA; син. С. крышечная ростральная) — продолжение эпиталамической С.; соединяет гомологичные участки обоих верхних холмиков пластинки крыши среднего мозга.

СПА́ЙКА ГА́НЗЕРА — см. *Спайка надзрительная наивысшая.*

С. ГУБ (c. labiorum, PNA, BNA, JNA) — 1) С., соединяющая верхнюю и нижнюю губы по углам рта; 2) С., соединяющая большие половые губы спереди и сзади.

СПА́ЙКА ГУ́ДДЕНА — см. *Спайка надзрительная нижняя.*

С. ЗА́ДНЯЯ большого мозга (c. posterior) — см. *Спайка эпиталамическая.*

С. КРЫ́ШЕЧНАЯ КАУДА́ЛЬНАЯ (c. tectalis caudalis) — см. *Спайка нижних холмиков.*

С. КРЫ́ШЕЧНАЯ РОСТРА́ЛЬНАЯ (c. tectalis rostralis) — см. *Спайка верхних холмиков.*

СПА́ЙКА МЕ́ЙНЕРТА — см. *Спайка надзрительная верхняя.*

С. МОРСКО́ГО КОНЯ (c. hippocampi) — см. *Спайка свода.*

С. НАДЗРИ́ТЕЛЬНАЯ ВЕ́РХНЯЯ [c. supraoptica, PNA; c. superior (Meynerti), BNA; c. dorsalis, JNA; син. Мейнерта спайка] — С., представляющая собой пучок нервных волокон, проходящий над зрительным перекрестом и соединяющий (по разным данным) базальные ядра обоих полушарий, верхний холмик пластинки крыши среднего мозга с гипоталамусом противоположной стороны, ядро латеральной петли с верхним и нижним холмиками пластинки крыши среднего мозга противоположной стороны.

С. НАДЗРИ́ТЕЛЬНАЯ НАИВЫ́СШАЯ (c. supraoptica suprema; син. Ганзера спайка) — С., представляющая собой пучок нервных волокон, проходящий над зрительным перекрестом, соединяющий между собой парные ядра покрышки среднего мозга и гипоталамуса.

С. НАДЗРИ́ТЕЛЬНАЯ НИ́ЖНЯЯ [c. supraoptica, PNA; c. inferior (Guddeni), BNA; c. basialis, JNA; син. Гуддена спайка] — С., представляющая собой пучок нервных волокон, примыкающий снизу к зрительному перекресту и соединяющий правое и левое медиальные коленчатые тела.

С. НИ́ЖНИХ ХО́ЛМИКОВ (c. colliculorum caudalium, PNA; син. С. крышечная каудальная) — С., соединяющая между собой нижние холмики пластинки крыши среднего мозга; содержит также перекрещенные волокна латеральной петли.

С. ПЕРЕ́ДНЯЯ большого мозга (c. anterior, PNA, BNA; c. rostralis, JNA) — С., представляющая собой тяж белого вещества, примыкающий к передней стенке III желудочка, содержащий нервные волокна, соединяющие первичные обонятельные центры, кору парагиппокампальных извилин и миндалевидные тела обоих полушарий большого мозга.

С. ПОВОДКО́В (c. habenularum, PNA, BNA; c. pinealis, JNA) — С., представляющая собой перемычку, содержащую нервные волокна, соединяющие ядра правого и левого поводков.

С. ПОДБУГО́РНАЯ ЗА́ДНЯЯ (c. subthalamica posterior; син. Фореля спайка) — С., представляющая собой пучок волокон, соединяющий гипоталамические ядра обеих сторон.

С. СВО́ДА (c. fornicis, PNA; c. hippocampi, BNA, JNA; син.: аммонова спайка — устар., комиссура гиппокампальная, лира Давида, С. морского коня) — С. в виде треугольной пластинки белого вещества, соединяющей ножки свода и содержащей нервные волокна, связывающие правый и левый гиппокампы.

С. СПИННО́ГО МО́ЗГА БЕ́ЛАЯ (c. alba, PNA; c. anterior alba, BNA; c. ventralis alba, JNA) — С. в виде пластинки белого вещества спинного мозга, расположенной кпереди от

центрального канала; образована преимущественно миелиновыми нервными волокнами, соединяет правый и левый передние канатики.

СПАЙКА ФОРЕЛЯ — см. *Спайка подбугорная задняя.*

С. ЭПИТАЛАМИЧЕСКАЯ [c. epithalamica (posterior), PNA; c. posterior (cerebri), BNA; c. caudalis, JNA; син. С. задняя] — С., представляющая собой изогнутую пластинку белого вещества; входит в заднюю стенку III желудочка на границе между средним и промежуточным мозгом и содержит нервные волокна, соединяющие ядра этих отделов головного мозга.

СПАНИОМЕНОРЕЯ (spaniomenorrhoea; греч. spanios редкий + mēn месяц + rhoia течение, истечение) — нарушение менструального цикла, выражающееся в его удлинении.

СПАРГАНОЗ (sparganosis) — гельминтоз из группы цестодозов, возникающий в результате внедрения в какие-либо органы и ткани (чаще в глаза и подкожную клетчатку) личинок лентеца Spirometra (Diphyllobothrium) erinacei europei; характеризуется конъюнктивитом, крапивницей, образованием подкожных узлов и абсцессов; встречается преимущественно на Дальнем Востоке.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ АВАРИЙНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (СНАВР) — комплекс проводимых формированиями Гражданской обороны мероприятий по локализации и ликвидации последствий нападения противника, стихийных бедствий или крупных производственных аварий и катастроф; включает спасение людей, оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения, а также восстановление коммуникаций, объектов промышленности и транспорта, обеспечение безопасности населения и спасательных работ.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД (СО) — объектовое формирование Гражданской обороны, предназначенное для проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения, при стихийных бедствиях и крупных производственных авариях.

СПАСОКУКОЦКОГО ДРЕНАЖ (С. И. Спасокукоцкий, 1870—1943, сов. хирург) — вид сигаретного дренажа, при к-ром в качестве трубки используют палец резиновой перчатки с обрезанным концом.

СПАСОКУКОЦКОГО ОПЕРАЦИЯ (С. И. Спасокукоцкий) — модификация грыжесечения по Жирару, при к-рой мышцы и медиальный край апоневроза фиксируют к паховой связке одним общим швом.

СПАСОКУКОЦКОГО — ВИЛЬМСА РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА (С. И. Спасокукоцкий, 1870—1943, сов. хирург; M. Wilms, 1867—1918, нем. хирург) — модификация резекции желудка по способу Бильрот-II, при к-рой просвет культи желудка ушивают частично от малой кривизны, а на оставшуюся часть накладывают анастомоз «конец в бок» с тощей кишкой.

СПАСОКУКОЦКОГО — КОЧЕРГИНА СПОСОБ (С. И. Спасокукоцкий, 1870—1943, сов. хирург; И. Г. Кочергин, 1903—1980, сов. хирург) — способ обработки рук хирурга 0,5% раствором нашатырного спирта в течение 6 мин. и (после осушения стерильным полотенцем) 96% этиловым спиртом в течение 5 мин.

СПАСТИЧНОСТЬ МЫШЕЧНАЯ (греч. spastikos стягивающий) — повышение тонуса мышц, характеризующееся неравномерностью их сопротивления в различные фазы пассивного движения; наблюдается при поражении пирамидных путей; выражено больше в сгибателях руки и разгибателях ноги.

СПАЦИО- (лат. spatium пространство) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к пространству», «пространственный».

СПАЦИОКАРДИОГРАММА (*спацио- + кардиограмма*) — кривая, получаемая при синхронной регистрации и электронной коммутации векторкардиограмм в трех проекциях; позволяет получить представление о пространственном положении петли, описываемой концом главного электрического вектора сердца.

СПАЦИОКАРДИОГРАФ (*спацио- + кардиограф*) — см. *Спацио электрокардиограф.*

СПАЦИОКАРДИОГРАФИЯ (*спацио- + кардиография*; син.: спацио-электрокардиография, электроспациография) — модификация векторкардиографии, основанная на электронной коммутации трех векторкардиограмм, регистрируемых синхронно в различных проекциях, что позволяет получить представление о пространственном положении петли, описываемой концом главного электрического вектора сердца.

СПАЦИОЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ (*спацио- + электрокардиограф*; син.: спациокардиограф, стереокардиограф, стереоэлектрокардиограф) — прибор для одновременной регистрации трех различно ориентированных в пространстве проекций векторкардиограммы.

СПАЦИОЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (*спацио- + электрокардиография*) — см. *Спациокардиография.*

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ лекарственного средства (лат. spectrum образ, представление, явление) — характеристика лекарственного средства, отражающая многообразие фармакологических эффектов, к-рые оно может вызывать, или многообразие тех видов патологических процессов или возбудителей болезней, на к-рые оно может действовать.

СПЕКТР ШУМА — распределение звуковой энергии шума по частотам; учитывается при нормировании и гигиенической оценке шума.

СПЕКТРОАНОМАЛОСКОП (спектр + *аномалоскоп*; син. Рабкина спектральный аномалоскоп) — прибор для исследования цветового зрения путем одновременного предъявления для сравнения двух цветовых полей, одно из к-рых образовано монохроматическим пучком света, а второе — смешением двух монохроматических пучков света с заданными длинами волн.

СПЕКТРОГРАФ (спектр + греч. graphō записывать) — оптический прибор для фотографической регистрации спектров излучения и поглощения; применяется в лабораторной практике для качественного и количественного анализа веществ.

СПЕКТРОЗОЛЬ (истор.; спектр + лат. sol солнце) — см. *Спектрозоль-лампа.*

СПЕКТРОЗОЛЬ-ЛАМПА (истор.; спектр + лат. sol солнце; син. спектрозоль) — лампа накаливания из увиолевого стекла, обеспечивающая равномерное облучение большой площади излучением, близким по спектральному составу к солнечному; применялась в светолечении.

СПЕКТРОМЕТР (спектр + греч. metreō измерять) — оптический прибор для измерения спектров излучения и поглощения; применяется в лабораторной практике для качественного и количественного анализа веществ.

СПЕКТРОМЕТР АКУСТИЧЕСКИЙ — см. *Анализатор спектра шума.*

СПЕКТРОМЕТР ИОНОВ (син. ионометр) — прибор для измерения подвижности ионов и электроаэрозолей, а также полярной объемной плотности электрического заряда в воздухе; применяется при определении содержания электроаэрозолей в воздухе.

СПЕКТРОСКОП (спектр + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — прибор для визуального наблюдения спектров излучения и поглощения; в медицине применяется для быстрого качественного и полуколичественного анализа веществ.

СПЕКТРОФЛЮОРИМЕТР (спектр + *флюориметр*) — спектрометр для люминесцентного излучения.

СПЕКТРОФОБИЯ (spectrophobia; лат. spectrum видение, представление + *фобия*) — см. *Эйзоптрофобия.*

СПЕКТРОФОТОКОЛОРИМЕТР (спектр + греч. phōs, phōtos свет + *колориметр*) — прибор для измерения концентраций веществ в растворах по их светопоглощению в узкой полосе видимого спектра (монохроматическом свете).

СПЕКТРОФОТОМЕТР (спектр + *фотометр*) — прибор для измерения спектров излучения и поглощения путем их сравнения с эталонным спектром; применяется в лабораторной практике для анализа состава веществ.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ (спектр + *фотометрия*) — метод качественного и количественного анализа веществ, основанный на измерении их спектров поглощения или излучения; применяется в лабораторной практике.

СПЕЛЕОТЕРАПИЯ (греч. spēlaion пещера + *терапия*) — лечение больного путем продолжительного воздействия микроклиматом гротов, пещер или выработанных шахт.

СПЕЛЕОТОМИЯ (spelaeotomia; греч. spēlaion пещера + tomē разрез, рассечение) — см. *Кавернотомия.*

СПЕНСА СИНДРОМ (Th. Spens, 1764—1842, шотл. врач) — см. *Морганьи — Адамса — Стокса синдром.*

СПЕНСЕРА БОЛЕЗНЬ (R. R. Spencer, род. в 1888 г., амер. врач) — см. *Диарея вирусная.*

СПЕРАНСКОГО БЛОКАДА (А. Д. Сперанский, 1888—1961, сов. патофизиолог) — новокаиновая блокада области шейно-грудного ганглия и околопочечной клетчатки; применяется для прерывания рефлексов, вызывающих и поддерживающих патологические процессы, напр. при бронхиальной астме.

СПЕРАНСКОГО УЧЕНИЕ (А. Д. Сперанский) — система взглядов, основанная на идее нервизма в патологии; основные положения: нарушение нервной трофики как основа механизма развития болезни, рефлекторный принцип

в патологии, болезненный процесс как единство повреждения, компенсации и восстановления, целостность организма в условиях патологии.

СПЕ́РМА (греч. sperma; син. семенная жидкость) — жидкость, выделяемая при эякуляции, представляющая собой взвесь сперматозоидов в смеси секретов придатков яичка, предстательной, бульбоуретральной и других желез.

СПЕРМАТ- (спермато-, спермо-; греч. sperma, spermatos, семя, сперма) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сперме, к сперматозоидам».

СПЕРМАТИ́ДА (spermatida, LNH) — мужская половая клетка, образующаяся из сперматоцита II порядка в результате второго деления созревания и обладающая гаплоидным набором хромосом; преобразуется в сперматозоид.

СПЕРМАТО- — см. *Сперматт-*.

СПЕРМАТОГЕНЕ́З (spermatogenesis; *сперматто-* + греч. genesis происхождение, развитие; син.: сперматопоэз, спермогенез) — процесс развития мужских половых клеток, заканчивающийся формированием сперматозоидов.

СПЕРМАТОГО́НИИ (spermatogonium, LNH; *сперматто-* + греч. gonē поколение, порождение) — клетки сперматогенного эпителия, из к-рых развиваются мужские половые клетки.

СПЕРМАТОГОНИО́МА (spermatogonioma; *сперматогонии* + *-ома*) — см. *Семинома*.

СПЕРМАТОГРА́ММА (*сперматто-* + греч. gramma запись; син.: спермиограмма, спермограмма) — совокупность результатов качественного и количественного исследования эякулята (данные о физических свойствах, химическом и клеточном составе и др.).

СПЕРМАТОЗО́ИД (spermatozoidum, син. spermatozoon; *сперматто-* + греч. zōon живое существо + eidos вид; син. спермий) — зрелая мужская половая клетка.

СПЕРМАТОПОЭ́З (*сперматто-* + греч. poiēsis выработка, образование) — см. *Сперматогенез*.

СПЕРМАТОРЕ́Я (spermatorrhoea; *сперматто-* + греч. rhoia течение, истечение; син. истечение семени) — выделение спермы из уретры без полового возбуждения, обычно в конце мочеиспускания или при дефекации; обусловлено слабостью мышечной оболочки семявыбрасывающего протока.

СПЕРМАТОЦЕ́ЛЕ (spermatocele; *сперматто-* + греч. kēlē выбухание, вздутие) — киста яичка, содержащая жидкость с примесью сперматоцитов и сперматозоидов.

СПЕРМАТОЦИСТИ́Т (spermatocystitis; *сперматто-* + греч. kystis пузырь + *-ит*) — см. *Везикулит*.

СПЕРМАТОЦИ́Т (spermatocytus; *сперматто-* + гист. cytus клетка) — незрелая мужская половая клетка, образующаяся из сперматогония и превращающаяся при втором делении созревания в сперматиду.

СПЕРМАТОЦИ́Т I ПОРЯ́ДКА (spermatocytus I, LNH) — С. в периоде роста, содержащий диплоидный набор хромосом.

СПЕРМАТОЦИ́Т II ПОРЯ́ДКА (spermatocytus II, LNH; син. пресперматида) — С. в периоде созревания, содержащий гаплоидный набор хромосом.

СПЕРМАТОЦИТО́МА (spermatocytoma; *сперматоцит* + *-ома*) — см. *Семинома*.

СПЕ́РМИЙ (spermium; греч. spermeion семя, сперма) — см. *Сперматозоид*.

СПЕРМИОГЕНЕ́З (*спермий* + греч. genesis происхождение, развитие) — последний период сперматогенеза, в течение к-рого сперматиды превращаются в сперматозоиды.

СПЕРМИОГРА́ММА (*спермий* + греч. gramma запись) — см. *Спермограмма*.

СПЕ́РМО- — см. *Сперматт-*.

СПЕРМОГЕНЕ́З (*спермо-* + греч. genesis происхождение, развитие) — см. *Сперматогенез*.

СПЕРМОГРА́ММА (*спермо-* + греч. gramma запись) — см. *Спермограмма*.

СПЕЦИАЛИЗА́ЦИЯ ГО́СПИТАЛЯ — придание госпиталю узкого профиля (по одному или нескольким видам специализированной медицинской помощи) путем включения в его состав соответствующих врачей-специалистов, а также специально подготовленного среднего медицинского персонала и оснащения его необходимым медицинским имуществом и оборудованием.

СПЕЦИАЛИЗИ́РОВАННАЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИ́ЧЕСКАЯ БРИГА́ДА (СПЭБ) — формирование медицинской службы Гражданской обороны, предназначенное для проведения комплекса противоэпидемических мероприятий в очагах особо опасных инфекционных болезней и защиты населения от биологического оружия противника.

СПЕЦИА́ЛЬНАЯ ОБРАБО́ТКА (син. деконтаминация) — составная часть мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения, направленная на обезвреживание или удаление поражающих агентов с поверхности тела и одежды человека, а также различных объектов окружающей среды, с к-рыми человек соприкасается; включает санитарную обработку людей, дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию зараженных объектов (в т. ч. одежды, обуви, средств защиты).

С. О. ПО́ЛНАЯ — С. о. всех загрязненных радиоактивными и отравляющими веществами или биологическими средствами объектов, к-рые представляют опасность поражения людей; проводится на пунктах или отделениях специальной обработки.

С. О. ЧАСТИ́ЧНАЯ — С. о., ограниченная теми участками загрязненных радиоактивными и отравляющими веществами или биологическими средствами поверхностей объектов, к-рые представляют наибольшую опасность поражения людей; проводится в порядке само- и взаимопомощи.

СПЕЦИА́ЛЬНАЯ ПОДГОТО́ВКА ЛИ́ЧНОГО СОСТА́ВА МЕДИЦИ́НСКОЙ СЛУ́ЖБЫ — раздел боевой подготовки, обеспечивающий теоретическое и практическое совершенствование знаний и навыков личного состава медицинской службы в соответствии со специальностью и должностными обязанностями по вопросам организации и осуществления медицинского обеспечения войск в мирное и военное время.

СПЕЦИФИ́ЧЕСКОЕ ДИНАМИ́ЧЕСКОЕ ДЕ́ЙСТВИЕ ПИ́ЩИ — повышение энерготрат организма, обусловленное приемом, перевариванием и усвоением пищи.

СПЕЦИФИ́ЧНОСТЬ ТКА́НЕЙ — см. *Детерминация тканевая*.

СПИГЕ́ЛИЕВА ДО́ЛЯ [A. Spigelius (van der Spieghel), 1578—1625, бельг. анатом и ботаник] — см. *Доля печени хвостатая*.

СПИГЕ́ЛИЕВА ЛИ́НИЯ (A. Spigelius) — см. *Полулунная линия*.

СПИ́КУЛЫ (лат. spiculum острие, стрела, луч) в рентгенологии — выявляемые при рентгенологическом исследовании кости линейные тени, расположенные перпендикулярно ее длиннику и обусловленные образованием костных игл вдоль стенок кровеносных сосудов; наблюдаются, напр., при остеогенной саркоме.

СПИ́ЛЛЕРА — ФРЕ́ЙЖЕРА — А́ДСОНА ОПЕРА́ЦИЯ (W. G. Spiller, 1863—1940, амер. невропатолог; Ch. H. Frazier, 1870—1936, амер. нейрохирург; A. W. Adson, 1887—1951, амер. нейрохирург) — хирургическая операция: перерезка чувствительного корешка тройничного нерва позади его ганглия (гассерова узла) при тяжелых невралгиях тройничного нерва, не поддающихся другим методам лечения.

СПИН- (лат. spina шип, ость, хребет, позвоночник) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к позвоночнику, к спинному мозгу».

СПИНА́ (dorsum, PNA, BNA, JNA) — задняя часть туловища, расположенная между шеей и ягодицами; делится на позвоночную, крестцовую, лопаточную, подлопаточную и поясничную области.

СПИНА́ ПЛО́СКАЯ — сглаженность физиологических кифоза и лордоза.

SPÍNA BÍFIDA (лат. spina ость, хребет; bifidus разделенный надвое; син. позвоночник расщепленный) — аномалия развития: неполное закрытие позвоночного канала.

S. BÍFIDA ANTÉRIOR (лат. anterior передний) — S. b. в форме расщелин в телах позвонков.

S. BÍFIDA ÁPERTA (лат. apertus открытый) — S. b. с наличием спинномозговой грыжи.

S. BÍFIDA OCCÚLTA (лат. occultus скрытый) — S. b. без спинномозговой грыжи.

SPÍNA VENTÓSA (лат. spina ость; ventosus вздутый) — веретенообразное утолщение диафиза кости; наблюдается при туберкулезном поражении фаланг пальцев, пястных и плюсневых костей.

СПИНАЛГИ́Я (лат. spina ость + греч. algos боль; син.: Петрушки симптом, Петрушки спиналгия) — болезненность при ощупывании и поколачивании в области остистых отростков III—VII грудных позвонков; наблюдается при бронхадените.

СПИНАЦЕ́Н — см. *Сквален*.

СПИ́ННАЯ СТРУНА́ (син. хорда) — 1) примитивный осевой скелет у первичнохордовых и хордовых; 2) (notochorda, LNE) — расположенный вдоль оси зародыша клеточный тяж, вокруг к-рого формируется позвоночник; редуцируется, сохраняясь у взрослого человека лишь в виде студенистого ядра межпозвоночных дисков.

СПИННО́Й СЕГМЕ́НТ — см. *Сомит*.

СПИННОМОЗГОВА́Я ЖИ́ДКОСТЬ (liquor cerebrospinalis) — см. *Цереброспинальная жидкость*.

СПИННОМОЗГОВО́Й КАНА́Л (canalis spinalis) — см. *Центральный канал.*
СПИННОМОЗГОВО́Й У́ЗЕЛ (ganglion spinale) — см. *Ганглий спинномозговой.*
СПИННОМОЗГОВЫ́Е ВЕ́ТВИ (rami spinales, PNA, BNA, JNA) — 1) артериальные — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *692*; 2) венозные — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1390.*
СПИННЫ́Е ВЕ́ТВИ (rami dorsales, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1049.*
СПИНОБУГО́РНЫЙ ПУТЬ БОКОВО́Й (tractus spinothalamicus lateralis, PNA) — см. *Спиноталамический путь латеральный.*
СПИНОБУГО́РНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕ́ДНИЙ — см. *Спиноталамический путь передний.*
СПИНОДЕРЖА́ТЕЛЬ — см. *Прямодержатель.*
СПИНОЗОПЛА́СТИКА (spinosoplastica; анат. processus spinosus остистый отросток + *пластика*) — пластическая операция на остистых отростках позвонков с целью их сращения.
СПИНОМОЗЖЕ́ЧКО́ВЫЙ ПУТЬ ВЕНТРА́ЛЬНЫЙ (tractus spinocerebellaris ventralis, JNA) — см. *Спиномозжечковый путь передний.*
СПИНОМОЗЖЕ́ЧКО́ВЫЙ ПУТЬ ДОРСА́ЛЬНЫЙ (tractus spinocerebellaris dorsalis, JNA) — см. *Спиномозжечковый путь задний.*
СПИНОМОЗЖЕЧКО́ВЫЙ ПУТЬ ЗА́ДНИЙ (tractus spinocerebellaris posterior, PNA; tractus spinocerebellaris dorsalis, JNA; fasciculus cerebellospinalis, BNA; син.: пучок спиномозжечковый прямой, спиномозжечковый путь дорсальный, Флексига пучок) — проекционный афферентный путь мозжечка, проходящий в латеральном канатике спинного мозга и нижней мозжечковой ножке, заканчивающийся в коре червя мозжечка с той же стороны; проводит проприоцептивную чувствительность.
СПИНОМОЗЖЕЧКО́ВЫЙ ПУТЬ ПЕРЕ́ДНИЙ [tractus spinocerebellaris anterior, PNA; tractus spinocerebellaris ventralis, JNA; fasciculus anterolateralis superficialis (Gowersi), BNA; син.: Говерса пучок, пучок спиномозжечковый перекрещенный, спиномозжечковый путь вентральный] — проекционный афферентный путь мозжечка, проходящий в латеральном канатике спинного мозга, вступающий в верхнюю мозжечковую ножку противоположной стороны (перекрещиваясь) и заканчивающийся в коре червя мозжечка; проводит проприоцептивную чувствительность.
СПИНООЛИ́ВНЫЙ ПУТЬ (tractus spinoolivaris; PNA, BNA, JNA) — пучок восходящих волокон переднего канатика спинного мозга, оканчивающийся в добавочных оливарных ядрах.
СПИНОПЛЕВРОСТОМИ́Я (истор.; spinopleurostomia; анат. medulla spinalis спинной мозг + cavum pleurae плевральная полость + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция отведения цереброспинальной жидкости из субарахноидального пространства грудного отдела спинного мозга в плевральную полость.
СПИНОПОКРЫ́ШЕЧНЫЙ ПУТЬ (tractus spinotectalis, PNA, BNA, JNA; син. спинотектальный путь) — проекционный восходящий путь общей чувствительности, проходящий в переднем канатике спинного мозга, стволе головного мозга и заканчивающийся в нижних и верхних холмиках крыши среднего мозга противоположной стороны.
СПИНОРЕТИКУЛЯ́РНЫЙ ПУТЬ (tractus spinoreticularis, PNA) — пучок восходящих волокон бокового канатика спинного мозга, оканчивающийся в ретикулярной формации продолговатого мозга, моста и среднего мозга.
СПИНОТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ ПУТЬ ЛАТЕРА́ЛЬНЫЙ (tractus spinothalamicus lateralis, PNA; син. спинобугорный путь боковой) — проекционный афферентный путь болевой и температурной чувствительности, проходящий в латеральном канатике спинного мозга, поднимающийся через ствол мозга и заканчивающийся в вентролатеральных ядрах таламуса противоположной стороны.
СПИНОТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ ПУТЬ ПЕРЕ́ДНИЙ (tractus spinothalamicus anterior, PNA; син. спинобугорный путь передний) — проекционный афферентный путь тактильной чувствительности, проходящий в переднем канатике спинного мозга, поднимающийся через ствол мозга и заканчивающийся в вентролатеральных ядрах таламуса противоположной стороны.
СПИНОТЕКТА́ЛЬНЫЙ ПУТЬ (tractus spinotectalis) — см. *Спинопокрышечный путь.*
СПИНТАРИСКО́П (греч. spintharis искра + skopeō рассматривать, наблюдать) — прибор для визуального наблюдения и подсчета альфа-частиц по вызываемым ими сцинтилляциям; применяется в радиометрии.
СПИНУЛОЗИ́ЗМ (spinulosismus; лат. spinula маленький шип, колючка; син. шиповатость) — наличие роговых конусовидных пробок в устьях волосяных фолликулов; наблюдается при нек-рых дерматозах.
СПИРАДЕНО́МА ЭККРИ́ННАЯ (spiradenoma eccrinicum; греч. speira изгиб, завиток + *аденома*; греч. ek из, вне + krinō отделять, выделять) — доброкачественная опухоль кожи, исходящая из клубочковидных концевых отделов мерокринных потовых желез.
СПИРАЛИЗА́ЦИЯ ХРОМОСО́М — см. *Контрактация хромосом.*
СПИРА́ЛЬНАЯ БОРОЗДА́ ВНУ́ТРЕННЯЯ (sulcus spiralis internus, PNA) — борозда, разделяющая губу барабанного края и губу преддверного края костной спиральной пластинки.
СПИРА́ЛЬНАЯ БОРОЗДА́ НАРУ́ЖНАЯ (sulcus spiralis externus, PNA) — борозда на барабанной стенке улиткового протока, расположенная в области соединения спиральной связки улитки с основной перепонкой.
СПИРА́ЛЬНАЯ ПЛАСТИ́НКА ВТОРИ́ЧНАЯ (lamina spiralis secundaria, PNA, BNA, JNA) — узкая костная пластинка, расположенная на поверхности стенки спирального канала улитки в нижней части его первого витка напротив костной спиральной пластинки.
СПИРА́ЛЬНАЯ ПЛАСТИ́НКА КО́СТНАЯ (lamina spiralis ossea, PNA, BNA, JNA) — костная пластинка, винтообразно расположенная на поверхности стержня улитки внутреннего уха, выступающая в спиральный канал.
СПИРА́ЛЬНАЯ СКЛА́ДКА [plica spiralis, PNA; valvula spiralis (Heisteri), BNA; valvula spiralis, JNA; син.: Гейстера заслонка, Гейстера клапан, заслонка спиральная] — совокупность нескольких расположенных по спирали складок пузырного протока.
СПИРА́ЛЬНЫЙ КАНА́Л (canalis spiralis) — см. *Плечемышечный канал.*
СПИРА́ЛЬНЫЙ КАНА́Л УЛИ́ТКИ (canalis spiralis cochleae, PNA, BNA, JNA) — спирально изогнутый костный канал в пирамиде височной кости; место расположения улиткового протока.
СПИРИ́ЛЛЫ (лат. spira, от греч. speira изгиб) — 1 общее название подвижных микроорганизмов винтообразной формы: 2) (Spirillaceae, Ber) — семейство бактерий, объединяющее подвижные винтообразные грамотрицательные микроорганизмы, имеющие 1—2 полярных жгутика; аэробы или факультативные анаэробы, не образующие спор; нек-рые виды патогенны для человека.
SPIRÍLLUM MÍNOR (Ber) — бактерия сем. Spirillaceae, подвижная грамотрицательная короткая спирилла с 2—3 завитками; возбудитель содоку у человека.
СПИРО- (лат. spiro дышать) —составная часть сложных слов, означающая «относящийся к дыханию».
СПИРОГРА́ММА (*спиро-* + греч. gramma запись; син. спирометрическая кривая) — кривая, отражающая изменение во времени объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
СПИРО́ГРАФ[1] (*спиро-* + греч. graphō писать, изображать; син. волюмоспирограф) — прибор для непрерывной графической регистрации объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
С. ВОДЯНО́Й — С., в к-ром в качестве элемента, воспринимающего изменения объема воздуха, использован цилиндр с поршнем, наполненный водой.
С. СИЛЬФО́ННЫЙ (истор.) — С., в к-ром в качестве элемента, воспринимающего изменения объема воздуха, использовался эластичный гофрированный мешок (сильфон).
СПИРО́ГРАФ[2] (нрк) — см. *Оксиспирограф.*
СПИРО́ГРАФ[3] (нрк) — см. *Спирометаболограф.*
СПИРОГРАФИ́Я (*спиро-* + греч. graphō писать, изображать) — графическая регистрация изменений во времени объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
СПИРОМЕТАБОЛО́ГРАФ (*спиро-* + греч. metabolē изменение, превращение + graphō писать, изображать; син.: метаболограф, спирограф — нрк, спирополиграф) — прибор для исследования функции внешнего дыхания и основного обмена путем одновременной графической регистрации глубины и частоты дыхания, а также объема потребленного кислорода.
СПИРО́МЕТР (*спиро-* + греч. metreō измерять) — прибор для измерения жизненной емкости легких и других легочных объемов.
СПИРО́МЕТР-БОЛО́ГРАФ (греч. metabolē изменение, превращение + graphō писать, изображать) — прибор для исследования показателей функции внешнего дыхания, измерения величины основного обмена и определения остаточного объема легких.
СПИРОМЕТРИ́ЧЕСКАЯ КРИВА́Я — см. *Спирограмма.*
СПИРОМЕТРИ́Я (*спиро-* + греч. metreō измерять) — измерение жизнен-

ной емкости легких и других легочных объемов при помощи спирометра.

С. ДИНАМИЧЕСКАЯ (греч. dynamikos действующий) — С., проводимая до и после выполнения физической нагрузки.

С. ФОРСИРОВАННАЯ (франц. forcer усиливать, форсировать) — С., проводимая при максимально быстром выдохе.

СПИРОПОЛИГРАФ (*спиро-* + *полиграф*) — см. *Спирометаболограф.*

СПИРОРАДИОГРАФИЯ (*спиро-* + *радиография*) — см. *Радиопульмонография.*

СПИРОХЕТА (-Ы) [Spirochaeta, -ae; греч. speira извилина, завиток + chaitē волосы] — 1) общее название микроорганизмов спирально извитой формы; 2) (Spirochaetales, Ber) — порядок микроорганизмов, объединяющий извитые подвижные микроорганизмы с аксиальной нитью, не образующие спор, окрашивающиеся по Романовскому — Гимзе и аммиачным серебром; 3) (Spirochaetaceae, Ber) — семейство микроорганизмов порядка Spirochaetales, включающее патогенные для человека виды, относящиеся к родам Treponema, Borrelia и Leptospira.

СПИРОХЕТА БЛЕДНАЯ (Spirochaeta pallida) — см. *Трепонема бледная.*

СПИРОХЕТА ВЕНСАНА (Spirochaeta vincentii) — см. *Венсана спирохета.*

СПИРОХЕТА ВОЗВРАТНОГО ТИФА (Borrelia recurrentis, Ber; син. Обермейера спирохета) — тонкая подвижная грамотрицательная спирохета с заостренными концами; по Романовскому — Гимзе окрашивается в сине-фиолетовый цвет; возбудитель эпидемического (вшиного) возвратного тифа.

СПИРОХЕТОЗ (spirochaetosis; *спирохета* + *-оз*) — общее название инфекционных болезней, вызываемых патогенными спирохетами.

СПИРОХЕТОЗ ВОЗВРАТНЫЙ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ (spirochaetosis recurrens epidemica) — см. *Тиф возвратный эпидемический.*

СПИРОХЕТОЗ КЛЕЩЕВОЙ (spirochaetosis acarina) — см. *Тиф возвратный эпидемический.*

SPIROCERCA LUPI — вид гельминтов кл. нематод; паразитирует в опухолях пищевода, желудка, аорты, легких и других органов собаки, волка, лисицы, изредка человека.

СПИРОЭРГОМЕТРИЯ (*спиро-* + *эргометрия*) — метод одновременного исследования основного обмена и внешнего дыхания с использованием спирометрии или спирографии.

СПИРТ КАРБОЛОВЫЙ РУСАКОВА — см. *Русакова карболовый спирт.*

СПИРТ-НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА — метод лечения, основанный на введении раствора новокаина в этиловом спирте в ткани, окружающие нервные образования, иннервирующие пораженный орган.

СПИРТОВАЯ ПРОБА при отморожении — диагностический прием определения степени отморожения, заключающийся в прикасании ватным шариком, смоченным водным раствором этилового спирта, к пораженному участку кожи, лишенному эпидермиса: при отморожении II степени прикосновение болезненно, при более тяжелом — безболезненно.

СПИРТОМЕТР (спирт + греч. metreō измерять, определять) — прибор для определения концентрации водных растворов этилового спирта по их плотности, представляющий собой разновидность ареометра.

СПИРТ-ФОРМАЛИНОВАЯ БЛОКАДА — введение смеси этилового спирта и 10% раствора формалина в лимфатический узел с целью полного прекращения прохождения через него лимфы; применяется в эксперименте на животных.

СПИРТЫ — органические соединения, содержащие гидроксильную группу у насыщенного атома углерода; по числу гидроксильных групп различают одноатомные (алкоголи), двухатомные (гликоли), трехатомные (глицерины) и многоатомные С.; нек-рые С. являются продуктами обмена веществ в организме.

СПИРТЫ СТЕРОИДНЫЕ — см. *Стерины.*

СПИРУЛИНА (Spirulina; лат. spirula завиток) — род одноклеточных сине-зеленых водорослей, употребляемых в пищу населением прибрежных районов нек-рых стран: рассматривается как потенциальный источник пищевого белка.

СПИСОК А — включенный в Государственную фармакопею СССР список лекарственных средств, назначение, дозирование и хранение к-рых должно производиться с особой осторожностью в связи с их высокой токсичностью или способностью вызывать наркоманию.

СПИСОК Б — включенный в Государственную фармакопею СССР список лекарственных средств, назначение, дозирование и хранение к-рых должно производиться с осторожностью в связи с возможными осложнениями при их применении без медицинского контроля.

СПИЦА в ортопедии — тонкий металлический стержень, вводимый в кость для фиксации ортопедического аппарата при лечении методом скелетного вытяжения.

СПИЦА КИРШНЕРА — см. *Киршнера спица.*

СПЛАНХН- (спланхно-; греч. splanchna внутренности) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к внутренним органам».

СПЛАНХНО- — см. *Спланхн-.*

СПЛАНХНОКРАН (*спланхно-* + греч. kranion череп) — см. *Череп лицевой.*

СПЛАНХНОЛОГИЯ (splanchnologia, PNA, BNA; *спланхно-* + греч. logos учение) — раздел анатомии, посвященный изучению пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем.

СПЛАНХНОМЕГАЛИЯ (splanchnomegalia; *спланхно-* + греч. megas, megalu большой; син. гигантизм внутренних органов) — патологическое состояние, характеризующееся чрезмерно большими размерами и массой внутренних органов.

СПЛАНХНОМЕЗОДЕРМА (*спланхно-* + *мезодерма*) — см. *Мезодерма внутренностная.*

СПЛАНХНОМЕТРИЯ (*спланхно-* + греч. metreō измерять) — совокупность методов количественной оценки размеров, массы, упругости и других параметров внутренних органов.

СПЛАНХНОПЕКСИЯ (splanchnopexia; *спланхно-* + греч. pēxis прикрепление) — хирургическая операция: фиксация внутренних органов при их патологической подвижности.

СПЛАНХНОПЛЕВРА (splanchnopleura; *спланхно-* + *плевра*) — см. *Мезодерма внутренностная.*

СПЛАНХНОПТОЗ (splanchnoptosis; *спланхно-* + греч. ptōsis опущение; син.: висцероптоз, Гленара симптомокомплекс) — смещение внутренних органов книзу по сравнению с их нормальным положением.

СПЛАНХНОСКОПИЯ (*спланхно-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — см. *Перитонеоскопия.*

СПЛАНХНОТОМ (splanchnotomus; *спланхно-* + греч. tomos отрезок, пластинка; син. боковая пластинка) — вентролатеральная часть мезодермы, у зародышей позвоночных и человека не подвергающаяся сегментации и расщепляющаяся на париетальный и висцеральный листки, щель между к-рыми становится целомом; предшественник мезотелия, миокарда, коркового вещества надпочечника, эпителия гонад, а также клеток мезенхимы.

СПЛАНХНЭКТОМИЯ (splanchnectomia) — 1) (анат. nervus splanchnicus чревный нерв + *эктомия*) — хирургическая операция: иссечение чревных нервов; 2) (*спланхн-* + *эктомия*) — производимая в эксперименте на лабораторном животном хирургическая операция удаления какого-либо внутреннего органа.

СПЛЕН- (селено-; греч. splēn селезенка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к селезенке».

СПЛЕНАДЕНОМА (splenadenoma; *сплен-* + *аденома*) — см. *Спленома.*

СПЛЕНАЛГИЯ (splenalgia; *сплен-* + греч. algos боль) — боль в области селезенки; наблюдается при растяжении капсулы селезенки из-за быстрого увеличения ее объема при повреждении или воспалении.

СПЛЕНИЗАЦИЯ (splenisatio; греч. splēn селезенка) — резкое уплотнение и гомогенизация ткани легкого, в результате чего она на разрезе напоминает ткань селезенки; наблюдается, напр., при долевой или тотальной пневмонии.

СПЛЕНИТ (splenitis; *сплен-* + *-ит*; син. лиенит) — воспаление селезенки.

СПЛЕНИТ СИФИЛИТИЧЕСКИЙ ГУММОЗНЫЙ (splenitis syphilitica gummosa; син. селезенка дольчатая сифилитическая) — поражение селезенки в третичном периоде врожденного сифилиса, характеризующееся ангиопатией и образованием многочисленных гумм, имеющих тенденцию к инкапсуляции и рубцеванию, в результате чего селезенка приобретает дольчатую форму.

СПЛЕНО- — см. *Сплен-.*

СПЛЕНОГЕПАТОМЕГАЛИЯ ЛИПОИДНО-КЛЕТОЧНАЯ (splenohepatomegalia lipoidocellularis; *спленo-* + греч. hēpar, hēpatos печень + megas, megalu большой) — см. *Ниманна — Пика болезнь.*

СПЛЕНОМА (splenoma; *сплен-* + *-ома*; син.: спленаденома, фиброспленома) — гиперплазия ткани селезенки с образованием в ней плотного узла; при жизни не диагностируется.

СПЛЕНОМАНОМЕТРИЯ (*спленo-* + *манометрия*) — определение гидростатического давления в селезеночной вене с помощью водного манометра.

СПЛЕНОМЕГАЛИЯ (splenomegalia; *спленo-* + греч. megas, megalu большой; син. мегалоспления) — стойкое увеличение селезенки.

С. ЛЕЙШМАНИО́ЗНАЯ (s. leishmaniosa) — С. при висцеральном лейшманиозе, отличающаяся очень большими размерами и плотностью селезенки.
С. ТРОМБОФЛЕБИТИ́ЧЕСКАЯ (s. thrombophlebitica) — С. при тромбофлебите селезеночной вены, гистологически характеризующаяся фиброзом и застойным полнокровием селезенки.

СПЛЕНОМЕГАЛИ́Я ТРОПИ́ЧЕСКАЯ (splenomegalia tropica) — см. *Лейшманиоз висцеральный.*

СПЛЕНОПЕКСИ́Я (splenopexia; *сплено-* + греч. pēxis прикрепление) — хирургическая операция: устранение патологической подвижности селезенки путем ее подшивания к диафрагме.

СПЛЕНОПНЕВМОНИ́Я (splenopneumonia; *сплено-* + *пневмония*) — см. *Дено пневмония.*

СПЛЕНОПОРТОГРАФИ́Я (*сплено-* + анат. vena portae воротная вена + греч. graphō писать, изображать; син.: рентгенолиенопортография, флебография селезеночная) — флебография селезеночной и воротной вен с их ветвями, при к-рой контрастное вещество вводят в пульпу селезенки посредством пункции.

СПЛЕНОПОРТОГРАФИ́Я РАДИОИЗОТО́ПНАЯ (син.: радиопортография внутривенная, радиоциркулография спленопортальная) — радиоизотопная ангиография системы воротной вены, при к-рой радиофармацевтический препарат вводят в пульпу селезенки.

СПЛЕНОПОРТОМАНОМЕТРИ́Я (*сплено-* + анат. vena portae воротная вена + *манометрия*) — метод измерения давления в системе воротной вены, заключающийся в пункции селезенки иглой, соединенной с манометром.

СПЛЕНОПОРТОХОЛАНГИОГРАФИ́Я (*сплено-* + анат. vena portae воротная вена + греч. cholē желчь + angeion сосуд + graphō писать, изображать) — спленопортография, выполняемая в сочетании с внутривенной холеграфией.

СПЛЕНОРАФИ́Я (splenorrhaphia; *сплено-* + греч. rhaphē шов) — хирургическая операция: ушивание селезенки при ее надрыве или разрыве.

СПЛЕНОРЕНА́ЛЬНЫЙ (splenorenalis; *сплено-* + лат. renalis почечный) — относящийся одновременно к селезенке и почкам.

СПЛЕНОСКАНИ́РОВАНИЕ (*сплено-* + *сканирование*; син. спленосканография) — радиоизотопное сканирование селезенки.

СПЛЕНОСКАНОГРАФИ́Я (*сплено-* + *сканография*) — см. *Спленосканирование.*

СПЛЕНОЦИ́Т ПАППЕНГЕ́ЙМА (*сплено-* + гист. cytus клетка) — см. *Паппенгейма клетка.*

СПЛЕНЭКТОМИ́Я (splenectomia; *сплен-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление селезенки.

СПО — см. *Слой половинного ослабления.*

СПОДОГРА́ММА (греч. spodos пепел, зола + gramma запись) — гистологический препарат, полученный микросжиганием (воздействием высокой температуры на тонкий срез ткани).

СПОДОГРАФИ́Я (греч. spodos пепел, зола + graphō писать, изображать) — см. *Микросжигание.*

СПОНГИ- (спонгио-; греч. spongia губка) — составная часть сложных слов, означающая «имеющий пористое строение».

СПОНГИО- — см. *Спонги-.*

СПОНГИОБЛА́СТ (spongioblastus; *спонгио-* + греч. blastos росток, зародыш) — малодифференцированная клетка нервной трубки; предшественник клеток нейроглии.

СПОНГИОБЛАСТО́З (spongioblastosis; *спонгиобласт* + *-оз*) — см. *Глиобластоз диффузный.*

СПОНГИОБЛАСТО́МА (spongioblastoma; *спонгиобласт* + *-ома*) — нейроэктодермальная опухоль ц. н. с., исходящая из спонгиобластов.

СПОНГИОБЛАСТО́МА МУЛЬТИФО́РМНАЯ (spongioblastoma multiforme) — см. *Глиобластома.*

СПОНГИОБЛАСТО́МА ПОЛЯ́РНАЯ (spongioblastoma polare; син. астроцитома веретеноклеточная) — доброкачественная глиальная опухоль мозга, характеризующаяся расположением вытянутых биполярных клеток с веретенообразными ядрами в виде пучка; гистологический вариант астроцитомы.

СПОНГИО́З (spongiosis; *спонги-* + *-оз*; син. отек межклеточный) — экссудативное воспаление эпидермиса, при к-ром серозная жидкость скапливается в межклеточных пространствах шиповатого слоя, вследствие чего увеличиваются межклеточные лакуны.

СПОНГИОЦИ́Т (spongiocytus, LNH; *спонгио-* + гист. cytus клетка) — железистая клетка пучковой зоны коркового вещества надпочечников; цитоплазма С. заполнена крупными каплями липидов.

СПОНДИЛ- (спондило-; греч. spondylos позвонок) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к позвонкам, к позвоночнику».

СПОНДИЛЁЗ (spondylosis; *спондил-* + *-оз*; син. С. деформирующий) — хроническая болезнь, характеризующаяся дистрофическими изменениями дисков, суставов и связочного аппарата позвоночника с образованием клювовидных и шиповидных остеофитов по верхнему и нижнему краям тел позвонков; проявляется болями в спине, ощущением скованности и ограничением подвижности позвоночника.

СПОНДИЛЁЗ ДЕФОРМИ́РУЮЩИЙ (spondylosis deformans) — см. *Спондилез.*

СПОНДИЛИ́Т (spondylitis; *спондил-* + *-ит*) — воспаление всех или нек-рых структурных элементов позвоночника (межпозвоночных суставов, дисков, тел позвонков).
С. БРУЦЕЛЛЁЗНЫЙ (s. brucellosa) — С. при бруцеллезе, характеризующийся поражением нескольких позвонков, преимущественно с продуктивными изменениями в них.
СПОНДИЛИ́Т КЮММЕЛЛЯ — ВЕРНЕ́Я — см. *Кюммелля болезнь.*
С. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (s. traumatica) — см. *Кюммелля болезнь.*
С. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (s. tuberculosa; син.: Потта болезнь, туберкулез позвоночника) — С. при туберкулезе, поражающий гл. обр. передние отделы тел позвонков, приводящий к их сплющиванию, уменьшению длины позвоночного столба и формированию кифоза; часто осложняется возникновением холодных абсцессов и натечников.

СПОНДИЛО- — см. *Спондил-.*

СПОНДИЛОАРТРИ́Т (spondyloarthritis; *спондило-* + *артрит*) — воспаление межпозвоночных суставов.

СПОНДИЛОАРТРИ́Т АНКИЛОЗИ́РУЮЩИЙ (spondyloarthritis ankylosans) — см. *Бехтерева болезнь.*

СПОНДИЛОАРТРИ́Т РЕВМАТО́ИДНЫЙ (устар.; spondyloarthritis rheumatoidea) — см. *Бехтерева болезнь.*

СПОНДИЛОАРТРО́З (spondyloarthrosis; *спондило-* + *артроз*; син. С. деформирующий) — артроз межпозвоночных суставов, сопровождающийся образованием краевых остеофитов тел позвонков, истончением и смещением межпозвоночных дисков, анкилозированием суставов.
С. ВТОРИ́ЧНЫЙ (s. secundaria) — С., развивающийся как следствие заболеваний и деформаций позвонков.
С. ГРУДНО́Й (s. thoracica; син. дорсартроз) — С. грудного отдела позвоночника.
С. ДЕФОРМИ́РУЮЩИЙ (s. deformans) — см. *Спондилоартроз.*
С. ПЕРВИ́ЧНЫЙ (s. primaria) — С., возникающий без видимых причин гл. обр. у людей пожилого и среднего возраста, а также под влиянием чрезмерных физических нагрузок или частой травматизации позвоночника.
С. ПОЯСНИ́ЧНЫЙ (s. lumbalis; син. люмбоартроз) — С. поясничного отдела позвоночника.
С. ШЕ́ЙНЫЙ (s. cervicis; син. цервикоартроз) — С. шейного отдела позвоночника.

СПОНДИЛОГРАФИ́Я (*спондило-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография позвоночника без предварительного его контрастирования.

СПОНДИЛОДЕ́З (spondylodesis; *спондило-* + греч. desis связывание, скрепление) — костно-пластическая операция на позвоночнике с целью исключения его подвижности в каком-либо отделе; применяется, напр., при сколиозе, туберкулезном спондилите.

СПОНДИЛОДИНИ́Я (spondylodynia; *спондил-* + греч. odynē боль) — боль в области позвоночника.

СПОНДИЛО́ЛИЗ (spondylolysis; *спондило-* + греч. lysis разрушение, разложение; син. спондилосхиз) — дефект в межсуставной части дужки позвонка в виде одно- или двусторонней щели; возникает как аномалия развития или в результате перестройки костной структуры дужки при ее функциональной перегрузке.

СПОНДИЛОЛИСТЕ́З (spondylolisthesis; *спондил-* + греч. olisthesis, соскальзывание, смещение) — смещение позвонка кпереди (крайне редко — кзади) относительно нижележащего позвонка.

СПОНДИЛОПАТИ́Я ТАБЕТИ́ЧЕСКАЯ (spondylopathia tabetica; *спондило-* + греч. pathos страдание, болезнь) — поражение межпозвоночных суставов при tabes dorsalis, характеризующееся деструктивными изменениями суставных поверхностей позвонков, неполным вывихом, рассасыванием больших участков кости с одновременным беспорядочным образованием новой костной ткани, обызвествлением межпозвоночных хрящей и связок.

СПОНДИЛОСХИ́З (spondyloschisis; *спондило-* + греч. schisis расщепление) — см. *Спондилолиз.*

СПОНДИЛОТОМИ́Я (spondylotomia; *спондило-* + греч. tomē разрез, рассечение) — акушерская плодоразрушающая операция при запущенном поперечном положении плода, заключающаяся в рассечении его позвоночника.

СПОНТА́ННЫЙ (лат. spontaneus) — самопроизвольный, возникающий без внешнего воздействия (о биологическом эффекте, болезни и др.).

СПОРАДИ́ЧЕСКИЙ (греч. sporadikos рассеянный, отдельный) — возникающий в виде одиночных случаев (напр., о болезни).

СПОРИЦИ́ДЫ (*споры* + лат. caedo убивать) — вещества, вызывающие гибель спор микроорганизмов (напр., активированные растворы хлорамина, формальдегид).

СПОРО- (греч. spora посев, семя) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к спорам».

СПОРОВИКИ́ (Sporozoa) — класс животных типа простейших, объединяющий внутриклеточных паразитов, в процессе размножения к-рых образуются споры; представители С. являются возбудителями малярии, кокцидиоза и других заболеваний человека.

СПОРОГОНИ́Я (*споро-* + греч. gonē зарождение, потомство) — процесс развития спировиков, заключающийся в многократном делении оплодотворенной клетки (ооцисты) с образованием спорозоитов.

СПОРОЗО́ИТ (*споро-* + греч. zōē жизнь) — стадия цикла развития спировиков, образующаяся при делении ооцисты.

СПОРОЗО́ИТНЫЙ И́НДЕКС — показатель риска заражения малярией, представляющий собой долю (в процентах) выловленных самок комаров анофелес, у к-рых в слюнных железах обнаружены спорозоиты малярийного плазмодия.

SPORÓTHRIX — см. *Sporotrichum.*

SPOROTRÍCHUM (син. Sporothrix) — род дрожжеподобных микроорганизмов сем. Moniliaceae кл. несовершенных грибов, включающий возбудителей споротрихоза человека и животных (S. schenckii, S. beurmanni, S. gougerotii и др.).

СПОРОТРИХО́З (sporotrichosis; син.: Берманна болезнь, ринокладиоз, Шенка болезнь) — хронический микоз, вызываемый паразитическими грибками рода Sporotrichum, поражающий гл. обр. кожу и подкожную клетчатку, характеризующийся возникновением изъязвляющихся узлов по ходу лимфатических сосудов; реже поражаются мышцы, кости и внутренние органы.

СПОРОЦИ́СТА (*споро-* + греч. kystis пузырь, мешок) — первая личиночная стадия трематод, формирующаяся из мирацидия в теле промежуточного хозяина — моллюска; в С. происходит образование редий.

СПОРТИ́ВНАЯ ТРЕНИРО́ВКА — процесс совершенствования физических и моральных качеств спортсмена, направленный на достижение лучших результатов в спорте и представляющий собой систематические занятия физическими упражнениями; при С. т. обязательны врачебный контроль и самоконтроль спортсмена.

СПОРТИ́ВНАЯ ФО́РМА — высшая степень тренированности спортсмена, соответствующая готовности к показу максимального спортивного результата; характеризуется оптимальными показателями специальной работоспособности, функционального состояния организма и адаптации к нагрузкам.

СПОРТИ́ВНЫЙ ОТБО́Р — выявление лиц, обладающих физиологическими, психологическими и морфологическими особенностями, необходимыми для успешного совершенствования в избранном виде спорта.

«СПО́РЩИКИ» — см. *Псевдокверулянты.*

СПО́РЫ (греч. spora посев, семя) — 1) бесполые репродуктивные образования у нек-рых растений и паразитических простейших (споровиков), состоящие из одной или нескольких клеток, покрытых, как правило, плотной оболочкой, устойчивой к внешним воздействиям; 2) б а к т е р и а л ь н ы е — образования, в форме к-рых нек-рые палочковидные бактерии сем. Bacillaceae способны выживать в неблагоприятных условиях; характеризуются наличием многослойной оболочки, термо- и кислотоустойчивостью.

СПОРЭНДОМИКО́З — см. *Гемиспороз.*

СПО́СОБ ФЛОТА́ЦИИ (син. Поттенджера способ) — метод обогащения мокроты для бактериоскопии, заключающийся в ее гомогенизации с помощью раствора едкого натра и последующем добавлении растворителя (ксилола, толуола), в тонкой всплывающей пленке к-рого концентрируются микобактерии туберкулеза.

СПОСО́БНОСТИ в п с и х о л о г и и — индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями для успешного осуществления определенного рода деятельности.

СПРА́ВКА О РАНЕ́НИИ (ПОРАЖЕ́НИИ, ЗАБОЛЕВА́НИИ) — документ, выдаваемый при выписке из военно-лечебного учреждения, удостоверяющий факт ранения (поражения, заболевания) и его связь с пребыванием военнослужащего на фронте.

СПРИДИНГ-ФА́КТОР (англ. spreading распространение) — см. *Фактор распространения.*

СПРИНЦЕВА́НИЕ в л а г а л и щ а (нем. spritzen брызгать) — промывание влагалища струей жидкости с гигиенической или лечебной целью.

СПРУ (англ. sprue; син.: афты злокачественные, афты тропические) — хроническая болезнь неясной этиологии, характеризующаяся нарушением всасывания в кишечнике глюкозы, жиров и витаминов, диареей, анемией, возникновением афт; встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом.

СПУМАВИ́РУСЫ (spumaviridae) — подсемейство РНК-содержащих вирусов сем. ретравирусов; у человека и животных наблюдается бессимптомное носительство С., сопровождающееся изменениями цитоплазмы пораженных клеток, напоминающими образование пены.

СПУ́ТАННОСТЬ О́СТРАЯ — см. *Корсакова дизнойя.*

СПУ́ТАННОСТЬ СОЗНА́НИЯ (confusio conscientiae) — помрачение сознания, характеризующееся позитивными психическими симптомами (бредом, галлюцинациями и др.).

С. СОЗНА́НИЯ ГАЛЛЮЦИНАТО́РНАЯ (c. conscientiae hallucinatoria) — С. с., возникшая на высоте развития вербального галлюциноза.

С. СОЗНА́НИЯ КАТАТОНИ́ЧЕСКАЯ (c. conscientiae catatonica) — С. с., развившаяся при выраженном кататоническом возбуждении.

С. СОЗНА́НИЯ КОНФАБУЛЯТО́РНАЯ (c. conscientiae confabulatoria) — С. с. с обильными конфабуляциями обыденного или фантастического содержания; наблюдается при интоксикационном, инфекционном и сосудистом психозах.

С. СОЗНА́НИЯ МАНИАКА́ЛЬНАЯ (c. conscientiae maniacalis) — С. с., развивающаяся на высоте маниакального возбуждения, напр. при маниакально-депрессивном психозе.

С. СОЗНА́НИЯ СОСУ́ДИСТАЯ (c. conscientiae vascularis) — С. с., сопровождающаяся тревогой и двигательным беспокойством, возникающая преимущественно в ночное время; наблюдается при сосудистых поражениях головного мозга.

С. СОЗНА́НИЯ СТА́РЧЕСКАЯ (c. conscientiae senilis) — С. с. при старческом слабоумии, характеризующаяся дезориентировкой со сдвигом ситуации в прошлое, сопровождающаяся двигательным беспокойством и суетливостью.

SPUTÁTIO (лат. sputum слюна) — навязчивое жевание.

СПУ́ТНИК(-И) в г е н е т и к е — сегмент хромосомы с диаметром, соизмеримым с диаметром хромосомы, отделенный от нее вторичной хромосомной перетяжкой.

С. И́НТЕРКАЛЯ́РНЫЙ (лат. intercalo вкладывать, вставлять) — С., расположенный между двумя вторичными хромосомными перетяжками.

С. ТАНДЕ́МНЫЕ (англ. tandem расположенный последовательно, соединенный) — два С., лежащие рядом и отделенные один от другого вторичной хромосомной перетяжкой.

С. ТЕРМИНА́ЛЬНЫЙ (лат. terminalis конечный) — С., расположенный на конце хромосомы.

СРАМНА́Я О́БЛАСТЬ (pudendum) — см. *Половая область.*

СРАМНА́Я ЩЕЛЬ (rima pudendi) — см. *Половая щель.*

СРАМНО́Й КАНА́Л (canalis pudendalis) — см. *Пудендальный канал.*

СРАЩЕ́НИЕ ЗРАЧКА́ — см. *Seclusio pupillae.*

СРЕДА́ 199 — см. *Моргана — Мортона — Паркера среда.*

СРЕДА́ КУЛЬТИВИ́РОВАНИЯ — см. *Среда роста.*

СРЕДА́ ОБИТА́НИЯ ЧЕЛОВЕ́КА — см. *Окружающая среда.*

СРЕДА́ ОБОГАЩЕ́НИЯ VF — см. *Вейнберга среда.*

СРЕДА́ ПОДДЕ́РЖКИ (син. питательная среда поддерживающая) — питательная среда, обеспечивающая длительное существование клеток культуры ткани без заметного увеличения ее массы.

СРЕДА́ РО́СТА (син. среда культивирования) — питательная среда, содержащая все компоненты, обеспечивающие активное деление клеток, культивируемых вне организма.

СРЕДИ́ННАЯ АПЕРТУ́РА ЧЕТВЁРТОГО ЖЕЛУ́ДОЧКА (apertura mediana ventriculi quarti, PNA; apertura me-

dialis ventriculi quarti, BNA; apertura mediana rhombencephali, JNA; син. Мажанди отверстие) — отверстие в сосудистой основе IV желудочка головного мозга, расположенное в области нижнего угла ромбовидной ямки и связывающее IV желудочек с подпаутинным пространством.

СРЕДИ́ННАЯ БОРОЗДА́ (sulcus medianus) — 1) предплечья — углубление в нижней части предплечья между сухожилиями лучевого сгибателя запястья и поверхностного сгибателя пальцев, образующееся после отведения сухожилия длинной ладонной мышцы; место расположения срединного нерва; 2) четвертого желудочка — продольное углубление по средней линии ромбовидной ямки, делящее ее на две половины; продолжение задней срединной борозды спинного мозга; 3) моста мозга — см. *Базилярная борозда.*

СРЕДИ́ННАЯ БОРОЗДА́ ЗА́ДНЯЯ (sulcus medianus posterior, PNA, BNA; sulcus medianus dorsalis, JNA) — продольное углубление по средней линии задней поверхности спинного и продолговатого мозга.

СРЕДИ́ННАЯ БОРОЗДА́ ЯЗЫКА́ (sulcus medianus linguae, PNA, BNA, JNA) — продольное углубление по средней линии спинки языка от его верхушки до слепого отверстия.

СРЕДИ́ННАЯ ЛИ́НИЯ ЗА́ДНЯЯ (linea mediana posterior, PNA, BNA, JNA) — вертикальная линия, условно проводимая по остистым отросткам позвонков; служит анатомо-топографическим ориентиром.

СРЕДИ́ННАЯ ЛИ́НИЯ ПЕРЕ́ДНЯЯ (linea mediana anterior, PNA, BNA, JNA) — вертикальная линия, условно проводимая по середине грудины; служит анатомо-топографическим ориентиром.

СРЕДИ́ННОЕ Э́ХО — см. *М-Эхо.*

СРЕДИ́ННО-КЛЮЧИ́ЧНАЯ ЛИ́НИЯ (linea medioclavicularis; син.: мамиллярная линия, сосковая линия) — вертикальная линия, условно проводимая на передней поверхности груди через проекцию середины ключицы; обычно проходит через сосок молочной железы; служит анатомо-топографическим ориентиром.

СРЕДНЕГОЛО́ВОСТЬ (mesocephalia) — см. *Мезоцефалия.*

СРЕ́ДНЯЯ ДО́ЛЯ предстательной железы (lobus medius) — см. *Перешеек предстательной железы.*

СРЕ́ДНЯЯ ЗА́НЯТОСТЬ КО́ЙКИ — статистический показатель, характеризующий использование коечного фонда, рассчитываемый как отношение общего числа койко-дней за год к среднегодовому числу фактически развернутых коек.

СРЕ́ДНЯЯ ПРОДОЛЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ ЖИ́ЗНИ (син. средняя продолжительность предстоящей жизни) — статистический показатель смертности населения, выражаемый числом лет, к-рое в среднем предстоит прожить лицам, родившимся или достигшим определенного возраста в данном календарном году, если предположить, что на всем протяжении их жизни смертность в каждой возрастной группе будет такой, какой она была в этом же году.

СРЕ́ДНЯЯ ПРОДОЛЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТОЯ́ЩЕЙ ЖИ́ЗНИ — см. *Средняя продолжительность жизни.*

СРЕДОСТЕ́НИЕ (mediastinum, PNA, JNA; septum mediastinale, BNA) — часть грудной полости, расположенная между правым и левым плевральными мешками, ограниченная спереди грудиной, сзади грудным отделом позвоночника, снизу диафрагмой, сверху верхней апертурой грудной клетки.

С. ВЕ́РХНЕЕ (m. superius, PNA; cavum mediastinale superius, BNA; pars cranialis mediastini, JNA) — часть С., расположенная выше корней легких; содержит вилочковую железу или замещающую ее жировую ткань, восходящую аорту и дугу аорты с ее ветвями, плечеголовные и верхнюю полую вены, конечный участок непарной вены, лимфатические сосуды и узлы, трахею и начало главных бронхов, диафрагмальные и блуждающие нервы.

С. ЗА́ДНЕЕ — 1) (m. posterius, PNA) — часть нижнего С., расположенная между задней поверхностью перикарда и позвоночником; содержит нижний отдел пищевода, нисходящую аорту, непарную и полунепарную вены, грудной проток, лимфатические узлы, нервные сплетения, блуждающие нервы и симпатические стволы; 2) (cavum mediastinale posterius, BNA; pars dorsalis mediastini, JNA) — часть С., расположенная кзади от корней легких; содержит пищевод, аорту, непарную и полунепарную вены, грудной проток, лимфатические узлы, нервные сплетения, блуждающие нервы и симпатические стволы.

С. НИ́ЖНЕЕ (m. inferius, PNA) — часть С., расположенная ниже корней легких; делится на переднее, среднее и заднее С.

С. ПЕРЕ́ДНЕЕ — 1) (m. anterius, PNA) — часть нижнего С., расположенная между задней поверхностью передней грудной стенки и передней поверхностью перикарда; содержит внутренние грудные артерии и вены, окологрудинные лимфатические узлы; 2) (cavum mediastinale anterius, BNA; pars ventralis mediastini, JNA) — часть С., расположенная кпереди от корней легких; содержит вилочковую железу, сердце с перикардом, дугу аорты и верхнюю полую вену с их ветвями и притоками, трахею и бронхи, лимфатические узлы, нервные сплетения, диафрагмальные нервы.

С. СРЕ́ДНЕЕ (m. medium, PNA) — часть нижнего средостения, содержащая сердце, перикард и диафрагмальные нервы.

СРЕДОСТЕ́НИЕ ЯИ́ЧКА (mediastinum testis, PNA, BNA, JNA; син. гайморово тело — устар.) — утолщение белочной оболочки яичка, вдающееся в его паренхиму по заднему краю; содержит сеть яичка.

СРЕДОСТЕ́ННО-ЛЁГОЧНАЯ СКЛА́ДКА (plica mediastinopulmonalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *477.*

СРЕ́ДСТВА ЗАЩИ́ТЫ — средства (промышленные изделия, сооружения и др.), предназначенные или приспособленные для предупреждения, устранения или уменьшения воздействия на людей опасных и вредных факторов окружающей (природной или производственной) среды, а также боевых средств поражения.

С. ЗАЩИ́ТЫ ИНДИВИДУА́ЛЬНЫЕ — С. з., представляющие собой предметы личного пользования (индивидуального оснащения).

С. ЗАЩИ́ТЫ КОЛЛЕКТИ́ВНЫЕ — С. з., представляющие собой сооружения и технические устройства, используемые для одновременной защиты группы людей.

СРЕ́ДСТВА МА́ССОВОГО ПОРАЖЕ́НИЯ — средства вооружения, предназначенные для нанесения массовых потерь в живой силе, технике и вооружении; в настоящее время к С.м. п., к-рые могут быть применены противником, относят ядерное, химическое и биологическое (бактериологическое) оружие.

СРЕ́ДСТВА МЕДИЦИ́НСКОЙ ЗАЩИ́ТЫ (син. медицинские средства защиты — нрк) — лекарственные средства и предметы медицинского оснащения, предназначенные для осуществления мероприятий по медицинской защите войск и населения.

СРЕ́ДЫ ДИ́ФКО — стандартные сухие питательные среды для культивирования и идентификации микроорганизмов, выпускаемые фирмой Дифко (США).

СРЕЗ ванатомии — тонкая пластинка ткани, срезанная с органа или его части для морфологического исследования.

С. ГИСТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ — С., получаемый в процессе изготовления гистологического препарата.

С. ГИСТОТОПОГРАФИ́ЧЕСКИЙ — гистологический С. большой площади, дающий возможность изучения особенностей строения тканей и клеток с учетом места их расположения в составе органа.

СРЕЗ ОПТИ́ЧЕСКИЙ — участок какой-либо оптической среды или оболочки глазного яблока, освещенный узким световым пучком при исследовании глаза с помощью щелевой лампы.

СРОК ГО́ДНОСТИ МЕДИЦИ́НСКОГО ИМУ́ЩЕСТВА — устанавливаемый официальными документами период времени, в течение к-рого гарантируется неизменность физико-химических свойств расходного медицинского имущества при соблюдении правил его производства и хранения.

СРОК ХРАНЕ́НИЯ МЕДИЦИ́НСКОГО ИМУ́ЩЕСТВА в военной медицине — устанавливаемый официальными документами период времени, в течение к-рого медицинское имущество может находиться в неприкосновенных запасах без замены.

СРОК ЭКСПЛУАТА́ЦИИ МЕДИЦИ́НСКОГО ИМУ́ЩЕСТВА — устанавливаемый официальными документами минимальный срок использования по прямому назначению инвентарного медицинского имущества.

СРЫВ ВЫ́СШЕЙ НЕ́РВНОЙ ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ — совокупность функциональных нарушений высшей нервной деятельности, возникающих вследствие столкновения («сшибки») процессов возбуждения и торможения или перенапряжения их силы и подвижности.

СРЫ́ГИВАНИЕ — внезапное выбрасывание пищи из пищевода или желудка, возникающее без видимого усилия у детей первых месяцев жизни, напр. при перекорме, аэрофагии, аномалиях развития пищевода и кардиальной части желудка.

ССА́ДИНА — 1) поверхностное механическое повреждение участка кожи; 2) см. *Экскориация.*

СТАБИЛИЗА́ТОР ПИЩЕВО́ГО ПРОДУ́КТА (лат. stabilis устойчивый, неподвижный) — пищевая добавка, улучшающая консистенцию продукта или способствующая длительному его сохранению.

СТАБИЛИЗА́ТОР КРО́ВИ — вещество, добавляемое в полученную из организма кровь с целью предотвращения ее свертывания.

СТАБИЛИЗА́ЦИЯ РАСТВО́РА (лат. stabilis устойчивый, неподвижный) в фармации — добавление к инъекционному раствору веществ, предупреждающих выпадение осадка, изменение цвета и других физических и химических свойств.

СТАБИЛОГРА́ММА (лат. stabilis устойчивый, неподвижный + греч. gramma запись) — кривая, отражающая колебания центра тяжести тела в положении стоя.

СТАБИЛОГРАФИ́Я (лат. stabilis устойчивый, неподвижный + греч. graphō писать, изображать) — графическая регистрация колебаний центра тяжести тела в положении стоя; используется, напр., при исследовании функционального состояния вестибулярного анализатора.

СТАБИ́ЛЬНЫЙ ФА́КТОР — см. *Фактор VII.*

СТАДЕРИ́НИ ЯДРО́ (R. Staderini, род. в 1869 г., итал. анатом) — см. *Ядро вставочное.*

СТА́ДИЯ МЕ́ДЛЕННОЙ РЕПОЛЯРИЗА́ЦИИ — см. *Фаза медленной реполяризации.*

СТА́ДИЯ РАЗВИ́ТИЯ — этап онтогенеза животного или растения, характеризующийся специфическими морфологическими и (или) биохимическими особенностями.

СТАЗ (stasis; греч. „стояние, неподвижность, застой") — остановка естественного тока крови или другой физиологической жидкости (напр., желчи, мочи, слюны) в ограниченной области тела.

С. ДУОДЕНА́ЛЬНЫЙ (duodenostasis) — см. *Дуоденостаз.*

С. ЖЕ́ЛЧНЫЙ (cholestasis) — см. *Холестаз.*

С. ЗАСТО́ЙНЫЙ (s. congestiva) — гемостаз, развившийся при нарушении оттока крови в вены.

С. ИШЕМИ́ЧЕСКИЙ (s. ischaemica) — гемостаз, развившийся при прекращении притока крови по артериям.

С. КА́ЛОВЫЙ (coprostasis) — см. *Копростаз.*

С. КРОВЯНО́Й (haemostasis) — см. *Гемостаз.*

С. ЛИ́МФЫ (lymphostasis) — см. *Лимфостаз.*

С. МОЧЕВО́Й (urostasis) — см. *Уростаз.*

С. СЕРО́ЗНЫЙ — см. *Лимфостаз.*

С. СЛЮННО́Й (sialostasis) — см. *Сиалостаз.*

СТАЗОБАЗОФОБИ́Я (stasobasophobia; греч. stasis стояние + basis хождение + *фобия*) — навязчивый страх — сочетание боязни стояния и ходьбы.

СТА́ЙЛСА — КРО́УФО́РДА ДИРЕКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ЭФФЕ́КТ (W. S. Stiles, англ. натуралист; B. H. Crawford, англ. натуралист) — см. *Дирекциональный эффект сетчатки.*

СТАКА́ННЫЕ ПРО́БЫ МОЧИ́ — методы выявления уровня поражения мочевых путей, основанные на сборе мочи при мочеиспускании последовательно в 2—3 стакана с раздельным исследованием каждой порции.

СТАНДА́РТ МУ́ТНОСТИ (син.: международный стандарт мутности, стеклянный стандарт мутности) — утвержденный Всемирной организацией здравоохранения первичный эталон мутности для оптической стандартизации бактериальных взвесей, соответствующий мутности взвеси бактерий Борде—Жангу, содержащей 10^9 клеток в 1 *мл*, т. е. равный 10 единицам мутности; представляет собой взвесь частиц стекла пирекс.

СТАНДАРТИЗА́ЦИЯ АНТРОПОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — направление в антропологии, разрабатывающее размерную типологию телосложения человека по данным антропометрии и изучающее процентное распределение типов телосложения в различных группах населения.

СТАНДАРТИЗА́ЦИЯ ЛЕКА́РСТВЕННЫХ ПРЕПАРА́ТОВ — определение активности лекарственных препаратов в сравнении со стандартами.

С. ЛЕКА́РСТВЕННЫХ ПРЕПАРА́ТОВ БИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (син. валоризация) — С. л. п. по показателям их действия на биологические объекты: организм животных, изолированные органы, культуры тканей и микроорганизмов и др.

СТАНДАРТИЗО́ВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕ́НТ — см. *Стандартизованный показатель.*

СТАНДАРТИЗО́ВАННЫЙ ПОКАЗА́ТЕЛЬ (син. стандартизованный коэффициент) — статистический показатель в форме, косвенно устраняющей влияние возрастных, половых и других особенностей состава исследуемой группы (совокупности) путем приведения его к составу, принятому за стандартный; применяется для сравнения результатов статистического исследования групп неоднородного состава.

СТА́ННИУСА О́ПЫТ (H. F. Stannius, 1803—1883, нем. биолог и физиолог) — опыт на изолированном сердце лягушки, заключающийся в наложении лигатур на определенные участки сердца, доказывающий существование в нем центров автоматизма.

СТА́НЦИЯ АЭРА́ЦИИ — комплекс сооружений, предназначенных для ускоренной очистки сточных вод посредством продувания биофильтров атмосферным воздухом.

СТА́НЦИЯ ПЕРЕЛИВА́НИЯ КРО́ВИ — учреждение здравоохранения, предназначенное для сбора и консервирования донорской крови, хранения крови и кровезаменителей, а также их распределения по лечебно-профилактическим учреждениям.

СТА́НЦИЯ САНИТА́РНОЙ АВИА́ЦИИ — оснащенное санитарными самолетами или вертолетами подразделение областной (краевой, республиканской) больницы, предназначенное для экстренного оказания медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных районах, для срочной транспортировки больных и пострадавших, в случаях тяжелых внезапных заболеваний, а также для оказания плановой консультативной помощи в этих районах.

СТА́НЦИЯ СКО́РОЙ И НЕОТЛО́ЖНОЙ МЕДИЦИ́НСКОЙ ПО́МОЩИ — лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для экстренного оказания внебольничной помощи населению при внезапных заболеваниях (патологических состояниях) и несчастных случаях, а также для срочной транспортировки больных и рожениц в стационар.

СТАПЕДОПЛА́СТИКА (stapedoplastica; анат. stapes, stapedis стремя + *пластика*) — совокупность пластических операций на стремени, производимых при отосклерозе и адгезивном среднем отите.

СТАПЕДЭКТОМИ́Я (истор.; stapedectomia; анат. stapes, stapedis стремя + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление стремени или его части, применявшееся при лечении отосклероза.

СТАРЕ́НИЕ (senescentia) — возникновение в органах и системах организма возрастных изменений, ограничивающих его приспособительные возможности и приводящих к старости.

С. ПАТОЛОГИ́ЧЕСКОЕ (s. pathologica) — ускорение темпов физиологического С., вызванное каким-либо заболеванием.

С. ПРЕЖДЕВРЕ́МЕННОЕ (s. praecox) — С., происходящее в существенно более раннем возрасте, чем это наблюдается в среднем в данной группе населения.

С. РАДИАЦИО́ННОЕ (s. e radiatione) — преждевременное С., обусловленное воздействием на организм ионизирующих излучений.

С. ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКОЕ (s. physiologica) — естественно протекающее С., соответствующее генетической программе развития индивидуума.

СТАРЕ́НИЕ ДЕМОГРАФИ́ЧЕСКОЕ — см. *Старение населения.*

СТАРЕ́НИЕ НАСЕЛЕ́НИЯ (син. старение демографическое) — изменение возрастной структуры населения в сторону нарастания в нем доли лиц пожилого и старческого возрастов; наступает в результате, напр., сокращения рождаемости и (или) снижения смертности.

СТАРКО́ВА — ДЬЯКО́НОВА РЕЗЕ́КЦИЯ (А. В. Старков, отеч. хирург; П. И. Дьяконов, 1855—1908, отеч. хирург) — резекция коленного сустава, произведенная с артротомией по Оллье и дополненная скалыванием бугристости большеберцовой кости.

СТАРЛИ́НГА ЗАКО́Н (E. H. Starling, 1866—1927, англ. физиолог; син.: закон сердца, Франка — Старлинга закон) — физиологический закон, согласно к-рому сила сокращения волокон миокарда пропорциональна первоначальной величине их растяжения.

СТАРОВЕГЕТАРИА́НЦЫ — вегетарианцы, исключающие из питания все продукты животного происхождения.

СТА́РОСТЬ (senilitas) — заключительный период жизни, характеризующийся ограничением приспособительных возможностей организма и морфологическими изменениями в различных системах и органах.

СТА́РОСТЬ ДЕМОГРАФИ́ЧЕСКАЯ — см. *Старость населения.*

СТА́РОСТЬ НАСЕЛЕ́НИЯ (син. старость демографическая) — демографическая характеристика населения, определяемая долей лиц пожилого и старческого возрастов.

СТА́РТОВОЕ СОСТОЯ́НИЕ — см. *Предстартовое состояние.*

СТАРТ-РЕФЛЕ́КС — см. *Рефлекс четверохолмный.*

СТА́РЧЕСКАЯ ДУГА́ — см. *Arcus (corneae) senilis.*

СТА́РШИЙ ВРАЧ ПОЛКА́ (истор.) — должностное лицо, возглавлявшее медицинскую службу полка; ныне именуется «начальник медицинской службы полка».

СТА́РШИЙ МОРСКО́Й МЕДИЦИ́НСКИЙ НАЧА́ЛЬНИК (истор.) — должностное лицо, выполнявшее функции гарнизонного врача в военно-морском гарнизоне.

СТА́РШИЙ СПЕЦИАЛИ́СТ УПРАВЛЕ́НИЯ БОЛЬНИ́ЧНОЙ БА́ЗЫ — высококвалифицированный врач-специалист, организующий в больничной базе лечебно-диагностическую работу по специальности и осуществляющий методическое руководство этой работой.

СТАСИ́НСКОГО СИМПТО́М (T. Stasinski, польский врач) — инъецирование склер с крестообразным расположением расширенных сосудов; признак диффузного токсического зоба.

СТАТИ́НЫ (греч. statikos способный останавливать, останавливающий) — нейрогормоны, тормозящие выделение тропных гормонов гипофиза.

СТАТИ́СТИКА (англ. statistics, от лат. status состояние) — общественная наука, изучающая количественные закономерности массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественным содержанием.

С. ВОЕ́ННО-МЕДИЦИ́НСКАЯ — раздел военной медицины и санитарной С., разрабатывающий количественные методы изучения массовых процессов и явлений, характеризующих уровень и изменения здоровья военнослужащих, состояние и деятельность сил и средств военно-медицинской службы.

С. ГОСПИТА́ЛЬНАЯ — раздел военно-медицинской С., изучающий состав госпитализированных больных и исходы их лечения, а также показатели лечебно-диагностической и медико-организационной работы лечебных учреждений Вооруженных Сил.

С. ДЕМОГРАФИ́ЧЕСКАЯ (син. С. населения) — раздел социально-экономической С. и санитарной С., изучающий процессы изменений численности и состава населения, его воспроизводства и миграции.

С. ЗАБОЛЕВА́ЕМОСТИ — раздел С. здоровья населения, изучающий уровни и структуру заболеваемости по возрастным, половым, профессиональным группам населения, а также по нозологическим формам.

С. ЗДОРО́ВЬЯ НАСЕЛЕ́НИЯ — раздел санитарной С., изучающий уровни и структуру заболеваемости и инвалидности, а также состояние физического развития и воспроизводства населения.

С. ЗДРАВООХРАНЕ́НИЯ — раздел санитарной С., изучающий количественные данные о сети лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений, их деятельности и кадрах.

С. МЕДИЦИ́НСКАЯ — см. *Статистика санитарная.*

С. НАСЕЛЕ́НИЯ — см. *Статистика демографическая.*

С. САНИТА́РНАЯ (син. С. медицинская) — отрасль С., изучающая состояние здоровья населения и общественное здравоохранение.

СТАТИСТИ́ЧЕСКАЯ КА́РТА — документ для сбора информации, заводимый на каждый объект, входящий в исследуемую статистическую совокупность и содержащий перечень регистрируемых признаков (вопросов).

СТАТИСТИ́ЧЕСКАЯ СВО́ДКА — обработка первичных ма́териалов статистического наблюдения с целью их обобщения, заключающаяся в группировке, подсчете итогов, расчете статистических показателей, составлении статистических таблиц и др.

СТАТИСТИ́ЧЕСКАЯ СОВОКУ́ПНОСТЬ — относительно однородная группа объектов или явлений, характеризующаяся наличием нек-рых общих признаков и подвергающаяся изучению путем сбора количественных данных, их обработки и анализа.

СТАТИСТИ́ЧЕСКИЙ MÉТОД — совокупность взаимосвязанных приемов исследования массовых объектов и явлений с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей путем устранения случайных особенностей отдельных единичных наблюдений; С. м. широко используется при решении научных и практических задач медицины и здравоохранения.

СТАТИ́ЧЕСКИЕ ПЯ́ТНА (устар.; maculae acusticae, BNA; maculae staticae, JNA; син. слуховые пятна) — общее название пятен эллиптического и сферического мешочков перепончатого лабиринта внутреннего уха.

СТАТИ́ЧЕСКИЙ (греч. statikos останавливающий, устанавливающий) — находящийся в состоянии покоя или равновесия.

СТАТО- (греч. statos стоящий, установленный, неподвижный) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к определенному положению».

СТАТОАКУСТИ́ЧЕСКИЙ ПУЗЫРЁК (vesicula statoacustica; *стато-* + греч. akustikos слуховой) — см. *Слуховой пузырек.*

СТАТОКИНЕТИ́ЧЕСКИЕ РАССТРО́ЙСТВА (*стато-* + греч. kinētikos приводящий в движение) — общее название нарушений равновесия тела и координации движений в результате поражения мозжечка или его проводящих путей.

СТАТОКО́НИИ (statoconia, LNH; *стато-* + греч. konia пыль; син.: отолиты, статолиты) — кристаллы углекислого кальция в студневидном веществе, расположенном над нейроэпителием сферического и эллиптического мешочков перепончатого лабиринта внутреннего уха; инерционное смещение С. при изменении скорости и (или) направления перемещения тела вызывает раздражение вестибулорецепторов.

СТАТОЛИ́ТЫ (*стато-* + греч. lithos камень) — см. *Статоконии.*

СТАТОЦИ́СТА (statocystis; *стато-* + греч. kystis пузырь) — см. *Слуховой пузырек.*

СТА́ТУС АБСА́НСА (лат. status состояние) — состояние больного, характеризующееся возникновением серии абсансов, в промежутках между к-рыми сознание полностью не восстанавливается, или одного абсанса, затянувшегося на несколько часов или дней; разновидность status epilepticus.

STÁTUS ANGINÓSUS (лат. «ангинозное состояние») — наличие у больного продолжающейся часами и плохо поддающейся лекарственному воздействию загрудинной боли давящего, сжимающего, реже жгучего характера, иррадиирующей в левую (реже правую) руку, в шею, нижнюю челюсть, левое (реже правое) надплечье, иногда в левую лопатку; наблюдается при остром инфаркте миокарда.

STÁTUS ARTHRÍTICUS (лат. arthriticus относящийся к артриту) — сочетание желудочно-кишечных и нервных расстройств, непосредственно предшествующих приступу подагры.

STÁTUS ASTHMÁTICUS — см. *Астматическое состояние.*

STÁTUS DEGENERATÍVUS (истор.; лат. «дегенеративное состояние») — особенность конституции, характеризующаяся наличием выраженного сочетания физических и психических дегенеративных стигм.

STÁTUS EPILÉPTICUS (лат. «эпилептическое состояние»; син. припадок эпилептический непрерывный) — состояние больного, характеризующееся возникновением серии эпилептических припадков (чаще больших), в промежутках между к-рыми сознание полностью не восстанавливается.

STÁTUS FEBRÍLIS (лат. «лихорадочное состояние») — чувство жара, гиперемия лица, учащение пульса и дыхания, наблюдаемые при повышенной температуре тела.

STÁTUS LACUNÁRIS (лат. «лакунарное состояние») — см. *Status spongiosus.*

STÁTUS PRÆSENS (лат. «состояние в настоящее время») — состояние здоровья человека в момент медицинского обследования.

STÁTUS SPONGIÓSUS (лат. «губчатое состояние»; син. status lacunaris) — совокупность дистрофических и атрофических изменений головного мозга, в результате к-рых его ткань на разрезе выглядит пористой.

STÁTUS THYMICOLYMPHÁTICUS (лат. «тимико-лимфатическое состояние») — сочетание увеличения вилочковой железы и лимфатических узлов с гипоплазией надпочечников; аномалия конституции у детей грудного возраста, приводящая в ряде случаев к внезапной смерти.

STÁTUS TYPHÓSUS (лат. «тифозное состояние») — клинический синдром резкой интоксикации организма, характеризующийся помрачением сознания, головной болью и удерживающейся в течение нескольких дней высокой лихорадкой; наблюдается, напр., у больных брюшным или сыпным тифом.

СТАФИЛ- (стафило; греч. staphylē виноградная гроздь, виноград, гроздевидная опухоль небного язычка) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «похожий на виноградную гроздь»; 2) «относящийся к небному язычку»; 3) «относящийся к стафилококкам».

СТАФИЛЕДЕ́МА (staphyloedema; *стафил-* + греч. oidēma отек) — отек небного язычка.

СТАФИЛО- — см. *Стафил-.*

СТАФИЛОДЕРМИ́Я (staphylodermia; *стафило-* + греч. derma кожа; син. пиодермия стафилококковая) — пиодермия, вызванная стафилококками; локализуется, как правило, в фолликулах волоса и апокриновых железах.

СТАФИЛОДЕРМИ́Я ФОЛЛИКУЛЯ́РНАЯ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (staphylodermia follicularis superficialis) — см. *Импетиго стафилококковое.*

СТАФИЛОКИНА́ЗА — протеолитический фермент (КФ 3.4.99.22), являющийся продуктом жизнедеятельности стафилококков; катализирует превращение плазминогена в плазмин.

СТАФИЛОКО́КК БЕ́ЛЫЙ (устар.; Staphylococcus albus; *стафило-* + *кокк*) — общее название видов стафилококков, не образующих золотистого пигмента (напр., Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus).

СТАФИЛОКО́КК ЗОЛОТИ́СТЫЙ (*стафило-* + *кокк*) — см. *Staphylococcus aureus.*

СТАФИЛОКО́ККИ (*стафило-* + *кокк*) — см. *Staphylococcus.*

STAPHYLOCÓCCUS (Ber; стафилококки) — род бактерий сем. Micrococcaceae, объединяющий неподвижные грамположительные кокки диаметром 0,6—1,0 *мкм*, располагающиеся обычно группами (гроздьями); факультативные анаэробы, спор и капсул не образуют; условно-патогенны для человека.

S. AUREUS (Ber; стафилококк золотистый)—вид бактерий рода S., образующий золотистый пигмент, ферментирующий маннит в анаэробных условиях, продуцирующий гиалуронидазу, фибринолизин, нек-рые другие ферменты и ряд токсинов; может вызывать у человека гнойные воспалительные процессы почти во всех органах и тканях.

S. EPIDÉRMIDIS (Ber) — вид бактерий рода S., не разлагающий маннит, обладающий фосфатазной активностью; обнаруживается на коже и слизистых оболочках человека, может вызывать сепсис, эндокардит, конъюнктивит, гнойную инфекцию ран и мочевых путей.

S. SAPROPHÝTICUS (Ber) — вид бактерий рода S., окисляющий маннит и не обладающий фосфатазной активностью; может вызывать острый цистит и уретрит.

СТАФИЛОКОККЦИ́НЫ — бактериоцины, продуцируемые нек-рыми штаммами стафилококков.

СТАФИЛО́МА (staphyloma; *стафил-* + *-ома*) — выпячивание поверхности глазного яблока, обусловленное рубцовым или дистрофическим изменением участка роговицы или склеры.

С. СКЛЕ́РЫ ЗА́ДНЯЯ (s. posticum) — см. *Стафилома склеры истинная.*

С. СКЛЕ́РЫ ИНТЕРКАЛЯ́РНАЯ (s. sclerae intercalare) — С. склеры в виде одного или нескольких возвышений темно-синего цвета между роговицей и областью проекции переднего края ресничного тела.

С. СКЛЕ́РЫ ИСТИННАЯ (s. sclerae verum; син.: склерэктазия задняя истинная, С. склеры задняя) — С. склеры в области заднего отдела глаза при близорукости высокой степени.

С. СКЛЕ́РЫ ЦИЛИА́РНАЯ (s. sclerae ciliare) — С. склеры в виде одного или нескольких возвышений темно-синего цвета в области проекции ресничного тела.

С. СКЛЕ́РЫ ЭКВАТОРИА́ЛЬНАЯ (s. sclerae aequatoriale) — С. склеры в виде одного или нескольких возвышений темно-синего цвета в области экватора глаза.

СТАФИЛОПЛА́СТИКА (staphyloplastica; *стафило-* + *пластика*) — общее название пластических операций по устранению дефектов мягкого неба.

СТАФИЛОРАФИ́Я (staphylorrhaphia, velosynthesis; *стафило-* + греч. rhaphē шов) — хирургическая операция: зашивание расщелины мягкого неба.

СТАФИЛОТОМИ́Я (staphylotomia; *стафилома* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение стафиломы склеры с целью ее ликвидации.

СТАХИБОТРИОТОКСИКО́З (Stachybotrys + *токсикоз*) — интоксикация гл. обр. сельскохозяйственных животных, возникающая при поедании ими корма, зараженного грибом Stachybotrys alternans; у человека встречается редко, протекает с явлениями ринита, катаральной ангины и поверхностной токсидермии.

СТАЦИОНА́Р (лат. stationarius стоящий, неподвижный) — структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения (больницы, медсанчасти, диспансера), предназначенное для обследования и лечения больных в условиях круглосуточного их пребывания в данном учреждении под наблюдением медицинского персонала.

СТАЦИОНА́РНАЯ ФА́ЗА (син. фаза М-концентрации) в бактериологии — этап развития бактериальной популяции в жидкой среде, характеризующийся максимальной концентрацией особей, достигаемой при равных скоростях деления и отмирания клеток.

СТАЦИОНА́РНЫЙ ТИП НАСЕЛЕ́НИЯ — см. *Возрастная структура населения стационарная.*

СТВОЛ БЛУЖДА́ЮЩЕГО НЕ́РВА ЗА́ДНИЙ (truncus vagalis posterior, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *1495.*

СТВОЛ БЛУЖДА́ЮЩЕГО НЕ́РВА ПЕРЕ́ДНИЙ (truncus vagalis anterior, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *1494.*

СТВОЛ МО́ЗГА (truncus cerebri) — часть головного мозга, расположенная между спинным мозгом и полушариями большого мозга; к С. м. относят продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг и промежуточный мозг.

СТГ — см. *Гормон соматотропный.*

СТЕАРИ́НОВАЯ КИСЛОТА́ — насыщенная жирная карбоновая кислота, содержащаяся в виде эфиров в растительных и животных жирах.

СТЕАТ- (стеато-; греч. stear, steatos жир) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к жирам», «содержащий жиры».

СТЕАТО- — см. *Стеат-.*

СТЕАТОГРАНУЛЁМА (steatogranuloma; *стеато-* + *гранулема*) — см. *Липогранулема.*

СТЕАТОДЕРМИ́Я (steatodermia; *стеато-* + греч. derma кожа; син. питириаз стеатодермический) — себорея волосистой части головы, характеризующаяся обильным наслоением жирных чешуек серовато-желтоватого цвета.

СТЕАТО́З (steatosis; *стеат-* + *-оз*) — см. *Себорея.*

СТЕАТО́МА (steatoma; *стеат-* + *-ома*; син. киста жировая) — ретенционная киста кожи, заполненная жировой массой, возникающая при закупорке протока сальной железы.

СТЕАТОМЕРИ́Я (steatomeria; *стеато-* + греч. mēros бедро) — значительное развитие жировой ткани на бедрах.

СТЕАТОПИГИ́Я (steatopygia; *стеато-* + греч. pygē ягодица) — значительное развитие жировой ткани на ягодицах.

СТЕАТОРЕ́Я (steatorrhoea; *стеато-* + греч. rhoia течение, истечение; син.: жировые испражнения, понос жирный, стул жирный, стул масляный) — повышенное содержание в кале нейтрального жира, жирных кислот или мыл.

С. АЛИМЕНТА́РНАЯ (s. alimentaria) — см. *Стеаторея пищевая.*

С. КИШЕ́ЧНАЯ (s. intestinalis) — С., обусловленная нарушением всасывания жиров в тонкой кишке.

С. ПАНКРЕАТИ́ЧЕСКАЯ (s. pancreatica) — С., обусловленная нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

С. ПАНКРЕАТИ́ЧЕСКАЯ ВРОЖДЁННАЯ (s. pancreatica congenita) — см. *Муковисцидоз.*

С. ПИЩЕВА́Я (s. alimentaria; син. С. алиментарная) — С., обусловленная избыточным содержанием жиров в пище.

СТЕАТОФА́ГИ (steatophagi; *стеато-* + греч. phagos пожирающий) — клетки макрофагальной системы, фагоцитирующие частицы жиров.

СТЕАТОЦИСТО́МА МНО́ЖЕСТВЕННАЯ (steatocystoma multiplex) — см. *Стеатоцистоматоз.*

СТЕАТОЦИСТОМАТО́З (steatocystomatosis; *стеато-* + греч. kystis пузырь + *-ома* + *-оз*; син.: пилосебоцистоматоз, Прингла стеатоцистома множественная, себоцистоматоз, стеатоцистома множественная) — образование множественных стеатом на волосистой части головы, на мошонке, в подмышечных впадинах и (или) вокруг сосков.

СТЕ́ЙНБРОККЕРА СИНДРО́М (O. Steinbrocker, совр. амер. врач) — см. *Синдром плечекистевой.*

СТЕ́ЙНТОНА СИНДРО́М (Ch. W. Stainton; 1839—1906, амер. стоматолог) — см. *Стейнтона — Капдепона синдром.*

СТЕ́ЙНТОНА — КАПДЕПО́НА СИНДРО́М (Ch. W. Stainton, 1839—1906, амер. стоматолог; B. Capdepont, 1867—1918, франц. стоматолог; син.: Капдепона синдром, Стейнтона синдром) — сочетание почти полного отсутствия эмали зубов с желто-коричневой окраской дентина, твердость к-рого понижена; природа С.— К. с. не выяснена.

СТЕКЛОВИ́ДНАЯ МЕМБРА́НА (membrana vitrea, PNA; membrana hyaloidea, BNA, JNA) — прозрачная оболочка, покрывающая стекловидное тело.

СТЕКЛОВИ́ДНАЯ ПЛАСТИ́НКА (lamina vitrea) — тонкая внутренняя пластинка компактного вещества плоских костей свода черепа; отличается значительной ломкостью при травмах.

СТЕКЛОВИ́ДНАЯ ЯМКА (fossa hyaloidea, PNA, BNA, JNA) — углубление в передней части стекловидного тела, в к-ром расположен хрусталик.

СТЕКЛОВИ́ДНОЕ ТЕ́ЛО (corpus vitreum, PNA, BNA, JNA) — прозрачная желеобразная масса, покрытая оболочкой и пронизанная сетью нежных волоконец, заполняющая полость глазного яблока кзади от хрусталика.

СТЕКЛОВИ́ДНЫЙ КАНА́Л (canalis hyaloideus, PNA, BNA; син.: канал стекловидного тела, клокетов канал) —

канал, проходящий через стекловидное тело от середины стекловидной ямки к диску зрительного нерва; содержит облитерированную артерию стекловидного тела.

СТЕКЛОВИ́ДНЫЙ СЛОЙ ЭПИДЕ́РМИСА — см. *Блестящий слой эпидермиса.*

СТЕКЛЯ́ННЫЙ СТАНДА́РТ МУ́ТНОСТИ — см. *Стандарт мутности.*

СТЕЛЛЭКТОМИ́Я (stellectomia; анат. ganglion stellatum звездчатый ганглий + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление или разрушение шейно-грудного (звездчатого) ганглия.

СТЕ́ЛЬКА-СУПИНА́ТОР — см. *Супинатор.*

СТЕ́НВЕРСА МЕ́ТОД (H. Stenvers, род. в 1889 г., нем. невропатолог) — метод рентгенографии височной кости, позволяющий получить неискаженное изображение ее пирамиды по всему длиннику последней; применяется, напр., для диагностики невриномы преддверно-улиткового нерва.

СТЕНИ́ЧЕСКИЙ СКЛАД ЛИ́ЧНОСТИ — склад личности с высоким витальным тонусом, повышенной психической активностью, устойчивостью воли и стремлений, высокой самооценкой.

СТЕНО- (греч. stenos узкий, тесный) — составная часть сложных слов, означающая «сужение».

СТЕНО́З (stenosis; греч. stenōsis сужение) — сужение трубчатого органа или его наружного отверстия.

СТЕНО́З АОРТА́ЛЬНЫЙ — см. *Стеноз устья аорты.*

СТЕНО́З А́ОРТЫ НАДКЛА́ПАННЫЙ (stenosis aortae supravalvularis) — аномалия развития: сужение восходящей аорты дистальнее ее луковицы.

СТЕНО́З А́ОРТЫ ПОДКЛА́ПАННЫЙ (stenosis aortae subvalvularis) — см. *Кардиомиопатия обструктивная.*

СТЕНО́З ЛЕ́ВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯ́РНОГО ОТВЕ́РСТИЯ (stenosis ostii atrioventricularis sinistri; син. стеноз митральный) — порок сердца: сужение левого предсердно-желудочкового отверстия; клинически проявляется хлопающим первым тоном, пресистолическим, протодиастолическим, реже мезодиастолическим шумом на верхушке сердца, акцентом или расщеплением второго тона над легочным стволом, уменьшением пульсового давления, а рентгенологически — митральной конфигурацией сердца.

С. ЛЕ́ВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯ́РНОГО ОТВЕ́РСТИЯ ВОРОНКООБРА́ЗНЫЙ (s. ostii atrioventricularis sinistri infundibuliformis) — С. л. а. о., при к-ром деформированный клапан выпадает в полость желудочка сердца в виде воронки с почти не изменяющимся за период сердечного цикла диаметром отверстия.

СТЕНО́З ЛЕ́ГОЧНОГО СТВОЛА́ (stenosis trunci pulmonalis) — порок сердца: сужение путей оттока крови из правого желудочка; клинически проявляется резкой одышкой, признаками гипертрофии правых отделов сердца, систолическим шумом, «кошачьим мурлыканьем» и ослаблением второго тона сердца, выслушиваемыми в области проекции легочного ствола.

С. ЛЕ́ГОЧНОГО СТВОЛА́ ИНФУНДИБУЛЯ́РНЫЙ (s. trunci pulmonalis infundibularis) — см. *Стеноз легочного ствола подклапанный.*

С. ЛЕ́ГОЧНОГО СТВОЛА́ КЛА́ПАННЫЙ (s. trunci pulmonalis valvularis) — С. л. с., при к-ром сужено отверстие легочного ствола.

С. ЛЕ́ГОЧНОГО СТВОЛА́ НАДКЛА́ПАННЫЙ (s. trunci pulmanalis supravalvularis; син. С. легочного ствола на протяжении) — С. л. с., при к-ром сужен синус легочного ствола.

С. ЛЕ́ГОЧНОГО СТВОЛА́ ПОДКЛА́ПАННЫЙ (s. trunci pulmonalis subvalvularis; син. С. легочного ствола инфундибулярный) — С. л. с., при к-ром сужен артериальный конус (воронка) правого желудочка сердца.

С. ЛЕ́ГОЧНОГО СТВОЛА́ НА ПРОТЯЖЕ́НИИ — см. *Стеноз легочного ствола надклапанный.*

СТЕНО́З МИТРА́ЛЬНЫЙ (stenosis mitralis) — см. *Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия.*

СТЕНО́З ПРА́ВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯ́РНОГО ОТВЕ́РСТИЯ (stenosis ostii atrioventricularis dextri; син. стеноз трикуспидальный) — порок сердца: сужение правого предсердно-желудочкового отверстия; клинически проявляется усилением первого тона и протодиастолическим шумом в точке аускультации трехстворчатого клапана, рентгенологически — резким увеличением правого предсердия.

СТЕНО́З СУБАОРТА́ЛЬНЫЙ ГИПЕРТРОФИ́ЧЕСКИЙ ИДИОПАТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Кардиомиопатия обструктивная.*

СТЕНО́З СУБАОРТА́ЛЬНЫЙ МЫ́ШЕЧНЫЙ — см. *Кардиомиопатия обструктивная.*

СТЕНО́З ТРИКУСПИДА́ЛЬНЫЙ (stenosis tricuspidalis) — см. *Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия.*

СТЕНО́З У́СТЬЯ А́ОРТЫ (stenosis ostii aortae; син. стеноз аортальный) — порок сердца: сужение отверстия аорты; клинически проявляется симптомами гипертрофии, позже дилатации левого желудочка, систолическим шумом над аортой, проводящимся по ходу крупных артерий.

СТЕНО́З У́СТЬЯ А́ОРТЫ ОТНОСИ́ТЕЛЬНЫЙ (stenosis ostii aortae relativa) — сочетание нормального диаметра отверстия аорты с патологическим расширением восходящего отдела (напр., при его аневризме).

СТЕНО́З ЮКСТАА́ОРТА́ЛЬНЫЙ (stenosis juxtaaortalis; лат. juxta возле, вблизи + *аорта*) — стеноз проксимальной части почечной артерии, обусловленный наличием в ней атеросклеротической бляшки; приводит к вазоренальной гипертензии.

СТЕНОЗЭКТО́М (истор.; *стеноз* + греч. ektomē вырезание, удаление) — разновидность вальвулотома, предназначавшаяся для иссечения тканей, стенозирующих клапаны сердца; распространения не получил.

СТЕНОКАРДИ́Я (stenocardia; *стено-* + греч. kardia сердце; син.: angina pectoris, Гебердена болезнь, грудная жаба) — форма ишемической болезни сердца, характеризующаяся приступами ангинозной боли продолжительностью от нескольких секунд до 20 мин. и более, купирующимися нитроглицерином; иногда во время приступа регистрируются электрокардиографические признаки ишемии миокарда.

С. НАПРЯЖЕ́НИЯ — форма С., при к-рой приступы ангинозной боли возникают только в связи с физической нагрузкой.

С. НЕСТАБИ́ЛЬНАЯ — см. *Прединфарктное состояние.*

С. ПОКО́Я (s. decubitus; син. С. постуральная)—форма С., при которой приступы ангинозной боли возникают, когда больной находится в горизонтальном положении, особенно во время сна; предположительно обусловлены повышением тонуса блуждающего нерва; всегда сочетается со С. напряжения.

С. ПОСТУРА́ЛЬНАЯ (s. posturalis) — см. *Стенокардия покоя.*

С. ПРОГРЕССИ́РУЮЩАЯ — см. *Прединфарктное состояние.*

СТЕНОКАРДИ́Я АНГИОМОТО́РНАЯ (stenocardia angiomotoria; син. стенокардия ложная) — возникновение при психоэмоциональном напряжении приступов ангинозной боли, легко купирующихся валидолом; обусловлено спазмом патологически не измененных венечных артерий сердца.

СТЕНОКАРДИ́Я ЛО́ЖНАЯ (stenocardia spuria) — см. *Стенокардия ангиомоторная.*

СТЕНОКАРДИ́Я СУБДИАФРАГМА́ЛЬНАЯ (stenocardia subdiaphragmatica) — см. *Брюшная жаба.*

СТЕНО́НОВ КАНА́Л [N. Sténon (Stensen, Stenonius), 1638—1686, датский анатом и физиолог] — см. *Резцовый канал.*

СТЕНО́НОВ ПРОТО́К (N. Sténon) — см. *Проток околоушной железы.*

СТЕНОСФИЗИ́Я (stenosphysia) — форма таза, характеризующаяся непропорционально большими вертикальными и малыми поперечными размерами.

STENOTÓMUS — см. *Скапы.*

СТЕ́НТА О́ТТИСКНАЯ МА́ССА (C. Stent, англ. стоматолог 19 в.) — термопластический оттискной материал, изготовляемый из канифоли, парафина, пчелиного воска, талька, глицерина и красителей; в настоящее время в С. о. м. вводят также антибиотики, напр. оксациллин.

СТЕ́НТОНА БОЛЕ́ЗНЬ (устар.; Th. A. Stanton, 1875—1930, англ. врач) — см. *Мелиоидоз.*

СТЕПА́НИКА ГОНИОТО́М — нож для рассечения структур радужно-роговичного угла передней камеры глаза, имеющий полую ножку с двумя выходными отверстиями на обеих поверхностях уплощенной колюще-режущей рабочей части.

СТЕППА́Ж (франц. steppage бег рысью) — см. *Походка перонеальная.*

СТЕ́РДЖА — ВЕ́БЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (W. A. Sturge, 1850—1919, англ. врач; F. P. Weber, 1863—1962, англ. врач) — см. *Стерджа — Вебера — Краббе синдром.*

СТЕ́РДЖА — ВЕ́БЕРА — КРА́ББЕ СИНДРО́М (W. A. Sturge, 1850—1919 англ. врач; F. P. Weber, 1863—1962, англ. врач; K. H. Krabbe, 1885—1961, датский невропатолог; син.: аменция невоидная, ангиоматоз энцефалотригеминальный, Брашфилда — Уайетта синдром, дисплазия нейроэктодермальная врожденная, Краббе синдром, синдром нейрокутанный, Стерджа — Вебера болезнь, Штурге — Вебера болезнь — нрк) — врожденный ангиоматоз нервной системы, про-

являющийся эпилептиформными припадками и другими расстройствами ц. н. с., глаукомой, сосудистыми невусами по ходу ветвей тройничного нерва.

СТЕРЕО- (греч. stereos твердый, прочный, объемный, пространственный) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «характеризующийся постоянством, неизменностью»; 2) «относящийся к восприятию или отображению пространственных отношений».

СТЕРЕОАКУЗИ́Я (stereoacusia; *стерео-* + греч. akusis слух) — способность целостного восприятия сочетания звуков, воздействующих с разных сторон (на оба уха), напр. звучания оркестра.

СТЕРЕОВЕКТОРКАРДИОГРА́ММА (*стерео-* + *векторкардиограмма*) — пара векторкардиограмм, синхронно зарегистрированных при стереовекторкардиографии.

СТЕРЕОВЕКТОРКАРДИОГРА́ФИЯ (*стерео-* + *векторкардиография*) — метод изучения сердечной деятельности, заключающийся в синхронной регистрации двух векторкардиограмм в таких отведениях, что при рассматривании в стереоскоп их изображение кажется объемным; позволяет установить перемещения главного электрического вектора сердца.

СТЕРЕОГНО́З (*стерео-* + греч. gnōsis познавание) — способность узнавать предметы путем их ощупывания.

СТЕРЕОКАРДИО́ГРАФ (*стерео-* + *кардиограф*) — см. *Спациоэлектрокардиограф.*

СТЕРЕОМИКРОСКО́П (*стерео-* + *микроскоп*) — см. *Микроскоп стереоскопический.*

СТЕРЕОНЕГАТОСКО́П (*стерео-* + *негатоскоп*) — устройство для рассматривания стереопары рентгенограмм, представляющее собой негатоскоп, совмещенный со стереоскопом.

СТЕРЕООПТИКА (*стерео-* + греч. optikos относящийся к зрению) — совокупность консервативных методов восстановления стереоскопического зрения при содружественном косоглазии.

СТЕРЕООФТАЛЬМОСКОПИ́Я (*стерео-* + *офтальмоскопия*) — см. *Офтальмоскопия бинокулярная стереоскопическая.*

СТЕРЕОПА́РА — совокупность двух фотографий или рентгенограмм одного и того же объекта, полученных с двух различных точек съемки и обеспечивающих восприятие его объемности при рассматривании через стереоскоп.

СТЕРЕОПИЕЛОГРАФИ́Я (*стерео-* + *пиелография*) — стереорентгенография почечных лоханок и чашек.

СТЕРЕОПОЛЯРИСКО́П (истор.; *стерео-* + *поляризация* + греч. skopeō рассматривать) — стереоскоп для исследования бинокулярного зрения, действующий на основе различной поляризации световых пучков, несущих изображение к правому и левому глазу.

СТЕРЕОРЕНТГЕНОАНГИОГРАФИ́Я (*стерео-* + *рентгеноангиография*)— стереорентгенография кровеносных или лимфатических сосудов.

СТЕРЕОРЕНТГЕНОГРАММЕТРИ́Я (*стерео-* + *рентгенограмметрия*) — стереорентгенография, сочетающаяся с рентгенограмметрией.

СТЕРЕОРЕНТГЕНОГРАФИ́Я (*стерео-* + *рентгенография*) — метод рентгенографии, обеспечивающий получение объемного рентгеновского изображения (стереопары) исследуемого объекта.

СТЕРЕОРЕНТГЕНОСКОПИ́Я (*стерео-* + *рентгеноскопия*; син. рентгеностереоскопия) — метод рентгеноскопии, обеспечивающий получение объемного рентгеновского изображения исследуемого объекта.

СТЕРЕОСКАНИ́РОВАНИЕ (*стерео-* + *сканирование*; син.: сканирование многовекторное, сканирование полипозиционное) — метод радиоизотопного сканирования, обеспечивающий получение объемного изображения исследуемого объекта.

СТЕРЕОСКО́П (*стерео-* + греч. skopeō рассматривать) — бинокулярный оптический прибор для обеспечения объемного восприятия объекта при рассматривании стереопары.

СТЕРЕОТАКСИ́ЧЕСКИЕ КООРДИНА́ТЫ — условные линии, соединяющие внутримозговые стереотаксические ориентиры, по отношению к к-рым определяют расположение определенных подкорковых структур мозга.

СТЕРЕОТАКСИ́ЧЕСКИЕ ОРИЕНТИ́РЫ ВНУТРИМОЗГОВЫ́Е — анатомические образования головного мозга (передняя и задняя спайки, межжелудочковое отверстие, шишковидное углубление, водопровод мозга, шишковидное тело, межталамическое сращение), изображения к-рых на контрастных рентгенограммах желудочков мозга используют для построения системы стереотаксических координат.

СТЕРЕОТАКСИ́ЧЕСКИЕ ОРИЕНТИ́РЫ КО́СТНЫЕ — анатомические образования (напр., венечный шов) и антропометрические точки на черепе (напр., назион, инион), используемые для построения системы стереотаксических координат.

СТЕРЕОТАКСИ́ЧЕСКИЙ А́ТЛАС — собрание схематических и (или) фотографических изображений последовательных срезов головного мозга человека или животных, предназначенное для определения положения различных структур мозга в системе стереотаксических координат.

СТЕРЕОТАКСИ́ЧЕСКИЙ МЕ́ТОД — метод введения микроинструментов строго в заданные структуры мозга, основанный на использовании системы стереотаксических координат и стереотаксических приборов.

СТЕРЕОТИ́П ДИНАМИ́ЧЕСКИЙ (*стерео-* + греч. typos отпечаток, образец; син. стереотип условных рефлексов) — устойчивая последовательность условных рефлексов, вырабатываемая в результате многократного воздействия набора следующих в определенном порядке условных сигналов.

СТЕРЕОТИ́П ДИНАМИ́ЧЕСКИЙ РАБО́ЧИЙ — динамический стереотип, формирующийся у человека в процессе трудового обучения и профессиональной деятельности, подкрепляемый достижением полезных результатов труда и обеспечивающий высокий уровень профессиональной работоспособности.

СТЕРЕОТИ́П СУ́ТОЧНЫЙ — совокупность ежесуточно повторяющихся изменений уровня активности организма человека и состояния его физиологических функций, выработавшихся под влиянием циклической смены условий окружающей среды, чередования периодов труда и отдыха, бодрствования и сна.

СТЕРЕОТИ́П ТЕЧЕ́НИЯ БОЛЕ́ЗНИ в психиатрии — характерная для данной психической болезни последовательность смены психопатологических расстройств, отражающая течение лежащих в ее основе патогенетических процессов.

СТЕРЕОТИ́П УСЛО́ВНЫХ РЕФЛЕ́КСОВ — см. *Стереотип динамический.*

СТЕРЕОТИПИ́Я ДВИ́ГАТЕЛЬНАЯ (stereotypia motoria; *стерео-* + греч. typos отпечаток, образец; син.: аутоэхопраксия, движения стереотипные, итерация двигательная, стереотипия моторная) — непроизвольное повторение однообразных, бесцельных, лишенных выразительности движений; наблюдается при кататонии, сумеречном помрачении сознания, а также у лиц (чаще у детей), находящихся в условиях сенсорной депривации.

СТЕРЕОТИПИ́Я МОТО́РНАЯ — см. *Стереотипия двигательная.*

СТЕРЕОТИПИ́Я РЕЧЕВА́Я — непроизвольное повторение в спонтанной речи больного и в его ответах на вопросы малоизменяющихся или неизмененных коротких, часто аграмматически построенных фраз, словосочетаний или слов, лишенных коммуникационного значения; наблюдается при болезни Пика и других психических болезнях, обусловленных атрофией головного мозга.

СТЕРЕОФОТОКОЛЬПОСКО́П (*стерео-* + *фотокольпоскоп*) — фотокольпоскоп, снабженный устройством для получения стереопар.

СТЕРЕОФОТОКОЛЬПОСКОПИ́Я [*стерео-* + фото (графирование) + *кольпоскопия*] — кольпоскопия, при к-рой производят фотографирование влагалища и влагалищной части шейки матки с изготовлением стереопар, позволяющих получить объемное изображение.

СТЕРЕОХИ́МИЯ (*стерео-* +химия)— область химии, изучающая пространственное строение молекул (в т. ч. аминокислот, белков, нуклеиновых кислот) и его связь с физическими и химическими свойствами вещества.

СТЕРЕОЦИ́ЛИИ (stereocilia; *стерео-* + анат. cilium ресница, реснička) — см. *Слуховые волоски.*

СТЕРЕОЭЛЕКТРОКАРДИО́ГРАФ (*стерео-* + *электрокардиограф*) — см. *Спациоэлектрокардиограф.*

СТЕРЕОЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИ́Я (*стерео-* + *электроэнцефалография*) — метод исследования пространственных отношений электрических процессов в головном мозге, основанный на одновременной графической регистрации биопотенциалов в нескольких десятках точек мозга.

СТЕРЕОЭНЦЕФАЛОМЕТРИ́Я (*стерео-* + *энцефалометрия*) — определение формы и размеров структур мозга в трехмерной системе координат (во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях).

СТЕРЕОЭНЦЕФАЛОТОМИ́Я (stereoencephalotomia; *стерео-* + греч. enkephalos головной мозг + tomē разрез, рассечение) — см. *Операция стереотаксическая.*

СТЕ́РЖЕНЬ ВО́ЛОСА (scapus pili, LNH; син.волосяной стержень) — часть волоса, находящаяся над поверхностью кожи.

СТЕ́РЖЕНЬ УЛИ́ТКИ (modiolus, PNA) — костное образование конической формы, расположенное в центре улитки, окруженное витками спирального канала и пронизанное продольными каналами, содержащими волокна улитковой части преддверно-улиткового нерва.

СТЕРИ́ГМЫ (греч. stērigma подпора) — клетки или выросты на поверхности органов спороношения многих грибов; на С. развиваются споры.

СТЕРИЛИЗА́ТОР (лат. sterilis бесплодный) — 1) общее название аппаратов для стерилизации различных предметов, материалов и сред; 2) (нрк) — см. *Дезинфекционный кипятильник.*

С. ПАРОВО́Й (син. автоклав) — С., действующим фактором к-рого является нагретый водяной пар, находящийся под повышенным давлением.

СТЕРИЛИЗАЦИО́ННАЯ (лат. sterilis бесплодный) — часть операционного блока, в к-рой осуществляется стерилизация перевязочного и шовного материала, белья, хирургических инструментов, перчаток и др.

СТЕРИЛИЗАЦИО́ННАЯ КОРО́БКА (син. бикс) — цилиндрическая или квадратная стальная емкость, имеющая перекрывающиеся отверстия в стенках, предназначенная для стерилизации и последующего хранения перевязочных материалов, инструментов и операционного белья.

СТЕРИЛИЗАЦИО́ННАЯ ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ — подразделение лечебно-профилактического учреждения, осуществляющее стерилизацию перевязочного и шовного материала, белья, хирургических инструментов, перчаток и др., а также обеспечивающее снабжение стерильными материалами и предметами всех других подразделений данного учреждения.

СТЕРИЛИЗА́ЦИЯ[1] (лат. sterilis бесплодный; син. обеспложивание) — полное освобождение какого-либо вещества или предмета от микроорганизмов путем воздействия на них физическими или химическими факторами.

С. ДРО́БНАЯ — см. *Тиндализация.*

С. ЛУЧЕВА́Я — С., осуществляемая с помощью ионизирующих излучений.

С. ХОЛО́ДНАЯ (s. frigida) — С. без воздействия высокой температурой.

СТЕРИЛИЗА́ЦИЯ[2] — см. *Стерилизация половая.*

СТЕРИЛИЗА́ЦИЯ ПОЛОВА́Я (син. стерилизация) — лишение человека или животного способности к воспроизводству потомства.

С. ПОЛОВА́Я БИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (син. С. половая иммунобиологическая) — временная С. п. вследствие выработки организмом женщины антител к сперме после ее подкожного введения.

С. ПОЛОВА́Я ИММУНОБИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — см. *Стерилизация половая биологическая.*

С. ПОЛОВА́Я ЛУЧЕВА́Я — С. п., обусловленная воздействием ионизирующего излучения на половые железы.

С. ПОЛОВА́Я ХИРУРГИ́ЧЕСКАЯ — С. п., осуществляемая с помощью хирургической операции на половых органах.

СТЕРИ́ЛЬНОЕ ПЯТНО́ — см. *Колония фага негативная.*

СТЕРИ́ЛЬНЫЙ (лат. sterilis бесплодный) — 1) полностью освобожденный от микроорганизмов; 2) лишенный способности к воспроизводству потомства.

СТЕРИ́НЫ (син.: спирты стероидные, стеролы) — биологически активные полициклические спирты из группы стероидов; содержатся в клеточных мембранах всех организмов; к С. относится, напр., холестерин.

СТЕ́РКО- (лат. stercus кал) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к калу».

СТЕРКОБИЛИ́Н — основной пигмент кала, являющийся продуктом окисления стеркобилиногена на свету под действием кислорода воздуха.

СТЕРКОБИЛИНОГЕ́Н — бесцветный продукт химического превращения билирубина в толстой кишке; окисляется кислородом с образованием пигмента стеркобилина.

СТЕРКОРА́РИИ (Stercoraria) — группа трипаносом млекопитающих; переносятся насекомыми, из к-рых выделяются с фекалиями и активно внедряются в кожу человека или животного; представитель группы Trypanosoma cruzi является возбудителем американского трипаносомоза у человека.

СТЕРКОТО́РАКС (stercothorax; *стерко-* + греч. thōrax грудь, грудная клетка) — острый плеврит, вызванный попаданием в плевральную полость кала, напр. при комбинированном ранении грудной клетки и живота, перфорации диафрагмальной грыжи.

СТЕ́РЛИНГА — РУСЕ́ЦКОГО РЕФЛЕ́КС (W. Sterling, невропатолог 20 в.; Russetzky) — патологический рефлекс: отведение I пальца кисти и быстрое сгибание остальных в ответ на короткий удар по ладонной поверхности концевых фаланг II—V пальцев пронированной кисти; признак поражения пирамидных путей.

СТЕРНИ́Т (греч. sternon грудь) в биологии — хитиновая пластинка, покрывающая вентральную сторону сегментов тела членистоногих.

СТЕРНО- (греч. sternon грудь, грудная клетка, грудина) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к грудине».

СТЕРНОМЕДИАСТИНОЛАПАРОТОМИ́Я (sternomediastinolaparotomia; *стерно-* + анат. mediastinum средостение + *лапаротомия*) — верхняя срединная лапаротомия, дополненная рассечением грудины на протяжении 6—7 *см* и тупым разделением волокон диафрагмы; применяется при резекции левой доли печени.

СТЕРНОПА́ГИ (sternopagi; *стерно-* + греч. pagos прикрепленный) — близнецы, сращенные в области грудины.

СТЕРНОТО́М (*стерно-* + греч. tomē разрез, рассечение; син. пож-долото) — режущий инструмент для рассечения грудины в поперечном направлении.

СТЕРНОТОМИ́Я (sternotomia; *стерно-* + греч. tomē разрез, рассечение) — 1) хирургическая операция: рассечение грудины, напр. в качестве доступа к органам средостения; 2) акушерская плодоразрушающая операция, заключающаяся в рассечении рукоятки грудины плода в области грудиноключичных сочленений после рождения головки.

СТЕРО́ИДЫ (син.: изопентеноиды, изопреноиды, полиизопреноиды) — группа биологически активных веществ, основой структуры к-рых является циклопентан-пергидрофенантреновое кольцо; к С. относятся, напр., гормоны коркового вещества надпочечников, половые гормоны, желчные кислоты, сердечные гликозиды.

СТЕРО́ИДЫ АНАБОЛИ́ЧЕСКИЕ — см. *Анаболические средства стероидные.*

СТЕРО́ЛЫ — см. *Стерины.*

СТЕТО- (греч. stēthos грудь) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к груди, к грудной клетке».

СТЕТО́МЕТР (*стето-* + греч. metreō измерять) —прибор для измерения окружности грудной клетки и ее изменений при дыхании.

СТЕТОСКО́П (*стето-* + греч. skopeō наблюдать, исследовать) — звукопроводящее приспособление для аускультации без усиления звука.

С. АКУШЕ́РСКИЙ — С. с широким раструбом, предназначенный для выслушивания сердечных тонов плода.

С. БИНАУРА́ЛЬНЫЙ — С. для аускультации обоими ушами; его звуковоспринимающая воронка снабжена двумя резиновыми трубками, оканчивающимися оливами, вставляемыми в наружные слуховые проходы.

СТЕТОСКО́П ЭЛЕКТРО́ННЫЙ — прибор для аускультации с усилением звука, состоящий из микрофона, усилителя низкой частоты и динамика или телефона.

СТЕТОФО́Н (*стето-* + греч. phōnē звук) — прибор для аускультации сердца с усилением звука, снабженный выносным динамиком, а также осциллоскопом, обеспечивающим возможность наблюдения фонокардиограммы.

СТЕТОФОНЕНДОСКО́П [*стето-* (*скоп*) + *фонендоскоп*] — прибор для бинауральной аускультации, состоящий из совмещенных в одном узле или сменных звуковоспринимающих частей стетоскопа и фонендоскопа, гибких звукопроводов, заканчивающихся жесткими трубками с оливами, и пружинного устройства, способствующего фиксации олив в ушах врача.

СТЕФА́НСКОГО БОЛЕ́ЗНЬ (В. К. Стефанский, 1867—1949, сов. инфекционист и эпидемиолог) — см. *Лепра крыс.*

СТЕФА́НСКОГО СИМПТО́М (В. К. Стефанский)— студневидное дрожание тканей, вызываемое ударом перкуссионного молоточка в месте отека; наблюдается при кожной форме сибирской язвы.

СТИ́ВЕНСА — ДЖО́НСОНА СИНДРО́М (A. M. Stevens, 1884—1945, амер. педиатр; F. C. Johnson, 1894—1934, амер. педиатр; син.: Бадера дерматостоматит, Бадера синдром, эритема экссудативная злокачественная) — дерматоз, характеризующийся полиморфными высыпаниями в виде эритематозных пятен и пузырей, часто с геморрагическим содержимым, локализующихся на коже, слизистых оболочках полости рта, мочеиспускательного канала и на конъюнктиве; сопровождается явлениями интоксикации.

СТИ́ГМЫ (греч. stigma точка; син. дыхальца) — наружные отверстия дыхательной системы некоторых членистоногих.

СТИ́ГМЫ ДЕГЕНЕРАТИ́ВНЫЕ ПСИХИ́ЧЕСКИЕ (устар.; stigmata degenerativa psychica; син. психические признаки вырождения — устар.) — врожденные отклонения от нормальной психической деятельности в виде недораз-

вития или извращения умственных, аффективных, волевых процессов либо их дисгармонического сочетания, являющиеся постоянными компонентами психического склада личности на протяжении всей жизни; рассматриваются как признаки психопатии.

СТИ́ГМЫ ДЕГЕНЕРАТИ́ВНЫЕ ФИЗИ́ЧЕСКИЕ (устар.; stigmata degenerativa physica; син. физические признаки вырождения) — врожденные отклонения от нормального анатомического строения (преимущественно наружных частей тела) или от нормального течения физиологических функций; наблюдаются при нек-рых психопатиях.

СТИ́ГМЫ ИСТЕРИ́ЧЕСКИЕ (устар.; stigmata hysterica) — разнообразные по своим проявлениям, нестойкие изменчивые расстройства функций нервной системы и внутренних органов, характерные для истерии.

СТИ́ГМЫ ПРОФЕССИОНА́ЛЬНЫЕ (stigmata professionalia; син.: профессиональные признаки, профессиональные приметы) — местные изменения кожи (напр., окрашивание, отложение пыли, омозолелость), возникающие в результате систематического воздействия на нее каких-либо профессиональных факторов и не влекущие за собой потери трудоспособности.

СТИ́ЛЛА — РИ́ЧАРДСОНА — ОЛЬШЕ́ВСКОГО СИНДРО́М (J. C. Steele, совр. канадский невропатолог; J. C. Richardson, совр. амер. невропатолог; J. Olszewski, совр. амер. невропатолог) — см. *Синдром прогрессирующего супрануклеарного паралича.*

STYLION (греч. stylos остроконечная палочка) — см. *Шиловидная точка.*

СТИ́ЛЛА БОЛЕ́ЗНЬ (G. F. Still, 1868—1941, англ. педиатр; син. Стилла — Шоффара болезнь) — форма ревматоидного артрита у детей, проявляющаяся триадой Стилла.

СТИ́ЛЛА СИМПТО́М (G. Steell, 1851—1942, англ. врач) — ограниченная пульсация передней стенки грудной клетки вне зоны сердечного толчка; признак прилегающей к грудной стенке опухоли или аневризмы аорты.

СТИ́ЛЛА ТРИА́ДА (G. F. Still, 1868—1941, англ. педиатр) — сочетание увеличения лимфатических узлов, спленомегалии и припухлости симметрично расположенных суставов; наблюдается при болезни Стилла.

СТИ́ЛЛА ШУМ (G. Steell, 1851—1942, англ. врач) — см. *Грэма Стилла шум.*

СТИ́ЛЛА — ШОФФА́РА БОЛЕ́ЗНЬ (G. F. Still, 1868—1941, англ. педиатр; A. M. E. Chauffard, 1855—1932, франц. терапевт) — см. *Стилла болезнь.*

СТИЛОИ́ДИТ (styloiditis; анат. processus styloideus шиловидный отросток + *-ит*) — общее название дистрофических и воспалительных процессов в сухожилиях в месте их прикрепления к шиловидному отростку лучевой (лучевой С.) или локтевой (локтевой С.) кости.

СТИ́МУЛ (лат. stimulo возбуждать, побуждать) в физиологии — раздражитель, вызывающий изменение (обычно усиление) деятельности организма, его отдельной системы, органа или ткани.

СТИМУЛЯ́ТОР ИМПУЛЬСНЫЙ (лат. stimulo, stimulatum возбуждать, побуждать) — см. *Электроимпульсатор.*

СТИМУЛЯ́ТОРЫ БИОГЕ́ННЫЕ (греч. bios жизнь + -genes порождающий, вызывающий) — биологически активные вещества различной химической природы, образующиеся в растительных и животных тканях и оказывающие стимулирующее влияние на обмен веществ, регенерацию и другие процессы в организме.

СТИМУЛЯ́ЦИЯ — раздражение, приводящее к изменению (обычно к усилению) деятельности всего организма, его отдельной системы, органа или ткани.

СТИМУЛЯ́ЦИЯ АНТИГЕ́ННАЯ — стимуляция процессов пролиферации и дифференцировки клеток лимфоидной системы при попадании в организм какого-либо антигена.

СТИМУЛЯ́ЦИЯ РО́ДОВ — искусственное усиление родовой деятельности с помощью фармакологических, гормональных, механических средств или электрического тока.

СТИМУЛЯ́ЦИЯ СЕ́РДЦА электрическая (син.: кардиостимуляция, навязывание ритма сердца, электростимуляция сердца) — ритмичное возбуждение миокарда, искусственно вызываемое воздействием импульсов, вырабатываемых электрокардиостимуляторами; применяется при резкой брадикардии, как правило, обусловленной полной атриовентрикулярной блокадой, а также при некоторых формах тахикардии.

С. СЕ́РДЦА АСИНХРО́ННАЯ — С. с., при к-рой моменты начала и прекращения воздействия и частота импульсов определяются лицом, проводящим стимуляцию.

С. СЕ́РДЦА АТРИОВЕНТРИКУЛЯ́РНАЯ (син. аутостимуляция сердца) — синхронная С. с., характеризующаяся тем, что каждый импульс автоматически вырабатывается через заданный период времени после появления зубца *P* на эндокардиальной электрокардиограмме, регистрируемой в правом предсердии; применяется только при полной атриовентрикулярной блокаде.

С. СЕ́РДЦА ВНУ́ТРЕННЯЯ (син. С. сердца интракорпоральная)—С. с., при которой электрокардиостимулятор имплантирован в ткани больного.

С. СЕ́РДЦА ЖДУ́ЩАЯ — см. *Стимуляция сердца «по требованию».*

С. СЕ́РДЦА ИНТРАКОРПОРА́ЛЬНАЯ — см. *Стимуляция сердца внутренняя.*

С. СЕ́РДЦА МИОКАРДИА́ЛЬНАЯ — С. с., осуществляемая с помощью электродов, имплантированных в миокард или временно введенных в него.

С. СЕ́РДЦА НАРУ́ЖНАЯ (син. С. сердца экстракорпоральная) — С. с., при которой электрокардиостимулятор находится вне организма больного.

С. СЕ́РДЦА ОСЕ́ДЛЫВАЮЩАЯ — см. *Стимуляция сердца связанными импульсами.*

С. СЕ́РДЦА ОХВА́ТЫВАЮЩАЯ — см. *Стимуляция сердца связанными импульсами.*

С. СЕ́РДЦА ПА́РНЫМИ И́МПУЛЬСАМИ — асинхронная С. с. спаренными импульсами, интервал между к-рыми таков, что первый импульс вызывает сокращение сердца, а второй — только его электрическое возбуждение; применяется при тахикардии.

С. СЕ́РДЦА СВЯ́ЗАННЫМИ И́МПУЛЬСАМИ (син.: С. сердца оседлывающая, С. сердца охватывающая) — синхронная С. с. парными импульсами, при к-рой первый импульс исходит из водителя ритма сердца больного, а второй подается от электрокардиостимулятора.

С. СЕ́РДЦА СИНХРО́ННАЯ — С. с., при к-рой подача импульса синхронизируется с определенной фазой сердечного цикла, с зубцом электрокардиограммы.

С. СЕ́РДЦА СКОЛЬЗЯ́ЩАЯ — асинхронная С. с., частота импульсов к-рой несколько отличается от собственной частоты сокращений предсердий или желудочков; применяется для купирования тахикардии и для подбора параметров единичного импульса; прекращающего тахикардию.

С. СЕ́РДЦА «ПО ТРЕ́БОВАНИЮ» (син.: деманд-стимуляция, С. сердца ждущая) — синхронная С. с., при к-рой автоматически определяются моменты ее начала и окончания соответственно возникновению и прекращению аритмии; применяется при преходящих формах полной атриовентрикулярной блокады и при угрозе ее развития в остром периоде инфаркта миокарда.

С. СЕ́РДЦА УРЕЖА́ЮЩАЯ — С. с., приводящая к уменьшению частоты сокращений желудочков сердца.

С. СЕ́РДЦА УЧАЩА́ЮЩАЯ — С. с., приводящая к увеличению частоты сокращений желудочков сердца.

С. СЕ́РДЦА ЭКСТРАКОРПОРА́ЛЬНАЯ — см. *Стимуляция сердца наружная.*

С. СЕ́РДЦА ЭНДОКАРДИА́ЛЬНАЯ — наружная С. с., осуществляемая с помощью электрода, вводимого по венам в полости правых отделов сердца до плотного контакта с эндокардом.

СТОК СИ́НУСОВ (confluens sinuum, PNA, BNA, JNA; torcular Herophili) — полость, образованная слиянием верхнего сагиттального, прямого и поперечного синусов твердой мозговой оболочки и расположенная у внутреннего затылочного выступа.

СТО́ККИСА МЕ́ТОД (истор.; E. Stockis; син. Корена — Стоккиса метод) — метод идентификации пятен спермы по обнаружению в них сперматозоидов, избирательно окрашивающихся в красный цвет 5% раствором эритрозина (йодированное производное флюоресцеина) в аммиаке; применялся в судебной медицине.

СТО́КСА ВОРОТНИ́К (W. Stokes, 1804—1878, ирланд. врач; син. Стокса симптом) — отек шеи, а иногда и лица, рук, верхней части груди и области лопаток, сопровождающийся набуханием кожных вен; признак сдавления верхней полой вены.

СТО́КСА СИМПТО́М (W. Stokes) — см. *Стокса воротник.*

СТО́КСА СИНДРО́М (W. Stokes) — см. *Морганьи — Адамса — Стокса синдром.*

СТОЛ ЛЕЧЕ́БНОГО ПИТА́НИЯ — общее название разработанных в СССР стандартных диет, обозначаемых номерами от 1 до 15; энергетическая ценность, химический состав и физические свойства каждого С. л. п. подобраны так, чтобы обеспечивать лечебное воздействие при определенной группе болезней.

СТОЛ-КРЕ́СЛО — устройство для размещения больного при полипозиционном рентгенологическом обследовании.

СТОЛБНЯ́К (tetanus) — острая инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Clostridium tetani при ее парентеральном проникновении в организм, обычно при попадании на поврежденную кожу и слизистые оболочки спор возбудителя с почвой, загрязненной фекалиями теплокровных животных; характеризуется поражением нервной системы, пароксизмами тонических и клонических судорог.

С. АКРОБАТИ́ЧЕСКИЙ (t. acrobaticus) — С., при к-ром тело больного в результате тонического сокращения мышц принимает причудливое положение.

С. ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННЫЙ (t. generalisatus) — см. *Столбняк общий.*

С. ГОЛОВНО́Й БРУННЕРА — см. *Бруннера головной столбняк.*

С. ГОЛОВНО́Й РО́ЗЕ — см. *Розе головной столбняк.*

С. ИДИОПАТИ́ЧЕСКИЙ (t. idiopathicus) — см. *Столбняк криптогенный.*

С. КРИПТОГЕ́ННЫЙ (t. cryptogenus; греч. kryptos тайный, скрытый + -genēs порожденный; син.: С. идиопатический, С. эндогенный) — С., при к-ром в анамнезе отсутствуют указания на повреждения кожи или слизистых оболочек; заражение связано с микротравмами, оставшимися незамеченными или забытыми больным.

С. ЛИЦЕВО́Й (t. facialis) — см. *Розе головной столбняк.*

С. МЕ́СТНЫЙ (t. localis) — С., при к-ром наблюдаются тонические сокращения лишь ограниченной группы мышц вблизи места внедрения возбудителя болезни; характеризуется относительно благоприятным течением.

С. МОЛНИЕНО́СНЫЙ (t. fulminans) — клиническая форма С., отличающаяся острейшим развитием гипертермии, судорог, нарушений дыхания и сердечной деятельности.

С. О́БЩИЙ (t. generalisatus; син. С. генерализованный) — С., характеризующийся последовательным развитием тонических сокращений жевательной, мимической, шейной мускулатуры, мышц туловища и конечностей, а затем пароксизмов клонических судорог.

С. РЕЦИДИВИ́РУЮЩИЙ (t. recidivus) — С., при к-ром возникают рецидивы болезни, провоцируемые обычно повторной травмой и обусловленные длительным сохранением спор возбудителя в тканях.

С. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (t. chronicus) — клиническая форма С., отличающаяся длительным инкубационным периодом (2—4 месяца), медленным нарастанием и слабой выраженностью основных симптомов болезни.

С. ЭНДОГЕ́ННЫЙ (t. endogenus) — см. *Столбняк криптогенный.*

СТО́ЛЛА МЕ́ТОД (N. R. Stoll, род. в 1892 г., амер. паразитолог) — метод количественного определения интенсивности инвазии гельминтами путем подсчета яиц гельминтов при микроскопии взвеси пробы кала с последующим пересчетом на единицу его веса или объема.

СТО́МА (устар.; stoma; греч. «рот, отверстие») — созданный оперативным путем наружный свищ полого органа.

СТОМАЛЬГИ́Н (греч. stoma рот, отверстие + алгинат натрия) — материал для снятия оттисков с челюстей при протезировании частичными съемными и мостовидными протезами; изготовляется из тонкоразмельченного альгината натрия с различными добавками.

СТОМАТ- (стомато-, стомо-, греч. stoma, stomatos рот, отверстие) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся ко рту, к полости рта».

СТОМАТИ́Т (stomatitis; *стомат- + -ит*) — воспаление слизистой оболочки полости рта.

С. АНГУЛЯ́РНЫЙ (s. angularis) — см. *Заеда.*

С. АФТО́ЗНЫЙ (s. aphthosa; син. афтоид) — С., характеризующийся появлением эрозий или поверхностных изъязвлений на слизистой оболочке, покрытых серовато-белым налетом (афты).

С. БЛАСТОМИКОТИ́ЧЕСКИЙ (s. blastomycotica) — см. *Стоматит микотический.*

С. ВИСМУТО́ВЫЙ (s. vismuthica) — С., возникающий при длительном лечении препаратами висмута; характеризуется появлением сине-черной каймы на деснах и пигментацией других участков слизистой оболочки.

С. ГАНГРЕНО́ЗНЫЙ (s. gangraenosa; син.: С. язвенно-гангренозный, С. язвенный) — С., характеризующийся появлением участков некроза тканей, быстрым течением, явлениями интоксикации и неприятным запахом изо рта.

С. КАНДИДО́ЗНЫЙ (s. candidosa; син.: молочница, soor) — микотический С., вызванный дрожжеподобными грибками рода Candida; характеризуется появлением точечных белых налетов, сливающихся в пленки.

С. КАТАРА́ЛЬНЫЙ (s. catarrhalis) — С., характеризующийся преобладанием экссудативных явлений, гиперемией и отечностью, иногда наличием беловатого налета.

С. КУРИ́ЛЬЩИКОВ (s. fumantium; син. С. никотиновый) — хронический катаральный С., возникающий у курильщиков в результате систематического воздействия никотина на слизистую оболочку.

С. ЛЕЙКЕМИ́ЧЕСКИЙ (s. leukaemica) — С. при остром лейкозе, характеризующийся кровоточивостью десен и кровоизлияниями в слизистую оболочку, позже появлением участков некроза и язв.

С. ЛУЧЕВО́Й (s. radialis) — С., обусловленный воздействием ионизирующего излучения; проявляется гиперемией, отечностью, эрозиями и язвами.

С. МЕДИКАМЕНТО́ЗНЫЙ (s. medicamentosa) — афтозный или гангренозный С., обусловленный употреблением нек-рых лекарственных средств (напр., антибиотиков, сульфаниламидов), обычно при повышенной индивидуальной чувствительности к ним.

С. МИКОТИ́ЧЕСКИЙ (s. mycotica; син. С. бластомикотический) — С., вызванный паразитическими грибками.

С. НИКОТИ́НОВЫЙ (s. nicotinica) — см. *Стоматит курильщиков.*

С. ПЕЛЛАГРО́ЗНЫЙ (s. pellagrosa) — С., возникающий при недостаточности никотиновой кислоты (витамина РР); характеризуется резкой гиперемией и сухостью слизистой оболочки, атрофией сосочков языка и его отечностью.

С. ПРОФЕССИОНА́ЛЬНЫЙ (s. professionalis) — С., вызванный воздействием профессиональных вредностей (химических веществ, ионизирующего излучения, пыли и др.).

С. РТУ́ТНЫЙ (s. mercurialis) — С., развивающийся вследствие поступления в организм ртути или ее ядовитых соединений; проявляется сероватой пигментацией и последующим некрозом тканей десневого края с распространением процесса на прилежащие отделы слизистой оболочки щек и языка.

С. РУБЦУ́ЮЩИЙСЯ (s. cicatricans; син. Саттона афты) — С., характеризующийся появлением в подслизистом слое узелка, распадающегося с возникновением язвы, к-рая заживает через 1—3 месяца с развитием рубца.

С. СВИНЦО́ВЫЙ (s. plumbea) — С., развивающийся вследствие поступления в организм солей свинца; характеризуется отечностью, гиперемией тканей и появлением темно-серых участков пигментации слизистой оболочки десневого края.

С. СКОРБУТИ́ЧЕСКИЙ (s. scorbutica; син. С. цинготный) — С., возникающий при недостаточности аскорбиновой кислоты (витамина С); характеризуется кровоточивостью слизистой оболочки, а в тяжелых случаях — появлением участков некроза в области миндалин и десневого края.

С. ЦИНГО́ТНЫЙ — см. *Стоматит скорбутический.*

С. ЭРИТЕМАТО́ЗНЫЙ (s. erythematosa) — С. при инфекционных болезнях, характеризующийся резкой гиперемией слизистой оболочки.

С. ЯЗВЕННО-ГАНГРЕНО́ЗНЫЙ (s. ulcerogangraenosa) — см. *Стоматит гангренозный.*

С. ЯЗВЕННО-ПЛЁНЧАТЫЙ (s. ulceromembranacea) — С., развивающийся в нек-рых случаях ангины Симановского — Плаута — Венсана; характеризуется наличием язв, покрытых пленками, некрозом участков десневого края, кровоточивостью десен и неприятным запахом изо рта.

С. ЯЗВЕННЫЙ (s. ulcerosa) — см. *Стоматит гангренозный.*

СТОМАТИ́Т ВЕЗИКУЛЯ́РНЫЙ (stomatitis vesicularis; син. лихорадка Индианы) — острая инфекционная болезнь, вызываемая одноименным вирусом рода рабдовирусов, передающаяся человеку от сельскохозяйственных животных контактным путем или через москитов; у человека проявляется повышением температуры тела, головной болью, появлением мелких болезненных везикул, а затем эрозий на слизистой оболочке полости рта; встречается гл. обр. в Северной и Центральной Америке.

СТОМАТИ́Т ГЕРПЕТИ́ЧЕСКИЙ (stomatitis herpetica) — клиническая форма простого герпеса, характеризующаяся высыпанием на слизистой оболочке полости рта везикул, к-рые лопаются с образованием эрозий.

СТОМАТО- — см. *Стомат-.*

СТОМАТО́ЛОГ (*стомато-* + греч. logos учение, наука) — врач-специалист, получивший подготовку по диаг-

ностике, лечению и профилактике болезней и повреждений зубов, челюстей и других органов полости рта и челюстно-лицевой области.

СТОМАТО́ЛОГ-ОРТОПЕ́Д — врач-специалист стоматолог, получивший подготовку в области диагностики нарушений целостности и функций зубов и челюстей, их лечения путем протезирования и применения замещающих или регулирующих аппаратов.

СТОМАТО́ЛОГ-ХИРУ́РГ — врач-специалист стоматолог, получивший подготовку в области диагностики и лечения болезней и повреждений органов полости рта и челюстно-лицевой области с использованием хирургических, в т. ч. оперативных методов.

СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ЛО́ЖКА — 1) костная ложка с полой ручкой, применяемая при стоматологических операциях; 2) инструмент для разогревания легких сплавов, применяемых в зубоврачебной практике.

СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПИЛА́ — миниатюрная дисковая пила, приводимая в движение бормашиной; применяется при хирургических операциях на челюстях.

СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПО́МОЩЬ (син. зубоврачебная помощь) — вид специализированной медицинской помощи, включающий комплекс мер по профилактике и лечению заболеваний полости рта, зубов, а также челюстно-лицевой области.

СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ЩЁТКА — рабочий орган зуботехнического инструмента, применяемый для пришлифовки (подгонки) искусственных зубов и полировки протезов; представляет собой круг с укрепленной по периферии щетиной.

СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКОЕ КРЕ́СЛО (син. зубоврачебное кресло) — кресло, снабженное приспособлениями для придания больному положения, удобного для обследования полости рта и проведения в ней лечебных манипуляций.

СТОМАТОЛО́ГИЯ (stomatologia; *стомато-* + греч. logos учение, наука) — область клинической медицины, изучающая этиологию и патогенез болезней и повреждений зубов, челюстей и других органов полости рта и челюстно-лицевой области, разрабатывающая методы их диагностики, лечения и профилактики.

С. ОРТОПЕДИ́ЧЕСКАЯ — раздел С., посвященный изучению и диагностике нарушений целости и функций зубов и челюстей, разработке методов их профилактики и лечения путем протезирования, применения замещающих и регулирующих аппаратов.

С. ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКАЯ — раздел С., посвященный изучению и диагностике болезней зубов, околозубных тканей и слизистой оболочки полости рта, разработке методов их лечения и профилактики, направленных на сохранение морфологической и функциональной целостности.

С. ХИРУРГИ́ЧЕСКАЯ — раздел С., посвященный изучению и диагностике болезней и повреждений органов полости рта и челюстно-лицевой области, разработке хирургических, в т. ч. оперативных, методов их лечения.

СТОМАТОНЕВРОЛО́ГИЯ (stomatoneurologia; *стомато-* + *неврология*) — раздел невропатологии и стоматологии, посвященный болезням нервной системы, связанным с патологическими процессами зубов, челюстей и полости рта.

СТОМАТОСКОПИ́Я (*стомато-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — осмотр слизистой оболочки рта при 20—40-кратном увеличении с помощью специальных оптических приборов.

СТОМО- — см. *Стомат-*.

СТОМОДЕ́УМ (stomodeum; *стомо-* + греч. hodaios находящийся в пути) — см. *Ротовая ямка*.

STOMÓXYS CÁLCITRANS (жигалка осенняя) — кровососущая муха сем. Muscidae, отр. Diptera; механический переносчик возбудителей сибирской язвы, туляремии и стафилококковых инфекций.

СТОПА́ (pes, PNA, BNA, JNA) — дистальный отдел нижней конечности, являющийся органом опоры и выполняющий рессорную функцию при стоянии, ходьбе, беге и прыжках.

СТОПА́ БОЛТА́ЮЩАЯСЯ (relaxatio pedis) — периферический паралич всех мышц, принимающих участие в движении стопы, проявляющийся ее свисанием.

СТОПА́ ВА́ЛЬГУСНАЯ (pes valgus) — сочетание отведения и пронации стопы, при к-ром опорой служит ее медиальный край; встречается, напр., при выраженном плоскостопии, при неправильно сросшемся переломе лодыжек.

СТОПА́ ВА́РУСНАЯ (pes varus) — сочетание приведения и супинации стопы, при к-ром опорой служит ее латеральный край; встречается, напр., как последствие травмы или при параличе малоберцовой мышцы.

СТОПА́ КОГТЕОБРА́ЗНАЯ (pes unguiformis) — деформация стопы в виде ее резкого разгибания, причем пальцы разогнуты в плюснефаланговых и согнуты в межфаланговых суставах; признак повреждения большеберцового нерва на бедре.

СТОПА́ КО́НСКАЯ (pes equinus) — контрактура голеностопного сустава, при к-рой стопа фиксирована в положении подошвенного сгибания.

С. КО́НСКАЯ АРТРОГЕ́ННАЯ (p. equinus arthrogenus) — С. к., развившаяся в результате поражения голеностопного сустава.

С. КО́НСКАЯ ВЕСТИМЕНТА́РНАЯ (p. equinus vestimentarius; лат. vestimentum одежда) — см. *Стопа конская привычная*.

С. КО́НСКАЯ МИОГЕ́ННАЯ (p. equinus myogenus) — С. к., развившаяся в результате поражения, вызвавшего укорочение икроножной мышцы.

С. КО́НСКАЯ ПАРАЛИТИ́ЧЕСКАЯ (p. equinus paralyticus) — С. к., развившаяся при парезе или параличе разгибателей стопы, напр. при полиомиелите.

С. КО́НСКАЯ ПРИВЫ́ЧНАЯ (p. equinus habitualis; син. С. конская вестиментарная) — С. к. развивающаяся, как правило, у ослабленных больных, в результате длительного (недели и месяцы) подошвенного сгибания стоп, вызванного внешним воздействием, напр. при неправильно наложенной гипсовой повязке или вытяжении.

С. КО́НСКАЯ РУБЦО́ВАЯ (p. equinus cicatricalis) — С. к., развившаяся в результате замещения рубцом обширных дефектов кожи, мышц и сухожилий в области голени.

С. КО́НСКАЯ СПАСТИ́ЧЕСКАЯ (p. equinus spasticus) — С. к., возникшая в результате спастического сокращения икроножной мышцы, напр. при неврите.

СТОПА́ МАДУ́РСКАЯ (син.: мадуромикоз, мицетома) — хронический глубокий микоз, вызываемый различными видами паразитических грибков, характеризующийся преимущественным поражением стоп с развитием в них множественных абсцессов и свищей с гнойным или гнойно-кровянистым отделяемым; встречается в странах с жарким и влажным климатом.

СТОПА́ МА́РШЕВАЯ (син.: болезнь маршевая, Дейчлендера болезнь, метатарзальная недостаточность, перелом маршевый — нрк, перелом новобранцев — нрк, стопа перегруженная) — болезнь, обусловленная функциональной перегрузкой стопы и характеризующаяся патологической перестройкой II—III, реже IV—V плюсневых костей; проявляется сильными болями в переднем отделе стопы.

СТОПА́ ПЕРЕГРУ́ЖЕННАЯ — см. *Стопа маршевая*.

СТОПА́ ПЛО́СКАЯ (pes planus) — см. *Плоскостопие*.

СТОПА́ ПО́ЛАЯ (pes excavatus) — деформация стопы, характеризующаяся чрезмерно высоким продольным сводом стопы; развивается, напр., при полиомиелите.

СТОПА́ ПРИВЕДЁННАЯ (pes adductus) — деформация стопы, при к-рой ее передний отдел приведен; наблюдается при параличе малоберцовой группы мышц.

СТОПА́ ПЯ́ТОЧНАЯ (pes calcaneus) — контрактура голеностопного сустава с фиксацией стопы в положении разгибания, при к-рой опора приходится на пяточный бугор.

СТОПА́ ТРАНШЕ́ЙНАЯ (син. конечность влажная) — отморожение стоп в результате их длительного умеренного охлаждения; возникает при температуре воздуха около 0° и высокой влажности, гл. обр. в военной обстановке.

СТОПА́ ФРИ́ДРЕЙХА — см. *Фридрейха стопа*.

СТОПОМЕ́Р — антропометрический прибор для измерения стопы.

СТО́ЧНЫЕ ВО́ДЫ — воды, загрязненные бытовыми и производственными отходами или образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков в пределах территории населенных мест.

СТОЯ́ЧИЙ ОБОРО́Т — короткая, часто аграмматически построенная фраза, словосочетание или отдельное слово, непроизвольно повторяемые больным без изменений (или почти без изменений) при спонтанной речи или при ответах на вопросы в случае речевой стереотипии.

СТРАБИ́ЗМ (strabismus; греч. strabismos косоглазие) — см. *Косоглазие*.

СТРАБО́МЕТР (*страбизм* + греч. metreō измерять, определять) — устройство для определения положения зрительных осей при косоглазии.

СТРАБОМЕТРИ́Я (*страбизм* + греч. metreō измерять, определять) — общее название методов измерения угла косоглазия.

СТРАЖЕ́СКО ПРИ́ЗНАК (Н. Д. Стражеско, 1876—1952, сов. терапевт) — болезненность при надавливании на VIII—XI, а также справа от X—XI грудных позвонков; наблюдается при опухоли головки поджелудочной железы.
СТРАЖЕ́СКО «ПУ́ШЕЧНЫЙ ТОН» (Н. Д. Стражеско) — резко усиленный первый тон сердца при полной атриовентрикулярной диссоциации, возникающий в случае совпадения во времени систолы предсердий и желудочков сердца.
СТРАЖЕ́СКО ФЕНО́МЕН (Н. Д. Стражеско) — перкуторный феномен, заключающийся в том, что зона тимпанита желудка расположена горизонтальнее, чем в норме, значительно расширена вправо и несколько вверх (под правую реберную дугу), причем нижняя граница печеночной тупости оказывается вогнутой; признак резко выраженного перигастрита.
СТРАМПЕ́ЛЛИ ИМПЛАНТА́Т (B. Strampelly) — кератопротез, опорной частью к-рого является пластинка надкостницы, взятая из альвеолярного отростка реципиента и тщательно отшлифованная.
СТРАМПЕ́ЛЛИ ШПА́ТЕЛЬ (B. Strampelly) — плоский прямой шпатель-нож, заканчивающийся круглым острым режущим краем; предназначен для послойной кератопластики.
СТРАНГУЛЯЦИО́ННАЯ БОРОЗДА́ — полоса вдавления кожи, образующаяся в результате сдавления соответствующей части тела, напр. петлей или предметом, не имеющим острых граней.
СТРАНГУЛЯ́ЦИЯ (лат. strangulatio удушение; греч. strangulē петля, виселица) — механическая асфиксия, вызванная сдавлением шеи, напр. петлей, руками.
СТРАНГУЛЯ́ЦИЯ ПОЛОВО́ГО ЧЛЕ́НА — сдавление или ущемление полового члена, ведущее к его некрозу.
СТРАНГУРИ́Я (stranguria; греч. от stranx, strangos нечто выдавливаемое, капля + uron моча) — болезненное затруднение мочеиспускания вследствие спазма мышечного слоя стенки мочевого пузыря в области его шейки.
СТРА́НСКОГО ИНТРАПСИХИ́ЧЕСКАЯ АТАКСИ́Я (E. Stransky, род. в 1877 г., австрийский психиатр) — см. *Атаксия интрапсихическая.*
СТРА́НСКОГО НООПСИХЕ́ (греч. nus, noos ум, разумность + psychē душа, сознание; E. Stransky, род. в 1877 г., австрийский психиатр) — интеллектуальная, рассудочная сторона психической деятельности; отсутствие согласованности между ноопсихе и эмоционально-волевой сферой рассматривалось автором как основное расстройство при шизофрении.
СТРА́НСКОГО ПРЕРЫ́ВИСТЫЙ РАСПА́Д МИЕЛИ́НА — см. *Дегенерация нервных волокон периаксональная.*
СТРА́НСКОГО РЕФЛЕ́КС (E. Stransky, род. в 1891 г., амер. педиатр) — разгибание большого пальца стопы при пассивном отведении мизинца; физиологический рефлекс у детей в возрасте до 2 лет; в более позднем возрасте является патологическим рефлексом, наблюдаемым при поражении пирамидных путей.
СТРА́НСКОГО ТИМОПСИХЕ́ (греч. thymos настроение, чувство + psychē душа, сознание; E. Stransky, род. в 1877 г., австрийский психиатр) — эмоционально-волевая сфера в психической деятельности человека; отсутствие согласованности тимопсихе с умственной, рассудочной деятельностью рассматривалось автором как основное расстройство при шизофрении.
СТРА́НСКОГО — РЕ́ГАЛЫ БОЛЕ́ЗНЬ (истор.; E. Stransky, род. в 1891 г., амер. педиатр; A. C. Regala, амер. педиатр 20 в.; син. Странского—Регалы синдром) — общее название различных форм семейной гемолитической анемии, наблюдаемых у населения Малайских островов.
СТРА́НСКОГО — РЕ́ГАЛЫ СИНДРО́М (истор., E. Stransky; A. C. Regala) — см. *Странского — Регалы болезнь.*
СТРА́ССБЕРГА ФОЛЛИКУЛЯ́РНЫЙ ДЕКАЛЬВИ́РУЮЩИЙ КЕРАТОДЕРМИ́Т (Strassberg) — см. *Кератоз фолликулярный атрофический.*
СТРАТИГРАФИ́Я (лат. stratum слой + греч. graphō писать, изображать) — см. *Томография.*
СТРАХ в психиатрии — беспредметная, отрицательно окрашенная эмоция у больного, сопровождаемая напряженностью, чувством непосредственной опасности для жизни и разнообразными вегетативными нарушениями.
«СТРАХ В ГОЛОВЕ́» — см. *Kopfangst.*
СТРАХ НАВЯ́ЗЧИВЫЙ — см. *Фобия.*
СТРАХ ПРЕДСЕРДЕ́ЧНЫЙ — см. *Предсердечная тоска.*
СТРАХ СТРА́ХА — см. *Фобофобия.*
СТРА́ХИ НОЧНЫ́Е — см. *Pavor nocturnus.*
СТРЕКА́ТЕЛЬНЫЕ НИ́ТИ (син. трихоцисты) — органеллы нек-рых представителей простейших подтипа инфузорий, расположенные в эктоплазме и выбрасываемые наружу в виде тонких нитей, способных поражать мелкие организмы (циклопов, инфузорий других видов).
СТРЕЛОВИ́ДНЫЙ СИ́НУС ВЕ́РХНИЙ (sinus sagittalis superior) — см. *Сагиттальный синус верхний.*
СТРЕЛОВИ́ДНЫЙ СИ́НУС НИ́ЖНИЙ (sinus sagittalis inferior) — см. *Сагиттальный синус нижний.*
СТРЕ́МЯ (stapes, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *123.*
СТРЕМЯ́ННАЯ ВЕТВЬ (ramus stapedius, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *699.*
СТРЕПТО- (греч. streptos крученый, витой; ожерелье, цепочка) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «витой, имеющий вид цепочки», 2) «относящийся к стрептококкам».
СТРЕПТОБАКТЕ́РИЯ ДЮКРЕ́Я — У́ННЫ (*стрепто-* + *бактерия*) — см. *Палочка мягкого шанкра.*
СТРЕПТОБАЦИ́ЛЛА ПЕ́ТЕРСЕНА — ДЮКРЕ́Я (*стрепто-* + бацилла) — см. *Палочка мягкого шанкра.*
СТРЕПТОДЕРМИ́Я [streptodermia; *стрепто-* + (*пио*) *дермия*; син. пиодермия стрептококковая) — пиодермия, вызываемая стрептококками; характеризуется возникновением фликтен.
С. ДИФФУ́ЗНАЯ ХРОНИ́ЧЕСКАЯ (s. chronica diffusa) — С., характеризующаяся возникновением обширных эрозий с рассеянными по их периферии фликтенами.
С. ИНТЕРТРИГИНОЗНАЯ (s. intertriginosa) — С., характеризующаяся высыпанием множественных фликтен в кожных складках.
С. ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (s. superficialis) — см. *Импетиго стрептококковое.*
С. ЯЗВЕННАЯ (s. ulcerosa) — см. *Эктима обыкновенная.*
СТРЕПТОКО́КК(-И) (Streptococcus, Ber; *стрепто-* + *кокки*) — род бактерий сем. Streptococcaceae, объединяющий шаровидные или овальные грамположительные неподвижные микроорганизмы диаметром 0,6—1,0 *мкм*, располагающиеся цепочками; спор не образуют; нек-рые виды патогенны для человека.
С. ГЕМОЛИТИ́ЧЕСКИЙ (S. pyogenes, Ber.) — общее название С., образующих на кровяном агаре мелкие колонии с зоной гемолиза; многие виды С. г. имеют капсулу, продуцируют эритрогенный токсин, стрептолизин, гиалуронидазу и являются возбудителями ангины, скарлатины, гнойной (в т. ч. раневой) инфекции, острого гломерулонефрита, рожи, ревматизма у человека.
С. α-ГЕМОЛИТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Стрептококк зеленящий.*
С. ГРУ́ППЫ D — см. *Стрептококк фекальный.*
С. ЗЕЛЕНЯ́ЩИЙ (S. viridans; син. С. α-гемолитический) — общее название видов С., образующих на кровяном агаре мелкие колонии с зоной позеленения; нек-рые виды С. з. обнаруживаются в крови больных септическим эндокардитом, могут вызывать кариес зубов у человека.
С. ФЕКА́ЛЬНЫЙ (S. faecalis, Ber.; син.: С. группы D, энтерококк) — вид С., являющийся основным компонентом микрофлоры тонкой кишки человека; условно патогенен, может вызывать воспаление мочевых путей, подострый эндокардит.
STREPTOCOCCUS PNEUMÓNIAE — см. *Пневмококк.*
СТРЕПТОЛИЗИ́НЫ (*стрепто-* + греч. lysis разложение, растворение, распад) — токсины, выделяемые нек-рыми группами стрептококков и вызывающие гемолиз.
СТРЕПТОСТАФИЛОДЕРМИ́Я [streptostaphylodermia; *стрепто-* + *стафило*(*кокки*) + (*пио*)дермия] — общее название пиодермий, возбудителями к-рых являются одновременно стрептококки и стафилококки.
СТРЕПТО́ТРИКС (Streptothrix; *стрепто-* + греч. thrix волос) — род микроорганизмов, включавший ранее нек-рых актиномицетов, в т. ч. возбудителей нокардиоза человека, ныне отнесенных к родам Streptomyces, Actinomyces, Nocardia.
СТРЕПТОТРИХО́З (streptotrichosis) — см. *Нокардиоз.*
СТРЕПТОЦЕРКО́З (streptocercosis) — гельминтоз из группы филяриатозов, вызываемый Dipetalonema streptocerca, личинки (микрофилярии) к-рой паразитируют в коже, а взрослые особи — в подкожной клетчатке; характеризуется зудом и отеком пораженных тканей.
СТРЕСС (англ. stress, напряжение, стресс) — состояние напряжения реактивности организма, возникающее у человека при действии чрезвычайных или патологических раздражителей и проявляющееся адаптационным синдромом.
СТРЕСС ЭМОЦИОНА́ЛЬНЫЙ — стресс, развившийся в результате эмоционального возбуждения.

СТРЕ́ССОР — см. *Стресс-фактор.*
СТРЕСС-РИТМ — см. *Тета-ритм.*
СТРЕСС-ФА́КТОР (син. стрессор) — чрезвычайный или патологический раздражитель, вызывающий стресс.
СТРИА́РНЫЕ ВЕ́ТВИ (rami striati, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *706.*
СТРИА́РНЫЙ (анат. corpus striatum полосатое тело) — относящийся к полосатому телу.
СТРИА́ТУМ (анат. corpus striatum полосатое тело) — см. *Полосатое тело.*
СТРИ́ДОР (stridor; лат. «шипение», «шум») — свистящий шум, возникающий гл. обр. во время вдоха, обусловленный резким сужением просвета гортани, трахеи или бронхов; наблюдается, напр., при опухолях, аспирации инородных тел, параличе голосовых связок.
СТРИ́ДОР ВРОЖДЁННЫЙ (stridor congenitus) — болезнь детей раннего возраста, проявляющаяся с первых дней жизни постоянным свистящим шумом на вдохе; обусловлена недоразвитием или аномалией развития гортани или трахеи; исчезает без лечения на первом-втором году жизни.
STRÍAE (нрк; лат. «полосы», «борозды») — см. *Striae atrophicae.*
STRÍAE ALBICÁNTES (лат. «белеющие полосы») — striae atrophicae в заключительной фазе развития, когда они становятся белыми.
STRÍAE ATRÓPHICAE (лат. «атрофические полосы»; син.: атрофические полосы кожи, striae — нрк, striae distensae) — полосы синюшно-багрового, а затем белого цвета, локализующиеся на коже, чаще живота, бедер, молочных желез, и представляющие собой проявление линейной атрофии кожи.
STRÍAE DISTÉNSAE (лат. «полосы растяжения») — см. *Striae atrophicae.*
STRÍAE GRAVIDÁRUM (лат. «полосы беременных»; син. рубцы беременности) — striae atrophicae, нередко образующиеся во второй половине беременности.
STRÍAE PATELLÁRES (лат. «надколенные полосы») — поперечные striae atrophicae на ногах; могут возникать при инфекционных болезнях, напр. при тифах.
СТРИКТУ́РА (strictura; лат. «сжатие») — резкое сужение просвета какого-либо трубчатого органа вследствие патологических изменений его стенок.
СТРИОПА́ЛЛИДУМ (анат. corpus striatum полосатое тело + globus pallidus бледный шар) — см. *Система стриопаллидарная.*
СТРО́БИЛ (греч. strobilē завиток волокна) — лентовидное тело взрослых цестод, состоящее из члеников (проглоттид).
СТРОБОСКОПИ́ЧЕСКИЙ ЭФФЕ́КТ (греч. strobos кружение, вихрь + skopeō рассматривать, наблюдать) — возникновение зрительной иллюзии неподвижности или мнимого движения предмета при его прерывистом (с определенной периодичностью) визуальном наблюдении; используется, напр., при исследовании гортани.
СТРО́ГАНОВА МЕ́ТОД (истор.; В. В. Строганов, 1857—1938, сов. акушер-гинеколог) — метод расширения шейки матки введением в ее канал по одному пальцу каждой руки и последующим растяжением.
СТРО́ГАНОВА СИСТЕ́МА (истор.; В. В. Строганов) — метод лечения эклампсии, заключающийся в сочетании ослабления воздействия внешних раздражителей (изолированная, затемненная палата), обезболивания (применение морфина), ускоренного, но не форсированного родоразрешения и кровопускания; лежит в основе современных методов лечения эклампсии.
СТРО́МА (stroma; греч. strōma подстилка) — соединительнотканная опорная структура органа или опухоли.
С. РЕТИКУЛЯРНАЯ (s. reticulare) — С., образованная ретикулярной тканью, напр. С. костного мозга, селезенки, лимфатических узлов, миндалин.
СТРОМАТО́ЛИЗ [*строма* (основа stromat-) + греч. lysis разложение, распад] — см. *Стромолиз.*
СТРОМО́ЛИЗ (stromolysis: *строма* + греч. lysis разложение, распад; син. строматолиз) — полный распад эритроцита при гемолизе.
STRONGYLÓIDES STERCORÁLIS (син. угрица кишечная) — вид паразитических нематод сем. Strongyloididae отр. Rhabditida; паразит тонкого кишечника человека, возбудитель стронгилоидоза.
СТРОНГИЛОИДО́З (strongyloidosis; син.: ангвиллюлёз, диарея кохинхинская) — гельминтоз из группы кишечных нематодозов, вызываемый Strongyloides stercoralis; протекает с явлениями аллергии, а позже — с диспептическими расстройствами; человек заражается при проникновении личинок через кожу или при проглатывании их с пищей.
СТРО́НЦИЕВАЯ ЕДИНИ́ЦА (СЕ) — единица относительной концентрации радиоактивного стронция (Sr); соответствует содержанию 1 *пкюри* (10^{-12} *кюри*) ^{90}Sr на 1 *г* содержащегося в исследуемой пробе кальция (Ca^{++}).
СТРО́НЦИЙ РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов стронция с массовым числом от 81 до 97 и периодом полураспада от 0,7 мин. до 28 лет; отдельные изотопы используют в радиоизотопной диагностике и лучевой терапии.
СТРО́ФУЛЮС (strophulus греч. strophos веревка, пояс; от strephō вертеть, поворачивать) — см. *Почесуха детская.*
СТРУКТУ́РА БЕЛКА́ ВТОРИ́ЧНАЯ — пространственное расположение полипептидной цепи (в виде спирали), стабилизированное водородными связями между расположенными рядом пептидными группами.
СТРУКТУ́РА БЕЛКА́ ПЕРВИ́ЧНАЯ — последовательность аминокислотных остатков в полипептидной цепи, соединенных ковалентными связями.
СТРУКТУ́РА БЕЛКА́ ТРЕТИ́ЧНАЯ — пространственное расположение полипептидной цепи, стабилизированное дисульфидными или эфирными связями между далеко отстоящими друг от друга участками молекулы.
СТРУКТУ́РА БЕЛКА́ ЧЕТВЕРТИ́ЧНАЯ — пространственное расположение полипептидной цепи, обусловленное ее связями с соседними цепями.
СТРУКТУ́РНАЯ ЕДИНИ́ЦА ВИ́РУСА — см. *Субъединица вируса.*
СТРУ́МА (struma; лат. «зоб», «припухлость») — 1) см. *Зоб;* 2) (устар.) аденоматозные разрастания, развивающиеся в нек-рых органах при их атрофии и склерозе, напр. почках, яичниках, гипофизе, надпочечниках.
СТРУ́МА ДЕРЕВЯНИ́СТАЯ (struma lignea) — см. *Риделя струма.*
СТРУ́МА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (struma maligna) — см. *Аденома метастазирующая.*
СТРУ́МА КАРОТИ́ДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ (struma glandulae carotidis) — см. *Хемодектома каротидная.*
СТРУ́МА ЛАНГХА́НСА — см. *Лангханса струма.*
СТРУ́МА РИ́ДЕЛЯ — см. *Риделя струма.*
СТРУ́МА ТВЕРДОЖЕЛЕ́ЗНАЯ — см. *Риделя струма.*
СТРУМИ́Т (strumitis; *струма* + *-ит*) — воспаление ткани узловатого зутиреоидного зоба.
СТРУМИ́Т ЖЕЛЕЗОПОДО́БНЫЙ — см. *Риделя струма.*
СТРУМЭКТОМИ́Я (strumectomia; *струма* + *эктомия*) — хирургическая операция: полное или частичное удаление щитовидной железы.
СТРУНА́ АРТЕРИА́ЛЬНОГО ПРОТО́КА (chorda ductus arteriosi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *53.*
СТРУНА́ ВЕНО́ЗНОГО ПРОТО́КА (chorda ductus venosi, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *666.*
СТРУНА́ МОЧЕВО́ГО ПРОТО́КА (chorda urachi, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *655.*
СТРУНА́ ПУПО́ЧНОЙ АРТЕ́РИИ (chorda arteriae umbilicalis, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *654.*
СТРУНА́ ПУПО́ЧНОЙ ВЕ́НЫ (chorda venae umbilicalis, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *611.*
СТРУНЕ́Ц — см. *Ascaris lumbricoides.*
СТРУП (eschara; син. эшара — устар.) — затвердевший слой свернувшейся крови и (или) некротизированных тканей, прикрывающий дефект кожи.
С. СИБИРЕЯЗВЕННЫЙ (e. anthracica) — С. черного цвета, расположенный на поверхности безболезненного инфильтрата, образующийся как заключительный этап развития первичного аффекта при кожной форме сибирской язвы.
СТРУП МОЛО́ЧНЫЙ (crusta lactea) — резко ограниченный участок кожи красного цвета с мелкими чешуйками; наблюдается при экссудативно-катаральном диатезе у грудных детей.
СТУ́КЕЯ ОПЕРА́ЦИЯ (B. P. Stookey, 1887—1966, амер. нейрохирург) — 1) хирургическая операция: перфорация передней и задней стенок III желудочка головного мозга при окклюзионной гидроцефалии для создания пути оттока цереброспинальной жидкости в цистерну перекреста (хиазмальную) и межножковую (интерпедункулярную) цистерну; 2) модификация С. о.[1], при к-рой перфорируют только переднюю стенку III желудочка, создавая путь оттока цереброспинальной жидкости в цистерну перекреста.
СТУ́КЕЯ ПРО́БА (B. P. Stookey) — метод исследования проходимости подпаутинного пространства спинного мозга в нижнегрудном и поясничном отделах; основан на том, что в случае непроходимости подпаутинного пространства сильное надавливание на переднюю брюшную стенку (сдавление нижней полой вены) не вызывает повышения давления цереброспинальной жидкости; разновидность ликвородинамических проб.

СТУ́КЕЯ — СКА́РФФА ОПЕРА́ЦИЯ (B. P. Stookey, 1887—1966, амер. нейрохирург; J. E. Scarff, род. в 1898 г., амер. нейрохирург) — хирургическая операция: перфорация конечной пластинки и дна III желудочка головного мозга при окклюзионной гидроцефалии для создания путей оттока цереброспинальной жидкости в цистерну перекреста (хиазмальную) и межножковую (интерпедункулярную) цистерну.

СТУЛ ДЁГТЕОБРА́ЗНЫЙ — см. *Мелена.*

СТУЛ ЖИ́РНЫЙ — см. *Стеаторея.*

СТУЛ МА́СЛЯНЫЙ — см. *Стеаторея.*

СТУЛ ФРАГМЕНТИ́РОВАННЫЙ — см. *Боаса фрагментированный стул.*

СТУ́ПОР (stupor; лат. «оцепенение»; син. ступорозное состояние) — состояние обездвиженности с полным или частичным мутизмом и ослабленными реакциями на раздражение, в том числе болевое.

С. АКИНЕТИ́ЧЕСКИЙ (s. akineticus) — С., характеризующийся длительным сохранением положения тела и сопротивлением его изменению.

С. АПАТИ́ЧЕСКИЙ (s. apathicus) — С., сочетающийся с аспонтанностью, апатией, бедностью переживаний, нарушением ориентировки.

С. АФФЕКТИ́ВНЫЙ (s. affectivus) — см. *Ступор депрессивный.*

С. ГАЛЛЮЦИНАТО́РНО-ПАРАНО́ИДНЫЙ (s. hallucinatorioparanoideus) — см. *Ступор галлюцинаторный.*

С. ГАЛЛЮЦИНАТО́РНЫЙ (s. hallucinatorius; син. С. галлюцинаторно-параноидный) — С., сопровождающийся слуховыми, реже зрительными, галлюцинациями.

С. ДЕПРЕССИ́ВНЫЙ (s. depressivus; син.: С. аффективный, С. меланхолический) — С. при глубокой депрессии, сопровождающийся скорбным, страдальческим выражением лица.

С. ИСТЕРИ́ЧЕСКИЙ (s. hystericus) — см. *Ступор психогенный.*

С. КА́ЖУЩИЙСЯ — см. *Вестфаля псевдоступор.*

С. КАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ (s. catatonicus) — С., развивающийся как проявление кататонического синдрома, характеризующийся пассивным негативизмом или восковой гибкостью, или (в наиболее тяжелой форме) резкой мышечной гипертонией с оцепенением больного в позе с согнутыми конечностями.

С. МАНИАКА́ЛЬНЫЙ (s. maniacalis; син. мания атоническая) — С., сочетающийся с повышенным настроением больного.

С. МЕЛАНХОЛИ́ЧЕСКИЙ (s. melancholicus) — см. *Ступор депрессивный.*

С. НЕГАТИВИСТИ́ЧЕСКИЙ — С., при к-ром больной противодействует попыткам исследующего изменить его позу или положение отдельных частей тела.

С. ПОСЛЕШО́КОВЫЙ — психогенный С., обусловленный возникновением катастрофической ситуации (напр., пожар, землетрясение, наводнение).

С. ПСЕВДОКАТАТОНИ́ЧЕСКИЙ (s. pseudocatatonicus) — см. *Ступор психогенный.*

С. ПСИХОГЕ́ННЫЙ (s. psychogenus; син. С. истерический, С. псевдокататонический, С. эмоциональный) — С., возникающий в результате психической травмы.

С. ПУСТО́Й (син. С. эффекторный) — С., не сопровождающийся какими-либо другими психопатологическими расстройствами (напр., бредом, галлюцинациями, изменениями настроения).

С. РЕЦЕПТО́РНЫЙ (s. receptorius) — С. на фоне онейроидного сумеречного помрачения сознания.

С. ЭМОЦИОНА́ЛЬНЫЙ (s. emotionalis) — см. *Ступор психогенный.*

С. ЭПИЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ (s. epilepticus) — относительно кратковременный С., продолжающийся от нескольких часов до нескольких дней, возникающий при эпилепсии, сопровождающийся последующей амнезией.

С. ЭФФЕ́КТОРНЫЙ — см. *Ступор пустой.*

СТУПОРО́ЗНОЕ СОСТОЯ́НИЕ (status stuporosus) — см. *Ступор.*

СТШИЗО́ВСКОГО РЕАКТИ́В (C. Strzyzowski, род. в 1868 г., швейц. биохимик) — смесь этилового спирта, ледяной уксусной и йодисто-водородной кислот, применяемая в судебной медицине для обнаружения крови в пятнах; при взаимодействии С. р. с кровью выпадают кристаллы черного цвета в форме ромбических призм.

СТЮА́РТА НЕФРОПЛИКА́ЦИЯ (H. Stewart, совр. англ. хирург) — хирургическая операция: сближение полюсов почки до полного соприкосновения и их фиксация в этом положении фасциальным лоскутом; применяется при значительном истончении паренхимы почки, в результате гидронефроза.

СТЮА́РТА ФА́КТОР — см. *Фактор X.*

СТЮА́РТА — ПРА́УЭР БОЛЕ́ЗНЬ — см. *Болезнь Стюарта — Прауэр.*

СТЮА́РТА — ТРИ́ВСА СИНДРО́М (F. W. Stewart, амер. патолог; N. Treves, род. в 1894 г., амер. хирург) — лимфангиосаркома верхней конечности, развивающаяся на фоне длительно существующего ее лимфостаза, гл. обр. после радикальной мастэктомии по поводу рака; проявляется красновато-багровыми сливающимися бляшками или пятнами на коже передней и (или) внутренней поверхности плеча, в дальнейшем приобретающими характер узлов, подвергающихся размягчению в центре с образованием кистозных полостей или изъязвлений.

СТЮА́РТА — ХА́МИЛТОНА МЕ́ТОД (G. N. Stewart, 1860—1930, канадский физиолог; W. F. Hamilton, род. в 1893 г., амер. физиолог; син.: красочный метод, метод разведения красителя) — метод определения минутного объема сердца путем введения в кровяное русло индифферентного для организма красителя в точно известной дозе и регистрации изменений во времени его содержания в крови, протекающей через какую-либо артерию.

СТЮА́РТА — ХО́ЛМСА СИМПТО́М (J. P. Stewart, 1869—1949, англ. невропатолог; G. M. Holmes, 1876—1965, англ. невропатолог; син. симптом отдачи) — неспособность больного удержать сгибание собственной руки в локтевом суставе, когда исследующий внезапно прекратил препятствовать этому движению; рука продолжает первоначальное движение и ударяет в грудь больного; признак поражения мозжечка.

СТЮА́РТ-ПРА́УЭР-ФА́КТОР — см. *Фактор X.*

СУБ- (лат. sub-) — приставка, означающая: 1) расположение под чем-либо, ниже чего-либо; 2) неполноту качества, свойства, обозначенного последующей частью слова.

СУБАРАХНОИДА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (cavum subarachnoidale) — см. *Подпаутинное пространство.*

СУББО́ТИНА КО́СТНЫЙ ШОВ (истор.; М. С. Субботин, 1848—1913, отеч. хирург) — остеосинтез отломков кости с помощью кетгута.

СУББО́ТИНА ОПЕРА́ЦИЯ (М. С. Субботин) — 1) торакопластика при эмпиеме плевры с применением экономной резекции ребер над остаточной плевральной полостью; 2) иссечение геморроидальных узлов с последующим наложением кетгутовых швов на дефект слизистой оболочки; 3) хирургическая операция: образование искусственного мочевого пузыря из передней стенки прямой кишки; предложена для лечения экстрофии мочевого пузыря и обширных пузырно-влагалищных свищей.

СУББО́ТИНА СПО́СОБ (истор.; М. С. Субботин) — метод лечения гнойного плеврита активной аспирацией гнойного экссудата из плевральной полости с помощью резинового баллона.

СУБДЕПРЕССИ́ВНОЕ СОСТОЯ́НИЕ (син. субдепрессия) — состояние легко выраженной депрессии, характеризующееся пониженным настроением, пессимистической оценкой событий и снижением работоспособности.

СУБДЕПРЕ́ССИЯ (subdepressio, *суб-* + *депрессия*) — см. *Субдепрессивное состояние.*

СУБДУРА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium subdurale, PNA; cavum subdurale, BNA, JNA; *суб-* + анат. dura mater твердая мозговая оболочка) — щелевидное пространство между твердой и паутинной оболочками спинного мозга.

СУБЕРО́З (лат suber кора пробкового дуба + *-оз*) — аллергический альвеолит, вызываемый попаданием в дыхательные пути грибков, обитающих в пыли коры пробкового дуба.

СУБИНВОЛЮ́ЦИЯ МА́ТКИ (subinvolutio uteri; *суб-* + *инволюция*) — замедленное обратное развитие матки после родов или аборта.

СУБКО́МА (subcoma; *суб-* + *кома*) — см. *Сопор.*

СУБКОМПЕНСА́ЦИЯ СЕРДЕ́ЧНОЙ ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ (*суб-* + компенсация; син. сердечная недостаточность латентная) — состояние кровообращения, при котором основные показатели гемодинамики в покое и при обычной для данного больного физической нагрузке не нарушены только благодаря мобилизации компенсаторных механизмов.

СУБЛИМА́ЦИЯ (sublimatio; лат. sublimo, sublimatum поднимать, возвышать) — предполагаемое превращение сексуальных влечений в приемлемые в социальном отношении и не подвергающиеся нравственному осуждению формы деятельности.

СУБМАКСИЛЛИ́Т (submaxillitis; анат. устар. glandula submaxillaris поднижнечелюстная железа + *-ит*) — воспаление поднижнечелюстной железы.

СУБСЕ́ПСИС АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ (subsepsis allergica; *суб-* + *сепсис*) — см. *Висслера — Фанкони болезнь.*

СУБСТИТУ́ЦИЯ (лат. substitutio подстановка, замена, замещение) — см. *Регенерация неполная.*

СУБТАЛАМИ́ЧЕСКАЯ БОРОЗДА́ (sulcus subthalamicus; *суб-* + *таламус*) — см. *Гипоталамическая борозда.*

СУБТАЛАМОТОМИ́Я (subthalamotomia; *суб-* + *таламус* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая стереотаксическая операция: разрушение нек-рых подкорковых структур, расположенных под таламусом; производится для лечения поражений экстрапирамидной системы.

СУБФЕБРИЛИТЕ́Т (*суб-* + лат. febris лихорадка) — см. *Температура тела субфебрильная.*

СУБХРОМАТИ́ДЫ (*суб-* + *хроматиды*) — фибриллярные субъединицы хроматид, состоящие из хромонем.

СУБХРОМОНЕ́МА (*суб-* + *хромонема*) — см. *Хромофибрилла.*

СУБЪЕДИНИ́ЦА ВИ́РУСА (син. структурная единица вируса) — структура, состоящая из одного или нескольких полипептидов вируса.

СУБЭНДОТЕЛИА́ЛЬНЫЙ СЛОЙ (stratum subendotheliale, LNH; син.: Лангханса слой, субэндотелий) — слой стенки кровеносных и лимфатических сосудов или эндокарда, образованный тонкими эластическими и коллагеновыми волокнами и малодифференцированными клетками звездчатой формы; выполняет роль камбия.

СУБЭНДОТЕ́ЛИЙ (*суб-* + *эндотелий*) — см. *Субэндотелиальный слой.*

СУБЭПЕНДИМО́МА (subependymoma; *суб-* + *эпендима* + *-ома*) — см. *Астроцитома субэпендимальная.*

СУГГЕ́СТИЯ (suggestio; лат. «внушение, намек») — см. *Внушение.*

СУДА́НОВЫЕ КРАСИ́ТЕЛИ — группа нейтральных гистологических красителей (судан III, IV; черный В), применяемых для выявления жиров и липоидов.

СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ ТРАССОЛО́ГИЯ (нем. Trasse трасса + греч. logos учение) — раздел судебной медицины, разрабатывающий методы групповой и индивидуальной идентификации ранящего предмета по особенностям его следа в поврежденных тканях.

СУДОРИФЕРОЦИ́Т (sudoriferocytus, LNH; лат. sudorifer потогонный + гист. cytus клетка) — секреторная клетка потовой железы.

СУ́ДОРОГА(-И) (spasmus,-i) — внезапное непроизвольное сокращение мышц.

С. АФФЕКТИ́ВНЫЕ (s. affectivi) — С., возникающие под влиянием сильного эмоционального возбуждения; наблюдаются у детей.

С. ГИПНАГОГИ́ЧЕСКАЯ (s. hypnagogicus; греч. hypnos сон + agōgos приводящий, вызывающий) — С. мышц ног, реже рук, возникающая перед засыпанием; наблюдается чаще у лиц, страдающих нарушением минерального обмена.

С. ИНИЦИА́ЛЬНАЯ (s. initialis) — судорога, возникающая в начале произвольного движения; наблюдается при нек-рых заболеваниях ц. н. с.

С. КЛОНИ́ЧЕСКАЯ (s. clonicus; греч. klonos беспорядочное движение, дрожь) — С. в виде следующих друг за другом коротких сокращений мышц, чередующихся с их расслаблением; наблюдается гл. обр. при раздражении двигательной зоны полушарий большого мозга.

С. КО́РКОВАЯ (s. corticalis) — С., обусловленная раздражением двигательных центров в области передней центральной извилины коры полушарий большого мозга.

С. ОПЕРКУЛЯ́РНАЯ (s. opercularis; анат. operculum frontale лобная покрышка) — ритмическая С. мышц языка и губ, сопровождающаяся причмокиванием и жевательными движениями; наблюдается при поражении задней части нижней лобной извилины.

С. ОТРАЖЁННАЯ — см. *Судорога реперкуссивная.*

С. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ (s. paroxysmalis) — С., возникающая в виде повторных приступов.

С. ПРОФЕССИОНА́ЛЬНАЯ (s. professionalis) — С., обусловленная систематическим переутомлением мышц, принимающих участие в стереотипных профессиональных движениях (письмо, игра на скрипке и др.)

С. РЕПЕРКУССИ́ВНАЯ (s. repercussivus; лат. repercussio отражение; син. С. отраженная) — С., возникающая в мышцах, отдаленных от места раздражения, напр. при болезнях внутренних органов.

С. РЕФЛЕКТО́РНАЯ (s. reflectorius) — С., возникающая в ответ на воздействие раздражителя, напр. при штриховом касании кожи.

С. САЛЬТАТО́РНАЯ (s. saltatorius; лат. saltatorius плясовой; син. С. скакательная) — клоническая С. нижних конечностей, возникающая в положении стоя, реже при прикосновении к подошвам стоп лежащего больного.

С. СКАКА́ТЕЛЬНАЯ — см. *Судорога сальтаторная.*

С. ТОНИ́ЧЕСКАЯ (s. tonicus) — С., характеризующаяся длительным напряжением сокращенных мышц; наблюдается при очаговом поражении базальных ядер и ствола мозга, при тетании, столбняке, эпилепсии, истерии.

С. ЭПИЛЕПТИФО́РМНАЯ (s. epileptiformis) — С. неэпилептической природы, внешне напоминающая С. при эпилептическом припадке.

СУ́ДОРОГА АПОПЛЕКТИ́ЧЕСКАЯ (spasmus apoplecticus) — см. *Гемотония апоплектическая.*

СУ́ДОРОГА ВЗО́РА (син.: криз окулогирный, спазм взора) — непроизвольный поворот глаз кверху с продолжительным (до нескольких минут) удерживанием их в этом положении; наблюдается при паркинсонизме, эпилепсии, а также при геморрагическом инсульте.

СУ́ДОРОГА КИВА́ТЕЛЬНАЯ — см. *Spasmus nutans.*

СУ́ДОРОГА ОРА́ЛЬНАЯ (spasmus oralis; лат. os, oris рот) — пароксизмальный гиперкинез, охватывающий мышцы окружности рта; наблюдается при поражении покрышковой части нижней лобной извилины.

СУ́ДОРОГА ПИ́СЧАЯ (spasmus scriptorius, graphospasmus) — см. *Спазм писчий.*

СУ́ДОРОГА ПРИВЕ́ТСТВИЯ (spasmus nutans) — см. *Spasmus nutans.*

СУ́ДОРОГА САЛАА́МОВА — см. *Spasmus nutans.*

СУ́ДОРОЖНЫЙ СМЕХ (risus convulsivus) — неестественно громкий и продолжительный смех, сопровождающийся преувеличенными мимическими движениями; наблюдается при неврозах, иногда при органических поражениях головного мозга и шизофрении.

СУИЦИ́Д (suicidium; лат. sui себя + caedo убивать) — см. *Самоубийство.*

СУИЦИДА́ЛЬНАЯ ПОПЫ́ТКА — действие, предпринимаемое для совершения самоубийства.

СУИЦИДА́ЛЬНЫЕ МЫ́СЛИ — мысли о самоубийстве и о способах его осуществления.

СУИЦИДОМАНИ́Я (suicidomania; *суицид* + *мания*; син. аутофономания — устар.) — навязчивое влечение: упорное стремление к совершению самоубийства.

СУ́КА СИМПТО́М (A. A. Souques, 1860—1944, франц. невропатолог) — 1) непроизвольное разведение пальцев парализованной руки при пассивном поднятии ее кверху; признак центрального паралича; 2) отсутствие компенсаторного выпрямления ног при внезапном пассивном отклонении туловища сидящего больного назад; признак поражения червя мозжечка.

СУ́КЕРА СИМПТО́М (J. R. Suker, род. в 1926 г., амер. эндокринолог) — затруднение фиксации взора на объектах, расположенных сбоку от средней линии; признак пареза наружных мышц глазных яблок, напр. при тиреотоксикозе.

СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНА́ЗА — фермент класса оксидоредуктаз (КФ 1.3.99.1), катализирующий обратимую реакцию окисления янтарной кислоты в фумаровую; участвует в цикле трикарбоновых кислот.

СУЛЕМО́ВАЯ ПРО́БА (син.: Гринстедта проба, сулемово-осадочная реакция) — модификация реакции Таката — Ара, заключающаяся в определении минимального количества 0,1% раствора хлорида ртути, к-рое необходимо добавить к смеси исследуемой сыворотки крови с изотоническим раствором хлорида натрия (1 · 2) для того, чтобы появилось ее стойкое помутнение; разновидность коагуляционных проб.

СУЛЕМО́ВО-ОСА́ДОЧНАЯ РЕА́КЦИЯ — см. *Сулемовая проба.*

СУЛЛИВА́НА ПОКАЗА́ТЕЛЬ (Sullivan) — показатель подвижности основания стремени, представляющий собой сумму разностей (в *дб*) порогов костной проводимости, исследованных при открытом и закрытом наружном слуховом проходе на частотах 250, 500 и 1000 *гц*.

СУЛЬКО́ВИЧА РЕАКТИ́В (H. W. Sulkowitch, род. в 1906 г., амер. уролог) — реактив, содержащий по 2,5 *г* щавелевой кислоты, оксалата аммония и ледяной уксусной кислоты на 150 *мл* их водного раствора; используется для ориентировочного определения содержания кальция в моче.

СУЛЬКО́ВИЧА ТЕСТ (H. W. Sulkowitch) — метод ориентировочного определения содержания кальция в моче по степени ее помутнения и образования осадка после добавления реактива Сульковича.

СУЛЬФАНИЛАМИ́ДНЫЕ ПРЕПАРА́ТЫ (sulfanilamida; син. сульфаниламиды) — химиотерапевтические средства, являющиеся производными сульфаниловой кислоты; применяются для лечения ряда инфекционных болезней.

СУЛЬФАНИЛАМИ́ДЫ (sulfanilamida) — см. *Сульфаниламидные препараты.*

СУЛЬФА́Т НИ́ЛЬСКОГО ГОЛУБО́ГО — см. *Нильский синий.*

СУЛЬФА́Т-АДЕНИЛИЛТРАНСФЕРА́ЗА — фермент класса трансфераз (КФ 2.7.7.4), катализирующий перенос остатка адениловой кислоты на сульфат с образованием аденилилсульфата; участвует в процессах метаболизма серы.

СУЛЬФАТА́ЗЫ (син. сульфоэстеразы) — ферменты класса гидролаз (3.1.6), катализирующие гидролитическое расщепление эфиров серной кислоты (напр., хондроитинсерной кислоты); участвуют в процессах осуществления антитоксической функции печени.

СУЛЬФАТИ́ДЫ (син. сульфолипиды) — сложные липиды, содержащие остаток серной кислоты; содержатся во всех тканях; участвуют в построении миелиновой оболочки нервных волокон.

СУЛЬФГЕМОГЛОБИ́Н — метгемоглобин, образующийся в результате взаимодействия гемоглобина с сульфидами или сероводородом, поступившими извне или образовавшимися в тканях и полостях (напр., трупа); представляет собой зеленоватый пигмент.

СУЛЬФГИДРИ́ЛЬНАЯ ГРУ́ППА (син. тиоловая группа) — одновалентная группа, состоящая из атома серы и водорода, входящая в состав цистеина, участвующая в стабилизации третичной структуры белков и определяющая активность нек-рых ферментов.

СУЛЬФОБРОМФТАЛЕИ́НОВАЯ ПРО́БА (син. бромсульфофталеиновая проба) — метод исследования функции печени, заключающийся в колориметрическом определении продолжительности задержки в крови бромсульфофталеина после его внутривенного введения.

СУЛЬФОЛИПИ́ДЫ — см. *Сульфатиды.*

СУЛЬФОСАЛИЦИ́ЛОВАЯ КИСЛОТА́ — производное бензойной кислоты, применяемое для осаждения и нефелометрического определения белков в моче и других биологических жидкостях.

СУЛЬФОЭСТЕРА́ЗЫ — см. *Сульфатазы.*

СУ́ЛЬЦБЕРГЕРА — ГА́РБЕ БОЛЕ́ЗНЬ (M. B. Sulzberger, амер. врач; W. Garbe, род. в 1908 г., канадский дерматолог) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся возникновением плазмоцитарных инфильтратов вокруг расширенных сосудов кожи и проявляющийся развитием шелушащихся, обычно зудящих бляшек.

СУ́МЕРЕЧНОЕ СОСТОЯ́НИЕ — см. *Помрачение сознания сумеречное.*

СУ́МКА ВО́ЛОСА (bursa pili, LNH; син. волосяная сумка) — соединительнотканная оболочка, окружающая корень волоса и образующая наружную часть волосяного мешка; состоит из наружного продольного и внутреннего циркулярного волокнистых слоев и базальной мембраны.

СУ́МКА ПРОТИВОХИМИ́ЧЕСКИХ СРЕДСТВ (син. противохимическая сумка — устар.) — комплект дегазирующих средств, предназначенный для частичной санитарной обработки.

СУ́МКА САНИТА́РА (истор.) — набор медицинского имущества, уложенный в тканевую сумку специального образца и предназначенный для оказания первой медицинской помощи санитарами; находилась на снабжении Вооруженных Сил; заменена войсковой медицинской сумкой (СМВ).

СУ́МКА САНИТА́РНОГО ИНСТРУ́КТОРА (истор.) — набор медицинского имущества, уложенный в тканевую сумку специального образца и предназначавшийся для оказания первой медицинской помощи санитарным инструктором или фельдшером; находилась на снабжении Вооруженных Сил; заменена войсковой медицинской сумкой (СМВ).

СУ́МКА ХРУСТА́ЛИКА (capsula lentis, PNA, BNA, JNA) — прозрачная эластичная оболочка, окружающая хрусталик.

СУММА́ЦИЯ ВОЗБУЖДЕ́НИЯ — снижение порога раздражителя и (или) усиление реакции возбудимого образования, обусловленные сочетанием нескольких раздражений.

С. ВОЗБУЖДЕ́НИЯ ВРЕМЕННА́Я (син. С. возбуждения последовательная) — С. в. при повторяющемся раздражении.

С. ВОЗБУЖДЕ́НИЯ ПОСЛЕ́ДОВАТЕЛЬНАЯ — см. *Суммация возбуждения временная.*

С. ВОЗБУЖДЕ́НИЯ ПРОСТРА́НСТВЕННАЯ — С. в. при одновременном множественном раздражении.

СУПЕР- (лат. super-) — приставка, означающая «нахождение над чем-либо, выше чего-либо», «превышение».

СУПЕРГЕ́Н (*супер-* + *ген*)—блок сцепленных генов, к-рые вместе передаются потомству.

СУПЕРИНВОЛЮ́ЦИЯ МА́ТКИ (superinvolutio uteri; *супер-* + *инволюция*) — чрезмерно ускоренное обратное развитие матки после родов.

СУПЕРКОРРЕ́КЦИЯ (*супер-* + лат. corrigo, correctum выпрямлять, исправлять; син. гиперкоррекция) — чрезмерное разгибание какой-либо части тела с ее иммобилизацией на определенный срок; применяется при лечении повреждений скелета для последующего более полного восстановления его функции.

СУПЕРПОЗИ́ЦИЯ (*супер-* + лат. positio установка, положение) — увеличение амплитуды мышечного сокращения в результате суммации одиночных сокращений при ритмичной стимуляции.

СУПЕРХЛОРИ́РОВАНИЕ ВОДЫ́ — см. *Перехлорирование воды.*

СУ́ПЕР-Э́ГО (*супер-* + лат. ego я) — принятое в психоаналитической умозрительной схеме построения личности обозначение наивысшей инстанции, выполняющей функции цензора, отвергающего подсознательные влечения и желания или допускающего их в сознание в измененном виде.

СУПЕРЭКСТРЕМА́ЛЬНАЯ ЗО́НА (*супер-* + лат. extremus крайний; син. абсолютно экстремальная зона) — территория, в пределах к-рой природные, хозяйственные и бытовые условия оказывают столь интенсивное неблагоприятное воздействие на уровень здоровья населения, что нормальная жизнедеятельность людей может быть обеспечена только созданием искусственной окружающей среды.

СУПИНА́ТОР[1] (musculus supinator, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *827.*

С. ДЛИ́ННЫЙ (m. s. longus) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *380.*

С. КОРО́ТКИЙ (m. s. brevis) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *827.*

СУПИНА́ТОР[2] (лат. supino, supinatum переворачивать, откидывать назад; син. стелька-супинатор) — ортопедическое изделие, предназначенное для поддержания сводов стопы при плоскостопии, представляющее собой вкладываемую в обувь стельку специальной формы.

СУПИНА́ЦИЯ (лат. supino, supinatum переворачивать, откидывать назад) — вращательное движение предплечья кнаружи до положения, при к-ром кисть обращена ладонью вверх, или движение стопы кнаружи до положения, при к-ром ее медиальный край приподнят.

СУППОЗИТО́РИИ (suppositoria; лат. suppono, suppositum подставлять, прикладывать снизу) — дозированные лекарственные формы, твердые в обычных условиях и расплывающиеся или растворяющиеся при температуре тела.

С. ВАГИНА́ЛЬНЫЕ (s. vaginalia) — С., предназначенные для введения во влагалище; могут иметь сферическую (глобули), яйцевидную (овули) или плоскую форму с закругленным концом (пессарии).

С. РЕКТА́ЛЬНЫЕ (s. rectalia; син.: мыльца — устар., свечи) — С., предназначенные для введения в прямую кишку и имеющие, как правило, форму цилиндра или конуса с заостренным концом.

СУПРА- (лат. supra-) — приставка, означающая «нахождение над чем-либо, выше чего-либо».

СУПРАВЕРГЕ́НЦИЯ (supravergentio; *супра-* + лат. vergo поворачивать) — см. *Косоглазие кверху.*

СУПРАДЕНТИ́Я (*супра-* + лат. dens, dentis зуб) — см. *Полиодонтия.*

СУПРАРЕНОРЕНТГЕНОГРАФИ́Я (анат. glandula suprarenalis надпочечник + *рентгенография*) — рентгенологическое исследование надпочечников, проводимое с наложением пневморетроперитонеума.

СУПРАРЕНЭКТОМИ́Я (анат. glandula suprarenalis надпочечник + *эктомия*) — см. *Адреналэктомия.*

СУПРАХОРИОИДА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium suprachorioideale) — см. *Перихориоидальное пространство.*

СУПРАХОРИОИ́ДЕА (*супра-* + анат. chorioidea собственно сосудистая оболочка) — см. *Надсосудистая пластинка.*

СУПРЕ́ССИЯ (лат. suppressio давление, подавление) — подавление фенотипического проявления доминантного гена геном-супрессором.

СУПРЕ́ССОР (лат. supprimo, suppressum давить, подавлять) — см. *Ген-супрессор.*

СУРДО- (лат. surdus глухой) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к тугоухости, к глухоте».

СУРДОБАРОКА́МЕРА (*сурдо-* + *барокамера*) — барокамера со звуконепроницаемыми стенами, предназначенная для исследований влияния на организм человека измененного баромe-

трического давления в условиях отсутствия посторонних звуковых и световых раздражителей (сенсорная депривация).

СУРДОКА́МЕРА (*сурдо-* + камера) — помещение со звуконепроницаемыми стенами, служащее для проведения физиологических, психологических и других исследований, а также тренировок (напр., при подготовке космонавтов) в условиях отсутствия посторонних звуковых и световых раздражителей (сенсорная депривация).

СУРДОЛО́ГИЯ (*сурдо-* + греч. logos учение, наука) — раздел оториноларингологии, изучающий этиологию и клинику различных форм тугоухости и глухоты, разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики.

СУРДОМУТИ́ЗМ (surdomutismus; *сурдо-* + лат. mutus немой) — см. *Глухонемота.*

СУРДОПЕДАГО́ГИКА (*сурдо-* + педагогика) — раздел оториноларингологии и педагогики, разрабатывающий методы развития слухового восприятия и использования остатков слуховой функции у тугоухих с целью формирования словесной речи.

СУРДОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКАЯ АППАРАТУ́РА (*сурдо-* + *терапия*) — приборы и аппараты, гл. обр. электроакустические, применяемые для тренировки и развития слуха при его стойких нарушениях.

СУ́РДОТЕРАПИ́Я (surdotherapia; *сурдо-* + *терапия*) — совокупность методов лечения тугоухости и глухоты.

СУРЬМО́ВАЯ ПРО́БА (син. Чопры — Гупты проба) — метод диагностики висцерального лейшманиоза, основанный на образовании хлопьевидного осадка после прибавления сыворотки крови больного к свежеприготовленному раствору препаратов сурьмы; разновидность коагуляционных проб.

СУ́СЛОВА ПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; Г. В. Суслов) — пластическая операция: замещение дефекта крыла носа путем свободной пересадки части ушной раковины.

СУСПЕ́НЗИИ (suspensiones; лат. suspendo, suspensum подвешивать; син. лекарственные взвеси) в фармации — жидкие лекарственные формы, представляющие собой дисперсные системы, в к-рых относительно крупные твердые частицы взвешены в жидкости (воде, глицерине, жидком масле).

СУСПЕНЗО́РИЙ (syspensorium; лат. suspendo, suspensum подвешивать, поддерживать) — поддерживающая повязка для мошонки в виде мешочка, фиксируемого на поясе и бедрах.

СУСТА́В(-Ы) (articulatio, -ones, PNA, BNA; articulus, -i, JNA; син.: диартроз, синовиальное соединение, сочленение)— подвижное соединение костей, при к-ром их концы (суставные поверхности) разделены суставной полостью, содержащей синовиальную жидкость.

С. АКРОМИА́ЛЬНО-КЛЮЧИ́ЧНЫЙ (a. acromioclavicularis, PNA, BNA, JNA) — эллипсоидный С., образованный суставной поверхностью акромиона и акромиальной суставной поверхностью ключицы; в С. а.-к. возможны движения лопатки вперед и назад, ее отведение, приведение и вращение.

С. АТЛАНТОЗАТЫ́ЛОЧНЫЙ (a. atlantooccipitalis, PNA, BNA, JNA) — эллипсоидный С., образованный верхней суставной ямкой атланта и затылочным мыщелком; в С. а. возможны наклоны головы вперед, назад и в стороны.

С. АТЛАНТООСЕВО́Й ЛАТЕРА́ЛЬНЫЙ (a. atlantoaxialis lateralis, PNA) — плоский С., образованный нижней суставной ямкой атланта и верхней суставной поверхностью осевого позвонка; в С. а. л. возможны повороты головы вправо и влево, ее наклоны вперед и назад.

С. АТЛАНТООСЕВО́Й СРЕДИ́ННЫЙ (a. atlantoaxialis mediana, PNA) — цилиндрический С., образованный суставными поверхностями зуба осевого позвонка, ямкой зуба передней дуги атланта и передней поверхностью поперечной связки атланта; в С. а. с. возможны повороты головы вправо и влево.

С. БЛОКОВИ́ДНЫЙ (ginglymus, PNA, BNA, JNA; син. С. шарнирный) — цилиндрический С., в к-ром на одной из суставных поверхностей имеется бороздка, а на другой — соответствующий ей гребешок, определяющие ось С.

С. БОЛЬШЕБЕРЦО́ВО-МАЛОБЕРЦО́ВЫЙ (a. tibiofibularis, PNA, BNA, JNA) — плоский С., образованный малоберцовой суставной поверхностью большеберцовой кости и суставной поверхностью головки малоберцовой кости.

С. ВИНТО́ВОЙ (a. cochlearis, BNA) — блоковидный С., в к-ром суставные поверхности имеют форму винта.

С. ВИСО́ЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНО́Й (a. temporomandibularis, PNA; a. mandibularis, BNA, JNA; син. С. нижнечелюстной) — мыщелковый (близкий к эллипсоидному) С., образованный нижнечелюстной ямкой височной кости и головкой нижней челюсти; в С. в.-н. возможны движения челюсти вниз, вверх, вперед, назад и в сторону.

С. ВРАЩА́ТЕЛЬНЫЙ (a. trochoidea, PNA, BNA; a. trochoideus, JNA) — цилиндрический С., ось к-рого совпадает с продольной осью кости, что обеспечивает вращательные движения в С.

С. ГОЛЕНОСТО́ПНЫЙ (a. talocruralis, PNA, BNA, JNA) — блоковидный С., образованный нижней суставной поверхностью большеберцовой кости, суставными поверхностями обеих лодыжек, лодыжковыми и верхней поверхностями таранной кости; в С. г. возможны сгибание и разгибание стопы.

С. ГРУДИНОКЛЮЧИ́ЧНЫЙ (a. sternoclavicularis, PNA, BNA, JNA)— седловидный С., образованный ключичной вырезкой грудины и грудинной суставной поверхностью ключицы; в С. г. возможны движения ключицы вверх, вниз, вперед, назад, вращение вокруг продольной оси и циркумдукция.

С. ГРУДИНОРЁБЕРНЫЕ (a. sternocostales, PNA, BNA, JNA) — плоские С., образованные II — VII реберными хрящами и соответствующими реберными вырезками грудины.

С. ДВУХО́СНЫЙ — С. с двумя осями вращения (с двумя степенями свободы).

С. ДУГООТРО́СТЧАТЫЕ (a. zygapophysiales) — см. *Суставы межпозвоночные.*

С. ЗАПЯ́СТНО-ПЯ́СТНЫЕ (a. carpometacarpeae, PNA, BNA; a. carpometacarpicus communis, JNA) — С., образованные трапециевидной, головчатой и крючковидной костями и основаниями II — V пястных костей; С. з.-п. с II — IV пястными костями — плоские, С. з.-п. с V пястной костью — эллипсоидный; в С. з.-п. с II — IV пястными костями возможны качательные движения, в С. з.-п. с V пястной костью — вращение вокруг продольной оси.

С. ЗАПЯ́СТНО-ПЯ́СТНЫЙ БОЛЬШО́ГО ПА́ЛЬЦА КИ́СТИ (a. carpometacarpea pollicis, PNA, BNA; a. carpometacarpicus primus, JNA) — седловидный С., образованный костью-трапецией и основанием I пястной кости; в этом С. возможны отведение (в плоскости ладони), приведение, сгибание, разгибание, противопоставление (оппозиция) и обратное ему движение (репозиция), а также циркумдукция большого пальца.

С. КИ́СТИ (устар.; a. manus, BNA, JNA) — комплекс лучезапястного и среднезапястного С., рассматривавшийся как комбинированный сустав.

С. КОЛЕ́ННЫЙ (a. genus, PNA, JNA; a. genu, BNA) — сложный мыщелковый С., образованный мыщелками и надколенниковой поверхностью бедренной кости, верхней суставной поверхностью большеберцовой кости и суставной поверхностью надколенника; в С. к. возможны сгибание, разгибание, вращение и циркумдукция (при сгибании) голени.

С. КОМБИНИ́РОВАННЫЙ (a. combinata) — совокупность двух или более анатомически раздельных, но функционально связанных С.

С. КРЕСТЦО́ВО-ПОДВЗДО́ШНЫЙ (a. sacroiliaca, PNA, BNA; a. sacroiliacus, JNA) — плоский С., образованный ушковидными поверхностями крестца и подвздошной кости.

СУСТА́В ЛИСФРА́НКА — см. *Суставы предплюсне-плюсневые.*

С. ЛОКТЕВО́Й (a. cubiti, PNA, BNA, JNA) — сложный С., объединяющий плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой С., заключенные в одну суставную капсулу; в С. л. возможны сгибание и разгибание предплечья, а также (при участии дистального лучелоктевого С.) его пронация и супинация.

С. ЛУЧЕЗАПЯ́СТНЫЙ (a. radiocarpea, PNA, BNA; a. radiocarpicus, JNA) — сложный эллипсоидный С., образованный запястной суставной поверхностью лучевой кости, а также ладьевидной, полулунной и трехгранной костями; в С. л. осуществляется сгибание, разгибание, отведение, приведение и циркумдукция кисти.

С. ЛУЧЕЛОКТЕВО́Й ДИСТА́ЛЬНЫЙ (a. radioulnaris distalis, PNA, BNA, JNA) — вращательный С., образованный локтевой вырезкой лучевой кости и суставной окружностью локтевой кости; совместно с проксимальным лучелоктевым С. представляет собой комбинированный С., в к-ром возможны пронация и супинация предплечья.

С. ЛУЧЕЛОКТЕВО́Й ПРОКСИМА́ЛЬНЫЙ (a. radioulnaris proximalis, PNA, BNA; pars radioulnaris

articuli cubiti, JNA) — вращательный С., образованный суставной окружностью лучевой кости и лучевой вырезкой локтевой кости; совместно с дистальным лучелоктевым С. представляет собой комбинированный С., в к-ром возможны пронация и супинация предплечья.

С. МЕЖЗАПЯ́СТНЫЕ (a. intercarpeae, PNA) — общее название С., образованных костями запястья.

С. МЕЖПОЗВОНО́ЧНЫЕ (a. zygapophyseales, PNA; a. intervertebrales, BNA, JNA; син. С. дугоотростчатые) — плоские комбинированные С., образованные верхними и нижними суставными отростками смежных позвонков; в С. м. возможны сгибание, разгибание, отведение (боковое сгибание), приведение и вращение (за исключением С. м. поясничных позвонков) позвоночника.

С. МЕЖФАЛА́НГОВЫЕ кисти и стопы [a. interphalangeae manus (pedis), PNA, BNA; a. digitorum manus (pedis), JNA] — блоковидные С., образованные головками и основаниями смежных фаланг пальцев; в С. м. возможны сгибание и разгибание пальцев.

С. МНОГООСНЫЙ — С. с тремя осями вращения (с тремя степенями свободы).

С. МЫЩЕЛКОВЫЙ (a. bicondylaris, PNA) — двухосный С., в к-ром одна кость сочленяется с другой посредством двух мыщелков.

С. НИЖНЕЧЕЛЮСТНО́Й (a. mandibularis, BNA, JNA) — см. *Сустав височно-нижнечелюстной.*

С. ОДНООСНЫЙ — С. с одной осью вращения (с одной степенью свободы).

С. ОРЕХОВИ́ДНЫЙ (enarthrosis) — см. *Сустав чашеобразный.*

С. ПЛЕЧЕВО́Й (a. humeri, PNA, BNA, JNA) — шаровидный С., образованный головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки; в С. п. возможны сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение и циркумдукция плеча.

С. ПЛЕЧЕЛОКТЕВО́Й (a. humeroulnaris, PNA, BNA; pars humeroulnaris articuli cubiti, JNA) — блоковидный С., образованный блоком плечевой кости и блоковидной вырезкой локтевой кости; в С. п. возможны сгибание и разгибание предплечья.

С. ПЛЕЧЕЛУЧЕВО́Й (a. humeroradialis, PNA, JNA; pars humeroradialis articuli cubiti, JNA) — шаровидный С., образованный головкой мыщелка плечевой кости и ямкой головки лучевой кости; в С. п. возможны сгибание и разгибание предплечья, а также (при участии дистального и проксимального лучелоктевых С.) его пронация и супинация.

С. ПЛО́СКИЙ (a. plana, PNA, BNA; articulus planus, JNA; син.: амфиартроз, С. тугоподвижный) — С., суставные поверхности к-рого обладают незначительной кривизной; допускает лишь небольшое их скольжение.

С. ПЛЮСНЕФАЛА́НГОВЫЕ (a. metatarsophalangeae, PNA, BNA; a. metatarsophalangici, JNA) — С., образованные головками плюсневых костей и основаниями проксимальных фаланг; С. п. большого пальца — блоковидный, остальные — шаровидные; в С. п. большого пальца возможны сгибание и разгибание, в остальных — сгибание, разгибание, отведение и приведение пальцев стопы.

С. ПОДТАРА́ННЫЙ (a. subtalaris, PNA; a. talocalcanea, BNA; a. talocalcanearis, JNA; син. С. таранно-пяточный) — вращательный С., образованный пяточными суставными поверхностями таранной кости и таранными суставными поверхностями пяточной кости; в С. п. возможны супинация стопы в сочетании с ее приведением и пронация стопы в сочетании с ее отведением.

С. ПРЕДПЛЮ́СНЕ-ПЛЮСНЕВЫ́Е (a. tarsometatarseae, PNA, BNA, JNA; син. Лисфранка сустав) — плоские С., образованные основаниями I — V плюсневых костей, клиновидными и кубовидной костями.

С. ПРЕДПЛЮ́СНЫ ПОПЕРЕ́ЧНЫЙ (a. tarsi transversa, PNA, BNA; a. tarsi transversus, JNA; син. шопаров сустав) — комбинированный С., образованный ладьевидной суставной поверхностью таранной кости и ладьевидной костью (таранно-ладьевидный С.), а также кубовидной суставной поверхностью пяточной кости и кубовидной костью (пяточно-кубовидный С.); в С. п. п. возможны ограниченные движения дистального отдела стопы вверх и вниз.

С. ПРОСТО́Й (a. simplex, PNA, BNA) — С., в к-ром имеется лишь одна пара суставных поверхностей.

С. ПЯСТНО-ФАЛА́НГОВЫЕ (a. metacarpophalangeae, PNA, BNA; a. metacarpophalangici, JNA) — С., образованные головками пястных костей и основаниями проксимальных фаланг; С. п.-ф. большого пальца блоковидный, остальные — шаровидные; в С. п.-ф. большого пальца возможны сгибание и разгибание, в остальных — сгибание, разгибание, отведение и приведение пальцев кисти.

С. РЁБЕРНО-ПОЗВОНО́ЧНЫЕ (a. costovertebrales, PNA, BNA, JNA) — комбинированные С., образованные суставными поверхностями головок ребер и реберными ямками грудных позвонков (С. головки ребра), а также суставными поверхностями бугорков ребер и реберными ямками поперечных отростков грудных позвонков (реберно-поперечный С.); в С. р.-п. возможны поднимание и опускание ребер с одновременным перемещением их передних концов соответственно вперед и назад.

С. СЕДЛОВИ́ДНЫЙ (a. sellaris, PNA, BNA) — двухосный С., суставные поверхности к-рого по одной из осей выпуклы, а по другой, перпендикулярной ей, вогнуты.

С. СЛО́ЖНЫЙ (a. composita, PNA, BNA) — С., имеющий две или более пар суставных поверхностей.

С. СРЕДНЕЗАПЯ́СТНЫЙ (a. mediocarpea, PNA; a. intercarpea, BNA; a. intercarpicus, JNA)— совокупность межзапястных С. между проксимальным и дистальным рядом костей запястья; С. с. функционально связан с лучезапястным С.

С. ТАЗОБЕ́ДРЕННЫЙ (a. coxae, PNA, BNA, JNA) — чашеобразный С., образованный головкой бедренной кости и полулунной поверхностью вертлужной впадины; в С. т. возможны сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение и циркумдукция бедра.

С. ТАРА́ННО-ПЯ́ТОЧНЫЙ (a. talocalcanea, BNA; a. talocalcanearis, JNA) — см. *Сустав подтаранный.*

С. ТУГОПОДВИ́ЖНЫЙ — см. *Сустав плоский.*

С. ЦИЛИНДРИ́ЧЕСКИЙ (a. trochoidea, PNA, BNA)— одноосный С., суставные поверхности к-рого имеют форму, сходную с боковой поверхностью цилиндра.

С. ЧАШЕОБРА́ЗНЫЙ (a. cotylica, PNA; син. С. ореховидный) — шаровидный С., отличающийся большой глубиной суставной ямки.

С. ШАРНИ́РНЫЙ — см. *Сустав блоковидный.*

С. ШАРОВИ́ДНЫЙ (a. spheroidea, PNA, BNA; син. артродия) — С., суставные поверхности к-рого имеют форму части поверхности шара.

С. ШОПА́РОВ — см. *Сустав предплюсны поперечный.*

С. ЭЛЛИПСО́ИДНЫЙ (a. ellipsoidea, PNA, BNA; син. С. яйцевидный) — двухосный С., суставные поверхности к-рого имеют форму части поверхности эллипсоида.

С. ЯЙЦЕВИ́ДНЫЙ — см. *Сустав эллипсоидный.*

СУСТА́В БОЛТА́ЮЩИЙСЯ (син. сустав разболтанный) — патологическое изменение сустава, при к-ром в нем значительно увеличен объем пассивных движений (в т. ч. в необычных плоскостях), что приводит к утрате суставом основных функций; наблюдается при растяжении и расслаблении суставной капсулы и связок, периферическом параличе мышц, дефектах или деформациях сочленяющихся концов костей.

СУСТА́В КОРА́ЛЛОВЫЙ ЛО́ТША — см. *Хондроматоз сустава.*

СУСТА́В ЛО́ЖНЫЙ (pseudoarthrosis; син. псевдоартроз) — стойкое нарушение целости или оссификации кости с наличием патологической подвижности на ее протяжении.

С. ЛО́ЖНЫЙ БОЛТА́ЮЩИЙСЯ — С. л. со значительным расхождением концов фрагментов кости, в связи с чем в его области возможны движения в любой плоскости с большой амплитудой.

С. ЛО́ЖНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ (p. congenita) — С. л., возникший в результате внутриутробной гипоплазии костей и нарушения их оссификации.

С. ЛО́ЖНЫЙ ПРИОБРЕТЁННЫЙ (p. acquisita) — С. л., образовавшийся в месте нарушения целости кости, вызванного травмой, патологическим процессом или хирургическим вмешательством.

СУСТА́В ПЕРСТНЕЩИТОВИ́ДНЫЙ (articulatio cricothyroidea, PNA; articulatio cricothyreoidea, BNA; articulus cricothyreoideus, JNA) — сочленение между пластинкой перстневидного и нижним рогом щитовидного хряща, допускающее перемещение последнего вокруг поперечной оси гортани.

СУСТА́В РАЗБО́ЛТАННЫЙ — см. *Сустав болтающийся.*

СУСТА́В ШАРКО́ — см. *Артропатия нейрогенная.*

СУСТАВНА́Я ГОЛО́ВКА (caput articulare) — часть кости, несущая выпуклую суставную поверхность.

СУСТАВНА́Я ГУБА́ (labrum glenoidale, PNA, BNA; labium articulare, JNA) — кольцевидное хрящевое обра-

зование, прикрепленное в нек-рых суставах по краю суставной ямки и увеличивающее ее площадь.

СУСТАВНА́Я КА́ПСУЛА (capsula articularis, PNA, BNA, JNA) — соединительнотканная оболочка сустава, охватывающая концы костей и прикрепленная по краю суставных поверхностей; образует герметически замкнутую суставную полость.

СУСТАВНА́Я МЫШЬ (mus articularis; син. артремфит) — свободно расположенный в полости сустава фрагмент его тканей или обызвествленный сгусток фибрина.

СУСТАВНА́Я ПОВЕ́РХНОСТЬ (facies articularis, PNA, BNA, JNA; син. сочленовная поверхность) — покрытая суставным хрящом поверхность кости, участвующая в образовании сустава.

СУСТАВНА́Я ПО́ЛОСТЬ (cavum articulare, PNA, BNA, JNA) — щелевидное пространство между суставными поверхностями костей, выстланное синовиальной оболочкой и содержащее синовиальную жидкость.

СУСТАВНА́Я ЩЕЛЬ — определяемая на рентгенограмме сустава полоса просветления между концами костей, соответствующая суставным хрящам, поглощающим рентгеновское излучение слабее, чем костная ткань.

СУСТАВНА́Я ЯМКА (fossa articularis) — вогнутая суставная поверхность.

СУСТАВНО́Й ДИСК (discus articularis, PNA, BNA, JNA) — хрящевое образование нек-рых суставов, расположенное между суставными поверхностями; увеличивает конгруэнтность сустава и выполняет роль амортизатора.

СУСТАВНЫ́Е ВЕ́ТВИ (rami articulares, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *36*.

СУСТАВНЫ́Е ОТРО́СТКИ ВЕ́РХНИЕ И НИ́ЖНИЕ (processus articulares superiores et inferiores, PNA, BNA; processus articulares cranialis et caudalis, JNA) — парные костные отростки на верхней и нижней поверхностях дуги позвонка, расположенные позади верхних и нижних позвоночных вырезок и несущие суставные поверхности, участвующие в образовании межпозвоночных суставов.

СУСТАВНЫ́Е ТЕЛЬЦА́ (corpuscula articularia, PNA; corpuscula nervorum articularia, BNA; corpuscula nervorum articularium, JNA) — проприорецепторы, расположенные в толще суставной капсулы.

СУСТЕНТОЦИ́ТЫ (sustentocyti, LNH; лат. sustento поддерживать, подпирать + гист. cytus клетка; син. Сертоли клетки) — клетки, расположенные в извитых семенных канальцах яичек, выполняющие опорную и трофическую функции по отношению к клеткам сперматогенного эпителия.

СУТЯ́ЖНОЕ ПОМЕША́ТЕЛЬСТВО — см. *Бред кверулянтов*.

СУХОЖИ́ЛИЕ (tendo, PNA, BNA, JNA) — состоящая из пучков коллагеновых волокон часть поперечнополосатой мышцы, посредством к-рой она прикрепляется к кости или другим анатомическим образованиям.

С. АХИ́ЛЛОВО (tendo Achillis) — см. *Сухожилие пяточное*.

С. ПЯ́ТОЧНОЕ [t. calcaneus (Achillis), PNA, BNA; tendo m. tricipitis surae, JNA; син. сухожилие ахиллово] — С. трехглавой мышцы голени, прикрепляющееся к бугру пяточной кости.

С. СОЕДИНЁННОЕ (t. conjunctivus) — см. *Паховый серп*.

С. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНОЕ (t. conjunctivus) — см. *Паховый серп*.

СУХОЖИ́ЛЬНАЯ ДУГА́ (arcus tendineus, PNA, BNA, JNA) — фиброзный тяж, соединяющий два участка костей или мышц и являющийся местом прикрепления мышц; известны С. д. фасции таза (a. t. fasciae pelvis), мышцы, поднимающей задний проход (a. t. musculi levatoris ani), и камбаловидной мышцы (a. t. musculi solei).

СУХОЖИ́ЛЬНОЕ ВЕРЕТЕНО́ (fusus tendineus) — см. *Нервно-сухожильное веретено*.

СУХОЖИ́ЛЬНОЕ КОЛЬЦО́ О́БЩЕЕ (annulus tendineus communis, PNA, BNA, JNA; син. цинново кольцо) — фиброзное образование в форме воронки, окружающее зрительный нерв, глазную артерию, глазной, глазодвигательный, отводящий и блоковый нервы в области верхней глазничной щели; от С. к. о. начинаются все мышцы глазного яблока, кроме нижней косой.

СУХОЖИ́ЛЬНОЕ РАСТЯЖЕ́НИЕ (aponeurosis) — см. *Апоневроз*.

СУХОЖИ́ЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫ́ЧКИ (intersectiones tendineae, PNA; inscriptiones tendineae, BNA, JNA) — состоящие из пучков коллагеновых волокон участки прямой мышцы живота, делящие ее на сегменты.

СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ЦЕНТР (centrum tendineum, PNA, BNA, JNA) — центральная часть диафрагмы, образованная пересекающимися пучками сухожильных волокон.

СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШЛЕМ (galea aponeurotica, PNA, BNA, JNA; aponeurosis epicranialis, PNA) — апоневроз надчерепной мышцы, расположенный между кожей и надкостницей и покрывающий свод черепа.

СУХО́ТКА СПИННО́ГО МО́ЗГА — см. *Tabes dorsalis*.

СУХОЯДЕ́НИЕ — исключение жидкости из пищевого рациона в течение суток; применяется при исследовании концентрационной способности почек.

СУ́ЧЬЕ ВЫ́МЯ (устар.) — см. *Гидраденит*.

СУШИ́ЛЬНЫЙ ШКАФ — камера с регулируемым подогревом, предназначенная для испарения влаги из каких-либо предметов и веществ при температуре 40—200°; применяется в лабораторной практике.

СФЕНОИДИ́Т (sphenoiditis; анат. sinus sphenoidalis клиновидная пазуха + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки клиновидной пазухи; острый С. обычно возникает как следствие острого ринита, хронический С. чаще сопутствует воспалению задних ячеек решетчатого лабиринта.

СФЕНОЦЕФАЛИ́Я (sphenocephalia; греч. sphēn клин + kephalē голова) — аномалия развития: клиновидная форма черепа.

СФЕРИ́ЧЕСКИЙ КАРМА́Н — см. *Сферическое углубление*.

СФЕРИ́ЧЕСКИЙ МЕШО́ЧЕК (sacculus, PNA, BNA, JNA, LNH; син. мешочек) — часть перепончатого лабиринта, расположенная в сферическом углублении преддверия и сообщающаяся с улитковым протоком.

СФЕРИ́ЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕ́НТ РЕФРА́КЦИИ ГЛА́ЗА — средняя арифметическая величина показателей рефракции (в диоптриях) астигматического глаза по двум главным меридианам.

СФЕРИ́ЧЕСКОЕ УГЛУБЛЕ́НИЕ (recessus sphericus, PNA; recessus sphaericus, BNA; recessus sacculi, JNA; син.: сферический карман, углубление мешочка, углубление сферического мешочка) — шаровидное углубление на медиальной стенке преддверия костного лабиринта внутреннего уха, соединяющееся с улитковой; в С. у. расположен сферический мешочек.

СФЕРО- (греч. sphaira шар) — составная часть сложных слов, означающая «имеющий сферическую поверхность», «шаровидный».

СФЕРОБЛАСТО́МА (sphaeroblastoma; *сферо-* + *бластома*) — см. *Медуллобластома*.

СФЕРОЛИ́Т (*сферо-* + греч. lithos камень) — микроскопическое шаровидное образование в желчи, представляющее собой каплю жира или холестерина; предшественник желчного конкремента.

СФЕРОЛИ́Т ЭПИФИЗА́РНЫЙ (sphero-lithus epiphysialis, LNH) — расположенное в паренхиме шишковидного тела (эпифиза) плотное образование в виде слоистого шарика, состоящего гл. обр. из фосфатов и карбонатов кальция.

СФЕРОПЛА́СТ (*сферо-* + греч. plastos созданный, образованный) — бактериальная клетка с частично разрушенной (редуцированной) клеточной стенкой, характеризующаяся неустойчивостью к изменениям осмотического давления.

СФЕРОФАКИ́Я (sphaerophakia; *сферо-* + греч. phakos чечевица) — семейно-наследственная аномалия развития: шаровидная форма хрусталика.

СФЕРОФАКИ́Я-БРАХИМОРФИ́Я — см. *Маркезани синдром*.

СФЕРОЦИ́Т (sphaerocytus; *сферо-* + гист. cytus клетка) — эритроцит сферической формы; обнаруживаются при гемолитических анемиях.

СФИГМО- (греч. sphygmos пульс, пульсация, биение сердца) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к пульсу».

СФИГМОГРА́ММА (*сфигмо-* + греч. gramma запись; син. пульсовая кривая) — кривая, отражающая пульсовые колебания стенки артерии.

С. ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКАЯ — С., регистрируемая на периферической артерии.

С. ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ — С., регистрируемая на общей сонной артерии.

СФИГМО́ГРАФ (*сфигмо-* + греч. graphō писать, изображать) — прибор для графической регистрации пульсовых колебаний стенок артерий.

СФИГМОГРАФИ́ЧЕСКАЯ ПРИСТА́ВКА — прибор для регистрации сфигмограммы с помощью электрокардиографа, представляющий собой набор датчиков, воспринимающих пульсовые колебания стенок артерий и преобразующих их в электрические сигналы.

СФИГМОГРАФИ́Я (*сфигмо-* + греч. graphō писать, изображать; син. сфигмоосциллография) — метод исследования гемодинамики, основанный на регистрации пульсовых колебаний стенок артерий.

С. ПРЯМА́Я — С., при к-рой датчик укрепляют непосредственно на стенке артерии.

СФИГМОГРАФИ́Я ОБЪЁМНАЯ — плетизмография части тела (напр., ко-

нечности), содержащей кровеносные сосуды крупного калибра.

СФИГМОКАРДИОХРОНО́ГРАФ (устар.; *сфигмо-* + греч. kardia сердце + *хронограф*; син. сфигмохронограф) — прибор для одновременной регистрации сердечного толчка и периферического артериального пульса.

СФИГМОМАНО́МЕТР (*сфигмо-* + *манометр*) — прибор для измерения артериального давления непрямым методом по Короткову, представляющий собой разновидность манометра.

С. МЕМБРА́ННЫЙ — С., в к-ром индикатором артериального давления служит механический мембранный манометр.

С. РТУ́ТНЫЙ (син. Рива-Роччи аппарат) — С., в к-ром индикатором артериального давления служит ртутный манометр.

СФИГМОМАНОМЕТРИ́Я (син. сфигмотонометрия) — измерение артериального давления сфигмоманометром.

СФИГМООСЦИЛЛОГРАФИ́Я (*сфигмо-* + *осциллография*) — см. *Сфигмография*.

СФИГМОТЕНЗИО́ГРАФ (*сфигмо-* + лат. tensio напряжение + греч. graphō писать, изображать) — прибор для одновременной регистрации величины артериального давления и пульсовых колебаний стенки артерии.

СФИГМОТОНОГРАФИ́Я (*сфигмо-* + *тонография*) — графическая регистрация изменений артериального давления во времени.

СФИГМОТОНОМЕТРИ́Я (*сфигмо-* + *тонометрия*) — см. *Сфигмоманометрия*.

СФИГМОФОНИ́Я (*сфигмо-* + греч. phōnē звук) — регистрация звуковых феноменов, возникающих при прохождении крови по артерии.

СФИГМОХРОНО́ГРАФ (устар.; *сфигмо-* + *хронограф*) — см. *Сфигмокардиохронограф*.

СФИНГОЗИ́Н — двухатомный непредельный аминоспирт ациклического ряда, входящий в состав сфинголипидов; ингибитор превращения протромбина в тромбин.

СФИНГОЛИПИДО́ЗЫ (sphingolipidoses; сфинголипиды + *-оз*) — наследственные болезни, характеризующиеся нарушениями обмена сфинголипидов, обусловленными недостаточностью соответствующих ферментов; включают нек-рые болезни накопления и лейкодистрофии; наследуются по рецессивному типу.

СФИНГОЛИПИ́ДЫ — сложные липиды, в состав к-рых входит сфингозин; содержатся в биологических мембранах, миелиновых оболочках нервных волокон и др.

СФИНГОМИЕЛИНО́З (sphingomyelinosis; сфингомиелины + *-оз*) — см. *Нимана — Пика болезнь*.

СФИНГОМИЕЛИ́НЫ — группа сфинголипидов, в к-рых сфингозин связан фосфодиэфирной связью с холином; содержатся в различных тканях организма, гл. обр. в нервной; входят в состав миелиновых оболочек нервных волокон.

СФИ́НКТЕР (musculus sphincter, PNA, BNA, JNA; греч. sphinktēr, от sphingō крепко стягивать, сжимать; син. жом) — круговая мышца, сжимающая полый орган или замыкающая какое-либо отверстие.

С. ВЛАГА́ЛИЩА (m. sphincter vaginae) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *388*.

СФИ́НКТЕР ГИ́РША — см. *Гирша сфинктер*.

С. ЗА́ДНЕГО ПРОХО́ДА ВНУ́ТРЕННИЙ (m. sphincter ani internus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *794*.

С. ЗА́ДНЕГО ПРОХО́ДА КО́ЖНЫЙ (m. sphincter ani cutaneus) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *793*.

С. ЗА́ДНЕГО ПРОХО́ДА НАРУ́ЖНЫЙ (m. sphincter ani externus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *793*.

С. ЗА́ДНЕГО ПРОХО́ДА ТРЕ́ТИЙ (m. sphincter ani tertius) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *795*.

С. ЗРАЧКА́ (m. sphincter pupillae, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *798*.

С. ИЛЕОЦЕКА́ЛЬНЫЙ (m. sphincter ileocaecalis) — С., образованный мышечными волокнами стенки подвздошной кишки, вдающимися в илеоцекальную заслонку; замыкает одноименное отверстие.

СФИ́НКТЕР КЕ́ННОНА — см. *Кеннона сфинктер*.

СФИ́НКТЕР ЛЮ́ТКЕНСА — см. *Люткенса сфинктер*.

С. МОЧЕВО́ГО ПУЗЫРЯ́ (m. sphincter vesicae, PNA, JNA) — утолщение среднего (циркулярного) слоя мышечной оболочки мочевого пузыря в области внутреннего отверстия мочеиспускательного канала.

С. МОЧЕИСПУСКА́ТЕЛЬНОГО КАНА́ЛА (m. sphincter urethrae, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *800*.

СФИ́НКТЕР НЕЛАТО́НА — см. *Нелатона сфинктер*.

С. О́БЩЕГО ЖЁЛЧНОГО ПРОТО́КА (m. sphincter ductus choledochi, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *796*.

СФИ́НКТЕР О́ДДИ (sphincter Oddi) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *791*.

С. ПЕЧЁНОЧНО-ПОДЖЕЛУ́ДОЧНОЙ А́МПУЛЫ (m. sphincter ampullae hepatopancreaticae, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *791*.

С. ПРИВРА́ТНИКА (m. sphincter pylori, PNA, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *799*.

СФИНКТЕРИ́Т (sphincteritis; *сфинктер* + *-ит*) — воспаление какого-либо сфинктера, чаще печеночно-поджелудочной ампулы.

СФИНКТЕРОМЕТРИ́Я (*сфинктер* + греч. metreō измерять) — совокупность методов измерения тонуса сфинктеров.

СФИНКТЕРОПЛА́СТИКА (sphincteroplastica; *сфинктер* + *пластика*) — пластическая операция: восстановление или формирование нового сфинктера.

СФИНКТЕРОРАФИ́Я (sphincterorrhaphia; *сфинктер* + греч. rhaphē шов) — хирургическая операция: ушивание сфинктера, напр. наружного сфинктера заднего прохода.

СФИНКТЕРОТОМИ́Я (sphincterotomia; *сфинктер* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение какого-либо сфинктера при его рубцовой стриктуре.

СФИНКТЕРЭКТОМИ́Я (sphincterectomia; *сфинктер* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление какого-либо сфинктера.

СФИ́РИОН (sphyrion; син. нижнеберцовая точка) — антропометрическая точка: самая нижняя точка медиальной лодыжки.

СХВА́ТКИ (labores parturientium; dolores ad partum; син. родовые схватки) — периодически повторяющиеся болезненные сокращения матки в родах.

СХЕ́МА ОБЛУЧЕ́НИЯ — графическое изображение способа формирования дозного поля в теле больного при лучевой терапии.

СХЕ́МА ТЕ́ЛА — сложный вид чувствительности, лежащий в основе ощущения взаимного расположения и соотношения размеров частей собственного тела.

СХЕ́МА ФРАКЦИОНИ́РОВАНИЯ — распределение сеансов облучения в курсе лучевой терапии с указанием значений дозных фракций и временных интервалов между ними.

СХЕ́МА ЭКРАНИРО́ВКИ — изображение участков тела больного, подлежащих защите от ионизирующего излучения при лучевой терапии.

СХИНДИЛЁЗ (schindylesis, PNA; греч. schindylēsis расщепление; син. шиндилез) — фиброзное соединение костей, при котором острый край одной кости входит между расщепленными краями другой, напр. соединение сошника с клиновидным клювом.

СЦЕ́НДИ ОПЕРА́ЦИЯ (B. Szendi) — хирургическая операция: сшивание передней и задней губы шейки матки после иссечения слизистой оболочки вокруг ее отверстия (наружного зева); применяется при лечении истмико-цервикальной недостаточности.

СЦЕПЛЕ́НИЕ генов — связь между генами, исключающая или ограничивающая возможность их независимого наследования и обусловленная расположением генов в одной хромосоме.

СЦИНТИ- (лат. scintillo сверкать, мерцать) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сцинтилляции».

СЦИНТИГРА́Ф (*сцинти-* + греч. graphō писать, изображать) — см. *Гамма-топограф*.

СЦИНТИГРАФИ́Я (*сцинти-* + греч. graphō писать, изображать; син. радиосцинтиграфия) — радиоизотопный метод визуализации распределения радиофармацевтического препарата в организме, органе или ткани.

СЦИНТИЛЛЯ́ТОРЫ (лат. scintillo, scintillatum сверкать, мерцать) — вещества, в к-рых под действием ионизирующего излучения возникают сцинтилляции; применяются, напр., в приборах для радиоизотопной диагностики.

СЦИНТИЛЛЯ́ЦИЯ (лат. scintillatio сверкание) — кратковременная световая вспышка, возникающая при прохождении заряженной частицы через нек-рые вещества; регистрация С. используется, напр., в радиоизотопной диагностике.

СЦИНТИСКОПИ́Я (истор.; *сцинти-* + греч. skopeō наблюдать, рассматривать; син. радиосцинтископия) — метод исследования распределения радиоактивных веществ в организме (или в отдельном органе) путем получения изображения на экране с помощью неподвижного детектора излучения.

СЧЁТНАЯ ЕДИНИ́ЦА — см. *Единица наблюдения*.

СЧЁТНАЯ КА́МЕРА — приспособление для подсчета под микроскопом количества объектов, невидимых невооруженным глазом (напр., форменных элементов крови, микроорганизмов), в единице объема их взвеси.

СЧЁТНАЯ КА́МЕРА БЮ́РКЕРА — см. *Бюркера счетная камера.*

СЧЁТНАЯ КА́МЕРА ГОРЯ́ЕВА — см. *Горяева счетная камера.*

СЧЁТЧИК ИЗЛУЧЕ́НИЯ — общее название приборов для регистрации и измерения ионизирующих излучений; различные С. и. входят в состав дозиметрической и радиодиагностической аппаратуры, применяемой в гигиене и медицинской радиологии.

СЧЁТЧИК ИО́НОВ — прибор для определения суммарного заряда аэроионов в единице объема, применяемый для контроля при аэроионотерапии.

СЧЁТЧИК КЛЕ́ТОК КРО́ВИ АВТОМАТИ́ЧЕСКИЙ (син.: автоанализатор морфологический, гематологический автомат) — прибор, автоматически подсчитывающий количество клеток крови в единице объема.

СЧЁТЧИК КЛЕ́ТОК КРО́ВИ КОНДУКТОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ — см. *Электрогемоскоп.*

СЧЁТЧИК ПУ́ЛЬСА — см. *Пульсотахометр.*

СШИ́БКА — столкновение процессов возбуждения и торможения в ц. н. с., приводящее к срыву высшей нервной деятельности.

СШИВА́ТЕЛЬ — см. *Аппарат сшивающий.*

СЫВОРО́ТКА иммунная (serum) — сыворотка крови, полученная от человека или животного, иммунизированного каким-либо антигеном, и содержащая антитела к этому антигену; применяется в качестве лечебного или диагностического средства.

С. АДСОРБИ́РОВАННАЯ (s. adsorptum; син. С. истощенная) — С., из к-рой извлечены нек-рые из содержащихся в ней антител.

С. АНТИБАКТЕРИА́ЛЬНАЯ (s. antibacteriale; син. С. антимикробная) — С., содержащая антитела к антигенам бактерии определенного вида или отдельных ее компонентов.

С. АНТИГЛОБУЛИ́НОВАЯ (s. antiglobulinicum; син. С. противоглобулиновая) — С., содержащая антитела к глобулинам человека или животных другого вида.

С. АНТИГЛОБУЛИ́НОВАЯ КУ́МБСА — см. *Кумбса антиглобулиновая сыворотка.*

С. АНТИЛИМФОЦИТА́РНАЯ (s. antilymphocyticum; АЛС) — гипериммунная С., содержащая антитела к лимфоидным клеткам, преимущественно лимфоцитам; обладает выраженным иммунодепрессивным действием.

С. АНТИМИКРО́БНАЯ (s. antimicrobiale) — см. *Сыворотка антибактериальная.*

С. АНТИРЕТИКУЛЯ́РНАЯ ЦИТОТОКСИ́ЧЕСКАЯ (s. antireticulare cytotoxicum; АЦС; син. Богомольца сыворотка) — цитотоксическая С., содержащая антитела к ретикулярной ткани костного мозга и селезенки человека; предложена для стимуляции активности соединительной ткани, напр. при длительно не заживающих язвах и ранах.

С. АНТИТИМОЦИТА́РНАЯ (s. antithymocyticum) — С., содержащая антитела к антигенам тимоцитов.

С. АНТИТОКСИ́ЧЕСКАЯ (s. antitoxicum) — С., содержащая антитоксин.

С. АНТИФА́ГОВАЯ (s. antiphagicum) — С., содержащая антитела к антигенам какого-либо фага и способная нейтрализовывать его инфекционную активность.

СЫВОРО́ТКА БОГОМО́ЛЬЦА — см. *Сыворотка антиретикулярная цитотоксическая.*

С. ГЕМОЛИТИ́ЧЕСКАЯ (s. haemolyticum) — С., содержащая гемолизины к чужеродным эритроцитам.

С. ГИПЕРИММУ́ННАЯ (s. hyperimmune) — С., содержащая антитела в более высоких титрах, чем обычная иммунная С., что достигается повторной иммунизацией животного или человека-донора.

С. ДИАГНОСТИ́ЧЕСКАЯ (s. diagnosticum) — С., используемая для серодиагностики.

С. ДИАГНОСТИ́ЧЕСКАЯ ТИПОСПЕЦИФИ́ЧЕСКАЯ (s. diagnosticum typospecificum) — диагностическая С., содержащая антитела к антигенам, присущим микроорганизмам только данного серовара (серотипа).

С. ИЗОИММУ́ННАЯ (s. isoimmune) — С., содержащая антитела, направленные к антигенам, специфичным для другого индивидуума или особи того же биологического вида.

С. ИСТОЩЁННАЯ — см. *Сыворотка адсорбированная.*

С. ЛЕЙКОЦИТОТОКСИ́ЧЕСКАЯ (s. leucocytotoxicum) — С., содержащая антитела к антигенам лейкоцитов и оказывающая на них токсическое действие.

С. МОНОРЕЦЕПТО́РНАЯ (s. monoreceptorium) — см. *Сыворотка моноспецифическая.*

С. МОНОСПЕЦИФИ́ЧЕСКАЯ (s. monospecificum; син. С. монорецепторная) — 1) С., содержащая антитела к одному из антигенов сложного антигенного комплекса; 2) С., содержащая антитела к одной детерминантной группе антигена.

С. ПОЛИВАЛЕ́НТНАЯ (s. polyvalens; син. С. полиспецифическая) — 1) С., содержащая антитела к нескольким антигенам; 2) С., содержащая антитела к нескольким детерминантным группам антигена.

С. ПОЛИСПЕЦИФИ́ЧЕСКАЯ (s. polyspecificum) — см. *Сыворотка поливалентная.*

С. ПРЕЦИПИТИ́РУЮЩАЯ (s. praecipitans) — С., содержащая антитела, способные преципитировать растворимый антиген.

С. ПРОТИВОГЛОБУЛИ́НОВАЯ (s. antiglobulinicum) — см. *Сыворотка антиглобулиновая.*

С. СПЕРМОЦИТОТОКСИ́ЧЕСКАЯ (s. spermocytotoxicum) — С., содержащая цитотоксические антитела к антигенам сперматозоидов.

С. СТАНДА́РТНАЯ (s. standartisatum) — С., содержащая заданное требованиями (стандартом) количество антител к определенному антигену в единице объема.

С. ЦИТОТОКСИ́ЧЕСКАЯ (s. cytotoxicum) — С., содержащая антитела к антигенам, находящимся на клеточной оболочке; в присутствии комплемента способна вызвать гибель соответствующих клеток.

СЫВОРО́ТКА АУТОЛОГИ́ЧНАЯ (serum autologicum)— сыворотка крови того же индивидуума, к-рому ее вводят.

СЫВОРО́ТКА ГЕТЕРОЛОГИ́ЧНАЯ (serum heterologicum) — сыворотка крови, полученная от особей другого биологического вида.

СЫВОРО́ТКА КРО́ВИ (serum sanguinis) — составная часть крови, представляющая собой плазму, из к-рой удален фибриноген.

СЫВОРО́ТКА ЛА́КМУСОВАЯ ПЕТРУ́ШКИ — см. *Петрушки лакмусовая сыворотка.*

СЫВОРО́ТОЧНЫЙ УСКОРИ́ТЕЛЬ ПРЕВРАЩЕ́НИЯ ПРОТРОМБИ́НА— см. *Фактор VII.*

СЫПЬ (-И) (eruptio, efflorescentia; син.: высыпания, эффлоресценция) — общее название наружных очаговых патологических изменений кожи (экзантема) и слизистых оболочек (энантема).

С. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКАЯ (e. allergica) — полиморфная С., возникающая как проявление аллергической реакции.

С. ВАКЦИ́ННАЯ (e. vaccinalis) — см. *Токсидермия вакцинная.*

С. КОРЕВА́Я (e. morbillica) — С. при кори в виде пятен и папул, появляющихся в первые три дня на лице и шее, а затем на туловище и конечностях; сопровождается зудом.

С. ЛЕКА́РСТВЕННАЯ (e. medicamentosa; син. С. медикаментозная) — общее название С. при медикаментозных токсидермиях и дерматитах.

С. МЕДИКАМЕНТО́ЗНАЯ — см. *Сыпь лекарственная.*

С. МЕНИНГОКОККЕМИ́ЧЕСКАЯ (e. meningococcaemica) — С. при менингококкемии, появляющаяся с 1—2-го дня болезни на конечностях, туловище, веках в виде множественных кровоизлияний неправильной звездчатой формы плотных на ощупь, занимающих иногда обширные участки кожи.

С. МОНОМО́РФНАЯ (e. monomorpha) — С., представленная однотипными морфологическими элементами, напр. папулами или пузырями.

С. ПОЛИМО́РФНАЯ (e. polymorpha) — С., представленная одновременно различными морфологическими элементами, напр. везикулами, эритемой, папулами.

С. СКАРЛАТИНО́ЗНАЯ (e. scarlatinosa) — С. при скарлатине в виде точечных пятен и кровоизлияний, иногда мелких папул, появляющихся в первые два дня болезни на всем теле, кроме носа, губ и подбородка (треугольник Филатова).

СЫПЬ РУДОКО́ПОВ — см. *Анкилостомидозы кожи.*

СЫРОВИ́ДНАЯ СМА́ЗКА (vernix caseosa) — см. *Первородная смазка.*

СЫРОЯДЕ́НИЕ — вид вегетарианства, сторонники к-рого употребляют исключительно сырую растительную пищу.

СЬЁГРЕНА СИНДРО́М (H. S. C. Sjögren, род. в 1899 г., шведский офтальмолог) — см. *Гужеро — Шегрена синдром.*

СЬЕ́РА СИМПТО́М (C. Sieur, род. в 1860 г., франц. хирург) — выслушиваемый на одной стороне задней стенки грудной клетки тимпанит с металлическим оттенком при аускультаторной

перкуссии, производимой постукиванием ребром монеты по другой монете, приложенной к коже в области грудины; признак спонтанного пневмоторакса.

СЭС — см. *Санитарно-эпидемиологическая станция.*

СЮЛЬВЕСТА БОЛЕ́ЗНЬ (E. O. S. Sylvest, 1880—1931, датский врач) — см. *Плевродиния эпидемическая.*

СЮРСИМУЛЯ́ЦИЯ (франц. приставка sur-, означающая высшую степень чего-либо + *симуляция*) — воспроизведение психически больным признаков психической болезни, не свойственных его заболеванию, напр. больным шизофренией — признаков псевдодеменции.

T

T$^1/_2$ — см. *Период полураспада.*

Т-СИСТЕМА — см. *Поперечная трубочка.*

ТА́АРНХО ОПЕРА́ЦИЯ (P. Taarnhøj, датский нейрохирург 20 в.) — см. *Торнхёя операция.*

ТАБАКО́З (tabacosis; табак + *-оз*) — пневмокониоз, развивающийся при систематическом вдыхании табачной пыли.

ТАБАКОКУРЕ́НИЕ (син. курение табака) — вредная привычка, заключающаяся во вдыхании дыма тлеющего табака; оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщиков и окружающих их лиц.

ТАБА́ЧНИКА СИНДРО́М (Tabatznik) — наследственное сочетание аритмии сердца с аномалией развития верхних конечностей, обычно в виде укорочения большого пальца; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

TÁBES DORSÁLIS (лат. tabes разрушение, истощение, тяжелая болезнь; dorsum спина; син. сухотка спинного мозга) — форма позднего нейросифилиса, характеризующаяся развитием дегенеративных изменений в задних корешках и в задних столбах спинного мозга; проявляется нарушением глубокой чувствительности, сенситивной атаксией, арефлексией, синдромом Аргайлла Робертсона, стреляющими болями в ногах и вегетативными кризами.

TÁBES MESARÁICA (греч. mesaraion брыжейка) — туберкулез брыжеечных лимфатических узлов у детей; проявляется снижением питания, лихорадкой, вздутием и болезненностью живота, ночными потами.

ТАБЛЕ́ТКА (tabuletta; франц. tablette, от лат. tabula доска, плитка) — твердая дозированная лекарственная форма, получаемая путем прессования ингредиентов.

Т. КИШЕ́ЧНО-РАСТВОРИ́МАЯ — Т., покрытая оболочкой из веществ, нерастворимых в кислом содержимом желудка, но хорошо растворимых в содержимом кишечника.

ТАБОПАРАЛИ́Ч (taboparalysis; *tabes dorsalis* + *паралич*) — сочетание прогрессивного паралича с tabes dorsalis.

ТАВЕ́ЛЯ БОЛЕ́ЗНЬ (E. Tavel, 1852—1912, швейц. хирург) — периколит после аппендэктомии, характеризующийся образованием спаек и сужением толстой кишки, лихорадкой и расстройствами функции кишечника.

ТАВИЛДА́РОВА СПО́СОБ (истор.) — хирургическая операция: имплантация устья мочеточника в непокрытый брюшиной участок прямой кишки, применявшаяся при раке, туберкулезе и других тяжелых поражениях мочевого пузыря.

ТАГАНИ́ДЗЕ ЖГУТ (А. Р. Таганидзе, сов. хирург) — кровоостанавливающий жгут, представляющий собой плоский ремень из резины или прорезиненной ткани с фиксирующей пряжкой.

ТАДДЕ́И ТИФЛОУРЕТЕРОСТОМИ́Я (D. Taddei, итал. хирург конца 19 — начала 20 в.) — хирургическая операция: имплантация устьев мочеточников в слепую кишку при экстрофии мочевого пузыря.

ТАЗ (pelvis, PNA, BNA, JNA) — замкнутое костное кольцо, образованное двумя тазовыми костями, крестцом и копчиком, дающее опору нижним конечностям.

Т. АНАТОМИ́ЧЕСКИ У́ЗКИЙ (син. Т. узкий) — Т. у женщины, хотя бы один из размеров к-рого уменьшен более чем на 1,5 *см* по сравнению с принятой в акушерстве нормой.

Т. БОЛЬШО́Й (p. major, PNA, BNA, JNA) — верхний отдел Т., образованный крыльями подвздошных костей, V поясничным позвонком и большей частью крестца.

Т. ВОРО́НКООБРА́ЗНЫЙ (p. infundibuliformis) — анатомически узкий Т., характеризующийся нарастающим уменьшением прямых размеров в направлении от входа к выходу таза.

Т. ГИПОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (p. hypoplastica) — общеравномерносуженный Т. у низкорослых женщин пропорционального телосложения.

Т. ДЕВЕНТЕ́РОВСКИЙ — см. *Таз простой плоский.*

Т. ДЕ́ТСКОГО ТИ́ПА — см. *Таз инфантильный.*

Т. ЖЕ́НСКИЙ МУЖСКО́ГО ТИ́ПА (p. feminina androidea) — симметричный анатомически суженный Т., характеризующийся признаками, свойственными строению таза у мужчин: полостью в форме высокого усеченного конуса, более острым подлобковым углом, большей толщиной всех тазовых костей.

Т. ИНФАНТИ́ЛЬНЫЙ (p. infantilis; син.: Т. детского типа, Т. юношеский) — симметричный анатомически суженный Т., характеризующийся признаками, присущими детскому возрасту: узким и малоизогнутым крестцом, высоким стоянием мыса, более острым подлобковым углом, круглой или продольно-овальной формой входа в таз.

Т. КА́РЛИКОВЫЙ (p. nana) — крайняя форма гипопластического Т. у женщин карликового роста.

Т. КЛИНИ́ЧЕСКИ У́ЗКИЙ (син. Т. узкий) — Т. у женщины, по своим размерам или форме представляющий препятствие для прохождения плода в родах.

Т. КОКСАЛГИ́ЧЕСКИЙ (p. coxalgica) — асимметрично суженный Т. вследствие коксита, перенесенного в детском возрасте.

Т. КОСОСМЕ́ЩЕННЫЙ (p. oblique dislocata) — см. *Таз кососуженный.*

Т. КОСОСУ́ЖЕННЫЙ (p. oblique contracta; син.: Т. кососмещенный, Т. узкий асимметричный) — анатомически узкий Т. с неодинаковым сужением его половин; наблюдается, напр., при искривлениях позвоночника, кокситах.

Т. ЛОРДО́ЗНЫЙ (p. lordotica) — анатомически узкий Т. с уменьшенным прямым размером входа в таз; обусловлен лордозом в пояснично-крестцовом отделе.

Т. МА́ЛЫЙ (p. minor, PNA, BNA, JNA) — нижняя часть Т., отделенная от большого Т. пограничной линией; образован сзади верхушкой крестца и копчиком, с боков — подвздошными и седалищными костями, спереди — лобковыми костями и лобковым симфизом.

ТАЗ НЕ́ГЕЛЕ — см. *Негеле таз.*

Т. ОБЩЕРАВНОМЕРНОСУ́ЖЕННЫЙ (p. aequabiliter contracta) — анатомически узкий Т., все размеры к-рого уменьшены практически на одну и ту же величину.

Т. ОСТЕОМАЛЯТИ́ЧЕСКИЙ (p. osteomalacica) — анатомически узкий Т., лобковый симфиз к-рого клювовидно выступает вперед, а выход из малого таза резко уменьшен в связи со смещением внутрь обоих седалищных бугров и нижней части крестца с копчиком; наблюдается при остеомаляции.

Т. ПЛО́СКИЙ (p. plana) — анатомически узкий Т. с уменьшенными одним или несколькими[1] прямыми размерами при нормальных поперечных и косых размерах.

Т. ПЛО́СКИЙ ОБЩЕСУ́ЖЕННЫЙ — анатомически узкий Т., все размеры к-рого уменьшены, но прямые — в большей степени, чем косые и поперечные.

Т. ПЛОСКОРАХИТИ́ЧЕСКИЙ (p. plana rachitica) — плоский Т., у к-рого уменьшен только прямой размер входа в малый таз; наблюдается у женщин, перенесших рахит.

Т. ПОПЕРЕ́ЧНО-СУ́ЖЕННЫЙ (p. transversocontracta) — анатомически узкий Т., у к-рого уменьшены все поперечные размеры.

Т. ПРОСТО́Й ПЛО́СКИЙ (p. simplex plana; син. девентеровский таз) — плоский Т., у к-рого уменьшены все прямые размеры.

Т. СКОЛИОТИ́ЧЕСКИЙ (p. scoliotica) — кососуженный Т., возни-

кающий при сколиозе в поясничном отделе позвоночника.

Т. СПОНДИЛОЛИСТЕТИ́ЧЕСКИЙ (p. spondylolisthetica) — анатомически узкий Т., прямой размер входа к-рого уменьшен вследствие соскальзывания тела V поясничного позвонка с основания крестца.

Т. У́ЗКИЙ (p. angusta) — 1) см. *Таз анатомически узкий*; 2) см. *Таз клинически узкий*.

Т. У́ЗКИЙ АСИММЕТРИ́ЧНЫЙ (p. angusta asymmetrica) — см. *Таз кососуженный*.

Т. ЮНОШЕ́СКИЙ (p. juvenilis) — см. *Таз инфантильный*.

ТА́ЗОВАЯ ПО́ЛОСТЬ (cavum pelvis, PNA, BNA, JNA; син. полость таза) — внутреннее пространство малого таза, выстланное внутритазовой фасцией, вверху сообщающееся с полостью живота, условную границу с к-рой составляет плоскость входа в малый таз.

ТА́ЗОВОЕ ДНО (fundus pelvis) — совокупность мягких тканей, занимающих нижнюю апертуру таза; основу Т. д. составляет диафрагма таза и мочеполовая диафрагма.

ТА́ЗОВО-ПРЕДСТА́ТЕЛЬНАЯ КА́ПСУЛА (capsula pelvioprostatica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *977*.

ТА́ЗОВЫЕ ПЯ́ТНА — небольшие интенсивные затемнения округлой или овальной формы, обнаруживаемые на рентгенограммах таза; обычно соответствуют флеболитам и сесамовидным косточкам сухожилий мышц тазового дна.

ТА́ЗОВЫЙ ВХОД (aditus pelvis, JNA) — см. *Апертура таза верхняя*.

ТА́ЗОВЫЙ ВЫ́ХОД (exitus pelvis, JNA) — см. *Апертура таза нижняя*.

ТА́ЗОВЫЙ ПО́ЯС — 1) см. *Пояс нижней конечности*; 2) приспособление для стягивания поврежденных костей при лечении переломов таза, представляющее собой широкий пояс, изготовленный из ткани и ваты.

ТАЗОМЕ́Р — инструмент в виде циркуля, снабженного сантиметровой шкалой, предназначенный для измерения наружных размеров таза, а также длины плода и размеров его головки.

ТАЗОПОДЪЁМНИК — гидравлическое или пневматическое устройство для приподнимания нижней части туловища лежачего больного при уходе за ним.

ТАЗОУГЛОМЕ́Р — прибор для измерения угла наклона таза к горизонтальной плоскости; применяется в акушерской практике.

ТАЙР — см. *Беджель*.

ТА́ЙДЖЕСОНА КЕРАТИ́Т (P. Thygeson) — см. *Кератит точечный поверхностный*.

ТА́ЙДЖЕСОНА КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИ́Т (P. Thygeson) — см. *Кератит точечный поверхностный*.

ТАКА́ТА РЕА́КЦИЯ (M. Takata, род. в 1892 г., японский патолог; син. Таката — Ара реакция) — коагуляционная проба, при к-рой в качестве действующего на сыворотку крови агента используют раствор хлорида ртути и карбоната натрия; проба считается положительной при наличии помутнения в нескольких разведениях сыворотки.

ТАКА́ТА — А́РА РЕА́КЦИЯ (M. Takata, род. в 1892 г., японский патолог; K. Ara, род. в 1894 г., японский психиатр) — см. *Таката реакция*.

ТАКАХА́РЫ БОЛЕ́ЗНЬ (Sh. Takahara, японский врач) — см. *Акаталазия*.

ТАКАЯ́МЫ ПРО́БА (M. Takayama, род. в 1871 г., японский врач) — метод выявления крови в пятне, основанный на способности реактива, состоящего из пиридина, раствора едкого натра (10%) и насыщенного раствора глюкозы, при взаимодействии с гемоглобином образовывать красные кристаллы гемохромогена; применяется в судебной медицине.

ТАКАЯ́СУ СИНДРО́М (M. Takayasu, род. в 1872 г., японский врач; син.: болезнь отсутствия пульса, коарктация аорты инвертированная, панартериит множественный облитерирующий, синдром дуги аорты) — аутоаллергическая болезнь, характеризующаяся воспалительными и дистрофическими изменениями стенки аорты и отходящих от нее крупных артерий с их стенозированием, ишемией кровоснабжаемых ими органов и внутриартериальным тромбообразованием.

ТА́КСИС (греч. taxis расположение, порядок) — движение микроорганизмов, нек-рых подвижных клеток многоклеточных организмов или клеточных органелл, направленное к раздражителю или от него.

ТАКСО́Н — см. *Таксономическая категория*.

ТАКСОНОМИ́ЧЕСКАЯ КАТЕГО́РИЯ (греч. taxis расположение, порядок + nomos закон; син.: систематическая категория, таксон) — общее название классификационных групп животных или растений (вид, род, семейство и т. д.).

ТАКСОНО́МИЯ (греч. taxis расположение, порядок + nomos закон) — раздел систематики, изучающий принципы классификации животных и растений.

ТА́КТИКА МЕДИЦИ́НСКОЙ СЛУ́ЖБЫ (устар.) — см. *Организация и тактика медицинской службы*.

ТАКТИ́ЛЬНЫЙ (tactilis; лат. tango, tactum трогать, касаться) — относящийся к осязанию.

ТАЛАЛА́ЕВА ВАЛЬВУЛИ́Т (В. Т. Талалаев, 1886—1947, сов. патологоанатом) — см. *Эндокардит диффузный*.

ТАЛАЛА́ЕВА МЕ́ТОД (В. Т. Талалаев) — метод приготовления сухих пластинчатых музейных патологоанатомических препаратов внутренних органов путем фиксации тонкой пластинки ткани, восстановления ее естественного цвета и помещения в желатин или агар между двумя стеклами.

ТАЛАЛГИ́Я (talalgia; лат. talus лодыжка, пятка + греч. algos боль; син. невралгия пяточная) — боль в пяточной области.

ТАЛАМИ́ЧЕСКАЯ ЛУЧИ́СТОСТЬ ЗА́ДНЯЯ (radiatio thalamica posterior, PNA) — расположенная в белом веществе полушария большого мозга совокупность нервных волокон, идущих от таламуса к затылочной доле, а также в обратном направлении.

ТАЛАМИ́ЧЕСКАЯ ЛУЧИ́СТОСТЬ ПЕРЕ́ДНЯЯ (radiatio thalamica anterior, PNA) — расположенная в белом веществе полушария большого мозга совокупность нервных волокон, идущих от таламуса к лобной доле, а также в обратном направлении.

ТАЛАМИ́ЧЕСКАЯ ЛУЧИ́СТОСТЬ ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ (radiatio thalamica centralis, PNA) — расположенная в белом веществе полушария большого мозга совокупность нервных волокон, идущих от таламуса к пред- и постцентральной извилинам и теменной доле, а также в обратном направлении.

ТАЛАМОТОМИ́Я (thalamotomia; *таламус* + греч. tomē разрез, рассечение) — стереотаксическая операция: разрушение определенных ядер таламуса.

ТАЛА́МУС (thalamus, PNA, BNA, JNA; греч. thalamos комната, внутренние покои; син. зрительный бугор) — часть промежуточного мозга, представляющая собой парное скопление серого вещества латеральнее третьего желудочка; является подкорковым центром всех видов чувствительности.

Т. ВЕНТРА́ЛЬНЫЙ (t. ventralis, PNA) — часть Т., в состав к-рой входят его срединные, медиальные, вентролатеральные и задние ядра.

Т. ДОРСА́ЛЬНЫЙ (t. dorsalis, PNA) — часть Т., в состав к-рой входят его передние, медиальное дорсальное и предкрышечные ядра.

ТАЛАСС- (талассо-; греч. thalassa море) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к морю», «морской».

ТАЛАССЕМИ́Я (thalassaemia; *таласс-* + греч. haima кровь; син. анемия гемолитическая мишеневидно-клеточная) — наследственная гемолитическая анемия, характеризующаяся нарушением синтеза глобина (белка, входящего в состав гемоглобина); наследуется по рецессивному типу.

Т. БОЛЬША́Я (t. major; син.: анемия средиземноморская, анемия эритробластическая, Кули анемия) — гомозиготная форма Т., характеризующаяся выраженной гипохромной анемией, наличием мишеневидных эритроцитов, увеличением селезенки, утолщением длинных трубчатых костей и костей черепа.

Т. МА́ЛАЯ (t. minor; син.: Риетти — Греппи — Микели болезнь, Сильвестрони — Бьянко синдром) — гетерозиготная форма Т., характеризующаяся легкой гипохромной анемией, небольшим количеством мишеневидных эритроцитов, нек-рым увеличением селезенки.

Т. МИНИМА́ЛЬНАЯ (t. minima) — гетерозиготная форма Т., протекающая без клинических проявлений.

ТАЛАССО- — см. *Таласс-*.

ТАЛАССОТЕРАПИ́Я (*талассо-* + *терапия*; син. морелечение) — лечебное использование морских купаний и климата морского побережья.

ТАЛАССОФОБИ́Я (thalassophobia; *талассо-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь моря.

ТА́ЛИЯ СЕ́РДЦА — сужение рентгеновской тени сердца на границе между тенями сердца и крупных сосудов в передней проекции; при нек-рых болезнях сердца Т. с. бывает сглажена или деформирована.

ТА́ЛЛИЙ РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название группы радиоактивных изотопов таллия с массовым числом от 195 до 210 и периодом полураспада от долей секунды до 4 лет; отдельные изотопы используются в лучевой терапии, напр. для контактного облучения.

ТА́ЛОН (франц. talon) в антропологии — дистальная часть коронки верхнего коренного зуба.

ТАЛО́Н МЕДИЦИ́НСКОГО РАСПРЕДЕЛИ́ТЕЛЬНОГО ПУ́НКТА — учетно-эвакуационный документ в системе медицинской службы Гражданской обороны, содержащий номер больничного коллектора, куда направляется автомобиль с пораженными, и маршрут следования до соответствующей головной больницы или сортировочно-эвакуационного госпиталя.

ТАЛОНИ́Д в антропологии — часть коронки нижнего коренного зуба, объединяющая гипоконид, гипоконулид и энтоконид.

ТАЛЫ́ШИНСКОГО АНЕСТЕЗИ́Я (А. М. Талышинский, сов. оториноларинголог) — способ местного обезболивания при мастоидэктомии и радикальной операции на среднем ухе, заключающийся в анестезии новокаином сосцевидной области, шейного сплетения, заднего ушного нерва и стенок наружного слухового прохода.

ТА́ЛЬБОТА ЗАКО́Н (W. H. F. Talbot, 1800—1877, англ. ученый; син.: закон слияния мельканий, Тальбота — Плато закон, Толбота закон)— закон, согласно к-рому видимая человеком яркость источника прерывистого света, воспринимаемого непрерывным и неизменяющимся, равна яркости источника непрерывного света с тем же суммарным световым потоком.

ТА́ЛЬБОТА — ПЛАТО́ ЗАКО́Н (W. H. F. Talbot, 1800—1877, англ. ученый; Plateau) — см. *Тальбота закон.*

ТАЛЬКО́З (talcosis; тальк + *-оз*) — 1) пневмокониоз, вызываемый систематическим вдыханием пыли талька; 2)осложнение хирургической операции, вызванное попаданием талька с перчаток на раневые поверхности или серозные оболочки; характеризуется развитием в тканях хронического воспалительного процесса.

ТА́ЛЬМЫ — ДРА́ММОНДА ОПЕРА́ЦИЯ (S. Talma, 1847—1918, голландский хирург; D. Drummond, 1852—1932, англ. хирург) — хирургическая операция: подшивание большого сальника или края печени к передней брюшной стенке на месте удаленного участка париетальной брюшины, производимое при портальной гипертензии для создания коллатерального оттока крови из системы воротной вены.

ТАЛЬХА́ЙМЕРА — ФИ́ШЕРА МЕТО́ДИКА (Thalheimer; Fischer) — метод профилактики послеоперационного ацидоза, заключающийся в сочетании подкожного введения инсулина с внутривенным введением раствора глюкозы в течение нескольких дней до хирургической операции.

ТАМПО́Н (франц. tampon) — стерильная полоска марли, к-рой заполняют рану или полость, напр. с целью остановки кровотечения или эвакуации отделяемого.

ТАМПО́Н АНТИСЕПТИ́ЧЕСКИЙ БИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ (БАТ) — биопрепарат местного кровоостанавливающего действия, изготовляемый из плазмы крови человека с добавлением к ней нек-рых лекарственных средств (напр., хлористого кальция, пенициллина, желатины).

ТАМПО́Н ВЛАГА́ЛИЩНЫЙ — тампон с нанесенным на него лекарственным веществом, вводимый во влагалище с лечебной целью.

ТАМПО́Н МИКУ́ЛИЧА — см. *Микулича тампон.*

ТАМПО́Н ПНЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ МЕ́ЗРИНА — см. *Мезрина пневматический тампон.*

ТАМПОНА́ДА (нем. Tamponade, от франц. tampon тампон) — заполнение ран или полостей тампонами, участками других тканей (напр., сальника, мышцы) или нек-рыми биопрепаратами (напр., гемостатической ватой); производится с целью остановки кровотечения, обеспечения оттока гноя, заполнения дефекта и др.

ТАМПОНА́ДА ПО ВИШНЕ́ВСКОМУ — см. *Вишневского тампонада.*

ТАМПОНА́ДА ПО́ЛОСТИ ПЕРИКА́РДА — см. *Тампонада сердца.*

ТАМПОНА́ДА СЕ́РДЦА (син. тампонада полости перикарда) — сдавление сердца кровью или экссудатом, скопившимися в полости перикарда.

ТАМПО́НЫ ГРЯЗЕВЫ́Е — лечебные процедуры, заключающиеся в введении подогретой грязи во влагалище или прямую кишку.

ТАМУРИ́Я (thamuria; греч. thama часто + uron моча) — см. *Поллакиурия.*

ТАНАТО- (греч. thanatos смерть) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к смерти».

ТАНАТОГЕНЕ́З (thanatogenesis; *танато-* + *генез*) — динамика клинических, биохимических и морфологических изменений в процессе умирания.

ТАНАТОЛО́ГИЯ (*танато-* + греч. logos учение) — учение о закономерностях умирания и обусловленных ими изменениях в органах и тканях.

ТАНАТОЛО́ГИЯ СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ — раздел судебной медицины, изучающий процесс умирания и посмертные изменения органов и тканей применительно к целям и задачам судебно-медицинской экспертизы.

ТАНАТОФОБИ́Я (thanatophobia; *танато-* + *фобия*) — навязчивый страх смерти.

ТАНГЕНЦИА́ЛЬНЫЙ ЭФФЕ́КТ (лат. tangens соприкасающийся, граничащий) в рентгенологии — феномен уменьшения плотности линейного участка рентгеновской тени (на рентгенограмме), расположенного в месте ее пересечения с другой тенью и сопутствующего контуру последней; может явиться причиной ошибок при диагностике повреждений скелета.

ТА́НДЛЕРА СХЕ́МА (J. Tandler, 1869—1936, австрийский анатом) — схема расчета проекции долей и извилин большого мозга на кости черепа по наружным костным ориентирам.

«ТА́НЕЦ КАРОТИ́Д» — см. *Пляска сонных артерий.*

ТА́ННЕРА МЕ́ТОД (N. C. Tanner, амер. хирург) — хирургический доступ к кардиальной части желудка и к стволам блуждающего нерва с целью выполнения селективной ваготомии, заключающийся в правосторонней трансректальной лапаротомии.

ТА́ННЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (E. K. Tanner, род. в 1876 г., амер. хирург) — хирургическая операция: устранение кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, путем поперечного рассечения желудка, перевязки всех сосудов малого и большого сальника и последующего сшивания желудка.

ТАННИ́НЫ — группа фенольных соединений растительного происхождения; применяются, напр., для изготовления противовоспалительных и дезинфицирующих средств.

ТА́ННХАУЗЕРА ЦИРРО́З ПЕ́ЧЕНИ (S. J. Thannhauser, род. в 1885 г., нем. врач; син. цирроз печени ксантоматозный) — цирроз печени, характеризующийся выраженной гиперхолестеринемией и возникновением ксантом на коже.

ТАНТА́Л (Tantalum; Ta) — химический элемент V группы периодической системы Д. И. Менделеева; атомный номер 73, атомная масса 180,948; биологически инертный, тяжелый, тугоплавкий металл; применяется в медицине, напр., в качестве шовного материала.

ТАНТА́Л РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов тантала с массовыми числами от 176 до 186 и периодом полураспада от долей секунды до 600 суток; отдельные изотопы используются в лучевой терапии.

ТАНТА́ЛОВЫЕ СКРЕ́ПКИ — биологически инертный, нерассасывающийся шовный материал из тантала в виде миниатюрных скобок, применяемый для наложения механического хирургического шва полуавтоматическими сшивающими аппаратами.

ТА́ПИА СИНДРО́М (A. G. Tapia, 1875—1950, исп. оториноларинголог) — односторонний паралич мышц голосовой складки и языка, иногда сопровождающийся параличом грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц; обусловлен поражением ядер добавочного и подъязычного нервов при тромбозе задней нижней мозжечковой артерии.

ТАРАКА́Н(-Ы) (Blattoptera) — отряд насекомых, развивающихся без метаморфоза; распространены в странах с теплым и жарким климатом; синантропные (экологически связанные с поселениями человека) виды — Т. американский, Т. рыжий, Т. черный — распространены значительно шире.

Т. АМЕРИКА́НСКИЙ (Periplaneta americana) — вид Т., распространенных гл. обр. в странах западного полушария; портит и загрязняет пищевые продукты; механический переносчик возбудителей кишечных инфекций и инвазий; в кишечнике Т. а. возможно переживание микобактерий туберкулеза и лепры.

Т. РЫЖИЙ (Blatella germabica) — вид Т.; портит и загрязняет пищевые продукты; механический переносчик кишечных инфекций и инвазий, промежуточный хозяин крысиного цепня, а также gougylonema pulchrum.

Т. ЧЁРНЫЙ (Blatta orientalis) — вид Т.; портит и загрязняет пищевые продукты; механический переносчик возбудителей кишечных инфекций и инвазий, промежуточный хозяин крысиного цепня.

ТАРА́НТУЛЫ (Lycosa) — род паукообразных сем. Lycosidae; включает виды, самки к-рых способны нанести человеку очень болезненный укус, вызывающий местное воспаление; распространены в пустынях и полупустынях, а также в степной и лесостепной зонах.

ТАРАТЫ́НОВА БОЛЕ́ЗНЬ — см. *Гранулема эозинофильная.*

ТАРДЬЕ́ ПЯ́ТНА (A. A. Tardieu, 1818—1879, франц. врач) — мелкото-

чечные темно-красные кровоизлияния под висцеральной плеврой и эпикардом; часто обнаруживаются при вскрытии погибших от механической асфиксии.

ТАРЗ- (тарзо-; анат. tarsus предплюсна, хрящ века; от греч. tarsos плоская поверхность, подошвенная поверхность стопы; хрящ века) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «относящийся к предплюсне», 2) «относящийся к хрящу века».

ТАРЗА́ЛЬНАЯ ПЛАСТИ́НКА — см. *Хрящ века.*

ТАРЗИ́Т (tarsitis; *тарз-* + *-ит*) — воспаление хряща века.

ТАРЗО- — см. *Тарз-.*

ТАРЗОМАРГИНОПЛА́СТИКА (tarsomarginoplastica; *тарзо-* + лат. margo, marginis край + *пластика*) — общее название пластических операций, производимых с целью восстановления хряща и края века, напр. при завороте века, при трихиазе.

ТАРЗОПЛА́СТИКА (tarsoplastica; *тарзо-* + *пластика*) — общее название пластических операций на хряще века.

ТАРЗОРАФИ́Я (tarsorrhaphia; *тарзо-* + греч. rhaphē шов) — см. *Блефарорафия.*

ТАРЗОТОМИ́Я (tarsotomia; *тарзо-* + греч. tomē разрез, рассечение) — рассечение хряща века.

ТАРНО́ВСКОГО ПРИ́ЗНАК (В. М. Тарновский, 1837—1906, отеч. дерматовенеролог) — ускоренный рост волос, покрывающих лоб почти до бровей; признак позднего врожденного сифилиса.

ТАРНО́ПОЛЬСКОГО РИНОПЛА́СТИКА (А. М. Тарнопольский) — пластическая операция: восстановление носа с использованием выкраиваемого на коже живота или плеча мигрирующего стебля, из четырех сегментов (лопастей) к-рого формируют различные части носа.

ТА́РНХОЯ ОПЕРА́ЦИЯ (P. Taarnhoj, датский нейрохирург 20 в.) — см. *Торнхёя операция.*

ТАРТРО́НОВАЯ КИСЛОТА́ — простейшая двухосновная оксикислота, входящая в состав нек-рых фосфолипидов головного мозга.

ТАРУ́И БОЛЕ́ЗНЬ (S. Tarui) — см. *Гликогеноз VIII типа.*

ТАРХА́НОВА ФЕНО́МЕН [И. Р. Тарханов (Тархнишвили, Тархан-Моуравн), 1846—1908, отеч. физиолог] — см. *Кожно-гальваническая реакция.*

ТА́ТО — ЛОМБА́РА ПРО́БА (J. M. Tato; E. Lombard, 1869—1920, франц. оториноларинголог) — метод аудиометрии, основанный на феномене повышения обследуемым громкости чтения вслух при возникновении шума и заключающийся в регистрации уровня (в *дб*) подаваемого постепенно усиливающегося шума, при к-ром обнаруживается этот феномен.

ТАТУА́Ж (франц. tatouage татуировка) — 1) см. *Татуировка*; 2) см. *Татуировка роговицы.*

ТАТУИРО́ВКА (франц. tatouer татуировать; син. татуаж)— окрашивание кожи в результате отложения в ней нерастворимых красящих веществ.

Т. ПРОФЕССИОНА́ЛЬНАЯ — Т., обусловленная внедрением в кожу частиц угля, металла или другой пыли в процессе профессиональной деятельности.

ТАТУИРО́ВКА РОГОВИ́ЦЫ (син. татуаж) — косметическая операция: закрашивание бельма роговицы.

ТАУРИ́Н — аминокислота, являющаяся в организме продуктом превращения цистеина и содержащаяся в свободном виде в печени; входит в состав парных желчных кислот.

ТАУРОХО́ЛЕВАЯ КИСЛОТА́ — продукт конъюгации холевой кислоты и таурина, образующийся в печени; выделяется с желчью и участвует в процессе переваривания жиров.

ТА́УССИГА СИМПТО́М (S. Taussig, австрийский микробиолог) — болезненность при поднимании пальцами верхнего века и (или) при надавливании на глазные яблоки; наблюдается в первые три дня заболевания флеботомной лихорадкой.

ТА́УССИГ — БИ́НГА СИНДРО́М (H. B. Taussig, род. в 1898 г., амер. кардиолог; R. J. Bing, род. в 1909 г., амер. врач) — врожденный порок сердца: сочетание отхождения аорты от правого желудочка, а легочного ствола от обоих желудочков с высоко расположенным дефектом межжелудочковой перегородки; проявляется цианозом, признаками легочной гипертензии и аортальной гипотензии.

ТА́УССИГ — СНЕ́ЛЛЕНА — А́ЛЬБЕРСА СИНДРО́М (H. B. Taussig, род. в 1898 г., амер. кардиолог; H. A. Snellen, амер. врач 20 в.; F. H. Albers, амер. врач 20 века)— врожденный порок сердца: впадение всех легочных вен в переднюю кардинальную вену, сохраняющуюся у ребенка в виде добавочной левой верхней полой вены.

ТАФОФИЛИ́Я (taphophilia; греч. taphē похороны, погребение + philia любовь, влечение) — патологическое влечение присутствовать на похоронах.

ТАФОФОБИ́Я (taphophobia; греч. taphē похороны, погребение + *фобия*) — 1) навязчивый страх — боязнь похорон и похоронных принадлежностей; 2) навязчивый страх — боязнь оказаться погребенным заживо.

ТАХИ- (тахо-; греч. tachys скорый, быстрый; tachos скорость) — составная часть сложных слов, означающая «скорый», «быстрый», «частый», «скорость».

ТАХИАРИТМИ́Я МЕРЦА́ТЕЛЬНАЯ (tachyarrhythmia fibrillaris; *тахи* + *аритмия*) — см. *Аритмия мерцательная тахисистолическая.*

ТАХИКАРДИ́Я (tachycardia; *тахи-* + греч. kardia сердце) — повышенная частота сердечных сокращений (более 100 в 1 мин.).

Т. КОНСТИТУЦИОНА́ЛЬНАЯ (t. constitutionalis) — постоянная Т., присущая нек-рым практически здоровым людям преимущественно астенического телосложения.

Т. НЕВРОГЕ́ННАЯ (t. neurogena) — 1) Т., возникающая под влиянием нервно-эмоционального напряжения; 2) Т., наблюдаемая при нек-рых поражениях ц. н. с., напр. при синдроме Пейджа.

Т. ОРТОСТАТИ́ЧЕСКАЯ (t. orthostatica) — Т., возникающая при переходе больного из горизонтального положения в вертикальное.

Т. СИ́НУСОВАЯ (t. sinuosa) — Т., обусловленная повышенной активностью синусно-предсердного узла.

Т. ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (t. physiologica) — Т., возникающая как адекватная реакция на эмоциональное напряжение или физическую нагрузку.

Т. ЭНДОКРИ́ННАЯ (t. endocrinica) — Т., обусловленная воздействием нек-рых гормонов (катехоламины, тироксин).

ТАХИКАРДИ́Я ЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (tachycardia ventricularis) — аритмия, характеризующаяся высокой частотой сокращений желудочков сердца, обусловленная наличием в них гетеротопного очага автоматизма и (или) патологической циркуляцией волны возбуждения по миокарду.

ТАХИКАРДИ́Я ЛЕВОЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (tachycardia ventriculi sinistri) — желудочковая тахикардия, при к-рой очаг автоматизма находится в миокарде левого желудочка.

ТАХИКАРДИ́Я МЕ́ДЛЕННАЯ ЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ — см. *Ритм сердца идиовентрикулярный ускоренный.*

ТАХИКАРДИ́Я НАДЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (tachycardia supraventricularis) — см. *Тахикардия суправентрикулярная.*

ТАХИКАРДИ́Я ПА́РКИНСОНА — ПА́ППА — см. *Паркинсона — Папа тахикардия.*

ТАХИКАРДИ́Я ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ (tachycardia paroxysmalis; син. Бувре болезнь) — аритмия в виде внезапно начинающихся и так же внезапно прекращающихся приступов тахикардии, обусловленных активностью гетеротопных очагов автоматизма или (чаще) патологической циркуляцией волны возбуждения по миокарду.

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ АТРИОВЕНТРИКУЛЯ́РНАЯ (t. paroxysmalis atrioventricularis; син. Т. пароксизмальная узловая) — Т. п., обусловленная патологической циркуляцией волны возбуждения в области миокарда, непосредственно прилегающей к предсердно-желудочковому узлу.

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ ЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (t. paroxysmalis ventricularis) — Т. п., обусловленная патологической циркуляцией возбуждения по миокарду желудочков.

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ ЛЕВОЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (t. paroxysmalis ventriculi sinistri) — Т. п., при к-рой водителем ритма сердца служит гетеротопный очаг автоматизма, расположенный в миокарде левого желудочка или разветвлениях левой ножки предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса).

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ НАДЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (t. paroxysmalis supraventricularis) — см. *Тахикардия пароксизмальная суправентрикулярная.*

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ ПРАВОЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (t. paroxysmalis ventriculi dextri) — Т. п., при к-рой водителем ритма сердца служит гетеротопный очаг автоматизма, расположенный в миокарде правого желудочка или разветвлениях правой ножки предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса).

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ ПРЕДСЕ́РДНАЯ (t. paroxysmalis atrialis) — см. *Тахикардия пароксизмальная суправентрикулярная.*

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ СИ́НУСОВАЯ (t. paroxysmalis sinuosa) — Т. п., обусловленная феноменом пов-

торного входа возбуждения в области синусно-предсердного узла.

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯ́РНАЯ (t. paroxysmalis supraventricularis; лат. supra над, выше + анат. ventriculus cordis желудочек сердца; син.: Т. пароксизмальная наджелудочковая, Т. пароксизмальная предсердная) — Т. п., при к-рой водителем ритма сердца служит гетеротопный очаг автоматизма, расположенный в миокарде предсердий.

Т. ПАРОКСИЗМА́ЛЬНАЯ УЗЛОВА́Я — см. *Тахикардия пароксизмальная атриовентрикулярная.*

ТАХИКАРДИ́Я ПРАВОЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (tachycardia ventriculi dextri) — желудочковая тахикардия, при к-рой очаг автоматизма находится в миокарде правого желудочка.

ТАХИКАРДИ́Я РЕЦИПРО́КНАЯ НАДЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (tachycardia reciproca supraventricularis) — см. *Паркинсона — Паппа тахикардия.*

ТАХИКАРДИ́Я РЕЦИПРО́КНАЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯ́РНАЯ (t. reciproca supraventricularis) — см. *Паркинсона — Паппа тахикардия.*

ТАХИКАРДИ́Я СУПРАВЕНТРИКУЛЯ́РНАЯ (tachycardia supraventricularis; син. тахикардия наджелудочковая) — аритмия в виде тахикардии, при к-рой водитель ритма сердца расположен в миокарде предсердий или синусно-предсердном узле.

ТАХИКАРДИ́Я ЭКТОПИ́ЧЕСКАЯ (tachycardia ectopica) — общее название аритмий в виде тахикардии, при к-рых водитель ритма сердца расположен вне синусно-предсердного узла.

ТАХИЛАЛИ́Я (tachylalia; *тахи-* + греч. lalia речь, болтовня; син.: тахифемия, тахифразия) — нарушение речи в форме выраженного многословия или резко ускоренного темпа речи.

ТАХИОСЦИЛЛОГРА́ММА (*тахи-* + *осциллограмма*) — совокупность трех кривых, синхронно зарегистрированных при постепенном повышении давления в манжетке, наложенной на конечность: сфигмограмм под манжетой и дистальнее места ее наложения, а также кривой, отражающей изменение давления воздуха в манжете.

ТАХИОСЦИЛЛОГРАФИ́Я (*тахи-* + *осциллография*; син. Савицкого метод) — метод определения бокового, ударного и среднего артериального давления путем регистрации тахиосциллограммы.

ТАХИПНО́Э (tachypnoë; *тахи-* + греч. pnoë дыхание; син. полипноэ) — учащенное дыхание без его углубления.

ТАХИПСИХИ́Я (устар.; tachypsychia; *тахи-* + греч. psychē душа, душевное состояние, сознание) в психиатрии — ускоренное протекание мыслительных процессов у психически больного (напр., «скачка идей»).

ТАХИСИСТОЛИ́Я ЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ (tachysystolia ventriculorum; *тахи-* + *систола*) — см. *Трепетание желудочков.*

ТАХИСТОСКО́П (греч. tachistos скорейший, быстрейший + skopeō рассматривать, наблюдать) — прибор для исследования зрительного восприятия путем предъявления зрительных тестов в течение заданного короткого промежутка времени.

ТАХИСТОСКОПИ́Я (греч. tachistos скорейший, быстрейший + skopeō рассматривать, наблюдать) — метод исследования зрительного восприятия путем кратковременного предъявления на экране тахистоскопа зрительных тестов (рисунков, текстов, шкал приборов и др.).

ТАХИСФИГМИ́Я (tachysphygmia; *тахи-* + греч. sphygmos пульс) — повышенная частота пульса (более 100 ударов в 1 мин.).

ТАХИФАГИ́Я (tachyphagia; *тахи-* + греч. phagein- есть) — быстрое поедание пищи, заглатывание ее без прожевывания.

ТАХИФЕМИ́Я (tachyphemia; *тахи-* + греч. phēmi говорить) — см. *Тахилалия.*

ТАХИФИЛАКСИ́Я (tachyphylaxia; *тахи-* + греч. phylaxis защита)— 1) быстрое снижение лечебного эффекта при повторном применении лекарственных препаратов; 2) в аллергологии — снижение способности организма отвечать развитием анафилактоидных реакций на повторное (с небольшим интервалом) введение веществ, дающих выраженное развитие этих реакций при первичном введении.

ТАХИФРАЗИ́Я (tachyphrasia; *тахи-* + греч. phrasis речь, оборот речи, выражение) — см. *Тахилалия.*

ТАХО- — см. *Тахи-.*

ТАХОГРА́ММА (истор.; *тахо-* + греч. gramma запись, изображение) в физиологии — кривая, отражающая результаты тахографии.

ТАХОГРАФИ́Я (истор.; *тахо-* + греч. graphō писать, изображать) в физиологии — совокупность методов графической регистрации скорости движения жидкостей (напр., крови) или газов (напр., воздуха в воздухоносных путях).

ТАХОКАРДИО́МЕТР (*тахо-* + греч. kardia сердце + metreō измерять, определять) — см. *Кардиотахометр.*

ТЕАТРА́ЛЬНОСТЬ ПОВЕДЕ́НИЯ — особенность поведения нек-рых психически больных, заключающаяся в преувеличенно выразительной мимике, пантомимике и речи, рассчитанных на привлечение к себе внимания.

ТЕБЕ́ЗИЕВ КЛА́ПАН (valva Thebesii; A. Ch. Thebesius, 1686—1732, нем. врач) — см. *Заслонка венечного синуса.*

ТЕБЕ́ЗИЕВЫ ВЕ́НЫ (venae Thebesii; A. Ch. Thebesius) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *997.*

ТЕБЕ́ЗИЕВЫ ОТВЕ́РСТИЯ (foramina Thebesii; A. Ch. Thebesius) — см. *Отверстия наименьших вен.*

ТЕБЕ́ЗИЯ ЗАСЛО́НКА (valva Thebesii; A. Ch. Thebesius) — см. *Заслонка венечного синуса.*

ТЕБЕ́ЗИЯ — ВЬЕССЕ́НА СОСУ́ДЫ (A. Ch. Thebesius, 1686—1732, нем. врач; R. Vieussens, 1641—1716, франц. анатом) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *997.*

ТЕВЕНА́РА СИНДРО́М (A. Thévenard, 1898—1959, франц. невропатолог) — см. *Акропатия язвенно-мутилирующая семейная.*

ТЕГМЕ́НТО - ТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ ПУТЬ (анат. tegmentum mesencephali покрышка среднего мозга) — см. *Покрышечно-таламический путь.*

ТЕДЕШИ МУЛЬТИЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ ЛИПОМАТО́З (Tedeschi) — см. *Липоматоз мультицентрический.*

ТЕЗАУРИСМО́ЗЫ (thesaurismoses; греч. thēsauros сокровищница + *-оз*) — см. *Болезни накопления.*

ТЕ́ЙЗМ (theismus; лат. thea чай) — разновидность кофеинизма, характеризующаяся злоупотреблением чаем.

ТЕ́ЙКЕТСА ПРО́БА (G. de Takats, род. в 1892 г., амер. хирург) — 1) метод функциональной диагностики нек-рых поражений сосудов, заключающийся во внутривенном введении гепарина с последующей регистрацией реакции сосудов кожи; 2) метод оценки степени нарушения кровоснабжения нижней конечности при облитерирующем эндартериите, заключающийся в определении времени, по прошествии к-рого появится первый приступ перемежающейся хромоты при ходьбе со скоростью 2 шага в секунду.

ТЕ́ЙЛЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (M. Theiler, 1899—1972, амер. микробиолог и иммунолог) — острая вирусная болезнь мышей, протекающая по типу энцефаломиелита с судорогами и параличами задних конечностей; наблюдаются эпизоотии среди лабораторных животных с их 100% гибелью.

ТЕ́ЙЛЕРА ВИ́РУС (M. Theiler) — см. *Вирус энцефаломиелита мышей.*

ТЕ́ЙЛОРА АППАРА́Т (Ch. F. Taylor, 1827—1899, амер. ортопед) — ортопедический аппарат для лечения косолапости, представляющий собой металлическую подошву с прикрепленным к ней с внутренней стороны рычагом, к-рый прибинтовывают к голени.

ТЕ́ЙЛОРА НОЖ (Ch. B. Taylor, 1829—1909, англ. офтальмолог) — обоюдоострый нож с тупым закругленным концом, предназначенный для рассечения спаек радужки.

ТЕ́ЙЛОРА ОПЕРА́ЦИЯ (C. Taylor) — хирургическая операция: сшивание периферического конца лицевого нерва с центральным концом подъязычного нерва, к-рые обнажают дугообразным разрезом (выпуклостью книзу) от сосцевидного отростка до подъязычной кости с резекцией части сосцевидного отростка; применяется при параличе лицевого нерва.

ТЕ́ЙНА СХЕ́МА (G. D. Thane, 1850—1930, англ. анатом) — схема расчета проекции желудочков головного мозга на кости черепа по наружным костным ориентирам.

ТЕ́ЙХМАННА МА́ССА (L. C. Teichmann-Stawiarski, 1825—1895, нем. гистолог) — затвердевающая смесь мела, киновари и олифы, вводимая в сосуды трупа при приготовлении анатомических препаратов сосудов.

ТЕ́ЙХМАННА ПРО́БА (L. C. Teichmann-Stawiarski) — метод обнаружения крови в пятне, основанный на свойстве крови при нагревании в присутствии хлорида натрия и ледяной уксусной кислоты образовывать кристаллы солянокислого гемина, имеющие вид параллелепипедов коричневого цвета; используется в судебной медицине.

ТЕ́ЙХМАННА — ТИХА́НОВА МА́ССА (L. C. Teichmann-Stawiarski, 1825—1895, нем. гистолог; М. Т. Тиханов; род. в 1863 г., отеч. анатом) — затвердевающая смесь уксусной кислоты, сурика и хлорида натрия, вводимая в сосуды трупа при приготовлении анатомических препаратов сосудов.

ТЕЙХО́ЕВАЯ КИСЛОТА́ — компонент клеточной стенки грамположительных бактерий, представляющий собой линейный полимер глицерин- или рибитфосфата.

ТЕК- (тека-, теко-; гист. theca покрышка, от греч. thēkē ящик, вместилище, коробка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к полому образованию, к оболочке».

ТЕКА- — см. *Тек-*.

ТЕКАЛЮТЕОЦИ́Т (thecaluteocytus, LNH; *тека-* + *лютеоцит*) — клетка соединительной ткани, окружающей зрелый фолликул, накапливающая лютеин при образовании желтого тела.

ТЕКАФОЛЛИКУЛО́МА (thecafolliculoma; *тека-* + *фолликул* + *-ома*; син.: опухоль гранулезотекаклеточная, текома гранулезоподобная, текома плеоморфная) — злокачественная гормонально-активная опухоль яичника, исходящая из гранулезных клеток и текоцитов; у девочек оказывает феминизирующее действие, у женщин в менопаузе проявляется ациклическими маточными кровотечениями.

ТЕКО- — см. *Тек-*.

ТЕКОДОНТИ́ЗМ (thecodontismus; *тек-* + греч. odus, odontos зуб) — отличительная особенность анатомического строения зубной системы млекопитающих, заключающаяся в том, что корни зубов помещаются в зубных альвеолах, а не сращены с челюстями.

ТЕКО́МА (thecoma; *тек-* + *-ома*; син.: опухоль текаклеточная, фиброма текаклеточная ксантоматозная) — гормонально-активная опухоль яичника, исходящая гл. обр. из текоцитов; возникает у женщин старше 50 лет; проявляется ациклическими маточными кровотечениями.

ТЕКО́МА ГРАНУЛЕЗОПОДО́БНАЯ (thecoma granulosiforme) — см. *Текафолликулома*.

ТЕКО́МА ПЛЕОМО́РФНАЯ (thecoma pleomorphum; греч. pleon больше + morphē вид, форма) — см. *Текафолликулома*.

ТЕКОЦИ́Т (thecocytus, LNH; *теко-* + гист. cytus клетка) — клетка соединительнотканной оболочки фолликулов яичника.

ТЕ́КСТОРА АРТРОТОМИ́Я (K. Textor, род в 1782 г., нем. хирург) — хирургическая операция: вскрытие коленного сустава дугообразным разрезом, идущим от одного мыщелка бедра до другого ниже надколенника, с пересечением его собственной связки.

ТЕКТОСПИНА́ЛЬНЫЙ ПУТЬ (tractus tectospinalis; анат. tectum mesencephali крыша среднего мозга) — см. *Покрышечно-спинномозговой путь*.

ТЕКТОТАЛАМИ́ЧЕСКИЙ ПУТЬ (tractus tectothalamicus; анат. tectum mesencephali крыша среднего мозга) — восходящий нервный путь, идущий от крыши среднего мозга к таламусу.

ТЕЛ- (теле-, телео-, тело-; греч. tēle далеко; telos конец, завершение, достижение цели; teleios и teleos завершенный) — составная часть сложных слов, означающая «отдаленность», «окончание», «завершение», «конец», «конечный».

ТЕЛАЛГИ́Я (telalgia; *тел-* + греч. algos боль)— боль, возникающая вдали от очага патологического процесса, вызвавшего ее.

ТЕЛА́НТРОП (Telanthropus; *тел-* + греч. anthrōpos человек) — ископаемый высший примат из Южной Африки; древность — около 700—800 тыс. лет.

ТЕЛЕ- — см. *Тел-*.

ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИ́Я (teleangiectasia; *теле-* + *ангиэктазия*) — локальное чрезмерное расширение капилляров и мелких сосудов; возникает как аномалия развития, а также при нек-рых патологических процессах, напр. при недостаточности кровообращения, после воздействия ионизирующего излучения.

ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИ́Я ПЕ́ЧЕНИ РАССЕ́ЯННАЯ (teleangiectasia hepatis disseminata) — вариант синдрома Ослера — Рандю, характеризующийся расположением множественных телеангиэктазий преимущественно в печени.

ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИ́Я НАСЛЕ́ДСТВЕННАЯ ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКАЯ (teleangiectasia hereditaria haemorrhagica) — см. *Ослера — Рандю синдром*.

ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИ́Я ФОЛЛИКУЛЯ́РНАЯ КОЛЬЦЕВИ́ДНАЯ (teleangiectasia follicularis anularis) — см. *Пурпура кольцевидная телеангиэктатическая*.

ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИ́Я ЦЕРЕБРА́ЛЬНАЯ БАЗА́ЛЬНАЯ (teleangiectasia cerebralis basalis) — см. *Нисимото болезнь*.

ТЕЛЕБАТОСКО́П (*теле-* + греч. bathos глубина + skopeō рассматривать) — диагностический комплекс, состоящий из приемно-передающей телевизионной и рентгеновской установок, обеспечивающих совмещение (наложение одного на другое) видимого и рентгеновского изображения исследуемого объекта на экране электронно-лучевой трубки, чем облегчается топическая диагностика.

ТЕЛЕГАММААППАРА́Т — см. *Гамма-аппарат*.

ТЕЛЕГАММАТЕРАПИ́Я (*теле-* + *гамма-терапия*) — см. *Гамма-терапия дистанционная*.

«ТЕЛЕГРА́ФНЫЙ СТИЛЬ» — нарушение речи, при к-ром в ней преобладают имена существительные и глаголы в неопределенной форме, а предлоги отсутствуют; наблюдается при нек-рых органических поражениях ц.н.с.

ТЕЛЕДИАСТОЛИ́ЧЕСКИЙ ОБЪЁМ (*теле-* + *диастола*) — см. *Конечно-диастолический объем*.

ТЕЛЕДИАСТОЛИ́ЧЕСКОЕ ДАВЛЕ́НИЕ (*теле-* + *диастола*) — см. *Конечно-диастолическое давление*.

ТЕЛЕКАРДИО́ГРАФ (*теле-* + *кардиограф*) — см. *Телеэлектрокардиограф*.

ТЕЛЕКАРДИОСТИМУЛЯ́ТОР (*теле-* + *кардиостимулятор*) — 1) электрокардиостимулятор, управляемый на расстоянии (по радио или перемещением магнита); 2) электрокардиостимулятор, основанный на бесконтактном питании электрической цепи, в которой находятся электроды, подводящие раздражающий ток.

ТЕ́ЛЕКИ СИМПТО́М (L. Teleky, 1872—1957, нем. гигиенист) — слабость разгибателей кисти; признак пареза лучевого нерва, обусловленного хроническим отравлением свинцом.

ТЕЛЕЛУ́ПА — см. *Лупа телескопическая*.

ТЕ́ЛЕМАННА МЕ́ТОД (W. Telemann, нем. паразитолог конца 19 — начала 20 в.) — метод обогащения, используемый при приготовлении препаратов для гельминтоовоскопии фекалий, основанный на осаждении яиц гельминтов центрифугированием в смеси соляной кислоты и этилового эфира.

ТЕЛЕМЕТРИ́ЧЕСКИЙ КОНТРО́ЛЬ (*теле-* + греч. metreō измерять, определять) в медико-биологических исследованиях — контроль состояния человека или животного путем регистрации их физиологических функций (чаще в совокупности с данными о факторах окружающей среды), осуществляемый на расстоянии обычно с использованием радиосвязи.

ТЕЛЕО- — см. *Тел-*.

ТЕЛЕОЛО́ГИЯ (*телео-* + греч. logos учение) — идеалистическое учение, приписывающее процессам и явлениям природы целесообразность или способность к целеполаганию, что в действительности присуще лишь деятельности человека.

ТЕЛЕРЕНТГЕ́НОГРАФИ́Я (*теле-* + *рентгенография*) — рентгенография, проводимая при фокусировке пучка излучения на большом расстоянии с целью получения рентгеновского изображения, по размерам близкого к исследуемому объекту.

ТЕЛЕРЕНТГЕНОМЕТРИ́Я (*теле-* + *рентгенометрия*) — измерение рентгеновских изображений, полученных при телерентгенографии или телерентгеноскопии.

ТЕЛЕРЕНТГЕНОСКОПИ́Я (*теле-* + *рентгеноскопия*) — рентгеноскопия, проводимая при фокусировке пучка излучения на большом расстоянии с целью получения рентгеновского изображения, по размерам близкого исследуемому объекту.

ТЕЛЕРЕНТГЕНОТЕРАПИ́Я (*теле-* + *рентгенотерапия*) — рентгенотерапия, при к-рой источник ионизирующего излучения удален от поверхности облучаемого объекта более чем на 25 *см*.

ТЕЛЕРЕЦЕ́ПТОР (*теле-* + *рецептор*) — см. *Рецептор дистантный*.

ТЕЛЕФОНОФОБИ́Я (телефон + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь пользоваться телефоном.

ТЕЛЕЭЛЕКТРОКАРДИО́ГРАФ (*теле-* + *электрокардиограф*; син. телекардиограф) — прибор для дистанционной регистрации электрокардиограммы, в к-ром связь между усилителями биопотенциалов (датчиками) и регистрирующим устройством осуществляется по радио.

ТЕЛЕЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИ́Я (*теле-* + *электрокардиография*; син.: радиоэлектрокардиография, электротелекардиография) — метод регистрации электрокардиограммы, при к-ром регистрирующее устройство значительно удалено (от нескольких метров до сотен тысяч километров) от обследуемого человека или животного; основан на использовании специальных датчиков и приемно-передающей радиоаппаратуры; используется при невозможности или нежелательности проведения обычной электрокардиографии (напр., в спортивной, авиационной и космической медицине).

ТЕЛЕЭЛЕКТРОСТИМУЛЯ́ЦИЯ (*теле-* + *электростимуляция*) — электростимуляция какого-либо отдела нервной системы, при к-рой генератор импульсов удален от объекта стимуляции; осуществляется с помощью радиосвязи или проводной связи.

ТЕЛЕЭНДОСКОПИ́Я (*теле-* + *эндоскопия*; син. эндоскопия телевизионная) — метод эндоскопического исследования, при к-ром изображение проецируется на телевизионный экран или записывается с помощью видеомагнитофона на магнитную пленку.

ТЕЛИГЕНИ́Я (греч. thēlys женский + genea порождение, потомство) — появление потомства преимущественно или исключительно женского пола; обусловлена сцеплением летальных генов с половыми хромосомами.

ТЕЛИ́Т (thelitis; греч. thēlē сосок молочной железы + *-ит*) — воспаление соска молочной железы.

ТЕЛИФО́НЫ (Uropygi; син. уропиги) — отряд членистоногих класса паукообразных, распространенный в субтропической и тропической зонах; секрет анальных желез Т. при попадании на слизистые оболочки человека вызывает их сильное раздражение.

ТЕЛКО́ВА КИШЕ́ЧНЫЙ ШОВ (Н. А. Телков, род. в 1911 г., сов. хирург) — шов, накладываемый с помощью специальных инструментов — энтеротома и гастрографиотома — при формировании кишечного или желудочно-кишечного анастомоза.

ТЕЛЛЕ́ ПРИ́ЗНАК (Tellais) — усиление пигментации век при диффузном токсическом зобе.

ТЕЛЛУРИ́ТОВАЯ ПРО́БА — метод ускоренной диагностики дифтерии, основанный на потемнении дифтерийных налетов при смачивании их 40% водным раствором глицерина, содержащим 2% теллурита натрия или калия, что связано со способностью возбудителя дифтерии восстанавливать металлический теллур из солей.

ТЕЛО- — см. *Тел-*

ТЕ́ЛО ЯЗЫКА́ (corpus linguae, PNA, BNA, JNA) — передняя, свободная часть языка, отделенная от корня пограничной бороздой.

ТЕЛОГЕ́НЫ (*теломер* + *гены*) — гены, расположенные в теломерах; относятся к постоянным структурным элементам хромосомы.

ТЕЛОЛИЗОСО́МА (*тело-* + *лизосома*) — см. *Остаточное тельце.*

ТЕЛОМЕ́Р (telomerus; *тело-* + греч. meros часть) — концевой участок хромосомы.

ТЕЛОСЛОЖЕ́НИЕ (habitus) — совокупность особенностей строения, формы, величины и соотношения отдельных частей тела человека.

Т. АСТЕНИ́ЧЕСКОЕ (h. asthenicus; син. Т. лептосомное) — Т., характеризующееся высоким ростом, длинными конечностями, узкой грудной клеткой, незначительным отложением подкожного жира, овальной формой лица.

Т. АТЛЕТИ́ЧЕСКОЕ (h. athleticus) — Т., характеризующееся хорошо развитыми мускулатурой и скелетом, большой шириной плечевого пояса, слабым отложением подкожного жира, крупными чертами лица с развитым подбородком.

Т. ДИСПЛАСТИ́ЧЕСКОЕ (h. dysplasticus; греч. приставка dys-, означающая расстройство, нарушение, + plastikē формирование, образование) — Т., характеризующееся непропорциональностью размеров отдельных частей тела, иногда чертами евнухоидизма (у мужчин) или маскулинизма (у женщин).

Т. ЛЕПТОСО́МНОЕ (h. leptosomicus; греч. leptos тонкий, нежный + sōma тело) — см. *Телосложение астеническое.*

Т. ПИКНИ́ЧЕСКОЕ (h. pycnicus; греч. pyknos плотный, крепкий) — Т., характеризующееся низким ростом, круглой головой, короткими конечностями и шеей, широкой грудью, выступающим животом и склонностью к отложению жира.

ТЕЛОСПОРИ́ДИИ — подкласс простейших кл. споровиков; отдельные представители Т. являются паразитами человека, напр. малярийный плазмодий, изоспоры.

ТЕЛОФА́ЗА (*тело-* + *фаза*) — заключительная стадия деления клеток (мейоза или митоза), в течение к-рой завершается образование дочерних клеток с реконструкцией их ядер.

ТЕЛОФРА́ГМА (telophragma, LNH; *тело-* + греч. phragma перегородка; син.: линия Т, линия Z, мембрана телофрагма, полоска Т, полоска Z) — тонкая перегородка, пересекающая в поперечном направлении изотропный диск миофибриллы поперечнополосатого мышечного волокна.

ТЕЛЬЦА́ ВИ́ЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ (corpuscula thymi; син.: Гассаля тельца, «эпителиальные жемчужины») — группы концентрически наслоенных эпителиальных клеток в мозговом веществе вилочковой железы.

ТЕЛЬЦА́ ВКЛЮЧЕ́НИЙ — см. *Включения вирусные.*

ТЕЛЯЗИО́З (thelaziosis) — гельминтоз из группы нематодозов, вызываемый Thelazia callipaeda, личинки к-рой заносятся в глаз мухой Phortica variegata; протекает в форме конъюнктивита.

THELÁZIA CALLIPÁEDA — вид нематод сем. Thelaziidae, паразитирующий в глазах у хищных животных; встречается в СССР; иногда вызывает телязиоз у человека.

ТЕМБР (франц. timbre) — индивидуальная особенность голоса, обусловленная присоединением добавочных обертонов к основному тону издаваемого звука.

ТЕМЕННА́Я ВЕТВЬ (ramus parietalis, PNA) — 1) поверхностной височной артерии — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *545*; 2) средней менингеальной артерии — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *544*.

ТЕМЕННА́Я О́БЛАСТЬ (regio parietalis, PNA, BNA, JNA; син. темя — нрк) — область головы, ограниченная спереди венечным швом, сзади ламбдовидным швом, с боков верхними височными линиями.

ТЕМЕННА́Я О́БЛАСТЬ ВЕ́РХНЯЯ (regio parietalis superior) — часть новой коры большого мозга, выделяемая в соответствии с цитоархитектоникой головного мозга; занимает верхнюю половину теменной доли (выше межтеменной борозды), исключая на верхнелатеральной поверхности постцентральную, а на медиальной — лимбическую области.

ТЕМЕННА́Я О́БЛАСТЬ НИ́ЖНЯЯ (regio parietalis inferior) — часть новой коры большого мозга, выделяемая в соответствии с цитоархитектоникой головного мозга, занимающая нижнюю половину теменной доли (ниже межтеменной борозды), исключая постцентральную область.

ТЕМЕ́ННАЯ ТО́ЧКА (luryon) — антропометрическая точка: самая латеральная точка боковой поверхности черепа.

ТЕМЕННО́Е ОТВЕ́РСТИЕ (foramen parietale, PNA, BNA, JNA) — отверстие на теменной кости, расположенное вблизи ее верхнего края; место прохождения эмиссарной вены.

ТЕ́МЕННО-ЗАТЫ́ЛОЧНАЯ ВЕТВЬ (ramus parietooccipitalis, PNA) — см. т. 1, Перечень анат.терминов, *546*.

ТЕМЕННО́Й БУГО́Р (tuber parietalis, PNA, BNA, JNA) — возвышение в центре наружной поверхности теменной кости; место расположения ее ядер окостенения.

ТЕ́МЕННО-КО́ПЧИКОВАЯ ДЛИНА́ — длина зародыша от темени до копчика.

ТЕ́МЕННО-МОСТОВО́Й ПУТЬ (tractus parietopontinus, PNA) — нисходящий проекционный нервный путь, начинающийся в коре теменной доли большого мозга, проходящий через внутреннюю капсулу, основание ножки мозга и заканчивающийся в ядрах моста.

ТЕМЕННЫ́Е ВЕ́ТВИ (rami parietales, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *538*.

ТЕ́МКИНА МЕ́ТОД (Я. С. Темкин, 1896—1976, сов. оториноларинголог) — разновидность новокаиновой блокады, заключающаяся во введении раствора новокаина в поверхностный слой слизистой оболочки валика носа; применяется, напр., при головных болях различной этиологии, болезни Меньера, вазомоторном рините.

ТЕМП ПСИХИ́ЧЕСКИХ ПРОЦЕ́ССОВ — совокупность скорости протекания, степени подвижности и переключаемости психических процессов.

ТЕМПЕРА́МЕНТ (лат. temperamentum соразмерность, надлежащее соотношение) — совокупность индивидуальных особенностей эмоциональных реакций и волевой деятельности человека.

Т. МЕЛАНХОЛИ́ЧЕСКИЙ (греч. melas, melanos темный, черный + cholē желчь) — Т., характеризующийся преобладанием подавленного настроения и слабостью волевых проявлений (нерешительностью, неуверенностью в себе).

Т. САНГВИНИ́ЧЕСКИЙ (лат. sanguis, sanguinis кровь) — Т., характеризующийся живостью и подвижностью эмоциональных реакций, быстротой и силой волевых проявлений.

Т. ФЛЕГМАТИ́ЧНЫЙ (греч. phlegma, phlegmatos слизь, флегма) — Т., характеризующийся устойчивым настроением, мало поддающимся внешнему влиянию, вялостью эмоциональных реакций и медлительностью в волевой деятельности.

Т. ХОЛЕРИ́ЧЕСКИЙ (греч. cholē желчь) — Т., характеризующийся повышенной возбудимостью, порывистостью и силой эмоциональных реакций и бурными волевыми проявлениями.

ТЕМПЕРАТУ́РА БАЗА́ЛЬНАЯ (лат. temperatura соразмерность, нормальное состояние) — температура тела, измеренная утром после сна до приема пищи; используется при исследовании динамики температуры тела.

ТЕМПЕРАТУ́РА ОПЕРАТИ́ВНАЯ (син. температура эквивалентная) — показатель, характеризующий комплексное воздействие на человека температуры и скорости движения воздуха, а также теплового излучения окружающей среды; определяется по показаниям обычного термометра, шарового термометра и анемометра с примене-

нием специальных таблиц или номограмм.

ТЕМПЕРАТУ́РА РАДИАЦИО́ННАЯ — показатель, характеризующий условия радиационного теплообмена человека с окружающей средой; определяется с помощью шарового термометра.

ТЕМПЕРАТУ́РА РАДИАЦИО́ННО-ЭКВИВАЛЕ́НТНО - ЭФФЕКТИ́ВНАЯ — см. *Температура результирующая.*

ТЕМПЕРАТУ́РА РЕЗУЛЬТИ́РУЮЩАЯ (РТ;син. температура радиационно-эквивалентно-эффективная) — показатель, характеризующий комплексное воздействие на человека температуры, влажности и скорости движения окружающего воздуха, а также инфракрасного (теплового) излучения окружающей среды; определяется с помощью номограмм или таблиц по величинам эквивалентно-эффективной и радиационной температур.

ТЕМПЕРАТУ́РА РЕКТА́ЛЬНАЯ — температура тела, измеренная путем введения термометра в прямую кишку через задний проход.

ТЕМПЕРАТУ́РА ТЕ́ЛА — величина, характеризующая тепловое состояние организма; измеряется гл. обр. в подмышечной ямке.

Т. ТЕ́ЛА ГИПЕРПИРЕТИ́ЧЕСКАЯ (греч. hyper- сверх, свыше + pyretos жар) — Т. т. выше 41°.

Т. ТЕ́ЛА ПИРЕТИ́ЧЕСКАЯ (греч. pyretos жар) — Т. т. в пределах 39—41°.

Т. ТЕ́ЛА СУБФЕБРИ́ЛЬНАЯ (нем. subfebril от лат. sub под, ниже + febris лихорадка; син. субфебрилитет) — Т. т. в пределах 37—38°.

Т. ТЕ́ЛА ФЕБРИ́ЛЬНАЯ — Т. т. в пределах 38—39°.

ТЕМПЕРАТУ́РА ЭКВИВАЛЕ́НТНАЯ — см. *Температура оперативная.*

ТЕМПЕРАТУ́РА ЭКВИВАЛЕ́НТНО-ЭФФЕКТИ́ВНАЯ (ЭЭТ) — показатель, характеризующий комплексное воздействие на человека температуры, влажности и скорости движения окружающего воздуха; определяется по показаниям термометра, психрометра и анемометра с применением специальных таблиц или номограмм.

ТЕМПЕРАТУ́РА ЭФФЕКТИ́ВНАЯ (ТЭ) — показатель, характеризующий комплексное воздействие на человека температуры и влажности окружающего воздуха; определяется по показаниям термометра и психрометра с применением специальных таблиц или номограмм.

ТЕМПОРА́ЛЬНЫЙ (temporalis; лат. tempus, temporis висок) — относящийся к виску, к височной кости, к височной доле.

ТЕ́МЯ — 1) (vertex, PNA, BNA, JNA)— часть свода черепа, расположенная между лбом и затылком; 2) (нрк) — см. *Теменная область.*

ТЕН- — см. *Тено-.*

ТЕНАЛГИ́Я КРЕПИТИ́РУЮЩАЯ (tenalgia crepitans; *тен-* + algos боль) — см. *Тендовагинит крепитирующий.*

ТЕ́НАР (thenar, PNA, BNA, JNA; греч. thenar ладонь, от theniō ударять) — см. *Возвышение большого пальца.*

ТЕНДИН- — см. *Тендо-.*

ТЕНДИНИ́Т (tendinitis; *тендин-* + *-ит*) — дистрофия ткани сухожилия, сопровождаемая явлениями вторичного (реактивного) воспаления; обычно сочетается с тендовагинитом.

ТЕНДО- (тендин-; лат. tendo, tendinis сухожилие) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сухожилию».

ТЕНДОБУРСИ́Т (tendobursitis; *тендо-* + анат. bursa сумка + *-ит*) — сочетание дистрофических изменений сухожилия и воспаления его синовиальной сумки.

ТЕНДОВАГИНИ́Т (tendovaginitis; *тендо-* + анат. vagina влагалище + *-ит*; син. тендосиновит) — воспаление синовиальной оболочки сухожильного влагалища.

Т. БРУЦЕЛЛЁЗНЫЙ (t. brucellosa) — Т. при бруцеллезе, локализующийся чаще в дистальной трети предплечья.

Т. КРЕПИТИ́РУЮЩИЙ (t. crepitans; син.: паратенонит крепитирующий, теналгия крепитирующая) — острый асептический Т., чаще развивающийся на тыльной поверхности предплечья в результате выполнения длительной однообразной или непривычной физической работы и проявляющийся характерной крепитацией.

Т. ПРОФЕССИОНА́ЛЬНЫЙ (t. professionalis) — асептический Т., чаще крепитирующий, возникающий при постоянной функциональной перегрузке сухожильных влагалищ конечностей вследствие перенапряжения определенных групп мышц в процессе профессиональной деятельности.

Т. СТЕНОЗИ́РУЮЩИЙ (t. stenosans; син.: лигаментит стенозирующий, пальцы защелкивающиеся, пальцы пружинящие, пальцы рессорные, пальцы щелкающие) — асептический Т., чаще по ходу короткого разгибателя и длинной отводящей мышцы большого пальца кисти, характеризующийся утолщением стенок синовиального влагалища и ущемлением заключенного в нем сухожилия, что вызывает перемежающуюся контрактуру пальца.

ТЕНДОСИНОВИ́Т (tendosynovitis; *тендо-* + анат. membrana synovialis синовиальная оболочка + *-ит*) — см. *Тендовагинит.*

ТЕНДОСИНОВИ́Т УЗЛОВА́ТЫЙ (tendosynovitis nodularis) — см. *Онуголь гигантоклеточная сухожильных влагалищ.*

ТЕНЕВА́Я ПРО́БА — см. *Скиаскопия.*

ТЕНЕ́ЗМЫ (tenesmi; греч. teinesmos от teino растягивать, напрягать) — ложные болезненные позывы к дефекации, напр. при проктите, дизентерии.

ТЕНЗИО́МЕТР МЫ́ШЕЧНЫЙ (лат. tensio напряжение + греч. metreō измерять, определять) — см. *Миотонометр.*

ТЕ́НЗИЯ ГЛА́ЗА (tensio oculi; лат. напряжение, от tendo, tensum тянуть, натягивать) — см. *Внутриглазное давление.*

ТЕНЗОРЕЦЕ́ПТОРЫ (лат. tendo, tensum тянуть, натягивать + *рецепторы*; син. рецепторы растяжения) — механорецепторы, воспринимающие растяжение мышцы или сухожилия.

ТЕ́НИ ЭРИТРОЦИ́ТОВ — строма эритроцитов, остающаяся в виде бесцветной массы после гемолиза.

TAENIA SÓLIUM (син.: цепень вооруженный, цепень свиной) — вид цестод сем. Taeniidae отр. Cyclophyllidea, паразитирующий в тонкой кишке человека; промежуточный хозяин — свиньи; возбудитель тениоза человека.

ТЕНИАРИНХО́З (taeniarhynchosis) — гельминтоз из группы цестодозов, вызываемый Taeniarhynchus saginatus (бычьим цепнем) или Taeniarhynchus confusum, характеризующийся развитием диспептических явлений; человек заражается при употреблении в пищу говядины, содержащей личинки возбудителя и не подвергнутой достаточной термической обработке.

TAENIARHYNCHUS CONFÚSUM — вид цестод сем. Taeniidae отр. Cyclophyllidea, паразитирующий в тонкой кишке человека; промежуточный хозяин — предположительно крупный рогатый скот; возбудитель тениаринхоза в США, Японии, Восточной Африке.

TAENIARHYNCHUS SAGINÁTUS (син.: цепень бычий, цепень невооруженный) — вид цестод сем. Taeniidae отр. Cyclophyllidea, паразитирующий в тонкой кишке человека; промежуточный хозяин — крупный рогатый скот; возбудитель тениаринхоза.

ТЕНИИДО́ЗЫ (taeniidoses) — гельминтозы из группы цестодозов, вызываемые представителями сем. Taeniidae; включают эхинококкоз, альвеококкоз, тениоз, тениаринхоз, ценуроз.

ТЕНИИ́ДЫ (Taeniidae) — семейство цестод отр. Cyclophyllidea; половозрелые черви паразитируют в просвете тонкой кишки, а личинки — в тканях млекопитающих; нек-рые виды являются возбудителями тениидозов человека.

ТЕНИО́З (taeniosis) — гельминтоз из группы цестодозов, вызываемый свиным цепнем (Taenia solium); характеризуется диспептическими явлениями, иногда осложняется цистицеркозом; человек заражается при употреблении в пищу свинины, содержащей личинки возбудителя и не подвергнутой достаточной термической обработке.

ТЕНИОФОБИ́Я (taeniophobia; биол. Taenia род ленточных червей + *фобия*) — боязнь заражения ленточными гельминтами; разновидность нозофобии.

ТЕНО- (тен-, греч. tenōn сухожилие) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сухожилию».

ТЕНОДЕ́З (tenodesis; *тено-* + греч. desis связывание, скрепление) — хирургическая операция: ограничение подвижности сустава путем фиксации его сухожилиями.

ТЕНОЛИГАМЕНТОКАПСУЛОТОМИ́Я (tenoligamentocapsulotomia; *тено-* + лат. ligamentum связка + анат. capsula articularis суставная капсула + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение сухожилий, связок и капсулы голеностопного сустава; применяется при лечении врожденной косолапости.

ТЕНО́ЛИЗ (tenolysis; *тено-* + греч. lysis освобождение) — хирургическая операция: освобождение сухожилия из рубцов.

ТЕНОЛО́ГИЯ (tenologia; *тено-* + греч. logos учение, наука) — раздел анатомии, посвященный изучению развития, строения и функции сухожилий.

ТЕНОМИОТОМИ́Я (tenomyotomia; *тено-* + греч. mys, myos мышца + tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение мышцы и ее сухожилия (напр., с целью удлинения мышцы).

ТЕНОНИ́Т (tenonitis; анат. устар. capsula Tenoni влагалище глазного яблока + *-ит*; син. капсулит) — воспаление влагалища глазного яблока (теноновой капсулы).

ТЕНО́НОВА КА́ПСУЛА (capsula Tenoni; J. R. Tenon, 1724—1816, франц. анатом и хирург) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1014*.

ТЕНО́НОВА ФА́СЦИЯ (fascia Tenoni; J. R. Tenon) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1014*.

ТЕНО́НОВО ПРОСТРА́НСТВО (J. R. Tenon) — см. *Эписклеральное пространство*.

ТЕНОНОГРАФИ́Я (tenonographia; анат. устар. capsula Tenoni влагалище глазного яблока + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография влагалища глазного яблока (теноновой капсулы) после его контрастирования введением газа в эписклеральное пространство.

ТЕНОПЛА́СТИКА (tenoplastica; *тено-* + *пластика*) — пластика сухожилий и их синовиальных влагалищ.

Т. ПО БИЗА́ЛЬСКОМУ — МА́ЙЕРУ — см. *Бизальского—Майера тенопластика*.

Т. ПО КО́ФМАНУ — см. *Кофмана тенопластика*.

ТЕНОПЛИКА́ТОР (*тено-* + лат. plico, plicatum складывать) — хирургический инструмент для образования складок сухожилия при ортопедической операции его укорочения.

ТЕНОПЛИКА́ТОР БЕ́ККЕРА — см. *Беккера тенопликатор*.

ТЕНОРАФИ́Я (tenorrhaphia; *тено-* + греч. rhaphē шов) — хирургическая операция сшивания или ушивания сухожилия.

ТЕНО́ТОМ (*тено-* + греч. tomē разрез, рассечение) — скальпель для подкожного рассечения сухожилий.

ТЕНО́ТОМ ВУЛЬПИУ́СА — см. *Вульпиуса тенотом*.

ТЕНО́ТОМ ГЕРЕ́НА — см. *Герена тенотом*.

ТЕНО́ТОМ ГЮ́БШЕРА — см. *Гюбшера тенотом*.

ТЕНО́ТОМ ДИФФЕ́НБАХА — см. *Диффенбаха тенотом*.

ТЕНОТО́МИЯ (tenotomia; *тено-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: пересечение или частичное рассечение сухожилия.

Т. ПО ЛА́НДОЛЬТУ — см. *Ландольта тенотомия*.

Т. ПО ПЕ́РТЕСУ — ШЕ́ДЕ — см. *Пертеса — Шеде тенотомия*.

Т. ПО ШАВА́ССУ — см. *Шавасса тенотомия*.

ТЕН-ХО́РНА ПРИ́ЗНАК (C. Ten Horn, нем. хирург) — болезненность в правом яичке при легком потягивании за основание мошонки; возможный симптом аппендицита.

ТЕО́РИЯ БЕГУ́ЩЕЙ ВОЛНЫ́ — см. *Бекеши теория слуха*.

ТЕО́РИЯ БОКОВЫ́Х ЦЕПЕ́Й — см. *Эрлиха теория иммунитета*.

ТЕО́РИЯ ДВОЙСТВЕ́ННОСТИ ЗРЕ́НИЯ — теория, объясняющая формирование зрительных ощущений за счет функционирования двух систем рецепторов в сетчатке: палочек (сумеречное и ночное зрение) и колбочек (дневное и цветовое зрение).

ТЕО́РИЯ ДЕГЕНЕРА́ЦИИ — теоретическое представление, бытующее в современной буржуазной медицине, согласно к-рому происходит вырождение человека, обусловленное несоответствием социальных условий его существования условиям его формирования в антропогенезе.

ТЕО́РИЯ ДИВЕРГЕ́НТНОГО РАЗВИ́ТИЯ ТКА́НЕЙ — см. *Хлопина теория*.

ТЕО́РИЯ ЖИВО́ТНОГО МАГНЕ́ТИЗМА — см. *Месмеризм*.

ТЕО́РИЯ ЗАРО́ДЫШЕВОГО ПУТИ́ — см. *Вейсмана теория*.

ТЕО́РИЯ ЗАРО́ДЫШЕВЫХ ЛИСТКО́В — см. *Ковалевского теория*.

ТЕО́РИЯ ЗРЕ́НИЯ ИО́ННАЯ (син. Лазарева теория зрения) — теория, согласно к-рой при действии светового раздражителя на светочувствительные элементы сетчатки (палочки и колбочки) в последних происходят фотохимические процессы распада молекул светочувствительного вещества с изменением концентрации ионов и определенным сдвигом в соотношении между ними.

ТЕО́РИЯ КАСКА́ДА (син. теория свертывания крови каскадная) — теория, объясняющая свертывание крови последовательной активацией факторов свертывания, начиная с фактора XII, к-рый активируется при соприкосновении с чужеродной поверхностью.

ТЕО́РИЯ КАТАСТРО́Ф (истор.) — учение о периодической гибели органического мира вследствие катастрофических событий планетарного масштаба, во время к-рых происходит перестройка геологии Земли, в результате появляются новые неизменяемые виды и роды живых организмов, не связанные с погибшими формами; была предложена Ж. Кювье в 18 в. и потеряла свое значение к концу 19 в.

ТЕО́РИЯ КРИТИ́ЧЕСКИХ ПЕРИО́ДОВ — теория, согласно к-рой в развитии зародыша и отдельных его зачатков существуют периоды наибольшей чувствительности к действию физических и химических факторов.

ТЕО́РИЯ МИШЕ́НИ (син.: принцип мишени, принцип попадания) в радиобиологии — теория, согласно к-рой радиобиологический эффект является результатом повреждения особо чувствительных к ионизирующему излучению биологических структур (мишеней).

ТЕО́РИЯ РЕПРЕ́ССИИ-ДЕРЕПРЕ́ССИИ — теория антителообразования, согласно к-рой антиген в иммунокомпетентной клетке вызывает специфическую дерепрессию генов, ответственных за синтез антител.

ТЕО́РИЯ СВЕ́РТЫВАНИЯ КРО́ВИ КАСКА́ДНАЯ — см. *Теория каскада*.

ТЕО́РИЯ СИСТЕ́М — теория, описывающая общие свойства систем (структуру, способы взаимодействия подсистем, информационные связи и др.) независимо от их физического содержания; одна из основных теорий кибернетики, в т. ч. биологической и медицинской.

ТЕО́РИЯ ТКАНЕ́ВОЙ ЭВОЛЮ́ЦИИ — см. *Заварзина теория*.

ТЕО́РИЯ ЦВЕТООЩУЩЕ́НИЯ ТРЕ́ХКОМПОНЕ́НТНАЯ — см. *Гельмгольца теория цветоощущения*.

ТЕПЛОВИ́ДЕНИЕ (син. термография) — метод регистрации инфракрасного (теплового) излучения поверхности тела человека на экране тепловизора.

ТЕПЛОВИ́ЗОР (тепло + лат. video, visum видеть; син. термограф) — прибор, преобразующий невидимое инфракрасное (тепловое) излучение объекта в видимое, отображаемое на экране электронно-лучевой трубки; в медицине применяется для выявления местных отклонений температуры кожи, что может иметь диагностическое значение.

ТЕПЛОВО́Й РЕЖИ́М — характеристика состояния среды в помещении, основанная на исследовании динамики температуры воздуха и поверхностей находящихся в нем предметов, а также интенсивности инфракрасного (теплового) излучения.

ТЕПЛОВО́Й УДА́Р — остро возникающее патологическое состояние, обусловленное нарушением терморегуляции организма при длительном воздействии на него высокой температуры воздуха или инфракрасного (теплового) излучения; характеризуется повышением температуры тела, усиленным потоотделением, учащением пульса и дыхания, головной болью, тошнотой и рвотой, адинамией, обмороками, в тяжелых случаях — острым развитием оглушения, психомоторного возбуждения, судорог, нарушений координации движений.

ТЕПЛОВЫ́Е ТО́ЧКИ — участки кожи, в к-рых преимущественно локализуются рецепторы, воспринимающие тепловое раздражение.

ТЕПЛОИЗЛУЧЕ́НИЕ — см. *Теплоотдача радиационная*.

ТЕПЛОЛЕЧЕ́НИЕ (син. термотерапия) — метод физиотерапии, заключающийся в дозированном воздействии на организм больного тепла, отдаваемого какими-либо теплоносителями или образующимся в тканях организма при поглощении ими энергии электромагнитных колебаний.

ТЕПЛООБМЕ́Н в физиологии — обмен тепловой энергией между организмом и окружающей средой.

Т. КОНВЕКТИ́ВНЫЙ (лат. convectio принесение, доставка) — Т. путем переноса тепла движущимся газом (воздухом) или жидкостью, окружающими организм.

Т. КОНДУКТИ́ВНЫЙ (лат. conduco, conductum сводить, соединять) — Т. путем проведения тепла к (или от) поверхности какого-либо твердого тела, соприкасающегося с поверхностью тела.

Т. РАДИАЦИО́ННЫЙ — Т. путем испускания или поглощения организмом лучистой энергии.

ТЕПЛООБРАЗОВА́НИЕ в физиологии — см. *Теплопродукция*.

ТЕПЛООТДА́ЧА в физиологии — выделение организмом тепловой энергии в окружающую среду.

Т. ИСПАРИ́ТЕЛЬНАЯ — Т. путем испарения воды с поверхности кожи, легочных альвеол и дыхательных путей.

Т. КОНВЕКЦИО́ННАЯ (лат. convectio принесение, доставка) — Т. путем переноса тепла движущимся газом (воздухом) или жидкостью, окружающими организм.

Т. РАДИАЦИО́ННАЯ (син. теплоизлучение) — Т. путем инфракрасного излучения поверхностью тела.

ТЕПЛОПРОДУ́КЦИЯ (син. теплообразование) в физиологии — образование тепла в организме в результате обменных процессов.

Т. ВОССТАНОВИ́ТЕЛЬНАЯ — см. *Теплопродукция запаздывающая*.

Т. ЗАПА́ЗДЫВАЮЩАЯ (син. Т. восстановительная) — фаза Т. в мышце,

продолжающаяся в течение нескольких минут после ее расслабления и соответствующая периоду ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты.

Т. НАЧА́ЛЬНАЯ — фаза Т. в мышце, соответствующая периоду ее сокращения и последующего расслабления.

ТЕПЛОСВЕТОЛЕЧЕ́НИЕ — метод физиотерапии, заключающийся в дозированном воздействии на организм больного инфракрасного (теплового) и видимого излучения естественных или искусственных источников света.

ТЕРАПЕ́ВТ (греч. therapeutēs ухаживающий за больными, лечащий) — врач-специалист, получивший подготовку по вопросам диагностики, лечения и профилактики болезней внутренних органов.

ТЕРАПЕ́ВТ ВЕДУ́ЩИЙ — наиболее опытный и квалифицированный терапевт, на к-рого возложено нештатное руководство терапевтической деятельностью в данном военном лечебном учреждении.

ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ И́НДЕКС — показатель широты терапевтического действия лекарственных веществ, представляющий собой отношение средней смертельной дозы к дозе, вызывающей терапевтический эффект у 50% экспериментальных животных.

ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ ИНТЕРВА́Л РАДИОЧУВСТВИ́ТЕЛЬНОСТИ — см. *Радиотерапевтический интервал.*

ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ ТЕА́ТР — см. *Психодрама.*

ТЕРАПИЯ[1] (therapia; греч. therapeia уход, лечение) — лечение больного; термин употребляется главным образом для обозначения так называемых консервативных методов лечения.

Т. АТРОПИНОШО́КОВАЯ — Т. нек-рых психических расстройств путем подкожного введения атропина в дозах, вызывающих кому.

Т. ГЕМОСТАТИ́ЧЕСКАЯ — Т., направленная на прекращение кровотечения.

Т. ГИДРАТАЦИО́ННАЯ — Т., направленная на увеличение содержания жидкости в организме путем ее введения извне; применяется, напр., при обезвоживании.

Т. ГИДРАТАЦИО́ННО - ДЕГИДРАТАЦИО́ННАЯ — Т., включающая как обильное введение жидкости в организм извне, так и усиленное ее выведение с помощью форсированного диуреза; применяется чаще в качестве дезинтоксикационной Т.

Т. ГОРМОНА́ЛЬНАЯ — см. *Гормонотерапия.*

Т. ДЕГИДРАТАЦИО́ННАЯ — Т., направленная на уменьшение содержания жидкости в организме или в отдельных органах и системах; применяется, напр., при отеках.

Т. ДЕЗИНТОКСИКАЦИО́ННАЯ — Т., направленная на обезвреживание ядовитых веществ в организме и (или) их выведение.

Т. ДЕСЕНСИБИЛИЗИ́РУЮЩАЯ — Т., направленная на снижение чувствительности организма к каким-либо антигенам.

Т. ДЕСЕНСИБИЛИЗИ́РУЮЩАЯ НЕСПЕЦИФИ́ЧЕСКАЯ — Т. д., заключающаяся во введении небольших доз белковых препаратов и противоаллергических средств с целью снижения чувствительности к любым антигенам (аллергенам).

Т. ДЕСЕНСИБИЛИЗИ́РУЮЩАЯ СПЕЦИФИ́ЧЕСКАЯ — см. *Гипосенсибилизация специфическая.*

Т. ДЕЦИМЕТРОВО́ЛНОВАЯ (син. ДМВ-терапия)— Т., заключающаяся в воздействии на организм больного электромагнитными колебаниями с длиной волны 0,1—1 *м*; вид электролечения.

Т. ЗАМЕСТИ́ТЕЛЬНАЯ — Т., заключающаяся во введении в организм вещества, естественная выработка к-рого понижена или прекращена.

Т. ЗА́НЯТОСТЬЮ — Т. психически больных, основанная на вовлечении их в активную деятельность.

Т. ИММУНОДЕПРЕССИ́ВНАЯ — Т., основанная на использовании лекарственных средств, вызывающих подавление иммунологической реактивности организма (иммунодепрессивных средств): применяется, напр., при аутоаллергических болезнях.

Т. ИНСУЛИНОАМИНАЗИ́НОВАЯ — инсулинотерапия психических болезней в сочетании с применением нейролептических средств (напр., аминазина).

Т. ИНСУЛИ́НОВАЯ — см. *Инсулинотерапия.*

Т. ИНТЕНСИ́ВНАЯ — комплексная Т., проводимая при тяжелых и угрожающих жизни больного состояниях.

Т. КВА́НТОВАЯ (син. Т. фотонная) — лучевая Т. с использованием рентгеновского и гамма-излучения.

Т. КИСЛОРО́ДНАЯ (син. оксигенотерапия) — Т., основанная на введении в организм кислорода.

Т. КИСЛОРО́ДНАЯ ИНГАЛЯЦИО́ННАЯ — Т. к., при к-рой кислород вводят в легкие через дыхательные пути.

Т. КИСЛОРО́ДНАЯ МЕ́СТНАЯ — Т. к., при к-рой кислород вводят в какую-либо полость тела или участок ткани для локального воздействия.

Т. КИСЛОРО́ДНАЯ НЕИНГАЛЯЦИО́ННАЯ — общее название методов Т. к., при к-ром кислород вводят в организм не через легкие.

Т. КОМПЛЕ́КСНАЯ — Т., при к-рой одновременно используется совокупность лечебных методов и средств, действующих на различные звенья патогенеза данной болезни.

Т. КОНСЕРВАТИ́ВНАЯ — Т. без хирургического вмешательства.

Т. КОРОТКОВО́ЛНОВАЯ — см. *Индуктотермия.*

Т. КОРПУСКУЛЯ́РНАЯ — лучевая Т. с использованием потоков частиц (электронов, тяжелых заряженных частиц, нейтронов, пи-мезонов).

Т. ЛУЧЕВА́Я (син. радиотерапия) — Т., основанная на использовании с лечебной целью ионизирующего излучения.

Т. ЛУЧЕВА́Я АППЛИКАЦИО́ННАЯ — Т. л., при к-рой источник ионизирующего излучения, фиксированный в специальных приспособлениях, размещают на поверхности пораженного участка ткани.

Т. ЛУЧЕВА́Я БЛИЗКОФО́КУСНАЯ — рентгенотерапия, при к-рой источник излучения удален от поверхности облучаемого участка тела на расстояние 5—10 *см*; гамма-терапия, при к-рой источник излучения удален от поверхности тела на расстояние до 30 *см*, прежде называлась короткодистанционной Т. л. (брахитерапией).

Т. ЛУЧЕВА́Я ВНУ́ТРЕННЯЯ—Т. л., при к-рой используется излучение радиофармацевтического препарата, введенного в полости или ткани организма больного.

Т. ЛУЧЕВА́Я ВНУТРИПОЛОСТНА́Я — Т. л., при к-рой источник ионизирующего излучения вводят в полость тела или в просвет полого органа больного.

Т. ЛУЧЕВА́Я ВНУТРИТКАНЕВА́Я — Т. л., при к-рой источник ионизирующего излучения (радиофармацевтические препараты, радионосные иглы и др.) вводят непосредственно в пораженный участок ткани больного, обычно в опухоль.

Т. ЛУЧЕВА́Я ДИСТАНЦИО́ННАЯ — Т. л., при к-рой источник ионизирующего излучения находится на нек-ром расстоянии от поверхности облучаемого участка тела.

Т. ЛУЧЕВА́Я МЕГАВО́ЛЬТНАЯ — квантовая Т., при к-рой используют ионизирующее излучение с энергией 1 *Мэв* и более.

Т. ЛУЧЕВА́Я ПОСЛЕОПЕРАЦИО́ННАЯ — Т. л., проводимая после хирургического вмешательства.

Т. ЛУЧЕВА́Я ПРЕДОПЕРАЦИО́ННАЯ — Т. л., предшествующая хирургическому вмешательству.

Т. ЛУЧЕВА́Я СОЧЕТА́ННАЯ — Т. л., при к-рой используется несколько различных способов облучения.

Т. МЕ́СТНАЯ — Т., при к-рой воздействуют непосредственно на орган или ткань, пораженные патологическим процессом.

Т. МИКРОВО́ЛНОВАЯ (син.: терапия сверхвысокочастотная, СВЧ-терапия) — Т., основанная на воздействии электромагнитных колебаний с длиной волны от 1 *мм* до 1 *м*; включает несколько видов электролечения.

Т. МИКРОВО́ЛНОВАЯ ИМПУЛЬСНАЯ (нрк) — см. *Терапия сантиметроволновая импульсная.*

Т. МИЛЛИМЕТРОВО́ЛНОВАЯ — Т., заключающаяся в воздействии на организм больного энергией электромагнитных колебаний с длиной волны от 1 до 10 *мм*; вид электролечения.

Т. НЕЙТРО́ННАЯ — лучевая Т. с использованием нейтронного излучения.

Т. НЕЙТРОНОЗАХВА́ТНАЯ —лучевая Т. с использованием тепловых нейтронов после предварительного введения в опухоль радионуклидов, захватывающих нейтроны.

Т. НЕОТЛО́ЖНАЯ (син. Т. ургентная) — незамедлительно осуществляемая Т., направленная на выведение больного из состояния, угрожающего его жизни.

Т. ОБЩЕСТИМУЛИ́РУЮЩАЯ — см. *Терапия общеукрепляющая.*

Т. ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ (син. Т. общестимулирующая) — Т., направленная на повышение естественных защитных сил организма.

Т. ПАЛЛИАТИ́ВНАЯ — Т., направленная на получение временного или частичного улучшения состояния больного или компенсации нек-рых нарушенных функций организма.

Т. ПАТОГЕНЕТИ́ЧЕСКАЯ —Т., направленная на различные звенья патогенеза болезни.

Т. ПИ-МЕЗО́ННАЯ (син. Т. пионная)— лучевая Т. с использованием пучка отрицательно заряженных пимезонов.
Т. ПИО́ННАЯ — см. *Терапия пи-мезонная.*
Т. ПИРОГЕ́ННАЯ — см. *Пиротерапия.*
Т. ПОВЕДЕ́НИЯ (син. Т. поведенческая) — Т. больных психозами и неврозами путем введения системы запретов и поощрений с целью исправления их поведения; вид психотерапии.
Т. ПОВЕДЕ́НЧЕСКАЯ — см. *Терапия поведения.*
Т. ПОДДЕ́РЖИВАЮЩАЯ — 1) Т., при к-рой лекарственные средства используют для сохранения полученного ранее лечебного эффекта; 2) в психиатрии — продолжение в амбулаторных условиях лечения, начатого в стационаре, с целью поддержания ремиссии.
Т. ПРОТИВОРЕЦИДИ́ВНАЯ — Т., направленная на предупреждение обострения или повторного приступа болезни.
Т. ПРОТИВОСУ́ДОРОЖНАЯ — Т., направленная на прекращение или ослабление судорог у больного.
Т. ПРОТО́ННАЯ — лучевая Т. с использованием пучка протонов.
Т. РА́ДИЕВАЯ — см. *Кюри-терапия.*
Т. РАДИКА́ЛЬНАЯ — Т., имеющая целью достичь полного излечения больного.
Т. РЕФЛЕКТО́РНАЯ — см. *Рефлексотерапия.*
Т. САНТИМЕТРОВОЛНО́ВАЯ — Т., основанная на воздействии на организм больного энергией электромагнитных колебаний с длиной волны 1—12,6 *см*; вид электролечения.
Т. САНТИМЕТРОВОЛНО́ВАЯ ИМПУЛЬСНАЯ (син. Т. микроволновая импульсная — нрк) — Т. с., при к-рой воздействие проводят многократно повторяющимися короткими импульсами.
Т. СВЕРХВЫСОКОЧАСТО́ТНАЯ— см. *Терапия микроволновая.*
Т. СЕГМЕНТА́РНО-РЕФЛЕКТО́РНАЯ — см. *Сегментарно-рефлекторное воздействие.*
Т. СЕМЕ́ЙНАЯ — применение различных форм психотерапии для воздействия как на психически больного, так и на членов его семьи с целью разрешения внутрисемейных конфликтов и оздоровления взаимоотношений в семье.
Т. СИМПТОМАТИ́ЧЕСКАЯ — Т., направленная на ликвидацию или ослабление отдельных проявлений болезни.
Т. СКЛЕРОЗИ́РУЮЩАЯ — Т. варикозного расширения вен (чаще нижних конечностей) с помощью лекарственных средств, вводимых в варикозные узлы и вызывающих их облитерацию (варикоцид, тетрадецилсульфат и др.).
Т. СНОМ (hypnotherapia; син. Т. сонная) — Т. психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон.
Т. СО́ННАЯ — см. *Терапия сном.*
Т. СОЦИА́ЛЬНАЯ — см. *Социотерапия.*
«Т. СТЕРИЛИЗУ́ЮЩАЯ БОЛЬША́Я» — см. *Антисептика общая.*
Т. СТИМУЛИ́РУЮЩАЯ — Т., направленная на усиление ослабленной функции какого-либо органа или системы.
Т. СУ́ДОРОЖНАЯ — Т. психически больных, основанная на вызывании у них судорожных припадков путем введения соответствующего лекарственного средства или раздражения определенного участка головного мозга электрическим током.
Т. ТКАНЕВА́Я (син. Филатова тканевая терапия) — Т., основанная на введении в организм больного животных или растительных тканей или их экстрактов, действующих в качестве биогенных стимуляторов.
Т. ТРУДОВА́Я (син.: трудотерапия, эрготерапия) — Т. психически больных, основанная на привлечении их к трудовым процессам.
Т. УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТО́ТНАЯ (син.: Т. ультракоротковолновая, УВЧ-терапия) — Т., основанная на воздействии на организм больного энергией электромагнитных колебаний с длиной волны от 1 до 10 *м*; вид электролечения.
Т. УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТО́ТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ — Т. у., при к-рой воздействие проводят многократно повторяющимися короткими импульсами.
Т. УЛЬТРАЗВУКОВА́Я (син. сонотерапия) — Т., заключающаяся в воздействии на определенные участки тела больного энергией механических колебаний с частотой, превышающей 20 *кГц* (обычно 800—1000 *кГц* и 2—3 *МГц*).
Т. УЛЬТРАКОРОТКОВО́ЛНОВАЯ— см. *Терапия ультравысокочастотная.*
Т. УРГЕ́НТНАЯ (лат. urgens, urgentis настоятельный, неотложный) — см. *Терапия неотложная.*
Т. ФИЗИКА́ЛЬНАЯ — см. *Физиотерапия.*
Т. ФИЗИ́ЧЕСКАЯ — см. *Физиотерапия.*
Т. ФОТО́ННАЯ — см. *Терапия квантовая.*
Т. ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ АКТИ́ВНАЯ — Т., направленная на восстановление нарушенных функций каких-либо органов и систем, включающая наряду с другими методами лечебную физкультуру и трудотерапию.
Т. ЦИТОСТАТИ́ЧЕСКАЯ — Т. с использованием лекарственных средств, тормозящих деление клетки.
Т. ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ (син.: кардиоверсия — нрк, контршок — нрк) — Т. нек-рых аритмий, основанная на воздействии на миокард разряда конденсатора высокого напряжения, что ведет к деполяризации всего миокарда и прерывает патологическую циркуляцию в нем волн возбуждения.
Т. ЭЛЕКТРОКОНВУЛЬСИ́ВНАЯ — см. *Терапия электросудорожная.*
Т. ЭЛЕКТРО́ННАЯ — лучевая Т. с использованием пучка электронов.
Т. ЭЛЕКТРОСУ́ДОРОЖНАЯ (син.: Т. электроконвульсивная, электрошок) — Т. психически больных, основанная на вызывании у них судорожных припадков путем раздражения определенного участка головного мозга электрическим током.
Т. ЭРАДИКАЦИО́ННАЯ (лат. eradicatio искоренение, истребление) — Т. гемобластозов, направленная на полное уничтожение патологического клеточного клона.
Т. ЭТИОТРО́ПНАЯ (греч. aitia причина + tropos направление) — Т., направленная против причинных факторов болезни.

ТЕРАПИ́Я[2] — см. *Болезни внутренние.*

ТЕРАПИ́Я ВОЕ́ННО-ПОЛЕВА́Я — раздел внутренних болезней и военной медицины, изучающий диагностику, клинику и лечение основных форм боевых поражений терапевтического профиля, особенности возникновения, течения, профилактики и лечения болезней (в т. ч. профессиональных) военнослужащих, а также разрабатывающий организационные формы оказания терапевтической помощи (этапного лечения) в войсках в мирное и военное время.

ТЕРАТ- (терато-; греч. teras, teratos чудовище, урод, уродство) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к аномалии развития, к уродству».

ТЕРАТО- — см. *Терат-.*

ТЕРАТОБЛАСТО́МА (teratoblastoma; *терато-* + *бластома*; син.: тератома бластоматозная, тератома злокачественная анапластическая) — злокачественная опухоль, развившаяся в результате нарушения формирования тканей в эмбриональном периоде или в результате малигнизации тератомы.

ТЕРАТОБЛАСТО́МА ЯИ́ЧНИКА ЭНТОДЕРМА́ЛЬНАЯ (teratoblastoma ovarii entodermale) — см. *Кистома яичника псевдомуцинозная сецернирующая.*

ТЕРАТОГЕНЕ́З (teratogenesis; *терато-* + греч. genesis зарождение, развитие) — механизм возникновения аномалий развития.

ТЕРАТОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЦИО́ННЫЙ ПЕРИО́Д (син. тератогенетический терминационный пункт) — часть периода эмбриогенеза, в течение к-рой воздействие на зародыш какого-либо вредного фактора может вызвать возникновение аномалии развития определенного органа; напр., 5-я и 6-я недели беременности являются Т. т. п. для развития губ.

ТЕРАТОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЦИО́ННЫЙ ПУНКТ — см. *Тератогенетический терминационный период.*

ТЕРАТОГЕ́ННОЕ ДЕ́ЙСТВИЕ (син. тератогенность) — свойство физического, химического или биологического фактора (напр., ионизирующего излучения, нек-рых лекарственных средств, ядов, вирусов) вызывать нарушения процесса эмбриогенеза, приводящие к возникновению аномалий развития.

ТЕРАТОГЕ́ННОСТЬ (*терато-* + греч. -genēs порождающий, вызывающий) — см. *Тератогенное действие.*

ТЕРАТОЗООСПЕРМИ́Я (teratozoospermia; *терато-* + греч. zōon живое существо + sperma семя, сперма)— наличие в эякуляте патологических форм сперматозоидов.

ТЕРАТОКАРЦИНО́МА (teratocarcinoma; *терато-* + *карцинома*) — см. *Рак эмбриональный.*

ТЕРАТОЛО́ГИЯ (*терато-* + греч. logos учение, наука) — раздел эмбриологии, изучающий аномалии развития.

ТЕРАТО́МА (teratoma; *терат-* + *-ома*; син. эмбриоцитома) — опухоле-

подобное образование, возникающее в результате нарушения формирования тканей в эмбриональном периоде развития; состоит из одной или нескольких зрелых тканей; может расти и развиваться параллельно с ростом организма.

ТЕРАТО́МА БИГЕРМИНА́ЛЬНАЯ (teratoma bigerminale; лат. bi-два + germen, germinis росток, зародыш; син.: бигерминома, бидермома) — тератома сложного строения и тканевого состава, возникающая в результате нарушения первых стадий дробления оплодотворенного яйца (до фазы гаструляции).

ТЕРАТО́МА БЛАСТОМАТО́ЗНАЯ (teratoma blastomatosum) — см. *Тератобластома.*

ТЕРАТО́МА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ АНАПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (teratoma malignans anaplasticum) — см. *Тератобластома.*

ТЕРАТО́МА КИСТО́ЗНАЯ (teratoma cystosum) — см. *Дермоид.*

ТЕРАТО́МА КО́ЖНОГО ТИ́ПА — см. *Дермоид.*

ТЕРГИ́Т (tergitum; лат. tergum спина, тыльная сторона) — хитиновая пластинка, покрывающая дорсальную сторону сегментов тела членистоногих.

ТЕР-ЕГИАЗА́РОВА ВИНТ-ШИ́ЛО (Г. М. Тер-Егиазаров, род. в 1923 г., сов. травматолог-ортопед) — приспособление для фиксации к кости небольших костных фрагментов без их предварительного сверления; представляет собой металлический винт, заканчивающийся трехгранным шилом.

ТЕР-ЕГИАЗА́РОВА МЕ́ТОД (Г. М. Тер-Егиазаров) — 1) остеотомия бедренной кости, при к-рой соединение фрагментов производят с помощью фиксатора, предложенного автором метода; 2) остеосинтез медиального надмыщелка плечевой кости с помощью винта-шила, предложенного автором метода.

ТЕР-ЕГИАЗА́РОВА ФИКСА́ТОР (Г. М. Тер-Егиазаров) — приспособление для соединения фрагментов бедренной кости после ее остеотомии; состоит из вилки, вводимой в шейку бедра, и соединенной с ней пластины с обоймами, к-рую можно закрепить под заданным углом к вилке.

ТЕР-ЕГИАЗА́РОВА ШИ́НА (Г. М. Тер-Егиазаров) — устройство для лечения переломов плечевой кости у детей; состоит из двух полукорсетов, укрепляемых на туловище ребенка с опорой на крылья подвздошных костей и из деталей, позволяющих удерживать плечо в положении отведения, производить скелетное вытяжение, осуществлять перемещение плеча в горизонтальной плоскости и ротацию предплечья.

ТЕРИОЛО́ГИЯ (греч. thērion зверь + logos учение, наука; син. маммалиология) раздел зоологии, изучающий млекопитающих.

ТЕРМ- (термо-; греч. thermos теплый, thermē теплота, жар) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к теплу, к температуре».

ТЕРМАЛГИ́Я (thermalgia; *терм-* + греч. algos боль) — возникновение боли при воздействии теплового или холодового раздражителя; наблюдается при сирингомиелии и нек-рых других болезнях.

ТЕРМАНЕСТЕЗИ́Я (thermanaesthesia; *терм-* + *анестезия*) — отсутствие температурной чувствительности.

ТЕРМИНАЛИЗА́ЦИЯ (лат. terminalis конечный) — смещение хиазм к концам мультивалентов в мейозе, начинающееся в конце профазы (в диплотене).

ТЕРМИНА́ЛЬНАЯ НИТЬ — см. *Конечная нить.*

ТЕРМИНА́ЛЬНАЯ ПА́УЗА (син. агональная пауза) — временное (до нескольких минут) прекращение дыхательных движений при крайне тяжелых состояниях больного; обычно предшествует агональному дыханию.

ТЕРМИНА́ЛЬНАЯ ПЛАСТИ́НКА (lamina terminalis, PNA, BNA; lamina terminalis cinerea ventriculi tertii, JNA) — тонкий слой серого вещества, расположенный фронтально между полушариями большого мозга впереди зрительного перекреста; образует переднюю стенку третьего желудочка.

ТЕРМИНА́ЛЬНОЕ СОСТОЯ́НИЕ (status terminalis) — обратимое состояние угасания функций организма, предшествующее биологической смерти; включает преагональное состояние, агонию и клиническую смерть.

ТЕРМО- — см. *Терм-.*

ТЕРМОАНЕМО́МЕТР (*термо-* + *анемометр*) — прибор для измерения скорости движения воздуха по величине теплоотдачи нагретого тела, помещенного в исследуемый воздушный поток; применяется в гигиенических исследованиях.

ТЕРМОБАРОКА́МЕРА (*термо-* + *барокамера*) — барокамера, устройство к-рой обеспечивает возможность сочетанного воздействия на организм повышенного (или пониженного) давления воздуха (газов) и повышенной (или пониженной) температуры окружающей среды.

ТЕРМОБАРО́МЕТР (*термо-* + *барометр*; син. гипсотермометр) — прибор для измерения величины атмосферного давления путем определения точки кипения жидкости, обычно воды.

ТЕРМОГАЗЛИ́ФТ — естественное фонтанирование высокогазонасыщенных термальных минеральных вод из скважины.

ТЕРМОГИГРО́ГРАФ (*термо-* + *гигрограф*) — прибор для непрерывной одновременной графической регистрации температуры и влажности воздуха или какого-либо газа.

ТЕРМОГИПЕРЕСТЕЗИ́Я (thermohyperaesthesia; *термо-* + *гиперестезия*) — повышенная чувствительность к тепловым и холодовым раздражителям.

ТЕРМОГИПЕСТЕЗИ́Я (thermohypaesthesia; *термо-* + *гипестезия*) — пониженная чувствительность к тепловым или холодовым раздражителям.

ТЕРМОГРА́ММА (*термо-* + греч. gramma запись) — 1) кривая, отражающая изменения во времени температуры одного или нескольких участков тела человека; 2) изображение распределения инфракрасного (теплового) излучения кожи на экране тепловизора.

ТЕРМО́ГРАФ (*термо-* + греч. graphō писать, изображать) — 1) прибор для непрерывной регистрации температуры; применяется в гигиенических исследованиях, а также для регистрации температуры тела; 2) — см. *Тепловизор.*

ТЕРМО́ГРАФ ВА́ЛЬДМАНА — см. *Вальдмана термограф.*

ТЕРМОГРАФИ́Я (*термо-* + греч. graphō писать, изображать) — 1) совокупность способов графической регистрации изменений температуры, напр. одного или нескольких участков тела человека; 2) — см. *Тепловидение.*

ТЕРМОДИЛЮЦИО́ННЫЙ МЕ́ТОД (*термо-* + лат. dilutio разведение) — метод определения нек-рых гемодинамических показателей, основанный на регистрации изменений температуры крови в определенном кровеносном сосуде после введения в кровяное русло раствора, температура к-рого отличается от температуры крови.

ТЕРМОИГЛА́ (*термо-* + игла) — термоэлектрический датчик для измерения температуры тканей и органов, чувствительный элемент к-рого смонтирован в кончике трубчатой иглы.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ КОНТЕ́ЙНЕР — см. *Термоконтейнер.*

ТЕРМОКА́УСТИКА (истор.; thermocaustica; *термо-* + греч. kaustikos жгучий; син. термокоагуляция) — метод коагуляции тканей, заключавшийся в их прижигании раскаленным металлом; заменен диатермокоагуляцией.

ТЕРМОКА́УТЕР (истор.; *термо-* + греч. kautēr инструмент для обжига) — аппарат или инструмент для прижигания тканей с рабочей частью в виде нагреваемого металлического наконечника; предшественник диатермокоагулятора.

ТЕРМОКОАГУЛЯ́ЦИЯ (thermocoagulatio; *термо-* + *коагуляция*) — см. *Термокаустика.*

ТЕРМОКОНТЕ́ЙНЕР (*термо-* + англ. container контейнер; син. термоизоляционный контейнер) — емкость для хранения и перевозки сосудов с кровью, жидкими лекарственными средствами и бактерийными препаратами, а также с пищей и пищевыми продуктами, предназначенная для их защиты от воздействия высоких или низких температур окружающей среды.

ТЕРМОЛАБИ́ЛЬНЫЙ (*термо-* + *лабильный*) — неустойчивый к тепловому воздействию, изменяющийся при нагревании.

ТЕРМО́МЕТР (*термо-* + греч. metreō измерять) — прибор для измерения температуры.

Т. ИЗЛУЧЕ́НИЯ — см. *Радиометр инфракрасный.*

Т. КОНТА́КТНЫЙ — ртутный Т., к к-рому подведены контакты электрической цепи, выключающей обогревательную систему при замыкании контактов столбиком ртути по достижении заданной температуры; используется как терморегулятор в различных тепловых аппаратах (напр., термостатах).

Т. МЕДИЦИ́НСКИЙ МАКСИМА́ЛЬНЫЙ — ртутный Т. для измерения температуры тела человека, имеющий шкалу от 34 до 42° и устройство, препятствующее обратному движению ртути при охлаждении по окончании измерения.

ТЕРМО́МЕТР-ЩУП — см. *Зонд температурный.*

ТЕРМОМЕТРИ́Я (*термо-* + греч. metreō измерять) в медицине — измерение температуры тела человека.

Т. ИНФРАКРА́СНАЯ — Т., при к-рой регистрируют интенсивность инфракрасного (теплового) излучения поверхности кожи.

ТЕРМОПЕНЕТРА́ЦИЯ (*термо-* + лат. penetratio проникновение) — см. *Диатермия.*

ТЕРМОРАДИО́МЕТР (*термо-* + *радиометр*) — прибор для измерения интенсивности инфракрасного (теплового) излучения; применяется для дистанционного определения температуры кожи человека, а при гигиенических исследованиях — температуры окружающих человека поверхностей.

ТЕРМОРЕГУЛЯ́ЦИЯ (*термо-* + регуляция) — совокупность физиологических процессов, обеспечивающих поддержание оптимальной температуры тела.

Т. СОСУ́ДИСТАЯ — Т., осуществляемая за счет сужения или расширения просвета кровеносных сосудов.

Т. ФИЗИ́ЧЕСКАЯ — Т., осуществляемая за счет изменения теплоотдачи организма.

Т. ХИМИ́ЧЕСКАЯ — Т., осуществляемая за счет изменения теплопродукции в тканях организма.

ТЕРМОРЕЦЕ́ПТОРЫ (*термо-* + *рецептор*) — см. *Рецепторы температурные.*

ТЕРМОСТАБИ́ЛЬНЫЙ (*термо-* + лат. stabilis постоянный, неизменный) — сохраняющий свои свойства при нагревании.

ТЕРМОСТА́Т (*термо-* + греч. statos стоящий, установленный) — аппарат для создания в замкнутом объеме заданной температуры среды и поддержания ее на постоянном уровне.

ТЕРМОТА́КСИС (*термо-* + *таксис*) — таксис, вызванный односторонним тепловым раздражением.

ТЕРМОТЕРАПИ́Я (thermotherapia; *термо-* + *терапия*) — см. *Теплолечение.*

ТЕРМОФИ́ЛЫ (thermophili; *термо-* + греч. philos любящий, склонный) — см. *Бактерии термофильные.*

ТЕРМОФО́БИЯ (thermophobia; *термо-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь жары и теплых помещений.

ТЕРМОФО́Р (*термо-* + греч. phoros несущий) — см. *Грелка электротермическая.*

ТЕРМОЭКЛЕ́КТОР (*термо-* + греч. eklegō выбирать, собирать) — аппарат для вылова насекомых и клещей из проб почвы, растительных остатков и т. п., состоящий из нагревательного устройства и ловушки для мигрирующих из нагреваемой пробы ее обитателей.

ТЕРМОЭСТЕЗИО́МЕТР (*термо-* + *эстезиометр*) — прибор для исследования температурной чувствительности.

ТЕРМОЭСТЕЗИОМЕТРИ́Я (*термо-* + *эстезиометрия*) — метод исследования температурной чувствительности, основанный на определении дифференциального температурного порога кожи.

ТЕ́РМЫ (греч. thermai горячие источники; син.: минеральные воды горячие, минеральные воды термальные) — природные минеральные воды с температурой 35° и выше.

Т. КРЕМНИ́СТЫЕ — Т., в к-рых концентрация кремния в виде кремниевой кислоты и гидросиликата составляет не менее 50 *мг/л.*

Т. ФУМАРО́ЛЬНЫЕ — Т., образующиеся в областях активного вулканизма в результате насыщения и нагрева подземных вод высокотемпературными вулканическими (фумарольными) газами.

ТЕ́РНЕРА СИНДРО́М (H. H. Turner, род. в 1892 г., амер. эндокринолог; син.: Шерешевского — Тернера синдром, Шерешевского — Тернера — Бонневи — Ульриха синдром) — хромосомная болезнь женщин, обусловленная отсутствием в кариотипе одной Х-хромосомы, проявляющаяся недоразвитием первичных и вторичных половых признаков и птеригиум-синдромом.

ТЕ́РНЕРА — КИ́ЗЕРА СИНДРО́М (J. W. Turner, совр. амер. врач; W. Kieser совр. нем. врач; син.: артроостеоонихходисплазия наследственная, онихоартроз наследственный, онихоартроостеодисплазия наследственная) — наследственная болезнь, характеризующаяся гипоплазией надколенника, дисплазией локтевой кости с вывихом головки лучевой кости, дистрофией ногтей, образованием экзостозов на костях таза; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

ТЕРНИДЕНТО́З (ternidentosis) — гельминтоз из группы кишечных нематодозов, вызываемый Ternidens deminutus, протекающий с явлениями колита; человек заражается при употреблении пищевых продуктов, загрязненных почвой, содержащей личинки гельминта.

ТЕРНО́ВСКОГО МЕ́ТОД (С. Д. Терновский, 1896—1960, сов. хирург) — хирургическая операция: исправление врожденного высокого стояния лопатки; заключается в рассечении мышц, прикрепляющихся к клювовидному отростку лопатки, остеотомии клювовидного отростка и низведении лопатки с ее фиксацией шелковыми нитями к VII и VIII ребрам; завершается наложением гипсовой повязки с отведением плеча до 90°.

ТЕРНО́ВСКОГО ОПЕРА́ЦИЯ (С. Д. Терновский) — модификация операции Герцена по поводу передней черепномозговой грыжи; костно-надкостничный лоскут в форме бабочки выкраивают из чешуи лобной кости.

ТЕРПЕ́НЫ — группа природных ненасыщенных углеводородов, содержащихся гл. обр. в эфирных маслах (камфора, ментол и др.); применяются, напр., при изготовлении лекарственных средств и инсектицидов.

ТЕРРЕНКУ́Р (франц. terrain местность + нем. Kur лечение) — метод лечебной физкультуры, заключающийся в дозированной ходьбе по специально проложенным и оборудованным маршрутам на пересеченной местности.

ТЕ́РРИ СИНДРО́М (Th. L. Terry, 1899—1946, амер. офтальмолог) — см. *Фиброплазия ретролентальная.*

ТЕРСИ́ЛЯ СИНДРО́М (Thersil) — сочетание башнеобразной формы черепа, экзофтальма, атрофии зрительных нервов, глазодвигательных нарушений, эпилептических припадков и олигофрении, обусловленное краниостенозом.

ТЕРСКИ́Х СРЕДА́ (В. И. Терских, 1894—1967, сов. микробиолог) — жидкая селективная питательная среда для выделения лептоспир, содержащая сыворотку крови, фосфатную буферную смесь и воду.

ТЕ́РСОНА СИНДРО́М (Terson) — кровоизлияние в глазное яблоко (в переднюю камеру, сетчатку, стекловидное тело), сопровождающее субарахноидальное кровоизлияние.

AST-ТЕСТ — метод диагностики болезней, вызываемых стафилококками, заключающийся в количественном определении антистафилолизинов в сыворотке крови.

ТЕСТ АЛЬТЕРА́ЦИИ ЛЕЙКОЦИ́ТОВ (англ. test испытание, исследование, тест) — метод диагностики специфической сенсибилизации организма, заключающийся в определении in vitro доли нейтрофильных гранулоцитов (в %), подвергшихся дегенерации после добавления испытываемого аллергена.

ТЕСТ НА БЕЛКО́ВО-СВЯ́ЗАННЫЙ ЙОД — метод исследования функционального состояния щитовидной железы, заключающийся в определении содержания в сыворотке крови йода, связанного с белками.

ТЕСТ С ДВОЙНО́Й НАГРУ́ЗКОЙ ГЛЮКО́ЗОЙ (син. Штауба — Трауготта проба) — метод оценки инкреторной функции поджелудочной железы, заключающийся в двукратном приеме внутрь раствора глюкозы (с интервалом 90 мин.) и определении содержания глюкозы в крови до первого приема и через каждые полчаса в течение последующих трех часов.

ТЕСТ ДЕГРАНУЛЯ́ЦИИ ТУ́ЧНЫХ КЛЕ́ТОК — метод диагностики специфической сенсибилизации организма, заключающийся в определении in vitro доли (в %) подвергшихся дегрануляции тучных клеток перитонеальной жидкости крыс, после добавления к ней сыворотки крови обследуемого человека и испытываемого аллергена.

ТЕСТ «КО́ЖНОЕ ОКНО́» (син. эозинофильный тест местный) — аллергическая кожная проба, заключающаяся в определении изменения процентного содержания эозинофильных гранулоцитов в клеточном составе отпечатка на стекле, взятого с небольшого участка кожи, на к-рый после удаления поверхностного слоя эпидермиса был нанесен аллерген.

ТЕСТ ЛЕЙКОЦИТО́ЛИЗА (син. реакция лейколиза) — метод диагностики специфической сенсибилизации организма, заключающийся в определении in vitro доли (в %) лейкоцитов, подвергшихся лизису после добавления испытываемого аллергена.

ТЕСТ С МЕТИЛЕ́НОВЫМ СИ́НИМ — метод определения функционального состояния почки по скорости выделения из устья соответствующего мочеточника красителя метиленового синего, введенного внутримышечно.

ТЕСТ «ОЖЕРЕ́ЛЬЯ» — метод идентификации палочек сибирской язвы, основанный на том, что, будучи выращенными на агаре с пенициллином, они распадаются на отдельные шарики, расположенные цепочками.

ТЕСТ ПЕРКУССИО́ННОГО МОЛОТО́ЧКА — метод диагностики поражения срединного нерва, основанный на том, что больному не удается удержать перкуссионный молоток большим и указательным пальцами в неподвижном состоянии.

ТЕСТ СПЕЦИФИ́ЧЕСКОГО ВЫСВОБОЖДЕ́НИЯ ГИСТАМИ́НА — метод выявления специфической сенсибилизации организма, основанный на освобождении in vitro гистамина из лейкоцитов крови больного после добавления к ним специфического аллергена.

ТЕСТ ТОЛЕРА́НТНОСТИ К ГЛЮКО́ЗЕ — общее название методов диагностики сахарного диабета, заключающихся в определении концентрации глюкозы в крови после ее введения в организм; в зависимости от способа введения

глюкозы различают внутривенный и пероральный тесты.

ТЕСТ ТОРМОЖЕ́НИЯ МИГРА́ЦИИ МАКРОФА́ГОВ — см. *Реакция торможения миграции макрофагов.*

ТЕСТ УГЛОВО́ГО ОТКЛОНЕ́НИЯ — см. *Бабинского — Вейля звездная проба.*

ТЕСТ УКО́ЛОМ — кожная проба, при к-рой на неповрежденную кожу наносят каплю испытываемого аллергена и через нее иглой прокалывают эпидермис.

ТЕСТ ЭКСПОЗИ́ЦИИ (лат. expositio изложение, объяснение; син. экспозиционный тест) — показатель, характеризующий содержание вредного вещества и продуктов его превращения в организме человека (в крови, моче, выдыхаемом воздухе) или степень угнетения активности определенных ферментов, соответствующую общей поглощенной дозе вредного вещества (по ГОСТ 12.1.007.76).

ТЕСТИКУЛЯ́РНЫЙ (лат. testiculus яичко) — относящийся к яичку.

ТЕСТ-КУЛЬТУ́РА — культура микроорганизмов, типичная по набору признаков, характеризующих их родовую (видовую, типовую) принадлежность, и используемая для моделирования свойств определенного микроорганизма (группы микроорганизмов) при бактериологических или иммунологических исследованиях.

ТЕСТ-МИКРО́Б — стандартный штамм микроорганизма, используемый для определения активности антибиотиков, эффективности дезинфицирующих средств и других бактериостатических или бактерицидных агентов.

TESTOVÁRIUM (лат. testis яичко + анат. ovarium яичник) — недифференцированная половая железа с нек-рым преобладанием секреции андрогенов; встречается при истинном гермафродитизме.

ТЕСТОСТЕРО́Н — стероидный гормон из группы андрогенов, вырабатываемый гл. обр. яичками.

ТЕ́ТА-ВО́ЛНЫ — см. *Тета-ритм.*

ТЕТАНИ́Я (tetania; греч. tetanos судорожное напряжение) — патологическое состояние в виде приступов тонических судорог.

Т. ДЕ́ТСКАЯ (t. infantilis) — см. *Спазмофилия.*

Т. ЖЕЛУ́ДОЧНАЯ (t. gastrica) — Т., возникающая у больных с упорной рвотой (напр., при стенозе привратника) вследствие потери хлоридов и развития алкалоза.

Т. СКРЫ́ТАЯ (t. latens) — Т., характеризующаяся повышенной возбудимостью нервной системы к механическому или электрическому раздражению при отсутствии выраженных судорог; наблюдается при пониженном содержании кальция и (или) повышенном содержании фосфора в крови и алкалозе у детей первых двух лет жизни.

Т. ЯВНАЯ — см. *Спазмофилия.*

ТЕТАНО- (греч. tetanos судорожное напряжение, столбняк; лат. tetanus столбняк) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к столбняку».

ТЕТАНОГЕМОЛИЗИ́Н (*тетано-* + *гемолиз*) — см. *Тетанолизин.*

ТЕТАНОЛИЗИ́Н (*тетано-* + *лизис*; син. тетаногемолизин) — фракция столбнячного токсина, вызывающая гемолиз.

ТЕТАНОСПАЗМИ́Н (*тетано-* + *спазм*) — фракция столбнячного токсина, вызывающая тонические судороги поперечнополосатых мышц.

ТЕ́ТАНУС (tetanus; греч. tetanos судорожное напряжение; син. сокращение тетаническое) — сильное и длительное сокращение мышц при достаточно высокой частоте их стимуляции.

Т. ГЛА́ДКИЙ (син. Т. сплошной) — Т., при к-ром отсутствует хотя бы частичное расслабление мышцы.

Т. ЗУ́БЧАТЫЙ (син. Т. неполный)— Т., при к-ром можно выявить периоды расслабления мышц, сменяющиеся новым сокращением.

Т. НЕПО́ЛНЫЙ — см. *Тетанус зубчатый.*

Т. СПЛОШНО́Й — см. *Тетанус гладкий.*

ТЕ́ТАНУС МА́ТКИ (tetanus uteri) — состояние матки в родах, при к-ром она судорожно сокращена и не расслабляется.

ТЕ́ТА-РИТМ (син.: стресс-ритм, тета-волны) — колебания суммарного потенциала головного мозга с частотой 4—8 *гц* и амплитудой до 150 *мкв*, являющиеся доминирующим ритмом электроэнцефалограммы у здоровых детей в возрасте 2—8 лет.

ТЕТРА- (греч. tetra четыре) — составная часть сложных слов, означающая «четыре».

ТЕТРА́ДА (греч. tetras, tetrados четверка) — 1) в генетике — бивалент в первом делении мейоза, состоящий из четырех хроматид; 2) в микробиологии — совокупность четырех расположенных в определенном порядке клеток (бактерий, грибков), образующаяся в результате двух последовательных делений одной клетки.

ТЕТРАЙОДТИРОНИ́Н — см. *Тироксин.*

ТЕТРАКО́КК (*тетра-* + *кокки*) — микроскопическое образование, состоящее из четырех кокков, возникающее при делении клетки (кокка) в двух взаимоперпендикулярных плоскостях.

ТЕТРАПАРЕ́З (tetraparesis; *тетра-* + *парез*; син. квадрипарез) — парез всех четырех конечностей.

ТЕТРАПЛЕГИ́Я (tetraplegia; *тетра-* + греч. plēgē удар, поражение; син. квадриплегия) — паралич всех четырех конечностей.

ТЕТРАСОМИ́Я [*тетра-* + (*хромо*)*сома*] — полисомия, при к-рой имеются четыре гомологичных хромосомы; Т., напр. по Х-хромосоме, наблюдается при нек-рых хромосомных болезнях человека.

ТЕТРАЦИКЛИ́Н (tetracyclinum) — антибиотик, продуцируемый Streptomyces anrefaciens, обладающий широким спектром антибактериального действия.

ТЕТРОДОТОКСИ́Н — токсин, содержащийся в яичниках рыбы фугу, обитающей у берегов Японии, а также в гонадах и коже нек-рых видов земноводных; блокирует транспорт натрия через цитоплазматические мембраны, обладает нейротоксическим и вазодепрессорным действием.

ТЕТУРА́М — АЛКОГО́ЛЬНАЯ РЕА́КЦИЯ — см. *Антабусно-алкогольная реакция.*

ТЕХНЕ́ЦИЙ РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов технеция с массовыми числами от 92 до 107 и периодами полураспада от 15,8 сек. до $2{,}6 \cdot 10^6$ лет; изотоп ^{99m}Tc используется в радиоизотопной диагностике.

ТЕ́ХНИКА БЕЗОПА́СНОСТИ — система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов (по ГОСТ 12.0.002—74).

ТЕЧЕ́НИЕ БОЛЕ́ЗНИ (cursus morbi) — эволюция фаз (стадий) болезни и ее проявлений (симптомов).

ТЕ́Я — СА́КСА БОЛЕ́ЗНЬ (W. Tay, 1843—1927, англ. офтальмолог; B. P. Sachs, 1858—1944, амер. невропатолог) — см. *Идиотия амавротическая детская ранняя.*

ТИАЗО́Л — органическое гетероциклическое соединение, содержащее азот и серу; входит в состав нек-рых биологически активных веществ, напр. тиамина, пенициллинов.

ТИАМИ́Н (thiaminum; син.: аневрин, витамин B_1) — водорастворимый витамин, содержащийся в зерновых и бобовых продуктах, а также продуктах животного происхождения; является предшественником тиаминдифосфата; при недостаточности Т. в пище развиваются нарушения функции нервной системы, напр. полиневрит, астения.

ТИАМИНА́ЗА (син.: аневриназа — устар., анзериназа — устар., тиамин — гидролаза) — бактериальный фермент класса гидролаз (КФ.3.5.99.2), катализирующий гидролиз тиамина.

ТИАМИ́Н—ГИДРОЛА́ЗА — см. *Тиаминаза.*

ТИАМИНДИФОСФА́Т (син. тиаминпирофосфат) — пирофосфорный эфир тиамина; кофермент нек-рых реакций углеводного обмена: декарбоксилирования α-кетокислот, переноса двууглеродного фрагмента с кетосахаров на альдосахара.

ТИАМИНПИРОФОСФА́Т — см. *Тиаминдифосфат.*

ТИБИА́ЛЬНЫЙ (tibialis; анат. tibia большеберцовая кость) — относящийся к большеберцовой кости.

ТИБИА́ЛЬНЫЙ ФЕНО́МЕН ШТРЮ́МПЕЛЛЯ — см. *Штрюмпелля тибиальный феномен.*

ТИБЬЕ́РЖА — ВЕ́ЙССЕНБАХА СИНДРО́М (G. Thiebièrge, 1856—1926, франц. дерматолог; R. J. E. Weissenbach, 1885—1963, франц. ревматолог и дерматолог; син. кальциноз кожи склеродермический) — сочетание системной склеродермии и кальциноза кожи.

ТИ́ГЕЛЯ МЕ́ТОД (M. Tiegel, род. в 1877 г., нем. хирург) — способ обработки культи бронха при резекции легкого, заключающийся в выскабливании и прижигании ее слизистой оболочки с последующим наложением на культю двух циркулярных лигатур, причем дистальную затягивают туго, а проксимальную — во избежание некроза — не до конца.

ТИ́ГЕЛЯ ШИ́НА (M. Tiegel) — транспортная шина для иммобилизации конечности при переломах голени или нижней трети бедра, состоящая из вставляемых друг в друга двух металлических труб и дающая возможность производить вытяжение за счет их раздвижения.

ТИГРО́ИДНОЕ ВЕЩЕСТВО́ — см. *Базофильное вещество.*

ТИГРО́ЛИЗ — см. *Хроматолиз.*

ТИ́ДИНГА — БО́ХОНА ТОНЗИЛЛОТО́М — см. *Тонзиллотом рычажный.*

THYSANÓTHRIX (греч. thysanos бахрома, кисть, пучок шерсти + thrix волос) — см. *Волосы пучкообразные.*

ТИ́ЗЗЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (E. E. Tyzzer, род. в 1875 г., амер. патолог) — инфекционная болезнь мышей, характеризующаяся кровянистым поносом и возникновением мелких некротических очагов в печени; наблюдаются эпизоотии среди лабораторных животных.

ТИЗОНИ́Т (tysonitis; анат. устар. glandulae Tysoni железы крайней плоти) — воспаление желез крайней плоти.

ТИЗО́НОВЫ ЖЕ́ЛЕЗЫ (glandulae Tysoni; E. Tyson, 1649—1708, англ. анатом) — см. *Железы крайней плоти.*

ТИЙО́ СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШОВ (P. J. Tillaux, 1834—1904, франц. анатом и хирург) — сухожильный шов, накладываемый с помощью одной нити, проводимой внутриствольно и завязываемой узлом на поверхности сухожилия.

ТИК (франц. tic) — быстрые, неритмичные, стереотипные, клонические подергивания мышц, напоминающие рефлекторные или целенаправленные движения, напр. мимику, жестикуляцию, мигание.

Т. ЛОКАЛИЗО́ВАННЫЙ — Т., охватывающий лишь ограниченную область тела, напр. лицо, шею.

ТИК САЛАА́МОВ — см. *Spasmus nutans.*

ТИКСОТРОПИ́Я (греч. thixō касаться + tropē поворот, изменение) — процесс обратимого изотермического превращения геля в золь при механическом воздействии; наблюдается в цитоплазме, а также в гелях нек-рых белков (миозина, желатины), полисахаридов и других полимеров.

ТИЛЁЗ (tylosis; греч. tylōsis омозолелость) — 1) в офтальмологии — отвисание значительно утолщенного края века; наблюдается при блефаритах, чаще при хроническом язвенном блефарите; 2) см. *Кератодермия.*

ТИ́ЛИНГА АРТРОТОМИ́Я (Tiling, шведский хирург-ортопед) — 1) артротомия коленного сустава, при к-рой сустав обнажают передним дугообразным разрезом с отсечением бугристости большеберцовой кости (вместе с собственной связкой надколенника), боковых связок (с частью костной ткани мыщелков бедра) и пересечением крестообразных связок; 2) артротомия тазобедренного сустава, при к-рой сустав обнажают продольным разрезом кпереди от большого вертела с отсечением обоих вертелов бедренной кости.

ТИ́ЛЬБЕРИ ФО́КСА ИМПЕТИ́ГО (W. Tilbury Fox, 1836—1879, англ. дерматолог) — см. *Импетиго стрептококковое.*

ТИМ- (тимо-) — 1) (греч. thýmos тимьян, анат. thymus вилочковая железа) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к вилочковой железе»; 2) (греч. thymós душа, настроение, чувство) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к настроению, к чувству».

ТИ́МАННА КАТЕ́ТЕР (Thiemann) — эластичный уретральный катетер, изготовленный из резины с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим введение инструмента при наличии аденомы предстательной железы.

ТИМЕРГАЗИ́Я (*тим-* + греч. ergasia работа, действие, деятельность) — общее название аффективных расстройств (депрессий и маний), применяемое гл. обр. в американской психиатрии.

ТИМИДИ́Н — нуклеозид, состоящий из тимина и дезоксирибозы; входит в состав дезоксирибонуклеиновой кислоты.

ТИМИДИНФОСФОРИЛА́ЗА — фермент класса трансфераз (КФ.2.4.2.4), катализирующий фосфоролитическое расщепление тимидина; участвует в обмене нуклеотидов.

ТИМИ́Н — пиримидиновое основание, входящее в состав тимидина.

ТИМО- — см. *Тим-.*

ТИМО́Л-ВЕРОНА́ЛОВАЯ ПРО́БА — см. *Тимоловая проба.*

ТИМОЛЕ́ПТИКИ (thymoleptica; *тимо-* + греч. lēptikos способный взять, воспринять) — см. *Антидепрессанты.*

ТИМОЛЕПТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА — см. *Антидепрессанты.*

ТИМО́ЛОВАЯ ПРО́БА (син.: тимолвероналовая проба, тимоловероналовая проба) — коагуляционная проба, при к-рой в качестве агента, действующего на сыворотку крови, используют тимол в вероналовом буфере.

ТИМОЛОВЕРОНА́ЛОВАЯ ПРО́БА — см. *Тимоловая проба.*

ТИМО́МА (thymoma; *тим-* + *-ома*) — опухоль, исходящая из ткани вилочковой железы; различают доброкачественную и злокачественную формы Т.

ТИМОПАТИ́ЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕ́НТ (*тимо-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название атипичных проявлений фаз депрессии или мании (при маниакально-депрессивном психозе, шизофрении) в виде преходящих нарушений функций каких-либо органов или систем либо психических расстройств, не характерных для этих фаз (напр., бред, малый кататонизм).

ТИМОПА́ТИЯ (thymopathia; *тимо-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название психопатий с преобладанием аномалий в эмоциональной сфере (дистимическая, реактивно-лабильная, циклотимическая психопатии).

ТИМОЦИ́Т (thymocytus, LNH; *тимо-* + гист. cytus клетка) — общее название клеток вилочковой железы.

ТИМОЦИ́Т ЗВЁЗДЧАТЫЙ (thymocytus stellatus, LNH) — эпителиальная клетка звездчатой формы, входящая в состав паренхимы вилочковой железы.

ТИМОЦИ́Т ЛИМФОЦИТА́РНЫЙ (thymocytus lymphocyticus) — см. *Т-Лимфоцит.*

ТИМПАНИ́Т (греч. tympanon, лат. tympanum барабан) — см. *Перкуторный звук тимпанический.*

ТИМПАНО- [греч. tympanon (лат. tympanum) барабан] — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к барабанной перепонке, к барабанной полости».

ТИМПАНОМАНОМЕТРИ́Я (*тимпано-* + *манометрия*) — метод исследования вентиляционной функции слуховой трубы или барофункции среднего уха, заключающийся в измерении давления в барабанной полости с помощью ушного манометра.

ТИМПАНОПЛА́СТИКА (tympanoplastica; *тимпано-* + *пластика*) — пластика звукопроводящего аппарата среднего уха, поврежденного при хроническом гнойном или адгезивном среднем отите.

ТИМПАНОПУ́НКЦИЯ (tympanopunctio; *тимпано-* + *пункция*) — прокол барабанной перепонки полой иглой с диагностической или лечебной целью; производится гл. обр. при остром гнойном среднем отите у детей.

ТИМПАНОСКЛЕРО́З (tympanosclerosis; *тимпано-* + *склероз*; син.: псевдоотосклероз, склероотит) — разрастание соединительной ткани в каких-либо участках среднего уха с последующим их гиалинозом, нередко с обызвествлением и окостенением; остаточное явление перенесенного среднего отита, приводящее к кондуктивной тугоухости.

ТИМПАНОТОМИ́Я (tympanotomia; *тимпано-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие барабанной полости.

ТИМПАНОФОНИ́Я (tympanophonia; *тимпано-* + греч. phōnē звук, голос) — см. *Аутофония.*

ТИ́МУС (thymus; греч. thýmos тимьян, анат. thymus вилочковая железа) — см. *Железа вилочковая.*

ТИ́МУСНЫЕ ВЕ́ТВИ (rami thymici, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *776.*

ТИМЭКТОМИ́Я (thymectomia; *тим-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление вилочковой железы.

ТИНДАЛИЗА́ЦИЯ (J. Tyndall, 1820—1893, англ. физик; син. стерилизация дробная) — метод стерилизации, заключающийся в повторном воздействии на стерилизуемые объекты относительно невысокой температурой с суточными интервалами, в течение к-рых объекты выдерживают при температуре 25—37° для проращивания спор; Т. проводят в следующих вариантах: а) трех-четырехкратно при температуре 100° в течение 20—30 мин.; б) трехкратно — при температуре 70—80° в течение часа; в) пятикратно — при температуре 60—65° в течение часа.

ТИНДА́ЛЯ ФЕНО́МЕН (J. Tyndall) — физическое явление рассеивания света в жидкой или газообразной среде, содержащей взвешенные мельчайшие частицы, что позволяет обнаруживать их при наблюдении сбоку; на использовании Т. ф. основана биомикроскопия глаза.

TÍNEA FAVÓSA (лат. tinea моль, червь) — см. *Фавус.*

ТИНЕ́ЛЯ СИМПТО́М (J. Tinel, 1879—1952, франц. невропатолог) — 1) усиление головной боли при сдавлении шейных вен или запрокидывании головы; признак повышенного внутричерепного давления; 2) парестезия в виде ощущения покалывания дистальнее места перкуссии, производимой в зоне проекции пораженного нерва; признак начавшейся регенерации нерва.

ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА́ — см. *Липоевая кислота.*

ТИО́ЛОВАЯ ГРУ́ППА — см. *Сульфгидрильная группа.*

ТИО́ЛЫ — см. *Меркаптаны.*

ТИОНИ́Н (син. лаутц фиолетовый) — основной тиазиновый краситель, хорошо растворимый в спирте, хуже в воде; применяется для окраски нервной ткани по Нисслю, для выявления клеточных ядер.

ТИОСПИРТЫ́ — см. *Меркаптаны.*

ТИП (typus; греч. typos отпечаток, образец) в систематике — высшая таксономическая категория в зоологии, объединяющая родственные классы.

ТИП ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — совокупность индивидуальных особенностей силы, уравновешенности и подвижности основных нервных процессов; И. П. Павлов выделил 4 основных Т. в. н. д. человека и животных.

Т. ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ (син. Т. высшей нервной деятельности речевой) — Т. в. н. д. человека, характеризующийся преобладанием второй сигнальной системы над первой, что проявляется склонностью к абстрактным, теоретическим, построениям.

Т. ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЧЕВОЙ — см. *Тип высшей нервной деятельности мыслительный.*

Т. ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛЬНЫЙ НЕУРАВНОВЕШЕННЫЙ — (син. холерический тип) — Т. в. н. д., характеризующийся большой силой, подвижностью и неуравновешенностью процессов возбуждения и торможения в коре большого мозга.

Т. ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛЬНЫЙ УРАВНОВЕШЕННЫЙ ИНЕРТНЫЙ (син. флегматический тип) — Т. в. н. д., характеризующийся большой силой и уравновешенностью, но малой подвижностью процессов возбуждения и торможения в коре большого мозга.

Т. ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛЬНЫЙ УРАВНОВЕШЕННЫЙ ПОДВИЖНЫЙ (син. сангвинический тип) — Т. в. н. д., характеризующийся большой силой, уравновешенностью и высокой подвижностью процессов возбуждения и торможения в коре большого мозга.

Т. ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛАБЫЙ (син. меланхолический тип) — Т. в. н. д., характеризующийся слабостью процессов возбуждения и торможения в коре большого мозга.

Т. ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ — Т. в. н. д. человека, характеризующийся преобладанием первой сигнальной системы над второй, что проявляется способностью к непосредственному восприятию действительности и относительно слабой склонностью к абстрактному мышлению.

ТИПИРОВАНИЕ АНТИГЕННОЕ — совокупность методов серологического исследования антигенной структуры клеток в отношении определенных групп антигенов (изоантигенов); применяется в научных исследованиях, в серодиагностике, напр. инфекционных болезней, при определении тканевой совместимости и др.

ТИПОЛОГИЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ — классификация психических болезней на основании выявленных психопатологических синдромов и закономерностей течения.

ТИРАМИН — биогенный амин, образующийся в результате ферментативного декарбоксилирования тирозина в кишечнике или при гнилостном распаде тканей; по биологическому действию напоминает адреналин.

ТИРЕО- (тиреоид-; тиро-; анат. glandula thyroidea щитовидная железа, cartilago thyroidea щитовидный хрящ, от греч. thyreos щит + -eidēs подобный) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к щитовидной железе, к щитовидному хрящу».

ТИРЕОАПЛАЗИЯ (thyreoaplasia; *тирео-* + *аплазия*) — аномалия развития: отсутствие щитовидной железы; проявляется признаками гипотиреоза.

ТИРЕОГЕННЫЙ (*тирео-* + греч. -genēs порождаемый, возникающий) — обусловленный понижением или повышением секреторной функции щитовидной железы.

ТИРЕОГЛОБУЛИН (thyreoglobulinum; *тирео-* + *глобулин*) — комплекс одного из гормонов щитовидной железы с белком, образующийся в фолликулах щитовидной железы; ферментативное расщепление Т. приводит к высвобождению гормона и его поступлению в кровь.

ТИРЕОГРАФИЯ РАДИОИЗОТОПНАЯ (*тирео-* + греч. graphō писать, изображать; син.: радиотиреография, тиреорадиография, тиреорадиометрия) — радиографическое исследование функции щитовидной железы, основанное на избирательном накоплении и выделении щитовидной железой радиоактивного йода и меченных им соединений.

ТИРЕОИД- — см. *Тирео.*

ТИРЕОИДИТ (thyreoiditis; *тиреоид-* + *-ит*) — воспаление щитовидной железы.

Т. ГРАНУЛЕМАТОЗНЫЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЙ (t. granulomatosa gigantocellularis) — см. *Тиреоидит подострый.*

ТИРЕОИДИТ ДЕ КЕРВЕНА — см. *Тиреоидит подострый.*

Т. ЛИМФОМАТОЗНЫЙ (t. lymphomatosa) — см. *Хасимото зоб.*

Т. ОСТРЫЙ (t. acuta) — остро протекающий Т., обусловленный гематогенным заносом возбудителей гнойной инфекции или их проникновением из носоглотки.

Т. ПОДОСТРЫЙ (t. subacuta; син.: Де Кервена болезнь, Де Кервена гранулематозный зоб, Де Кервена тиреоидит, Т. гранулематозный гигантоклеточный) — длительно протекающий Т., характеризующийся десквамацией и дегенерацией тироцитов, к-рые замещаются клетками соединительной ткани, наличием гигантских многоядерных клеток и гранулем, а также увеличением содержания в крови антител к тиреоглобулину.

Т. ФИБРОЗНЫЙ (t. fibrosa) — см. *Риделя струма.*

Т. ХРОНИЧЕСКИЙ (t. chronica) — см. *Хасимото зоб.*

ТИРЕОИДНЫЙ (*тирео-* + греч. -eidēs подобный, похожий) — относящийся к щитовидной железе или щитовидному хрящу.

ТИРЕОИДЭКТОМИЯ (thyreoidectomia; *тиреоид-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление щитовидной железы.

ТИРЕОКАЛЬЦИТОНИН — см. *Кальцитонин.*

ТИРЕОПРИВНЫЙ (*тирео-* + лат. privus лишенный чего-либо) — обусловленный удалением щитовидной железы (о симптоме или состоянии организма).

ТИРЕОРАДИОГРАФИЯ (*тирео-* + *радиография*) — см. *Тиреография радиоизотопная.*

ТИРЕОРАДИОМЕТРИЯ (*тирео-* + *радиометрия*) — см. *Тиреография радиоизотопная.*

ТИРЕОСКАНИРОВАНИЕ (*тирео-* + *сканирование*; син.: тиреосканография, тиреосцинтиграфия) — радиоизотопное сканирование щитовидной железы.

ТИРЕОСКАНОГРАФИЯ (*тирео-* + *сканография*) — см. *Тиреосканирование.*

ТИРЕОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (thyreostatica; *тирео-* + греч. statikos останавливающий) — см. *Антитиреоидные средства.*

ТИРЕОСЦИНТИГРАФИЯ (*тирео-* + *сцинтиграфия*) — см. *Тиреосканирование.*

ТИРЕОТОКСИКОЗ (thyreotoxicosis; *тирео-* + *токсикоз*) — патологическое состояние, обусловленное поступлением в организм чрезмерного количества гормонов щитовидной железы и характеризующееся повышением основного обмена, нарушениями функций нервной и сердечно-сосудистой систем.

ТИРЕОТОКСИЧЕСКИЙ (*тирео-* + *токсический*) — обусловленный повышенной функцией щитовидной железы.

ТИРЕОТОМИЯ (thyreotomia; *тирео-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие гортани продольным срединным рассечением щитовидного хряща.

ТИРЕОТРОПИН (thyreotropinum; *тирео-* + греч. tropos поворот, направление) — см. *Гормон тиреотропный.*

ТИРЕОТРОПНЫЙ (*тирео-* + греч. tropos поворот, направление) — воздействующий на щитовидную железу.

ТИРЕОТРОПОЦИТЫ (thyreotropocyti; *тирео-* + греч. tropos поворот, направление + гист. cytus клетка; син. клетки тиреотропные) — клетки передней доли гипофиза, секретирующие тиреотропный гормон.

ТИРЕОТРОФИН (thyreotrophinum; *тирео-* + греч. trophē питание) — см. *Гормон тиреотропный.*

ТИРИ ФИСТУЛА (L. Thiry, 1817—1897, австрийский физиолог) — искусственный наружный свищ тонкой кишки у подопытного животного, представляющий собой изолированный участок кишки, один конец к-рого ушит наглухо, а другой выведен на поверхность кожи; используется в хроническом эксперименте, гл. обр. для изучения процессов пищеварения.

ТИРИ — ВЕЛЛЫ ФИСТУЛА (L. Thiry, 1817—1897, австрийский физиолог; L. Vella, 1825—1886, итал. физиолог) — модификация фистулы Тири, при к-рой на кожу выводят оба конца изолированного участка кишки.

ТИРО- — см. *Тирео-.*

ТИРОЗИН (tyrosinum) — заменимая в питании человека моноаминомонокарбоновая циклическая аминокислота, к-рая может образовываться в организме из фенилаланина; участвует в биосинтезе адреналина, норадреналина, меланинов, тироксина, многих белков животных и растений.

ТИРОЗИНОЗ (tyrosinosis; *тирозин* + *-оз*) — наследственная болезнь, характеризующаяся отложением тирозина в печени, почках и других органах; проявляется гепатомегалией, рахитоподобными изменениями в костях, поражением почек, геморрагическим синдромом и нарушениями функции ц. н. с.; обусловлена, предположительно, недостаточностью фермента 4-Гидроксифенилпируват — диоксигеназа (КФ1.13.

11.27) или тирозинаминотрансферазы (КФ 2.6.1.5).

ТИРОКСИ́Н (thyroxinum; син. тетрайодтиронин) — гормон щитовидной железы, повышающий интенсивность окислительных реакций в организме; представляет собой йодсодержащее производное тирозина; недостаток Т. в организме приводит к гипотиреозу.

ТИРОЦИ́Т (thyrocytus, LNH; *тиро-* + гист. cytus клетка; син. клетка тиреоидная) — эпителиальная клетка; из Т. построены стенки фолликулов щитовидной железы.

ТИРОЦИ́Т ГЛА́ВНЫЙ (thyrocytus principalis, LNH) — крупная шаровидная клетка эпителия щитовидной железы.

ТИРОЦИ́Т ПАРАФОЛЛИКУЛЯ́РНЫЙ (thyrocytus parafollicularis) — см. *К-клетка*.

ТИРРЕ́ЛЛА ПЛАСТИ́НКА (lamina Tyrrelli; F. Tyrrell, 1797—1843, англ. анатом) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *962*.

ТИРРЕ́ЛЛА ФА́СЦИЯ (fascia Tyrrelli; F. Tyrrell) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *962*.

ТИ́РША КО́ЖНАЯ ПЛА́СТИКА (K. Thiersch, 1822—1895, нем. хирург) — пластическая операция: замещение дефекта кожи свободным расщепленным кожным лоскутом толщиной 0,2—0,25 *мм*.

ТИ́РША НОЖ (K. Thiersch) — см. *Нож трансплантационный*.

ТИ́РША ОПЕРА́ЦИЯ (K. Thiersch) — хирургическая операция: сужение заднего прохода путем проведения серебряной проволоки под кожей вокруг наружного сфинктера прямой кишки; применяется для лечения выпадения прямой кишки.

ТИС МЕ́ТОД [F. Thies, K. Thies (братья), нем. оториноларингологи 20 в.] — радикальная операция на среднем ухе, при к-рой проводят два параллельных разреза по задней и верхней стенкам наружного слухового прохода с иссечением кожи между ними, а вскрытие полости среднего уха начинают с удаления латеральной стенки надбарабанного углубления; применяется при хроническом гнойном среднем отите с ограниченным кариесом надбарабанного углубления и сосцевидной пещеры или с небольшой холестеатомой.

ТИТО́ВА ОПЕРА́ЦИЯ (И. Г. Титов, сов. офтальмолог) — хирургическая операция: иссечение задней стенки слезного канальца; применяется при слезотечении, обусловленном сужением слезной точки.

ТИТР АНТИТЕ́Л (франц. titre определение, титр) — предельное разведение пробы сыворотки крови или другой биологической жидкости, при к-ром обнаруживается активность антител с помощью какой-либо серологической реакции.

ТИТР БАКТЕРИОФА́ГА — 1) число активных единиц бактериофага, содержащихся в 1 *мл* фаголизата; 2) по Аппельману — предельное разведение взвеси бактериофага, способное вызвать лизис культуры чувствительных бактерий в жидкой питательной среде; 3) по Грацца — количество негативных колоний, образовавшихся из определенного объема (обычно 1 *мл*) взвеси бактериофага (исследуемого материала) при ее культивировании совместно с чувствительными бактериями.

ТИТР ВИ́РУСА — количество инфекционных, бляшкообразующих, гемагглютинирующих или других единиц активности вируса, определяемое в единице объема вируссодержащей жидкости.

ТИТР КИШЕ́ЧНОЙ ПА́ЛОЧКИ — см. *Коли-титр*.

ТИТРОВА́НИЕ АЛЛЕРГОМЕТРИ́ЧЕСКОЕ — метод оценки степени сенсибилизации организма, основанный на определении интенсивности реакции кожи, слизистой оболочки носа или бронхов, вызванной введением аллергена в различных разведениях.

ТИТРОВА́НИЕ БАКТЕРИОФА́ГА — определение активности бактериофага по способности различных разведений его взвеси лизировать бактериальные культуры в жидких питательных средах или образовывать негативные колонии в бактериальном газоне на плотных питательных средах.

ТИТРОВА́НИЕ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИ́ЧЕСКОЕ — см. *Комплексонометрия*.

ТИТРОВА́НИЕ КОМПЛЕМЕ́НТА — метод определения содержания комплемента в сыворотке крови, основанный на оценке способности различных ее разведений лизировать эритроциты в присутствии гемолизина.

ТИТРОВА́НИЕ СЕРОЛОГИ́ЧЕСКОЕ — определение содержания антигенов, антител или комплемента с помощью серологических реакций.

ТИ́ТЦЕ БОЛЕ́ЗНЬ (A. Tietze, 1864—1927, нем. хирург) — см. *Титце синдром*.

ТИ́ТЦЕ СИНДРО́М (A. Tietze; син.: дистрофия ребер, псевдоопухоль реберных хрящей, Титце болезнь, хондрит реберный) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся опухолевидным разрастанием одного или нескольких реберных хрящей в области их соединения с грудиной, сопровождающимся болями в этой области.

ТИФ (typhus; греч. typhos дым, помрачение сознания) — 1) (истор.) — состояние, характеризующееся помрачением сознания и возникающее при нек-рых инфекционных болезнях; 2) общее название нек-рых инфекционных болезней, характеризующихся высокой лихорадкой и выраженной интоксикацией с явлениями помрачения сознания.

ТИФ АМАРИ́ЛЛЬНЫЙ — см. *Лихорадка желтая*.

ТИФ БЛОШИ́НЫЙ ЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ (син.: риккетсиоз крысиный, тиф малайский городской, тиф мексиканский, тиф сыпной крысиный, тиф сыпной тулонский, тиф сыпной эндемический) — инфекционная эндемическая болезнь из группы риккетсиозов, вызываемая риккетсией Музера; передается человеку от грызунов блохами и гамазовыми клещами; сходная по клиническим признакам с сыпным тифом, но отличающаяся от него более легким течением.

ТИФ БРЮШНО́Й (typhus abdominalis; син. илеотиф) — острая инфекционная болезнь из группы кишечных, вызываемая брюшнотифозной палочкой; характеризуется циклическим течением, бактериемией, поражением лимфатической системы тонкой и, значительно реже, толстой кишки, интоксикацией, лихорадкой, розеолезной сыпью и гепатолиенальным синдромом.

Т. БРЮШНО́Й АБОРТИ́ВНЫЙ (t. abdominalis abortivus) — клиническая форма Т. б., характеризующаяся острым началом с развитием типичных признаков болезни, но быстро оканчивающаяся клиническим выздоровлением; встречается чаще у вакцинированных лиц.

Т. БРЮШНО́Й АМБУЛАТО́РНЫЙ (нрк; t. abdominalis ambulatorius) — Т. б., протекающий атипично в легкой или легчайшей форме.

Т. БРЮШНО́Й ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (t. abdominalis haemorrhagicus) — клиническая форма Т. б., характеризующаяся тяжелым течением с выраженной интоксикацией и геморрагическим синдромом.

ТИФ ВОЗВРА́ТНЫЙ (typhus recurrens) — общее название спирохетозов, переносимых вшами или клещами и характеризующихся чередованием приступов лихорадки и апирексии.

ТИФ ВОЗВРА́ТНЫЙ ВШИ́НЫЙ — см. *Тиф возвратный эпидемический*.

ТИФ ВОЗВРА́ТНЫЙ ЕВРОПЕ́ЙСКИЙ — см. *Тиф возвратный эпидемический*.

ТИФ ВОЗВРА́ТНЫЙ КЛЕЩЕВО́Й — см. *Тиф возвратный эндемический*.

ТИФ ВОЗВРА́ТНЫЙ КОСМОПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Тиф возвратный эпидемический*.

ТИФ ВОЗВРА́ТНЫЙ ЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ (typhus recurrens endemicus; син.: лихорадка клещевая возвратная, лихорадка персидская возвратная, спирохетоз клещевой, тиф возвратный клещевой) — острая инфекционная природноочаговая болезнь, вызываемая спирохетами рода Borrelia; передается клещами рода Ornithodorus и характеризуется многочисленными нерегулярными приступами лихорадки, часто первичным аффектом на коже и поражением нервной системы; различают несколько форм Т. в. э. в зависимости от вида возбудителя.

ТИФ ВОЗВРА́ТНЫЙ ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ (typhus recurrens epidemicus; син.: лихорадка возвратная, спирохетоз возвратный эпидемический, тиф возвратный вшиный, тиф возвратный европейский, тиф возвратный космополитический) — острая инфекционная болезнь, вызываемая спирохетой возвратного тифа; передается вшами и характеризуется острым началом, регулярными приступами лихорадки, интоксикацией, головными и мышечными болями, гепатолиенальным синдромом.

ТИФ ДЖУ́НГЛЕЙ — см. *Цуцугамуши*.

ТИФ КЛЕЩЕВО́Й ИНДИ́ЙСКИЙ (febris acarina indica) — острая инфекционная природноочаговая болезнь из группы клещевых риккетсиозов, возбудитель к-рой по своей антигенной структуре сходен с возбудителем марсельской лихорадки Rickettsia conorii; характеризуется кратковременной лихорадкой и пятнистой сыпью с вторичными петехиями.

ТИФ КЛЕЩЕВО́Й КВИ́НСЛЕНДА — см. *Риккетсиоз клещевой австралийский*.

ТИФ КЛЕЩЕВО́Й СИБИ́РСКИЙ — см. *Риккетсиоз клещевой североазиатский*.

ТИФ КЛЕЩЕВО́Й ТРОПИ́ЧЕСКИЙ — см. *Цуцугамуши*.

ТИФ КУСТА́РНИКОВЫЙ — см. *Цуцугамуши*.

ТИФ МАЛА́ЙСКИЙ ГОРОДСКО́Й — см. *Тиф блошиный эндемический.*
ТИФ МЕКСИКА́НСКИЙ — см. *Тиф блошиный эндемический.*
ТИФ ПЕЛЛАГРО́ЗНЫЙ (устар.) — 1) острая форма пеллагры, характеризующаяся тяжелым течением; 2) совокупность психических нарушений при пеллагре.
ТИФ СЕ́ЛЬСКИЙ — см. *Цуцугамуши.*
ТИФ СЫПНО́Й (typhus exanthematicus; син.: тиф сыпной вшиный, тиф сыпной европейский, тиф сыпной эпидемический) — острая инфекционная болезнь из группы риккетсиозов, вызываемая риккетсией Провацека; передается через вшей и характеризуется возникновением сыпнотифозных гранулем в кровеносных сосудах многих органов и тканей и проявляется лихорадкой, спленомегалией, розеолезно-петехиальной или петехиальной сыпью, признаками поражения нервной и сердечно-сосудистой системы.
ТИФ СЫПНО́Й БРАЗИ́ЛЬСКИЙ — см. *Лихорадка пятнистая Скалистых гор.*
ТИФ СЫПНО́Й ВШИ́НЫЙ — см. *Тиф сыпной.*
ТИФ СЫПНО́Й ЕВРОПЕ́ЙСКИЙ — см. *Тиф сыпной.*
ТИФ СЫПНО́Й КЛЕЩЕВО́Й — см. *Риккетсиоз клещевой североазиатский.*
ТИФ СЫПНО́Й КЛЕЩЕВО́Й СЕ́ВЕРНОГО КВИНСЛЕНДА — см. *Риккетсиоз клещевой австралийский.*
ТИФ СЫПНО́Й КЛЕЩЕВО́Й СЕВЕРОАЗИА́ТСКИЙ — см. *Риккетсиоз клещевой североазиатский.*
ТИФ СЫПНО́Й КРЫСИ́НЫЙ — см. *Тиф блошиный эндемический.*
ТИФ СЫПНО́Й КРЫСИ́НЫЙ САВА́НН ТРОПИ́ЧЕСКОЙ А́ФРИКИ — разновидность блошиного эндемического тифа, отличающаяся слабо выраженной сыпью и тяжелым течением болезни; эпидемиология изучена недостаточно.
ТИФ СЫПНО́Й ПОВТО́РНЫЙ (typhus exanthematicus recrudescens) — сыпной тиф у человека, ранее перенесшего эту болезнь; возникает, в отличие от болезни Брилла, в результате экзогенного заражения с обычным механизмом передачи инфекции; характеризуются более легким течением, чем первое заболевание.
ТИФ СЫПНО́Й САН-ПА́УЛО — см. *Лихорадка пятнистая Скалистых гор.*
ТИФ СЫПНО́Й СПОРАДИ́ЧЕСКИЙ — см. *Брилла болезнь.*
ТИФ СЫПНО́Й ТУЛО́НСКИЙ — см. *Тиф блошиный эндемический.*
ТИФ СЫПНО́Й ЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ — см. *Тиф блошиный эндемический.*
ТИФ СЫПНО́Й ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ — см. *Тиф сыпной.*
ТИФ ЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ ТУНИ́ССКИЙ — см. *Лихорадка марсельская.*
ТИФЛ- (тифло-; греч. typhlos слепая, typhlon слепая кишка) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «слепой»; 2) «относящийся к слепой кишке».
ТИФЛАТОНИ́Я (typhlatonia; *тифл- + атония*) — недостаточность двигательной функции слепой кишки, сопровождающаяся расширением ее просвета и истончением стенки.
ТИФЛИ́Т (typhlitis; *тифл- + -ит*) — воспаление слепой кишки.
ТИФЛО- — см. *Тифл-.*
ТИФЛОКОЛИ́Т (typhlocolitis; *тифло-* + греч. kolon толстая кишка + *-ит*) — колит, характеризующийся локализацией патологического процесса преимущественно в слепой кишке.
ТИФЛОМЕГАЛИ́Я (typhlomegalia; *тифло-* + греч. megas, megalu большой) — врожденное или приобретенное стойкое увеличение размеров слепой кишки с утолщением ее стенок.
ТИФЛОПЕКСИ́Я (typhlopexia; *тифло-* + греч. pēxis прикрепление) — см. *Цекопексия.*
ТИФЛОПРИБО́Р (*тифло-* + прибор) — прибор, предназначенный для облегчения ориентации слепых людей в пространстве; различные виды Т. основаны на использовании тактильной чувствительности или слуха.
ТИФЛОПТО́З (typhloptosis; *тифло-* + греч. ptōsis опущение) — опущение слепой кишки.
ТИФЛОСПА́ЗМ (typhlospasmus; *тифло-* + греч. spasmos спазм) — спазм слепой кишки.
ТИФЛОСТА́З (typhlostasis; *тифло-* + греч. stasis стояние, задержка) — задержка кала в слепой кишке.
ТИФЛОСТОМИ́Я (typhlostomia; *тифло-* + греч. stoma отверстие) — см. *Цекостомия.*
ТИФЛОТЕ́ХНИКА (*тифло-* + техника) — отрасль техники, разрабатывающая приспособления и аппараты для обучения слабовидящих и слепых, облегчения выполнения ими производственных процессов и удовлетворения бытовых нужд.
ТИФЛОТОМИ́Я (typhlotomia; *тифло-* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Цекотомия.*
ТИФЛОТРАНСВЕРЗОСТОМИ́Я (typhlotransversostomia; *тифло-* + анат. colon transversum поперечная ободочная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между слепой и поперечной ободочной кишкой; может применяться при неудалимой опухоли печеночного изгиба ободочной кишки.
ТИФЛОУРЕТЕРОСТОМИ́Я ПО ТАДДЕ́Ю (*тифло-* + греч. urētēr мочеточник + stoma отверстие) — см. *Таддеи тифлоуретеростомия.*
ТИФЛЭКТАЗИ́Я (typhlectasia; *тифл-* + греч. ektasis растягивание, расширение) — дилатация слепой кишки без утолщения ее стенки.
ТИФО́ИД (typhoidum; *тиф* + греч. -eidēs подобный) — 1) тяжелое состояние при выраженной интоксикации, похожее на status typhosus, но возникшее у больного инфекционной болезнью, отличной от тифов; 2) (устар.) — заболевание брюшным тифом, характеризующееся легким течением.
ТИФО́ИД ЖЕ́ЛЧНЫЙ (устар.) — см. *Паратифобациллез.*
ТИФО́ИД ХОЛЕ́РНЫЙ (typhoidum choleraicum) — осложнение холеры, возникающее в период выздоровления в связи с присоединением вторичной инфекции и протекающее по типу сепсиса.
ТИФФНО́ КОЭФФИЦИЕ́НТ (R. Tiffeneau) — показатель проходимости бронхов, представляющий собой отношение (в %) объема воздуха, выдыхаемого за первую секунду форсированного выдоха, к жизненной емкости легких.
ТИ́ХОВА ОПЕРА́ЦИЯ (П. И. Тихов, 1865—1917, отеч. хирург) — хирургическая операция: имплантация мочеточника в прямую кишку, в результате чего его конец свободно свисает в просвет кишки.
ТИ́ХОВА — ЛИ́НБЕРГА ОПЕРА́ЦИЯ (П. И. Тихов, 1865—1917, отеч. хирург; Б. Э. Линберг, 1885—1965, сов. хирург; син. резекция межлопаточно-грудная) — хирургическая операция: удаление лопатки вместе с акромиальным концом ключицы и окружающими их мышцами и клетчаткой при злокачественных опухолях лопатки и области плечевого сустава.
ТИ́ХОВА — ЛИ́НБЕРГА — МАХСО́НА ОПЕРА́ЦИЯ (П. И. Тихов, 1865—1917, отеч. хирург; Б. Э. Линберг, 1885—1965, сов. хирург; Н. Е. Махсон, сов. ортопед) — модификация операции Тихова — Линберга, при к-рой резецированное плечо подвешивают с помощью лавсановой ленты к скелетированной ключице.
ТИХОМИ́РОВА ПРО́БА (П. Е. Тихомиров, 1895—1964, сов. офтальмолог; син. питьевая скотометрическая проба) — метод диагностики глаукомы, основанный на увеличении размеров слепого пятна через час после приема внутрь 500 *мл* воды.
ТИХОНО́ВИЧА — ПОЛЕ́НОВА ОПЕРА́ЦИЯ (А. В. Тихонович, род. в 1876 г., отеч. хирург; А. Л. Поленов, 1871—1947, сов. хирург) — пластическая операция при лечении spina bifida в крестцовой области, заключающаяся в закрытии дефекта дужек позвонков смещенным кверху копчиком.
ТКАНЕВА́Я ЖИ́ДКОСТЬ — жидкость, заполняющая тканевые щели; содержит продукты обмена веществ, а также вещества, поступающие из крови.
ТКАНЕВА́Я ПРОВОДИ́МОСТЬ — см. *Звукопроводимость тканевая.*
ТКАНЕВА́Я ФО́РМА — вегетативная стадия развития нек-рых паразитических простейших, напр. Entamoeba histolytica, протекающая в тканях хозяина и вызывающая патологический процесс.
ТКА́НЕВО-БИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПРО́БА — см. *Дольда проба.*
ТКАНЕВЫ́Е ЩЕ́ЛИ — межклеточные пространства в тканях.
ТКАНЕПОДО́БНОЕ ВЕЩЕСТВО́ в медицинской радиологии — см. *Тканеэквивалентное вещество.*
ТКАНЕЭКВИВАЛЕ́НТНОЕ ВЕЩЕСТВО́ (син. тканеподобное вещество) — вещество, к-рое поглощает и рассеивает ионизирующее излучение так же, как и исследуемая ткань организма; Т. в. используется для моделирования распространения ионизирующего излучения в органах и тканях.
ТКАНЬ (textus, LNH) — система клеток и неклеточных структур, объединенных общей функцией, строением и (или) происхождением.
Т. ГРАНУЛЯЦИО́ННАЯ (granulationes; син.: грануляции, Т. зернистая) — соединительная Т., образующаяся при заживлении дефектов ткани, хроническом воспалении, организации омертвевших участков и инкапсуляции инородных тел.; состоит из большого числа новообразованных сосудов (типа капилляров), молодых и дифференцированных клеток, ретикулярных и коллагеновых волокон; в открытой ране имеет зернистый вид.
Т. ЖИРОВА́Я (t. adiposus, LNH) — Т., образованная жировыми клетками.

Т. ЖИРОВА́Я БУ́РАЯ (t. adiposus fuscus, LNH; син. жир бурый) — Т. ж., состоящая из клеток бурого цвета, содержащих в митохондриях железосодержащие пигменты; характерна для новорожденных.
Т. ЗЕРНИ́СТАЯ (t. granularis) — см. *Ткань грануляционная.*
Т. ИНТЕРСТИЦИА́ЛЬНАЯ (t. interstitialis; син.: интерстиций, скелет волокнистый, Т. межуточная) — рыхлая волокнистая соединительная ткань, образующая строму паренхиматозных органов.
Т. КАМБИА́ЛЬНАЯ (лат. cambium обмен, смена) — общее название Т., в к-рых происходит интенсивное деление клеток (напр., лимфоидная ткань, кишечный эпителий).
Т. КО́СТНАЯ (t. osseus, LNH) — соединительная Т., содержащая обызвествленное межклеточное вещество; основной структурный компонент костей скелета.
Т. КО́СТНАЯ ГРУБОВОЛОКНИ́СТАЯ (t. osseus rudifibrosus) — Т. к., характеризующаяся беспорядочным расположением оссеиновых волокон, образующих грубые пучки; встречается у зародыша, а также на месте прикрепления к кости сухожилий и в участках остеогенеза (напр., при заживлении переломов).
Т. КО́СТНАЯ ПЛАСТИ́НЧАТАЯ (t. osseus lamellaris, LNH) — Т. к., характеризующаяся упорядоченным расположением оссеиновых волокон, образующих тонкие пластинки в составе остеонов.
Т. КО́СТНАЯ ПЛАСТИ́НЧАТАЯ ПЕРИОСТА́ЛЬНАЯ (t. osseus lamellaris periostalis) — Т. к. п., образующаяся на месте хряща в результате перихондроостального окостенения.
Т. КО́СТНАЯ ПЛАСТИ́НЧАТАЯ ЭНДОСТА́ЛЬНАЯ (t. osseus lamellaris endostalis) — Т. к. п., образующаяся на месте хряща в результате эндохондрального окостенения.
Т. ЛИМФАДЕНО́ИДНАЯ (t. lymphadenoideus) — см. *Ткань лимфоидная.*
Т. ЛИМФО́ИДНАЯ (t. lymphoideus; *лимфа* + греч. -eidēs подобный; син.: Т. лимфаденоидная, Т. лимфоретикулярная) — ретикулярная Т. с большим количеством лимфоцитов; образует паренхиму лимфатических узлов, селезенки, миндалин, вилочковой железы, собственную пластинку слизистой оболочки внутренних органов.
Т. ЛИМФОРЕТИКУЛЯ́РНАЯ (t. lymphoreticularis) — см. *Ткань лимфоидная.*
Т. МЕЖУ́ТОЧНАЯ — см. *Ткань интерстициальная.*
Т. МЕТАНЕФРОГЕ́ННАЯ (*метанефрос* + греч. -genēs порождающий) — см. *Метанефрогенный тяж.*
Т. МИЕЛО́ИДНАЯ (t. myeloideus; греч. myelos мозг, костный мозг + -eidēs подобный) — совокупность клеток, являющихся предшественниками гранулоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, т. е. образующих миелоидный росток кроветворения.
Т. МИОЭПИТЕЛИА́ЛЬНАЯ (t. myoepithelialis, LNH) — разновидность эпителия, клетки к-рого содержат сократимые структуры — миофибриллы; входит в состав секреторных отделов потовых и молочных желез, а также больших слюнных желез.
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ (t. muscularis, LNH) — Т., образованная клетками, содержащими сократимые элементы.
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ АНИМА́ЛЬНАЯ — см. *Ткань мышечная скелетная.*
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ ГЛА́ДКАЯ (t. muscularis non striatus, LNH; син. Т. мышечная мезенхимная — устар.) — Т. м., построенная из гладких мышечных клеток; входит гл. обр. в состав сосудистых стенок, образует мышечные оболочки внутренних органов.
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ МЕЗЕНХИ́МНАЯ (устар.) — см. *Ткань мышечная гладкая.*
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ ПОПЕРЕЧНОПОЛОСА́ТАЯ (t. muscularis striatus, LNH) — Т. м., содержащая поперечнополосатые миофибриллы; различают скелетную и сердечную Т. м. п.
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ СЕРДЕ́ЧНАЯ (t. muscularis striatus cardiacus, LNH; син. Т. мышечная целомическая) — поперечнополосатая Т. м., образующая миокард; состоит из волокон, образованных сердечными миоцитами.
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ СКЕЛЕ́ТНАЯ (t. muscularis striatus sceletalis, LNH; син.: Т. мышечная анимальная, Т. мышечная соматическая) — Т. м. миотомного происхождения, входящая в состав скелетных мышц.
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ СОМАТИ́ЧЕСКАЯ (t. muscularis somaticus) — см. *Ткань мышечная скелетная.*
Т. МЫ́ШЕЧНАЯ ЦЕЛОМИ́ЧЕСКАЯ (t. muscularis coelomicus) — см. *Ткань мышечная сердечная.*
Т. НЕ́РВНАЯ (t. nervosus, LNH) — Т., специализированная на восприятии раздражения и передаче его в форме импульса другим тканям; является основным структурным компонентом нервной системы.
Т. ОСТЕО́ИДНАЯ (t. osteoideus, LNH; греч. osteon кость + -eidēs подобный) — см. *Остеоид.*
Т. ПИГМЕ́НТНАЯ (t. pigmentosus) — общее название Т., содержащих пигментные клетки (напр., пигментная соединительная ткань глаза, пигментный эпителий сетчатки).
Т. ПРЕХОНДРА́ЛЬНАЯ (t. prechondralis; лат. prae- перед + греч. chondros хрящ; син. Т. протохондральная) — Т. зародыша человека, состоящая из хондробластов и тонких прослоек межклеточного вещества, содержащего фибриллы коллагена; из Т. п. образуется хрящевая Т.
Т. ПРОТОХОНДРА́ЛЬНАЯ (t. protochondralis; греч. proton сначала + chondros хрящ) — см. *Ткань прехондральная.*
Т. РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИА́ЛЬНАЯ (t. reticuloendothelialis) — см. *Система макрофагов.*
Т. РЕТИКУЛЯ́РНАЯ (t. reticularis) — см. *Ткань соединительная ретикулярная.*
Т. РУБЦО́ВАЯ (нрк; t. cicatricalis) — см. *Рубец.*
Т. СЕ́ТЧАТАЯ (t. reticularis) — см. *Ткань соединительная ретикулярная.*
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ (t. connectivus, LNH) — Т., содержащая большое количество межклеточного вещества; различные виды Т. с. осуществляют в организме трофическую, пластическую, защитную и механическую (опорную) функции.
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ ВОЛОКНИ́СТАЯ (t. connectivus fibrosus LNH; син. Т. фиброзная) — Т. с. межклеточное вещество к-рой состоит гл. обр. из коллагеновых, эластических и (или) ретикулярных волокон.
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ НЕОФО́РМЛЕННАЯ (t. connectivus irregularis) — см. *Ткань соединительная волокнистая рыхлая.*
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ ВОЛОКНИ́СТАЯ ПЛО́ТНАЯ (t. connectivus fibrosus compactus, LNH) — Т. с. в., межклеточное вещество к-рой характеризуется наличием плотно расположенных коллагеновых волокон.
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ ВОЛОКНИ́СТАЯ РЫ́ХЛАЯ (t. connectivus fibrosus laxus, LNH; син. Т. соединительная неоформленная) — Т. с. в., межклеточное вещество к-рой характеризуется наличием рыхло расположенных коллагеновых волокон.
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ ПИГМЕ́НТНАЯ (t. connectivus pigmentosus, LNH) — Т. с., в цитоплазме клеток к-рой содержится пигмент (напр., Т. с. радужки).
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ РЕТИКУЛЯ́РНАЯ (t. connectivus reticularis, LNH; син.: Т. ретикулярная, Т. сетчатая, Т. соединительная сетчатая) — Т. с., состоящая из ретикулярных волокон и синцитиально связанных отростчатых ретикулярных клеток; входит в состав кроветворных органов.
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ СЕ́ТЧАТАЯ (t. connectivus reticularis) — см. *Ткань соединительная ретикулярная.*
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ СТУДЕНИ́СТАЯ (t. connectivus gelatus) — Т. с., межклеточное вещество к-рой желеобразно и гомогенно; встречается только у зародыша.
Т. СОЕДИНИ́ТЕЛЬНАЯ ЭЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (t. connectivus elasticus, LNH) — Т. с., в межклеточном веществе к-рой содержатся эластические волокна, расположенные в виде сети или тонких пластинок; входит в состав, напр., эластических связок, стенок крупных артерий, бронхов.
Т. ФИБРО́ЗНАЯ (t. fibrosus) — см. *Ткань соединительная волокнистая.*
Т. ХОНДРО́ИДНАЯ (t. chondroideus; греч. chondros хрящ + -eidēs подобный) — хрящеподобная ткань, образующаяся на ранних этапах развития хрящевой ткани в эмбриогенезе человека, характерна также для низших позвоночных.
Т. ХРОМАФФИ́ННАЯ (t. chromaffinis; хром + лат. affinis родственный, сродный; син. система хромаффинная) — система клеток глиального происхождения, вырабатывающих катехоламины — адреналин и норадреналин; образует мозговое вещество надпочечников и параганглии; клетки обладают выраженным сродством к солям хрома.
Т. ХРЯЩЕВА́Я (t. cartilagineus, LNH) — соединительная Т., состоящая из хондробластов, хондроцитов и большого количества плотного межклеточного вещества; выполняет опорно-механическую функцию.

Т. ХРЯЩЕВА́Я ВОЛОКНИ́СТАЯ (cartilago fibrosa, LNH; син.: хрящ волокнистый, хрящ коллагеноволокнистый) — Т. х., в межклеточном веществе к-рой содержатся коллагеновые волокна, расположенные между рядами хондроцитов; из Т. х. в. построены, напр., межпозвоночные диски, лобковый симфиз.

Т. ХРЯЩЕВА́Я ГИАЛИ́НОВАЯ (cartilago hyalina, LNH; син.: Т. хрящевая стекловидная, хрящ гиалиновый) — Т. х., межклеточное вещество к-рой содержит коллагеновые волокна и хондромукопротеиды; из Т. х. г. состоят хрящи ребер, трахеи и бронхов, суставных поверхностей костей.

Т. ХРЯЩЕВА́Я СТЕКЛОВИ́ДНАЯ — см. *Ткань хрящевая гиалиновая.*

Т. ХРЯЩЕВА́Я ЭЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (cartilago elastica, LNH; син. хрящ эластический) — Т. х., межклеточное вещество к-рой содержит эластические волокна; Т. х. э. входит в состав ушной раковины, надгортанника, рожковидных и клиновидных хрящей гортани.

Т. ЭПИТЕЛИА́ЛЬНАЯ (t. epithelialis, LNH) — см. *Эпителий.*

ТКАНЬ ЛИОФИЛИЗИ́РОВАННАЯ — участок ткани, изъятый из организма и подвергнутый быстрому замораживанию при температуре —160°, с последующим высушиванием в вакууме до полного обезвоживания; используется при пластических операциях.

ТКАЧЕ́НКО КОМПРЕССИО́ННО-ДИСТРАКЦИО́ННЫЙ АППАРА́Т (С. С. Ткаченко, род. в 1923 г., сов. ортопед-травматолог) — ортопедический аппарат для репозиции и фиксации костных отломков; состоит из четырех рамок со спицами, связанных между собой винтами и снабженных эксцентриками и поводками для перемещения спиц, проведенных через костные отломки.

ТО́БИАНА ГИПО́ТЕЗА (L. Tobian, род. в 1920 г., амер. врач) — гипотеза, объясняющая стойкое повышение артериального давления при гипертонической болезни истощением функции противогипертензивных структур почек вследствие длительной их гиперфункции, вызванной избыточным потреблением поваренной соли.

ТО́БЛЕРА СИНДРО́М (L. Tobler, 1877—1915, швейц. педиатр) — врожденное сочетание плоской гемангиомы на лице с частичной односторонней гипертрофией верхней челюсти.

ТОГАВИ́РУСЫ (Togaviridae) — семейство вирусов, относящихся к экологической группе арбовирусов, содержащих одноцепочечную рибонуклеиновую кислоту и нуклеокапсид, окруженный липопротеиновой оболочкой; включает возбудителей многих арбовирусных болезней человека.

ТО́ДДА МЕТУ́ЩАЯ ПОХО́ДКА (R. B. Todd, 1809—1860, англ. врач) — походка, при к-рой больной переступает одной ногой, а другую, выпрямленную, подтягивает за собой; наблюдается при истерии.

ТО́ДДА ПАРАЛИ́Ч (R. B. Todd) — преходящий паралич, развивающийся сразу после нек-рых судорожных эпилептических припадков.

ТО́ЙНБИ О́ПЫТ (J. Toynbee, 1815—1866, англ. оториноларинголог; син. Вальсальвы опыт отрицательный) — метод определения проходимости слуховой (евстахиевой) трубы в направлении от барабанного к глоточному отверстию: исследуемый производит глотательное движение, закрыв рот и прижав пальцами ноздри, что при наличии проходимости сопровождается ощущением треска в ухе, обусловленным нек-рым втяжением барабанной перепонки.

ТО́ЙНБИ СИМПТО́М (J. Toynbee) — 1) неясное восприятие речи, особенно при одновременном разговоре нескольких лиц; признак отосклероза; 2) наличие экзостозов в наружных слуховых проходах; признак отосклероза.

ТО́ЙНБИ — БИ́НГА СИМПТО́М (J. Toynbee, 1815—1866, англ. оториноларинголог; A. Bing, 1844—1922, австрийский оториноларинголог) — гипосекреция ушной серы; признак отосклероза.

ТОКЕ́ЛО — см. *Микоз черепицеобразный.*

ТО́КИ УВЧ — см. *Ультравысокочастотные токи.*

ТОКО- (греч. tokos роды) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к родам, к родовой деятельности».

ТОКО́ГРАФ (*токо-* + греч. graphō писать, изображать) — см. *Гистерограф.*

ТОКОГРА́ФИЯ (tocographia; *токо-* + греч. graphō писать, изображать) — графическая регистрация сократительной деятельности матки во время родов.

Т. ВНУ́ТРЕННЯЯ — Т. с помощью резинового баллона, введенного в матку и соединенного с манометром; производится только в первом периоде родов.

Т. НАРУ́ЖНАЯ — Т. с помощью датчика, расположенного на передней брюшной стенке.

ТОКОДИНАМО́ГРАФ (*токо-* + *динамограф*) — см. *Гистерограф.*

ТОКОДИНАМОМЕТРИ́Я (*токо-* + *динамометрия*) — измерение силы маточных сокращений во время родов.

ТОКОФЕРО́ЛЫ (tocopherola; *токо-* + греч. pherō нести; син. витамин Е) — группа жирорастворимых витаминов, содержащихся во многих растительных маслах; защищают ненасыщенные липиды клеточных мембран от окисления (воздействия свободных радикалов).

ТОКОФОБИ́Я (tocophobia; *токо-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь родов.

ТОКС- [токси-, токсик-, токсико-, токсо-, греч. toxikon (pharmakon) яд, к-рым смазывали стрелы, от toxikos относящийся к луку и к стреле] — составная часть сложных слов, означающая «ядовитый», «токсический», «относящийся к ядам».

ТОКСАСКАРО́З (toxascarosis) — гельминтоз животных (чаще собак), вызываемый Toxascaris leonina; описаны единичные случаи заболевания человека.

ТОКСЕМИ́Я (toxaemia; *токс-* + греч. haima кровь; син. токсинемия) — наличие в крови токсина (токсинов); наблюдается при интоксикациях, многих инфекционных болезнях, лучевой болезни и др.

ТОКСИ- — см. *Токс-.*

ТОКСИГЕ́ННОСТЬ (*токси-* + греч. -genēs порождающий) — способность животного, растения или микроорганизма образовывать вещества, обладающие токсическим действием на другие организмы.

ТОКСИДЕРМИ́Я (toxidermia; *токси-* + греч. derma кожа; син.: токсикодермия, экзантема токсическая) — общее название дерматозов токсической или токсико-аллергической природы.

Т. АЛИМЕНТА́РНАЯ (t. alimentaria; син. Т. гастроинтестинальная) — Т. при пищевых интоксикациях в виде зудящих эритем, волдырей и папул.

Т. ГАСТРОИНТЕСТИНА́ЛЬНАЯ (t. gastrointestinalis) — см. *Токсидермия алиментарная.*

Т. ВАКЦИ́ННАЯ (t. vaccinalis; син. сыпь вакцинная) — Т., возникающая как осложнение вакцинации; проявляется полиморфной сыпью.

Т. МЕДИКАМЕНТО́ЗНАЯ (t. medicamentosa) — Т., возникающая при приеме внутрь лекарственных средств, к к-рым больной обладает повышенной чувствительностью; протекает чаще в виде крапивницы или полиморфной эритемы.

Т. САЛЬВАРСА́ННАЯ (t. ex usu salvarsani; син. арсенодерматит) — Т., возникающая после введения препаратов сальварсана, протекающая, как правило, в виде зудящих кератозов и эритродермии.

Т. СЫВОРОТО́ЧНАЯ (t. serosa; син. эритема окаймленная) — Т., возникающая после введения какой-либо сыворотки, протекающая в виде серозной эритемы или крапивницы.

ТОКСИК- — см. *Токс-.*

ТОКСИКО- — см. *Токс-.*

ТОКСИКОДЕРМИ́Я (toxicodermia; *токсико-* + греч. derma кожа) — см. *Токсидермия.*

ТОКСИКО́З (toxicosis; *токсик-* + *-оз*) — патологическое состояние, вызванное более или менее длительным отравлением или токсемией иного происхождения.

Т. ГЕЛИОТРО́ПНЫЙ — см. *Болезнь гелиотропная.*

Т. ИНФЕКЦИО́ННЫЙ (t. infectiosa) — Т., обусловленный воздействием на организм бактериальных токсинов или продуктов распада и нарушенного обмена тканей, поврежденных возбудителями инфекции.

Т. ПИЩЕВО́Й (t. alimentaria) — см. *Отравление пищевое.*

Т. СОРНЯКО́ВЫЙ — Т., обусловленный употреблением в пищу продуктов переработки зерна с примесью семян сорняков, содержащих токсины (напр., софоры, седой триходесмы, опущенноплодного гелиотропа, опьяняющего плевела).

Т. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (t. traumatica; син.: Байуотерса синдром, крашсиндром, синдром длительного раздавливания, синдром миоренальный, синдром раздавливания, синдром размозжения, травматическое сжатие) — Т., вызванный продуктами распада и нарушенного обмена сдавленных или размозженных мягких тканей (чаще нижних конечностей); приводит к поражению почек с развитием острой почечной недостаточности.

ТОКСИКО́З БЕРЕ́МЕННЫХ (toxicosis gravidarum; син. гестоз) — общее название патологических состояний, возникающих при беременности, осложняющих ее течение и, как правило, прекращающихся после ее окончания.

Т. БЕРЕ́МЕННЫХ ПО́ЗДНИЙ (t. gravidarum tarda) — Т. б. в форме водянки беременных, нефропатии, преэклампсии и эклампсии, возникающий в основном во второй половине беременности.

Т. БЕРЕ́МЕННЫХ РА́ННИЙ (t. gravidarum praecox) — Т. б. в форме рвоты, в т. ч. чрезмерной, дерматозов, невритов, возникающий в основном в первые месяцы беременности.

ТОКСИКО́З ТИРЕОИДИ́НОВЫЙ (toxicosis thyreoidinica; син. гипертиреоз экспериментальный) — тиреотоксикоз, вызванный у подопытного животного введением гормонов щитовидной железы.

ТОКСИКОИНФЕ́КЦИЯ ПИЩЕВА́Я (toxicoinfectio alimentaria; син.: бактериотоксикоз пищевой, отравление пищевое бактериальное) — общее название острых инфекционных болезней, возникающих при попадании в организм с пищей различных микроорганизмов и их токсинов: протей, энтерококки, споровые аэробы и анаэробы, гемофильные вибрионы, стафилококк, стрептококк и др.; характеризуется внезапным началом, интоксикацией, нарушением водно-солевого обмена и деятельности сердечно-сосудистой системы.

ТОКСИКО́ЛОГ (*токсико-* + греч. logos учение, наука) — врач-специалист, получивший подготовку по вопросам диагностики, лечения и профилактики отравлений (поражений вредными и отравляющими веществами).

ТОКСИКОЛО́ГИЯ (*токсико-* + греч. logos учение, наука) — область медицины, изучающая физические и химические свойства ядов (вредных и отравляющих веществ), механизм их действия на организм человека и разрабатывающая методы диагностики, лечения и профилактики отравлений.

Т. АВИАЦИО́ННО-КОСМИ́ЧЕСКАЯ — раздел Т., изучающий влияние на организм вредных химических веществ, загрязняющих атмосферу кабин летательных аппаратов, и разрабатывающий соответствующие гигиенические нормативы и профилактические мероприятия.

Т. ВОЕ́ННАЯ — раздел военной медицины и Т., изучающий патогенез поражений отравляющими веществами, а также вредными веществами и агрессивными жидкостями, используемыми в военной технике, и разрабатывающий методы диагностики, профилактики и лечения этих поражений.

Т. КЛИНИ́ЧЕСКАЯ — раздел Т., изучающий клинические проявления отравлений и разрабатывающий методы диагностики и лечения отравлений.

Т. КОММУНА́ЛЬНАЯ — раздел Т., изучающий токсичные вещества, действующие на человека в условиях населенных мест, и разрабатывающий соответствующие гигиенические нормативы и профилактические мероприятия.

Т. ЛЕКА́РСТВЕННАЯ — раздел Т., изучающий механизмы токсического действия лекарственных веществ и разрабатывающий методы его предупреждения и лечения осложнений.

Т. ПИЩЕВА́Я — раздел Т., изучающий пищевые отравления и разрабатывающий меры их профилактики.

Т. ПРОМЫ́ШЛЕННАЯ — раздел Т., изучающий вредные вещества, являющиеся исходными, промежуточными, конечными или побочными продуктами промышленного производства, и разрабатывающий соответствующие гигиенические нормативы, профилактические и лечебные мероприятия.

Т. РАДИАЦИО́ННАЯ (син. радиотоксикология) — раздел Т., изучающий лучевые поражения, возникающие при попадании радиоактивных веществ внутрь организма.

Т. САНИТА́РНАЯ — раздел Т., разрабатывающий меры профилактики вредного действия на организм человека химических веществ, встречающихся в окружающей среде, в т. ч. в продуктах питания.

Т. СЕЛЬСКОХОЗЯ́ЙСТВЕННАЯ — раздел Т., изучающий вредные вещества, применяемые в сельском хозяйстве (пестициды и др.), и разрабатывающий соответствующие гигиенические нормативы, профилактические и лечебные мероприятия.

Т. СУДЕ́БНАЯ — раздел судебной медицины и Т., изучающий отравления применительно к задачам судебно-медицинской экспертизы.

ТОКСИКОМАНИ́Я (toxicomania; *токсико-* + *мания*) — общее название болезней, проявляющихся влечением к постоянному приему нек-рых веществ и развитием в связи с этим хронической интоксикации.

Т. АЛКОГО́ЛЬНАЯ (t. alcoholica) — см. *Алкоголизм хронический.*

ТОКСИКОМЕТРИ́Я (*токсико-* + греч. metreō измерять, определять) — совокупность методов, используемых для количественной оценки токсичности химических веществ, основанных гл. обр. на экспериментах с лабораторными животными.

ТО́КСИКО - ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКАЯ ГРУ́ППА — подразделение отряда специализированной медицинской помощи, предназначенное для оказания специализированной или квалифицированной терапевтической помощи пораженным отравляющими веществами; используется для усиления медико-санитарных батальонов или для специализации госпиталей.

ТОКСИКОФОБИ́Я (toxicophobia; *токсико-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь отравиться.

ТОКСИ́Н [греч. toxikon (pharmakon) яд] — вещество бактериального, растительного или животного происхождения, способное при попадании в организм человека или животных вызывать заболевание или их гибель.

Т. БАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ — Т., образующийся в результате жизнедеятельности бактерий и выделяемый во внешнюю среду (экзотоксин) или являющийся компонентом бактериальной клетки (эндотоксин).

Т. БОТУЛИНИ́ЧЕСКИЙ (син. ботулотоксин) — общее название Т. белковой природы, продуцируемых различными типами палочки ботулизма, тормозящих освобождение ацетилхолина в синапсах и вызывающих поражение продолговатого мозга, сердечно-сосудистой системы и мышц.

Т. ДИФТЕРИ́ЙНЫЙ — общее название Т. белковой природы, продуцируемых дифтерийной палочкой, обладающих летальным или некротическим действием.

Т. И́СТИННЫЙ — см. *Экзотоксин.*

Т. СТАФИЛОКО́ККОВЫЙ — общее название Т., продуцируемых стафилококками и обладающих летальным, гемолитическим, некротическим действием или вызывающих пищевые отравления.

Т. СТОЛБНЯ́ЧНЫЙ — Т. белковой природы, продуцируемый столбнячной палочкой и состоящий из двух фракций — тетанолизина и тетаноспазмина.

Т. ХОЛЕ́РНЫЙ (нрк) — см. *Холероген.*

Т. ЭРИТРОГЕ́ННЫЙ (син. Дика токсин) — Т., продуцируемый нек-рыми группами гемолитического стрептококка; играет важную роль в патогенезе скарлатины, в т. ч. вызывает появление сыпи.

ТОКСИНЕМИ́Я (toxinaemia; *токсин* + греч. haima кровь) — см. *Токсемия.*

ТОКСИ́ННОЕ ОРУ́ЖИЕ — средство массового поражения людей, действие которого основано на использовании ядовитых веществ биологического происхождения; рассматривается в зарубежной литературе как вид биологического или химического оружия.

ТОКСИНОТЕРАПИ́Я (*токсин* + *терапия*) — лечение токсинами (напр., пчелиным или змеиным ядом).

ТОКСИ́ЧЕСКИЙ ТУМА́Н — см. *Смог.*

ТОКСИ́ЧНОСТЬ[1] (син. ядовитость) — свойство вещества при попадании в определенных количествах в организм человека, животного или растения вызывать их отравление или гибель.

Т. ИЗБИРА́ТЕЛЬНАЯ — Т., проявляющаяся поражением лишь определенных биологических структур.

ТОКСИЧНОСТЬ[2] — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества.

ТОКСО- — см. *Токс-.*

ТОКСОДО́ЗА (*токсо-* + *доза*) — величина, характеризующая воздействие на организм отравляющего вещества, измеряемая произведением его концентрации в воздухе на продолжительность воздействия (выражается в *мг/л·мин* или *мг/м*^{3}*·мин*).

ТОКСО́ИД (*токс-* + греч. -eidēs подобный) — см. *Анатоксин.*

ТОКСОКАРО́З (toxocarosis) — гельминтоз собак, кошек, пушных зверей; известны единичные случаи заболевания у человека, вызываемые личинками Toxocara canis или Toxocara mystax.

ТОКСОНЕ́МА (*токсо-* + греч. nēma нить) — см. *Микронема.*

ТОКСОПЛАЗМИ́Н (toxoplasminum) — фракция перитонеального экссудата белых мышей, зараженных токсоплазмами, содержащая антигенный комплекс возбудителя; применяется для постановки внутрикожной аллергической пробы при диагностике токсоплазмоза.

ТОКСОПЛАЗМО́З (toxoplasmosis) — паразитарная болезнь из группы протозойных зоонозов, вызываемая внутриклеточным паразитом Toxoplasma gondii, характеризующаяся паразитемией и поражением различных органов; у человека протекает с полиморфной клинической картиной или бессимптомно.

Т. ВРОЖДЁННЫЙ (t. congenita; син. Т. новорожденных) — Т., развивающийся при трансплацентарном

заражении плода и характеризующийся преимущественным поражением центральной нервной системы и глаз.

Т. НОВОРОЖДЁННЫХ (t. neonatorum) — см. *Токсоплазмоз врожденный.*

Т. ПРИОБРЕТЁННЫЙ — Т., развивающийся при заражении алиментарным путем, а также через кожу и иногда при гемотрансфузии и трансплантации органов и тканей; проявляется поражением нервной и лимфатической системы, глаз, скелетных мышц, миокарда и др.; различают острый и хронический Т. п.

ТОКСОПЛА́ЗМЫ (Toxoplasma) — род паразитических простейших отр. кокцидий, включающий лишь один вид Toxoplasma gondii; окончательный хозяин обычно кошка, в кишечнике которой образуются ооцисты; промежуточный хозяин — многие млекопитающие и птицы; возбудитель токсоплазмоза человека.

ТОКСОТОКСИ́Н — малоизученное вещество, продуцируемое токсоплазмами, обладающее антигенными свойствами и токсичностью; при введении экспериментальным животным вызывает признаки, напоминающие токсоплазмоз.

ТОКСОФО́РНАЯ ГРУ́ППА (истор.; *токсо-* + греч. phoros несущий; син. зимофорная группа) — гипотетическая часть молекулы токсина, ответственная за повреждение клетки после образования комплекса между гаптофорной группой токсина и клеточным рецептором первого порядка.

ТО́ЛБОТА ЗАКО́Н (W. H. F. Talbot, 1800—1877, англ. ученый) — см. *Тальбота закон.*

ТОЛЕРА́НТНОСТЬ (лат. tolerantia способность переносить, терпеливость; син. переносимость) в фармакологии — способность организма переносить воздействие определенного лекарственного вещества или яда без развития соответствующего терапевтического или токсического эффекта.

ТОЛЕРА́НТНОСТЬ ИММУНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — неспособность организма к иммунному ответу на определенный антиген при сохранении иммунологической реактивности к другим антигенам; различают естественную Т. и., обусловленную генотипом особи, и искусственную (индуцируемую) Т. и., наблюдаемую при введении антигена совместно с иммунодепрессантами.

ТОЛОЧИ́НОВА — РОЖЕ́ БОЛЕ́ЗНЬ (H. L. Roger, 1809—1891, франц. врач) — см. *Роже болезнь.*

ТО́ЛСТАЯ КА́ПЛЯ — препарат крови для микроскопии, представляющий собой 2—3 капли крови, распределенные по предметному стеклу ровным толстым слоем, высушенный и окрашенный по Романовскому — Гимзе без предварительной фиксации; применяется для обнаружения в крови малярийного плазмодия, трипаносом или филярий.

ТОЛУИДИ́НОВЫЙ СИ́НИЙ (toluidin blau) — основной тиазиновый краситель, применяемый в гистологической технике для окраски нервной ткани, выявления клеточных ядер и базофильных структур, а также метахроматических субстанций.

ТОЛУО́Л (син.: метилбензол, фенилметан) — ароматический углеводород, применяемый в медицине и медицинской промышленности как растворитель, а также при изготовлении нек-рых лекарственных средств; токсичен для человека, поражает нервную систему и кроветворные органы.

ТОМА́ РЕФЛЕ́КС (A. A. H. Thomas, 1867—1963, франц. невропатолог) — см. *Рефлекс коленный маятникообразный.*

ТОМА́ СИМПТО́М (A. A. H. Thomas) — избыточная пронация кисти при быстром переводе ее из положения супинации; признак поражения мозжечка и его проводящих путей.

ТОМА́ СИ́НДРОМ (A. A. H. Thomas) — мозжечковый синдром, возникающий в возрасте старше 55 лет в результате атрофии или глиоза коры мозжечка.

ТОМА́ СХЕ́МА (A. A. H. Thomas) — схема сегментарной организации пиломоторной иннервации.

ТОМА́ — ЖЮМАНТИ́ СИМПТО́М (A. A. H. Thomas, 1867—1963, франц. невропатолог; Jumantie) — чрезмерное разведение пальцев при попытке больного охватить предмет; признак поражения мозжечка и его проводящих путей.

ТОМА́ — РУ СИМПТО́М (A. A. H. Thomas, 1867—1963, франц. невропатолог) — см. *Рефлекс солярный.*

ТОМА́ЙЕРА ПРИ́ЗНАК (J. Thomayer, 1853—1952, чешский терапевт) — усиление тимпанического звука при перкуссии живота справа от пупка; признак слипчивого перитонита.

ТО́МАСА МЕ́ТОД (H. Thomas) — метод исследования дыхательных движений диафрагмы, основанный на получении на одной и той же рентгенограмме изображения диафрагмы на высоте вдоха и после выдоха.

ТО́МАСА ОСТЕОКЛА́СТ (H. O. Thomas, 1834—1891, англ. ортопед) — приспособление для подкожной остеоклазии, представляющее собой ручные тиски, цилиндрические губки к-рых сводят и разводят с помощью винта, расположенного в ручке.

ТО́МАСА ПРИЁМ (H. O. Thomas) — способ выявления сгибательной контрактуры бедра путем сгибания другой конечности в коленном и тазобедренном суставах с прижатием бедра к животу; при сгибательной контрактуре бедро на стороне поражения приподнимается над поверхностью, на которой лежит исследуемый.

ТО́МАСА ШИ́НА (H. O. Thomas) — транспортная шина для иммобилизации нижней конечности с одновременным ее вытяжением, выполненная в виде двух стержней с гамачками и приспособлением для упора в седалищный бугор; прообраз шины Ларденуа — Виноградова.

ТОМИНКСО́З (thominxosis) — гельминтоз из группы нематодозов, вызываемый Thominx aerophilus, характеризующийся развитием трахеобронхита или бронхопневмонии; человек заражается при попадании яиц паразита на руки при случайном раздавливании дождевых червей (во время земляных работ, на рыбной ловле).

ТОМО- (греч. tomos отрезок, пластина, слой от temnō резать, разрезать, рассекать) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к слою, к пласту».

ТОМО́ГРАФ (*томо-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгеновская установка специальной конструкции, предназначенная для томографии.

ТОМОГРАФИ́Я (*томо-* + греч. graphō писать, изображать; син.: биотомия, ламинография, рентгенологическое исследование послойное, рентгенотомография, стратиграфия) — получение рентгеновского изображения определенного слоя объекта, что достигается путем перемещения во время исследования каких-либо двух элементов из трех (рентгеновская трубка, рентгеновская пленка, объект) при неподвижном третьем.

Т. КОМПЬЮ́ТЕРНАЯ (син.: томоденситография, ЭМИ-сканирование) — Т. путем сканирования исследуемого слоя объекта тонким пучком рентгеновского излучения с последующим построением изображения этого слоя с помощью ЭВМ, что позволяет без применения контрастных веществ дифференцировать ткани, незначительно различающиеся по степени поглощения рентгеновского излучения.

Т. ПАНОРА́МНАЯ — см. *Пантомография.*

ТОМОДЕНСИТОГРАФИ́Я (*томо-* + *денситография*) — см. *Томография компьютерная.*

ТОМОПНЕВМОМЕДИАСТИНОГРАФИ́Я (*томо-* + греч. pneuma воздух + анат. mediastinum средостение + греч. graphō писать, изображать) — томография органов средостения, контрастированных путем предварительного введения в него газа.

ТОМОПНЕВМОПЕРИТОНЕОГРАФИ́Я (*томо-* + греч. pneuma воздух + peritonaion брюшина + graphō писать, изображать) — томография органов брюшной полости, контрастированных газом, введенным в брюшную полость.

ТОМОПНЕВМОРЕТРОПЕРИТОНЕОГРАФИ́Я (*томо-* + греч. pneuma воздух + лат. retro позади + греч. peritonaion брюшина + graphō писать, изображать) — томография органов забрюшинного пространства, контрастированных введением в него газа.

ТОМОРЕСПИРАТО́РНАЯ ПРО́БА (*томо-* + лат. respiratio дыхание) — метод оценки вентиляционной функции определенного участка легкого, основанный на последовательной томографии легкого на высоте вдоха и после максимального выдоха.

ТОМОСКАНИ́РОВАНИЕ (*томо-* + *сканирование*) — радиоизотопное сканирование, проводимое послойно.

ТОМОФЛЮОРО́ГРАФ (*томо-* + *флюорограф*) — рентгеновская установка специальной конструкции, предназначенная для послойной флюорографии.

ТОМОФЛЮОРОГРАФИ́Я (*томо-* + *флюорография*) — флюорография, при к-рой получают послойное рентгеновское изображение.

ТО́МПСОНА ПРИ́ЗНАК (истор.; Th. Thompson, 1807—1860, англ. врач) — наличие красной линии по краю десен; рассматривался как ранний диагностический признак туберкулеза легких.

ТО́МПСОНА — РЕ́ЙСБЕКА ОПЕРА́ЦИЯ (J. E. Thompson, 1863—1927, амер. хирург) — хирургическая операция: введение талька в полость перикарда через экстраплевральный доступ с резекцией V ребра слева; предложена для реваскуляризации миокарда при хронической коронарной недостаточности.

ТО́МСА ВОЛОКНО́ (J. Tomes, 1836—1895, англ. стоматолог) — см. *Дентинный отросток одонтобласта.*

ТО́МСА ЗЕРНИ́СТЫЙ СЛОЙ (J. Tomes) — см. *Слой корня дентинный зернистый.*

ТО́МСЕНА БОЛЕ́ЗНЬ (A. J. Thomsen, 1815—1896, датский врач) — см. *Миотония врожденная.*

ТО́МСЕНА МИОТОНИ́Я (A. J. Thomsen) — см. *Миотония врожденная.*

ТО́МСОНА БОЛЕ́ЗНЬ (W. H. S. Thomson) — см. *Гликогеноз VII типа.*

ТО́МСОНА ЛИТОТРИ́ПТОР (истор.) — инструмент для дробления конкрементов в мочевом пузыре с рабочей частью в виде металлических губок, к-рые сводились с помощью винта; предшественник современных механических литотрипторов.

ТО́МСОНА СИНДРО́М (M. S. Thomson, род. в 1894 г., англ. дерматолог) — см. *Пойкилодермия наследственная склерозирующая.*

ТО́МЫ ЖИ́ДКОСТЬ (R. Thoma, 1847—1923, нем. патологоанатом и гистолог) — жидкость, применяемая в гистологической технике для декальцинации костей, зубов и обызвествленных тканей, представляющая собой смесь 96% этилового спирта и концентрированной азотной кислоты в соотношении 5 : 1.

ТОН сердца (греч. tonos музыкальный тон, лат. tonus тон) — аускультативный феномен; короткий звук, выслушиваемый в области сердца и обусловленный его деятельностью.

ТОН I — см. *Тон систолический.*

ТОН II — см. *Тон диастолический.*

ТОН III — см. *Тон желудочковый.*

ТОН IV — см. *Тон предсердный.*

ТОН OS (англ. opening snap щелчок открытия) — см. *Тон открытия митрального клапана.*

Т. БА́РХАТНЫЙ — см. *Дмитренко бархатный тон.*

Т. ВТОРО́Й — см. *Тон диастолический.*

Т. ДИАСТОЛИ́ЧЕСКИЙ (син.: тон II, тон второй) — Т., обусловленный захлопыванием и напряжением полулунных заслонок клапанов аорты и легочного ствола.

Т. ЖЕЛУ́ДОЧКОВЫЙ (син.: тон III, тон третий) — Т., обусловленный изменением тонуса миокарда желудочков при поступлении в них крови во время диастолы сердца.

Т. ОТКРЫТИЯ МИТРА́ЛЬНОГО КЛА́ПАНА (син.: тон OS, щелчок открытия митрального клапана) — дополнительный Т., следующий непосредственно за диастолическим Т. и обусловленный запаздыванием раскрытия деформированных створок клапана при сужении левого предсердно-желудочкового отверстия.

Т. ПЕ́РВЫЙ — см. *Тон систолический.*

Т. ПРЕДСЕ́РДНЫЙ (син.: тон IV, тон четвертый) — Т., обусловленный сокращениями миокарда предсердий; аускультативно обычно не воспринимается; регистрируется при низкочастотной фонокардиографии.

Т. СИСТОЛИ́ЧЕСКИЙ (син.: тон I, тон первый) — Т., обусловленный изменением тонуса, сокращением миокарда желудочков и захлопыванием предсердно-желудочковых клапанов.

Т. СИСТОЛИ́ЧЕСКИЙ ПЕРИКАРДИА́ЛЬНЫЙ — систолический Т., отличающийся своеобразным оттенком, обусловленным колебаниями более высокой частоты; иногда наблюдается при плевроперикардиальных сращениях.

Т. СУММИ́РОВАННЫЙ — Т., обусловленный суммацией звуков, возникающих при захлопывании предсердно-желудочкового и аортального клапанов, а также клапанов легочного ствола.

Т. ТРЕ́ТИЙ — см. *Тон желудочковый.*

Т. ЧЕТВЁРТЫЙ — см. *Тон предсердный.*

ТОН ДВОЙНО́Й ТРА́УБЕ — см. *Траубе двойной тон.*

ТОН- (тоно-; греч. tonos напряжение) — составная часть сложных слов, означающая «напряжение», «натяжение», «тонус», «давление».

ТОН ТХАТ ТУ́НГА MÉТОД (Ton That Tung, род. в 1912 г., вьетнамский хирург) — хирургическая операция: резекция печени, при к-рой на границе предполагаемого отсечения печень сдавливают руками и на ощупь определяют сосуды и протоки, после чего их перевязывают и пересекают.

ТОНЗИЛЛ- (тонзилло-; анат. tonsilla миндалина) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к миндалине».

ТОНЗИЛЛИ́Т (tonsillitis; *тонзилл- + -ит*; син. амигдалит) — воспаление небных миндалин.

ТОНЗИЛЛИ́Т ИНТЕРСТИЦИА́ЛЬНЫЙ (tonsillitis interstitialis) — см. *Тонзиллит хронический склеротический.*

ТОНЗИЛЛИ́Т О́СТРЫЙ (tonsillitis acuta) — быстро развивающийся тонзиллит с характерной симптоматикой ангины и являющийся ее основным морфологическим признаком.

ТОНЗИЛЛИ́Т РУБЦО́ВЫЙ (tonsillitis cicatricalis) — см. *Тонзиллит хронический склеротический.*

ТОНЗИЛЛИ́Т СКЛЕРОЗИ́РОВАННЫЙ (tonsillitis sclerotica) — см. *Тонзиллит хронический склеротический.*

ТОНЗИЛЛИ́Т ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (tonsillitis chronica; син. ангина хроническая) — медленно текущий тонзиллит, склонный к обострениям; возникает чаще как осложнение инфекционных болезней (ангина, скарлатина, корь) или как проявление аллергии.

Т. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ БЕЗАНГИ́ННЫЙ (t. chronica sine angina) — Т. х., протекающий без обострения местного процесса, но с выраженными симптомами общей интоксикации.

Т. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ КРИПТОВЫЙ (t. chronica cryptalis) — см. *Тонзиллит хронический лакунарный.*

Т. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ ЛАКУНА́РНЫЙ (t. chronica lacunaris; син. Т. хронический криптовый) — Т. х., при к-ром воспалительный процесс ограничен лакунами миндалин.

Т. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ ЛАКУНА́РНО-ПАРЕНХИМАТО́ЗНЫЙ (t. chronica lacunaris parenchymatosa) — Т. х., при к-ром воспалительный процесс локализуется как в лакунах, так и в лимфаденоидной ткани миндалин.

Т. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ ПАРЕНХИМАТО́ЗНЫЙ (t. chronica parenchymatosa) — Т. х., при к-ром воспалительный процесс локализован преимущественно в лимфаденоидной ткани небных миндалин.

Т. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ СКЛЕРОТИ́ЧЕСКИЙ (t. chronica sclerotica; син.: Т. интерстициальный, Т. рубцовый, Т. склерозированный) — Т. х., при к-ром происходит обильное разрастание соединительной ткани в миндалинах и окружающих тканях.

ТОНЗИЛЛО- — см. *Тонзилл-.*

ТОНЗИЛЛОРОТА́ТОР (*тонзилло-* + лат. roto, rotatum вращать) — инструмент в виде изогнутого шпателя, применяемый для обнаружения гноя или казеозных масс в лакунах небных миндалин путем надавливания на переднюю небную дужку.

ТОНЗИЛЛОТО́М (*тонзилло-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургический инструмент, чаще в виде кольцевидного ножа, предназначенный для резекции небных миндалин.

ТОНЗИЛЛОТО́М РЫЧА́ЖНЫЙ (син. Тидинга — Бохона тонзиллотом) — тонзиллотом, представляющий собой тонкую проволочную петлю, втягиваемую в трубку с помощью рычажного механизма.

ТОНЗИЛЛОТОМИ́Я (tonsillotomia; *тонзилло-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: частичное удаление небных миндалин.

ТОНЗИЛЛЭКТОМИ́Я (tonsillectomia; *тонзилл- + эктомия*) — хирургическая операция: полное удаление небных миндалин вместе с соединительнотканной капсулой.

ТОНЗИЛЛЯ́РНАЯ НИ́ША — пространство в области боковой стенки глотки, ограниченное спереди и сзади небными дужками; место расположения небной миндалины.

ТОНЗИЛЛЯ́РНЫЙ (tonsillaris) — относящийся к небной миндалине.

ТОНИЗИ́РУЮЩИЕ СРЕ́ДСТВА (tonica) — лекарственные средства, возбуждающие ц. н. с. и используемые для профилактики и лечения состояний, связанных с угнетением ее деятельности.

ТОНИ́ЧЕСКИЙ — относящийся к тонусу, обусловленный тоническим сокращением.

ТОННЕЛИЗА́ЦИЯ МОЧЕИСПУСКА́ТЕЛЬНОГО КАНА́ЛА (англ. tunnel тоннель) — хирургическая операция: насильственное проведение бужа через рубцовую ткань, облитерирующую заднюю часть мочеиспускательного канала.

ТОНО- — см. *Тон-.*

ТОНО́ГРАФ (*тоно-* + греч. graphō писать, изображать) — см. *Электротонограф.*

ТОНОГРАФИ́Я (*тоно-* + греч. graphō писать, изображать) — метод исследования гидродинамики глаза, заключающийся в графической регистрации результатов многократного измерения внутриглазного давления на фоне продолжительного сдавления глазного яблока тонометром.

ТОНО́МЕТР (*тоно-* + греч. metreō измерять) — прибор для измерения внутриглазного давления.

Т. АППЛАНАЦИО́ННЫЙ (лат. applanatio уплощение) — Т., измеряющий внутриглазное давление по способности глаза поддаваться сплющиванию при надавливании.

Т. ИМПРЕССИО́ННЫЙ (лат. impressio надавливание, вдавливание) — Т., измеряющий внутриглазное давление по степени вдавливания рого-

вицы под воздействием плунжера прибора.

ТОНОМЕТРИ́Я ГЛАЗНА́Я (син. офтальмотонометрия) — общее название методов измерения величины внутриглазного давления.

ТОНОМОТО́РНЫЙ ЭФФЕ́КТ — см. *Вюльпиана — Гейденгайна феномен.*

ТОНОСКОПИ́Я (*тоно-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — см. *Офтальмодинамометрия.*

ТОНОФИБРИ́ЛЛЫ (tonofibrillae; *тоно-* + лат. fibrilla волоконце) — тонкие белковые волокна, обеспечивающие сохранность формы в некоторых эпителиальных клетках.

ТОНОФИЛАМЕ́НТЫ (tonofilamenta; *тоно-* + лат. filamentum нить) — структурные элементы тонофибрилл, представляющие собой тончайшие белковые нити.

ТО́НУС (лат. tonus, от греч. tonos натяжение, напряжение) — длительно поддерживаемый уровень активности организма в целом, его отдельных систем и органов.

ТО́НУС АРТЕРИА́ЛЬНЫЙ — сосудистый тонус артерий, обусловленный сокращением гладкомышечных элементов и натяжением эластических соединительнотканных структур стенок сосудов.

ТО́НУС АФФЕКТИ́ВНЫЙ — свойственный индивидууму уровень эмоциональности в целом (преобладающий характер эмоций и аффективных реакций, степень их изменчивости).

ТО́НУС ВЕНО́ЗНЫЙ — сосудистый тонус вен, обусловленный сокращением гладкомышечных элементов их стенок.

ТО́НУС ВИТА́ЛЬНЫЙ — сочетанное выражение темпа и силы психической деятельности индивидуума.

ТО́НУС МЫ́ШЕЧНЫЙ — длительно сохраняющееся состояние упругости мышцы.

ТО́НУС МЫШЦ СО́БСТВЕННЫЙ — мышечный тонус, обусловленный происходящими в мышцах метаболическими процессами (напр., образованием молочной кислоты).

ТО́НУС НЕ́РВНО-МЫ́ШЕЧНЫЙ — мышечный тонус, обусловленный активирующим влиянием нервной системы на мышечную ткань.

ТО́НУС СОСУ́ДИСТЫЙ — постоянное напряжение стенок кровеносных сосудов, противодействующее их растяжению под воздействием давления крови.

ТОП- (топо-; греч. topos место, положение) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к определенному месту, положению, локализации».

ТОПАЛГИ́Я (topalgia; *топ-* + греч. algos боль) — боль в строго ограниченном участке кожи, не сопровождающаяся какими-либо признаками органического поражения нервной системы; наблюдается чаще при истерии.

ТОПЕСТЕЗИ́Я (topaesthesia; *топ-* + греч. aisthēsis чувство, ощущение) — см. *Чувство локализации.*

ТОПИСТИ́ЧЕСКОЕ ЕДИ́НСТВО (истор.; греч. topizō сосредоточивать, локализовать) — совокупность нервных образований, обладающих общими функциями, особенностями обмена веществ и избирательной наклонностью к определенным заболеваниям (патоклизу).

ТОПО- — см. *Топ-.*

ТОПО́ГРАФО - АНАТОМИ́ЧЕСКАЯ КА́РТА — изображение сечения тела больного с учетом выявленных патологических изменений и индивидуальных анатомических особенностей; используется для планирования облучения при лучевой терапии.

ТОПОМЕТРИ́Я КЛИНИ́ЧЕСКАЯ (*топо-* + греч. metreō измерять, определять) — раздел диагностики, посвященный методам измерения и масштабного графического отображения индивидуальных топографо-анатомических соотношений, в т. ч. с учетом патологических изменений органов и тканей.

ТОПОСКО́П (*топо-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — прибор для многоточечной регистрации пространственного распределения биоэлектрической активности головного мозга, имеющий число усилителей, равное числу точек отведения биопотенциалов.

ТОПОФОБИ́Я (topophobia; *топо-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь определенного места или помещения.

ТОПРОВЕ́РА ГАСТРОСТОМИ́Я (Г. С. Топровер, 1894—1966, сов. хирург) — гастростомия, при к-рой переднюю стенку желудка выводят в рану в виде конуса, на него накладывают несколько кисетных швов и затягивают их вокруг резиновой трубки, введенной в желудок через вскрытую верхушку конуса, затем края раны желудка подшивают к коже, а трубку извлекают.

ТОПЧИБА́ШЕВА ЛАПАРОТОМИ́Я (М. А. Топчибашев, 1895—1981, сов. хирург) — лапаротомия, производимая через разрез брюшной стенки, идущий выше пупка от наружного края правой прямой мышцы живота к седьмому межреберью справа; применяется при резекции печени.

ТОПЭКТОМИ́Я (topectomia; *топ-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление определенной цитоархитектонической зоны коры полушарий большого мозга.

ТОРАК- (торако-; греч. thōrax, thōrakos грудь, грудная клетка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к груди, к грудной клетке».

ТОРАКАЛГИ́Я (thoracalgia; *торак-* + греч. algos боль) — см. *Торакодиния.*

ТОРАКО- — см. *Торак-.*

ТОРАКОАБДОМИНА́ЛЬНЫЙ (*торако-* + лат. abdomen живот) — относящийся одновременно к грудной и брюшной полости.

ТОРАКОГАСТРОСХИЗИС (*торако-* + греч. gastēr, gastros живот + schisis расщепление, расщелина) — аномалия развития: незаращение передних отделов грудной и брюшной стенки.

ТОРА́КОГРАФ (*торако-* + греч. graphō писать, изображать) — прибор для графической регистрации контура грудной клетки в горизонтальной плоскости и его изменений при дыхании.

ТОРАКОДИНИ́Я (thoracodynia; *торак-* + греч. odynē боль; син. торакалгия) — боль в грудной клетке.

ТОРАКОКА́УСТИКА (thoracocaustica; *торако-* + греч. kaustikos жгучий) — хирургическая операция: прижигание плевральных спаек.

ТОРАКОЛАПАРОТОМИ́Я (thoracolaparotomia; *торако-* + *лапаротомия*; син. лапаротомия торакоабдоминальная) — оперативный доступ, заключающийся во вскрытии грудной и брюшной полостей одним разрезом; применяется при хирургических операциях в труднодоступных областях нижней части грудной и верхней части брюшной полости.

ТОРАКОМЕ́ТР (*торако-* + греч. metreō измерять) — прибор для измерения окружности и диаметра грудной клетки.

ТОРАКОПА́Г (thoracopagus; *торако-* + греч. pagos прикрепленный) — близнецы, сращенные в области грудной клетки.

ТОРАКОПЛА́СТИКА (thoracoplastica; *торако-* + *пластика*) — хирургическая операция: удаление или резекция ребер в определенном участке грудной стенки с целью создания условий для спадения пораженных отделов легкого.

Т. ПО БО́ГУШУ — см. *Богуша торакопластика.*

Т. ВЕ́РХНЯЯ (t. superior) — Т., выполняемая на верхних ребрах, включая I ребро.

Т. ПО ВИ́ЛЬМСУ — см. *Вильмса торакопластика.*

Т. ПО ГА́РМСЕНУ — см. *Гармсена торакопластика.*

Т. ПО ГИ́ЛЬМАНУ — см. *Гильмана торакопластика.*

Т. ПО ГРА́ФУ — см. *Графа торакопластика.*

Т. ИНТРАПЛЕВРА́ЛЬНАЯ (t. intrapleuralis) — Т., при к-рой вскрывают плевральную полость и кроме ребер иссекают участок париетальной плевры.

Т. ЛЕ́СТНИЧНАЯ — см. *Линберга торакопластика.*

Т. ПО ЛИ́НБЕРГУ — см. *Линберга торакопластика.*

Т. ПО МОНА́ЛЬДИ — см. *Мональди торакопластика.*

Т. ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНАЯ (t. extrapleuralis) — Т., при к-рой не производят вскрытия плевральной полости.

Т. ПО ЭСТЛА́НДЕРУ — см. *Эстландера торакопластика.*

Т. ЭТА́ПНАЯ — см. *Богуша торакопластика.*

ТОРАКОСКО́П (*торако-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — медицинский эндоскоп для осмотра плевральной полости, а также для осуществления торакокаустики под визуальным контролем; вводится путем прокола грудной стенки.

ТОРАКОСКОПИ́Я (thoracoscopia; *торако-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать; син. плевроскопия) — эндоскопическое исследование плевральной полости с помощью торакоскопа, вводимого через канюлю троакара после наложения искусственного пневмоторакса.

ТОРАКОТОМИ́Я (thoracotomia; *торако-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие плевральной полости через грудную стенку.

Т. МЕЖРЁБЕРНАЯ (t. intercostalis) — Т., осуществляемая разрезом, проведенным по межреберью без пересечения или резекции ребер.

ТОРАКОФРЕНОЛАПАРОТОМИ́Я (thoracophrenolaparotomia; *торакола паротомия* + греч. phrēn диафрагма) — тораколапаротомия, производимая с рассечением диафрагмы.

ТОРАКОЦЕНТЕ́З (thoracocentesis; *торако-* + греч. kentēsis прокол) — см. *Плевроцентез.*

ТО́РЕКА — ГЕ́РЦЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (F. J. A. Torek, 1861—1938, амер. хирург; П. А. Герцен, 1871—1947, сов. хирург) — двухэтапная хирургическая операция при крипторхизме, на I этапе к-рой яичко низводят в мошонку и через разрез в области дна мошонки фиксируют к широкой фасции бедра с одновременным подшиванием краев разреза мошонки к краям разреза на бедре, а на II этапе (через 6—12 месяцев) отделяют мошонку от бедра, а яичко от фасции.

ТО́РИЙ (Thorium; Th) — радиоактивный химический элемент III группы периодической системы Д. И. Менделеева; ат. номер 90, ат. вес (масса) 232,038; относится к актиноидам.

ТО́РКИЛЬДСЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (A. Torkildsen, совр. норвежский нейрохирург) — хирургическая операция: наложение анастомоза между желудочком головного мозга и мозжечково-мозговой цистерной; применяется для лечения гидроцефалии и при окклюзирующих процессах в задней черепной ямке.

ТОРМОЖЕ́НИЕ — активный нервный процесс, результатом которого является ослабление или подавление процесса возбуждения.

Т. ВНЕ́ШНЕЕ — Т. условного рефлекса, возникающее под влиянием внешних (посторонних для данного условного рефлекса) раздражителей.

Т. ВНУ́ТРЕННЕЕ — Т. условного рефлекса, возникающее и развивающееся в пределах его дуги.

Т. ВОЗВРА́ТНОЕ — Т. мотонейронов спинного мозга, осуществляемое по принципу отрицательной обратной связи через аксоны мотонейрона, образующие возвратную коллатераль, заканчивающуюся на тормозных нейронах — клетках Реншо.

Т. ЗАПРЕДЕ́ЛЬНОЕ (син. Т. охранительное) — Т. условного рефлекса, возникающее в результате чрезмерного увеличения силы условного раздражителя; препятствует истощению нейронов под воздействием сверхсильного раздражения.

Т. ЗАСТО́ЙНОЕ — стойкое Т. условных рефлексов, обусловленное перенапряжением силы или подвижности основных нервных процессов.

Т. ИНДУКЦИО́ННОЕ — Т. условного рефлекса, осуществляемое на основе механизма отрицательной индукции, возникающее в окрестности возбужденной группы корковых нейронов или в той же группе сразу по прекращении возбуждения.

Т. ЛАТЕРА́ЛЬНОЕ — Т. нейронов (или рецепторов), расположенных по соседству с возбужденными нейронами проекционных областей коры полушарий большого мозга (или с группой рецепторов); Т. л. лежит в основе индукционного Т.

Т. ОХРАНИ́ТЕЛЬНОЕ — см. *Торможение запредельное.*

Т. ПЕССИМА́ЛЬНОЕ — см. *Пессимум.*

Т. ПОСТСИНАПТИ́ЧЕСКОЕ — Т., обусловленное гиперполяризацией постсинаптической мембраны.

Т. ПРЕСИНАПТИ́ЧЕСКОЕ — Т., развивающееся в пресинаптическом элементе в связи с деполяризацией его мембраны в результате воздействия со стороны подходящего к нему аксона другого нейрона.

Т. СИНАПТИ́ЧЕСКОЕ — общее название пре- и постсинаптического Т.

ТОРМОЖЕ́НИЕ КОНТА́КТНОЕ — прекращение движения однотипных клеток в культурах по направлению друг к другу после их соприкосновения.

ТОРМОЗНА́Я ФА́ЗА в физиологии — состояние измененной возбудимости ц. н. с., при к-ром условные сигналы не вызывают рефлекса или вызывают чрезвычайно слабую реакцию.

ТО́РНА ПРО́БА (G. W. Thorn, род. в 1906 г., амер. врач) — см. *Проба с АКТГ.*

ТО́РНВАЛЬДТА БОЛЕ́ЗНЬ (G. L. Tornwaldt, 1843—1910, нем. врач) — воспаление лакуны глоточной миндалины с образованием кист, наполненных гноем.

ТО́РНТОНА ЭХИНОКОККЭКТОМИ́Я (J. K. Thornton, 1845—1904, шотл. хирург) — см. *Эхинококкэктомия закрытая.*

ТО́РНТОНА — БОБРО́ВА — ПОСА́ДАСА ЭХИНОКОККЭКТОМИ́Я (J. K. Thornton, 1845—1904, шотл. хирург; А. А. Бобров, 1850—1904, отеч. хирург; Posadas) — см. *Эхинококкэктомия закрытая.*

ТРНХЁЯ ОПЕРА́ЦИЯ (P. Taarnhøj, датский нейрохирург 20 в.; син.: Таарнхо операция, Тарнхоя операция) — хирургическая операция при невралгии тройничного нерва, заключающаяся в рассечении твердой мозговой оболочки над чувствительным корешком и ганглием тройничного нерва (гассеровым узлом).

ТОРО́Н (син. эманация тория) — инертный радиоактивный газ, являющийся изотопом радона с ат. весом (массой) 220; дочерние продукты распада Т. используют с лечебной целью.

ТОРПИ́ДНАЯ ФА́ЗА ШО́КА (лат. torpidus оцепеневший, бесчувственный) — фаза травматического шока, следующая за эректильной и характеризующаяся развитым торможением ц. н. с., ослаблением функций сердечно-сосудистой системы, развитием дыхательной недостаточности и гипоксии; проявляется общей заторможенностью, адинамией, снижением болевой чувствительности, поверхностным и редким дыханием, снижением артериального давления, уменьшением минутного объема и массы циркулирующей крови.

ТОРПИ́ДНЫЙ (лат. torpidus оцепеневший, бесчувственный) — вялый, неактивный (о течении болезни).

ТОРС (итал. torso) — см. *Туловище.*

ТОРСИОНО́МЕТР (лат. torsio, torsionis вращение, скручивание + греч. metreō измерять) — прибор для измерения угла поворота позвоночника по его вертикальной оси.

ТО́РСИЯ позвонков (torsio; лат. «вращение, скручивание») — поворот позвонков вокруг вертикальной оси позвоночника при сколиозе, сопровождающийся нарушением симметрии ножек дуг позвонков и клиновидной деформацией их тел.

ТОРТОАНОМА́ЛИЯ (лат. torqueo, tortum поворачивать + *аномалия*) — аномалия развития: зуб повернут вокруг своей продольной оси.

TORTUOSITAS VASORUM RETINAE (лат. «извитость сосудов сетчатки») — аномалия развития: чрезмерная извитость центральных сосудов сетчатки.

ТОРУЛЁЗ (torulosis, лат. torulus уменьшительное от torus возвышение, выпуклость, вздутие + *-оз*) — см. *Криптококкоз.*

ТО́РУС НЁБНЫЙ (torus palatinus; лат. torus возвышение, выпуклость, вздутие) — утолщение небного шва обнаруживаемое у некоторых людей; при больших размерах затрудняет применение съемных зубных протезов.

ТО́РУС ПОДБОРО́ДОЧНО-ПОДЪЯЗЫ́ЧНЫЙ (torus geniohyoideus; лат. torus возвышение, выпуклость, вздутие) — костный выступ с язычной стороны подбородочной области нижней челюсти в месте прикрепления подбородочно-подъязычной и подбородочно-язычной мышц, обнаруживаемый у нек-рых людей; затрудняет протезирование при полной потере зубов.

ТОРФОЛЕЧЕ́БНИЦА — лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для проведения торфолечения.

ТОРФОЛЕЧЕ́НИЕ — метод теплолечения, заключающийся в воздействии на организм нагретым торфом.

ТО́РФЫ ЛЕЧЕ́БНЫЕ (син. грязи лечебные торфяные) — применяемые с лечебной целью растительные остатки, накапливающиеся в болотах в процессе отмирания высших растений и неполного их разложения при избыточном увлажнении и недостатке кислорода.

Т. ЛЕЧЕ́БНЫЕ КИ́СЛЫЕ — Т. л., характеризующиеся высокой кислотностью (pH < 3,0) и зольностью, большим количеством (до 250 *г/л*) различных водорастворимых веществ, особенно сульфатов железа и алюминия, а также свободной серной кислоты.

Т. ЛЕЧЕ́БНЫЕ МИНЕРАЛИЗО́ВАННЫЕ — Т. л., минерализация жидкой части к-рых составляет более 2 *г/л.*

Т. ЛЕЧЕ́БНЫЕ ПРЕСНОВО́ДНЫЕ — Т. л., минерализация жидкой части к-рых составляет менее 2 *г/л.*

Т. ЛЕЧЕ́БНЫЕ СЕРОВОДОРО́ДНЫЕ — см. *Торфы лечебные сульфидные.*

Т. ЛЕЧЕ́БНЫЕ СУЛЬФИ́ДНЫЕ (син. Т. лечебные сероводородные) — Т. л., содержащие сероводород (до 0,005%) при минерализации жидкой части до 3 *г/л* и pH 7,0.

ТО́ТИ ОПЕРА́ЦИЯ (A. Toti, род. в 1861 г., итал. офтальмолог) — наружная дакриоцисториностомия, при к-рой выдалбливают костное отверстие у края слезного мешка с последующим удалением части мешка и участка слизистой оболочки носа.

ТОФИ́ЛО ШИ́НА (Тофило, сов. хирург) — транспортная шина для иммобилизации нижней конечности, отличающаяся от шины Дитерихса наличием задней планки, скрепленной шарнирами с боковыми планками, что устраняет возможность смещения отломков кости кзади.

ТО́ФУС (лат. tofus и греч. tōphus пористый камень, туф) — общее название очагов патологического уплотнения подкожной клетчатки.

ТО́ЧКА ДИАФРАГМА́ЛЬНОГО НЕ́РВА — см. *Гено де Мюсси точка.*

ТО́ЧКА ОКОСТЕНЕ́НИЯ (punctum ossificationis, LNH; син.: центр окостенения, ядро окостенения) — очаг образования костной ткани в мезенхимальной или хрящевой основе развивающейся кости.

ТО́ЧКА ФИКСА́ЦИИ — 1) в акушерстве — см. *Гипомохлион*; 2) в физиологии зрения — точка, на к-рой фиксирован взор пациента.

ТОШНОТА́ (nausea) — тягостное ощущение приближения рвоты, иногда с ощущением давления в надчревной области.

ТПСП — см. *Постсинаптический потенциал тормозный.*

ТРАБЕ́КУЛА (trabecula, LNH; лат. уменьшительное от trabs балка) — соединительнотканная перемычка, отходящая от капсулы органа; Т. (напр., в селезенке) разделяют паренхиму органа на доли.

ТРАБЕ́КУЛА КО́СТНАЯ — см. *Костная перекладина.*

ТРАБЕКУЛОТО́М А́ЛЛЕНА — БУРИА́НА (*трабекула* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Аллена — Буриана трабекулотом.*

ТРАБЕКУЛОТОМИ́Я (trabeculotomia; *трабекула* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение участка трабекулярной сети глаза; применяется для лечения глаукомы.

ТРАБЕКУЛЭКТОМИ́Я (trabeculectomia; *трабекула* + *эктомия*) — хирургическая операция: иссечение участка трабекулярной сети глаза; применяется для лечения глаукомы.

ТРАБЕКУЛЯ́РНАЯ СЕТЬ (spongium anguli iridocornealis, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *435.*

ТРАВЕРТИ́НЫ (итал. travertino известковый туф) — отложения карбоната кальция в стволах скважин источников углекислых минеральных вод и в трубопроводах бальнеотехнических сооружений.

ТРАВЕСТИ́ЗМ (франц. travestir переодевать) — см. *Трансвестизм.*

ТРА́ВМА (греч. trauma рана, телесное повреждение; син. повреждение) — нарушение целости и функций тканей (органа) в результате внешнего воздействия.

Т. АКУСТИ́ЧЕСКАЯ (t. acusticum; син.: акутравма, Т. шумовая) — Т. органа слуха в результате воздействия звука чрезмерной силы или продолжительности; проявляется понижением функциональных возможностей слухового анализатора.

Т. БОЕВА́Я — см. *Поражение боевое.*

Т. БЫТОВА́Я — Т., полученная в бытовых условиях.

Т. ЗАКРЫ́ТАЯ (t. clausum) — механическая Т., не сопровождающаяся нарушением целости наружных покровов тела; к Т. з. относят сотрясения, ушибы, разрывы и сдавления внутренних органов, растяжение и разрыв связок, вывихи и закрытые переломы.

Т. ОТКРЫ́ТАЯ (t. apertum) — Т., при к-рой нарушена целость наружных покровов.

Т. ПРОИЗВО́ДСТВЕННАЯ — Т., полученная работающим на производстве и вызванная нарушением требований безопасности труда (по ГОСТ 12.0.002—74).

Т. РОДОВА́Я (t. obstetricium) — 1) Т. органов и тканей новорожденного, возникшая во время родов; 2) Т. родовых путей матери, возникшая во время родов.

Т. СОЧЕ́ТАННАЯ — одновременно возникшая Т. двух и более органов, принадлежащих к разным анатомо-функциональным системам.

Т. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВА́Я (t. craniocerebrale) — общее название открытых и закрытых Т. черепа и головного мозга.

Т. ШУМОВА́Я — см. *Травма акустическая.*

ТРА́ВМА ПСИХИ́ЧЕСКАЯ (trauma psychicum) — эмоциональное воздействие, вызвавшее психическое расстройство.

ТРАВМАТИ́ЗМ — распространенность травм среди населения и его отдельных групп; статистический показатель, отражающий распространенность травм; рассчитывают как число травм за год, приходящееся на 1000 населения или соответствующей группы населения.

Т. АВТОДОРО́ЖНЫЙ — Т., возникший в результате дорожно-транспортных происшествий; показатель Т. а. рассчитывается на 1000 населения.

Т. БЫТОВО́Й — Т., не связанный с производственной деятельностью, а возникший, напр., при выполнении домашней работы, при бытовых конфликтах; показатель Т. б. рассчитывается на 1000 населения.

Т. ДЕ́ТСКИЙ — Т. у детей в возрасте до 14 лет включительно; показатель Т. д. рассчитывается на 1000 детского населения.

Т. О́БЩИЙ — общее число травм среди населения (независимо от их причин и обстоятельств возникновения); показатель Т. о. рассчитывается на 1000 населения.

Т. ПРОИЗВО́ДСТВЕННЫЙ — Т., связанный с выполнением работающими их трудовых производственных обязанностей; в СССР к Т. п. относят также Т., по пути на работу и с работы, связанный с выполнением общественных обязанностей и поручений администрации, с совершением действий по спасению человеческой жизни, охране социалистического правопорядка и социалистической собственности; показатель Т. п. рассчитывается на 1000 работающих.

Т. СЕЛЬСКОХОЗЯ́ЙСТВЕННЫЙ — Т., связанный с выполнением сельскохозяйственных работ; показатель Т. с. рассчитывается на 1000 работающих.

Т. СПОРТИ́ВНЫЙ — Т., возникший в ходе занятий физической культурой и спортом; показатель Т. с. рассчитывается на 1000 населения.

ТРАВМАТИ́ЧЕСКОЕ СЖА́ТИЕ — см. *Токсикоз травматический.*

ТРАВМАТО́ЛОГ - ОРТОПЕ́Д — врач-специалист (хирург), получивший подготовку по вопросам диагностики, лечения и профилактики травм (механических повреждений и ожогов), болезней и деформаций опорно-двигательного аппарата.

ТРАВМАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПО́МОЩЬ — специализированная лечебно-профилактическая помощь лицам, получившим травму.

ТРАВМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ПУНКТ — подразделение городской поликлиники, предназначенное для круглосуточного оказания медицинской помощи лицам, получившим травму.

ТРАВМАТОЛО́ГИЯ (греч. trauma, traumatos рана, телесное повреждение, травма + греч. logos учение, наука) — область клинической медицины, изучающая патогенез механических повреждений опорно-двигательного аппарата и разрабатывающая методы их диагностики, лечения и профилактики.

ТРАВМАТОЛО́ГИЯ СУДЕ́БНАЯ — раздел судебной медицины, изучающий особенности механических повреждений, связанные со свойствами повреждающих предметов, прижизненностью, последовательностью и давностью повреждающего воздействия, разрабатывающий методы судебно-медицинской экспертизы механических повреждений; в т. ч. методы определения степени вреда, причиненного здоровью пострадавшего, и идентификации повреждающих предметов.

ТРА́ВНИК (истор.) — древнерусский лечебник, содержавший описания лекарственных трав и снадобий растительного происхождения, применявшихся в народной медицине, с указанием на болезни, при которых и в каком количестве их надлежит применять.

ТРА́ГИОН (tragion; анат. tragus козелок, от греч. tragos козел) — см. *Козелковая точка.*

ТРАКТОТОМИ́Я (tractotomia; лат. tractus тракт + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: пересечение проводящих путей в головном или спинном мозге с целью прекращения проведения патологических нервных импульсов при тяжелых болевых синдромах.

Т. БУЛЬБА́РНАЯ (t. bulbaris) — Т., производимая на уровне продолговатого мозга.

Т. МЕЗЭНЦЕФА́ЛЬНАЯ (t. mesencephalica) — Т., производимая на уровне среднего мозга.

Т. ТАЛАМОКОРТИКА́ЛЬНАЯ (t. thalamocorticalis) — Т., производимая между таламусом и корой большого мозга.

ТРАНЗИТИВИ́ЗМ (transitivismus; лат. transitus переход, перемещение) — убежденность больного в том, что какие-либо ощущения испытываются не только им, но и окружающими его людьми или же только другими лицами, к-рые и являются больными, в то время как сам больной здоров; проявление синдрома Кандинского — Клерамбо.

ТРАНЗИ́ЦИЯ ОСНОВА́НИЙ (лат. transitio переход) — мутация, при к-рой происходит замена одного пуринового основания на другое пуриновое или замена одного пиримидинового основания на другое пиримидиновое в цепи дезоксирибонуклеиновой кислоты.

ТРАНКВИЛИЗА́ТОРЫ (tranquilisantia; франц. tranquilliser, от лат. tranquillo успокаивать; син.: анксиолитики, антифобические седативные средства, атарактики, атарактические средства, транквилизаторы малые) — лекарственные средства, подавляющие патологические страхи, напряжение, беспокойство; применяются гл. обр. при невротических расстройствах (хлордиазеноксид, диазепам и др.).

Т. БОЛЬШИ́Е — см. *Нейролептические средства.*

Т. МА́ЛЫЕ — см. *Транквилизаторы.*

ТРАНС (франц. transe) — кратковременное (1—2 мин.) состояние амбулаторного автоматизма, при к-ром больной куда-то бежит, раздевается и совер-

шает другие импульсивные действия; наблюдается при эпилепсии.

ТРАНС- (лат. trans-) — приставка, означающая «движение, направленное через, сквозь что-либо», «нахождение за пределами чего-либо».

ТРАНСАМИНА́ЗЫ — см. *Аминотрансферазы.*

ТРАНСАМИНИ́РОВАНИЕ — см. *Переаминирование.*

ТРАНСАЦЕТИЛА́ЗЫ — см. *Ацетилтрансферазы.*

ТРАНСВЕРЗИ́Т (transversitis; анат. colon transversum поперечная ободочная кишка + *-ит*) — форма сегментарного колита, характеризующаяся локализацией процесса в поперечной ободочной кишке.

ТРАНСВЕРЗОСИГМОСТОМИ́Я (transversosigmostomia; анат. colon transversum поперечная ободочная кишка + colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между поперечной ободочной и сигмовидной кишкой.

ТРАНСВЕРЗОСТОМИ́Я (transversostomia; анат. colon transversum поперечная ободочная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: создание наружного свища поперечной ободочной кишки.

ТРАНСВЕ́РСИЯ ОСНОВА́НИЙ (лат. transverto обращать, превращать) — мутация, при к-рой происходит замена одного пуринового основания на пиримидиновое или замена одного пиримидинового основания на пуриновое в цепи дезоксирибонуклеиновой кислоты.

ТРАНСВЕСТИ́ЗМ (transvestismus; *транс-* + лат. vestio одевать; син.: травестизм, эонизм) — половое извращение, при к-ром половое возбуждение и удовлетворение достигаются при переодевании в одежду противоположного пола.

ТРАНСГАСТРА́ЛЬНОЕ РАСШИРЕ́НИЕ КАРДИ́И (*транс-* + греч. gastēr желудок, живот) — см. *Микулича ретроградное расширение кардии.*

ТРАНСГЕНА́ЦИЯ — см. *Мутация генная.*

ТРАНСГЕТЕРОГЕНО́ТА — сингенота, у которой доминантные аллели двух или нескольких локусов расположены частично в эндогеноте, частично в экзогеноте.

ТРАНСГЕТЕРОЗИГО́ТА — гетерозигота по двум локусам, у которой рецессивные аллели локализованы в различных хромосомах.

ТРАНСГЛУТАМИНАЗА (нрк) — см. *Фактор XIII.*

ТРАНСГРЕ́ССИЯ (лат. transgressio переход) в генетике — появление среди потомства второго и последующих поколений таких особей, у к-рых один или несколько признаков выражены сильнее, чем у родителей.

ТРАНСДУ́КЦИЯ (лат. transductio перенос, перемещение; *транс-* + ducto водить, вести) — перенос бактериофагом генетического материала (участка дезоксирибонуклеиновой кислоты) от одной бактерии (донора) к другой (реципиенту); приводит к изменению генотипа бактерии реципиента.

Т. АБОРТИ́ВНАЯ — Т., при к-рой перенесенный материал передается только одной из двух дочерних клеток.

Т. ЛОКАЛИЗО́ВАННАЯ — см. *Трансдукция специфическая.*

Т. НЕСПЕЦИФИ́ЧЕСКАЯ (син. Т. общая) — Т., при к-рой возможен перенос любого небольшого участка дезоксирибонуклеиновой кислоты бактерии.

Т. О́БЩАЯ — см. *Трансдукция неспецифическая.*

Т. СПЕЦИФИ́ЧЕСКАЯ (син. Т. локализованная) — Т., при к-рой переносится строго определенный участок дезоксирибонуклеиновой кислоты бактерии.

ТРАНСИЛЛЮМИНА́ЦИЯ (transilluminatio; *транс-* + лат. illuminatio освещение) — метод выявления инородного тела глазного яблока по его тени на поверхности склеры; тень обнаруживается при освещении глаза через зрачок (напр., с помощью офтальмоскопа) в затемненном помещении.

ТРАНСКАПСИДА́ЦИЯ (*транс-* + *капсид*) — включение генома одного вируса в капсид, белки к-рого кодируются другим вирусом; описан при взаимодействии аденовирусов и обезьяньего вакуолизирующего вируса (ОВ-40).

ТРАНС-КОНФИГУРА́ЦИЯ (*транс-* + лат. configuratio взаимное расположение) в молекулярной генетике — см. *Транс-положение.*

ТРАНСКОРТИ́Н — см. *Глобулин кортикостероидсвязывающий.*

ТРАНСКРИПТА́ЗА ОБРА́ТНАЯ (син. ревертаза) — фермент, катализирующий обратную транскрипцию рибонуклеиновой кислоты вирусов (в т. ч. опухолевых) в участки дезоксирибонуклеиновой кислоты (гены).

ТРАНСКРИ́ПЦИЯ (лат. transcriptio переписывание; син. действие гена первичное) в биологии — первый этап реализации генетической информации в клетке, в процессе к-рого происходит биосинтез молекул информационной рибонуклеиновой кислоты на матрице дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Т. ОБРА́ТНАЯ — биосинтез дезоксирибонуклеиновой кислоты на информационной рибонуклеиновой кислоте; протекает при участии фермента (обратной транскриптазы).

ТРАНСЛОКА́ЦИЯ в генетике — структурные изменения хромосом, возникающие в результате перемещения генетического материала.

Т. ВНУ́ТРЕННЯЯ — Т. в пределах одной хромосомы.

Т. ДИЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ — Т., приводящая к образованию дицентрической хромосомы.

Т. НЕСБАЛАНСИ́РОВАННАЯ — Т., приводящая к изменению количества генетического материала.

Т. РЕЦИПРО́КНАЯ — Т., при к-рой происходит взаимный обмен сегментами между хромосомами.

Т. СБАЛАНСИ́РОВАННАЯ — Т., при к-рой после ближайшего мейоза и оплодотворения количество генетического материала не изменяется.

ТРАНСЛЯ́ЦИЯ (лат. translatio перенос, передача) в биологии — второй этап реализации генетической информации в клетке, в процессе к-рого синтезируется белок; последовательность аминокислот белка определяется последовательностью нуклеотидов в информационной рибонуклеиновой кислоте, на к-рой идет синтез.

ТРАНСМЕМБРА́ННЫЙ ПОТЕНЦИА́Л (*транс-* + *мембрана*) — см. *Мембранный потенциал.*

ТРАНСМЕТИЛИ́РОВАНИЕ (син. переметилирование) — ферментативная реакция переноса метильных групп с одних органических веществ на другие; этап биосинтеза биологически активных веществ, напр. креатина, холина, адреналина.

ТРАНСМУТА́ЦИЯ (*транс-* + *мутация*) — см. *Конверсия генов.*

ТРАНСОВАРИА́ЛЬНАЯ ПЕРЕДА́ЧА (*транс-* + анат. ovarium яичник) — передача возбудителя инфекционной или паразитарной болезни потомству посредством его внедрения в яйцеклетку.

ТРАНСПИЛОРИ́ЧЕСКАЯ ПЛО́СКОСТЬ (planum transpyloricum; *транс-* + анат. pylorus привратник) — см. *Чреспривратниковая плоскость.*

ТРАНСПЛАНТА́Т (transplantatum; лат. transplanto пересаживать) — участок ткани или орган, используемый для трансплантации.

Т. АЛЛОВИТА́ЛЬНЫЙ (греч. allos другой, иной + лат. vita жизнь; син. Т. гомовитальный — устар.) — прижившийся и сохранивший жизнеспособность аллотрансплантат.

Т. АЛЛОСТАТИ́ЧЕСКИЙ (греч. allos другой, иной + греч. statos стоящий, установленный; син. Т. гомостатический — устар.) — аллотрансплантат, служащий каркасом для прорастания новой ткани реципиента, напр. костный трансплантат.

Т. БУЛЬО́ННЫЙ (син. гвоздь бульонный) — вываренный в воде костный ксенотрансплантат, обычно в форме штифта, иногда пластинки, применяемый при костно-пластических операциях для временного остеосинтеза.

Т. ГЕТЕРОТОПИ́ЧЕСКИЙ (греч. heteros другой, иной, необычный + topos место) — Т., пересаженный на место, не свойственное для данной ткани, напр. хрящ или мышца, пересаженные в костную полость.

Т. ГОМОВИТА́ЛЬНЫЙ (устар.; греч. homos один и тот же, тот же самый + лат. vita жизнь) — см. *Трансплантат алловитальный.*

Т. ГОМОСТАТИ́ЧЕСКИЙ (устар.; греч. homos один и тот же, тот же самый + statos стоящий, установленный) — см. *Трансплантат аллостатический.*

Т. ОРТОТОПИ́ЧЕСКИЙ (греч. orthos прямой, правильный + topos место) — Т., пересаженный на обычное для данной ткани или органа место, напр. почка, пересаженная на место удаленной почки.

ТРАНСПЛАНТАЦИО́ННЫЙ ТЕСТ — определение прививаемости опухоли на животных, предварительно иммунизированных клетками известной опухоли или онкогенным вирусом; снижение прививаемости (увеличение минимальной дозы клеток, вызывающей опухоль) свидетельствует об антигенном родстве прививаемой опухоли с использованной для вакцинации, или о наличии в опухоли вирусиндуцированных антигенов.

ТРАНСПЛАНТА́ЦИЯ (transplantatio; лат. «пересадка» от transplanto пересаживать; син. пересадка) — замещение тканей или органов, отсутствующих или поврежденных патологическим процессом, собственными тканями или органами либо взятыми из другого организма.

Т. ГЕТЕРОТОПИ́ЧЕСКАЯ (t. heterotopica; греч. heteros другой, иной, необычный + topos место) — Т., при к-рой орган или ткань помещают на несвойственное им место.

Т. ОРТОТОПИ́ЧЕСКАЯ (t. orthotopica; греч. orthos прямой, правильный + topos место) — Т., при к-рой орган или ткань помещают на место такого же отсутствующего или удаленного органа (ткани).

ТРАНСПЛАНТА́ЦИЯ О́ПУХОЛИ (transplantatio tumoris; син.: пассирование, перевивка опухоли) — парентеральное введение опухолевых клеток животному с целью вызвать у него развитие опухоли.

Т. О́ПУХОЛИ АЛЛОГЕ́ННАЯ (t. tumoris allogena; греч. allos другой, иной + genos род; син. Т. опухоли гомологическая) — Т. о. животному от животного того же вида.

Т. О́ПУХОЛИ АУТОГЕ́ННАЯ (t. tumoris autogena; греч. autos сам + genos род; син. Т. опухоли аутологическая) — Т. о. тому же животному, у к-рого она удалена.

Т. О́ПУХОЛИ АУТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (t. tumoris autologica; греч. autos сам + logos соотношение) — см. *Трансплантация опухоли аутогенная.*

Т. О́ПУХОЛИ ГЕТЕРОГЕ́ННАЯ (t. tumoris heterogena; греч. heteros другой, иной, разный + genos род; син.: Т. опухоли гетерологическая, гетеротрансплантация опухоли) — Т. о. животному от животного другого вида.

Т. О́ПУХОЛИ ГЕТЕРОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (t. tumoris heterologica; греч. heteros другой, иной + logos соотношение) — см. *Трансплантация опухоли гетерогенная.*

Т. О́ПУХОЛИ ГОМОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (t. tumoris homologica; греч. homologos согласующийся, соответствующий) — см. *Трансплантация опухоли аллогенная.*

Т. О́ПУХОЛИ ИЗОГЕ́ННАЯ (t. tumoris isogena; греч. isos одинаковый + genos род) — см. *Трансплантация опухоли сингенная.*

Т. О́ПУХОЛИ ИЗОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (t. tumoris isologica; греч. isos одинаковый + logos соотношение) — см. *Трансплантация опухоли сингенная.*

Т. О́ПУХОЛИ КСЕНОГЕ́ННАЯ (t. tumoris xenogena; греч. xenos чужой + genos род) — Т. о. животному от животного другого отряда.

Т. О́ПУХОЛИ СИНГЕ́ННАЯ (греч. syngenēs врожденный; син.: Т. опухоли изогенная, Т. опухоли изологическая) — Т. о. животному от животного, обладающего теми же антигенами тканевой совместимости.

ТРАНСПЛАНТОЛО́ГИЯ (transplantologia; *трансплантация* + греч. logos учение, наука) — отрасль биологии и медицины, изучающая проблемы трансплантации, разрабатывающая методы консервирования органов и тканей, создания и применения искусственных органов.

Т. КЛИНИ́ЧЕСКАЯ — раздел Т., посвященный применению трансплантации органов и тканей при лечении болезней человека.

ТРАНСПЛАЦЕНТА́РНАЯ ПЕРЕДА́ЧА ИНФЕ́КЦИИ (*транс-* + *плацента*) — заражение плода, обусловленное проникновением возбудителя инфекции через плаценту.

ТРАНСПОЗИ́ЦИЯ АРТЕРИА́ЛЬНОГО СТВОЛА́ (лат. transpositio перемещение; *транс-* + pono, positum ставить, размещать) — см. *Транспозиция магистральных сосудов.*

ТРАНСПОЗИ́ЦИЯ МАГИСТРА́ЛЬНЫХ СОСУ́ДОВ (син. транспозиция артериального ствола) — аномалия развития: отхождение аорты от правого желудочка сердца, а легочной артерии — от левого.

ТРАНСПОЗИ́ЦИЯ О́РГАНОВ — см. *Situs viscerum inversus.*

ТРАНСПОЗО́Н — участок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, содержащий гены, контролирующие устойчивость бактерии к антибиотикам и другим лекарственным средствам и способный к перемещению из одной молекулы в другую.

ТРАНС-ПОЛОЖЕ́НИЕ (син. трансконфигурация) в генетике — расположение тесно сцепленных доминантного и рецессивного генов в одной хромосоме, а соответствующих им рецессивного и доминантного аллелей в другой хромосоме гомологичной пары.

ТРАНСПОРТА́БЕЛЬНОСТЬ ПОРАЖЁННОГО (БОЛЬНО́ГО) — состояние пораженного (больного), допускающее его эвакуацию данным видом транспорта без риска возникновения осложнений, опасных для жизни.

ТРАНСПОРТИРО́ВКА ПОРАЖЁННЫХ (БОЛЬНЫ́Х) — переноска и перевозка пораженных (больных) к месту оказания им медицинской помощи и лечения или из одного лечебного учреждения в другое.

ТРАНСРЕПЛИКА́ЦИЯ (*транс-* + *репликация*) — см. *Конверсия генов.*

ТРАНССЕКСУАЛИ́ЗМ (transsexualismus; *транс-* + лат. sexus пол) — убежденность больного в том, что имеющиеся у него половые признаки якобы не соответствуют его полу; сопровождается стремлением изменить половые органы путем хирургической операции или скрыть свою половую принадлежность имитацией поведения лица противоположного пола.

ТРАНССУДА́Т (transsudatum; *транс-* + лат. sudo, sudatum потеть, сочиться; син. отечная жидкость) — бедная белками жидкость, скапливающаяся в тканевых щелях и полостях тела при отеках.

ТРАНССУДА́ЦИЯ (transsudatio; *транс-* + лат. sudo, sudatum потеть, сочиться) — выход жидкой части крови из капилляров и венул в тканевые щели или полости тела.

ТРАНСФА́ЗОВАЯ ПЕРЕДА́ЧА — продолжение обитания паразита в организме хозяина при последовательной смене стадий (фаз) развития последнего; характерна, напр., для паразитов у членистоногих.

ТРАНСФЕ́КЦИЯ [*транс* + (*ин*)*фекция*] — воспроизведение вируса в клетке, инфицированной изолированной вирусной нуклеиновой кислотой.

ТРАНСФЕ́Р (франц. transfert, от лат. transfero переносить, перемещать) — применяемый в психоанализе метод, при к-ром добиваются переноса больным на врача бессознательных дружеских, враждебных и других чувств, а также ситуаций, возникавших в детстве при контактах с родителями или близкими людьми.

ТРАНСФЕРА́ЗЫ — класс ферментов, катализирующих реакции переноса каких-либо химических групп от одного соединения к другому; посредством Т. в живых клетках осуществляются процессы фосфорилирования биосинтеза белков, нуклеиновых кислот и др.

ТРАНСФЕРРИ́Н (transferrinum; *транс-* + лат. ferrum железо; син. сидерофилин) — белок, относящийся к β-глобулинам плазмы, транспортирующий железо в организме.

ТРАНСФИКСИ́Я (transfixio; лат. transfigo, transfixum прокалывать, от *транс-* + figo колоть) — хирургическая операция: прокалывание роговицы и радужки при лечении вторичной глаукомы.

ТРАНСФОРМА́ЦИЯ (лат. transformatio превращение; *транс-* + formatio образование) — 1) клеток — преобразование клеток в процессе дифференцировки, метаплазии или опухолевого роста; 2) бактерий — включение в хромосому или плазмиду бактерии (реципиента) фрагмента дезоксирибонуклеиновой кислоты другой бактерии (донора) в результате переноса ее изолированной дезоксирибонуклеиновой кислоты.

ТРАНСФОСФОРИЛИ́РОВАНИЕ — см. *Перефосфорилирование.*

ТРАНСФУЗИОЛО́ГИЯ [*трансфузия* (*крови*) + греч. logos учение, наука] — раздел клинической медицины, изучающий вопросы переливания человеку крови и ее препаратов, а также кровезамещающих и плазмозамещающих жидкостей.

ТРАНСФУЗИО́ННАЯ РЕА́КЦИЯ — преходящее состояние организма, к-рое может возникать при внутривенном вливании жидкостей; характеризуется общим недомоганием, ознобом и повышением температуры тела.

ТРАНСФУ́ЗИЯ КРО́ВИ (transfusio sanguinis; лат. transfusio переливание, от *транс-* + fundo, fusum лить) — см. *Переливание крови.*

ТРАНСЦЕ́ССИЯ (*транс-* + лат. cedo, cessum идти, перемещаться) — проявление бактериальных генов при их попадании в растительные и животные организмы и культуры тканей.

ТРА́НТАСА ОПЕРА́ЦИЯ (A. Trantas, род. в 1867 г., греческий офтальмолог) — хирургическая операция: фиксация кожи нижнего века к нижнему краю глазницы; применяется для устранения спастического заворота века.

ТРАПЕЦИЕВИ́ДНОЕ ТЕ́ЛО (corpus trapezoideum, PNA, BNA; corpus trapezoides, JNA) — плоский пучок поперечно идущих волокон слухового пути, расположенный на границе верхней и нижней частей моста мозга (варолиева моста).

ТРАПЕ́ЦИЯ (os trapezium, PNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *139.*

ТРАССИРО́ВКА ПЛОЩА́ДКИ этапа медицинской эвакуации — определение и обозначение рационального расположения функциональных подразделений этапа медицинской эвакуации на избранном для его развертывания участке местности.

ТРА́УБЕ ДВОЙНО́Й ТОН (L. Traube, 1818—1876, нем. терапевт; син. Траубе симптом) — аускультативный феномен: удвоенный тон, выслушиваемый при сдавлении крупной артерии; признак недостаточности клапана аорты, обусловленный регургитацией крови в левый желудочек сердца в период диастолы.

ТРА́УБЕ ПРОСТРА́НСТВО (L. Traube, 1818—1876, нем. терапевт; син. полулунное пространство) — участок левой подреберной области, дающий при перкуссии тимпанический звук; ограничен справа печенью, слева селезенкой, снизу и медиально краем реберной дуги, сверху краем легкого, сзади дном желудка и ободочной кишкой.

ТРА́УБЕ СИМПТО́М (L. Traube, 1818—1876, нем. терапевт) — см. *Траубе двойной тон.*

ТРА́УБЕ ТЕО́РИЯ НАРКО́ЗА (J. Traube) — см. *Адсорбционная теория наркоза.*

ТРА́УБЕ — ГЕ́РИНГА ВО́ЛНЫ (L. Traube, 1818—1876, нем. терапевт; K. E. K. Hering, 1834—1918, нем. физиолог) — медленные колебания артериального давления, синхронные с редкими дыхательными движениями; наблюдаются при гипоксии ц. н. с.

ТРА́УТМАННА ТРЕУГО́ЛЬНИК (M. F. Trautmann, 1833—1902, нем. оториноларинголог) — область черепа, ограниченная сзади сигмовидным синусом, спереди — задним полукружным каналом, сверху — верхним краем каменистой части височной кости; служит ориентиром при нек-рых операциях на лабиринте, реже — на мозжечке.

ТРАХЕА́ЛЬНЫЙ (trachealis; анат. trachea трахея) — относящийся к трахее.

ТРАХЕИ́Т (tracheitis; *трахея* + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки трахеи.

ТРАХЕ́ЙНАЯ ШПО́РА (carina tracheae, PNA) — выступ стенки трахеи, вдающийся в ее просвет в месте бифуркации и разделяющий начало правого и левого главных бронхов.

ТРАХЕЛО- (греч. trachēlos шея, шейка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к шейке матки».

ТРАХЕЛОРАФИ́Я (trachelorrhaphia; *трахело-* + греч. rhaphē шов) — пластическая операция: восстановление формы шейки матки после ее разрыва.

ТРАХЕЛОТОМИ́Я (истор.; trachelotomia; *трахело-* + греч. tomē разрез, рассечение; син. дисцизия шейки матки) — хирургическая операция: рассечение шейки матки.

ТРАХЕОБРОНХИ́Т (tracheobronchitis; *трахея* + *бронхи* + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки трахеи и бронхов.

ТРАХЕОБРОНХОМАЛЯ́ЦИЯ (tracheobronchomalacia; *трахея* + *бронхи* + *малякия*; син. маляция трахеобронхопатическая) — диффузное или очаговое размягчение хрящей трахеи и бронхов; возникает при нек-рых врожденных болезнях, а также в результате сдавления опухолью, аномально расположенным кровеносным сосудом и др.

ТРАХЕОБРОНХОМЕГАЛИ́Я (tracheobronchomegalia; *трахея* + *бронхи* + греч. megas, megalu большой; син. Мунье-Куна синдром) — аномалия развития: чрезмерно большой диаметр трахеи и бронхов, обусловленный недоразвитием эластической, мышечной и (или) хрящевой ткани их стенок.

ТРАХЕОБРОНХОПАТИ́Я ХОНДРООСТЕОПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (*трахея* + *бронхи* + греч. pathos страдание, болезнь) — см. *Трахеопатия хондроостеопластическая.*

ТРАХЕОБРОНХОСКО́П (*трахея* + *бронхоскоп*) — см. *Бронхоскоп.*

ТРАХЕОБРОНХОСКОПИ́Я (*трахея* + *бронхоскопия*) — см. *Бронхоскопия.*

ТРАХЕОМЕГАЛИ́Я (tracheomegalia; (*трахея* + греч. megas, megalu большой) — аномалия развития: чрезмерно большой диаметр трахеи, обусловленный недоразвитием эластической, мышечной и (или) хрящевой ткани ее стенки.

ТРАХЕОПАТИ́Я ХОНДРООСТЕОПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (*трахея* + греч. pathos страдание, болезнь; син.: бронхопатия хондроостеопластическая, трахеобронхопатия хондроостеопластическая) — патологический процесс неясной этиологии, заключающийся в прогрессирующем окостенении хрящей трахеи и бронхов с деформацией дыхательных путей и нарастающей дыхательной недостаточностью.

ТРАХЕОПЛА́СТИКА (tracheoplastica; *трахея* + *пластика*) — пластическая операция: восстановление целости стенки трахеи.

ТРАХЕОСТЕНО́З (tracheostenosis; *трахея* + *стеноз*) — сужение просвета трахеи, приводящее к дыхательной недостаточности.

ТРАХЕОСТО́МА (tracheostoma; *трахея* + греч. stoma отверстие) — искусственный наружный свищ трахеи.

ТРАХЕОСТОМИ́Я (tracheostomia; *трахея* + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: вскрытие просвета трахеи с подшиванием краев разреза трахеи к краям разреза кожи, производимая для образования трахеостомы.

ТРАХЕОТО́М (истор.; *трахея* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургический нож для трахеотомии.

ТРАХЕОТОМИ́Я (tracheotomia; *трахея-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие трахеи с введением в ее просвет специальной трубки; производится чаще в экстренном порядке в связи с развитием стеноза гортани.

Т. ВЕ́РХНЯЯ (t. superior) — Т., производимая выше перешейка щитовидной железы.

Т. НИ́ЖНЯЯ (t. inferior) — Т., производимая ниже перешейка щитовидной железы.

ТРАХЕОЦЕ́ЛЕ (tracheocele; *трахея* + греч. kēlē выбухание; син.: аэроцеле, дивертикул трахеи) — аномалия развития: добавочный трахеальный бронх, заканчивающийся большим дивертикулом, содержащим воздух.

ТРАХЕ́Я (trachea, PNA, BNA, JNA; греч. tracheia arteria от trachys шероховатый, неровный; син. дыхательное горло) — орган дыхательного аппарата, представляющий собой хрящевую трубку, выстланную слизистой оболочкой; начинается от гортани и дает начало главным бронхам; относится к нижним дыхательным путям.

ТРАХИСКОПИ́Я (trachyscopia; греч. trachys шероховатый, неровный + skopeō рассматривать; син.: Барона трахископия, микротрахископия) — метод микроскопии, при к-ром окрашенные послойные срезы органа или ткани размещают друг над другом и рассматривают через стереоскопический микроскоп, что позволяет изучать пространственное взаимоотношение частей исследуемого объекта.

ТРАХО́МА (trachoma; греч. trachōma, от trachys шероховатый, шершавый) — инфекционная болезнь, вызываемая хламидиями, характеризующаяся диффузной инфильтрацией лимфоидной ткани конъюнктивы и образованием трахоматозных зерен с их последующим распадом и рубцеванием, поражением роговицы с развитием паннуса; может приводить к образованию рубцового заворота век, трихиазу, помутнению роговицы, к слепоте.

ТРАХОМАТО́ЗНЫЕ ЗЁРНА (granulationes trachomatosae; син. фолликулы трахоматозные) — мелкие полупрозрачные очаги розовато-серого или мутно-серого цвета на конъюнктиве век и переходных складок, состоящие из лимфоидных клеток различной степени зрелости; образуются при трахоме.

ТРЕВО́ГА в психиатрии — аффект ожидания какого-либо неприятного события.

ТРЕГУ́БОВА КА́ПЕЛЬНЫЙ МЕ́ТОД (С. Л. Трегубов, 1872—1944, сов. хирург-ортопед) — метод лечения контрактур, заключающийся в вытяжении с нарастающей тягой; в качестве груза используют сосуд, в к-рый по каплям поступает вода.

ТРЕДЕКАФОБИ́Я (tredecaphobia; лат. tredecim тринадцать + *фобия*; син. трискайдекафобия) — навязчивый страх — боязнь числа тринадцать.

ТРЕ́ЙТЛЕРА НОЖ (Treutler) — см. *Нож копьевидный двойной.*

ТРЕ́ЙТЦА ГРЫ́ЖА (W. Treitz, 1819—1872, австр. врач) — см. *Грыжа парадуоденальная.*

ТРЕ́ЙТЦА КАРМА́Н (W. Treitz) — см. *Дуоденально-еюнальное углубление.*

ТРЕ́ЙТЦА ФА́СЦИЯ (W. Treitz) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *986.*

ТРЕ́КВЕЙРА «О́СТРОВ ЗРЕ́НИЯ» (H. M. Traquair, род. в 1876 г., англ. офтальмолог) — трехмерная модель поля зрения, отображающая зависимость его границ от яркости или величины светового раздражителя.

ТРЕЛА́ СИМПТО́М (U. Trélat, 1828—1890, франц. хирург) — см. *Трела точки.*

ТРЕЛА́ ТО́ЧКИ (U. Trélat; син. Трела симптом) — мелкие желтоватые пятна на слизистой оболочке, обнаруживаемые в окружности туберкулезных язв.

ТРЁЛЬЧА КАРМА́Н ЗА́ДНИЙ (A. F. Tröltsch, 1829—1890, нем. оториноларинголог) — см. *Углубление барабанной перепонки заднее.*

ТРЁЛЬЧА КАРМА́Н ПЕРЕ́ДНИЙ (A. F. Tröltsch) — см. *Углубление барабанной перепонки переднее.*

ТРЕ́МА (trema; греч. trēma отверстие, щель) — наличие промежутка или нескольких промежутков между зубами при целом зубном ряде; возникает, напр., при чрезмерном росте челюсти.

ТРЕМАТОДО́ЗЫ (trematodoses; син.: дистоматозы, дистомиазы) — гельминтозы, возбудители к-рых относятся к классу трематод типа плоских червей.

ТРЕМАТО́ДЫ (Trematoda; син. сосальщики дигенетические) — класс типа плоских червей; представители Т. имеют нерасчлененное тело, снабженное присосками, и разветвленный, слепо заканчивающийся кишечник; окончательные хозяева — позвоночные животные, промежуточные хозяева — беспозвоночные, обычно моллюски; нек-рые Т. являются паразитами человека.

ТРЕ́МНЕРА РЕФЛЕ́КС (E. L. Trömner, род. в 1868 г., нем. невропатолог) — сгибание пальцев кисти при ударе по ладонной поверхности конечных фаланг в положении пронации; признак поражения пирамидных путей.

ТРЕ́МНЕРА СИМПТО́М (E. L. Trömner) — разгибание большого пальца стопы при сдавлении икроножной мышцы; признак поражения пирамидных путей.

ТРЕМОГРАФИ́Я (лат. tremor дрожание + греч. graphō — писать, записывать) — регистрация частоты и амплитуды дрожания частей тела.

ТРЕМОЛЬЕ́РА МЕ́ТОД — метод исследования всасывания жира в кишечнике, заключающийся во флюориметрическом определении количества йода, выделенного с мочой в течение 24 часов после его приема внутрь с оливковым маслом (0,04 *г* йода на 2 *мл* масла).

ТРЕ́МОР (tremor; лат. «дрожание») — см. *Дрожание.*

ТРЕМОФОБИ́Я (лат. tremor дрожание + *фобия*) — см. *Тромофобия.*

ТРЕНАЖЁР (англ. train тренировать, обучать) — установка, имитирующая важнейшие элементы какого-либо вида деятельности; применяется для выработки и тренировки профессиональных навыков.

ТРЕНДЕЛЕНБУ́РГА ОПЕРА́ЦИЯ (F. Trendelenburg, 1844—1924, нем. хирург) — косметическая хирургическая операция при резко увеличенной и оттопыренной ушной раковине, заключающаяся в иссечении клиновидных участков во всю толщу раковины и наложении швов на края образованных дефектов.

ТРЕНДЕЛЕНБУ́РГА ПОЛОЖЕ́НИЕ (F. Trendelenburg) — положение больного на операционном столе, при к-ром таз расположен выше головы, что достигается наклоном головного конца стола на 30—45°; применяется при операциях на органах малого таза, при острой анемии или шоке, при нек-рых видах эндоскопического исследования.

ТРЕНДЕЛЕНБУ́РГА ПРО́БА (F. Trendelenburg) — см. *Тренделенбурга — Троянова проба.*

ТРЕНДЕЛЕНБУ́РГА — ТРОЯ́НОВА ПРО́БА (F. Trendelenburg, 1844—1924, нем. хирург; А. А. Троянов, 1849—1916, отеч. хирург; син.: Броди — Троянова — Тренделенбурга проба, Тренделенбурга проба) — диагностическая проба при варикозном расширении вен нижних конечностей; заключается в сдавливании большой подкожной вены бедра у паховой складки в положении больного лежа на спине с поднятой ногой и последующим переходом в положение стоя; быстрое набухание варикозно-расширенных вен после прекращения сдавливания свидетельствует о недостаточности венозных клапанов.

ТРЕ́НИНГ АУТОГЕ́ННЫЙ (англ. training обучение, тренировка; греч. autos сам + -genēs зарождающийся, производимый; син.: аутогенная тренировка, концентративное расслабление, метод прогрессивной релаксации)— вид психотерапии, основанный на максимальном мышечном расслаблении, сочетающемся с самовнушением.

ТРЕНИРО́ВАННОСТЬ в спорте — состояние организма спортсмена, характеризующееся высоким уровнем развития функциональных возможностей различных систем и хорошей приспособленностью их к возрастающим физическим нагрузкам; Т. обеспечивает устойчивые высокие спортивные результаты.

ТРЕНИРО́ВКА КОЛЛАТЕРА́ЛЕЙ — совокупность методов стимуляции развития коллатерального кровообращения при недостаточности кровотока по магистральному артериальному сосуду.

ТРЕОНИ́Н — незаменимая в питании человека аминокислота, представляющая собой производное масляной кислоты; входит в состав многих белков.

ТРЕПА́Н (франц. trépan, от греч. trypanon бурав) — 1) хирургический инструмент для образования небольших отверстий в кости или в другой плотной ткани, рабочей частью к-рого являются фреза или сверло; приводится во вращение вручную по типу коловорота или электромотором (электротрепан); 2) (истор.) — хирургический инструмент типа коловорота с рабочей частью в виде полой зубчатой коронки, предназначенный для образования круглых трепанационных отверстий в кости свода черепа.

ТРЕПАНА́ЦИЯ (trepanatio; франц. trépanation) — хирургическая операция: образование отверстия в костной ткани с целью доступа к подлежащей полости.

Т. ДЕКОМПРЕССИ́ВНАЯ ПО КУ́ШИНГУ — см. *Трепанация черепа декомпрессивная.*

Т. ЛО́БНО-РЕШЁТЧАТАЯ (t. frontoethmoidalis) — см. *Иванова операция.*

Т. ПО О́ЛИВЕКРУНЕ — см. *Оливекруны трепанация.*

Т. СОСЦЕВИ́ДНОГО ОТРО́СТКА (t. processus mastoidei) — см. *Мастоидотомия.*

Т. ЧЕ́РЕПА (t. cranii; син. краниотомия) — Т. свода черепа с целью вскрытия его полости.

Т. ЧЕ́РЕПА БИФРОНТА́ЛЬНАЯ (t. cranii bifrontalis; лат. bis дважды + frons, frontis лоб) — Т. ч., производимая в лобной области с обеих сторон с образованием одного большого костного лоскута; применяется в качестве доступа к образованиям дна передней черепной ямки и области турецкого седла.

Т. ЧЕ́РЕПА ПО ВА́ГНЕРУ — ВО́ЛЬФУ — см. *Вагнера — Вольфа трепанация черепа.*

Т. ЧЕ́РЕПА ДЕКОМПРЕССИ́ВНАЯ (t. cranii decompressiva; лат. приставка de-, означающая устранение чего-либо, + compressio сдавление, сжатие; син. Кушинга декомпрессивная трепанация) — двусторонняя Т. ч. в височной области с резекцией чешуи височной кости и вскрытием твердой мозговой оболочки; производится для уменьшения внутричерепного давления при неоперабельных опухолях головного мозга.

Т. ЧЕ́РЕПА КО́СТНО-ПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (t. cranii osteoplastica) — Т. ч. с выкраиванием лоскутов мягких тканей и кости, которые после окончания операции укладывают на место.

Т. ЧЕ́РЕПА РЕЗЕКЦИО́ННАЯ (t. cranii resectionalis) — Т. ч. с удалением части костей черепа; применяется при хирургической обработке черепно-мозговых ран, для декомпрессии, а также при операциях на задней черепной ямке.

ТРЕПАНА́ЦИЯ СКЛЕ́РЫ (trepanatio sclerae) — хирургическая операция: сквозное иссечение дисковидного участка склеры; применяется гл. обр. при глаукоме.

Т. СКЛЕ́РЫ ПО Э́ЛЛИОТУ — см. *Эллиота трепанация склеры.*

ТРЕПАНО- (франц. trépan, от греч. trypanon бурав) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к трепанации».

ТРЕПАНОБИОПСИ́Я (*трепано-* + *биопсия*) — биопсия участка костного мозга путем прокола обычно подвздошной кости с помощью специальной иглы.

ТРЕПАНОЦИКЛОДИА́ЛИЗ (trepanocyclodialysis; *трепано-* + *циклодиализ*) — хирургическая операция: отслоение ресничного тела от склеры, производимое через трепанационное отверстие в склере; применяется при глаукоме.

ТРЕПЕТА́НИЕ ЖЕЛУ́ДОЧКОВ (tachysystolia ventriculorum; син. тахисистолия желудочковая) — желудочковая тахикардия с исключительно высокой частотой сокращений (более 250 в 1 мин.).

ТРЕПЕТА́НИЕ ПРЕДСЕ́РДИЙ (tachysystolia atriorum) — резкое ритмичное учащение сокращений предсердий, обусловленное патологическим движением волны возбуждения по миокарду.

Т. ПРЕДСЕ́РДИЙ АССОЦИИРОВА́ННОЕ (t. atriorum associata) — Т. п., при к-ром отмечается четкая временна́я связь между одним из нескольких сокращений предсердий и сокращением желудочков.

Т. ПРЕДСЕ́РДИЙ ДИССОЦИИРОВА́ННОЕ (t. atriorum dissociata) — Т. п., при к-ром не отмечается временно́й связи между сокращениями предсердий и желудочков.

ТРЕПОНЕ́МА БЛЕ́ДНАЯ (Treponema pallidum, Ber; син. спирохета бледная) — тонкий спиралевидный микроорганизм рода Treponema; анаэроб, обладающий значительной подвижностью; по Романовскому — Гимзе окрашивается в бледно-розовый цвет; возбудитель сифилиса.

TREPONÉMA (Ber; трепонемы) — род микроорганизмов семейства Spirochaetaceae (порядок Spirochaetales), объединяющий анаэробные подвижные спиралевидные микроорганизмы, имеющие на концах фибриллы; плохо красятся анилиновыми красками; по Романовскому — Гимзе красятся в бледно-розовый цвет; включает возбудителей сифилиса и фрамбезии.

T. VINCÉNTII (Ber) — см. *Венсана спирохета.*

T. PÁLLIDUM (Ber) — см. *Трепонема бледная.*

T. PERTÉNUE (Ber) — вид Т., морфологически сходный с бледной трепонемой; возбудитель фрамбезии.

ТРЕ́СИЛЬЕНА ПРИ́ЗНАК (F. J. Tresilian, 1862—1926, англ. врач) — красноватая окраска слизистой оболочки у устья околоушного протока; признак эпидемического паротита.

ТРЕ́ССДЕРА СИМПТО́М (Tressder)— уменьшение боли в положении больного на животе; возможный признак аппендицита.

ТРЕУГО́ЛЬНИК БЛУЖДА́ЮЩЕГО НЕ́РВА (trigonum nervi vagi, PNA; ala

cinerea, BNA, JNA; син. серое крыло)— нижнелатеральный участок ромбовидной ямки, в к-ром расположены ядра блуждающего и языкоглоточного нервов.

ТРЕУГО́ЛЬНИК ПЕ́ТЛИ (trigonum lemnisci, PNA) — участок поверхности среднего мозга, ограниченный латеральной бороздой, ручкой нижнего (каудального) холмика и верхней (краниальной) мозжечковой ножкой; в пределах Т. п. поверхностно расположены волокна латеральной петли, а в глубине — ее ядро.

ТРЕУГО́ЛЬНИК ПОДЪЯЗЫ́ЧНОГО НЕ́РВА (trigonum nervi hypoglossi, PNA, BNA, JNA) — нижнемедиальный участок ромбовидной ямки, в к-ром находится ядро подъязычного нерва.

ТРЕФИ́Н (франц. trépan трепан + fin тонкий) — хирургический инструмент для образования трепанационных отверстий небольшого диаметра; его рабочая часть состоит из полой зубчатой коронки и поперечно расположенной рукоятки.

ТРЕФИНА́ЦИЯ ЧЕ́РЕПА (trefinatio cranii; франц. trépan трепан + fin тонкий) — трепанация черепа, при к-рой образуют одно небольшое округлое отверстие с помощью трефина.

ТРЕХЖГУТО́ВАЯ ПРО́БА (син. Шейниса проба) — диагностическая проба при варикозном расширении вен нижней конечности; заключается в сдавливании подкожных вен поднятой нижней конечности лежащего на спине больного тремя жгутами, наложенными у паховой складки, в средней трети бедра и под коленным суставом; набухание подкожных вен при переходе больного в вертикальное положение ниже одного из жгутов или выше поочередно снимаемых снизу вверх жгутов свидетельствует о недостаточности вен, соединяющих глубокие и поверхностные вены на этом участке.

ТРЕХПУ́НКТНЫЙ КОНТА́КТ — см. *Бонвилла трехпунктный контакт.*

ТРЕХСТАКА́ННАЯ ПРО́БА — см. *Ядассона проба.*

ТРЕЩИНА АНА́ЛЬНАЯ (fissura ani)— см. *Трещина заднего прохода.*

ТРЕ́ЩИНА ГУБЫ́ (rhagas labii) — линейное нарушение целости губы, обычно в области красной каймы, напр. при хейлите.

ТРЕ́ЩИНА ЗА́ДНЕГО ПРОХО́ДА (fissura ani; син. трещина анальная) — щелевидная радиально расположенная резко болезненная язва на месте перехода слизистой оболочки заднего прохода в кожу.

ТРЕ́ЩИНА КО́ЖИ (rhagas; син. фиссура) — линейное болезненное нарушение целости кожи; вторичный морфологический элемент кожной сыпи.

ТРЕ́ЩИНА КО́СТИ (fissura ossis) — см. *Перелом неполный.*

ТРЕ́ЩИНА СОСКА́ (rhagas papillae mammae) — линейный дефект кожи соска молочной железы, возникающий в периоде лактации, чаще при нарушении правил кормления ребенка и недостаточном уходе за молочными железами.

ТРИ́БА (tribus; лат. tribuo делить, распределять) в систематике — таксономическая категория в ботанике и зоологии, занимающая промежуточное положение между семейством и родом; применяется для объединения близких родов или для подразделения крупных семейств или подсемейств.

ТРИБА́ДИЯ (tribadia; греч. tribō тереть) — 1) форма женского гомосексуализма, при к-рой половое удовлетворение достигается путем трения половыми органами о различные части тела партнера либо при попытках имитации коитуса с введением клитора во влагалище; 2) см. *Лесбийская любовь.*

ТРИБУЛЕ́ ПРО́БА (H. Triboulet, 1864—1920, франц. педиатр и гигиенист; син. Трибуле — Вишнякова проба) — метод обнаружения растворимого белка в кале, основанный на его способности денатурироваться и осаждаться при взаимодействии с 20% р-ром трихлоруксусной к-ты или 7% р-ром сулемы; используется для диагностики нарушений переваривания белков в кишечнике.

ТРИБУЛЕ́ — ВИШНЯКО́ВА ПРО́БА (H. Triboulet, 1864—1920, франц. педиатр и гигиенист; А. В. Вишняков, сов. биохимик) — см. *Трибуле проба.*

ТРИВАКЦИ́НА (trivaccinum; три- + *вакцина*) — вакцина, предназначенная для иммунизации одновременно против трех различных инфекционных болезней (напр., брюшного тифа, паратифов А и Б).

ТРИВАЛЕ́НТ (три- + лат. valens, valentis сильный, действенный) — мультивалент, состоящий из трех хромосом.

ТРИ́ВУСА СИМПТО́М — обнаружение при перкуссии небольшой полоски ясного легочного звука между сердечной тупостью и нижерасположенным участком тупости; признак поддиафрагмального абсцесса.

ТРИГЕМИНИ́Я (trigeminia; лат. trigeminus тройной) — форма аллоритмии, при к-рой экстрасистола следует после каждых двух нормальных сокращений сердца.

ТРИГЛИЦЕРИ́ДЫ — см. *Жир.*

ТРИГО́Н (греч. trigōnon треугольник) — часть коронки верхнего коренного зуба, объединяющая метаконус, паракопус и протоконус.

ТРИГОНИ́Д (trigonidum; греч. trigōnon треугольник) — часть коронки нижнего коренного зуба человека, объединяющая метаконид и протоконид.

ТРИГОНИ́Т (trigonitis; анат. trigonum vesicae мочепузырный треугольник + *-ит*) — воспаление мочевого пузыря с преимущественной локализацией процесса в области мочепузырного треугольника.

ТРИГОНОУРЕТЕРОСИГМОАНАСТОМО́З (trigonoureterosigmoanastomosis; анат. trigonum vesicae мочепузырный треугольник + греч. urētēr мочеточник + анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка + *анастомоз*) — см. *Майдля операция.*

ТРИГОНОЦЕФАЛИ́Я (trigonocephalia; греч. trigōnon треугольник + kephalē голова) — вариант формы черепа человека, характеризующийся широкой затылочной и узкой лобной частью.

ТРИДОНДА́НА РАЗМЕ́Р — расстояние между верхней и нижней вершинами крестцового ромба; Т. р. увеличен при общеравномерносуженном тазе и уменьшен при плоскорахитическом тазе.

ТРИЗМ (греч. trismos скрип, скрежет) — тоническое сокращение жевательных мышц, проявляющееся стискиванием челюстей; наблюдается, напр., при столбняке, остеомиелите нижней челюсти.

ТРИЙОДТИРОНИ́Н (triiodthyroninum) — гормон щитовидной железы, по химической структуре и биологическому действию близкий к тироксину, но более активный.

ТРИЙОДТИРОНИ́НОВЫЙ ТЕСТ — метод выявления нарушений функции щитовидной железы, основанный на ускорении захвата эритроцитами введенного трийодтиронина (меченного радиоактивным йодом) при гипертиреозе и замедлении этого процесса при гипотиреозе.

ТРИКАРБО́НОВЫЕ КИСЛО́ТЫ — органические кислоты, содержащие в молекуле три карбоксильные группы (напр., лимонная, изолимонная кислоты); образуются в организме при окислении углеводов, жиров и нек-рых аминокислот.

ТРИКУСПИДА́ЛЬНАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ (insufficientia tricuspidalis; анат. valva tricuspidalis трехстворчатый клапан) — см. *Недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана.*

ТРИОЗОФОСФА́ТЫ — фосфорные эфиры глицеринового альдегида и диоксиацетона, образующиеся в организме в качестве промежуточных продуктов окисления глюкозы и глицерина.

ТРИО́ЗЫ — простейшие углеводы (глицериновый альдегид и диоксиацетон), являющиеся промежуточными продуктами обмена глицерина и глюкозы.

ТРИОЛИ́ЗМ (лат. tres, tria три) — половое извращение, при к-ром половое удовлетворение достигается лишь в том случае, если половой акт выполняется в присутствии третьего лица.

ТРИПАНИ́ДЫ (trypanides) — пятна или кольца розового или фиолетового цвета, появляющиеся на коже туловища и конечностей у больных трипаносомозом в начальной стадии заболевания.

ТРИПА́НОВЫЙ СИ́НИЙ — бензидиновый краситель, водный раствор к-рого имеет синий цвет; малотоксичен; применяется для витальной окраски.

TRYPANOSÓMA (Ber; трипаносомы) — род простейших сем. Trypanosomatidae, отр. Kinetoplastida, класса жгутиковых; паразиты крови и тканей позвоночных; включает возбудителей трипаносомозов.

T. GAMBIÉNSE — вид Т., распространенный в Африке между 14° северной широты и 13° южной широты; носители — антилопы, а также свиньи и козы; переносчики — кровососущие мухи цеце (Glossina); возбудитель африканского трипаносомоза человека.

T. CRÚZI — вид Т., распространенный в Центральной и Южной Америке; носители — опоссумы, броненосцы, лесные крысы, а также кошки, собаки; переносчики — триатомовые клопы; возбудитель американского трипаносомоза человека.

T. RHODESIÉNSE — вид Т., распространенный в Восточной Африке, гл. обр. у антилоп; переносчики — кровососущие мухи цеце (Glossina); возбудитель африканского трипаносомоза человека.

ТРИПАНОСОМАТИ́ДЫ (Trypanosomatidae) — семейство простейших отр. Kinetoplastida, кл. жгутиковых, характеризующееся наличием лишь одного жгута и сменой форм на протяже-

нии жизненного цикла; паразиты растений и животных; переносчики — насекомые; включает возбудителей трипаносомозов.

ТРИПАНОСОМО́ЗЫ (trypanosomoses) — общее название трансмиссивных протозойных болезней, вызываемых трипаносомами, характеризующихся затяжным течением с поражением различных органов и систем организма в зависимости от вида возбудителя болезни.

Т. АМЕРИКА́НСКИЙ (t. americana; син. Шагаса болезнь) — Т., вызываемый Trypanosoma cruzi, эндемичный для Центральной Америки и характеризующийся лимфогематогенной диссеминацией возбудителя, нерегулярной лихорадкой, лимфаденопатией, гепатоспленомегалией и последующим медленным развитием поражений ц. н. с., миокарда и органов пищеварительного тракта.

Т. АФРИКА́НСКИЙ (t. africana; син.: болезнь сонная, болезнь сонная африканская) — Т., вызываемый Trypanosoma gambiense или Trypanosoma rhodesiense, передающийся гл. обр. мухами цеце и характеризующийся нерегулярной лихорадкой, головной болью, увеличением лимфатических узлов, кожной сыпью, а в последующем нарастающей сонливостью и нарушением психики.

ТРИПАНОСО́МЫ — см. *Trypanosoma.*

ТРИПАНОСО́МЫ МЕТАЦИКЛИ́ЧЕСКИЕ — трипомастиготы, образующиеся в теле переносчика (насекомого) и приспособленные к внедрению в организм хозяина — позвоночного животного.

ТРИПАФЛАВИ́НОВАЯ ПРО́БА — проба для дифференцировки R-форм бактерий от S-форм, основанная на свойстве клеток R-формы агглютинировать в растворе трипафлавина.

ТРИПЕЛЬФОСФА́Т — двойной фосфат аммония и магния, встречающийся в виде осадка в моче при ее щелочном брожении, а также при нек-рых физиологических и патологических состояниях, сопровождающихся щелочной реакцией мочи (напр., при вегетарианском питании, при гнойных процессах в мочевыводящих путях).

ТРИПЛЕГИ́Я (triplegia; *три-* + греч. plēgē удар, поражение) — паралич трех конечностей.

ТРИПЛЕ́Т — три последовательно расположенные азотистые основания в цепи нуклеиновых кислот; служит единицей генетического кода (кодоном).

ТРИПЛО́ИД [*три-* + (*поли*) *плоид*] — полиплоид с тремя гаплоидными наборами хромосом.

ТРИПЛОПИ́Я (triplopia; греч. triploos тройной + ōps, ōpos глаз, зрение) — утроенное изображение предмета, возникающее при рассматривании его двумя глазами в случае монокулярной диплопии.

ТРИПОМАСТИГО́ТА — стадия жизненного цикла простейших рода Trypanosoma, для которой характерно наличие колеблющейся мембраны, проходящей вдоль всего тела, и способность к передвижению.

ТРИ́ППЕР (нем. Tripper, от tropfen капать) — см. *Гонорея.*

ТРИПСИ́Н — протеолитический фермент класса гидролаз (КФ 3.4.21.4), катализирующий гидролитическое расщепление белков, пептидов, амидов и сложных эфиров по связям, в образовании к-рых принимают участие карбоксильные группы L-аргинина и L-лизина; образуется в просвете кишечника из трипсиногена и участвует в переваривании пищи.

ТРИПСИНИЗА́ЦИЯ ТКА́НИ — метод измельчения ткани для приготовления суспензии клеток с целью их последующего культивирования, основанный на обработке ткани трипсином.

ТРИПСИНОГЕ́Н — профермент трипсина, секретируемый поджелудочной железой в просвет двенадцатиперстной кишки.

ТРИПТАМИ́Н (син. индолэтиламин) — продукт ферментативного декарбоксилирования триптофана, образующийся в процессе обмена в печени и почках или продуцируемый кишечными бактериями; повышает артериальное давление за счет высвобождения норадреналина в нервных окончаниях симпатических волокон.

ТРИПТОФА́Н — незаменимая в питании человека моноаминомонокарбоновая гетероциклическая аминокислота; входит в состав многих белков (напр., глобулинов сыворотки крови, казеина) и участвует в процессе биосинтеза никотиновой кислоты и серотонина.

ТРИСКАЙДЕКАФОБИ́Я (греч. triskaideka тринадцать + *фобия*) — см. *Тредекафобия.*

ТРИСОМИ́Я [*три-* + (*хромо*) *сома*] в генетике — вид полисомии, при к-рой имеются три гомологичные хромосомы.

ТРИСОМИ́Я Д (син. Патау синдром) — комплекс аномалий развития: микроцефалия, незарастение неба и верхней губы, пороки сердца и др.; обусловлен трисомией одной из хромосомных групп (группы Д).

ТРИТАНОМА́ЛИЯ (tritanomalia; греч. tritos третий + *аномалия*) — нарушение цветового зрения, при к-ром ослаблено восприятие преимущественно фиолетового цвета.

ТРИТАНО́П — человек, страдающий тританопией.

ТРИТАНОПИ́Я (tritanopia; греч. tritos третий + отрицательная приставка an- + ōps, ōpos глаз, зрение) — форма дихромазии, при к-рой отсутствует восприятие преимущественно фиолетового цвета.

ТРИ́ТИЕВАЯ ВОДА́ — вода, в молекулах к-рой атомы водорода замещены атомами трития; применяется как меченое соединение для исследования водного обмена.

ТРИ́ТИЙ (Tritium; T, ^3H) — бета-радиоактивный изотоп водорода, ядро к-рого состоит из одного протона и двух нейтронов; используется, напр., в радиоизотопной диагностике.

ТРИТОНИ́МФА (греч. tritos третий + *нимфа*) — третья нимфальная стадия в цикле развития клещей.

ТРИУ́МФОВА РЕФЛЕ́КС (А. В. Триумфов, 1897—1963, сов. невропатолог; син.: Гийена — Триумфова рефлекс, рефлекс лобковый) — физиологический рефлекс: одностороннее сокращение мышц брюшной стенки при постукивании молоточком в области лобка на 1—2 *см* латеральнее средней линии.

ТРИХ- (трихо-; греч. thrix, trichos волос) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к волосам».

ТРИХАТРОФИ́Я (trichatrophia; *трих-* + *атрофия*) — врожденная или приобретенная атрофия волос.

ТРИХИА́З (trichiasis; *трих-* + *-иаз*) — неправильное положение ресниц, при к-ром их концы направлены в сторону глазного яблока.

ТРИХИНЕ́ЛЛА — см. *Trichinella spiralis.*

TRICHINÉLLA SPIRÁLIS (трихинелла) — вид нематод отр. Trichocephalida, сем. Trichinellidae, зрелые формы к-рых паразитируют у человека и нек-рых млекопитающих в тонкой кишке, а личинки — в мышечной ткани; возбудитель трихинеллеза.

ТРИХИНЕЛЛЁЗ (trichinellosis; син. трихиноз — нрк) — гельминтоз из группы нематодозов, вызываемый трихинеллой (Trichinella spiralis); характеризуется лихорадкой, болями в мышцах, диспептическими явлениями, эозинофилией; человек заражается при употреблении в пищу мяса свиней и диких животных, пораженного личинками гельминта; встречается повсеместно.

ТРИХИНЕЛЛОСКОПИ́Я (*Trichinella spiralis* + греч. skopeō наблюдать, исследовать) — микроскопия мяса свиней и диких животных с целью выявления в нем личинок трихинелл; в СССР — обязательный элемент ветеринарно-санитарной экспертизы мяса свиней.

ТРИХИНО́З (нрк; trichinosis) — см. *Трихинеллез.*

ТРИ́ХИОН (греч. thrix, trichos волос) — антропометрическая точка; находится на границе волосистой части лба по его средней линии.

ТРИХИУРИА́З (trichiuriasis) — см. *Трихоцефалез.*

ТРИХО- — см. *Трих-.*

ТРИХОБАЗАЛИО́МА (trichobasalioma; *трихо-* + *базалиома*; син. Понсе опухоль) — базалиома, в клеточных комплексах к-рой происходит выраженная дифференцировка по типу образования волос.

ТРИХОБЕЗОА́Р (*трихо-* + *безоар*; син.: волосяной шар, опухоль волосяная) — инородное тело в желудке, состоящее из клубка проглоченных волос с вкраплением частиц пищи и слизи.

ТРИХОГИАЛИ́Н (trichohyalinum; *трихо-* + *гиалин*) — белок, по составу сходный с кератогиалином; содержится в волосах.

ТРИХОДЕСМОТОКСИКО́З (trichodesmotoxicosis; син.: энцефалит джалангарский, энцефалит местный) — пищевое отравление, возникающее при употреблении в пищу зерна, засоренного семенами седой триходесмы (Trichodesma incanum).

ТРИХО́З (trichosis; *трих-* + *-оз*) — общее название болезней волос.

ТРИХОКИНЕ́З (trichokinesis; *трихо-* + греч. kinēsis движение) — см. *Волосы перекрученные.*

ТРИХОКЛАЗИ́Я (trichoclasia; *трихо-* + греч. klasis ломка; син.: трихорексис, хрупкость волос) — патологическое состояние волос, характеризующееся их самопроизвольным обламыванием на уровне 1—3 *см* от поверхности кожи.

Т. ИДИОПАТИ́ЧЕСКАЯ (t. idiopathica; син.: Т. спонтанная, трихорексис очаговый) — Т., при к-рой волосы обламываются на одном уровне, образуя очаги округлой формы; наблюдается у женщин.

Т. СПОНТА́ННАЯ (t. spontanea) — см. *Трихоклазия идиопатическая.*

Т. УЗЛОВА́ТАЯ (t. nodosa; син. расщепление волос) — Т., характеризую-

щаяся расщеплением коркового вещества волоса и образованием в местах расщепления узелков.

ТРИХОКРИПТОМАНИ́Я (*трихо-* + греч. kryptos скрытый + *мания*) — см. *Трихотилломания.*

ТРИХОЛО́ГИЯ (trichologia; *трихо-* + греч. logos учение, наука) — раздел дерматологии, посвященный изучению волос и их болезней.

ТРИХО́МА (греч. trichōma рост волос, волосатость) — см. *Колтун.*

ТРИХОМАЛЯ́ЦИЯ (trichomalacia; *трихо-* + греч. malakia мягкость) — патологическое изменение волос, при к-ром наблюдается размягчение их стержней, приводящее к ограниченной алопеции.

ТРИХОМАТРИО́МА (*трихо-* + *матрикс волоса* + *-ома*) — доброкачественная опухоль в виде мелкого плотного узелка на коже головы, шеи или рук, исходящая из внутреннего корневого влагалища фолликула волоса.

ТРИХОМИКО́З [trichomycosis; *трихо-* + (*кератo*) *микоз*] — 1) общее название кератомикозов, при к-рых поражается кутикула волоса; 2) (истор.) — см. *Пиломикоз.*

ТРИХОМИКО́З ПОДМЫ́ШЕЧНЫЙ (trichomycosis axillaris; *трихо-* + *микоз*; син.: lepothrix, трихонокардиоз подмышечный) — болезнь волос, вызываемая микроорганизмом Nocardia tenuis и характеризующаяся возникновением на кутикуле волос мягких узелков желтого, реже красного или черного цвета, сливающихся и образующих чехол, окружающий волос.

ТРИХОМИКО́З УЗЛОВА́ТЫЙ (trichomycosis nodularis) — см. *Трихоспория.*

ТРИХОМОНА́ДА(-Ы)— 1) (Trichomonadida) — отряд паразитических простейших кл. жгутиконосцев, объединяющий организмы, характеризующиеся наличием внеядерного веретена деления, парабазального тельца и внутреннего скелета, состоящего из трубчатых микрофибрилл; 2) (Trichomonas) — род простейших отр. Trichomonadida, сем. Trichomonadidae, для представителей к-рого характерно наличие четырех свободных жгутиков и короткой ундулирующей мембраны; включает виды, вызывающие трихомоноз у человека.

Т. КИШЕ́ЧНАЯ (Trichomonas hominis; pentatrichomonas hominis) — вид Т., представители к-рого паразитируют в толстой кишке человека; патогенность Т. к. для человека не установлена.

Т. МОЧЕПОЛОВА́Я (Trichomonas vaginalis) — вид Т., представители к-рого паразитируют в органах мочеполовой системы человека и передаются, как правило, половым путем; возбудитель трихомоноза.

Т. РОТОВА́Я (Trichomonas elongata) — вид непатогеных для человека Т., представители к-рого паразитируют в полости рта.

TRICHOMÓNAS — см. *Трихомонада(-ы)*[2].

T. VAGINÁLIS — см. *Трихомонада мочеполовая.*

T. HÓMINIS — см. *Трихомонада кишечная.*

T. ELONGÁTA — см. *Трихомонада ротовая.*

ТРИХОМОНИА́З — см. *Трихомоноз.*

ТРИХОМОНО́З (син. трихомониаз) — инфекционная болезнь, вызываемая мочеполовой трихомонадой; заражение человека происходит преимущественно половым путем; клинически проявляется симптомами поражения различных отделов мочеполовой системы.

ТРИХОНОДО́З (trichonodosis; *трихо-* + лат. nodus узел + *-оз*) — самопроизвольное скручивание волос в узелки (петли); наблюдается обычно при плохом уходе за волосами.

ТРИХОНОКАРДИО́З ПОДМЫ́ШЕЧНЫЙ (trichonocardiosis axillaris) — см. *Трихомикоз подмышечный.*

ТРИХОПАТИ́Я (trichopathia; *трихо-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название патологических изменений волос.

ТРИХОПАТОФОБИ́Я (trichopathophobia; *трихо-* + греч. pathos страдание, болезнь + *фобия*) — см. *Трихофобия.*

ТРИХОПОЛИО́З (trichopoliosis; *трихо-* + греч. polios серый, седой + *-оз*) — см. *Поседение.*

ТРИХОПТИЛО́З (trichoptilosis; *трихо-* + греч. ptilon перо + *-оз*; син. трихошизис) — кисточкообразное расщепление кончиков длинных волос.

ТРИХОРЕ́КСИС (trichorrhexis; *трихо-* + греч. rhēxis ломка, разрушение) — см. *Трихоклазия.*

Т. ОЧАГО́ВЫЙ (t. focalis) — см. *Трихоклазия идиопатическая.*

ТРИХОРЕ́Я (trichorrhoea; *трихо-* + греч. rhoia течение, истечение) — патологическое выпадение волос.

ТРИХОСПОРИ́Я (trichosporia; син.: пьедра, трихомикоз узловатый) — трихомикоз, вызываемый Trichosporon beigelii и Piedraia hortai, характеризующийся образованием плотных мелких узелков на кутикуле длинных волос.

TRICHOSPÓRON BEIGÉLII — микроорганизм рода Trichosporon, сем. Cryptococcaceae, кл. несовершенных грибков, характеризующийся образованием большого количества дрожжеподобных артроспор; возбудитель трихоспории (пьедры) у человека и животных.

TRICHOSTÁSIS SPINULÓSA — см. *Волосы пучкообразные.*

ТРИХОСТРОНГИЛИДО́ЗЫ (trichostrongylidoses) — гельминтозы из группы нематодозов, вызываемые представителями сем. Trichostrongylidae и характеризующиеся развитием диспептических явлений, а в тяжелых случаях гипохромной анемией; человек заражается при проглатывании личинок гельминтов с водой и пищей.

ТРИХОСТРОНГИЛИ́ДЫ (Trichostrongylidae) — семейство нематод отр. Rhabditida, включающее паразитов кишечника позвоночных и человека; личинки Т. развиваются в почве.

ТРИХОТИЛЛОМАНИ́Я (trichotillomania; *трихо-* + греч. tillō выдергивать + *мания*; син. трихокриптомания) — навязчивое действие: выдергивание волос на голове или других частях собственного тела.

ТРИХОТОРТО́З (trichotortosis; *трихо-* + лат. torqueo, tortum крутить, скручивать + *-оз*) — см. *Волосы перекрученные.*

ТРИХОФАГИ́Я (trichophagia; *трихо-* + греч. phagein есть, поедать) — патологическое влечение к поеданию волос.

ТРИХОФИТИ́ДЫ (trichophytida; *трихофития* + греч. -eidēs подобный) — вторичные высыпания на коже при трихофитии, имеющие аллергическую природу; наблюдаются чаще при инфильтративно-нагноительной трихофитии.

ТРИХОФИТИ́Н — экстракт из культуры некоторых паразитических грибков рода Trichophyton, применяемый в качестве аллергена для диагностики трихофитии.

ТРИХОФИТИ́Я (trichophytia; *трихо-* + греч. phyton нечто вырастающее, растение; син.: лишай стригущий, трихофитоз) — дерматомикоз, вызываемый паразитическими грибками рода трихофитон.

Т. ГЛУБО́КАЯ (t. profunda) — см. *Трихофития инфильтративно-нагноительная.*

Т. ИНФИЛЬТРАТИ́ВНО-НАГНОЙТЕЛЬНАЯ (t. infiltrativa suppurativa; син. трихофития глубокая) — Т., вызываемая зоофильным трихофитоном, проявляющаяся образованием фолликулярных гнойных абсцессов и желтовато-белого налета на волосах, увеличением регионарных лимфатических узлов, общим недомоганием; поражает волосистую часть головы, гладкую кожу, а также область бороды и усов.

Т. НОГТЕ́Й (t. unguium; син. онихомикоз трихофитический) — поверхностная Т. с поражением ногтей, к-рые деформируются, тускнеют, желтеют, утолщаются и позже — крошатся.

Т. ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (t. superficialis) — Т., вызываемая антропофильным трихофитоном, проявляющаяся гл. обр. обламыванием волос на уровне кожи или на 1—2 *мм* от нее и образованием очагов шелушения; поражает волосистую часть головы, гладкую кожу и ногти.

Т. ХРОНИ́ЧЕСКАЯ (t. chronica) — поверхностная Т., характеризующаяся длительным течением (десятки лет).

ТРИХОФИТО́З (trichophytosis; *трихо-* + греч. phyton нечто вырастающее, растение + *-оз*) — см. *Трихофития.*

ТРИХОФИ́ТОН (Trichophyton) — род паразитических грибков (кл. несовершенных грибов), вызывающих у человека поверхностную трихофитию (T. tonsurans, T. violaceum, T. equinum), инфильтративно-нагноительную трихофитию (T. mentagrophytes var. granulosum, T. verrucosum), фавус (T. schönleinii), руброфитию (T. rubrum), эпидермофитию стоп (T. mentagrophytes var. interdigitale) и черепицеобразный лишай (T. concentricum).

Т. АНТРОПОФИ́ЛЬНЫЙ (греч. anthrōpos человек + philos любящий) — общее название видов Т., патогенных только для человека (напр., T. violaceum, T. tonsurans).

Т. ЗООФИ́ЛЬНЫЙ (греч. zōon животное + philos любящий) — общее название видов Т., поражающих преимущественно животных, от к-рых они могут передаваться человеку (напр., T. mentagrophytes, T. verrucosum).

ТРИХОФОБИ́Я (trihcophobia; *трихо-* + *фобия*; син. трихопатофобия) — навязчивый страх: боязнь попадания волос в пищу, на одежду или на поверхность тела.

ТРИХОФОЛЛИКУЛО́МА (trichofolliculoma; *трихо-* + *фолликулома*) —

доброкачественная опухоль волосяных фолликулов, состоящая из высокодифференцированных клеточных элементов.

ТРИХОЦЕФАЛЁЗ (trichocephalosis; син.: трихиуриаз, трихуроз) — гельминтоз из группы кишечных нематодозов, вызываемый власоглавом (Trichocephalus trichiuris) и характеризующийся болями в животе, развитием диспептических явлений, колита, гипо- или нормохромной анемии; человек заражается при употреблении в пищу овощей, фруктов, ягод, загрязненных яйцами возбудителя.

TRICHOCEPHÁLUS TRICHIÚRIS (власоглав) — вид паразитических нематод отр. Trichocephalida, сем. Trichocephalidae, обитающий в тонкой кишке человека; яйца T. t. развиваются в почве; возбудитель трихоцефалеза.

ТРИХОЦИ́СТЫ — см. *Стрекательные нити.*

ТРИХОШИ́ЗИС (trichoschisis; *трихо-* + греч. schisis расщепление) — см. *Трихоптилоз.*

ТРИХОЭПИТЕЛИО́МА (trichoepithelioma; *трихо-* + *эпителиома*; син.: Анселля опухоль, эпителиома множественная доброкачественная кистозная) — доброкачественная опухоль, развивающаяся из волосяных фолликулов и содержащая железистые кисты.

Т. ПАПУЛЁЗНАЯ МНО́ЖЕСТВЕННАЯ ЯРИША — см. *Яриша множественная папулезная трихоэпителиома.*

ТРИХРОМАЗИ́Я (trichromasia; три- + греч. chrōma цвет, окраска) — способность воспринимать три основных цвета — красный, зеленый и фиолетовый; рассматривается как нормальное цветовое зрение.

ТРИХРОМАЗИ́Я АНОМА́ЛЬНАЯ (trichromasia anomalis) — расстройство цветового зрения (чаще врожденное), характеризующееся ослаблением восприятия некоторых цветов; различают протаномалию, дейтераномалию и тританомалию.

ТРИХРОМА́Т (три + греч. chrōma, chrōmatos цвет, окраска) — человек, нормально воспринимающий три основных цвета — красный, зеленый и фиолетовый.

ТРИХУРО́З — см. *Трихоцефалез.*

ТРИХЭСТЕЗИО́МЕТР (истор.; *трих-* + *эстезиометр*) — прибор для исследования волосковой чувствительности путем механического раздражения кожных волосков колеблющейся металлической пластинкой; разработан В. М. Бехтеревым.

ТРИЦЕФАЛИ́Я (три + греч. kephalē голова) — аномалия развития: наличие на одной голове трех лицевых поверхностей при общем туловище.

ТРНКИ СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШОВ — способ соединения концов сухожилия, при к-ром их прошивают в поперечном направлении с образованием двух петель, после чего петли стягивают.

ТРОАКА́Р (франц. trocart; син. трокар) — хирургический инструмент, представляющий собой стальной остроконечный стилет с надетой на него трубкой, предназначенный для прокола грудной или брюшной стенки с целью выведения жидкости из полостей тела человека.

ТРОАКА́Р-ВЫКУ́СЫВАТЕЛЬ — инструмент для прокола медиальной стенки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи и создания ее сообщения с нижним носовым ходом.

ТРОАКА́Р-НАКОНЕ́ЧНИК — троакар, снабженный ниппелем для соединения с резиновой трубкой; предназначен для прокола желчного пузыря с целью выведения желчи и промывания желчных путей.

ТРО́ИЦКОГО ПРИ́ЗНАК — любое вынужденное положение тела больного при прободении полого органа брюшной полости, обусловленное сильными болями.

ТРОЙНА́Я РЕА́КЦИЯ — см. *Тройной ответ.*

ТРОЙНИ́ЧНАЯ ПО́ЛОСТЬ (cavum trigeminale, PNA; син. меккелева полость) — пространство между расщепившимися листками твердой мозговой оболочки в области тройничного вдавления пирамиды височной кости; место расположения ганглия тройничного нерва (гассерова узла).

ТРОЙНИ́ЧНОЕ ВДАВЛЕ́НИЕ (impressio trigemini, PNA, BNA, JNA) — углубление на передней поверхности пирамиды височной кости вблизи ее верхушки; место расположения ганглия тройничного нерва (гассерова ганглия).

ТРОЙНИ́ЧНЫЙ БУГОРО́К (tuberculum trigeminale, PNA; tuberculum cinereum, BNA, JNA; син. роландов бугорок) — возвышение на дорсальной поверхности продолговатого мозга, расположенное латерально от бугорка клиновидного ядра; соответствует спинномозговому пути тройничного нерва.

ТРОЙНО́Й ОТВЕ́Т (син. тройная реакция) — реакция кожи на введение гистамина, выражающаяся в образовании эритемы, затем пузыря на месте введения и гиперемии, распространяющейся за его пределы.

ТРОКА́Р — см. *Троакар.*

ТРО́КСЛЕРА ФЕНО́МЕН (J. P. V. Troxler, 1780—1866, нем. физиолог) — см. *Трокслера эффект.*

ТРО́КСЛЕРА ЭФФЕ́КТ (J. P. V. Troxler; син. Трокслера феномен) — физиологический феномен: временное нерегулярное прекращение восприятия малого объекта в периферической зоне поля зрения при постоянной фиксации взора.

ТРОМБ (thrombus; греч. thrombos сгусток крови) — плотный сверток крови в просвете кровеносного сосуда или полости сердца, образовавшийся прижизненно.

Т. АГГЛЮТИНАЦИО́ННЫЙ (t. agglutinativus; син. Т. коагуляционный) — Т., возникший вследствие агглютинации эритроцитов и тромбоцитов, напр. при переливании несовместимой крови.

Т. АУТОТОКСИ́ЧЕСКИЙ (t. autotoxicus) — Т., возникший вследствие изменения реологических свойств крови при болезнях, сопровождающихся аутоинтоксикацией.

Т. АУТОХТО́ННЫЙ (t. autochtonus) — Т., расположенный на месте своего образования.

Т. БЕ́ЛЫЙ (t. albus; син. Т. лейкоцитарный) — Т., состоящий преимущественно из тромбоцитов, фибрина и лейкоцитов, придающих ему светло-серую окраску.

Т. БЕ́ЛЫЙ ЛЕЙКЕМИ́ЧЕСКИЙ (t. albus leukaemicus) — Т. б., состоящий преимущественно из незрелых лейкоцитов.

Т. ВАСКУЛЯРИЗО́ВАННЫЙ (t. vascularisatus) — см. *Тромб канализованный.*

Т. ГИАЛИ́НОВЫЙ (t. hyalinicus) — гомогенный Т., состоящий из разрушенных эритроцитов, тромбоцитов и преципитировавших белков плазмы.

Т. ДИЛАТАЦИО́ННЫЙ (t. dilatativus) — Т., образовавшийся в полости аневризмы.

Т. ЗАКУПО́РИВАЮЩИЙ (t. obturatorius; син. Т. обтурирующий) — Т., полностью закрывающий просвет сосуда.

Т. ЗАСТО́ЙНЫЙ (t. congestivus; син. Т. марантический) — красный Т., образовавшийся в просвете вены вследствие венозного застоя.

Т. КАНАЛИЗО́ВАННЫЙ (t. canalisatus; син. Т. васкуляризованный) — Т., в к-ром имеются щели и каналы, выстланные эндотелием.

Т. КОАГУЛЯЦИО́ННЫЙ (t. coagulativus) — см. *Тромб агглютинационный.*

Т. КРА́СНЫЙ (t. ruber; син. Т. эритроцитарный) — Т., состоящий из тромбоцитов, фибрина и большого количества эритроцитов, придающих ему красный цвет.

Т. ЛЕЙКОЦИТА́РНЫЙ (t. leucocytarius) — см. *Тромб белый.*

Т. МАРАНТИ́ЧЕСКИЙ (t. maranticus; греч. marantikos иссушающий, истощающий) — см. *Тромб застойный.*

Т. МИКОТИ́ЧЕСКИЙ (t. mycoticus; син. Т. септический) — Т., содержащий микроорганизмы.

Т. ОБТУРИРУЮЩИЙ (t. obturatorius) — см. *Тромб закупоривающий.*

Т. ОБЫЗВЕСТВЛЁННЫЙ (t. petrificatus) — см. *Тромб петрифицирующийся.*

Т. О́ПУХОЛЕВЫЙ (t. tumorosus) — Т., содержащий клетки опухоли или целиком состоящий из опухолевой ткани; образуется вследствие прорастания или гематогенной диссеминации опухоли.

Т. ОРГАНИЗО́ВАННЫЙ — Т., проросший соединительной тканью.

Т. ПАРИЕТА́ЛЬНЫЙ (t. parietalis) — см. *Тромб пристеночный.*

Т. ПЕРВИ́ЧНЫЙ (t. primarius) — см. *Тромб провизорный.*

Т. ПЕТРИФИЦИ́РОВАННЫЙ (t. petrificatus; греч. petra камень + лат. facio делать; син. Т. обызвествленный) — Т. твердой консистенции, обусловленной отложением в нем солей кальция.

Т. ПЛАСТИ́НОЧНЫЙ (t. lamellosus; син. Т. тромбоцитарный) — белый Т., состоящий преимущественно из фибрина и тромбоцитов.

Т. ПРИСТЕ́НОЧНЫЙ (t. parietalis; син. Т. париетальный) — Т., прикрепленный к стенке сосуда или эндокарду и неполностью закрывающий просвет сосуда или полости сердца.

Т. ПРОВИЗО́РНЫЙ (t. provisorius; нем. provisorisch, от лат. provideo, provisum заранее готовить; син. Т. первичный) — начальная часть Т., состоящая преимущественно из фибрина и тромбоцитов.

Т. ПРОДО́ЛЖЕННЫЙ (t. prolongatus) — закупоривающий Т., распространившийся в сосуде по току крови.

Т. СВОБО́ДНЫЙ (t. liber) — Т., оторвавшийся от стенки (чаще предсердий или крупных вен) и перемещающийся по кровяному руслу.

Т. СЕПТИ́ЧЕСКИЙ (t. septicus) — см. *Тромб микотический.*

Т. СЛОИ́СТЫЙ (t. stratificatus) — 1) Т., состоящий из нескольких слоев вследствие наложения свежих тромботических масс на старый организованный Т.; 2) Т. с чередующимися слоями белого и красного Т.

Т. СМЕ́ШАННЫЙ (t. mixtus) — пестрый на разрезе Т., в к-ром среди фибрина распределены эритроциты и лейкоциты.

Т. СПОДОГЕ́ННЫЙ (t. spodogenus; греч. spodos prax, пыль + -genēs порождаемый, возникающий) — Т., возникший вследствие распада кровяных и слущенных эндотелиальных клеток.

Т. ТОКСИ́ЧЕСКИЙ (t. toxicus) — Т., возникающий вследствие быстрого свертывания крови при нек-рых отравлениях.

Т. ТРОМБОЦИТА́РНЫЙ (t. thrombocytarius) — см. *Тромб пластиночный.*

Т. ФЕРМЕ́НТНЫЙ (t. fermentativus) — Т., возникший в результате попадания в кровоток протеолитического фермента.

Т. ХВОСТА́ТЫЙ (t. caudatus) — длинный пристеночный Т., часть к-рого свободно расположена в просвете сосуда.

Т. ЧЕРВЕОБРА́ЗНЫЙ (t. vermiformis) — 1) длинный Т., прикрепленный к сосудистой стенке лишь в начальной части, причем остальная часть, изгибаясь под влиянием тока крови, приобрела червеобразную форму; 2) свободный Т. ствола и (или) ветвей легочной артерии, имеющий червеобразную форму.

Т. ШАРОВИ́ДНЫЙ (t. sphaeroideus) — свободный Т., имеющий форму шара; обнаруживается гл. обр. в полости предсердия.

Т. ЭРИТРОЦИТА́РНЫЙ (t. erythrocytarius) — см. *Тромб красный.*

ТРОМБ ЖЁЛЧНЫЙ (thrombus biliaris) — сгусток желчи, образовавшийся в просвете внутрипеченочного желчного протока при обтурационной желтухе.

ТРОМБ ЭКСТРАВАСКУЛЯ́РНЫЙ (нрк; thrombus extravascularis; лат. extra вне + vasculum, уменьшит. от vas сосуд) — небольшая организующаяся периваскулярная гематома.

ТРОМБ- (тромбо-; греч. thrombos сгусток, сгусток крови, тромб) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «относящийся к тромбу, к тромбообразованию»; 2) «относящийся к тромбоцитам».

ТРОМБА́ЗА — см. *Тромбин.*

ТРОМБАНГИ́ИТ КО́ЖНО-КИШЕ́ЧНЫЙ ДИССЕМИНИ́РОВАННЫЙ (thrombangiitis cutaneointestinalis disseminata; *тромб-* + *ангиит*) — см. *Дегоса синдром.*

ТРОМБАНГИ́ИТ ОБЛИТЕРИ́РУЮЩИЙ (thrombangiitis obliterans) — см. *Бюргера болезнь.*

ТРОМБАНГИО́З ОБЛИТЕРИ́РУЮЩИЙ (thrombangiosis obliterans; *тромб-* + греч. angeion сосуд + *-оз*) — см. *Эндартериит облитерирующий.*

ТРОМБАРТЕРИ́ИТ (thrombarteriitis; *тромб-* + *артериит*) — воспаление артерии, сопровождающееся тромбозом или вызванное им.

Т. ИНФЕКЦИО́ННЫЙ (t. infectiosa) — Т., развивающийся вследствие распространения возбудителей гнойной инфекции с инфицированного тромба на стенку артерии.

ТРОМБАРТЕРИЭКТО́МИЯ (thrombarteriectomia; *тромб-* + *артерия* + *эктомия*) — см. *Тромбэндартериэктомия.*

ТРОМБАСТЕ́НИЯ ГЛА́НЦМАННА — см. *Гланцманна — Негели болезнь.*

ТРОМБАФЕРЕ́З (*тромб-* + греч. aphairesis отнятие, взятие) — выделение тромбоцитов из цельной крови; вид плазмоцитафереза.

Т. ДО́НОРСКИЙ — Т. крови донора, производимый для лечебных целей.

Т. ЛЕЧЕ́БНЫЙ — Т. крови больного лейкозом с целью удаления избыточного количества тромбоцитов.

ТРОМБИДИА́З (trombidiasis; устар. зоол. Trombidium род клещей + *-иаз*; син.: болезнь крыжовниковая, эритема сонная) — дерматозооноз, вызываемый клещом Leptus autumnalis, характеризующийся возникновением зудящих воспалительных пятен, узелков и папуловезикул.

ТРОМБИ́Н (син.: тромбаза, фибрин-фермент) — протеолитический фермент гликопротеидной природы, образующийся в плазме крови из протромбина; превращает фибриноген в фибрин; может применяться в качестве местного кровоостанавливающего средства.

ТРОМБИ́НОВОЕ ВРЕ́МЯ — показатель активности антитромбинов крови; определяется по продолжительности свертывания исследуемой плазмы (до образования сгустка) после добавления к ней стандартного раствора тромбина.

ТРОМБО- — см. *Тромб-.*

ТРОМБОАГГЛЮТИНА́ЦИЯ [thromboagglutinatio; *тромбо*(*цит*) + *агглютинация*] — агглютинация тромбоцитов при взаимодействии их с сыворотки крови, содержащей соответствующие антитела.

ТРОМБОАГГЛЮТИНИ́НЫ [*тромбо*(*цит*) + *агглютинины*] — см. *Антитела тромбоагглютинирующие.*

ТРОМБОВАСКУЛИ́Т (thrombovasculitis; *тромбо-* + *васкулит*) — воспаление стенки кровеносного сосуда, сопровождающееся тромбозом.

ТРОМБОГЕ́Н (нрк) — см. *Фактор II.*

ТРОМБО́З (thrombosis; *тромб-* + *-оз*) — процесс образования тромба (тромбов).

Т. ВНУТРИСТЕ́НОЧНЫЙ (t. intramuralis) — см. *Тромбоз интрамуральный.*

Т. ИНТРАМУРА́ЛЬНЫЙ (t. intramuralis; син. Т. внутристеночный) — Т., начинающийся со свертывания фибрина во внутренней стенке сосуда, напр. при распаде атеросклеротической бляшки.

Т. ОБТУРИРУЮЩИЙ (t. obturatoria) — Т. с образованием закупоривающего тромба.

Т. ПАРИЕТА́ЛЬНЫЙ (t. parietalis; син. Т. пристеночный) — Т. с образованием пристеночных тромбов.

Т. ПЕЧЕ́НОЧНЫХ ВЕ́Н ПЕРВИ́ЧНЫЙ — см. *Киари болезнь.*

Т. ПРИСТЕ́НОЧНЫЙ — см. *Тромбоз париетальный.*

Т. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ ПОДКЛЮЧИ́ЧНОЙ ВЕ́НЫ — см. *Педжета — Шреттера синдром.*

Т. УСИ́ЛИЯ — см. *Педжета — Шреттера синдром.*

ТРОМБОКАПИЛЛЯ́РИТ (thrombocapillaritis; *тромбо-* + *капилляр* + *-ит*) — воспаление капилляров, сопровождающееся их тромбозом.

ТРОМБОКАТАЛИЗИ́Н — см. *Фактор VIII.*

ТРОМБОКИНА́ЗА ТКАНЕВА́Я — см. *Фактор III.*

ТРОМБОПАТИ́Я ХРОНИ́ЧЕСКАЯ (thrombopathia chronica; *тромбо-* + греч. pathos страдание, болезнь) — см. *Тромбофлебит мигрирующий.*

ТРОМБОПЕНИ́Я [thrombopenia; *тромбо*(*цит*) + греч. penia бедность, недостаток] — см. *Тромбоцитопения.*

ТРОМБОПЕНИ́Я ЭССЕНЦИА́ЛЬНАЯ ФРА́НКА — см. *Псевдогемофилия печеночная.*

ТРОМБОПИЛЕФЛЕБИ́Т (thrombopylephlebitis; *тромбо-* + *пилефлебит*) — тромбофлебит воротной вены.

ТРОМБОПЛАСТИ́Н КРОВЯНО́Й — см. *Фактор 3 тромбоцитов.*

ТРОМБОПЛАСТИ́Н ТКАНЕВО́Й — см. *Фактор III.*

ТРОМБОПЛАСТИНОГЕ́Н — см. *Фактор VIII.*

ТРОМБОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ КОМПОНЕ́НТ ПЛА́ЗМЫ (*тромбо-* + греч. plastikē формирование, образование) — см. *Фактор VIII.*

ТРОМБОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ ФА́КТОР ПЛА́ЗМЫ — см. *Фактор VIII.*

ТРОМБОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ ФА́КТОР ПЛА́ЗМЫ А — см. *Фактор VIII.*

ТРОМБОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ ФА́КТОР ПЛА́ЗМЫ В — см. *Фактор IX.*

ТРОМБОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ ФА́КТОР ПЛАСТИ́НОК — см. *Фактор 3 тромбоцитов.*

ТРОМБОСТЕНИ́Н (*тромбо-* + греч. stenoō стягивать, сжимать) — см. *Фактор 6 тромбоцитов.*

ТРОМБОТЕ́СТ КОТО́ВЩИКОВОЙ (*тромбо-* + англ. test испытание, исследование) — см. *Котовщиковой метод.*

ТРОМБОТЕ́СТ О́ВРЕНА — см. *Оврена тромботест.*

ТРОМБОФИЛИ́Я (thrombophilia; *тромбо-* + греч. philia любовь, склонность) — патологическое состояние, характеризующееся значительным повышением свертываемости крови; проявляется признаками тромбоза.

ТРОМБОФЛЕБИ́Т (thrombophlebitis; *тромбо-* + *флебит*) — воспаление вены с ее тромбозом.

Т. МИГРИ́РУЮЩИЙ (t. migrans; син.: политромбофлебит, тромбопатия хроническая, флебит мигрирующий) — хронический рецидивирующий Т. поверхностных вен конечностей, при к-ром воспалительный процесс неоднократно перемещается с одного участка вены на другой.

Т. ПОСЛЕРОДОВО́Й (t. puerperalis) — Т. у родильниц, иногда возникающий при расстройствах кровообращения в малом тазу и нижних конечностях.

ТРОМБОЦИ́Т (thrombocytus; *тромбо-* + гист. cytus клетка; син.: Биццоцеро бляшка, кровяная пластинка) — форменный элемент крови овальной или круглой формы, являющийся цитоплазматическим осколком мегакариоцита костного мозга; принимает участие в процессе свертывания крови.

ТРОМБОЦИТАСТЕНИ́Я (thrombocytasthenia; *тромбоцит* + *астения*) — см. *Гланцманна — Негели болезнь.*

ТРОМБОЦИТЕМИ́Я (thrombocytaemia; *тромбоцит* + греч. haima кровь) — см. *Тромбоцитоз*.

ТРОМБОЦИТОАКТИВИ́РУЮЩИЕ ФА́КТОРЫ — медиаторы аллергических реакций немедленного типа; представляют собой фосфолипиды, продуцируемые базофильными гранулоцитами и тучными клетками; при участии макроэргических соединений, не повреждая тромбоцитов, вызывают их агрегацию, сопровождающуюся освобождением серотонина и гистамина.

ТРОМБОЦИТОБАРИ́НЫ — иммунные антитела у больных вшиным возвратным тифом, обусловливающие нагрузку спирохет тромбоцитами в ходе реакции Риккенберга — Брусина.

ТРОМБОЦИТОГРА́ММА (*тромбоцит* + греч. gramma запись) — выраженное в процентах распределение тромбоцитов по морфологическим признакам и степени зрелости (юные, зрелые, дегенеративные).

ТРОМБОЦИТОДИСТРОФИ́Я (thrombocytodystrophia; *тромбоцит* + *дистрофия*; син. Бернара — Сулье болезнь) — наследственный геморрагический диатез, при к-ром наблюдается увеличение размеров тромбоцитов и нек-рое укорочение продолжительности их жизни при нормальной продукции мегакариоцитов; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

ТРОМБОЦИТО́З (thrombocytosis; *тромбоцит* + *-оз*; син. тромбоцитемия) — увеличенное содержание тромбоцитов в периферической крови; наблюдается, напр., при обширных травмах, а также нек-рых лейкозах.

ТРОМБОЦИТО́ЛИЗ (thrombocytolysis; *тромбоцит* + греч. lysis распад, разрушение) — процесс распада тромбоцитов.

ТРОМБОЦИТОЛИЗИ́Н — см. *Фактор VIII*.

ТРОМБОЦИТОПАТИ́Я (thrombocytopathia; *тромбоцит* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название геморрагических диатезов, обусловленных качественной неполноценностью тромбоцитов.

Т. ГЕ́МОРРАГИ́ЧЕСКАЯ (t. haemorrhagica; син. Т. наследственная) — семейно-наследственная Т., обусловленная недостаточностью фактора 3 тромбоцитов, что приводит к нарушению свертывания крови.

Т. КОНСТИТУЦИОНА́ЛЬНАЯ (t. constitutionalis) — см. *Ангиогемофилия*.

Т. НАСЛЕ́ДСТВЕННАЯ (t. hereditaria) — см. *Тромбоцитопатия геморрагическая*.

ТРОМБОЦИТОПЕНИ́ЧЕСКИЙ ТЕСТ — провокационная проба, при к-рой показателем сенсибилизации организма служит снижение содержания тромбоцитов в периферической крови после введения аллергена.

ТРОМБОЦИТОПЕНИ́Я (thrombocytopenia; *тромбоцит* + греч. penia бедность, недостаток; син. тромбопения) — пониженное содержание тромбоцитов в периферической крови.

Т. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКАЯ (t. allergica) — Т., возникающая как проявление лекарственной аллергии.

Т. АУТОИММУ́ННАЯ (t. autoimmunis; греч. autos сам + *иммунный*) — Т., обусловленная выработкой антител против собственных тромбоцитов.

Т. СИМПТОМАТИ́ЧЕСКАЯ (t. symptomatica) — Т., развивающаяся вследствие угнетения мегакариоцитарного ростка, напр. при инфекциях, интоксикациях, тиреотоксикозе.

Т. ТРАНСИММУ́ННАЯ (t. transimmunis; лат. trans через + *иммунный*) — Т. у новорожденных, обусловленная проникновением аутоантител больной матери через плаценту.

ТРОМБОЦИТОПО́Э́З (thrombocytopoëses; *тромбоцит* + греч. poiësis выработка, образование) — процесс образования тромбоцитов.

ТРОМБОЭЛАСТОГРА́ММА (*тромбо-* + греч. elastos тягучий + gramma запись, графическое изображение) — кривая, отображающая динамику свертывания крови по изменению ее вязкости и упругоэластических свойств образующегося сгустка; характеризует процесс образования тромба, механические свойства фибрина, процесс фибринолиза.

ТРОМБОЭЛАСТО́ГРАФ (*тромбо-* + греч. elastos тягучий + graphō писать, изображать; син. гемокоагулограф механический) — прибор для визуального наблюдения процесса свертывания крови, а также графической регистрации изменений ее вязкости и упругоэластических свойств образующегося сгустка.

ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИ́Я (*тромбо-* + греч. elastos тягучий + graphō писать, изображать) — графическая регистрация спонтанного свертывания венозной крови с помощью тромбоэластографа.

ТРОМБОЭЛАСТО́МЕТР (*тромбо-* + греч. elastos тягучий + metreō измерять; син.. гемокоагулометр) — электронный прибор с цифровым индикатором для автоматического измерения времени свертывания крови и площади тромбоэластограммы.

ТРОМБОЭМБОЛИ́Я (thromboembolia; *тромбо-* + *эмболия*) — эмболия сосуда оторвавшимися частями тромба.

ТРОМБОЭМБОЛИ́Я ЛЁГОЧНОЙ АРТЕ́РИИ (thromboembolia arteriae pulmonalis) — синдром, обусловленный эмболией легочного ствола или его ветвей тромбом, характеризующийся резким нарушением кровообращения и внешнего дыхания, а при перекрытии небольших ветвей — симптомами образования геморрагических инфарктов легкого.

ТРОМБОЭНДОКАРДИ́Т (thromboendocarditis; *тромбо* + *эндокардит*) — образование пристеночных тромбов в полостях сердца, обусловленное нарушением целости эндокарда, гл. обр. при его воспалении.

Т. КЛАПА́ННЫЙ (t. valvularis) — Т., характеризующийся отложением тромбов на клапанах сердца.

Т. ПАРИЕТА́ЛЬНЫЙ (t. parietalis) — см. *Тромбоэндокардит пристеночный*.

Т. ПРИСТЕ́НОЧНЫЙ (t. parietalis; син. Т. париетальный) — Т., характеризующийся отложением тромбов на стенке полостей сердца, а не на клапанах.

Т. ПРИСТЕ́НОЧНЫЙ АБАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ (t. parietalis abacterialis; син. эндокардит пристеночный абактериальный) — Т. п. неинфекционной природы; возникает, как правило, при трансмуральном или субэндокардиальном инфаркте миокарда.

ТРОМБЭКТОМИ́Я (thrombectomia; *тромб-* + *эктомия*) — хирургическая операция извлечение тромба из кровеносного сосуда.

ТРОМБЭНДАРТЕРИЭКТОМИ́Я (thrombendarteriectomia; *тромб-* + *эндартериэктомия*; син.: атеромэндартериэктомия, интимотромбэктомия, тромбартериэктомия) — хирургическая операция: удаление пристеночного тромба вместе с соответствующим участком внутренней оболочки тромбированной артерии.

ТРОМОМАНИ́Я (tromomania; греч. tromos дрожь + *мания*) — см. *Делирий алкогольный*.

ТРОМОФОБИ́Я (tromophobia; греч. tromos дрожь + *фобия*; син. тремофобия) — навязчивый страх — боязнь появления дрожания при посторонних лицах.

ТРОП- (тропо-; греч. tropos поворот, направление, способ или образ действия) — составная часть сложных слов, означающая «направленность действия», «способ или образ действия».

ТРОПИ́ЗМ (tropismus; греч. tropos поворот, направление) — реакция животного, растения или отдельной клетки: ориентирование положения тела, направления роста или движения относительно раздражителя (светового, химического и др.).

ТРОПИ́ЗМ МИКРООРГАНИ́ЗМОВ (греч. tropos поворот, направление) — избирательная локализация микробов в определенных клетках или тканях.

ТРОПИ́НЫ (греч. tropos поворот, направление) — см. *Бактериотропины*.

ТРОПО- — см. *Троп-*.

ТРОПОКОЛЛАГЕ́Н (истор.; *тропо-* + *коллаген*) — структурная единица коллагенового волокна, представляющая собой палочковидное образование длиной около 300 *нм* и толщиной около 1,5 *нм* с молекулярной массой около 300 000; в наст. время отождествлен с молекулой белка коллагена.

ТРОПОСКО́П (*тропо-* + греч. skopeō наблюдать, исследовать) — см. *Синоптофор*.

ТРО́ТТЕРА БОКОВА́Я ФАРИНГОТОМИ́Я (W. B. L. Trotter, 1871—1939, англ. хирург) — хирургическая операция: вскрытие полости глотки при опухоли ее нижнего отдела, заключающаяся в обнажении боковой стенки гортани и глотки разрезом, проведенным вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, с последующей резекцией пластинки щитовидного хряща вместе с верхним и большим рогом подъязычной кости, после чего продольно рассекают боковую стенку глотки.

ТРО́ТТЕРА СИНДРО́М (W. B. L. Trotter, син. Траттера триада) — сочетание односторонней боли в нижней челюсти, языке и ухе, односторонней глухоты и ограничения подвижности мягкого неба при опухоли носовой части глотки, обусловленное сдавлением нижнечелюстного нерва.

ТРО́ТТЕРА ТРИА́ДА (W. B. L. Trotter) — см. *Троттера синдром*.

ТРОФ- (трофо-; греч. trophē питание)— составная часть сложных слов, означающая «относящийся к питанию», «связанный с питанием».

ТРОФЕДЕ́МА (*троф-* + греч. oidēma припухлость, опухоль) — хронический местный отек неизвестной этиологии, локализующийся чаще на лице; реци-

дивы Т. приводят к стойкому утолщению кожи и подлежащих мягких тканей.

ТРО́ФИКА (греч. trophē питание) — совокупность процессов клеточного питания, обеспечивающих сохранение структуры и функции ткани или органа.

ТРО́ФИКА НЕ́РВНАЯ — регуляция трофики тканей, осуществляемая нервной системой.

ТРОФИ́ЧЕСКАЯ ЦЕПЬ — см. *Цепь питания.*

ТРОФО- — см. *Троф-.*

ТРОФОБЛА́СТ (trophoblastus; *трофо-* + греч. blastos росток, зародыш; син. трофэктодерма) — наружный слой клеток у зародышей млекопитающих, возникающий на стадии бластоцисты; обеспечивает контакт зародыша с материнским организмом; участвует в имплантации зародыша в стенку матки и образовании плаценты.

ТРОФОБЛАСТИ́ЧЕСКИЕ ЛАКУ́НЫ (lacunae trophoblasticae) — полости в толще трофобласта, сообщающиеся друг с другом и с кровеносными лакунами слизистой оболочки матки; существуют до появления ворсинок хориона.

ТРОФОБЛАСТОЦИ́ТЫ (trophoblastocyti; *трофобласт* + гист. cytus клетка) — клетки цитотрофобласта; во второй половине беременности вырабатывают хорионический гонадотропин.

ТРОФОДЕ́РМА (trophoderma; *трофо-* + греч. derma кожа) — стенка бластоцисты, образованная трофобластом и подстилающим его париетальным листком мезодермы.

ТРОФОЗО́ИТ (*трофо-* + греч. zōon живое существо) — см. *Вегетативная форма.*

ТРОФОНЕВРО́З (устар.; trophoneurosis; *трофо-* + *невроз*) — общее название нарушений трофики, обусловленных поражением вегетативной нервной системы (пролежни, прободная язва стопы, гемиатрофия лица и др.).

ТРОФЭКТОДЕ́РМА (trophoectoderma; *троф-* + *эктодерма*) — см. *Трофобласт.*

ТРОХАНТЕРИ́Т (trochanteritis; анат. trochanter вертел + *-ит*) — остит, чаще туберкулезной этиологии, локализующийся в большом вертеле бедренной кости.

ТРОХА́НТЕРНЫЙ И́НДЕКС — антропометрический показатель, представляющий собой отношение высоты тела к длине ноги от площади опоры до большого вертела; коррелирует с темпами полового созревания и индивидуально-типовой характеристикой конституции обследуемых.

ТРОХО- (греч. trochos колесо, круг) — составная часть сложных слов, означающая «имеющий округлую форму», «вращающийся».

ТРОХОСКО́П (*трохо-* + греч. skopeō наблюдать, исследовать) — рентгенологический стол для проведения трохоскопии.

ТРОХОСКОПИ́Я (*трохо-* + греч. skopeō наблюдать, исследовать) — рентгенологическое исследование в положении лежа, при к-ром пучок рентгеновского излучения направлен вертикально снизу вверх.

ТРОХОЦЕФАЛИ́Я (trochocephalia; *трохо-* + греч. kephalē голова) — аномалия развития, характеризующаяся формированием круглой головы.

ТРОЯ́НОВА ИГЛОДЕРЖА́ТЕЛЬ (А. А. Троянов, 1849—1916, отеч. хирург) — инструмент для удержания хирургических игл при наложении швов, характеризующийся тем, что фиксирующая кремальера расположена на конечной части рукояток и расстегивание ее осуществляется V пальцем руки.

ТРОЯ́НОВА ОПЕРА́ЦИЯ (А. А. Троянов) — хирургическая операция: перевязка большой подкожной вены ноги у места впадения ее в бедренную вену; производится при варикозном расширении вен.

ТРОЯ́НОВА ТРАНСПЛЕВРА́ЛЬНЫЙ ДО́СТУП (истор.; А. А. Троянов) — оперативный доступ через плевральную полость и диафрагму для вскрытия поддиафрагмального абсцесса.

ТРОЯ́НОВА — ТРЕНДЕЛЕНБУ́РГА ПРО́БА (А. А. Троянов, 1849—1916, отеч. хирург; E. Trendelenburg, 1844—1924, нем. хирург) — см. *Тренделенбурга — Троянова проба.*

ТРУАЗЬЕ́ — АНО́ — ШОФФА́РА СИНДРО́М (Ch. E. Troisier, 1844—1919, франц. врач; V. Ch. Hanot, 1844—1896, франц. врач; A. M. E.Chauffard, 1855—1932, франц. врач) — см. *Гемохроматоз.*

ТРУ́БКА АСПИРАЦИО́ННАЯ — приспособление для отсасывания жидкостей и полужидких масс из полостей тела человека, представляющее собой гибкую или изогнутую жесткую трубку, снабженную устройством для соединения с отсасывающим аппаратом.

ТРУ́БКА ИНТУБАЦИО́ННАЯ — приспособление в виде трубки особой формы, изготовленной из резины или пластмассы, реже из металла, предназначенное для введения в гортань, трахею или бронхи с целью восстановления или улучшения проходимости дыхательных путей или для проведения ингаляционного наркоза.

ТРУ́БКА ПЫЛЕВА́Я — стеклянная трубка с притертыми пробками, заполненная ватой, предназначенная для определения запыленности воздуха по увеличению веса (массы) Т. п. после просасывания через нее определенного объема исследуемого воздуха.

ТРУ́БКА ТРАХЕОТОМИ́ЧЕСКАЯ (син. канюля трахеотомическая) — приспособление, вставляемое в рану трахеи при трахеотомии, состоящее из двух изогнутых металлических трубок, входящих одна в другую.

ТРУ́БНАЯ ВЕТВЬ (ramus tubarius, PNA, BNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *795.*

ТРУ́БНЫЙ ВА́ЛИК (torus tubarius, PNA, BNA, JNA) — возвышение в носовой части глотки, в к-ром расположен хрящ слуховой (евстахиевой) трубы.

ТРУБОНЁБНАЯ СКЛА́ДКА (plica salpingopalatina, PNA, BNA; plica palatotubalis, JNA) — складка слизистой оболочки, идущая от глоточного отверстия слуховой (евстахиевой) трубы к мягкому небу.

ТРУ́БЧАТЫЙ СТЕ́БЕЛЬ — см. *Филатова стебель.*

ТРУД — целесообразная деятельность человека, направленная на удовлетворение личных и общественных потребностей; физиология и гигиена Т. занимают важное место в советской медицине и здравоохранении.

Т. УМСТВЕННЫЙ — Т., характеризующийся преобладанием психической нагрузки над физической (мышечной) нагрузкой.

Т. ФИЗИ́ЧЕСКИЙ — Т., характеризующийся преобладанием физической (мышечной) нагрузки над психической нагрузкой.

ТРУДОВА́Я НАГРУ́ЗКА — см. *Рабочая нагрузка.*

ТРУДОВО́Е УСТРО́ЙСТВО ИНВАЛИ́ДОВ (син. трудоустройство инвалидов) — предоставление инвалидам специально подобранных видов работ и производственных условий, позволяющих им трудиться в соответствии с состоянием здоровья и накопленным профессиональным опытом.

ТРУДОВЫ́Е МАСТЕРСКИ́Е в психиатрии — см. *Лечебно-производственные мастерские.*

ТРУДОСПОСО́БНОСТЬ — совокупность физических и духовных возможностей человека (зависящих от состояния его здоровья), позволяющих ему заниматься трудовой деятельностью.

ТРУДОТЕРАПИ́Я — см. *Терапия трудовая.*

ТРУДОУСТРО́ЙСТВО ИНВАЛИ́ДОВ — см. *Трудовое устройство инвалидов.*

ТРУ́НЕЧЕКА СИМПТО́М (K. Truneček, род. в 1865 г., чешский врач) — усиленная пульсация подключичной артерии в области прикрепления грудиноключично-сосцевидной мышцы; наблюдается при атеросклерозе аорты, аневризме подключичной артерии.

ТРУНЦИ́Т (truncitis; анат. truncus ствол + *-ит*) — воспаление симпатического ствола; проявляется жгучими болями, парестезиями, гипергидрозом, иногда гиперемией в соответствующей зоне иннервации.

ТРУП (cadaver) — тело человека (животного) после его биологической смерти.

ТРУ́ПНАЯ ФА́УНА — совокупность животных, обитающих на трупе и способствующих его разрушению.

ТРУ́ПНАЯ ФЛО́РА — совокупность растений, произрастающих на тканях трупа и способствующих его разрушению.

ТРУ́ПНОЕ ВЫСЫХА́НИЕ — см. *Мумификация.*

ТРУ́ПНОЕ ОКОЧЕНЕ́НИЕ (rigor mortis) — процесс посмертного уплотнения скелетных мышц и гладкой мускулатуры внутренних органов.

Т. О. КАТАЛЕПТИ́ЧЕСКОЕ (r. m. catalepticus) — Т. о., развивающееся тотчас после наступления смерти в результате значительного повреждения продолговатого мозга или подкорковых областей головного мозга; фиксирует то положение человека, в к-ром он находился в момент остановки сердца.

ТРУ́ПНОЕ ОХЛАЖДЕ́НИЕ — процесс понижения температуры трупа до уровня температуры окружающей среды.

ТРУ́ПНОЕ РАЗЛОЖЕ́НИЕ (decompositio cadaverina) — процесс разрушения органов и тканей трупа под действием собственных протеолитических ферментов и ферментов, вырабатываемых микроорганизмами.

ТРУ́ПНЫЕ ГА́ЗЫ — газы, образующиеся при гниении трупа.

ТРУ́ПНЫЕ ИЗМЕНЕ́НИЯ — общее название морфологических изменений, происходящих в организме после наступления смерти.

ТРУ́ПНЫЕ ПЯ́ТНА (livores mortis) — пятна на коже трупа, образующиеся в результате посмертного стекания крови в нижележащие отделы, переполнения и расширения сосудов кожи и пропитывания кровью окружающих сосуды тканей.

ТРУ́ПНЫЙ ВОСК — см. *Жировоск.*

ТРУССО́ ГИДРОЦЕФАЛИ́ЧЕСКИЙ КРИК (A. Trousseau, 1801—1867, франц. врач) — см. *Гидроцефалический крик.*

ТРУССО́ СИМПТО́М (A. Trousseau)— 1) (син. Труссо феномен) — тоническая судорога кисти, возникающая в ответ на давление в области нервно-сосудистого пучка на плече; признак спазмофилии или тетании; 2) развитие острого тромбофлебита крупных вен при раке внутренних органов.

ТРУССО́ ФЕНО́МЕН (A. Trousseau)— см. *Труссо симптом* [1].

ТРУЭ́ЛЛЯ — ЖЮНЕ́ СИНДРО́М (N. A. Troell, 1881—1954, шведский врач; R. M. Gunet, совр. швейц. врач; син. гипертиреоз акромегалоидный с гиперостозом) — сочетание диффузного гиперостоза свода черепа, акромегалии и признаков гиперфункции щитовидной железы, обусловленное увеличенной секрецией аденогипофизом соматотропного и тиреотропного гормонов.

ТРЮ́КА ОПЕРА́ЦИЯ (H. Truc, 1857—1929, франц. офтальмолог) — хирургическая операция: восстановление нижнего свода конъюнктивального мешка при отсутствии глаза лоскутом кожи, взятым с виска.

ТСУТСУГАМУ́ШИ (нрк) — см. *Цуцугамуши.*

ТТГ — см. *Гормон тиреотропный.*

ТУАЛЕ́Т РА́НЫ (франц. toilette омовение, промывание, очистка) — очистка окружности раны, ее краев, стенок и дна с использованием средств физической и химической антисептики без применения режущих инструментов.

ТУБА́Ж НЕ́РВА (франц. tubage, от лат. tuba труба) — обкладывание нервного ствола после невролиза муфтой из гомо- или гетеропластического материала с целью профилактики рубцовых сращений.

ТУБЕРКУЛ- (туберкуло-; лат. tuberculum бугорок, уменьшительное от tuber бугор) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «бугорок», «узелок»; 2) «относящийся к туберкулезу».

ТУБЕ́РКУЛ МИЛИА́РНЫЙ (tuberculum miliare; лат. milium просо) — небольшой очаг творожистого некроза, представляющий собой группу некротизированных туберкулезных гранулем.

ТУБЕ́РКУЛ СОЛИТА́РНЫЙ (t. solitarium; лат. solitarius одинокий, одиночный) — одиночный очаг творожистого некроза в каком-либо внутреннем органе, развившийся в результате слияния мелких участков некроза.

ТУБЕРКУЛЁЗ (tuberculosis; *туберкул-* + *-оз*; син. бугорчатка — устар.)— инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями туберкулеза и характеризующаяся образованием специфических гранулем в различных органах и тканях (чаще в легких) и полиморфной клинической картиной.

Т. АКТИ́ВНЫЙ (t. activa) — фаза Т., характеризующаяся наличием выраженных признаков болезни.

Т. ВТОРИ́ЧНЫЙ (t. secundaria; син. Т. послепервичный) — Т., развивающийся у лиц, перенесших первичный Т. и выработавших к нему относительную устойчивость.

Т. КО́ЖИ (t. cutis) — общее название патологических изменений кожи при Т.

Т. КО́ЖИ БОРОДА́ВЧАТЫЙ (t. cutis verrucosa; син.: Андерсона веррукозный люпус, Риля — Пальтауфа бородавчатый туберкулез кожи) — Т. к., характеризующийся образованием преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей плотных, синевато-красных, медленно растущих, сливающихся папул с очагами грубого ороговения в центральной части их поверхности; возникает чаще при попадании возбудителя на кожу людей, уже болеющих Т.

Т. КО́ЖИ ИНДУРАТИ́ВНЫЙ (t. cutis indurativa; лат. induratio, затвердение, уплотнение; син.: Базена болезнь, эритема индуративная) — Т. к., характеризующийся образованием плотных, округлых, почти безболезненных подкожных узлов синевато-фиолетового цвета на голенях, реже на бедрах; наблюдается у женщин, преимущественно молодых, при гематогенной диссеминации возбудителя.

Т. КО́ЖИ ИНДУРАТИ́ВНЫЙ ЯЗВЕ́ННЫЙ (t. cutis indurativa ulcerosa; син. Гетчинсона язвенный индуративный туберкулез кожи) — разновидность Т. к. и., при к-рой в центральной части узлов образуются язвы с ровными краями и серозно-гнойным отделяемым.

Т. КО́ЖИ КОЛЛИКВАТИ́ВНЫЙ (t. cutis colliquativa; син. скрофулодерма) — Т. к., характеризующийся образованием в толще кожи и подкожной жировой клетчатке (на шее и конечностях) подвижных, округлых, плотных малоболезненных узлов, постепенно спаивающихся с кожей и вскрывающихся с образованием язв с подрытыми краями и гнойно-некротическим дном; наблюдается при генерализации инфекции.

Т. КО́ЖИ ЛИХЕНО́ИДНЫЙ (t. cutis lichenoidea; *лихен* + греч.-eidēs подобный; син.: лишай золотушных — устар., скрофулодерма милиарная, туберкулодермия микропапулезная, фолликулит золотушных) — Т. к., характеризующийся появлением (преимущественно на туловище) сгруппированных в кольца и дуги или рассеянных множественных мелких папул желто-коричневого цвета; наблюдается при гематогенной диссеминации возбудителя.

Т. КО́ЖИ ЛИЦА́ МИЛИА́РНЫЙ ДИССЕМИНИ́РОВАННЫЙ (t. cutis miliaris disseminata faciei; син.: волчанка обыкновенная диссеминированная милиарная лица, Фокса волчанка фолликулярная диссеминированная) — Т. к., характеризующийся образованием на коже лица несливающихся мягких полушаровидных милиарных узелков красновато-коричневатого цвета, в к-рых обнаруживаются феномен «яблочного желе» и положительная проба зондом Поспелова; наблюдается при гематогенной диссеминации возбудителя.

Т. КО́ЖИ ЛЮПО́ЗНЫЙ (t. cutis luposa) — см. *Волчанка обыкновенная.*

Т. КО́ЖИ ПАПУЛОНЕКРОТИ́ЧЕСКИЙ (t. cutis papulonecrotica; син.: акнит, Гамбургера туберкулоид, туберкулоид папулонекротический) — Т. к., характеризующийся появлением на разгибательных поверхностях конечностей плотных бледно-красных папул, некротизирующихся в центре с образованием рубцующихся язвочек; наблюдается при гематогенной диссеминации возбудителя.

Т. КО́ЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛО́ЧЕК МИЛИА́РНЫЙ ЯЗВЕ́ННЫЙ [t. cutis (mucosae) miliaris ulcerosa; син. язва туберкулезная вторичная] — Т., характеризующийся появлением на слизистых оболочках полости рта, носа, прямой кишки, наружных половых органах и на прилежащих участках кожи множества мелких плотных узелков красного цвета, нагнаивающихся и вскрывающихся с образованием болезненных кровоточащих сливающихся язв, по периферии к-рых расположены точки Трела; наблюдается при ранней гематогенной диссеминации возбудителя.

Т. КО́ЖИ ЯЗВЕ́ННЫЙ ПЕРВИ́ЧНЫЙ (t. cutis ulcerosa primaria) — Т. к., характеризующийся формированием в месте внедрения возбудителя язвы с неровными краями и грязно-серым дном, а также развитием регионарного гнойного лимфаденита; наблюдается у детей в случае первичного заражения через поврежденную кожу.

Т. КОСТЕ́Й И СУСТА́ВОВ — см. *Туберкулез костно-суставной.*

Т. КО́СТНО-СУСТА́ВНОЙ (t. osseoarticularis; син.: артрит туберкулезный, полиартрит туберкулезный, Т. костей и суставов) — форма Т. с преимущественным поражением костей и суставов, характеризующаяся длительным течением с возникновением очагов творожистого некроза в эпифизах и метафизах, разрушением суставных хрящей, образованием наружных свищей.

Т. ЛАТЕ́НТНЫЙ (устар.; t. latens)— см. *Интоксикация туберкулезная хроническая.*

Т. ЛЁГКИХ (t. pulmonum) — форма Т., характеризующаяся преимущественной локализацией патологического процесса в легких.

Т. ЛЁГКИХ ДИССЕМИНИ́РОВАННЫЙ (t. pulmonum disseminata) — клиническая форма Т. л., характеризующаяся двусторонней локализацией, однотипностью и симметричностью патологических изменений в легких; наблюдается при лимфогенной и гематогенной диссеминации возбудителя.

Т. ЛЁГКИХ ИНФИЛЬТРАТИ́ВНО-ПНЕВМОНИ́ЧЕСКИЙ (t. pulmonum infiltrativa pneumonica) — см. *Туберкулез легких инфильтративный.*

Т. ЛЁГКИХ ИНФИЛЬТРАТИ́ВНЫЙ (t. pulmonum infiltrativa; син. Т. легких инфильтративно-пневмонический) — клиническая форма Т. л., характеризующаяся возникновением в легких очага экссудативного воспаления, обычно с творожистым некрозом в центре.

Т. ЛЁГКИХ КАВЕРНО́ЗНЫЙ (t. pulmonum cavernosa) — клиническая форма Т. л., характеризующаяся образованием тонкостенной каверны

при малоизмененной остальной ткани легкого.

Т. ЛЁГКИХ ОЧАГО́ВЫЙ (t. pulmonum focalis) — клиническая форма Т. л., характеризующаяся развитием ограниченных очагов воспаления.

Т. ЛЁГКИХ ФИБРО́ЗНО-КАВЕРНО́ЗНЫЙ (t. pulmonum fibrosa cavernosa) — клиническая форма Т. л., характеризующаяся образованием каверн с фиброзными изменениями в легких и утолщением плевры.

Т. ЛЁГКИХ ФИБРО́ЗНО-ОЧАГО́ВЫЙ (t. pulmonum fibrosa focalis) — очаговый Т. л., при к-ром очаги воспаления подвергаются фиброзу; ныне в отдельную форму Т. л. не выделяют.

Т. ЛЁГКИХ ЦИРРОТИ́ЧЕСКИЙ (t. pulmonum cirrhotica) — клиническая форма Т. л., возникающая как исход заболеваний с обширным поражением ткани легких и характеризующаяся развитием массивного фиброза.

Т. ЛИМФАТИ́ЧЕСКИЙ ДЮФУРА — см. *Интоксикация туберкулезная хроническая.*

Т. МИЛИА́РНЫЙ (устар.; t. miliaris) — форма Т., развивающаяся при гематогенной диссеминации возбудителя и характеризующаяся тяжелым острым течением с образованием во всех органах мелких туберкулезных бугорков.

Т. НЕАКТИ́ВНЫЙ (t. inactiva) — фаза Т., характеризующаяся отсутствием клинических проявлений болезни при сохранении в организме остаточных патологических изменений.

Т. ОККУЛЬТНЫЙ ЭНГЕЛЯ (устар.) — см. *Интоксикация туберкулезная хроническая.*

Т. ПЕРВИ́ЧНЫЙ (t. primaria) — Т. у лиц, впервые инфицированных микобактериями туберкулеза.

Т. ПОЗВОНО́ЧНИКА — см. *Спондилит туберкулезный.*

Т. ПОСЛЕПЕРВИ́ЧНЫЙ — см. *Туберкулез вторичный.*

ТУБЕРКУЛЕ́МА (tuberculoma; *туберкул-* + *-ома*) — опухолевидный инкапсулированный очаг творожистого некроза в легких или других внутренних органах (напр., в почке) при вторичном туберкулезе.

ТУБЕРКУЛЁМА ЛЁГКИХ (tuberculoma pulmonum; син. казеома легких) — клиническая форма туберкулеза легких, характеризующаяся образованием одной или нескольких (часто образующих конгломерат) крупных туберкулем, окруженных мало измененной легочной тканью.

ТУБЕРКУЛИ́Д (tuberculidum; *туберкул-* + греч. -eidēs подобный) — общее название поражений кожи токсической или аллергической природы, возникающих при туберкулезе и характеризующихся отсутствием микобактерий туберкулеза в элементах сыпи.

Т. РОЗАЦЕОПОДО́БНЫЙ (t. rosaceaforme; син. Левандовского болезнь) — Т. в виде мелких папул, сопровождающихся эритемой и телеангиэктазиями.

ТУБЕРКУЛИ́Н — общее название препаратов, получаемых из культур микобактерий туберкулеза и предназначенных для постановки аллергических диагностических проб.

Т. ПО́ЛНЫЙ — см. *Коха старый туберкулин.*

Т. СТА́РЫЙ — см. *Коха старый туберкулин.*

ТУБЕРКУЛИ́НОВАЯ ПРО́БА — кожная проба с туберкулином для выявления сенсибилизации организма к микобактериям туберкулеза.

ТУБЕРКУЛИ́НОВАЯ ПРО́БА ГРАДУИ́РОВАННАЯ — см. *Шмелёва — Пирке проба.*

ТУБЕРКУЛИ́НОВАЯ ПРО́БА КОНЪЮНКТИВА́ЛЬНАЯ — см. *Кальметта — Вольфф-Эйснера офтальмореакция.*

ТУБЕРКУЛИ́НОВАЯ ПРО́БА ТОНОМЕТРИ́ЧЕСКАЯ — метод диагностики туберкулезного поражения задних отделов сосудистой оболочки глаза, заключающийся в наблюдении за уровнем внутриглазного давления после подкожного введения туберкулина.

ТУБЕРКУЛИНОДИАГНО́СТИКА (туберкулин + *диагностика*) — метод изучения инфицированности микобактериями туберкулеза, а также реактивности инфицированных или вакцинированных людей, основанный на применении туберкулиновых проб.

ТУБЕРКУЛИНОТЕРАПИ́Я (туберкулин + *терапия*) — применение туберкулина в лечебных целях.

ТУБЕРКУЛО- — см. *Туберкул-.*

ТУБЕРКУЛОДЕРМИ́Я МИКРОПАПУЛЁЗНАЯ (tuberculodermia micropapulosa; *туберкуло-* + греч. derma кожа) — см. *Туберкулез кожи лихеноидный.*

ТУБЕРКУЛО́ИД ПАПУЛОНЕКРОТИ́ЧЕСКИЙ (tuberculoidum papulonecroticum; *туберкуло-* + греч. -eidēs подобный) — см. *Туберкулез кожи папулонекротический.*

ТУБЕРКУЛО́ИД ПОГРАНИ́ЧНЫЙ — см. *Лепра пограничная туберкулоидная.*

ТУБЕРКУЛО́ИД ПОЛЯ́РНЫЙ — см. *Лепра туберкулоидная.*

ТУБЕРКУЛОПРОТЕИ́НЫ (*туберкуло-* + *протеины*) — белки микобактерий туберкулеза.

ТУБООТИ́Т (tubootitis; анат. tuba auditiva слуховая труба + греч. us, ōtos ухо + *-ит*; син.: евстахиит, сальпингоотит) — воспаление слизистой оболочки слуховой (евстахиевой) трубы.

ТУБУЛИЗА́ЦИЯ (лат. tubulus трубочка) — соединение концов пересеченного нерва с помощью трубочек, изготовленных из артерий.

ТУБУЛО- [лат. tubulus (уменьшит. от tubus) и tubula (уменьшит. от tuba) трубка, трубочка] — составная часть сложных слов, означающая: «имеющий форму трубки», «относящийся к трубке, к трубкам».

ТУБУЛОПАТИ́И ВРОЖДЁННЫЕ (*тубуло-* + греч. pathos страдание, болезнь)— группа наследственных болезней, характеризующихся поражением почечных канальцев; включает фосфатдиабет, синдром де Тони — Дебре — Фанкони, цистинурию, почечную глюкозурию, почечный несахарный диабет, почечный канальцевый ацидоз, нефронофтиз Фанкони, синдром Лоу и нек-рые другие нозологические формы.

ТУБУЛОРЕ́КСИС (tubulorrhexis; *тубуло* - + греч. rhēxis разрыв) — повреждение почечного канальца с разрывом стенки, обусловленное переполнением его мочой; наблюдается, напр., при обтурации канальцев.

ТУБУЛЯ́РНЫЙ (tubularis; лат. tubulus трубка) — относящийся к трубке, имеющий форму трубки.

ТУ́БУС (лат. tubus труба) в м е д и ц и н е — 1) приспособление к рентгеновскому аппарату в виде металлического усеченного конуса, ограничивающее поле облучения; 2) элемент конструкции медицинского прибора, предназначенный для защиты экрана визуального индикатора от внешней засветки, представляющий собой укрепленный вокруг экрана металлический или резиновый полый усеченный конус, вершина к-рого обычно имеет форму, удобную для прилегания к лицу наблюдателя.

ТУГОЛУ́КОВА МЕ́ТОД (В. Н. Туголуков) — метод определения протеолитической активности желудочного сока, основанный на его способности переваривать раствор сухой плазмы крови и заключающийся в количественной оценке осадка непереваренного белка, образующегося при добавлении раствора трихлоруксусной кислоты.

ТУГОПОДВИ́ЖНОСТЬ МЫШЛЕ́НИЯ — замедленность и затрудненность мышления у психически больного, сочетающаяся с обстоятельностью, пониженной переключаемостью и склонностью к застреванию на малозначимых подробностях.

ТУГОУ́ХОСТЬ (bradyacusia; син. брадиакузия) — ослабление слуха, при к-ром еще сохранено восприятие речи.

Т. КОНДУКТИ́ВНАЯ (b. conductiva) — Т., обусловленная поражением звукопроводящего аппарата.

Т. ПЕРЦЕПТИ́ВНАЯ (b. perceptiva; лат. percipio, perceptum воспринимать, чувствовать) — Т., обусловленная поражением звуковоспринимающего аппарата или центрального отдела слухового анализатора.

Т. ПРОФЕССИОНА́ЛЬНАЯ (b. professionalis) — перцептивная Т., вызванная длительным воздействием производственного шума.

Т. СТА́РЧЕСКАЯ — см. *Пресбиакузис.*

ТУ́ЛОВИЩЕ (truncus, PNA, BNA, JNA; син. торс) — часть тела человека за исключением головы, шеи и конечностей.

ТУЛЯРЕМИ́Д (tularemidum; *туляремия* + греч. -eidēs подобный) — общее название элементов сыпи (пятен, папул, пустул и др.), наблюдаемых при туляремии или после введения туляремийной вакцины.

ТУЛЯРЕМИ́Я (tularaemia; Tulare название местности в Калифорнии + греч. haima кровь; син.: болезнь заячья, болезнь мышиная, лихорадка кроличья, лихорадка оленьей мухи, Франсиса болезнь, чума малая)— острая инфекционная природно-очаговая болезнь из группы бактериальных зоонозов, вызываемая Francisella tularensis; передается человеку контактным, алиментарным, воздушно-пылевым или трансмиссивным путем.

Т. АБДОМИНА́ЛЬНАЯ (t. abdominalis; син. Т. кишечная) — клиническая форма Т., возникающая при внедрении возбудителя через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, реже как осложнение других форм болезни; характеризуется поражением брыжеечных лимфатических узлов, образованием эрозий и язв по ходу кишечника.

Т. АНГИНО́ЗНО-БУБО́ННАЯ (t. anginosobubonica) — клиническая форма Т., возникающая при внедрении возбудителя через миндалины; характеризуется чаще односторонним их

поражением с образованием глубоких язв, налетов и регионарных бубонов.

Т. БУБО́ННАЯ (t. bubonica) — клиническая форма Т., возникающая при трансмиссивном или контактном пути заражения; характеризуется регионарным лимфаденитом и образованием бубонов, содержащих возбудителя.

Т. ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННАЯ (t. generalisata; син.: Т. септическая, Т. тифоидная) — клиническая форма Т., характеризующаяся бактериемией, выраженной интоксикацией с симптомами, напоминающими брюшной тиф или сепсис, и отличающаяся от него отсутствием первичного аффекта и регионарного бубона.

Т. ГЛАЗОБУБО́ННАЯ (t. oculobubonica; син. Т. глазожелезистая) — вариант бубонной Т., возникающий при внедрении возбудителя через конъюнктиву, отличающийся развитием конъюнктивита, иногда с образованием папул и язвочек и отеком век.

Т. ГЛАЗОЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ (t. oculoglandularis) — см. *Туляремия глазобубонная.*

Т. КИШЕ́ЧНАЯ — см. *Туляремия абдоминальная.*

Т. ЛЁГОЧНАЯ ВТОРИ́ЧНАЯ (t. pulmonalis secundaria) — клиническая форма Т., возникающая при попадании возбудителя с кровью или лимфой в легкие или в бронхолегочные лимфатические узлы и характеризующаяся развитием в них множественных воспалительных очагов.

Т. ЛЁГОЧНАЯ ПЕРВИ́ЧНАЯ (t. pulmonalis primaria) — клиническая форма Т., возникающая при воздушно-пылевом пути заражения и протекающая по типу разлитого бронхита или бронхопневмонии с длительным течением и склонностью к рецидивам.

Т. СЕПТИ́ЧЕСКАЯ (t. septica) — см. *Туляремия генерализованная.*

Т. ТИФО́ИДНАЯ (t. typhoidea) — см. *Туляремия генерализованная.*

ТУЛЯРИ́Н (tularinum) — препарат для аллергической диагностической пробы при туляремии, представляющий собой взвесь убитых туляремийных палочек.

ТУЛЯРИ́НОВАЯ ПРО́БА — внутрикожная аллергическая диагностическая проба с тулярином.

ТУМЕСЦЕ́НЦИЯ (лат. tumesco распухать, вздуваться) — увеличение объема кавернозных тел наружных половых органов и приобретение ими повышенной упругости при половом возбуждении.

ТУМИО́ТТО СА́ХАРНАЯ ПРО́БА (G. Tumiotto; син. Сотжиу — Тумиотто проба) — метод выявления латентной коронарной недостаточности, основанный на появлении в этом случае электрокардиографических признаков гипоксии миокарда после внутривенного введения 20 *мл* 40% р-ра глюкозы.

TÚNGA PÉNETRANS (син.: блоха песчаная, блоха проникающая) — вид блох сем. Fungidae, представители к-рого являются эктопаразитами; оплодотворенные самки переходят на внутрикожное паразитирование, гл. обр. в подногтевых и межпальцевых пространствах ног и в области додыжек.

ТУННЕ́ЛЬ ВНУ́ТРЕННИЙ (cuniculus internus, LNH; син. кортиев тунель) — пространство между внутренними и наружными волосковыми клетками спирального (кортиева) органа.

ТУ́РГОР (turgor; лат. turgeo быть наполненным, набухшим) — напряженность и эластичность ткани, изменяющиеся в зависимости от ее физиологического состояния; термин применяется преимущественно для характеристики состояния кожи.

ТУРЕ́ВИЧА МЕ́ТОД (Е. И. Туревич, 1890—1949, сов. вирусолог) — способ окраски внутриклеточных включений с использованием железного гематоксилина Вейгерта, кислого фуксина и насыщенного раствора пикриновой кислоты; применяется гл. обр. для выявления телец Бабеша — Негри, к-рые окрашиваются в рубиновый цвет.

ТУРЕ́НА БОЛЬШО́Й АФТО́З (A. Touraine, 1883—1961, франц. дерматолог) — см. *Бехчета болезнь.*

ТУРЕ́НА ВРОЖДЁННЫЙ ПОЛИКЕРАТО́З (A. Touraine; син.: дисплазия эктодермальная множественная, полидисплазия эктодермы, поликератоз, Турена поликератоз) — общее название аномалий развития эктодермы, проявляющихся гиперкератозом; к Т. в. п. относят синдромы Шефера, Ядассона — Левандовского и др.

ТУРЕ́НА ДУГООБРА́ЗНАЯ ТЕЛЕАНГИЭКТАТИ́ЧЕСКАЯ ПУ́РПУРА (A. Touraine) — см. *Пурпура телеангиэктатическая дугообразная.*

ТУРЕ́НА НАСЛЕ́ДСТВЕННЫЙ ПОЛИФИБРОМАТО́З (A. Touraine) — см. *Турена полифиброматоз.*

ТУРЕ́НА ПОДНОГТЕВА́Я АКРОПИГМЕНТА́ЦИЯ (A. Touraine) — см. *Акропигментация подногтевая.*

ТУРЕ́НА ПОЛИКЕРАТО́З (A. Touraine) — см. *Турена врожденный поликератоз.*

ТУРЕ́НА ПОЛИФИБРОМАТО́З (A. Touraine; син. Турена наследственный полифиброматоз) — наследственное сочетание контрактуры Дюпюитрена, келоида и пластической индурации полового члена или фибром матки.

ТУРЕ́НА СИСТЕ́МНЫЙ ЭЛАСТОРЕ́КСИС (A. Touraine) — см. *Псевдоксантома эластическая.*

ТУРЕ́НА СРЕДИ́ННО-ЛИЦЕВО́Е ЛЕНТИ́ГО (A. Touraine) — см. *Лентигиноз центрофациальный дизрафический.*

ТУРЕ́НА — ГИ́ССЕЛЬБРЕХТА ВРОЖДЁННАЯ ЭКТОДЕРМА́ЛЬНАЯ ПОЛИДИСПЛАЗИ́Я (A. Touraine, 1883—1961, франц. дерматолог; Gisselbrecht) — см. *Шефера синдром.*

ТУРЕ́НА — СОЛА́НТА — ГОЛЕ́ СИНДРО́М (A. Touraine, 1883—1961, франц. дерматолог; G. Solente, род. в 1890 г., франц. дерматолог; L. Golé, род. в 1903 г., франц. дерматолог) — см. *Пахидермопериостоз.*

ТУРЕ́НА — СУЛИНЬЯ́КА ВРОЖДЁННЫЙ ГИПЕРЭКТОДЕРМО́З (A. Touraine, 1883—1961, франц. дерматолог; Soulignac) — см. *Шефера синдром.*

ТУРЕ́ТТА БОЛЕ́ЗНЬ (G. G. Tourette, 1857—1904, франц. невропатолог) — см. *Жилль де ла Туретта синдром.*

ТУРЕ́ЦКОЕ СЕДЛО́ (sella turcica, PNA, BNA, JNA) — углубление на верхней поверхности тела клиновидной кости, ограниченное спереди и сзади костными выступами; место расположения гипофиза.

ТУРНЕ́ ЗРАЧКО́ВАЯ РЕА́КЦИЯ (A. Tournay, 1878—1969, франц. офтальмолог; син. Турне феномен) — зрачковый рефлекс: расширение зрачка при крайнем отведении глаза.

ТУРНЕ́ ФЕНО́МЕН (A. Tournay) — см. *Турне зрачковая реакция.*

ТУ́РНЕРА АППАРА́Т (Г. И. Турнер, 1858—1941, сов. хирург-ортопед) — аппарат для стерилизации текучим паром небольшого количества инструментов, перевязочного материала и белья.

ТУ́РНЕРА СИМПТО́М (Г. И. Турнер) — понижение болевой чувствительности кожи на медиальной поверхности области коленного сустава и голени при застарелом повреждении менисков коленного сустава; обусловлен сопутствующим невритом подкожного нерва.

ТУ́РНЕРОВСКАЯ АТРОФИ́Я (Г. И. Турнер) — атрофия мышц конечностей при переломах костей, обусловленная рефлекторными воздействиями из зоны перелома.

ТУРНИКЕ́Т (франц. tourniquet) — кровоостанавливающий жгут в виде матерчатой или кожаной петли, скручиваемой при помощи рычага (палочки).

ТУРНИКЕ́Т Э́СМАРХА — см. *Эсмарха жгут.*

ТУРТЮА́ЛЯ СИ́НУС (K. Th. Tourtual, 1802—1865, нем. анатом) — глубокая разветвленная лакуна в добавочной внутрипеченочной миндалине.

ТУРУ́НДА (лат. turunda корпия, перевязочный материал) — небольшой узкий марлевый тампон.

ТУ́РЫНА СИМПТО́М (F. Turyn, род. в 1899 г., польский врач) — возникновение боли в икроножной мышце при резком разгибании большого пальца стопы; признак неврита седалищного нерва.

TÚSSIS CONVÚLSÍVA (лат. «кашель судорожный») — см. *Коклюш.*

ТУ́ТОНА КЛЕ́ТКИ (K. Touton, род. в 1858 г., нем. дерматолог) — крупные клетки с многочисленными ядрами, расположенными в виде кольца или полукольца вокруг базофильного участка цитоплазмы, имеющие светлую, пенистую цитоплазму, содержащую двоякопреломляющие липиды; встречаются в опухолях мезенхимального происхождения.

ТУ́ТОР (франц. tuteur) — фиксирующий ортопедический аппарат для иммобилизации суставов, состоящий из гильз (иногда и башмачка), соединенных шипами без шарниров.

ТУ́ТОР-КОРСЕ́Т — ортопедический аппарат для иммобилизации и разгрузки тазобедренного сустава в виде корсета, охватывающего таз и бедро больного.

ТУ́ЧНОСТЬ (obesitas) — расстройство обмена веществ, характеризующееся избыточным депонированием жира, преимущественно в подкожной клетчатке.

ТЦА́НКА КЛЕ́ТКИ (A. Tzanck, 1886—1954, франц. дерматолог и гематолог) — см. *Клетки акантолитические.*

ТЫЧИ́НКИНОЙ МЕ́ТОД КО́ЖНОЙ ПЛА́СТИКИ (А. К. Тычинкина, 1915—1971, сов. хирург) — способ кожной пластики, при к-ром сочетают несвободную пластику лоскутом на широкой ножке, взятым в отдаленной части тела, и свободную пластику ложа лоскута расщепленным трансплантатом с временным погружением последнего в глубину тканей.

ТЬЕ́РА ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННЫЙ ПАПУЛЁЗНЫЙ ФИБРОМАТО́З (H. Thiers) — см. *Фиброматоз папулезный генерализованный.*

ТЬЮ́ДОРА — Э́ДВАРДСА РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ (A. Tudor; R. Edwards) — мощный реечный ранорасширитель, применяемый в кардиоваскулярной и легочной хирургии.

ТЭ — см. *Температура эффективная.*

ТЮБА́Ж (франц. tubage) — метод опорожнения желчного пузыря путем перорального введения холекинетика с одновременным прогреванием области печени; используется в качестве лечебного мероприятия (напр., при холестазе) и в диагностических целях (напр., в сочетании с зондированием).

«ТЮЛЕ́НЬЯ ЛА́ПА» — деформация кисти, при к-рой она напоминает плавник тюленя; обусловлена периферическим параличом мышц кисти и предплечья при поражении ветвей VII—VIII шейных и I грудного спинномозговых нервов или части шейно-плечевого сплетения (паралич Дежерин-Клюмпке).

ТЮРЕ́МНОЕ БУ́ЙСТВО — непродолжительное двигательное и речевое возбуждение, сопровождаемое злобой или яростным исступлением со стремлением к разрушению, нападению на окружающих или самоизувечиванию; наблюдается вскоре после заключения в тюрьму; разновидность реактивных состояний.

ТЮ́РКА БОЛЕ́ЗНЬ (W. Türk, 1871—1916, австрийский врач) — см. *Мононуклеоз инфекционный.*

ТЮ́РКА ВТОРИ́ЧНОЕ ПЕРЕРОЖДЕ́НИЕ (L. Türck, 1810—1868, австрийский невропатолог) — дегенерация нервного волокна, отделенного от нейрона.

ТЮ́РКА ЛИ́НИЯ (S. Türk, швейц. офтальмолог 19—20 вв.; син. Эрлиха — Тюрка капельная линия) — наблюдаемое в норме линейное скопление лейкоцитов на задней поверхности роговицы, расположенное в нижнем ее отделе строго по средней линии.

ТЮ́РКА ПУЧО́К (L. Türck, 1810—1868, австрийский невропатолог) — см. *Височно-мостовой путь.*

ТЮ́РКА РЕФЛЕ́КС (L. Türck, 1810—1868, австрийский невропатолог) — сгибание задней конечности декапитированной лягушки при нанесении на кожу конечности химического или механического раздражения; используется в учебных целях для демонстрации спинального рефлекса и состава его рефлекторной дуги.

ТЮФФЬЕ́ КАНЮ́ЛЯ (истор.; M. Th. Tuffier, 1857—1929, франц. хирург) — стеклянная канюля для промывания мочеиспускательного канала, имеющая на наружном конце чашечку для сбора жидкости, просачивающейся между оливой канюли и эластичной трубкой.

ТЮФФЬЕ́ СИМПТО́М (M. Th. Tuffier) — набухание периферических подкожных вен при одновременном сдавлении вены и пальцевом прижатии магистральной артерии конечности; признак достаточности коллатерального кровообращения.

ТЯЖЁЛАЯ ВОДА́ (син. окись дейтерия) — вода, в к-рой атомы водорода заменены атомами дейтерия; применяется в медико-биологических исследованиях.

ТЯЖЕЛОРА́НЕНЫЙ, ТЯЖЕЛОПОРАЖЁННЫЙ — раненый (пораженный) с повреждениями жизненно важных органов и систем или нарушениями их функций, нуждающийся в интенсивной терапии, а нередко и реанимационных мероприятиях, а также в систематическом врачебном наблюдении и медицинском уходе.

ТЯЖЁЛЫЕ ЦЕ́ПИ ИММУНОГЛОБУЛИ́НОВ — полипептидные цепи иммуноглобулинов с молекулярным весом (массой) 50 000—70 000.

ТЯ́ЖЕСТЬ ТЕЛЕ́СНОГО ПОВРЕЖДЕ́НИЯ — степень причинения вреда здоровью нанесением телесного повреждения, устанавливаемая по его опасности для жизни, размерам последовавшей утраты трудоспособности и длительности расстройства здоровья.

У

УА́ЙЕТА СПО́СОБ (истор.; J. A. Wyeth, 1845—1922, амер. хирург) — способ фиксации кровоостанавливающего жгута при ампутации бедра вблизи от тазобедренного сустава, заключавшийся во введении нескольких больших игл в мягкие ткани дистальнее жгута по обе стороны сустава.

УА́ЙЗА — РЕ́ЙНА БОЛЕ́ЗНЬ (F. Wise, род в 1881 г., амер. дерматолог; Ch. R. Rein, совр. амер. дерматолог) — см. *Лишай красный монилиформный.*

УА́ЙЛДЕРА ПЕЧЁНОЧНО-ВО́ДНАЯ ПРО́БА (R. M. Wilder, 1885—1959, амер. врач) — метод исследования функции печени, заключающийся в измерении диуреза после внутривенного введения 300 *мл* изотонического раствора хлорида натрия; при поражениях печени диурез повышен.

УА́ЙЛИ ОПЕРА́ЦИЯ (W. G. Wylie, 1848—1923, амер. гинеколог) — хирургическая операция: укорочение круглых связок матки при ее ретродевиации.

УА́ЙТА АРТРОТОМИ́Я (J. W. White, род. в 1892 г., амер. хирург) — артротомия тазобедренного сустава дугообразным разрезом, огибающим бедренную кость сзади, с рассечением капсулы по краю вертлужной впадины.

УА́ЙТХЕДА ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; W. Whitehead, 1840—1913, англ. хирург) — хирургическая операция: круговое иссечение слизистой оболочки прямой кишки на протяжении 5—8 *см* от заднего прохода и подшивание края оставшейся слизистой оболочки к коже; предложена для лечения геморроя.

УАНЬЕ́ РЕА́КЦИЯ ПОМУТНЕ́НИЯ (R. Hoigné, совр. швейц. дерматолог) — метод диагностики лекарственной аллергии, основанный на феномене повышения оптической плотности сыворотки крови после добавления к ней раствора лекарственного средства, способного вызвать у обследуемого аллергическую реакцию.

УБЕ́ЖИЩЕ — инженерное сооружение, предназначенное для защиты людей от средств массового поражения и обычных видов оружия.

У. МЕДИЦИ́НСКОЕ — У., предназначенное для размещения функциональных подразделений этапов медицинской эвакуации с целью защиты пораженных и больных, а также обслуживающего их медицинского персонала.

УБИ́ЙСТВО (caedes) — противоправное лишение жизни другого человека.

УБИКВИТА́РНЫЙ (ubiquitarius; лат. ubique повсюду) — повсеместный, встречающийся повсюду.

УБИХИНО́Н (син. кофермент Q) — жирорастворимое вещество, близкое по химическому строению к токоферолам (витамину Е) и филлохинонам (витамину К); участвует в процессах тканевого дыхания; переносчик электронов от флавопротеидов к цитохрому С.

УБО́РКА ПОЛЕ́Й СРАЖЕ́НИЯ (юрк) — см. *Очистка полей сражения.*

УВЕ- (увео-; анат. устар. uvea сосудистая оболочка глаза, от лат. uva виноградная гроздь, виноград) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сосудистой оболочке глаза».

УВЕА́ЛЬНЫЙ ТРАКТ (анат. устар. uvea сосудистая оболочка глаза) — см. *Сосудистая оболочка глазного яблока.*

УВЕ́ИТ (*уве-* + *-ит*; син. иридоциклохориоидит) — воспаление увеального тракта (сосудистой оболочки глазного яблока).

У. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ (u. allergica) — У., развивающийся как проявление аллергической реакции.

У. БЕЛКО́ВО-АНАФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Увеит факогенный.*

У. ВТОРИ́ЧНЫЙ (u. secundaria) — У., возникший как осложнение других болезней глаза, напр. язвы роговицы, склерита, флегмоны глазницы.

У. ГИПЕРТЕНЗИ́ВНЫЙ (u. hypertensiva) — У., сопровождающийся повышением внутриглазного давления.

У. ГНО́ЙНЫЙ (u. purulenta) — У., обусловленный внедрением в сосудистую оболочку глаза возбудителей гнойной инфекции.

У. ГРАНУЛЕМАТО́ЗНЫЙ (u. granulomatosa) — У., характеризующийся возникновением воспалительной гранулемы.

У. ЗА́ДНИЙ (нрк.; u. posterior) — см. *Хориоидит.*

У. МЕТАСТАТИ́ЧЕСКИЙ (u. metastatica) — У., обусловленный метастазированием патогенных микробов.

У. ОДОНТОГЕ́ННЫЙ (u. odontogena) — метастатический У., при к-ром первичный воспалительный очаг локализован в зубах или челюстях.

У. О́СТРЫЙ (u. acuta) — У., характеризующийся внезапным началом и скоплением экссудата в передней камере глаза, стекловидном теле; приводит к понижению остроты зрения.

У. ПЕРВИ́ЧНЫЙ (u. primaria) — У., к-рому не предшествовала какая-нибудь другая болезнь глаза.

У. ПЕРЕ́ДНИЙ (нрк.; u. anterior) — см. *Иридоциклит.*
У. РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ (u. rheumatica) — см. *Иридоциклит ревматический.*
У. СИМПАТИЗИ́РУЮЩИЙ (u. sympathetica) — травматический У., являющийся причиной развития симпатической офтальмии другого глаза.
У. СИМПАТИ́ЧЕСКИЙ (u. sympathica) — У., возникший как форма симпатической офтальмии при прободном ранении другого глаза.
У. СИНУСОГЕ́ННЫЙ (u. sinusogena) — метастатический У., при к-ром первичный воспалительный очаг находится в околоносовых пазухах.
У. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (u. traumatica) — У., обусловленный травмой глазного яблока.
У. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (u. tuberculosa) — метастатический У. туберкулезной этиологии, характеризующийся тяжелым течением.
У. ФАКОГЕ́ННЫЙ (u. phacogena; син. У. белково-анафилактический) — У., обусловленный токсико-аллергической реакцией сосудистой оболочки глазного яблока на белки хрусталика, проникающие через его поврежденную или дистрофически измененную капсулу.
У. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (u. chronica) — У., характеризующийся длительным течением (нередко многолетним), часто ведущий к вторичной глаукоме, значительному ухудшению зрения, иногда к слепоте.

УВЕО- — см. *Уве-.*

УВЕОПАРОТИ́Т (uveoparotitis; *увео-* + *паротит*; син.: лихорадка увеопаротидная, Хеерфордта синдром) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся сочетанием двустороннего паротита и увеита, сопровождающимся парезом лицевого нерва и диплопией.

УВЕОПАТИ́Я (uveopathia; *увео-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название нек-рых болезней глаза, характеризующихся поражением сосудистой оболочки невоспалительного характера.

УВЕ́ЧЬЕ (mutilatio) — стойкое или кратковременное повреждение здоровья в результате несчастного случая либо противоправных действий; термин обычно используется в юридической практике.
У. ТРУДОВО́Е — У., возникшее в результате несчастного случая на производстве; термин используется для обозначения причины инвалидности.

УВИО́ЛЕВАЯ ЛА́МПА [устар.; сокращ., от лат. u(ltra) сверх, за пределами + viol(aceus) — фиолетовый] — см. *Эритемная лампа.*

УВИО́ЛЕВОЕ СТЕКЛО́ [сокращ., от лат. u(ltra) сверх, за пределами + viol(aceus) фиолетовый] — стекло с повышенной прозрачностью в ультрафиолетовой области спектра; применяется для изготовления ультрафиолетовых облучателей.

УВЛАЖНИ́ТЕЛЬ — устройство для повышения влажности вдыхаемого воздуха путем введения диспергированной воды в воздуховоды; применяется в аппаратах искусственной вентиляции легких, системах приточной вентиляции или рециркуляции воздуха в помещении.

УВЧ-ТЕРАПИ́Я — см. *Терапия ультравысокочастотная.*

УГА́РНЫЙ ГАЗ — см. *Окись углерода.*

УГЛЕВА́НИЕ ВОДЫ́ — метод обработки природной воды при ее очистке, заключающийся в добавлении к ней активированного угля с целью устранения посторонних привкусов, запахов и органических веществ.

УГЛЕВОДОРО́ДЫ — органические соединения, в состав которых входят только атомы углерода и водорода; нек-рые высокомолекулярные У. являются онкогенными веществами.

УГЛЕВО́ДЫ (син.: глициды — устар., глюциды — устар.) — природные органические соединения, представляющие собой альдегидо- и кетоноспирты или продукты их конденсации; присутствуют в свободном виде и в соединениях или комплексах с белками и липидами во всех органах и тканях и являются одним из основных питательных веществ.
У. НЕУСВОЯ́ЕМЫЕ (син. У. трудноусвояемые) — высокомолекулярные У. в составе продуктов растительного происхождения (например, клетчатка), слабо поддающиеся расщеплению при воздействии пищеварительных соков.
У. РАФИНИ́РОВАННЫЕ — легкоусвояемые У., извлеченные из растительного сырья и очищенные от сопутствующих (балластных) веществ для употребления в пищу.
У. ТРУДНОУСВОЯ́ЕМЫЕ — см. *Углеводы неусвояемые.*
У. УСВОЯ́ЕМЫЕ — У. в составе продуктов питания, эффективно перевариваемые и используемые организмом, напр. крахмал, гликоген, сахароза.

УГЛЕКИ́СЛЫЙ ГАЗ — см. *Двуокись углерода.*

УГЛЕРО́Д (Carboneum; C) — химический элемент IV группы периодической системы Д. И. Менделеева; ат. номер 6, ат. вес (масса) 12,011; является структурной основой органических соединений, участвующих в построении организмов и обеспечении их жизнедеятельности.

УГЛЕРО́Д РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название группы радиоактивных изотопов углерода с массовыми числами от 9 до 15 и периодом полураспада от 0,46 сек. до 5730 лет; отдельные изотопы используются в медико-биологических исследованиях.

УГЛО́ВА БРОНХОФИКСА́ТОР (Ф. Г. Углов, род. в 1904 г., сов. хирург) — хирургический инструмент для фиксации культи или отсеченной части бронха, имеющий губки, смыкающиеся параллельно друг другу при помощи винта.

УГЛО́ВА ДО́СТУП (Ф. Г. Углов) — оперативный доступ к корню легкого при пневмонэктомии: переднебоковой разрез передней грудной стенки с пересечением одного или двух ребер.

УГЛОМЕ́Р (син. гониометр) в медицине — прибор для измерения (в угловых градусах) амплитуды движений суставов конечностей и подвижности позвоночника, представляющий собой соединенные шарниром линейки, к одной из которых прикреплена градуированная дуга, а к другой — стрелка-указатель.

УГЛУБЛЕ́НИЕ БАРАБА́ННОЙ ПЕРЕПО́НКИ ВЕ́РХНЕЕ (recessus membranae tympani superior, PNA; син.: карман барабанной перепонки верхний, Пруссака карман) — узкая щель в барабанной полости между ненатянутой частью барабанной перепонки и шейкой молоточка.

УГЛУБЛЕ́НИЕ БАРАБА́ННОЙ ПЕРЕПО́НКИ ЗА́ДНЕЕ (recessus membranae tympani posterior, PNA, BNA, JNA; син.: карман барабанной перепонки задний, Трельча карман задний) — углубление стенки барабанной полости между барабанной перепонкой и задней молоточковой складкой.

УГЛУБЛЕ́НИЕ БАРАБА́ННОЙ ПЕРЕПО́НКИ ПЕРЕ́ДНЕЕ (recessus membranae tympani anterior, PNA, BNA, JNA; син.: карман барабанной перепонки передний, Трельча карман передний) — углубление стенки барабанной полости между барабанной перепонкой и передней молоточковой складкой.

УГЛУБЛЕ́НИЕ ДИ́СКА (excavatio disci; син. экскавация физиологическая) — воронкообразное углубление (в центре или в наружной половине) диска зрительного нерва, не доходящее до его края; наблюдается при офтальмоскопии здорового глаза.

УГЛУБЛЕ́НИЕ МА́ТОЧКИ (recessus utriculi, JNA) — см. *Эллиптическое углубление.*

УГЛУБЛЕ́НИЕ МЕШО́ЧКА (recessus sacculi, JNA) — см. *Сферическое углубление.*

УГЛУБЛЕ́НИЕ СА́ЛЬНИКОВОЙ СУ́МКИ КАУДА́ЛЬНОЕ [recessus caudalis (bursae omentalis), JNA] — см. *Сальниковое углубление нижнее.*

УГЛУБЛЕ́НИЕ СА́ЛЬНИКОВОЙ СУ́МКИ КРАНИА́ЛЬНОЕ [recessus cranialis (bursae omentalis), JNA] — см. *Сальниковое углубление верхнее.*

УГЛУБЛЕ́НИЕ СФЕРИ́ЧЕСКОГО МЕШО́ЧКА — см. *Сферическое углубление.*

УГЛУБЛЕ́НИЕ ЭЛЛИПТИ́ЧЕСКОГО МЕШО́ЧКА — см. *Эллиптическое углубление.*

У́ГОЛ ВТОРИ́ЧНОГО ОТКЛОНЕ́НИЯ ГЛА́ЗА — величина отклонения (в градусах) зрительной линии здорового глаза от нормального положения при фиксации какого-либо объекта косящим глазом.

У́ГОЛ ГА́ММА в физиологической оптике — угол, образованный зрительной линией и оптической осью глаза.

У́ГОЛ ЗРЕ́НИЯ — см. *Зрительный угол.*

У́ГОЛ КАЧА́НИЯ в лучевой терапии — см. *Угол ротации.*

У́ГОЛ КОСОГЛА́ЗИЯ — величина отклонения (в градусах) зрительной линии косящего глаза от нормального положения.

У́ГОЛ ПЕРЕ́ДНЕЙ КА́МЕРЫ — см. *Радужно-роговичный угол.*

У́ГОЛ РОТА́ЦИИ (син. угол качания) в лучевой терапии — угловое расстояние между крайними положениями оси пучка излучения в облучаемом теле при подвижном (круговом) облучении.

У́ГОЛЬНЫЙ АНГИДРИ́Д — см. *Двуокись углерода.*

УГРЕВЫДА́ВЛИВАТЕЛЬ — инструмент, применяемый в косметической практике для удаления угрей с кожи лица; рабочими частями У. являются две площадки с отверстиями.

УГРИ́ (acne) — воспаление сальных желез и волосяных фолликулов, разви-

вающееся на фоне себореи и изменения химических свойств кожного сала.

У. НЕКРОТИ́ЧЕСКИЕ (a. necrotica) — У. с участками некроза на поверхности, расположенные преимущественно на лбу, ушных раковинах и волосистой части головы; как правило, возникают в возрасте старше 40 лет.

У. ОБЫКНОВЕ́ННЫЕ (a. vulgaris; син. У. юношеские) — У., развивающиеся в период полового созревания.

У. ОБЫКНОВЕ́ННЫЕ ПУСТУЛЁЗНЫЕ (a. vulgaris pustulosa) — У. о., характеризующиеся наличием на поверхности папул небольших конических пустул.

У. ОБЫКНОВЕ́ННЫЕ СЛИВНЫ́Е (a. vulgaris conglobata) — У. о., характеризующиеся слиянием высыпаний с образованием глубоких очагов гнойного воспаления; наблюдаются чаще на спине.

У. ОБЫКНОВЕ́ННЫЕ УПЛОТНЁННЫЕ (a. vulgaris indurata) — У. о., характеризующиеся образованием крупных болезненных нагнаивающихся папул с выраженной инфильтрацией подкожной клетчатки.

У. ОБЫКНОВЕ́ННЫЕ ФЛЕГМОНО́ЗНЫЕ (a. vulgaris phlegmonosa) — У. о., характеризующиеся резко выраженными глубокими очагами гнойного воспаления с образованием абсцессов.

У. СЕРПИГИНО́ЗНЫЕ Я́ЗВЕННЫЕ НО́СА (a. serpiginosa ulcerosa nasi; син. Капоши серпигинозные язвенные угри носа) — некротические У., расположенные на коже носа и характеризующиеся склонностью к периферическому росту.

У. ЮНОШЕ́СКИЕ (a. juvenilis) — см. *Угри обыкновенные.*

УГРИ́ БЕ́ЛЫЕ (acne albida) — см. *Милиум.*

УГРИ́ БРО́МИСТЫЕ (acne bromica) — см. *Бромодерма угревидно-пустулезная.*

УГРИ́ ЙО́ДИСТЫЕ (acne jodica) — см. *Иододерма угревидная.*

УГРИ́ КРА́СНЫЕ (acne erythematosa) — см. *Угри розовые.*

УГРИ́ МА́СЛЯНЫЕ (acne oleica) — фолликулиты, внешне напоминающие угри, возникающие вследствие загрязнения кожи минеральными маслами.

УГРИ́ МЕДИКАМЕНТО́ЗНЫЕ (acne medicamentosa) — угреподобное поражение кожи, обусловленное непереносимостью или побочным действием принимаемых больным лекарственных средств, напр. брома, кортикостероидов.

УГРИ́ НОВОРОЖДЁННЫХ (acne neonatorum) — высыпания у новорожденных, внешне напоминающие угри и расположенные преимущественно на коже лица и волосистой части головы.

УГРИ́ ПРОФЕССИОНА́ЛЬНЫЕ (acne professionalis) — кератотические фолликулярные папуло-пустулы, возникающие при систематическом контакте с некоторыми химическими веществами (смолы, парафины, хлор и др.) при выполнении профессиональных обязанностей.

УГРИ́ РО́ЗОВЫЕ (acne rosacea; син. угри красные) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся стойкой эритемой лица, телеангиэктазиями, пустулезными высыпаниями.

УГРИ́ СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЕ (acne syphilitica) — см. *Сифилид пустулезный угревидный.*

УГРИ́ УРТИКА́РНЫЕ (acne urticata, син. угри экскориированные) — отечные папулы, покрытые корочками, возникающие преимущественно на туловище и конечностях, реже на лице.

УГРИ́ ЧЕРВЕОБРА́ЗНЫЕ (acne vermicularis) — см. *Атрофодермия червеобразная.*

УГРИ́ ЧЁРНЫЕ (acne nigra) — см. *Комедоны.*

УГРИ́ ШАРОВИ́ДНЫЕ (acne conglobata; син.: дерматит фолликулярный, Ланга перифолликулярный дерматит, псевдоскрофулодерма) — разновидность глубокой пиодермии, сопровождающаяся возникновением комедонов, закупоривающих устья сальных желез, и нагнаивающихся атером, вскрывающихся с появлением свищей; заживление происходит с образованиями неровных, мостикообразных рубцов; У. ш. наблюдаются при себорее, осложненной вторичной пиококковой инфекцией.

УГРИ́ ЭКСКОРИ́ИРОВАННЫЕ (acne excoriata) — см. *Угри уртикарные.*

У́ГРИЦА КИШЕ́ЧНАЯ — см. *Strongyloides stercoralis.*

У́ГРИЦЫ — см. *Железницы.*

УДАБНОПИТЕ́К (Udabnopithecus) — ископаемая человекообразная обезьяна, найденная на территории Грузии; древность — более 2 млн. лет.

УДАВЛЕ́НИЕ — приведшее к механической асфиксии сдавление шеи рукой или руками, петлей, какой-либо тяжестью, движущейся частью машины или механизмом.

УДА́РНЫЙ ОБЪЁМ КРО́ВИ — см. *Ударный объем сердца.*

УДА́РНЫЙ ОБЪЁМ СЕ́РДЦА (син.: систолический объем крови, систолический объем сердца, ударный объем крови) — объем крови (в *мл*), выбрасываемый желудочком сердца за одну систолу.

УДВОЕ́НИЕ ДВЕНАДЦАТИПЕ́РСТНОЙ КИШКИ́ (duplicatio duodeni) — аномалия развития: выпячивание стенки двенадцатиперстной кишки, чаще по внутреннему краю ее нисходящей части.

УДВОЕ́НИЕ ПИЩЕВАРИ́ТЕЛЬНОГО ТРА́КТА (duplicatio tractus digestorii) — аномалия развития: наличие на уровне различных отделов пищеварительного тракта сообщающихся с ним или изолированных сферических или продольных полостей, выстланных слизистой оболочкой.

УДВОЕ́НИЕ ПИЩЕВО́ДА (dioesophagia) — см. *Диэзофагия.*

УДВОЕ́НИЕ СПИННО́ГО МО́ЗГА (diastematomyelia) — см. *Диастематомиелия.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ КАУДА́ЛЬНЫЙ (retinaculum caudale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *490.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ МАЛОБЕРЦО́ВЫХ МЫШЦ ВЕ́РХНИЙ (retinaculum musculorum peronaeorum superius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *503.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ МАЛОБЕРЦО́ВЫХ МЫШЦ ДИСТА́ЛЬНЫЙ (retinaculum musculorum fibularium distale, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *502.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ МАЛОБЕРЦО́ВЫХ МЫШЦ НИ́ЖНИЙ (retinaculum musculorum peronaeorum inferius, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *502.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ МАЛОБЕРЦО́ВЫХ МЫШЦ ПРОКСИМА́ЛЬНЫЙ (retinaculum musculorum fibularium proximale, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *503.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ РАЗГИБА́ТЕЛЕЙ (retinaculum extensorum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *492.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ СГИБА́ТЕЛЕЙ (retinaculum flexorum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *493.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИ́ЛИЙ МАЛОБЕРЦО́ВЫХ МЫШЦ ВЕ́РХНИЙ [retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) superius, PNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *503.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИ́ЛИЙ МАЛОБЕРЦО́ВЫХ МЫШЦ НИ́ЖНИЙ [retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) inferius, PNA] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *502.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИ́ЛИЙ МЫШЦ-СГИБА́ТЕЛЕЙ (retinaculum musculorum flexorum, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *499.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИ́ЛИЙ РАЗГИБА́ТЕЛЕЙ ВЕ́РХНИЙ (retinaculum musculorum extensorum superius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *496.*

УДЕ́РЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИ́ЛИЙ РАЗГИБА́ТЕЛЕЙ НИ́ЖНИЙ (retinaculum musculorum extensorum inferius, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *495.*

УДУ́ШЬЕ (asphyxia) — см. *Асфиксия.*

УЗДЕ́ЧКА ВЕ́РХНЕГО МОЗГОВО́ГО ПА́РУСА (frenulum veli medullaris superioris, PNA; frenulum veli medullaris anterioris, BNA, JNA; син. уздечка переднего мозгового паруса) — волокнистый тяж, соединяющий верхний мозговой парус с крышей среднего мозга.

УЗДЕ́ЧКА ВЕ́РХНЕЙ ГУБЫ́ (frenulum labii superioris, PNA, BNA, JNA) — вертикальная складка слизистой оболочки полости рта, соединяющая середину верхней губы с десной.

УЗДЕ́ЧКА ИЛЕОЦЕКА́ЛЬНОГО КЛА́ПАНА (frenulum valvae ileocaecalis, PNA; frenulum valvulae coli, BNA; frenula valvulae, JNA) — совокупность складок слизистой оболочки слепой кишки, являющихся продолжением верхней и нижней складок илеоцекального клапана.

УЗДЕ́ЧКА КЛИ́ТОРА (frenulum clitoridis, PNA, BNA, JNA) — кожная складка, соединяющая передние концы малых половых губ с нижней поверхностью клитора.

УЗДЕ́ЧКА КРА́ЙНЕЙ ПЛО́ТИ (frenulum preputii, PNA; frenulum praeputii, BNA, JNA; син. уздечка полового члена) — кожная складка, соединяющая крайнюю плоть с головкой полового члена.

УЗДЕ́ЧКА НИ́ЖНЕЙ ГУБЫ́ (frenulum labii inferioris, PNA, BNA, JNA) — вертикальная складка слизистой оболочки полости рта, соединяющая середину нижней губы с десной.

УЗДЕ́ЧКА ПЕРЕ́ДНЕГО МОЗГОВО́ГО ПА́РУСА — см. *Уздечка верхнего мозгового паруса.*

УЗДЕ́ЧКА ПОЛОВО́ГО ЧЛЕ́НА — см. *Уздечка крайней плоти.*

УЗДЕ́ЧКА ПОЛОВЫ́Х ГУБ (frenulum labiorum pudendi, PNA, BNA, JNA) — поперечная складка кожи, соединяющая задние концы малых половых губ; ограничивает преддверие влагалища.

УЗДЕ́ЧКА ЯЗЫКА́ (frenulum linguae, PNA, BNA, JNA) — складка слизистой оболочки полости рта, идущая по сред-

шей линии и соединяющая дно полости рта с нижней поверхностью языка.

У́ЗЕЛ (nodus) — первичный морфологический элемент кожных сыпей, представляющий собой инфильтрат, развивающийся в глубоких слоях дермы и подкожной клетчатке.

УЗЕ́ЛКИ БУША́РА — см. *Бушара узелки.*

УЗЕ́ЛКИ ДОЙЛЬЩИЦ — см. *Оспа коровья ложная.*

УЗЕ́ЛКИ О́СЛЕРА — см. *Ослера узелки.*

УЗЕ́ЛКИ ПЕВЦО́В — см. *Ларингит узелковый.*

УЗЕ́ЛКИ ПЕВЦО́В ЛО́ЖНЫЕ — см. *Псевдоузелки певцов.*

УЗЕ́ЛКИ ПОДАГРИ́ЧЕСКИЕ (prurigo uratica) — зудящие пруригинозные высыпания на ногах, возникающие при подагре.

УЗЕЛО́К — см. *Папула.*

УЗЕЛО́К ПЫЛЕВО́Й — см. *Узелок фиброзно-пылевой.*

УЗЕЛО́К РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ (nodulus rheumaticus) — см. *Гранулема ревматическая.*

УЗЕЛО́К РЕВМАТО́ИДНЫЙ — плотное образование величиной от рисового зерна до грецкого ореха, возникающее при ревматоидном артрите в подкожной клетчатке, чаще на разгибательной поверхности локтевого сустава.

УЗЕЛО́К СИЛИКОТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Гранулема силикотическая.*

УЗЕЛО́К ТАЛЬКО́ЗНЫЙ — см. *Гранулема талькозная.*

УЗЕЛО́К ТИФО́ЗНЫЙ — см. *Гранулема брюшнотифозная.*

УЗЕЛО́К УШНО́Й РА́КОВИНЫ БОЛЕ́ЗНЕННЫЙ — см. *Хондродерматит ушного завитка хронический.*

УЗЕЛО́К ФИБРО́ЗНО-ПЫЛЕВО́Й (син. узелок пылевой) — очаг отложения пыли, образующийся в легких периваскулярно и перибронхиально при силикозах.

УЗЛОВА́ТОСТИ ОКОЛОСУСТАВНЫЕ СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЕ (nodositates juxtaarticulares syphiliticae) — см. *Жансельма — Лютца узловатости.*

УЗЛОВЫ́Е ТО́ЧКИ ОПТИ́ЧЕСКОЙ СИСТЕ́МЫ ГЛА́ЗА — две точки оптической оси глаза, характеризующиеся тем, что лучи света, проходящие через каждую точку, образуют одинаковый угол с оптической осью, т. е. не преломляются, а только смещаются; используются для расчетов в физиологической оптике.

УЗЛООБРАЗОВА́НИЕ КИШО́К — форма кишечной непроходимости, характеризующаяся образованием узла из петель тонкой кишки.

УЗЛЫ ОКОЛОСУСТАВНЫ́Е (noduli juxtaarticulares) — см. *Жансельма — Лютца узловатости.*

УЗЛЫ ЧЕРЕПНЫ́Х НЕ́РВОВ — см. *Ганглии черепных нервов чувствительные.*

УЗНАВА́НИЕ в психологии — психический процесс отождествления объекта с тем, что уже было воспринято когда-то.

УЗУ́РА НОГТЕВА́Я (лат. usura пользование, применение) — деформация свободного края ногтя, возникшая в результате его стирания при постоянном расчесывании кожи.

УЙКХЕМА СЕ́ТКА (L. F. Wickham, 1861—1913, франц. дерматолог) — мелкая сетчатость на поверхности папул; симптом красного плоского лишая, обусловленный неравномерным гранулезом.

УЙЛИСА — БАЛЬФУ́РА — МАКСУИ́НИ СИНДРО́М — см. *Уиллс — Бальфура — Мак-Суини синдром.*

УЙЛКИНСА ПРО́БА (L. Wilkins, амер. эндокринолог) — метод диагностики болезней гипофиза и (или) надпочечников; заключается во введении больному больших доз глюкокортикоидов, подавляющих секрецию адренокортикотропного гормона с последующим определением содержания 17-кетостероидов в моче.

УЙЛКИНСОНА БОЛЕ́ЗНЬ (J. F. Wilkinson, род. в 1897 г., англ. гематолог) — см. *Анемия B_{12}-фолиево-ахрестическая.*

УЙЛЛЕТТА ОПЕРА́ЦИЯ (J. A. Willett, 1872—1932, англ. акушер) — см. *Иванова — Гаусса кожно-головные щипцы.*

УЙЛЛЕТТА — ИВАНО́ВА — ГА́УССА СПО́СОБ (J. A. Willett, 1872—1932, англ. акушер; А. А. Иванов, сов. акушер-гинеколог; C. J. Gauss, 1875—1957, нем. гинеколог) — см. *Иванова — Гаусса кожно-головные щипцы.*

УЙЛЛИСА ТЕО́РИЯ О́ПУХОЛЕВОГО ПО́ЛЯ (W. Willis, англ. патолого-анатом) — теория, согласно к-рой злокачественная опухоль возникает не из одной клетки, а из множества рядом расположенных клеток, подвергшихся воздействию онкогенного агента.

УЙЛЛС — БАЛЬФУ́РА — МАК-СУЙНИ СИНДРО́М (L. Wills, англ. врач 20 в.; Balfour; Mc. Swiney; син. анемия беременных мегалоцитарная субтропическая) — сочетание стоматита, сопровождающегося лихорадкой, с гиперхромной анемией и лейкопенией с относительным лимфоцитозом; наблюдается в тропиках у беременных при выраженной неполноценности питания и прекращается после родов или прерывания беременности.

УЙЛЛЬЯМСА ОПЕРА́ЦИЯ (D. I. Williams, англ. уролог) — хирургическая операция: удлинение отдела мочеточника, расположенного в стенке мочевого пузыря, путем перемещения устья мочеточника вместе с клиновидным лоскутом слизистой оболочки мочевого пузыря в дистальном направлении; применяется при пузырно-мочеточниковом рефлюксе.

УЙЛСОНА АРТРОДЕ́З (J. C. Wilson, род. в 1888 г., амер. хирург) — внесуставной артродез тазобедренного сустава с помощью костного трансплантата на ножке из крыла подвздошной кости, свободный конец к-рого укрепляют в подготовляемой выемке у основания большого вертела.

УЙЛСОНА ОТВЕДЕ́НИЯ (F. N. Wilson, 1890—1952, амер. кардиолог; син. Вильсона отведения) — система отведений электрокардиограммы, при к-рой регистрируют разность потенциалов между «активным» электродом, расположенным на одной из конечностей или на определенном участке грудной клетки, и объединенным «нулевым» электродом, три разветвления к-рого накладывают на правую и левую руки и левую ногу.

УЙЛСОНА ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ ТЕРМИНА́ЛЬ (F. N. Wilson, 1890—1952, амер. кардиолог) — см. *Электрод нулевой.*

УЙНТЕРБОТТОМА ПРИЗНАК (Th. M. Winterbottom, 1764—1859, амер. врач) — увеличение лимфатических узлов в латеральной области шеи при африканском трипаносомозе.

УЙППЛА БОЛЕ́ЗНЬ (J. H. Whipple, род. в 1878 г., амер. патолог)— см. *Липодистрофия интестинальная.*

УЙППЛА ТРИА́ДА (A. O. Whipple, род. в 1881 г., амер. хирург) — сочетание постоянно пониженного содержания глюкозы в крови с возникновением натощак приступов гиперинсулинизма, устраняемых введением глюкозы; синдром гиперфункции поджелудочной железы, напр. при инсуломе.

УЙТМЕНА ГИПСО́ВАЯ ПОВЯ́ЗКА (R. Whitman, 1857—1946, амер. хирург) — круговая гипсовая повязка, накладываемая от подмышечной впадины до кончиков пальцев стопы в положении разгибания, сильного отведения и ротации бедра внутрь; предложена для лечения переломов шейки бедренной кости.

УЙТМЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (R. Whitman) — хирургическая операция: восстановление функции тазобедренного сустава при ложном суставе шейки бедренной кости, заключающаяся в удалении ее головки, придании шейке бедренной кости округлой формы, соответствующей вертлужной впадине, и в пересадке большого вертела на наружную поверхность кости.

УКА́ЧИВАНИЕ (син.: болезнь воздушная, болезнь морская) — патологическое состояние, возникающее у нек-рых людей при полетах на летательных аппаратах или при плавании на судах, вызываемое длительным раздражением вестибулярного анализатора и проявляющееся слабостью, головокружением, усиленным слюноотделением, потливостью, тошнотой, рвотой.

УКРЫ́ТИЕ ПОРАЖЁННЫХ — защита пораженных на поле боя от возможных повторных поражений до их выноса или вывоза.

У́КСУСНАЯ КИСЛОТА́ (acidum aceticum; син. этановая кислота) — природная предельная монокарбоновая кислота, являющаяся в организме исходным продуктом биосинтеза многих веществ, напр. жирных кислот, стероидов, стеринов, терпенов; входит в состав ацетилкоэнзима А.

У́КСУСНЫЙ АЛЬДЕ́ГИД (син.: ацетальдегид, этаналь) — простейший природный альдегид ациклического ряда, промежуточный продукт спиртового брожения; участвует в цикле трикарбоновых к-т; производные У. а. применяются в качестве лекарственных средств.

УКУ́ТЫВАНИЕ — см. *Обертывание.*

У́ЛЕНБРУКА MÉТОД (истор.; P. Uhlenbruck, род. в 1897 г., нем. врач) — метод выявления скрытой недостаточности кровообращения, основанный на том, что в этом случае при дыхании чистым кислородом его потребление в первые 6 мин. на 10—60% больше, чем при дыхании воздухом.

У́ЛЕНГУТА СРЕДА́ (P. Th. Uhlenhuth, 1870—1957, нем. бактериолог) — жидкая или полужидкая селективная питательная среда для выращивания лептоспир, содержащая инактивированную сыворотку крови кролика.

ULERYTHÉMA (мед. лат., от греч. ulē рубец + *эритема*; син.: атрофия кожи рубцовая, эритема рубцующаяся) — поражение кожи в виде эритемы с образованием атрофических рубцов.

ULERYTHÉMA OPHRYOGÉNES (греч. ophrys бровь + -genēs порожда-

емый, возникающий; син.: кератоз волосяной красный атрофический лица, Унны — Тенцера ulerythema ophryogenes, фолликулит атрофический) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся развитием Ulerythema в области бровей и околоушной железы, сопровождающийся фолликулитами.

ULERYTHÉMA SYCOSIFÓRME — см. *Сикоз люпоидный.*

УЛИ́ТКА (cochlea, PNA, BNA, JNA) — часть костного лабиринта, представляющая собой совокупность костного образования конической формы (стержень улитки) и костного канала спиральной формы (спиральный канал), обвивающего стержень двумя с половиной витками.

УЛИ́ТКА ЗАСТО́ЙНАЯ (cochlea congestiva) — сочетание прогрессирующей перцептивной тугоухости, шума в ушах и вестибулярных нарушений, обусловленное повышенным внутричерепным давлением, нарушением кровообращения во внутреннем ухе или гиперсекрецией эндолимфы.

УЛИ́ТКИ — см. *Моллюски брюхоногие.*

УЛИ́ТКОВОЕ ОКНО́ — см. *Окно улитки.*

УЛИ́ТКОВЫЕ ТО́КИ — биопотенциалы спирального (кортиевого) органа улитки.

УЛИ́ТКОВЫЙ ПРОТО́К (ductus cochlearis, PNA, BNA, JNA; син.: канал улитки, проток улитки) — канал перепончатого лабиринта, расположенный в спиральном канале улитки.

ÚLCUS RÓDENS (мед. лат. «разъедающая язва») — см. *Базалиома.*

У́ЛЛЬРИХА СИНДРО́М (O. Ullrich, 1894—1957, нем. педиатр; син.: Бонневи — Уллриха синдром, Уллриха статус) — аномалия развития: наличие кожных складок на шее между сосцевидным отростком и акромионом, сочетающееся с множественными изменениями конечностей (синдактилия, клинодактилия, врожденный вывих бедра и т. д.); сопровождается лимфангиэктазией и отеком тыльных поверхностей кистей и стоп.

У́ЛЛЬРИХА СТА́ТУС (O. Ullrich) — см. *Уллриха синдром.*

УЛОТРИХИЯ (ulotrichia; греч. ulothrrix, ulotrichos курчавоволосый) — курчавость волос головы.

УЛЬНА́РНЫЙ (ulnaris; лат. ulna локоть) — относящийся к локтевой кости, к стороне предплечья, где расположена локтевая кость.

УЛЬТИМОБРАНХИА́ЛЬНЫЕ ТЕЛА́ (corpora ultimobranchialia, LNE; лат. ultimus самый дальний + греч. branchia жабры; син. постбранхиальные тела) — дивертикулы четвертой пары жаберных карманов зародыша (по нек-рым данным, рудименты пятой пары), являющиеся источником клеток щитовидной железы, продуцирующих кальцитонин.

УЛЬТРА- (лат. ultra- больше, сверх, за пределами) — приставка, означающая: «крайняя мера чего-либо», «сверх», «за пределами».

УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТО́ТНЫЕ ТО́КИ (токи УВЧ) — электромагнитные колебания частотой от 30 до 300 *Мгц*; применяются как средство электролечения.

УЛЬТРАЗВУ́К (син. ультразвуковые колебания) — упругие колебания физической среды с частотой более 20 *кгц*, не слышимые человеком; используется с диагностическими и лечебными целями.

УЛЬТРАЗВУКОВА́Я РЕ́ЗКА — рассечение тканей с помощью специальных инструментов, соединенных с генератором ультразвука.

УЛЬТРАЗВУКОВА́Я СВА́РКА — метод бесшовного соединения тканей, основанный на использовании полимерного клея и воздействии на него ультразвуком.

УЛЬТРАЗВУКОВО́Й ИЗЛУЧА́ТЕЛЬ — устройство, преобразующее электрические колебания, создаваемые генератором высокой частоты, в ультразвуковые колебания; применяется в ультразвуковых терапевтических и диагностических аппаратах.

«УЛЬТРАЗВУКОВЫ́Е ВЕСЫ́» — см. *Дозиметр ультразвуковой.*

УЛЬТРАЗВУКОВЫ́Е КОЛЕБА́НИЯ — см. *Ультразвук.*

УЛЬТРАМИКРОАНА́ЛИЗ — общее название методов качественного и количественного анализа очень малых количеств вещества (вес пробы меньше 1 *мкг*, объем раствора меньше 1 *мкл*), напр. при цитохимических исследованиях.

УЛЬТРАМИКРОСКО́П (*ультра-* + *микроскоп*) — оптический микроскоп с боковым осветителем специальной конструкции, предназначенный для выявления частиц, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности обычного оптического микроскопа, т. е. менее 0,15 *мкм*.

УЛЬТРАМИКРОТО́М (*ультра-* + *микротом*) — аппарат для автоматизированного приготовления сверхтонких срезов тканей заданной толщины (5—10 *нм*), предназначенных для электронно-микроскопического исследования.

УЛЬТРАПАСТЕРИЗА́ЦИЯ (*ультра-* + *пастеризация*) — см. *Уперизация.*

УЛЬТРАСТРУКТУРОМЕТРИ́Я (син. цитометрия субмикроскопическая) — совокупность методов измерения структур клетки, невидимых в световой микроскоп.

УЛЬТРАТЕРМОСТА́Т (*ультра-* + *термостат*) — аппарат для создания и автоматического поддержания в замкнутом объеме заданной температуры в пределах 30—99° с отклонениями не более ±0,05°.

УЛЬТРАФИЛЬТРА́Т (*ультра-* + *фильтрат*) — продукт фильтрации жидкости через биологическую или искусственную полупроницаемую мембрану; первичная моча является У. плазмы крови, образующимся в клубочках почек.

УЛЬТРАФИЛЬТРА́ЦИЯ (*ультра-* + *фильтрация*) — процесс фильтрации через биологические или искусственные полупроницаемые мембраны; напр. образование первичной мочи.

У. КАПИЛЛЯ́РНАЯ — У. плазмы крови или тканевой жидкости через стенку кровеносного капилляра, происходящая под действием разности тканевого осмотического давления и суммы осмотического и гидростатического давления в просвете капилляра; обеспечивает переход через стенку кровеносного капилляра воды и других соединений небольшой молекулярной массы.

УЛЬТРАФИ́ЛЬТР (*ультра-* + *фильтр*) — мембранный бактериальный фильтр с диаметром пор 10—270 *нм*.

УЛЬТРАФИОЛЕ́ТОВАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ — см. *Солнечная недостаточность.*

УЛЬТРАФИОЛЕ́ТОВАЯ ПРО́БА в неврологии — метод выявления одностороннего поражения вегетативной нервной системы, заключающийся в одновременном и равном по величине воздействии ультрафиолетовым излучением на симметричные участки кожи с последующим сравнением степени выраженности на них эритемы.

УЛЬТРАФИОЛЕ́ТОВЫЕ ЛУЧИ́ — см. *Излучение ультрафиолетовое.*

УЛЬТРАФИОЛЕ́ТОВЫЙ МИКРОУКО́Л — см. *Чахотина метод.*

УЛЬТРАФОНОФОРЕ́З (*ультра-* + *фонофорез*) — см. *Фонофорез.*

УЛЬТРАЦЕНТРИФУ́ГА (*ультра-* + *центрифуга*) — центрифуга, обладающая очень высокой скоростью вращения ротора, обеспечивающей разделение частиц в высокодисперсных суспензиях и коллоидных растворах; применяется в биохимических исследованиях, напр. при определении молекулярной массы высокомолекулярных соединений.

У́ЛЬТЦМАННА КАТЕ́ТЕР (R. Ultzmann, 1842—1889, нем. уролог) — металлический мужской уретральный катетер для промывания мочевого пузыря, снабженный кольцом для ограничения глубины введения.

УЛЬЦЕРО́ЗНЫЙ (ulcerosus; лат. ulcus, ulceris язва) — характеризующийся наличием язвы (язв); приводящий к изъязвлению.

УМБИЛИКА́ЛЬНЫЙ (umbilicalis; лат. umbilicus пупок) — относящийся к пупку.

У́МИКОВА РЕА́КЦИЯ — метод, позволяющий отличить женское молоко от молока животных; основан на появлении красно-фиолетовой окраски при добавлении аммиака в женское молоко.

УМИРА́НИЕ — последовательно развивающийся процесс прекращения жизнедеятельности организма в терминальном состоянии, предшествующий наступлению биологической смерти; характеризуется постепенным угасанием функций различных систем, органов и тканей, протекающим, как правило, в порядке, обратном их созреванию в филогенезе.

У́МСТВЕННАЯ ЖВА́ЧКА — см. *Мудрствование навязчивое.*

УМЯГЧЕ́НИЕ ВОДЫ́ — уменьшение жесткости воды путем полного или частичного освобождения ее от ионов кальция и магния.

У́НГЕРМАННА СРЕДА́ (H. Ungermann, нем. врач) — жидкая питательная среда для хранения культур менингококков, стрептококков, пневмококков и выращивания спирохет; представляет собой сыворотку крови, прогретую при *t*° 58—60° в течение 30 мин. и покрытую слоем стерильного парафина.

У́НДРИЦА ДИРЕКТОСКО́П (истор.; В. Ф. Ундриц, 1891—1963, сов. оториноларинголог) — см. *Директоскоп.*

У́НДРИЦА ОПЕРА́ЦИЯ (В. Ф. Ундриц) — 1) хирургическая операция по поводу гнойного воспаления в области верхушки пирамиды височной кости; доступ к гнойному очагу осуществляется одновременно с наружной поверхности пирамиды и со стороны барабанной полости; 2) хирургическая операция по поводу хронического гнойного отита с изолированным поражением над-

барабанного углубления; вскрытие надбарабанного углубления и сосцевидной пещеры образует общую полость, отделенную от барабанной полости, что позволяет сохранить слуховые косточки и остатки барабанной перепонки.

УНДУЛИ́РУЮЩАЯ МЕМБРА́НА (лат. undulatus волнообразный) — органоид движения некоторых простейших (напр., трихомонад, трипаносом), представляющий собой перепонку, образованную складкой клеточной оболочки и жгутом.

УНДУЛИ́РУЮЩИЙ (лат. undulatus волнообразный) — волнообразный.

УНДУЛЯ́ЦИЯ (лат. undulatus волнообразный) — феномен распространения ударной волны через жидкость, скопившуюся в одной из крупных полостей организма (чаще — в брюшной), на стенку полости; вызывается толчком руки при бимануальной пальпации живота.

УНИ- (лат. unus один) — составная часть сложных слов, означающая «один», «единственный», «единичный».

УНИВАЛЕ́НТ (*уни-* + лат. valens, valentis сильный) — неконъюгировавшая хромосома в первом делении мейоза.

УНИВЕРСА́ЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯ́ЗОЧНЫЙ ПАКЕ́Т — индивидуальный перевязочный пакет, подушечки к-рого покрыты металлизированным нетканым материалом, предупреждающим присыхание повязки к ожоговой (раневой) поверхности.

УНИВЕРСИТЕ́Т ЗДОРО́ВЬЯ — см. *Народный университет здоровья.*

УНЛЮ́СТ (нем. Unlust неудовольствие, скука) — беспричинная подавленность настроения и раздражительность, сопровождающиеся отсутствием желаний и неприязненным отношением к окружающему; наблюдается в раннем периоде многих психических болезней.

У́ННЫ КОЛЛАСТИ́Н (P. G. Unna, 1850—1929, нем. дерматолог) — см. *Колластин.*

У́ННЫ ОКРА́СКА (P. G. Unna) — 1) метод окраски соединительнотканных волокон сначала смесью растворов водного голубого, орсеина, глицерина, ледяной уксусной кислоты и эозина в абсолютном этиловом спирте, а затем — раствором сафранина и бихромата калия; коллагеновые волокна окрашиваются в синий цвет, эластические — в буро-красный, ядра клеток — в красно-фиолетовый, а цитоплазма — в сине-фиолетовый; 2) (син. Унны — Тенцера метод) — метод окраски эластических волокон спиртовым раствором орсеина с последующим обесцвечиванием раствором соляной кислоты в этиловом спирте; эластические волокна окрашиваются в буро-красный цвет; 3) метод окраски кератогиалина гемалауном с последующей обработкой перманганатом калия; кератогиалиновые зерна окрашиваются в темно-голубой цвет; 4) метод окраски плазматических и тучных клеток полиморфным метиленовым синим с последующей обработкой глицериново-эфирной смесью; гранулы тучных клеток окрашиваются в красный цвет, плазматические клетки — в голубой; 5) метод окраски волосяных влагалищ раствором нильского голубого и водным раствором бордо с последующей обработкой абсолютным этиловым спиртом, подщелоченным аммиаком; кератогиалин окрашивается в винно-красный цвет; 6) метод обнаружения вирусных включений в срезах тканей путем их окраски оранжевым G, эозином и полихромным метиленовым синим.

У́ННЫ ПЛАЗМАТИ́ЧЕСКИЕ КЛЕ́ТКИ (P. G. Unna) — плазматические клетки воспалительного инфильтрата с резко пиронинофильной цитоплазмой.

У́ННЫ СЕБОРЕ́ЙНАЯ КОРО́НА (P. G. Unna) — эритематозно-сквамозные четко отграниченные высыпания на границе лба и волосистой части головы; признак себореи.

У́ННЫ СИМПТО́М (P. G. Unna) — покраснение и набухание высыпаний при их механическом раздражении; признак пигментной крапивницы.

У́ННЫ СКУТУЛЯ́РНЫЙ ПАРАКЕРАТО́З (P. G. Unna) — см. *Паракератоз скутулярный.*

У́ННЫ ФИБРОКЕРАТО́МА (P. G. Unna) — см. *Кожный рог.*

У́ННЫ — ПА́ППЕНГЕЙМА МЕ́ТОД (P. G. Unna, 1850—1929, нем. дерматолог; A. Pappenheim, 1870—1917, нем. патолог) — метод дифференцировки рибо- и дезоксирибонуклеиновых кислот в клетках путем окраски гистологического препарата смесью метилового зеленого и пиронина.

У́ННЫ — САНТИ — ПО́ЛЛИТЦЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (P. G. Unna, 1850—1929, нем. дерматолог; Santi; S. Pollitzer, 1859—1937, амер. дерматолог) — см. *Парапсориаз лихеноидный.*

У́ННЫ — ТЕ́НЦЕРА МЕ́ТОД (P. G. Unna, 1850—1929, нем. дерматолог; P. Taenzer, 1858—1919, нем. дерматолог) — см. *Унны окраска*[2].

У́ННЫ — ТЕ́НЦЕРА ULERYTHÉMA OPHRYOGÉNES (P. G. Unna; P. Taenzer) — см. *Ulerythema ophriogenes.*

У́ННЫ — ТО́СТА КЕРАТО́З (P. G. Unna, 1850—1929, нем. дерматолог; Thost) — см. *Унны — Тоста наследственная кератодермия.*

У́ННЫ — ТО́СТА НАСЛЕ́ДСТВЕННАЯ КЕРАТОДЕРМИ́Я (P. G. Unna; Thost; син.: Унны — Тоста кератоз, Унны — Тоста синдром) — наследственный дерматоз, характеризующийся возникновением массивных роговых наслоений на ладонях и подошвах, сочетающихся с локальным гипергидрозом, гиперонихией, иногда с множественными липомами, дистрофией роговицы и олигофренией; наследуется по аутосомно-доминантному и аутосомно-рецессивному типу.

У́ННЫ — ТО́СТА СИНДРО́М (P. G. Unna; Thost) — см. *Унны — Тоста наследственная кератодермия.*

УНТЕРБЕРГЕРА СПО́СОБ (Unterberger) — способ определения степени раскрытия отверстия матки по высоте стояния контракционного кольца над лобковым симфизом.

УНТЕРХАРНШЕЙДТА СИНКОПА́ЛЬНЫЙ ВЕРТЕБРА́ЛЬНЫЙ СИНДРО́М (F. Unterharnscheidt, нем. невропатолог) — возникновение при поворотах головы кратковременной потери сознания с диффузной мышечной гипотонией; наблюдается у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника и обусловлен нарушением кровообращения в системе позвоночной и базилярной артерий.

УНЦИНАРИО́З (uncinariosis) — гельминтоз, вызываемый внедрением в кожу человека личинок нематоды Uncinaria stenocephala, паразитирующей у животных; характеризуется развитием дерматита и крапивницы.

У́НЦИЯ (истор.: лат. uncia) в медицине — аптекарская мера веса, применявшаяся в России до введения метрической системы; составляла $^1/_{12}$ аптекарского фунта, т. е. 29,860 *г.*

УО́КЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (A. E. Walker, род. в 1907 г., амер. нейрохирург) — хирургическая операция: перерезка проводящих путей в дорсолатеральной части среднего мозга при болевых синдромах, не поддающихся другим воздействиям.

УО́ЛЛЕСА ПРА́ВИЛО ДЕВЯ́ТОК (A. B. Wallace, совр. англ. хирург) — схема определения процентного отношения площади ожогов к общей площади поверхности тела, согласно к-рой голова и шея составляют 9%, верхняя конечность — 9%, бедро — 9%, голень со стопой — 9%, передняя поверхность туловища — 18%, задняя — 18%, промежность и половые органы 1% поверхности тела.

УО́ЛТЕРА КОРА́ [W. G. Walter, род. в 1910 г., англ. физиолог; англ. conditioned reflex analogue (cora) аналог условного рефлекса] — кибернетическое устройство, реагирующее на отдельное раздражение разрядом неоновой лампочки и образующее простые ассоциации между звуковым и световым раздражителями; аналог условного рефлекса.

УО́ЛТЕРСА — МЕ́РША — МАК-КИ́ННОМА — КО́ЛЛИ МЕ́ТОД (Walters; Moersch; McKinnom; Colley) — хирургическая операция: наложение анастомоза «бок в бок» между селезеночной и печеночной венами при портальной гипертензии.

УО́ррена ОПЕРА́ЦИЯ (J. C. Warren, 1842—1927, амер. хирург) — хирургическая операция: удаление опухоли молочной железы; разрез кожи производят по латеральному краю железы, отворачивают ее к средней линии и клиновидно иссекают ее вместе с опухолью.

УО́РСТА ГОНИОЛИ́НЗА — контактная линза, предназначенная для наблюдения за радужно-роговичным углом глаза во время хирургической операции; представляет собой усеченный цилиндр с вогнутой поверхностью, обращенной к роговице, к-рый фиксируют к глазному яблоку швами; снабжена окошечком, через к-рое инструменты вводят в переднюю камеру глаза.

УО́РТА МЕ́ТОД (C. Worth, 1869—1936, англ. офтальмолог) — метод исследования бинокулярного зрения с помощью прибора, в к-ром разделение полей зрения обоих глаз достигается с помощью красного и зеленого стекол.

УО́РТИНА О́ПУХОЛЬ (A. S. Warthin, 1866—1931, амер. патолог) — см. *Аденолимфома.*

УО́РТИНА — ФИ́НКЕЛЬДЕЯ КЛЕ́ТКИ (A. S. Warthin, 1866—1931, амер. патолог; W. Finkeledey, нем. патолого-анатом 20 в.)— гигантские многоядерные клетки, обнаруживаемые в фолликулах лимфатических узлов при кори.

УО́ТЕРХАУСА — ФРИДЕРИКСЕ́НА СИНДРО́М (R. Waterhouse, род. в 1873 г., англ. врач; C. Friderichsen, род. в 1886 г., датский педиатр) — см. *Недостаточность коры надпочечников острая.*

УО́ТСОНА ПРА́ВИЛО (Watson) — правило, согласно к-рому наследуемые признаки обладают различной характерной для каждого из них скоростью эво-

люции, в силу чего не может происходить одновременного изменения большей части или всей совокупности признаков.

УО́ТСОНА — КРИ́КА СПИРА́ЛЬ (J. D. Watson, род. в 1928 г., амер. биохимик; F. H. Crick, род. в 1916 г., англ. биофизик) — модель молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты в виде двух полинуклеотидных нитей, ориентированных в виде правостороннего винта и объединенных водородными связями между азотистыми основаниями.

УО́ТСОНА — ТО́ЛАНА МЕ́ТОД (L. A. Watson, амер. оториноларинголог; Th. Tolan, амер. оториноларинголог) — метод аудиометрии, применяемый при дифференциальной диагностике кондуктивной и перцептивной тугоухости; заключается в определении величины изменения порога слуха для тона 1000 или 2000 *гц*, наступающего при подаче его на фоне маскирующего тона (200—250 *гц*).

УО́ТСОН-ДЖО́НСА РЕДРЕССА́ЦИЯ ПОЗВОНО́ЧНИКА (R. Watson-Jones, 1902—1973, англ. хирург-ортопед) — способ редрессации позвоночника: больного укладывают лицом вниз на два стола так, чтобы живот свободно провисал в промежутке между ними; применяется при компрессионных переломах тел позвонков.

УОТСОНИО́З (watsoniosis) — тропический гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый Watsonius Watsoni, паразитирующим в тонкой кишке.

УПЕРИЗА́ЦИЯ (син.: сверхпастеризация, ультрапастеризация) — метод обезвреживания жидких пищевых продуктов путем введения в них водяного пара, нагретого до 150—160°, и последующего быстрого охлаждения.

УПРАВЛЕ́НИЕ в кибернетике — целенаправленный процесс, призванный обеспечить функционирование управляемого объекта в соответствии с заданным критерием; аналогичные принципы заложены в процессы регуляции физиологических функций организма.

УПРАВЛЕ́НИЕ БОЛЬНИ́ЧНОЙ БА́ЗЫ (УББ) — орган управления в системе медицинской службы Гражданской обороны, предназначенный для руководства больничными коллекторами и отдельными учреждениями и формированиями, входящими в состав больничной базы.

УПРАВЛЕ́НИЕ ГОЛОВНО́ГО ПОЛЕВО́ГО ЭВАКОПУ́НКТА С ЭВАКОПРИЁМНИКОМ (истор.; УГПЭП) — лечебно-эвакуационное учреждение периода 1942—1945 гг., созданное путем объединения головного отделения полевого эвакуационного пункта с эвакоприемником.

УПРАВЛЕ́НИЕ ГОСПИТА́ЛЬНОЙ БА́ЗЫ (УГБ) — орган управления в составе военно-медицинской службы, осуществляющий руководство лечебно-эвакуационной деятельностью госпиталей и других частей и учреждений госпитальной базы.

УПРАЖНЕ́НИЕ(-Я) в медицине — повторное выполнение каких-либо действий с целью укрепления и развития функциональных способностей организма или лечения болезней.

У. ДЫХА́ТЕЛЬНЫЕ — общее название физических У., используемых для развития и укрепления мышц, участвующих в процессе дыхания.

У. ИЗОМЕТРИ́ЧЕСКИЕ — физические У. в виде чередования напряжения и расслабления отдельных мышечных групп без соответствующих движений в суставах; применяются, напр., для поддержания нормального функционального состояния мышц конечности, иммобилизированной гипсовой повязкой.

У. ОРТОПТИ́ЧЕСКИЕ — У., направленные на восстановление бинокулярного зрения при лечении косоглазия; выполняются с помощью специальных приборов.

У. ФИЗИ́ЧЕСКИЕ — У. в виде движений туловища или конечностей; составленные на их основе комплексы движений используются для физического воспитания, профилактики и лечения болезней и травм.

УПРУ́ГОСТЬ МЫ́ШЦЫ — способность растянутой или сжатой в поперечном направлении мышцы возвращаться к первоначальному состоянию после устранения силы, вызвавшей деформацию; У. м. обусловлена эластичностью мышечной ткани и зависит от функционального состояния мышцы.

УР- (уро-; греч. uron моча) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к моче».

УРАМИ́Н — см. *Гуанидин*.

УРАНИ́ЗМ (uranismus; по имени греч. бога Урана) — 1) форма гомосексуализма у мужчины, полностью исключающая возможность сексуального влечения к женщинам; 2) см. *Педерастия*.

УРАНО- (греч. uranos небесный свод, небо; нёбо) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «относящийся к небу»; 2) «относящийся к нёбу».

УРАНОПЛА́СТИКА (uranoplastica; *урано-* + *пластика*; син. палатопластика) — общее наименование пластических операций устранения дефектов твердого нёба.

УРАНОФОБИ́Я (uranophobia; *урано-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь смотреть в небо.

УРАТУРИ́Я (uraturia; ураты + греч. uron моча) — повышенное содержание в моче уратов.

УРА́ТЫ — соли мочевой кислоты; в организме образуются как продукты обмена пуриновых нуклеотидов; накапливаются в крови при нек-рых болезнях, напр. при подагре, нефритах, лейкемиях; могут откладываться в тканях и образовывать конкременты.

УРА́ХУС (urachus, греч. uron моча + cheō лить, выливать) — см. *Мочевой проток*.

УРАЦИ́Л — пиримидиновое основание, входящее в состав рибонуклеиновых кислот.

У́РБАНА КЛИН — костный отломок клиновидной формы, образующийся при компрессионном переломе тела позвонка; может вдаваться в позвоночный канал и сдавливать спинной мозг.

У́РБАНА — ХО́ЛДИНА МАСТЭКТОМИ́Я (нрк.; J. A. Urban; C. A. Холдин, 1896—1974, сов. хирург-онколог) — см. *Эрбана — Холдина мастэктомия*.

УРБАНИЗА́ЦИЯ (франц. urbanisation, от лат. urbanus городской) — социально-демографический процесс, характеризующийся ростом численности городского населения, увеличением количества и величины городов; У. должна учитываться при долгосрочном планировании здравоохранения.

У́РБАХА ВНЕКЛЕ́ТОЧНЫЙ ХОЛЕСТЕРО́З (E. Urbach, 1893—1946, амер. дерматолог) — см. *Гиалиноз кожи и слизистых оболочек*.

У́РБАХА — ВИ́ТЕ БОЛЕ́ЗНЬ (E. Urbach, 1893—1946, амер. дерматолог; C. Wiethe, 1888—1949, австрийский оториноларинголог) — см. *Гиалиноз кожи и слизистых оболочек*.

У́РБАХА — ОППЕНГЕ́ЙМА ДИСЛИПОИДО́З КО́ЖИ (E. Urbach, 1893—1946, амер. дерматолог, M. Oppenheim, 1876—1949, австрийский дерматолог) — см. *Некробиоз липоидный диабетический*.

У́РБАХА — ОППЕНГЕ́ЙМА СИНДРО́М (E. Urbach; M. Oppenheim) — см. *Некробиоз липоидный диабетический*.

УРГИДРО́З (urhidrosis; *ур-* + греч. hidrōs пот + *-оз*) — выделение с потом мочевины и мочевой кислоты; наблюдается при почечной недостаточности.

УРЕА́ЗА — фермент класса гидролаз (КФ 3.5.1.5.), катализирующий гидролитическое расщепление мочевины до углекислого газа и аммиака; участвует в обмене пуринов у нек-рых видов животных.

УРЕЙДЫ — производные мочевины, в к-рой атомы водорода замещены кислотными радикалами; нек-рые У. являются промежуточными продуктами биосинтеза и распада пуринов и пиримидинов, нек-рые используются в качестве лекарственных средств (напр., кофеин, теофиллин, бромурал).

УРЕМИ́ЧЕСКИЙ (uraemicus) — относящийся к уремии, обусловленный уремией.

УРЕМИ́Я (uraemia; *ур-* + греч. haima кровь; син. мочекровие — устар.) — патологическое состояние, обусловленное задержкой в крови азотистых шлаков, ацидозом и нарушениями электролитного, водного и осмотического равновесия при почечной недостаточности; обычно проявляется слабостью, апатией, ступором, гипотермией, артериальной гипертензией; может возникнуть кома.

УРЕТЕР- (уретеро-; анат. ureter, от греч. urētēr мочеточник) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к мочеточнику».

УРЕТЕРИ́Т (ureteritis; *уретер-* + *-ит*) — воспаление мочеточника.

У. ВИЛЛЁЗНЫЙ (u. villosa, лат. villus ворсинка) — У., характеризующийся гиперплазией эпителия мочеточника с образованием ворсинок.

У. КИСТО́ЗНЫЙ (u. cystica) — У., характеризующийся образованием на слизистой оболочке мочеточника кист с прозрачным содержимым.

У. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (u. tuberculosa) — У., вызываемый микобактериями туберкулеза; характеризуется рубцеванием стенки мочеточника, приводящим к его неравномерному сужению и натяжению.

УРЕТЕРО- — см. *Уретер-*.

УРЕТЕРОВЕЗИКОСТОМИ́Я (ureterovesicostomia; *уретеро-* + анат. vesica urinaria мочевой пузырь + греч. stoma отверстие) — см. *Уретероцистонеостомия*.

УРЕТЕРОГИДРОНЕФРО́З (ureterohydronephrosis; *уретеро-* + *гидронефроз*) — значительное расширение почечной лоханки и всех цистоидов мочеточника; возникает при нарушении оттока мочи.

УРЕТЕРОГРАФИ́Я (*уретеро-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенологическое исследование мочеточника после его заполнения контрастным веществом; обычно сочетается с пиело- или урографией.

УРЕТЕРОИЛЕОПЛА́СТИКА (ureteroileoplastica; *уретеро-* + анат. ileum подвздошная кишка + *пластика*) — хирургическая операция: одно- или двустороннее замещение мочеточника изолированной петлей тонкой кишки на брыжейке.

УРЕТЕРОИЛЕОСТОМИ́Я (ureteroileostomia; *уретеро-* + анат. ileum подвздошная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: создание анастомоза между мочеточником и тонкой кишкой.

УРЕТЕРОКАЛИКОСТОМИ́Я [ureterocalycostomia; *уретеро-* + анат. calyx (calycis) renalis почечная чашечка + греч. stoma отверстие] — хирургическая операция: наложение анастомоза между мочеточником и нижней почечной чашечкой при нарушении оттока мочи из лоханки, расположенной внутрипочечно.

УРЕТЕРОКОЛОСТОМИ́Я (ureterocolostomia; *уретеро-* + греч. kolon толстая кишка + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между мочеточником и внутрибрюшинным отделом прямой кишки.

УРЕТЕРОКУТАНЕОСТОМИ́Я (ureterocutaneostomia; *уретеро-* + анат. cutaneus кожный + греч. stoma отверстие; син. уретеростомия кожная) — хирургическая операция: создание наружного свища мочеточника путем выведения дистального отдела мочеточника в рану и подшивания его слизистой оболочки к коже; применяется, напр., при цистэктомии как временное мероприятие при травме мочеточника.

УРЕТЕРО́ЛИЗ (ureterolysis; *уретеро-* + греч. lysis развязывание, освобождение) — хирургическая операция освобождения мочеточника из склеротически измененной парауретальной клетчатки или рубцов.

УРЕТЕРОЛИТОТОМИ́Я (ureterolithotomia; *уретеро-* + *литотомия*) — хирургическая операция: удаление камня из мочеточника путем вскрытия последнего.

У. ВЛАГА́ЛИЩНАЯ (u. vaginalis) — У. с доступом к нижнему отделу мочеточника через стенку влагалища.

УРЕТЕРОЛИТОЭКСТРА́КЦИЯ (*уретеро-* + греч. lithos камень + *экстракция*) — метод удаления камня из мочеточника путем низведения его в мочевой пузырь с помощью специального инструмента (экстрактора).

УРЕТЕРОНЕОИМПЛАНТА́ЦИЯ (ureteroneoimplantatio; *уретеро-* + греч. neos новый + *имплантация*) — хирургическая операция: вшивание мочеточника в какой-либо орган малого таза (мочевой пузырь, кишечник, влагалище, уретру) или выведение его на поверхность кожи.

УРЕТЕРОНЕОЦИСТОСТОМИ́Я (ureteroneocystostomia; *уретеро-* + греч. neos новый + kystis пузырь + stoma отверстие) — см. *Уретероцистонеостомия*.

УРЕТЕРОПИЕЛОГРАФИ́Я (*уретеро-* + *пиелография*) — см. *Пиелоуретерография*.

УРЕТЕРОПИЕЛОНЕОСТОМИ́Я (ureteropyeloneostomia; *уретеро-* + греч. pyelos лоханка + neos новый + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между почечной лоханкой и мочеточником; производится при нарушении прохождения мочи через прилоханочный отдел мочеточника.

УРЕТЕРОПИЕЛОРЕИМПЛАНТА́ЦИЯ (ureteropyeloreimplantatio; *уретеро-* + греч. pyelos лоханка + *реимплантация*) — пластическая операция: имплантация мочеточника с участком стенки почечной лоханки на то же место после устранения перегиба мочеточника через крупные аномальные сосуды нижнего полюса почки.

УРЕТЕРОПИЕЛОСТОМИ́Я (ureteropyelostomia; *уретеро-* + греч. pyelos лоханка + stoma отверстие) — хирургическая операция: вшивание мочеточника в почечную лоханку.

УРЕТЕРОРАФИ́Я (ureterorrhaphia; *уретеро-* + греч. rhaphē шов) — хирургическая операция: сшивание концов пересеченного или резецированного мочеточника.

УРЕТЕРОРЕКТОНЕОСТОМИ́Я (ureterorectoneostomia; *уретеро-* + анат. rectum прямая кишка + греч. neos новый + stoma отверстие; син. уретероректостомия) — хирургическая операция: имплантация мочеточников в прямую кишку, напр. после цистэктомии.

УРЕТЕРОРЕКТОСТОМИ́Я (ureterorectostomia; *уретеро-* + анат. rectum прямая кишка + греч. stoma отверстие) — см. *Уретероректонеостомия*.

УРЕТЕРОСИГМОАНАСТОМО́З (ureterosigmoanastomosis; *уретеро-* + анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка + *анастомоз*) — искусственный анастомоз между мочеточником и сигмовидной ободочной кишкой.

УРЕТЕРОСИГМОИДОСТОМИ́Я (ureterosigmoidostomia; *уретеро-* + анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка + греч. stoma отверстие) — см. *Гудвина — Белта — Соррентино операция*.

УРЕТЕРОСИГМОСТОМИ́Я (ureterosigmostomia; *уретеро-* + анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между мочеточником и сигмовидной ободочной кишкой для отведения мочи, главным образом после цистэктомии.

УРЕТЕРОСТОМИ́Я КО́ЖНАЯ (*уретеро-* + греч. stoma отверстие) — см. *Уретерокутанеостомия*.

УРЕТЕРОТОМИ́Я (ureterotomia; *уретеро-* + греч. tomē разрез, рассечение) — рассечение стенки мочеточника при хирургической операции.

У. ИНТУБАЦИО́ННАЯ (u. intubationalis) — У. с заживлением раны мочеточника на интубационной трубке, введенной в его просвет.

УРЕТЕРОУРЕТЕРОСТОМИ́Я (ureteroureterostomia; *уретеро-* + *уретеро-* + греч. stoma отверстие) — пластическая операция: наложение анастомоза между обоими мочеточниками.

УРЕТЕРОЦЕ́ЛЕ (ureterocele; *уретеро-* + греч. kēlē выбухание, припухлость; син. грыжа устья мочеточника) — кистовидное выпячивание стенки мочеточника в мочевой пузырь; возникает вследствие недоразвития или сужения его устья.

УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИ́Я (ureterocystoneostomia; *уретеро-* + греч. kystis мочевой пузырь + neos новый + stoma отверстие; син.: уретеровезикостомия, уретеронеоцистостомия, уретероцистостомия) — хирургическая операция: создание искусственного устья мочеточника в мочевом пузыре после резекции дистальной части мочеточника или трансплантации почки.

УРЕТЕРОЦИСТОСТОМИ́Я (ureterocystostomia; *уретеро-* + греч. kystis, мочевой пузырь + stoma отверстие) — см. *Уретероцистонеостомия*.

УРЕТЕРЭКТОМИ́Я (ureterectomia; *уретер-* + *эктомия*; син. экстирпация мочеточника) — хирургическая операция: удаление мочеточника на всем его протяжении.

УРЕТР- (уретро-; анат. urethra, от греч. urēthra мочеиспускательный канал) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к мочеиспускательному каналу».

УРЕ́ТРА (греч. urēthra) — см. *Мочеиспускательный канал*.

УРЕТРА́ЛЬНАЯ ПЕ́ТЛЯ ДЕ́ТСКАЯ — инструмент для удаления камней из периферической части мочеиспускательного канала у детей, состоящий из двух металлических петель, расположенных на концах никелированной латунной рукоятки и втягиваемых в нее.

УРЕТРА́ЛЬНЫЕ НИ́ТИ — нитеподобные образования в моче, состоящие из эпителиальных клеток и лейкоцитов; выявляются, напр., при уретритах.

УРЕТРА́ЛЬНЫЙ ЖЕЛО́БОК (sulcus urogenitalis definitivus, LNE) — медиальная впадина вдоль нижней стороны зачатка полового члена, впоследствии превращающаяся в губчатую часть мочеиспускательного канала.

УРЕТРАПЛАЗИ́Я (aplasia urethrae; *уретр-* + *аплазия*) — аномалия развития: отсутствие мочеиспускательного канала.

УРЕТРАТРЕЗИ́Я (atresia urethrae; *уретр-* + *атрезия*) — аномалия развития: отсутствие какого-либо участка мочеиспускательного канала.

УРЕТРИ́Т (urethritis; *уретр-* + *-ит*) — воспаление мочеиспускательного канала.

У. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ (u. allergica) — У., развивающийся как проявление аллергической реакции.

У. АМЕ́БНЫЙ (u. amoebica) — вяло протекающий У., вызываемый Entamoeba histolytica и характеризующийся обнаружением подвижных амеб в осадке мочи; встречается в странах Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.

У. БАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ (u. bacterialis) — общее название У., вызываемых бактериями, напр. стафило- или стрептококками, кишечной палочкой, диплококками.

У. ЗА́ДНИЙ (u. posterior) — У., при котором процесс локализуется в перепончатой и предстательной частях мочеиспускательного канала.

У. КИСТО́ЗНЫЙ (u. cystica) — У., сопровождающийся образованием кист слизистой оболочки мочеиспускательного канала.

У. КОНГЕСТИ́ВНЫЙ (u. congestiva; лат. congestus набитый, полный) — У., обусловленный венозным застоем крови в слизистой оболочке мочеиспускательного канала; возникает, напр., при частых половых сноше-

ниях, онанизме, при хронических запорах, геморрое.

У. МИКОТИ́ЧЕСКИЙ (u. mycotica) — У., вызываемый паразитическими грибками, обычно рода Candida.

У. ПЕРЕ́ДНИЙ (u. anterior) — У., при к-ром процесс локализуется в губчатой части мочеиспускательного канала.

У. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (u. tuberculosa) — У., вызываемый микобактериями туберкулеза; обычно сопровождает туберкулез почек и мочевых путей.

УРЕТРО- — см. *Уретр-*.

УРЕТРОГРАФИ́Я (*уретро-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография мочеиспускательного канала после его заполнения контрастным веществом.

У. ВОСХОДЯ́ЩАЯ (син. У. ретроградная) — У., при к-рой контрастное вещество вводят в мочеиспускательный канал через наружное отверстие.

У. КОМБИНИ́РОВАННАЯ — восходящая и восходящая У., проводимые одновременно.

У. НИСХОДЯ́ЩАЯ — У., при к рой контрастное вещество поступает в мочеиспускательный канал из предварительно контрастированного мочевого пузыря.

У. РЕТРОГРА́ДНАЯ (лат. retro назад + gradior идти) — см. *Уретрография восходящая*.

УРЕТРО́МЕТР (*уретро-* + греч. metreō измерять, определять) — прибор для определения степени сужения мочеиспускательного канала, состоящий из тонких длинных браншей, параллельно раздвигаемых после введения в мочеиспускательный канал, и рукоятки с делениями и стрелкой, указывающей расстояние между браншами.

УРЕТРОМЕТРИ́Я (*уретро-* + греч. metreō измерять, определять) — определение диаметра мочеиспускательного канала с помощью уретрометра.

УРЕТРОПЛА́СТИКА (urethroplastica; *уретро-* + *пластика*) — общее название хирургических операций, восстанавливающих форму и функцию мочеиспускательного канала.

УРЕТРОПОЭ́З (urethropoësis; *уретро-* + греч. poiēsis выработка, образование) — пластическая хирургическая операция: восстановление мочеиспускательного канала.

УРЕТРОРРАГИ́Я (urethrorrhagia; *уретро-* + греч. rhagos разорванный, прорванный) — кровотечение из мочеиспускательного канала вне акта мочеиспускания.

УРЕТРОСКО́П (*уретро-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — медицинский эндоскоп для осмотра внутренней поверхности мочеиспускательного канала и проведения нек-рых лечебных процедур.

УРЕТРОСКОПИ́Я (*уретро-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — эндоскопия мочеиспускательного канала.

УРЕТРОСТЕНО́З (urethrostenosis; *уретро-* + греч. stenosis сужение) — сужение просвета мочеиспускательного канала.

УРЕТРОСТОМИ́Я (urethrostomia; *уретро-* + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: создание искусственного наружного свища мочеиспускательного канала.

УРЕТРОТО́М (*уретро-* + греч. tomē разрез, рассечение) — инструмент для рассечения рубцовых стриктур мочеиспускательного канала, представляющий собой стержень с желобом, в котором скользит треугольный нож; вводится с помощью бужа, служащего проводником.

УРЕТРОТОМИ́Я (urethrotomia; *уретро-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение стенок мочеиспускательного канала в месте его патологического сужения.

У. ВНУ́ТРЕННЯЯ (u. interna) — У., проводимая с помощью уретротома, вводимого в мочеиспускательный канал; применяется для рассечения рубцов, суживающих его просвет.

У. НАРУ́ЖНАЯ (u. externa) — У., проводимая доступом через кожу и подкожную клетчатку; применяется, напр., для удаления инородных тел и конкрементов, создания искусственного свища.

У. ПРОМЕ́ЖНОСТНАЯ (u. perinealis) — У., проводимая доступом через ткани промежности.

УРЕТРОТРИГОНИ́Т (urethrotrigonitis; *уретро-* + анат. trigonum vesicae мочепузырный треугольник + *-ит*) — сочетанное воспаление слизистой оболочки мочеиспускательного канала и мочепузырного треугольника, чаще при гонорее.

УРЕТРОЦЕ́ЛЕ (urethrocele; *уретро-* + греч. kēlē выбухание, выпячивание) — мешкообразное выпячивание стенки мочеиспускательного канала; встречается у женщин.

УРЕТРОЦИСТИ́Т (urethrocystitis; *уретро-* + греч. kystis пузырь + *-ит*) — сочетанное воспаление слизистой оболочки мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.

УРЕТРОЦИСТОГРАФИ́Я (*уретро-* + греч. kystis пузырь + graphō писать, изображать) — одновременная рентгенография мочевого пузыря и мочеиспускательного канала после их контрастирования.

УРИАЛО́З ИДИОПАТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Липоидоз идиопатический*.

УРИДИ́Н — нуклеозид, содержащий в качестве основания урацил; входит в состав рибонуклеиновых кислот и рибонуклеотидов.

УРИДИНТРИФОСФА́Т (УТФ) — уридинфосфорная кислота, молекула к-рой содержит три остатка фосфорной кислоты; участвует, напр., в биосинтезе рибонуклеиновой кислоты.

УРИДИНФО́СФОРНЫЕ КИСЛО́ТЫ — коферменты процессов переноса остатков глюкозы или галактозы и их производных, напр., при биосинтезе полисахаридов; представляют собой соединения уридина с одним, двумя или тремя остатками фосфорной кислоты.

УРИКЕМИ́Я (uricaemia; лат. acidum uricum мочевая кислота + греч. haima кровь) — повышенное содержание мочевой кислоты в крови.

URINA SPASTICA (мед. лат. «спастическая моча») — обильное мочеотделение, наблюдаемое после эмоционального возбуждения, вегетативного криза, приступа пароксизмальной тахикардии или стенокардии.

УРИНО́ЗНЫЙ (лат. urina моча) — относящийся к моче, подобный моче.

УРИНОКУЛЬТУ́РА (лат. urina моча + *культура бактериальная*) — культура микроорганизма, выделенная из мочи человека или животного при бактериологическом исследовании.

У́РНИНГ (англ. urning) — см. *Педераст*.

УРО- — см. *Ур-*.

УРОБИЛИ́Н (*уро-* + лат. bilis желчь; син. мезобилин) — пигмент, образующийся в моче при окислении уробилиногена (напр., на свету при контакте с воздухом).

УРОБИЛИ́НОВЫЕ ТЕЛА́ — см. *Уробилиноиды*.

УРОБИЛИНОГЕ́Н (*уробилин* + греч. -genēs порождаемый, возникающий; син. мезобилиноген) — продукт восстановления билирубина, образующийся в кишечнике под действием бактерий; повышенное количество У. в моче обнаруживается при нек-рых болезнях печени.

УРОБИЛИНО́ИДЫ (*уробилин* + греч. -eidēs подобный; син. уробилиновые тела) — общее название продуктов обмена билирубина, выделяемых с мочой и калом (уробилин, уробилиноген, стеркобилин, стеркобилиноген и др.).

УРОБИЛИНУРИ́Я (urobilinuria; *уробилин* + греч. uron моча; син. гиперуробилинурия) — повышенное содержание уробилина в моче.

У́РОВЕНЬ ДОЛГОЛЕ́ТИЯ — распространенность долголетия среди населения; оценивается по индексу долголетия.

УРОГАСТРО́Н (*уро-* + греч. gastēr желудок) — вещество, выделенное из мочи, оказывающее тормозное влияние на секрецию и моторику желудка.

УРОГЕ́МАТО́МА (urohaematoma; *уро-* + греч. haima, haimatos кровь + *-ома*) — ограниченное скопление крови и мочи в жировой клетчатке, обусловленное повреждением стенки какого-либо отдела мочевой системы.

У. ПЕРИРЕНА́ЛЬНАЯ (u. perirenalis) — У. при травме почки, расположенная в околопочечной клетчатке.

УРОГЕНИТА́ЛЬНЫЙ (urogenitalis; *уро-* + анат. organa genitalia половые органы) — относящийся одновременно к мочевым и половым органам.

УРОГЕНИТОГРАФИ́Я (*уро-* + анат. organa genitalia половые органы + греч. graphō писать, изображать) — см. *Генитоурография*.

УРОГИНЕКОЛО́ГИЯ (*уро-* + *гинекология*) — раздел урологии, посвященный болезням органов мочевой системы, сочетающимся с патологическими изменениями в женских половых органах.

УРОГРАФИ́Я (*уро-* + греч. graphō писать, изображать; син.: пиелоуретерография экскреторная, У. выделительная, У. экскреторная) — рентгенография почек и мочевых путей после введения в организм контрастного вещества, выделяемого с мочой.

У. ВНУТРИВЕ́ННАЯ (син. пиелография внутривенная — прк) — У., при к-рой контрастное вещество вводят внутривенно.

У. ВНУТРИКИШЕ́ЧНАЯ — У., при к-рой контрастное вещество вводят в дистальный отдел толстой кишки.

У. ВЫДЕЛИ́ТЕЛЬНАЯ — см. *Урография*.

У. ИНФУЗИО́ННАЯ — У., при к-рой в вену медленно вводят большое количество сильно разведенного контрастного вещества, что обеспечивает

длительное и интенсивное контрастирование почек и мочевых путей.

У. КОМПРЕССИО́ННАЯ — внутривенная У., при к-рой для повышения контрастности изображения придавливают мочеточники через брюшную стенку, вызывая задержку мочи в верхних мочевых путях.

У. ПОДКО́ЖНАЯ — см. *Урография субкутанная.*

У. СУБКУТА́ННАЯ (син. У. подкожная) — У., при к-рой контрастное вещество вводят под кожу.

У. ЭКСКРЕТО́РНАЯ — см. *Урография.*

УРО́ДСТВО (monstruositas, teratismus) — тяжелый порок развития, обезображивающий внешний облик и часто не совместимый с жизнью.

УРОЛАГНИ́Я (urolagnia; *уро-* + греч. lagneia похоть, сладострастие) — половое извращение, при к-ром половое удовлетворение наступает в результате манипуляций с мочой или наблюдения за актом мочеиспускания партнера.

УРОЛИ́Т (urolithus; *уро-* + греч. lithos камень) — см. *Конкремент мочевой.*

УРОЛИТИА́З (urolithiasis; *уролит-* + *-иаз*) — см. *Болезнь почечнокаменная.*

УРО́ЛОГ (*уро-* + греч. logos учение, наука) — врач-специалист, подготовленный по вопросам диагностики, лечения (в т. ч. оперативного) и профилактики болезней органов мочевой системы, а у мужчин — и половых органов.

УРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ФАНТО́М — модель нижней части туловища человека, воспроизводящая мочевые пути в натуральную величину; предназначена для использования в качестве наглядного учебного пособия при изучении приемов цистоскопии и катетеризации мочеточников.

УРОЛО́ГИЯ (*уро-* + греч. logos учение, наука) — область клинической медицины, изучающая болезнь органов мочевой системы, а у мужчин — и половой системы, разрабатывающая методы их диагностики, лечения и профилактики.

УРО́МЕТР (*уро-* + грсч. metreō измерять, определять) — 1) прибор для определения удельного веса мочи; 2) У.[1], представляющий собой разновидность ареометра.

У. ТОРСИО́ННЫЙ (лат. torsio вращение) — У.[1], представляющий собой торсионные весы со специальным поплавком, к-рый помещается в исследуемую пробу мочи и взвешивается.

УРОНЕФРО́З (uronephrosis; *уро-* + *нефроз*) — см. *Гидронефроз.*

УРО́НОВЫЕ КИСЛО́ТЫ (син. альдуроновые кислоты) — органические одноосновные кислоты, являющиеся производными моносахаридов; входят в состав мукополисахаридов.

УРОПЕПСИ́Н (син.: пепсин мочи, уропепсиноген) — часть пепсиногена, выделяемая в неизменепном виде с мочой; определение содержания У. в моче используется в диагностике нек-рых болезней органов пищеварения.

УРОПЕПСИНОГЕ́Н — см. *Уропепсин.*

УРОПИ́ГИ — см. *Телифоны.*

УРОПОРФИРИ́Н — продукт распада гема, выделяемый с мочой.

УРОПОРФИРИ́Я ЭРИТРОПОЭТИ́ЧЕСКАЯ (uroporphyria erythropoëtica; син.: Гюнтера болезнь, порфирия врожденная — устар.)—вариант эритропоэтической порфирии, характеризующийся избыточным накоплением в эритроцитах уропорфирина; проявляется тяжелым фотодерматозом, гемолитической анемией, спленомегалией; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

УРОПРОТЕИНОГРА́ММА (уропротеин + греч. gramma запись, изображение) — кривая, отображающая качественный состав белков, содержащихся в моче, определяемый методом электрофореза.

УРОРЕНТГЕНОКИНЕМАТОГРАФИ́Я (*уро-* + *рентгенокинематография*) — рентгенокинематография мочевых путей после введения в организм контрастного вещества, выделяемого с мочой.

УРОРЕНТГЕНОСКОПИ́Я (*уро-* + *рентгеноскопия*) — рентгеноскопия мочевыводящих путей в процессе урографии.

УРОСЕ́ПСИС (urosepsis; *уро-* + *сепсис*) — сепсис, возбудитель к-рого распространяется из очага, расположенного в органах мочевой системы (у мужчин — и в половых органах).

УРОСТА́З (urostasis; греч. uron моча + *стаз*; син. стаз мочевой) — стаз мочи в мочевых путях.

УРОСТЕРЕОРЕНТГЕНОГРАФИ́Я (*уро-* + *стереорентгенография*) — стереорентгенография мочевых путей в процессе урографии.

УРОСТРАТИГРАФИ́Я (нрк; *уро-* + *стратиграфия*) — томография почек и мочевых путей, выполняемая в процессе урографии.

УРОФО́БИЯ (urophobia; *уро-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь появления позыва на мочеиспускание в неподходящей обстановке (напр., во время чтения лекции).

УРОХРО́М (*уро-* + греч. chrōma цвет, окраска) — пигмент, представляющий собой комплекс уропорфирина и белка, обнаруживаемый в моче и придающий ей желтый цвет; повышение содержания У. в моче может указывать на усиление процессов гниения в кишечнике.

УСВОЯ́ЕМОСТЬ пищевого вещества — доля поступившего пищевого вещества, использованная организмом; зависит от перевариваемости пищи и от полноты всасывания.

УСИЛИ́ТЕЛЬ РЕНТГЕ́НОВСКОГО ИЗОБРАЖЕ́НИЯ (син. рентгеновский электронно-оптический усилитель) — устройство для многократного увеличения яркости изображения на рентгеновском экране путем преобразования светового изображения в электронное, его последующего усиления и обратного преобразования в световое.

УСКОРИ́ТЕЛЬ ЗАРЯ́ЖЕННЫХ ЧАСТИ́Ц — устройство, предназначенное для получения пучков заряженных частиц высоких энергий; в медицинской радиологии используется для лучевой терапии и производства определенных радиоактивных нуклидов.

УСПОКА́ИВАЮЩИЕ СРЕ́ДСТВА (sedativa) — см. *Седативные средства.*

УСТА́ЛОСТЬ — субъективное проявление утомления, выражающееся в характерном комплексе ощущений и желании прекратить работу или уменьшить рабочую нагрузку.

УСТАНО́ВКА[1] в психологии — состояние предрасположенности к определенной активности в определенной ситуации.

УСТАНО́ВКА[2] в технике — совокупность взаимосвязанных приборов, аппаратов и оборудования, согласованная работа которых обеспечивает выполнение заданных операций; в медицине используются различные У. диагностического, лечебного и профилактического назначения.

У. АВТОДУШЕВА́Я — смонтированная на автомобиле У., предназначенная для гигиенического мытья и санитарной обработки людей в полевых условиях.

У. БУЧИ́ЛЬНАЯ — У., предназначенная для обеззараживания одежды и белья способом бучения.

У. ДЕЗИНФЕКЦИО́ННАЯ — передвижная У. для дезинфекции (дезинсекции) одежды, постельного и нательного белья, представляющая собой одну-две паровоздушно-формалиновые дезинфекционные камеры, смонтированные на шасси автомобиля или автомобильного прицепа.

У. ДЕЗИНФЕКЦИО́ННАЯ КОМБИНИ́РОВАННАЯ — У. для дезинфекции и дезинсекции наружной поверхности строений, растительности и больших помещений, представляющая собой опрыскиватель и опыливатель, смонтированные на самодвижущейся платформе и приводимые в действие двигателем внутреннего сгорания.

У. ДЕЗИНФЕКЦИО́ННО-ДУШЕВА́Я — У. для санитарной обработки людей в полевых условиях, представляющая собой одну-две паровоздушно-формалиновые дезинфекционные камеры и душевую установку, смонтированные на шасси автомобиля и (или) автомобильного прицепа.

У. ДИАГНОСТИ́ЧЕСКАЯ СЦИНТИЛЛЯЦИО́ННАЯ — У. для проведения радиоизотопной диагностики, воспринимающими элементами к-рой являются сцинтилляционные счетчики.

У. ДУШЕВА́Я — передвижная У. для мытья людей под душем в полевых условиях, на новостройках и в других местах, где отсутствуют бани.

У. ЛЫЖНО-НОСИ́ЛОЧНАЯ — У. для перевозки по снегу одного пораженного (больного), представляющая собой санитарные носилки, укрепленные на лыжах.

У. РАДО́НОВАЯ — У. для приготовления и разлива растворов радона, представляющая собой комплекс защитных шкафов с необходимым оборудованием.

У. РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИО́ННАЯ — У. для рентгенологического исследования, обеспечивающая возможность дистанционного наблюдения рентгеновского изображения на экране электронно-лучевой трубки.

У. ТЕЛЕТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКАЯ — см. *Гамма-аппарат.*

У. ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРАФИ́ЧЕСКАЯ — см. *Электрорентгенограф.*

УСТАНОВЛЕ́НИЕ ПО́ЛА — определение половой принадлежности лица в случае гермафродитизма.

УСТАНОВЛЕ́НИЕ ПОЛОВО́ГО СНОШЕ́НИЯ — выявление доказательств совершения полового акта при освидетельствовании, исследовании трупа, лабораторном исследовании вещественных доказательств.

УСТАНО́ВОЧНЫЕ РЕА́КЦИИ — совокупность рефлексов, обеспечивающих

человеку или животному принятие и сохранение нормального положения тела в пространстве.

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ — свойство системы возвращаться к исходному состоянию после прекращения воздействия, к-рое вывело ее из этого состояния; устойчивость живых систем проявляется их способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям существования.

УСТОЙЧИВОСТЬ ЯСНОГО ВИДЕНИЯ — показатель функционального состояния ц. н. с., представляющий собой отношение суммарной продолжительности периодов раздельного видения двух точек в условиях пороговой величины угла их различения ко всему периоду наблюдения (обычно 3 мин.).

УСТЬЕ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ (ostium venae cavae superioris) — см. *Отверстие верхней полой вены.*

УСТЬЕ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ (ostium tubae uterinae) — см. *Отверстие трубы маточное.*

УСТЬЕ МОЧЕТОЧНИКА (ostium ureteris) — см. *Отверстие мочеточника.*

УСТЬЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ (ostium venae cavae inferioris) — см. *Отверстие нижней полой вены.*

УСТЬЯ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН (ostia venarum pulmonalium) — см. *Отверстия легочных вен.*

УТА (исп. uta) — см. *Лейшманиоз ута.*

УТИЛИЗАЦИЯ БЕЛКА ЧИСТАЯ — показатель биологической ценности белков пищи, представляющий собой долю азота, усвоенного организмом, от общего количества азота, поступившего с пищей.

УТОМИТЕЛЬНОСТЬ — свойство физической или умственной нагрузки вызывать утомление.

УТОМЛЕНИЕ (син. утомленность) — состояние временного снижения функциональных возможностей организма, наступающее вследствие интенсивной или длительной деятельности, проявляющееся ухудшением количественных и качественных показателей этой деятельности (снижением работоспособности), дискоординацией физиологических функций и обычно сопровождающееся чувством усталости; иногда термином У. обозначают процесс возникновения этого состояния.

У. МЫШЕЧНОЕ — У., проявляющееся преимущественно в определенной группе мышц, подвергавшихся наибольшему напряжению при работе.

У. УМСТВЕННОЕ — У., возникшее при выполнении умственных нагрузок, характеризующееся снижением показателей умственной работоспособности, понижением эмоционального тонуса, внимания, интереса к работе; обычно сопровождается изменениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной системы.

У. ФИЗИЧЕСКОЕ — У., возникшее при выполнении физических нагрузок и характеризующееся снижением показателей физической работоспособности и изменениями функционального состояния преимущественно сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем.

У. ЦВЕТОВОЕ — см. *Астенопия цветовая.*

У. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ — У., проявляющееся снижением эмоциональных реакций и эмоционального тонуса; вызывается воздействием сверхсильных или монотонных раздражителей.

УТОМЛЕННОСТЬ — см. *Утомление.*

УТОМЛЯЕМОСТЬ — свойство организма (физиологической системы, органа) быть подверженным утомлению.

УТОМЛЯЕМОСТЬ МЫШЕЧНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ — ускоренное развитие утомления мышц, наблюдаемое при миастении.

УТОМЛЯЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКАЯ — ускоренное снижение умственной работоспособности при нагрузке, сопровождающееся быстрым появлением чувства усталости; психический компонент астенического синдрома.

УТОПЛЕНИЕ — обтурация просвета дыхательных путей жидкой средой (напр., водой, грязью, нечистотами), приводящая к механической асфиксии.

УТФ — см. *Уридинтрифосфат.*

УТРАТА НЕПРЕРЫВНОСТИ СОЗНАНИЯ «Я» — прекращение осознания больным своей личности как единой, идентичной в прошлом и настоящем.

УФЛ — см. *Лампа ультрафиолетового излучения.*

УФР — см. *Ритм условно-физиологический.*

УФФЕЛЬМАННА РЕАКЦИЯ (J. A. Uffelmann, 1837—1894, нем. педиатр и гигиенист) — метод определения молочной кислоты в желудочном соке, основанный на образовании фиолетового окрашивания при ее взаимодействии со смесью карболового раствора и хлорного железа.

УХО (auris) — 1) см. *Орган преддверно-улитковый*; 2) см. *Ушная раковина.*

УХО ВИЛЬДЕРМУТА — см. *Вильдермута ухо.*

УХО ВНУТРЕННЕЕ (auris interna, PNA, BNA, JNA; син. лабиринт) — часть преддверно-улиткового органа, представляющая собой систему каналов височной кости с находящимися в них рецепторами слухового и вестибулярного анализаторов.

УХО ИСКУССТВЕННОЕ — 1) протез ушной раковины; 2) акустический прибор для калибровки телефонов, аудиометров и другой аппаратуры, передающей или имитирующей звуки речи, характеризующийся близкими к уху человека акустическими параметрами.

УХО КОШАЧЬЕ — вариант строения ушной раковины, при к-ром ее верхняя часть отогнута и свешивается в форме складки, закрывая латеральную поверхность раковины.

УХО МАКАКИ — вариант строения ушной раковины, при к-ром завиток развернут, а верхняя часть ушной раковины обращена внутрь.

УХО НАРУЖНОЕ (auris externa, PNA, BNA, JNA) — часть преддверно-улиткового органа, образованная ушной раковиной и наружным слуховым проходом; выполняет звукоулавливающую, звукопроводящую и защитную функции.

УХО САТИРА (син. ухо фавна) — вариант строения ушной раковины, при к-ром отсутствуют завиток и бугорок ушной раковины, а ушной хрящ выпячивается в этом месте латерально.

УХО СРЕДНЕЕ (auris media, PNA; tympanum, JNA) — часть преддверно-улиткового органа, включающая барабанную полость с расположенными в ней слуховыми косточками и мышцами, барабанную перепонку, сосцевидные ячейки и слуховую (евстахиеву) трубу; выполняет функцию звукопроведения.

УХО ФАВНА — см. *Ухо сатира.*

УХОГЛАЗНИЧНАЯ ПЛОСКОСТЬ — плоскость, условно проводимая через линии, соединяющие верхние края наружных слуховых проходов с наиболее низко расположенными точками нижних краев глазниц; применяется при антропометрии в качестве ориентира.

УХОД за больным (син. гипургия) — совокупность санитарных мер и нек-рых медицинских процедур, направленных на облегчение состояния больного и способствующих его выздоровлению.

УЧАСТКОВОСТЬ — принцип организации лечебно-профилактической помощи населению, при котором территория (промышленное предприятие), обслуживаемая поликлиникой, делится на территориальные (цеховые) участки, к каждому из к-рых прикрепляются участковый (цеховой) врач и медицинская сестра; У. обеспечивает преемственность в мед. обслуживании и содействует практическому соединению лечебной и профилактической работы.

УЧАСТОК ЗАРАЖЕНИЯ — см. *Зараженный участок.*

УЧЕНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ — орган, создаваемый в министерствах здравоохранения СССР и союзных республик, осуществляющий планирование и координацию научных исследований по важнейшим научно-практическим медицинским проблемам и разрабатывающий рекомендации по внедрению в практику здравоохранения научных достижений медицинской науки, техники и передового опыта.

УШИБ (contusio) — закрытое механическое повреждение мягких тканей или органов, без видимого нарушения их анатомической целости.

УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА (contusio cerebri) — см. *Контузия головного мозга.*

УШИВАТЕЛЬ — см. *Аппарат ушивающий.*

УШИВАТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА (УАП) — аппарат для наложения сосудистого шва при помощи танталовых скрепок при операции по поводу незарастания артериального (боталлова) протока.

УШИНСКОГО СРЕДА (истор.; Н. Г. Ушинский, 1863—1934, сов. патолог и бактериолог) — синтетическая питательная среда для культивирования микроорганизмов, содержащая, кроме неорганических солей, глицерин, молочнокислый аммоний и аспарагиновокислый натрий; одна из первых синтетических питательных сред.

УШКО ПРЕДСЕРДИЯ (auricula atrii, PNA; auricula cordis, BNA, JNA; син. ушко сердца) — изогнутый вырост предсердия, на внутренней поверхности к-рого расположены гребенчатые мышцы.

УШКО СЕРДЦА (auricula cordis) — см. *Ушко предсердия.*

УШНАЯ ВЕТВЬ (ramus auricularis, PNA, BNA, JNA) — 1) задней ушной артерии — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *49*; 2) затылочной артерии — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *48.*

УШНА́Я ПРО́БА — см. *Жизненная проба ушная.*
УШНА́Я РА́КОВИНА (auricula, PNA, BNA, JNA; син. ухо[2]) — выступающая часть наружного уха, состоящая из хряща, покрытого кожей; выполняет функции звукоулавливания и защиты наружного слухового прохода и барабанной перепонки.
УШНА́Я СЕ́РА (cerumen) — продукт секреции серных желез, расположенных в наружном слуховом проходе.
УШНО́Й МОБИЛИЗА́ТОР — инструмент для отведения барабанной перепонки и проверки подвижности слуховых косточек при хирургических операциях на среднем ухе, гл. обр. по поводу отосклероза.
УШНО́Й ШУМ — см. *Шум в ушах.*
УШНЫ́Е ВЕ́ТВИ ПЕРЕ́ДНИЕ (rami auriculares anteriores, PNA, BNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *45.*
УШНЫ́Е ПРИВЕ́СКИ (син. ушные придатки) — аномалия развития: наличие кпереди от ушной раковины на щеке или на шее фрагментов наружного уха, по форме напоминающих дольку ушной раковины.

УШНЫ́Е ПРИДА́ТКИ — см. *Ушные привески.*
УЩЕМЛЕ́НИЕ (incarceratio; син. инкарцерация) — сдавление органа или другого анатомического образования в естественных или патологических каналах и отверстиях, между спайками, рубцами и др., нарушающее его кровоснабжение, иннервацию и (или) проходимость.
У. МО́ЗГА (i. cerebri) — У. вещества мозга в естественных внутричерепных отверстиях при отеке мозга или его резкой дислокации; проявляется развитием различных неврологических симптомов.
УЭ́ВЕРА — БРЕ́Я ФЕНО́МЕН (E. G. Wever, род. в 1902 г., амер. психолог; C. W. Bray, род. в 1904 г., амер. оториноларинголог) — см. *Микрофонный эффект улитки.*
УЭ́ЛЛСА ЛО́ЖКА (Th. S. Wells, 1818—1897, англ. хирург) — хирургический инструмент для изоляции зрительного нерва при энуклеации глазного яблока; имеет прорезь, в к-рую при оттеснении глазного яблока входит ствол зрительного нерва.
УЭ́СТА ОПЕРА́ЦИЯ (J. M. West, род. в 1876 г., амер. оториноларинголог) — см. *Дакриоцисториностомия эндоназальная.*
УЭ́СТИНГ-БОЛЕ́ЗНЬ — см. *Уэстинг-синдром.*
УЭ́СТИНГ-СИНДРО́М (англ. wasting слабость, упадок сил; син. уэстинг-болезнь) — состояние, возникающее у лабораторных животных через 2—3 месяца после тимэктомии, произведенной в первые сутки жизни; характеризуется потерей веса, диареей, истончением костей, выпадением шерсти, дерматитами, кровоизлияниями во внутренние органы, деструкцией лимфоидных фолликулов и лимфопенией.
УЯЗВИ́МЫЙ ПЕРИО́Д СЕРДЕ́ЧНОГО ЦИ́КЛА (син. ранимый период сердечного цикла) — короткий (около 0,01 сек.) интервал фазы реполяризации желудочков сердца, характеризующийся тем, что экстрасистола, а также внешнее электрическое воздействие на сердце в этот период вызывают фибрилляцию желудочков; электрокардиографически примерно соответствует верхушке зубца Т.

Ф

ФАБЕ́ЛЛА (fabella; лат. уменьшительное от faba боб) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *46.*
ФА́БРА ПРИ́ЗНАК (A. Fabre) — выбухание боковых стенок матки, определяемое при пальпации бокового свода влагалища; вероятный признак беременности малых сроков.
ФА́БРИ АНГИОКЕРАТО́МА (J. Fabry, 1860—1930, нем. дерматолог) — см. *Фабри болезнь.*
ФА́БРИ БОЛЕ́ЗНЬ (J. Fabry; син.: ангиокератома диффузная туловища, липоидоз дистопический наследственный, пурпура геморрагическая узелковая — нрк, Фабри ангиокератома, Фабри синдром) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена гликолипидов и проявляющаяся поражением кожи туловища в виде множественных доброкачественных сосудистых образований типа ангиом, сопровождающихся гиперкератозом, парестезиями, болями в конечностях, вазомоторной лабильностью, поражениями глаз, кишечника, почек.
ФА́БРИ СИНДРО́М (J. Fabry) — см. *Фабри болезнь.*
ФА́БУЛА БРЕ́ДА (лат. fabula повествование, рассказ) — содержание бреда, обладающее сюжетной законченностью.
ФА́ВАЛЛИ — ГИ́РШСПРУНГА БОЛЕ́ЗНЬ (H. Hirschsprung, 1830—1916, датский врач) — см. *Гиршспрунга болезнь.*
ФАВИ́Д (favidum; *фавус* + греч. -eidēs подобный) — аллергическая сыпь у больного фавусом, элементы к-рой не содержат возбудителя.
Ф. ЛИХЕНО́ИДНЫЙ (f. lichenoideum) — Ф. в виде пятен, покрытых сухими чешуйками.
Ф. ПЯТНИ́СТО-ПУСТУЛЁЗНЫЙ (F. maculopustulosum) — Ф. в виде пятен, покрытых сухими чешуйками серого цвета и мелкими пустулами.
Ф. ЭРИТЕМАТО́ЗНЫЙ (f. erythematosum) — Ф. в виде участков гиперемии кожи.
Ф. ЭРИТЕМАТОСКВАМО́ЗНЫЙ (f. erythematosquamosum) — Ф. в виде сочетания участков гиперемии и шелушения кожи.
ФАВИ́ЗМ (итал. favismo, от fava боб) — см. *Анемия примахиновая.*
ФАВО́РСКОГО ме́тод (А. В. Фаворский, 1873—1930, сов. невропатолог) — модификация способа Рамон-и-Кахаля импрегнации азотнокислым серебром нервных клеток, осевых цилиндров и нервных окончаний в кусочках ткани, при к-ром в фиксирующий спиртовой раствор добавляют муравьиную (для нервных клеток) или ледяную уксусную (для нервных волокон) кислоту.
ФА́ВРА — РАКУШО́ БОЛЕ́ЗНЬ (M. J. Favre, 1876—1954, франц. дерматолог; J. Racouchot, род. в 1908 г., франц. дерматолог) — см. *Дистрофия кожи коллоидная.*
ФА́ВРА — ШЕ ПУРПУРО́ЗНЫЙ ПИГМЕ́НТНЫЙ АНГИОДЕРМАТИ́Т (M. J. Favre, 1876—1954, франц. дерматолог; A. Chaix) — см. *Ангиодермит пурпурозный пигментный.*
ФА́ВУС (favus; лат. «сотовая ячейка»; син.: парша, tinea favosa) — хронический дерматомикоз, вызываемый паразитическим грибком Trichophyton schonleinii, характеризующийся поражением кожи волосистой части головы, реже других областей, а также ногтей и иногда внутренних органов.
Ф. ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (f. visceralis) — Ф., при к-ром поражены внутренние органы; наблюдается при понижении сопротивляемости организма.
Ф. ВОЛОСИ́СТОЙ ЧА́СТИ ГОЛОВЫ́ (f. capillitii) — клиническая форма Ф., при к-рой поражены кожа и волосы головы.
Ф. ВОЛОСИ́СТОЙ ЧА́СТИ ГОЛОВЫ́ ТРИХОФИТО́ИДНЫЙ (f. capillitii trichophytoides; син.: гранулема фавозная, керион фавозный, фавус глубокий) — Ф. в. ч. г., протекающий по типу инфильтративно-нагноительной трихофитии.
Ф. ГЕРПЕТИ́ЧЕСКИЙ (f. herpeticus) — Ф. гладкой кожи, характеризующийся гиперемией и отеком пораженных участков с появлением на них сгруппированных везикулезно-пустулезных высыпаний.
Ф. ГЛА́ДКОЙ КО́ЖИ (f. cutis glabrae) — клиническая форма Ф., характеризующаяся поражением кожи лица, туловища и конечностей.
Ф. ГЛУБО́КИЙ (f. profundus) — см. *Фавус волосистой части головы трихофитоидный.*
Ф. ИМПЕТИГИНО́ЗНЫЙ (f. impetiginosus) — Ф., характеризующийся наличием в очагах поражения корочек, напоминающих импетиго.
Ф. СЕПТИ́ЧЕСКИЙ (f. septicus) — висцеральный Ф., характеризующийся гематогенной диссеминацией возбудителя с множественным поражением различных органов и тяжелым течением.
Ф. СКУТУЛЯ́РНЫЙ (f. scutularis; лат. scutulum щиток) — Ф., характеризующийся наличием на эпидермисе крупных светло-желтых корочек с блюдцеобразным вдавлением в центре, расположенных вокруг волос и состоящих из мицелия и спор возбудителя.
Ф. ЭРИТЕМАТОСКВАМО́ЗНЫЙ (f. erythematosquamosus) — Ф., характеризующийся наличием пятен неправильной формы, с поверхности к-рых отделяются мелкие чешуйки беловатого цвета.
ФАГ — см. *Бактериофаг.*

ФА́ГГЕ БОЛЕ́ЗНЬ (Ch. H. Fagge, 1838—1883, англ. врач) — см. *Кретинизм.*

ФАГЕДЕНИ́ЗМ (phagedaenismus; греч. phagedaina разъедающая язва) — язвенно-некротический процесс, развивающийся в тканях, окружающих первичный очаг при сифилисе или мягком шанкре.

Ф. ГЛУБО́КИЙ (p. profundus; син.: Брока сверлящий фагеденизм, фагеденизм сверлящий) — Ф. с распадом глубоко расположенных тканей, развивающийся чаще у истощенных больных.

Ф. ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ (p. superficialis; син. Брока поверхностный фагеденизм) — Ф. с поражением поверхностно расположенных тканей, обычно не сопровождающийся нарушением общего состояния больного.

Ф. СВЕРЛЯ́ЩИЙ — см. *Фагеденизм глубокий.*

ФАГО- (греч. phagein есть, поедать, пожирать) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «относящийся к поеданию, к поглощению»; 2) «относящийся к бактериофагу».

ФА́ГОВАЯ КОНВЕ́РСИЯ (лат. conversio изменение, превращение; син. лизогенная конверсия) — изменение фенотипа бактериальной клетки (антигенной характеристики, токсинообразования, чувствительности к другим фагам и т. п.), обусловленное включением в ее хромосому генома умеренного фага.

ФАГОДИАГНО́СТИКА (*фаго-* + *диагностика*) — диагностика инфекционных болезней, основанная на применении стандартных препаратов бактериофагов для идентификации видовой принадлежности бактерий, выделенных из организма больного.

ФАГОЛИЗА́Т — продукт лизиса жидкой бактериальной культуры бактериофагом, представляющий собой смесь компонентов бактериальных клеток и питательной среды, содержащую частицы бактериофага.

ФАГОЛИЗОСО́МА (phagolysosoma, LNH; *фаго-* + *лизосома*) — разновидность лизосомы, возникающая в результате ее слияния с фагосомой; основная функция Ф.— разрушение веществ, попавших в клетку извне.

ФАГОПРОФИЛА́КТИКА (*фаго-* + *профилактика*) — специфическая профилактика инфекционных болезней в эпидемических очагах путем перорального введения бактериофага лицам с высоким риском заражения.

ФАГОРЕЗИСТЕ́НТНОСТЬ (*фаго-* + *резистентность*) — устойчивость бактериальной клетки к бактериофагу, обусловленная либо изменениями клеточных рецепторов, исключающими его адсорбцию на клетке, либо нарушением внутриклеточных фаз размножения бактериофага.

ФАГОСО́МА (phagosoma, LNH; *фаго-* + греч. sōma тело) — вакуоль, образующаяся в процессе фагоцитоза, внутри к-рой находятся субстраты, подлежащие перевариванию.

ФАГОТЕРАПИ́Я (*фаго-* + *терапия*)— метод лечения инфекционных больных или носителей возбудителя инфекции, основанный на введении в организм бактериофага.

ФАГОТИ́П (*фаго-* + *тип*) — совокупность бактериальных штаммов, характеризующихся одинаковой чувствительностью к типовому набору бактериофагов.

ФАГОТИПИ́РОВАНИЕ (*фаго-* + типирование) — определение принадлежности выделенного бактериального штамма к тому или иному фаготипу; применяется, как правило, в интересах эпидемиологического анализа.

ФАГОФОБИ́Я (phagophobia; *фаго-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь проглотить пищу из-за опасения подавиться.

ФАГОЦИ́Т (phagocytus; *фаго-* + гист. cytus клетка; син. клетка фагоцитирующая) — общее название подвижных клеток многоклеточного организма, способных захватывать и переваривать микроорганизмы, разрушенные клетки и инородные частицы.

ФАГОЦИ́Т АЛЬВЕОЛЯ́РНЫЙ (phagocytus alveolaris, LNH) — свободный макрофаг, проникший в полость легочной альвеолы из соединительнотканной межальвеолярной перегородки.

ФАГОЦИТА́РНЫЙ ПОКАЗА́ТЕЛЬ — среднее число микробов, поглощенных одной фагоцитирующей клеткой.

ФАГОЦИТО́З (phagocytosis; *фагоцит* + *-оз*) — процесс активного захватывания и поглощения микроорганизмов, разрушенных клеток и инородных частиц одноклеточными организмами или особыми клетками (фагоцитами) многоклеточных организмов.

Ф. ЗАВЕРШЁННЫЙ — Ф., при к-ром происходит внутриклеточное переваривание поглощенных микроорганизмов и частиц.

Ф. НЕЗАВЕРШЁННЫЙ (син. эндоцитобиоз) — Ф., при к-ром поглощенные микроорганизмы не подвергаются внутриклеточному перевариванию, а сохраняются или размножаются в фагоцитах.

ФАД — см. *Флавинаденинди нуклеотид.*

ФАЖЕ́ СИМПТО́М (J. Ch. Faget, 1818—1884, франц. врач) — относительная или истинная брадикардия при высокой температуре тела, наблюдаемая во втором периоде желтой лихорадки.

ФА́ЗА в психиатрии (франц. phase, от греч. phasis проявление) — приступ психической болезни, после окончания к-рого не происходит существенных изменений личности; протекает чаще в форме аффективных или аффективно-бредовых расстройств.

Ф. ДЕПРЕССИ́ВНАЯ — Ф., при к-рой преобладают симптомы депрессии.

Ф. МАНИАКА́ЛЬНАЯ — Ф., при к-рой преобладают симптомы мании.

Ф. СДВО́ЕННАЯ — Ф., в течении к-рой происходит смена маниакального синдрома депрессивным (или наоборот) без промежутка между ними.

ФА́ЗА АСИНХРО́ННОГО СОКРАЩЕ́НИЯ — период, в течение которого один из желудочков сердца сокращается, а второй еще не начал сокращаться; удлиняется при легочной или системной гипертензии, а особенно при блокаде одной из ножек предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса).

ФА́ЗА БЫ́СТРОГО НАПОЛНЕ́НИЯ (син.: период быстрого наполнения, период быстрого пассивного наполнения) — период от момента открытия предсердно-желудочкового клапана до момента установления постоянного градиента давления между предсердиями и желудочками: удлинена при митральном стенозе.

ФА́ЗА БЫ́СТРОЙ РЕПОЛЯРИЗА́ЦИИ — первый период фазы реполяризации потенциала действия, характеризующийся быстрым изменением полярности поверхностей клеточной мембраны; на электрограмме изолированной клетки имеет форму крутого спада кривой.

ФА́ЗА ДЕПОЛЯРИЗА́ЦИИ ПОТЕНЦИА́ЛА ДЕ́ЙСТВИЯ — период, в течение к-рого происходит полное изменение полярности электрических потенциалов, регистрируемых на внешней и внутренней поверхностях мембраны покоящейся клетки (т. е. изменение на обратные отрицательного заряда на внутренней и положительного на внешней поверхности).

ФА́ЗА ИЗГНА́НИЯ (син. период изгнания) — период опорожнения желудочков сердца от поступившей в них крови, длящийся от момента раскрытия клапанов аорты и легочного ствола до момента, на несколько миллисекунд предшествующего их замыканию.

ФА́ЗА ИЗОМЕТРИ́ЧЕСКОГО НАПРЯЖЕ́НИЯ — см. *Фаза изометрического сокращения.*

ФА́ЗА ИЗОМЕТРИ́ЧЕСКОГО РАССЛАБЛЕ́НИЯ — период от момента закрытия клапанов аорты до момента открытия предсердно-желудочковых клапанов.

ФА́ЗА ИЗОМЕТРИ́ЧЕСКОГО СОКРАЩЕ́НИЯ (син. фаза изометрического напряжения) — начальный период сокращения желудочков сердца, в течение к-рого объем крови в их полости не меняется; длится от момента замыкания предсердно-желудочковых клапанов до момента открытия клапанов аорты и легочного ствола.

ФА́ЗА МАКСИМА́ЛЬНОГО ИЗГНА́НИЯ — период, в течение к-рого изгнание крови из желудочков сердца происходит с максимальной скоростью; осциллографически определяется от момента появления волны давления в аорте или расположенных поблизости от нее магистральных артериях (напр., правой общей сонной) до момента перехода крутого спада этой волны в пологий.

ФА́ЗА МЕ́ДЛЕННОГО НАПОЛНЕ́НИЯ (син. период медленного наполнения) — период от момента установления постоянного градиента давления между предсердиями и желудочками до начала систолы предсердий.

ФА́ЗА МЕ́ДЛЕННОЙ РЕПОЛЯРИЗА́ЦИИ (син. стадия медленной реполяризации) — второй период фазы реполяризации потенциала действия, характеризующийся медленным изменением полярности поверхностей клеточной мембраны; на электрограмме изолированной клетки имеет форму пологого плато.

ФА́ЗА М-КОНЦЕНТРА́ЦИИ — см. *Стационарная фаза.*

ФА́ЗА НАПОЛНЕ́НИЯ (син. период наполнения) — период, в течение к-рого желудочки сердца заполняются кровью; в норме длится от момента раскрытия предсердно-желудочковых клапанов до окончания систолы предсердий.

ФА́ЗА НАПРЯЖЕ́НИЯ (син. период напряжения) в кардиологии — период, в течение к-рого происходит систола желудочков сердца.

ФА́ЗА ПРЕОБРАЗОВА́НИЯ (син. фаза трансформации) в кардиологии — период между началом электрической систолы (начало зубца ЭКГ) и началом механической систолы (начало колебания фонокардиограммы, соответствующего первому тону сердца).
ФА́ЗА ПРОТЕ́СТА — период детского развития, характеризующийся оппозиционным отношением к окружающим, в т. ч. к родителям.
ФА́ЗА РЕ́ПОЛЯРИЗА́ЦИИ ПОТЕНЦИА́ЛА ДЕ́ЙСТВИЯ — период, в течение к-рого расположение электрических зарядов, характерное для полной деполяризации клетки (отрицательные заряды — на внешней поверхности клеточной мембраны, положительные — на внутренней), изменяется на противоположное.
ФА́ЗА ТРАНСФОРМА́ЦИИ в кардиологии — см. *Фаза преобразования*.
ФАЗЕОЛУНАТИ́Н — глюкозид, содержащийся в семенах некоторых видов бобов (напр., лунной фасоли Phaseolus lunatus) и вызывающий при случайном попадании их в пищу отравление синильной кислотой, входящей в его состав.
ФАЗМОФОБИ́Я (phasmophobia; греч. phasma призрак + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь привидений, леших, домовых, чертей и других фантастических существ.
ФАЗОРЕНТГЕНОКАРДИО́ГРАФ — установка для получения рентгенограммы сердца в заданную фазу цикла сердечной деятельности; Ф. состоит из рентгеновского аппарата и управляющего им электрокардиографа.
ФАЗОФРЕНИ́Й КЛЕ́ЙСТА [*фаза* + (*шизо*)*френия*] — см. *Клейста фазофрении*.
ФА́ЙЛДСА СРЕДА́ (P. G. Fildes, род. в 1882 г., англ. бактериолог) — питательная среда для выделения и выращивания гемоглобинофильных бактерий, содержащая пептический гидролизат (перевар) крови.
ФА́ЙТА — СМЕ́ЛЛИ ПРИЁМ (J. Veit, 1852—1917, нем. гинеколог; W. Smellie, 1697—1763, англ. акушер) — акушерский прием освобождения головки плода при родах в тазовом предлежании, заключающийся в сгибании головки надавливанием пальцами на верхнюю челюсть плода.
ФАКО- (греч. phakos чечевица, нечто имеющее форму чечевицы) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к хрусталику глаза».
ФАКОДОНЕ́З (phacodonesis; *фако-* + греч. donēsis колебание) — дрожание хрусталика при движении глаза, обусловленное разрывом части волокон ресничного пояска (цинновой связки), напр. в результате травмы глаза.
ФАКОМАЛЯ́ЦИЯ (phacomalacia; *фако-* + греч. malakia мягкость) — разрушение хрусталика, обусловленное нарушением целости его капсулы и развивающимся дистрофическим процессом.
ФАКОМАТО́З (phacomatosis; греч. phakos родимое пятно + *-ома* + *-оз*) — группа наследственных болезней, обусловленных дисплазией эктодермы и характеризующихся сочетанием поражений кожи (участки лейкодермии и гиперпигментации, ангиомы, телеангиэктазии) и нарушениями нервной системы (эпилептиформные припадки, расстройства экстрапирамидной системы, умственное недоразвитие).
ФАКОПРОТЕЗИ́РОВАНИЕ (*фако-* + протезирование) — имплантация искусственной линзы в глазное яблоко при афакии.
ФАКОСКЛЕРО́З (phacosclerosis; *фако-* + *склероз*) — склероз центральной части хрусталика.
ФАКОЭМУЛЬСИФИКА́ТОР-АСПИРА́ТОР УЛЬТРАЗВУКОВО́Й КЕ́ЛМАНА — см. *Келмана ультразвуковой факоэмульсификатор-аспиратор*.
ФАКОЭМУЛЬСИФИКА́ЦИЯ (*фако-* + эмульсификация) — метод экстракции катаракты, заключающийся в раздроблении вещества хрусталика ультразвуком с последующим его отсасыванием.
ФА́КТОР I (син.: фибриноген, фибриногенное вещество — нрк) — образующийся в клетках печени и ретикулоэндотелиальной системы белок плазмы крови, под воздействием тромбина превращающийся в фибрин; наследственная недостаточность Ф. I обусловливает возникновение афибриногенемии.
ФА́КТОР II (син.: протромбин, тромбоген — нрк) — образующийся в печени гликопротеид плазмы крови, являющийся предшественником тромбина; недостаточность Ф. II обусловливает возникновение нек-рых разновидностей геморрагического диатеза.
ФА́КТОР III (син.: зимопластическое вещество — устар., тромбокиназа тканевая, тромбопластин тканевой) — фосфолипопротеид, содержащийся в тканях организма и участвующий в процессе свертывания крови в качестве катализатора превращения протромбина в тромбин.
ФА́КТОР IV — содержащийся в плазме крови ионизированный и неионизированный кальций; участвует в процессе свертывания крови, определяя ионное равновесие плазмы, вступая в некоторые химические реакции или действуя как катализатор при активации ряда факторов.
ФА́КТОР V (син.: акцелерин — нрк, АС-глобулин — нрк, аутопротромбин — нрк, глобулин акцелераторный — нрк, кофактор тромбопластина — нрк, лабильный фактор — нрк, плазменный фактор превращения протромбина — нрк, протромбиназа — нрк, протромбиновый акцелератор — нрк, фактор VI — нрк) — образующийся в печени глобулин плазмы крови, в комплексе с фактором XII участвующий в процессе свертывания крови, ускоряя превращение фактора II в тромбин; наследственная недостаточность фактора V обусловливает развитие болезни Оврена.
ФА́КТОР VI (нрк) — см. *Фактор V*.
ФА́КТОР VII (син.: антифибринолизин, каппа-фактор — нрк, конвертин — нрк, котромбопластин — нрк, кофактор V — нрк, проконвертин, протромбиноген — нрк, серозим — нрк, стабильный фактор, сывороточный ускоритель превращения протромбина — нрк) — образующийся в печени глобулин плазмы крови, участвующий в процессах свертывания, обеспечивая образование активной формы фактора III из его неактивной формы; наследственная недостаточность Ф. VII обусловливает развитие гипопроконвертинемии (болезни Александера).
ФА́КТОР VIII (син.: акцелератор сыворотки — нрк, антигемофильный фактор, глобулин антигемофильный, глобулин антигемофильный А, кофактор тромбоцитов — нрк, плазмакинин — нрк, протромбокиназа — нрк, тромбокатализин — нрк, тромбопластиноген — нрк, тромбопластический компонент плазмы, тромбопластический фактор плазмы, тромбопластический фактор плазмы А, тромбоцитолизин — нрк) — глобулин плазмы крови, принимающий участие в активации фактора X; наследственная недостаточность фактора VIII обусловливает развитие гемофилии А.
ФА́КТОР IX (син.: глобулин антигемофильный В, кристмас-фактор, плазменный компонент тромбопластина — нрк, тромбопластический фактор плазмы В — нрк) — глобулин плазмы крови, участвующий вместе с другими факторами в образовании фактора 3 тромбоцитов; наследственная недостаточность фактора IX обусловливает развитие гемофилии В.
ФА́КТОР X (син.: прауэр-фактор — нрк, Стюарта фактор — нрк, стюарт-прауэр-фактор — нрк) — образующийся в печени белок плазмы крови, участвующий в образовании фактора III и фактора 3 тромбоцитов; недостаточность фактора X обусловливает возникновение болезни Стюарта — Прауэр.
ФА́КТОР XI (ППТ; син. плазменный предшественник тромбопластина) — глобулин плазмы крови, участвующий в образовании фактора 3 тромбоцитов; недостаточность фактора XI обусловливает развитие одной из форм гемофилии.
ФА́КТОР XII (син.: контактный фактор, Хагемана фактор) — гликопротеид плазмы крови, при взаимодействии с чужеродной поверхностью инициирующий процессы свертывания крови, фибринолиза, а также активность калликреин-кининовой системы; наследственная недостаточность фактора XII обусловливает развитие болезни Хагемана.
ФА́КТОР XIII (син.: трансглутаминаза — нрк, фибриназа, фибринстабилизирующий фактор) — глобулин плазмы крови, катализирующий в присутствии кальция (фактора IV) превращение растворимого фибрина в нерастворимый; наследственная недостаточность фактора XIII обусловливает возникновение болезни Лаки — Лорана.
ФА́КТОР Hly — плазмида кишечной палочки, содержащая гены, контролирующие продукцию ее гемолизинов; способна передаваться от особи к особи
ФА́КТОР I (англ. inhibition торможение; син. Флори фактор I) — вещество, обнаруженное в экстрактах ткани мозга, оказывающее тормозящее действие на нейроны центральной нервной системы.
F-ФА́КТОР (англ. fertility плодовитость; син.: половой фактор бактерий, секс-фактор) — плазмида, определяющая конъюгационные свойства мужских штаммов бактерий.
F′-ФА́КТОР (син. половой фактор замещенный) — F-фактор, содержащий фрагмент хромосомы бактерии.
К-ФА́КТОР (сокращ. кроссинговер) — общее название различных факторов (гены, структурные изменения хромосом и др.), подавляющих кроссинговер.
R-ФА́КТОР (англ. resistance устойчивость) — плазмида, содержащая гены,

контролирующие устойчивость микроорганизма к антибиотикам или другим антибактериальным средствам; способна передаваться от особи к особи.

ФА́КТОР ДЕ́ЛЬТА — компонент R-фактора, контролирующий его способность передаваться от бактерии к бактерии.

ФА́КТОР КА́ЧЕСТВА в радиобиологии — см. *Коэффициент качества.*

ФА́КТОР МОЛОКА́ — *Биттнера вирус.*

ФА́КТОР ПЕРЕДА́ЧИ ИНФЕ́КЦИИ — элемент окружающей среды, посредством к-рого возбудитель инфекции передается от зараженного человека или животного (больного, носителя) к здоровому.

ФА́КТОР ПЕРЕНО́СА — вещество, секретируемое сенсибилизированными лимфоцитами при инкубации их с аллергеном; введением Ф. п. можно передать интактному реципиенту повышенную чувствительность к соответствующему аллергену.

ФА́КТОР ПИТА́НИЯ (син.: алиментарный фактор, пищевой фактор) — общее название веществ, входящих в состав пищи и участвующих в процессах обмена в организме.

Ф. ПИТА́НИЯ ЗАМЕНИ́МЫЙ — Ф. п., синтезируемый в организме человека в достаточном количестве.

Ф. ПИТА́НИЯ НЕЗАМЕНИ́МЫЙ (син. Ф. питания эссенциальный) — Ф. п., не синтезируемый в организме или синтезируемый им в недостаточном количестве.

Ф. ПИТА́НИЯ ЭССЕНЦИА́ЛЬНЫЙ — см. *Фактор питания незаменимый.*

ФА́КТОР РА́КА МОЛО́ЧНЫХ ЖЕЛЁЗ МЫШЕ́Й — см. *Биттнера вирус.*

ФА́КТОР РАСПРОСТРАНЕ́НИЯ (син.: Дюран-Рейнальса фактор, Рейнальса фактор, спридинг-фактор) — комплекс ферментов, повышающих проницаемость соединительной ткани и тем самым ускоряющих распространение и переход в лимфатические и кровеносные капилляры находящихся в ней веществ и клеток; некоторые Ф. р. синтезируются патогенными микроорганизмами и способствуют их распространению из первичного очага.

ФА́КТОР РИ́СКА — общее название факторов, не являющихся непосредственной причиной определенной болезни, но увеличивающих вероятность ее возникновения.

ФА́КТОР РО́СТА — вещество, способное ускорять деление клеток, но не используемое при этом как пластический материал или источник энергии.

Ф. РО́СТА НЕ́РВНОЙ ТКА́НИ (син. нервный ростовой фактор) — Ф. р. белковой природы, усиливающий рост и ускоряющий дифференцировку нек-рых видов нервных клеток (напр., эмбриональных чувствительных); выделен, напр., из ткани слюнных желез, из змеиного яда.

Ф. РО́СТА ФИБРОБЛА́СТОВ — Ф. р. пептидной или белковой природы, ускоряющий деление фибробластов, напр., фрагмент миелина, выделенный из ткани мозга.

Ф. РО́СТА ЭПИДЕРМА́ЛЬНЫЙ — Ф. р. пептидной или белковой природы, ускоряющий деление эпителиальных клеток, напр. вещество, химически близкое к урогастрону, выделенное из ткани слюнной железы.

ФА́КТОР ТОРМОЖЕ́НИЯ МИГРА́ЦИИ МАКРОФА́ГОВ (MIF) — вещество, выделяемое сенсибилизированными лимфоцитами при контакте с аллергеном; замедляет движение макрофагов, что приводит к их скоплению в зоне контакта.

ФА́КТОР 1 ТРОМБОЦИ́ТОВ — адсорбированный на мембране тромбоцитов глобулин плазмы крови, по химической природе и функции напоминающий фактор V, но менее активный.

ФА́КТОР 2 ТРОМБОЦИ́ТОВ — синтезируемый в тромбоцитах белок, участвующий в образовании пространственной структуры нерастворимого фибрина.

ФА́КТОР 3 ТРОМБОЦИ́ТОВ (син.: тромбопластин кровяной, тромбопластический фактор пластинок) — фосфолипид, синтезируемый в тромбоцитах, участвующий в превращении протромбина в тромбин.

ФА́КТОР 4 ТРОМБОЦИ́ТОВ — белок, синтезируемый в тромбоцитах и нейтрализующий активность гепарина плазмы.

ФА́КТОР 5 ТРОМБОЦИ́ТОВ (син.: фибриноген тромбоцитов, фибриногеноподобный фактор) — фактор I, синтезируемый в тромбоцитах или адсорбируемый на их мембране из плазмы крови.

ФА́КТОР 6 ТРОМБОЦИ́ТОВ (син.: ретрактозизим, тромбостенин) — фактор VII, адсорбированный на мембране тромбоцитов.

ФАКУЛЬТЕ́Т (лат. facultas, facultatis способность, возможность) — структурная часть высшего учебного заведения, объединяющая кафедры определенного профиля; Ф. предназначен для подготовки специалистов определенного профиля; в СССР в состав медицинского института могут входить лечебный, санитарно-гигиенический, педиатрический, стоматологический, фармацевтический и медико-биологический Ф.

Ф. МЕДИЦИ́НСКИЙ — Ф. университета, осуществляющий подготовку врачей (обычно, лечебного профиля).

ФАКУЛЬТЕ́Т ВОЕ́ННО-МЕДИЦИ́НСКИЙ — высшее военно-медицинское учебное заведение, предназначенное для подготовки или усовершенствования военных врачей и организованное при медицинском институте или институте усовершенствования врачей, на базе к-рого слушатели Ф. в.-м. проходят подготовку по всем остальным дисциплинам, кроме военно-медицинских.

ФАКУЛЬТЕ́Т ЗДОРО́ВЬЯ ПРИ НАРО́ДНОМ УНИВЕРСИТЕ́ТЕ — см. *Народный университет здоровья.*

ФАКУЛЬТЕ́ТСКОЕ ОБЕЩА́НИЕ ВРАЧА́ (истор.) — торжественное обязательство честно выполнять врачебный долг, дававшееся при окончании высшего медицинского учебного заведения в дореволюционной России; берет свое начало от «Клятвы Гиппократа».

ФАЛА́НГИ — см. *Сольпуги.*

ФАЛА́НГИ ПА́ЛЬЦЕВ — 1) (ossa digitorum, PNA, JNA; phalanges digitorum, BNA; греч. phalanx, phalangos фаланга пальца) — короткие трубчатые кости, составляющие скелет пальцев кисти и стопы; 2) сегменты пальцев кисти и стопы.

ФАЛАНГИЗА́ЦИЯ (phalangisatio) — пластическая операция: расщепление пясти по межкостным промежуткам для улучшения функции кисти в случае утраты пальцев.

ФАЛЛАТОРИ́ЗМ (греч. phallos половой член) — см. *Фелляция.*

FALLÁCIA (устар.; лат. «обман», «волшебство») — общее название галлюцинаций и иллюзий.

ФА́ЛЛИСА — БА́РРОНА ОПЕРА́ЦИЯ (L. Fallis; J. Barron) — наложение анастомоза между подвздошной и прямой кишкой при колэктомии; культю прямой кишки вшивают по типу «конец в бок» в подвздошную кишку на нек-ром удалении от места пересечения последней, а культю подвздошной кишки (обычно после временного выведения илеостомы) вшивают в стенку ее участка, расположенного выше места анастомоза.

ФАЛЛО́ ПЕНТА́ДА (E.-L. Fallot, 1850—1911, франц. врач; син. Фалло пенталогия) — врожденный порок сердца: сочетание стеноза устья легочного ствола, гипоплазии легочного ствола, смещения вправо аорты, отходящей от обоих желудочков, дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок.

ФАЛЛО́ ПЕНТАЛО́ГИЯ (E.- L. Fallot) — см. *Фалло пентада.*

ФАЛЛО́ ТЕТРА́ДА (E.-L. Fallot; син. Фалло тетралогия) — врожденный порок сердца: сочетание стеноза устья легочного ствола, дефекта межжелудочковой перегородки, смещения аорты вправо и вторично развивающейся гипертрофии правых отделов сердца.

ФАЛЛО́ ТЕТРАЛО́ГИЯ (E.-L. Fallot) — см. *Фалло тетрада.*

ФАЛЛО́ ТРИА́ДА (E.-L. Fallot; син. Фалло трилогия) — врожденный порок сердца: сочетание стеноза легочного ствола с дефектом межпредсердной перегородки и вторично развивающейся гипертрофией правого желудочка.

ФАЛЛО́ ТРИЛО́ГИЯ (E.-L. Fallot) — см. *Фалло триада.*

ФАЛЛО́ПИЕВ КАНА́Л [G. Fallopius (Fallopio), 1523—1562, итал. анатом] — см. *Лицевой канал.*

ФАЛЛО́ПИЕВА СВЯ́ЗКА (G. Fallopius) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *312.*

ФАЛЛО́ПИЕВА ТРУБА́ (G. Fallopius) — см. *Маточная труба.*

ФАЛЛОПЛА́СТИКА (phalloplastica; греч. phallos половой член + *пластика*) — общее название хирургических операций восстановления полового члена.

Ф. ПО БЕ́ССЕЛЬ-ХА́ГЕНУ — см. *Бессель-Хагена фаллопластика.*

Ф. ПО БОГОРА́ЗУ — см. *Богораза фаллопластика.*

Ф. ПО РЕ́ЙХУ — см. *Рейха фаллопластика.*

ФАЛЛОПЛЕГИ́Я (phalloplegia; греч. phallos половой член + plēgē удар, поражение) — отсутствие эрекции полового члена при половом возбуждении.

ФАЛЬСИФИКА́ЦИЯ ПИЩЕВО́ГО ПРОДУ́КТА — подделка пищевого продукта без ведома потребителя, производимая с корыстной целью; карается законом.

ФА́ЛЬТИНА ШИ́НА — лечебная шина для иммобилизации переломов верхней челюсти, представляющая со-

бой металлический фигурный каркас, прикрепляемый к эластичной повязке, фиксируемой на голове.

ФА́ЛЬТЫ СИНДРО́М (W. Falta, 1875—1950, австрийский врач) — см. *Гужеро — Фальты синдром.*

ФАНЕРО́З ЖИРОВО́Й (phanerosis adiposa; греч. phaneros видимый, явный + *-оз*) — см. *Дистрофия жировая.*

ФАНКО́НИ АНЕМИ́Я (G. Fanconi, род. в 1892 г., швейц. педиатр; син. Фанкони синдром) — наследственная болезнь, характеризующаяся гипоплазией костного мозга, панцитопенией, а также аномалиями развития кожи (гиперпигментация), костной системы (недоразвитие I пястной или лучевой кости) и (или) внутренних органов (почек, селезенки); наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

ФАНКО́НИ БОЛЕ́ЗНЬ (G. Fanconi) — см. *Фанкони нефронофтиз.*

ФАНКО́НИ НЕФРОНОФТИ́З (G. Fanconi; син.: нефронофтиз ювенильный, Фанкони болезнь) — наследственная болезнь, обусловленная поражением петли нефрона и дистальных канальцев; проявляется у детей гипотонической полиурией, рахитоподобным изменением костной системы, гипохромной анемией, а в юношеском возрасте — азотемией; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

ФАНКО́НИ СИНДРО́М (G. Fanconi) — см. *Фанкони анемия.*

ФАНКО́НИ — ДЕБРЕ́ — ДЕ ТО́НИ СИНДРО́М (G. Fanconi, род. в 1892 г., швейц. педиатр; A.R. Debré, род. в 1882 г., франц. педиатр; G. de Toni, род. в 1895 г., итал. педиатр) — см. *Де Тони — Дебре — Фанкони синдром.*

ФАНКО́НИ — ШЛЕ́ЗИНГЕРА СИНДРО́М (G. Fanconi, род. в 1892 г., швейц. педиатр; B. Schlesinger, совр. англ. педиатр) — наследственное нарушение кальциево-фосфорного обмена, проявляющееся в детском возрасте отставанием в физическом и психическом развитии, множественными деформациями лица (напр., «лицо эльфа»), сходящимся косоглазием, расстройствами функций органов пищеварительного тракта.

ФАНТА́ЗИИ БРЕДОПОДО́БНЫЕ (син. идеи бредоподобные) — возникающие у больных реактивным психозом идеи преследования, величия, реформаторства, обвинения, самообвинения и т. д., содержание к-рых изменяется в зависимости от внешних обстоятельств; в отличие от бреда при Ф. б. у больного отсутствует убежденность в этих идеях; сопровождаются театральностью поведения.

ФАНТА́ЗИИ ДЕ́ТСКИЕ ПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЕ — усиленное воображение, проявляющееся в содержании игр и высказываний детей, больных неврозами или психозами, и являющееся компонентом аутизма, навязчивых или бредовых идей.

ФАНТА́ЗИИ ИСТЕРИ́ЧЕСКИЕ (син. pseudologia phantastica) — образные вымыслы неправдоподобного содержания, сообщаемые больным истерией с целью привлечь к себе внимание.

ФАНТАЗИОФРЕНИ́Я [фантазия + (*шизо*)*френия*] — параноидная шизофрения с преобладанием фантастических бредовых идей.

ФАНТАЗИ́РОВАНИЕ ИСТЕРИ́ЧЕСКОЕ (син.: мифомания, сновидения наяву) — склонность больного истерией к образным сценоподобным представлениям, отражающим его стремления и частично заменяющим ему окружающую реальность.

ФАНТАЗИ́РОВАНИЕ ПАТОЛОГИ́ЧЕСКОЕ — склонность психически больного или психопата к сочинению неправдоподобных историй, в к-рые он верит.

ФАНТА́ЗМЫ (устар.; греч. phantasma призрак, воображение, представление) — сценоподобные образные представления, возникающие без реального раздражителя; относятся к галлюцинациям или псевдогаллюцинациям.

ФАНТО́М АМПУТИ́РОВАННЫХ (франц. fantôme, от греч. phantasma призрак, воображение, представление) — см. *Ощущения фантомные.*

ФАНТО́М ДОЗИМЕТРИ́ЧЕСКИЙ (син. фантом тканеэквивалентный) — модель тела или его частей, предназначенная для измерения поглощенных доз ионизирующего излучения.

ФАНТО́М ТКАНЕЭКВИВАЛЕ́НТНЫЙ — см. *Фантом дозиметрический.*

ФАНТО́М-ДОЗИ́МЕТР — дозиметрическое устройство, в котором детектор излучения совмещен с дозиметрическим фантомом.

ФА́РА ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРО́З (K. Th. Fahr, 1877—1945, нем. патолог) — см. *Фара нефросклероз.*

ФА́РА НЕФРОСКЛЕРО́З (K. Th. Fahr; син.: нефросклероз артериолонекротический, нефросклероз злокачественный, Фара гломерулосклероз) — нефросклероз при злокачественной форме гипертонической болезни, характеризующийся фибриноидным некрозом артериол и капилляров клубочков почки.

ФА́РА СИНДРО́М (K. Th. Fahr; син. обызвествление мозговых сосудов наследственное) — наследственная болезнь, характеризующаяся обызвествлением сосудов, снабжающих внутреннюю капсулу и базальные ядра головного мозга; проявляется в возрасте 20—30 лет атетозом, тремором, центральными параличами, эпилептиформными припадками, прогрессирующим слабоумием; тип наследования не установлен.

ФАРАБЕ́ФА АМПУТА́ЦИЯ (L. H. Farabeuf, 1841—1910, франц. анатом и хирург) — 1) ампутация голени в проксимальной трети; кожу разрезают спереди в области бугристости большеберцовой кости, а сзади — на 4—5 *см* ниже, кость спиливают немного выше переднего разреза кожи и культю закрывают задним кожным лоскутом; 2) ампутация плеча на уровне хирургической шейки плечевой кости с сохранением дельтовидной мышцы.

ФАРАБЕ́ФА ВЫЧЛЕНЕ́НИЕ (L. H. Farabeuf) — 1) вычленение большого пальца кисти вместе с пястной костью; 2) вычленение кисти в лучезапястном суставе с закрытием культи кожным лоскутом, взятым с ладонной поверхности удаляемой кисти.

ФАРАБЕ́ФА КРЮЧО́К (L. H. Farabeuf; син. Фарабефа тупой крючок) — хирургический инструмент для расширения раны с согнутыми под прямым углом закругленными рабочими концами.

ФАРАБЕ́ФА РАСПА́ТОР (L. H. Farabeuf) — хирургический инструмент для отслаивания надкостницы в виде прямого или изогнутого долота с односторонней заточкой, имеющего плоскую ручку с площадкой для упора пальцем.

ФАРАБЕ́ФА ТРЕУГО́ЛЬНИК (L. H. Farabeuf) — часть сонного треугольника, ограниченная внутренней яремной и впадающей в нее (общей) лицевой венами, а сверху — подъязычным нервом.

ФАРАБЕ́ФА ТУПО́Й КРЮЧО́К (L. H. Farabeuf) — см. *Фарабефа крючок.*

ФАРАБЕ́ФА — ВАРНЬЕ́ ИДЕА́ЛЬНЫЙ ЗАХВА́Т (L. H. Farabeuf, 1841—1910, франц. анатом и хирург; H. Varnier) — захват головки плода щипцами так, чтобы каждая ложка щипцов заходила за теменной бугор, располагаясь при этом спереди от уха; возможен при стоянии головки в положении сгибания затылком кпереди в прямом размере нижней апертуры таза.

ФАРАДИЗА́ЦИЯ (истор.; M. Faraday, 1791—1867, англ. физик) — метод электролечения, заключавшийся в воздействии на отдельные участки тела больного асимметричным переменным током нестабильной частоты (40—150 *гц*), получаемым от индукционной катушки.

ФА́РБЕРА ПРО́БА (S. Farber, род. в 1903 г., амер. педиатр) — метод дифференциальной диагностики между атрезией и сужением пищеварительного тракта в первые 2 суток жизни новорожденного; заключается в микроскопическом исследовании отделяемого из прямой кишки: отсутствие в отделяемом ороговевших клеток эпидермиса, заглатываемых плодом вместе с околоплодными водами, свидетельствует о непроходимости пищеварительного тракта.

ФА́РБЕРА СИНДРО́М (S. Farber; син. липогранулематоз диссеминированный врожденный) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена липидов и мукополисахаридов с отложением в тканях внутренних органов и нервной системы атипичных мукополисахаридно-липопротеидных комплексов; начинается в раннем детстве и характеризуется затруднением дыхания, контрактурами, гепатомегалией, деформациями скелета.

ФАРИНГ- (фаринго-; греч. pharynx, pharyngos глотка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к глотке».

ФАРИНГИ́Т (pharyngitis; *фаринг-* + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки.

Ф. БОКОВО́Й (p. lateralis) — гипертрофический хронический Ф., локализующийся в области боковых стенок глотки позади небно-глоточных дужек; чаще наблюдается у лиц, перенесших тонзиллэктомию.

Ф. ГРАНУЛЕ́ЗНЫЙ (p. granulosa) — гипертрофический хронический Ф., локализующийся на задней стенке глотки; развивается в результате систематического раздражения вдыхаемой пылью или дымом (напр., при курении), алкогольными напитками.

Ф. О́СТРЫЙ (p. acuta) — внезапно развивающийся Ф., проявляющийся болью в глотке, парестезиями, равномерной гиперемией и некоторой припухлостью слизистой оболочки, повышенной секрецией слизи.

Ф. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (p. chronica) — общее название медленно текущих форм Ф., проявляющихся саднением, парестезиями в глотке и кашлем.

Ф. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ АТРОФИ́ЧЕСКИЙ (p. chronica atrophica; син. Ф. хронический сухой) — Ф. х., при к-ром слизистая оболочка глотки истончена, сглажена, суха, местами покрыта вязкой густой слизью.

Ф. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ ГИПЕРТРОФИ́ЧЕСКИЙ (p. chronica hypertrophica) — Ф. х., при к-ром слизистая оболочка глотки и находящиеся в ней элементы лимфоидной ткани утолщены и гиперемированы.

Ф. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ КАТАРА́ЛЬНЫЙ (p. chronica catarrhalis) — Ф. х., при к-ром слизистая оболочка глотки гиперемирована и покрыта скоплениями густой слизи.

Ф. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ СУХО́Й (p. chronica sicca) — см. *Фарингит хронический атрофический.*

ФАРИНГИ́Т АФТО́ЗНЫЙ (pharyngitis aphtosa) — см. *Герпангина.*

ФАРИНГИ́Т ВЕЗИКУЛЯ́РНЫЙ (pharyngitis vesicularis) — см. *Герпангина.*

ФАРИНГО- — см. *Фаринг-.*

ФАРИНГОГРАФИ́Я (*фаринго-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенологическое исследование глотки после введения в нее контрастного вещества.

ФАРИНГОМИКО́З (pharyngomycosis; *фаринго-* + *микоз*) — болезнь, вызываемая микроорганизмами Leptotrix buccalis и проявляющаяся ороговением плоского эпителия, покрывающего слизистую оболочку глотки.

ФАРИНГОСКОПИ́Я (*фаринго-* + греч. skopeō рассматривать, наблюдать) — осмотр глотки с диагностической целью.

ФАРИНГОСПА́ЗМ (pharyngospasmus; *фаринго-* + *спазм*) — судорожное сокращение мышц глотки, напр. при спазмофилии, тетании, истерии.

ФАРИНГОСТО́МА (pharyngostoma; *фаринго-* + греч. stoma отверстие) — наружный свищ глотки.

ФАРИНГОТОМИ́Я (pharyngotomia; *фаринго-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие глотки.

Ф. БОКОВА́Я (p. lateralis) — Ф., при к-рой разрезают боковую стенку глотки.

Ф. БОКОВА́Я ПО ТРО́ТТЕРУ — см. *Троттера боковая фаринготомия.*

Ф. НАДПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ (p. suprahyoidea) — Ф., при к-рой обнажают подъязычную кость горизонтальным разрезом мягких тканей над ее верхним краем, пересекают челюстно-подъязычные мышцы, а также сухожилия двубрюшных подбородочно-подъязычных мышц, после чего вскрывают слизистую оболочку глотки над подъязычной костью.

Ф. ПЕРЕ́ДНЯЯ (p. anterior) — Ф., производимая через переднюю стенку гортанной части глотки.

Ф. ПОДПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ (p. infrahyoidea) — Ф., при к-рой обнажают подъязычную кость горизонтальным разрезом мягких тканей на уровне нижнего ее края, рассекают мышцы, прикрепленные к этому краю (грудино-подъязычную, щитоподъязычную, лопаточно-подъязычную), вскрывают щитоподъязычную мембрану, после чего разрезают стенку глотки между корнем языка и надгортанником.

Ф. ПОПЕРЕ́ЧНО-БОКОВА́Я (p. transversolateralis) — Ф., представляющая собой сочетание подподъязычной и боковой Ф., что обеспечивает широкий доступ к патологическим образованиям в полости глотки.

Ф. СРЕДИ́ННАЯ (p. mediana) — см. *Фаринготомия чресподъязычная.*

Ф. ТРАНСГИО́ИДНАЯ (p. transhyoidea) — см. *Фаринготомия чресподъязычная.*

Ф. ЧРЕСПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ (p. transhyoidea; син.: Ф. срединная, Ф. трансгиоидная) — Ф., при к-рой подъязычную кость обнажают срединным или Т-образным разрезом мягких тканей шеи и резецируют тело подъязычной кости, после чего вскрывают гортанную часть глотки.

ФАРМАКО- (фармац-; греч. pharmakon лекарство; лат. pharmacia от греч. pharmakeia применение, употребление лекарств, лекарственных средств) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к лекарственным средствам, к фармации».

ФАРМАКОАНГИОГРАФИ́Я (*фармако-* + *ангиография*) — ангиография после введения лекарственных средств, изменяющих тонус кровеносных сосудов, с целью получения более четкого изображения артерий; применяется также при изучении влияния лекарственных средств на кровеносные сосуды.

ФАРМАКОГЕНЕ́ТИКА (*фармако-* + *генетика*) — раздел медицинской генетики, изучающий генетические основы реакций организма на лекарственные вещества.

ФАРМАКОГНО́ЗИЯ (pharmacognosia; *фармако-* + греч. gnōsis познавание, знание) — раздел фармации, изучающий лекарственное сырье растительного и животного происхождения и разрабатывающий методы его заготовки, хранения и обогащения.

ФАРМАКОДИНА́МИКА (*фармако-* + греч. dynamikos имеющий силу, действующий) — раздел фармакологии, изучающий совокупность эффектов, вызываемых лекарственным веществом, а также механизмы его действия.

ФАРМАКОКИНЕ́ТИКА (*фармако-* + греч. kinētikos относящийся к движению) — раздел фармакологии, изучающий пути поступления, распределение и метаболизм лекарственных веществ в организме, а также их выведение.

ФАРМАКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ АКТИ́ВНОСТЬ — совокупность эффектов, вызываемых введением данного вещества (или смеси веществ) в организм, используемых при лечении, профилактике заболеваний или для поддержания необходимого уровня жизнедеятельности.

ФАРМАКОЛОГИ́ЧЕСКОЕ СРЕ́ДСТВО — вещество или смесь веществ с установленной фармакологической активностью и токсичностью, являющееся объектом клинического испытания.

ФАРМАКОЛО́ГИЯ (pharmacologia; *фармако-* + греч. logos учение, наука) — наука, изучающая действие лекарственных и других биологически активных веществ на организм человека и животных.

Ф. БИОХИМИ́ЧЕСКАЯ — раздел Ф., изучающий биохимические процессы в организме, лежащие в основе действия лекарственных веществ.

Ф. КЛИНИ́ЧЕСКАЯ — раздел Ф., изучающий влияние лекарственных веществ на организм больного.

Ф. МОЛЕКУЛЯ́РНАЯ — раздел Ф., изучающий молекулярные механизмы взаимодействия лекарственных веществ с биологическими субстратами.

Ф. ЭКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНАЯ — раздел Ф., изучающий влияние лекарственных и биологически активных веществ на организм в условиях эксперимента.

ФАРМАКОМАНИ́Я (pharmacomania; *фармако-* + *мания*) — 1) стремление больного к употреблению различных лекарственных средств или необоснованно продолжительному приему отдельного средства; 2) массовое употребление населением лекарственных средств, гл. обр. транквилизаторов и снотворных средств.

ФАРМАКОПЕ́Я (pharmacopoea; *фармако-* + греч. poieō делать, приготовлять) — сборник стандартов и положений, нормирующих качество лекарственных средств; Государственная фармакопея СССР имеет законодательный характер.

ФАРМАКОПСИХИАТРИ́Я (*фармако-* + *психиатрия*) — направление в психиатрии, изучающее действие психотропных средств на проявления психических болезней и нормальную психическую деятельность.

ФАРМАКОПСИХОЛО́ГИЯ (*фармако-* + *психология*) — см. *Психофармакология.*

ФАРМАКОТЕРАПИ́Я (pharmacotherapia; *фармако-* + *терапия*) — совокупность методов лечения, основанных на применении лекарственных средств.

ФАРМАКОФОБИ́Я (pharmacophobia; *фармако-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь употреблять лекарственные средства.

ФАРМАЦ- — см. *Фармако-.*

ФАРМАЦЕ́ВТ (греч. pharmakeutēs приготовляющий лекарства) — лицо, получившее высшее или среднее специальное образование в фармацевтическом институте, на фармацевтическом факультете медицинского института или в фармацевтическом училище.

ФАРМАЦЕВТИ́ЧЕСКАЯ ХИ́МИЯ — раздел фармации, изучающий химические и физические свойства лекарственных веществ, их изменения при хранении, а также влияние особенностей молекулярного строения лекарственных веществ на характер их действия на организм и разрабатывающий методы получения, очистки, хранения и контроля качества лекарственных средств.

ФАРМАЦЕВТИ́ЧЕСКАЯ ШКО́ЛА (истор.) — среднее специальное учебное заведение, готовившее помощников провизоров; в 1954 г. Ф. ш. реорганизованы в фармацевтические училища.

ФАРМАЦЕВТИ́ЧЕСКОЕ УЧИ́ЛИЩЕ — специальное среднее учебное заведение, предназначенное для подготовки помощников провизоров.

ФАРМАЦИ́Я (pharmacia; греч. pharmakeia применение, употребление лекарств, лекарственных средств, от pharmakon лекарство; син. лекарствоведение) — отрасль научных знаний и практической деятельности, посвященная изысканию, изготовлению, стандартизации, исследованию (оценке каче-

ства), хранению и отпуску лекарственных средств, а также организации лекарственного обеспечения.

ФА́РНСУОРТА ЦВЕТОВО́Й ТЕСТ (Farnsworth) — метод исследования цветового зрения, заключающийся в том, что испытуемому предлагается расположить специально подобранные образцы цветной бумаги в серию с плавными переходами от одного цвета к другому.

ФА́РРА — ВАЛЬДЕ́ЙЕРА ЛИ́НИЯ (A. Farre, 1811—1887, англ. гинеколог; H. W. G. Waldeyer, 1836—1921, нем. анатом) — беловатая линия на яичнике в месте перехода его покровного эпителия в мезотелий брыжейки яичника.

ФА́РРАНТА MÉТОД (Farrant) — метод консервирования необезвоженных гистологических препаратов, заключающийся в погружении их в водный раствор гуммиарабика, глицерина, мышьяковистой кислоты и камфоры.

ФАСЕ́ТКИ СТИРА́НИЯ (франц. facette) — блестящие полированные площадки на зубах, образовавшиеся в точках соприкосновения зубов-антагонистов; по Ф. с. определяется вид прикуса.

ФАСЦИА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium fasciale) — см. *Клетчаточное пространство.*

ФАСЦИА́ЛЬНЫЙ КАНА́Л (canalis fascialis) — см. *Пудендальный канал.*

ФАСЦИКУЛЯ́ЦИЯ (fasciculatio; анат. fasciculus пучок мышечных волокон) — непроизвольное сокращение отдельных пучков мышечных волокон в зоне, иннервируемой пораженными передними корешками или передними рогами спинного мозга.

ФАСЦИНА́ЦИЯ (лат. fascinatio околдовывание) — прием приведения человека в состояние гипноза, заключающийся в пристальном взгляде гипнотизирующего в глаза гипнотизируемого.

ФАСЦИОДЕ́З (fasciodesis; *фасция* + греч. desis связывание, скрепление) — хирургическая операция: ограничение подвижности сустава с помощью фасциального лоскута.

FASCIÓLA (фасциолы) — род трематод отр. Fasciolidida, сем. Fasciolidae, паразитирующих в желчных протоках и желчном пузыре млекопитающих; промежуточные хозяева — моллюски; включает виды, представители к-рых вызывают фасциолез у человека.

F. GIGÁNTEA (двуустка гигантская) — вид трематод рода F., характеризующийся удлиненной по сравнению с F. hepatica формой; промежуточный хозяин — моллюски рода Limnea; возбудитель фасциолеза человека (в СССР встречается редко).

F. HEPÁTICA (двуустка печеночная) — вид трематод рода F., характеризующийся листообразной формой зрелой особи; промежуточный хозяин — моллюск Galba Truncatula; основной возбудитель фасциолеза человека в СССР.

ФАСЦИОЛЁЗ (fasciolosis) — гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый печеночной и гигантской фасциолами (Fasciola hepatica, Fasciola gigantea), протекающий с явлениями холангита, холецистита и гепатохолангита; человек заражается при проглатывании личинок возбудителя с водой и растениями.

ФАСЦИОЛОПСИДО́З (fasciolopsidosis) — гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый Fasciolopsis buski, протекающий с диспептическими явлениями; человек заражается при проглатывании личинок возбудителя с водой и растениями; распространен в Китае.

FASCIOLÓPSIS BÚSKI — вид трематод отр. Fasciolidida, сем. Fasciolidae, паразитирующий в тонкой кишке и желудке человека и млекопитающих; промежуточные хозяева — моллюски; возбудитель фасциолопсидоза.

ФАСЦИОТОМИ́Я (fasciotomia; *фасция* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение фасции, напр. при хирургической обработке огнестрельной раны или при устранении контрактуры.

ФАСЦИ́Т (fascitis; *фасция* + *-ит*) — воспаление фасции.

Ф. ЛАДО́ННЫЙ (f. palmaris) — Ф. кисти с поражением ладонного апоневроза; приводит к контрактуре Дюпюитрена.

ФАСЦИЭКТОМИ́Я ЛАДО́ННАЯ (fasciectomia palmaris; *фасция* + *эктомия*) — см. *Дюпюитрена операция.*

ФА́СЦИЯ(-И) (fascia, PNA, BNA, JNA; лат. «повязка», «бинт») — оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани, покрывающая мышцы, многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы; образует их фасциальные ложа и влагалища и выстилает клетчаточные пространства.

Ф. БЕДРА́ ШИРО́КАЯ (f. lata femoris, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *933.*

Ф. БРЮШИ́ННО-ПРОМЕ́ЖНОСТНАЯ (f. peritoneoperinealis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *962.*

ФА́СЦИЯ ВЕЛЬПО́ (f. propria Velpeau) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *995.*

Ф. ВИСО́ЧНАЯ (f. temporalis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1003.*

Ф. ВНУ́ТРЕННЕЙ ЗАПИРА́ТЕЛЬНОЙ МЫ́ШЦЫ (f. musculi obturatoris interni) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *945.*

Ф. ВНУТРИБРЮШНА́Я (f. endoabdominalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *904.*

Ф. ВНУТРИГРУДНА́Я (f. endothoracica, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *908.*

Ф. ВНУТРИТА́ЗОВАЯ (f. endopelvina, BNA; f. intrapelvina, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *907.*

Ф. ВНУТРИШЕ́ЙНАЯ (f. endocervicalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *905.*

Ф. ВОКРУГПО́ЧЕЧНАЯ (f. perirenalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *984.*

Ф. ВЫЙНАЯ (f. nuchae, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *944.*

ФА́СЦИЯ ГЕРО́ТЫ (f. Gerotae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *984.*

Ф. ГЛАЗНО́ГО Я́БЛОКА (f. bulbi, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1014.*

Ф. ГЛОТО́ЧНО-БАЗИЛЯ́РНАЯ (f. pharyngobasilaris, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *963.*

Ф. ГЛОТО́ЧНО-ЩЁЧНАЯ (f. pharyngobuccinatoria) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *868.*

Ф. ГЛУБО́КАЯ (f. profunda) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *972.*

Ф. ГО́ЛЕНИ (f. cruris, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *890.*

Ф. ГРЕБЕ́НЧАТАЯ (f. pectinea, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *949.*

Ф. ГРУДНА́Я (f. pectoralis, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *950.*

Ф. ГРУДНА́Я ГЛУБО́КАЯ (f. pectoralis profunda) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *877.*

Ф. ГРУДНА́Я ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (f. pectoralis superficialis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *950.*

Ф. ГРУШЕВИ́ДНАЯ (f. piriformis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *966.*

Ф. ДЕЛЬТОВИ́ДНАЯ (f. deltoidea) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *891.*

Ф. ДИАФРАГМА́ЛЬНАЯ (f. diaphragmatica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *892.*

Ф. ДИАФРАГМОПЛЕВРА́ЛЬНАЯ (f. phrenicopleuralis, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *965.*

Ф. ДИАФРА́ГМЫ ТА́ЗА ВЕ́РХНЯЯ (f. diaphragmatis pelvis superior) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *896.*

Ф. ДИАФРА́ГМЫ ТА́ЗА ВНУ́ТРЕННЯЯ (f. diaphragmatis pelvis interna) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *896.*

Ф. ДИАФРА́ГМЫ ТА́ЗА НАРУ́ЖНАЯ (f. diaphragmatis pelvis externa) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *894.*

Ф. ДИАФРА́ГМЫ ТА́ЗА НИ́ЖНЯЯ (f. diaphragmatis pelvis inferior) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *894.*

Ф. ЖЕВА́ТЕЛЬНАЯ (f. masseterica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *937.*

ФА́СЦИЯ ЖЕРДИ́ (f. Gerdy) — см. *Жерди фасция.*

Ф. ЖИВОТА́ ВНУ́ТРЕННЯЯ ГЛУБО́КАЯ (f. abdominis interna profunda) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1007.*

Ф. ЖИВОТА́ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (f. abdominis superficialis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *848.*

Ф. ЖИВОТА́ СО́БСТВЕННАЯ (f. propria abdominis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *974.*

Ф. ЗАБРЮШИ́ННАЯ (f. retroperitonealis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *995.*

Ф. ЗАПИРА́ТЕЛЬНАЯ (f. obturatoria, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *945.*

Ф. ЗАПИРА́ЮЩАЯ [f. occludens (nexus), LNH; син. нексус] — плотная соединительная перемычка между контактирующими мышечными клетками в гладкой и сердечной мышечной тканях.

Ф. ЗУ́БЧАТАЯ (f. serrata) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *991.*

Ф. ЗУ́БЧАТАЯ ГИППОКА́МПА — см. *Извилина зубчатая.*

Ф. КВАДРА́ТНАЯ (f. quadrata) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *981.*

Ф. КИ́СТИ ТЫ́ЛЬНАЯ (f. dorsalis manus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *901*.
Ф. КИ́СТИ ТЫ́ЛЬНАЯ ГЛУБО́КАЯ (f. dorsalis manus profunda) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *918*.
Ф. КЛИ́ТОРА (f. clitoridis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *878*.
Ф. КЛЮВОВИ́ДНО-ГРУДНА́Я (f. coracopectoralis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *877*.
Ф. КЛЮВОВИ́ДНО-КЛЮЧИ́ЧНАЯ (f. coracoclavicularis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *877*.
Ф. КЛЮВОВИ́ДНО-КЛЮЧИ́ЧНО-ГРУДНА́Я (f. coracocleidopectoralis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *877*.
Ф. КЛЮЧИ́ЧНО-ГРУДНА́Я (f. clavipectoralis, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *877*.
ФА́СЦИЯ КУ́ПЕРА (f. cremasterica Cooperi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *887*.
Ф. ЛОПА́ТОЧНО-КЛЮЧИ́ЧНАЯ (f. omoclavicularis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *927*.
Ф. МЕЖКО́СТНАЯ ЛАДО́ННАЯ (f. interossea volaris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *921*.
Ф. МЕЖКО́СТНАЯ ПОДО́ШВЕННАЯ (f. interossea plantaris) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *920*.
Ф. МЕЖКО́СТНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (КИ́СТИ) [f. interossea dorsalis (manus)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *918*.
Ф. МЕЖКО́СТНАЯ ТЫ́ЛЬНАЯ (СТОПЫ) f. interossea dorsalis (pedis)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *919*.
ФА́СЦИЯ МЕССИА́ (f. Maissiati) — см. *Подвздошно-большеберцовый тракт*.
Ф. МОЧЕПОЛОВО́Й ДИАФРА́ГМЫ ВЕ́РХНЯЯ (f. diaphragmatis urogenitalis superior, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *900*.
Ф. МОЧЕПОЛОВО́Й ДИАФРА́ГМЫ ВНУ́ТРЕННЯЯ (f. diaphragmatis urogenitalis interna) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *900*.
Ф. МОЧЕПОЛОВО́Й ДИАФРА́ГМЫ НАРУ́ЖНАЯ (f. diaphragmatis urogenitalis externa, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *898*.
Ф. МОЧЕПОЛОВО́Й ДИАФРА́ГМЫ НИ́ЖНЯЯ (f. diaphragmatis urogenitalis inferior, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *898*.
Ф. МУЖСКО́ГО ПОЛОВО́ГО ЧЛЕ́НА (f. penis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *957*.
Ф. МЫ́ШЕЧНЫЕ (f. musculares, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *941*.
Ф. МЫ́ШЦЫ, ПОДНИМА́ЮЩЕЙ ЯИ́ЧКО (f. cremasterica, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *887*.
Ф. НАДО́СТНАЯ (f. supraspinata, BNA; f. supra spinam, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1002*.
Ф. ОКОЛОУ́ШНО-ЖЕВА́ТЕЛЬНАЯ (f. parotideomasseterica, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *948*.
Ф. ОКОЛОУШНО́Й ЖЕЛЕЗЫ́ (f. parotidea, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *947*.
ФА́СЦИЯ ПИРОГО́ВА (f. Pyrogovi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *855*.
Ф. ПЛЕЧА́ (f. brachii, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *866*.
Ф. ПЛЮСНЕВА́Я (f. metatarsalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *940*.
Ф. ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (f. superficialis, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *998*.
Ф. ПОДБРЮШИ́ННАЯ (f. subperitonealis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *995*.
Ф. ПОДВЗДО́ШНАЯ (f. iliaca, PNA, BNA; f. ilica, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *913*.
Ф. ПОДВЗДО́ШНО-ГРЕБЕ́НЧАТАЯ (f. iliopectinea, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *915*.
Ф. ПОДКО́ЖНАЯ (f. subcutanea) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *998*.
Ф. ПОДКОЛЕ́ННАЯ (f. poplitea) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *967*
Ф. ПОДЛОБКО́ВАЯ (f. subpubica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *900*.
Ф. ПОДЛОПА́ТОЧНАЯ (f. subscapularis, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *997*.
Ф. ПОДМЫ́ШЕЧНАЯ (f. axillaris, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *865*.
Ф. ПОДО́СТНАЯ (f. infraspinata, BNA; f. infra spinam, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *917*.
Ф. ПОДО́ШВЫ ГЛУБО́КАЯ (f. profunda plantae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *973*.
Ф. ПОДЧРЕ́ВНАЯ (f. hypogastrica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *953*.
Ф. ПОЗАДИМОЧЕТО́ЧНИКОВАЯ (f. retroureterica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *989*.
Ф. ПОЗАДИОБОДО́ЧНЫЕ (f. retrocolicae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *985*.
Ф. ПОЗАДИПОДЖЕЛУ́ДОЧНАЯ ТРЕ́ЙТЦА [f. retropancreatica (Treitzi)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *986*.
Ф. ПОЗАДИПО́ЧЕЧНАЯ (f. retrorenalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *988*.
Ф. ПОЗАДИПУЗЫ́РНАЯ (f. retrovesicalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *990*.
Ф. ПОЛОВО́ГО ЧЛЕ́НА ГЛУБО́КАЯ И ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (f. penis profunda et superficialis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *957*.
Ф. ПОПЕРЕ́ЧНАЯ (f. transversalis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1007*.
Ф. ПОПЕРЕ́ЧНОЙ МЫ́ШЦЫ (f. musculi transversi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1007*.
Ф. ПО́ЧЕЧНАЯ (f. renalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *984*.
Ф. ПОЯСНИ́ЧНАЯ (f. psoica, JNA; f. psoatica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *979*.
Ф. ПОЯСНИ́ЧНО-ГРУДНА́Я (f. thoracolumbalis, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1005*.
Ф. ПОЯСНИ́ЧНО-СПИННА́Я (f. lumbodorsalis, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1005*.
Ф. ПРЕДМОЧЕТО́ЧНИКОВАЯ (f. preureterica) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *970*.
Ф. ПРЕ́ДПЛЕ́ЧЬЯ (f. antebrachii, PNA, JNA; f. antibrachii, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *849*.
Ф. ПРЕДПОЗВОНО́ЧНАЯ (f. praevertebralis, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *928*.
Ф. ПРЕДПО́ЧЕЧНАЯ (f. prerenalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *969*.
Ф. ПРЕДПУЗЫ́РНАЯ (f. prevesicalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *971*.
Ф. ПРЕДСТА́ТЕЛЬНАЯ (f. prostatae, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *977*.
Ф. ПРОМЕ́ЖНОСТИ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (f. superficialis perinei, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1000*.
Ф. ПРОМЕ́ЖНОСТИ СО́БСТВЕННАЯ (f. perinei propria) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *959*.
Ф. ПРОМЕ́ЖНОСТИ СО́БСТВЕННАЯ ГЛУБО́КАЯ (f. perinei profunda propria) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *900*.
Ф. ПРОМЕ́ЖНОСТНАЯ (f. perinealis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *898*.
Ф. ПРЯМО́Й КИШКИ́ СО́БСТВЕННАЯ (f. propria recti) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *975*.
Ф. ПРЯМОКИШЕ́ЧНО-ВЛАГА́ЛИЩНАЯ (f. rectovaginalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *982*.
Ф. ПРЯМОКИШЕ́ЧНО-ПУЗЫ́РНАЯ (f. rectovesicalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *983*.
Ф. ПУЗЫ́РНАЯ (f. vesicae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1015*.
Ф. ПУПО́ЧНАЯ (f. umbilicalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1013*.
Ф. РЕШЁТЧАТАЯ (f. cribrosa, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *889*.
Ф. СЕДА́ЛИЩНО-ПРЯМОКИШЕ́ЧНАЯ (f. ischiorectalis) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *898*.
Ф. СЕМЕННА́Я ВНУ́ТРЕННЯЯ (f. spermatica interna, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *993*.
Ф. СЕМЕННА́Я НАРУ́ЖНАЯ (f. spermatica externa, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *992*.
Ф. СТОПЫ́ ТЫ́ЛЬНАЯ (f. dorsalis pedis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *903*.
Ф. ТА́ЗА (f. pelvis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *953*.
Ф. ТА́ЗА ВИСЦЕРА́ЛЬНАЯ (f. pelvis visceralis, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *955*.
Ф. ТА́ЗА ПАРИЕТА́ЛЬНАЯ (f. pelvis parietalis, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *954*.
ФА́СЦИЯ ТЕНО́НОВА (f. Tenoni) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *1014*.
ФА́СЦИЯ ТРЕ́ЙТЦА (f. Treitzi) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *986*.
Ф. ШЕ́И (f. colli, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *876*.
Ф. ШЕ́И ГЛУБО́КАЯ (f. colli profunda, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *928*.

Ф. ШЕ́И ПОВЕ́РХНОСТНАЯ [f. superficialis (cervicis)] — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *999*.
Ф. ШЕ́И ПОДКО́ЖНАЯ (f. colli subcutanea) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *999*.
Ф. ШЕ́И СРЕ́ДНЯЯ (f. colli media, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *927*.
Ф. ШЕ́ЙНАЯ (f. cervicalis, PNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *876*.
Ф. ШИРО́КАЯ (f. lata, PNA, BNA, JNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *933*.
Ф. ЩЁЧНАЯ (f. buccalis) — см. т. 3 Перечень анат. терминов, *867*.
Ф. ЩЁЧНО-ГЛО́ТОЧНАЯ (f. buccopharyngea, PNA, BNA) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *868*.
Ф. ЯГОДИ́ЧНАЯ (f. glutea) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *911*.
Ф. ЯЗЫКА́ (f. linguae) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *935*.

ФА́ТЕРА — ПАЧИ́НИ ТЕ́ЛЬЦЕ (A. Vater, 1684—1751, нем. анатом; F. Pacini, 1812—1883, итал. анатом) — см. *Пластинчатое тельце*.

ФАТЕ́РОВ ДИВЕРТИ́КУЛ (A. Vater, 1684—1751, нем. анатом) — см. *Ампула печеночно-поджелудочная*.

ФАТЕ́РОВ СОСО́К (A. Vater) — см. *Большой сосочек двенадцатиперстной кишки*.

ФАТЕ́РОВА А́МПУЛА (A. Vater) — см. *Ампула печеночно-поджелудочная*.

ФА́УЛЕРА МЕ́ТОД (E. P. Fowler) — метод дифференциальной диагностики поражения органа слуха, основанный на том, что при нормальном слухе и при поражении звукопроводящего отдела восприятие громкости звука по мере усиления его интенсивности возрастает равномерно, а при поражении рецепторного аппарата по достижении определенной интенсивности отмечается резкое улучшение восприятия звука, и оно становится соответствующим нормальному восприятию.

ФА́УЛЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (E. P. Fowler) — хирургическая операция при отосклерозе, заключающаяся во вскрытии барабанной полости и перерезке передней ножки стремени.

ФА́УЛЕРА ПОЛОЖЕ́НИЕ (G. R. Fowler, 1848—1906, амер. хирург; син. Фовлера положение — прк) — полусидячее положение больного в кровати, головной конец к-рой поднят на 50 *см*.

ФА́УНА (лат. Fauna богиня лесов и полей, покровительница животных стад) — совокупность видов животных, обитающих на определенной территории.

ФА́УСТА МЕ́ТОД (E. C. Faust, совр. амер. паразитолог) — метод обогащения при гельминтоовоскопии кала, основанный на осаждении яиц гельминтов центрифугированием с последующим их всплыванием в 33% растворе сульфата цинка.

FÁCIES PÉSTICA (лат. «чумное лицо») — резко гиперемированное лицо (включая конъюнктивы) с заостренными чертами и выражением страдания; наблюдается при тяжелом течении чумы.

ФА́ЯНСА — КО́ННА ПРО́БА (K. Fajans, род. в 1887 г., польский химик; J. W. Conn, род. в 1907 г., амер. эндокринолог) — см. *Глюкозокортизоновая проба*.

F-ДУ́КЦИЯ (лат. ductio ведение, отведение; син. секс-дукция) — процесс переноса генов из одной бактериальной клетки в другую F^1 фактором.

ФЕБРИ́ЛЬНЫЙ (febrilis; лат. febris лихорадка) — относящийся к лихорадке, к повышенной температуре тела.

ФЕДЕРИ́ЧИ О́ПЫТ (F. Federici) — метод дифференциальной диагностики поражений звукопроводящего и звуковоспринимающего аппаратов путем сравнения продолжительности восприятия звука при исследовании костной и воздушной звукопроводимости с помощью камертона, переносимого с сосцевидного отростка на козелок ушной раковины.

ФЁДОРОВА ДО́СТУП (С. П. Федоров, 1869—1936, сов. хирург) — см. *Федорова разрез*.

ФЁДОРОВА ЗАЖИ́М (С. П. Федоров; син. зажим для почечной ножки) — хирургический зажим для пережатия почечной ножки при нефрэктомии; рукоятки зажима являются съемными.

ФЁДОРОВА НЕФРОПЕКСИ́Я (С. П. Федоров) — хирургическая операция: фиксация почки к XII ребру с помощью листков ее фиброзной капсулы, отслоенных по латеральной поверхности; применяется при нефроптозе.

ФЁДОРОВА ПИНЦЕ́Т (С. П. Федоров) — пинцет для захватывания твердой мозговой оболочки, слегка изогнутые губки к-рого снабжены на концах мелкими зубчиками.

ФЁДОРОВА ПОЛОЖЕ́НИЕ (С. П. Федоров) — полусидячее положение больного в кровати, при к-ром ноги умеренно согнуты в тазобедренных и коленных суставах; создается в послеоперационном периоде с помощью функциональной кровати либо путем подкладывания нескольких подушек под спину больного и валика под колени.

ФЁДОРОВА ПО́ЧЕЧНОЕ ЗЕ́РКАЛО (С. П. Федоров) — хирургический инструмент для оттеснения мягких тканей с целью обнажения почки и почечной лоханки, представляющий собой зеркало с пластинчатой рабочей частью, отогнутой под углом 120° к рукоятке.

ФЁДОРОВА РАЗРЕ́З (С. П. Федоров; син. Федорова доступ) — 1) оперативный доступ к желчному пузырю: разрез брюшной стенки в правом подреберье с поворотом под тупым углом к мечевидному отростку; 2) оперативный доступ к почке и верхней трети мочеточника: дугообразный разрез брюшной стенки от конца XII ребра по направлению к пупку.

ФЁДОРОВА РЕКТОСКО́П (истор.; С. П. Федоров) — один из первых образцов ректороманоскопа, представлявший собой набор металлических трубок различной длины и диаметра, снабженных обтураторами и источником освещения.

ФЁДОРОВА СУБКАПСУЛЯ́РНАЯ НЕФРЭКТОМИ́Я (С. П. Федоров) — см. *Нефрэктомия субкапсулярная*.

ФЕ́ЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (E. Feer, 1864—1955, швейц. педиатр) — см. *Акродиния*.

ФЕЙГЕНБА́УМА СИМПТО́М (A. Feigenbaum, франц. офтальмолог) — желтоватое окрашивание задних отделов глазного дна, наблюдаемое при офтальмоскопии с сильным источником света; признак сахарного диабета.

ФЕ́ЙЛЬГЕНА РЕА́КЦИЯ (R. Feulgen, 1884—1955, нем. физиолог и химик) — способ выявления дезоксирибонуклеиновой кислоты в клетках и тканях, основанный на ее гидролизе соляной кислотой с высвобождением альдегидных групп, обнаруживаемых по фиолетовому окрашиванию при взаимодействии с фуксинсернистой кислотой (реактивом Шиффа).

ФЕ́ЙРБАНКА БОЛЕ́ЗНЬ (Th. Fairbank, совр. англ. радиолог; син. дисплазия эпифизарная множественная) — семейно-наследственная болезнь, характеризующаяся нарушением эндохондрального окостенения, особенно бедренной и большеберцовой костей, проксимального эпифиза плечевой и дистального эпифиза лучевой кости; проявляется малым ростом, тугоподвижностью в суставах, болями и деформациями конечностей, особенно нижних.

ФЕКА́ЛИИ — см. *Кал*.

ФЕКА́ЛЬНЫЙ (faecalis, от лат. faeces кал, испражнения) — относящийся к калу, к испражнениям.

ФЕКА́ЛЬНЫЙ ЩЕЛОЧЕОБРАЗОВА́ТЕЛЬ — см. *Alcaligenes faecalis*.

ФЕЛИНО́З (felinosis; лат. felinus кошачий + *-оз*) — см. *Болезнь от кошачьих царапин*.

ФЕ́ЛЛА МЕ́ТОД (H. B. Fell) — метод культивирования тканей, при к-ром их помещают на часовое стекло с питательной средой, а часовые стекла — в чашку Петри, куда для увлажнения воздуха помещают смоченную водой стерильную вату.

ФЕ́ЛЛИНГА БОЛЕ́ЗНЬ (I. A. Fölling, род. в 1888 г., норвежский врач) — см. *Фенилкетонурия*.

ФЕ́ЛЛИНГА ПРО́БА (I. A. Fölling) — метод обнаружения фенилпировиноградной кислоты в моче, основанный на появлении сине-зеленой окраски после добавления к моче хлорида железа; применяется для диагностики фенилкетонурии.

ФЕ́ЛЛИНГА РЕАКТИ́В (I. A. Fölling; син. феллингова жидкость) — реактив для качественного и количественного определения альдегидов, простейших редуцирующих сахаров и нек-рых других веществ в биологических жидкостях; представляет собой раствор сульфида меди, сегнетовой соли и едкого натра.

ФЕ́ЛЛИНГА СИНДРО́М (I. A. Fölling) — см. *Фенилкетонурия*.

ФЕ́ЛЛИНГОВА ЖИ́ДКОСТЬ (I. A. Fölling) — см. *Феллинга реактив*.

ФЕЛЛЯ́ЦИЯ (лат. fello сосать; син.: иррумация, фаллаторизм) — форма орогенитального сексуального контакта, при к-рой половое возбуждение вызывается воздействием ртом и языком на половой член партнера.

ФЕ́ЛПСА — ГО́ХТА ОСТЕОКЛА́СТ-РЕДРЕССА́ТОР (A. M. Phelps, 1851—1902, амер. ортопед; H. Gocht, 1869—1938, нем. ортопед) — инструмент, применяемый при репозиции свежих переломов пяточной кости, застарелых и повторных переломов лодыжек, а также при редрессации стопы, представляющий собой массивный зажим в виде тисков, губки которых сближают с помощью винта.

ФЕ́ЛТИ СИНДРО́М (A. R. Felty, род. в 1895 г., амер. врач) — сочетание полиартрита с увеличением селезенки и лимфатических узлов, лейкопенией, иногда с анемией и тромбоцитопенией; представляет собой форму ревматоидного артрита у взрослых.

ФЕ́ЛЬДМАНА ПЛО́СКИЙ ОСТРОКОНЕ́ЧНЫЙ АТРОФИ́ЧЕСКИЙ ЛИ́ХЕН — см. *Литтла — Лассюэра синдром.*

ФЕ́ЛЬДМАНА ПРИЁМ (Э. А. Фельдман) — метод растормаживания коленного или ахиллова рефлекса, при к-ром больному предлагается покашлять.

ФЕ́ЛЬДШЕР (нем. Feldscher) — медицинский работник со средним специальным образованием, работающий самостоятельно или под руководством врача.

Ф. ВОЕ́ННЫЙ — Ф., состоящий на действительной военной службе и занимающий соответствующую должность в Вооруженных Силах.

Ф. О́БЩЕГО ПРО́ФИЛЯ — Ф., получивший подготовку по оказанию медицинской помощи населению (по диагностике и лечению заболеваний, оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи, родовспоможению и др.) и работающий в фельдшерско-акушерском пункте, фельдшерском здравпункте, на станции скорой и неотложной медицинской помощи или другом лечебно-профилактическом учреждении.

Ф. САНИТА́РНЫЙ — Ф., получивший подготовку по санитарно-противоэпидемическим вопросам и работающий помощником санитарного врача, врача-эпидемиолога, паразитолога СЭС, или в качестве санитарного фельдшера участковой больницы.

ФЕ́ЛЬДШЕРСКАЯ СПРА́ВКА О СМЕ́РТИ — учетный документ, регистрирующий факт и причину смерти, заполняемый фельдшером, констатировавшим смерть; составляется только в сельской местности при отсутствии врача.

ФЕ́ЛЬДШЕРСКО - АКУШЕ́РСКИЙ ПУНКТ — лечебно-профилактическое учреждение, входящее в комплекс медицинских учреждений сельского врачебного участка, предназначенное для оказания населению силами фельдшера (заведующего Ф.-а. п.) и акушерки доврачебной медицинской помощи и родовспоможения, для осуществления патронажа беременных женщин и детей, проведения санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий; Ф.-а. п. создаются в небольших, отдельно расположенных населенных пунктах.

ФЕ́ЛЬТИНА — БЁЛЕРА ме́тод (Feltin; L. Böhler, 1885—1973, австрийский хирург-травматолог) — метод лечения переломов пястных костей, заключающийся в проведении через кость металлической спицы и последующим вытяжением с креплением груза к спице.

ФЕМИНИЗА́ЦИЯ (feminisatio; лат. femina женщина) — появление у мужчины женских вторичных половых признаков; Ф. обусловлена нарушением функции желез внутренней секреции.

Ф. ТЕСТИКУЛЯ́РНАЯ — см. *Синдром тестикулярной феминизации.*

ФЕМИНИ́ЗМ (feminismus; лат. femina женщина) в психиатрии — наличие у мужчины вторичных половых признаков и (или) характерологических и поведенческих особенностей, свойственных женщине.

ФЕ́МИСТЕРА КО́СТНАЯ ПЛА́СТИКА (D. B. Phemister, род. в 1882 г., амер. хирург) — метод костной пластики при ложных суставах большеберцовой кости; заключается в аутотрансплантации пластинки коркового вещества кости с надкостницей в глубокое ложе по передневнутренней ее поверхности, а кусочков губчатого вещества — по наружной поверхности; не требует обнажения костных отломков и иссечения рубцовой ткани.

ФЕН (греч. phainō являть, проявлять) в генетике — 1) генетически обусловленный признак; 2) Ф.[1], контролируемый одним геном.

ФЕНАНТРЕ́Н — компонент многих онкогенных веществ (напр., каменноугольной смолы), представляющий собой ароматический углеводород, состоящий из трех конденсированных бензольных колец.

ФЕ́НГЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (Ch. Fenger, 1840—1902, амер. хирург) — хирургическая операция: продольное рассечение стриктуры почечной лоханки и прилежащего участка мочеточника с последующим поперечным сшиванием краев разреза.

ФЕНЕСТРА́ТОР (лат. fenestro, fenestratum снабжать окнами, отверстиями) — хирургический инструмент в виде острого стального крючка, применяемый при слухулучшающих операциях для создания искусственного отверстия в подножной пластинке стремечка.

ФЕНЕСТРА́ЦИЯ (истор.; fenestratio; лат. fenestro, fenestratum снабжать окнами, отверстиями) — трефинация черепа при эпилепсии; производится над корковой проекцией очага патологических изменений в головном мозге с целью снижения внутричерепного давления.

ФЕНЕСТРА́ЦИЯ ЛАБИРИ́НТА (fenestratio labyrinthi) — хирургическая операция: создание отверстия, через которое боковой (реже передний) полукружный канал лабиринта сообщается с барабанной полостью для замещения функции овального окна; применяется, напр., при отосклерозе.

Ф. ЛАБИРИ́НТА ПО БО́РДЕС-ВО́ЛЛСУ — см. *Бордес-Воллса фенестрация лабиринта.*

Ф. ЛАБИРИ́НТА ПО ПО́ППЕРУ — см. *Поппера фенестрация лабиринта.*

ФЕНЕСТРА́ЦИЯ МОЗЖЕЧКО́ВОГО НАМЁТА (fenestratio tentorii cerebelli) — хирургическая операция: образование отверстия в намете мозжечка для лечения окклюзионной гидроцефалии, вызванной нарушением проходимости субарахноидального пространства на этом уровне.

ФЕНЕСТРА́ЦИЯ СТРЕ́МЕНИ (fenestratio stapedis) — хирургическая операция: создание отверстия в основании стремени; этап стапедопластики или тимпанопластики.

ФЕНИЛАЛАНИ́Н — незаменимая моноаминомонокарбоновая циклическая аминокислота, входящая в состав большинства природных белков; наследственное нарушение превращения Ф. в тирозин приводит к фенилкетонурии.

ФЕНИЛАМИ́Н — см. *Анилин.*

ФЕНИЛКЕТОНУРИ́Я (phenilketonuria; фенилаланин + кетоны + греч. uron мочa; син.: оксифенилкетонурия, олигофрения фенилпировиноградная, Феллинга болезнь, Феллинга синдром) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена фенилаланина, проявляющаяся отставанием физического и психического развития, расстройствами движений и мышечного тонуса (гиперкинезии, дискинезии); наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

ФЕНИЛМЕТА́Н — см. *Толуол.*

ФЕНИЛПИРОВИНОГРА́ДНАЯ КИСЛОТА́ — промежуточный продукт обмена фенилаланина; повышенное содержание Ф. к. в моче обнаруживают, напр., при фенилкетонурии, вирусном гепатите, нек-рых формах шизофрении.

ФЕНИ́Л-РОЗАНИЛИ́Н — см. *Розанилинблау.*

ФЕНИЛЭТИЛАМИ́НЫ — см. *Катехоламины.*

ФЕНО- (греч. phainō являть, проявлять) — составная часть сложных слов, означающая «явление», «проявление», «признак».

ФЕНОГЕНЕ́З (*фено-* + греч. genesis зарождение, развитие) — процесс формирования фена (фенов) в онтогенезе.

ФЕНОГЕНЕ́ТИКА (*фено-* + *генетика*) — раздел генетики, изучающий закономерности и механизмы проявления генов и генотипа в ходе онтогенеза.

ФЕНОКЛИ́Н — постепенное уменьшение (или увеличение) частоты каких-либо фенотипов внутри ареала популяции в определенном пространственном направлении.

ФЕНОКО́ПИЯ (*фено-* + копия; син. мутация ложная — нрк) — ненаследственное изменение каких-либо признаков организма под влиянием окружающей среды, копирующее мутации, отсутствующие в генотипе данной особи.

ФЕНО́Л (син.: карболовая кислота, оксибензол) — производное бензола, содержащее в молекуле гидроксильную группу, связанную с атомами углерода бензольного кольца; токсичен, обладает антисептическим действием; используется для приготовления многих лекарственных средств.

ФЕНОЛСЕ́РНАЯ КИСЛОТА́ — продукт обезвреживания фенола, образующегося в организме; представляет собой сложный эфир фенола и серной кислоты; выводится с мочой.

ФЕНОЛСУЛЬФОФТАЛЕ́ИНОВЫЙ ТЕСТ — показатель канальцевой секреции почек, представляющий собой клиренс фенолсульфофталеина, введенного внутривенно.

ФЕНОЛФТАЛЕ́ИН — индикатор, окрашивающийся в щелочной среде в малиновый цвет; продукт конденсации фталевого ангидрида с фенолом; используется также в качестве слабительного средства.

ФЕНО́МЕН АВТОМАТИ́ЧЕСКОГО ХВАТА́НИЯ И ПРЕСЛЕ́ДОВАНИЯ (греч. phainomenon нечто являющееся, явление) — см. *Автоматическое хватание.*

ФЕНО́МЕН АРБОРИЗА́ЦИИ (лат. arbor дерево) — см. *Феномен папоротника.*

ФЕНО́МЕН БУ́ДДЫ — см. *Панченко прием.*

ФЕНО́МЕН ВИШНЁВОЙ КО́СТОЧКИ — выявление конкремента во внепеченочных желчных протоках при их пальпации во время операции по поводу желчнокаменной болезни.

ФЕНО́МЕН ВОЗВРА́ТА ВОЗБУЖДЕ́НИЯ — см. *Феномен повторного входа возбуждения.*

ФЕНО́МЕН ВЫРА́ВНИВАНИЯ ГРО́МКОСТИ ЗВУ́КА — см. *Рекрутмент.*

ФЕНО́МЕН ГАШЕ́НИЯ СЫ́ПИ (син.: Чарлтона феномен, Шульца — Чарлтона феномен) — побледнение кожной сыпи при скарлатине в месте внутрикожного введения антитоксической антистрептококковой сыворотки; используется для дифференциальной диагностики скарлатины.

ФЕНО́МЕН ГО́ЛЕНИ (син. Фуа — Тевенара феномен голени) — неполное разгибание голени в коленном суставе у больного, лежащего на животе, после того как голень нек-рое время удерживали в положении крайнего сгибания; проявление экстрапирамидной ригидности.

ФЕНО́МЕН ДРОЖА́НИЯ ГИДАТИ́Д — см. *Дрожание гидатид.*

ФЕНО́МЕН ДЯ́ТЛА — резкое укорочение интервала между первым и вторым тонами сердца, воспринимаемое при аускультации как раздвоение первого тона при отсутствии второго; признак выраженной энергодинамической сердечной недостаточности.

ФЕНО́МЕН ЖЕЛОБКА́ — см. *Симптом клавишей.*

ФЕНО́МЕН КЛА́ВИШЕЙ — см. *Симптом клавишей.*

ФЕНО́МЕН КОША́ЧЬЕГО ЗРАЧКА́ — см. *Белоглазова признак.*

ФЕНО́МЕН КРОВЯНО́Й РОСЫ́ — см. *Феномен точечного кровотечения.*

ФЕНО́МЕН ЛУ́КОВИЧНОЙ ШЕЛУ́ХИ (син. склероз «луковичный») — многослойное кольцевидное разрастание коллагеновых волокон вокруг артерий и артериол селезенки при системной красной волчанке.

ФЕНО́МЕН МЕ́СТНОЙ ЭОЗИНОФИЛИ́И — увеличение процентного содержания эозинофилов в клеточном составе отпечатка с участка обнаженного глубокого слоя эпидермиса после предварительной аппликации аллергена.

ФЕНО́МЕН ОБКРА́ДЫВАНИЯ ВНУТРИМОЗГОВО́Й — 1) (син. феномен Робина Гуда) — отток крови в бассейн закупоренного мозгового сосуда из бассейнов соседних сосудов, ведущее к недостаточности кровоснабжения в зоне последних; 2) углубление ишемии в бассейне закупоренного мозгового сосуда в результате оттока крови в соседние участки при воздействии сосудорасширяющими средствами.

ФЕНО́МЕН ОБЛА́ТКИ — см. *Поспелова феномен.*

ФЕНО́МЕН ОТДА́ЧИ — быстрая смена одного рефлекса другим, антагонистическим первому, напр. резкое разгибание рефлекторно согнутой конечности по прекращении раздражения.

ФЕНО́МЕН ОТКЛОНЕ́НИЯ КОМПЛЕМЕ́НТА — см. *Нейссера — Веккберга феномен.*

ФЕНО́МЕН ПА́ПОРОТНИКА (син. феномен арборизации) — образование при высушивании слизи шейки матки кристаллов, расположение к-рых напоминает лист папоротника; может наблюдаться с 6—8-го дня до 21—22-го дня менструального цикла; наиболее выражен к моменту овуляции.

ФЕНО́МЕН ПАРАГИПЕРГИ́И — см. *Анафилактоидная реакция.*

ФЕНО́МЕН ПАТОЛОГИ́ЧЕСКОГО АРТЕРИОВЕНО́ЗНОГО ПЕРЕКРЕ́СТА — см. *Салюса — Гунна симптом.*

ФЕНО́МЕН ПОВТО́РНОГО ВХО́ДА ВОЗБУЖДЕ́НИЯ (син. феномен возврата возбуждения) — возникновение циркуляции возбуждения в участке миокарда вследствие локального увеличения его рефрактерности или блокады проведения импульса в одном направлении; служит причиной многих нарушений ритма сердца.

ФЕНО́МЕН ПО́ЛЗАНИЯ — см. *Бауэра рефлекс.*

ФЕНО́МЕН ПРО́ВОЛОЧНОЙ ПЕ́ТЛИ — выраженное утолщение базальных мембран капилляров почечных клубочков, в результате чего при микроскопии капилляры имеют вид проволочных петель; морфологический признак люпус-нефрита.

ФЕНО́МЕН ПСОРИАТИ́ЧЕСКОЙ ПЛЁНКИ (син. феномен терминальной пленки) — обнажение ровной розовой поверхности при поскабливании папулы; симптом псориаза.

ФЕНО́МЕН ПУ́РПУРЫ — появление точечных кровоизлияний в поверхностном слое кожи при поскабливании элемента сыпи и вокруг него; симптом каплевидного парапсориаза.

ФЕНО́МЕН РО́БИНА ГУ́ДА — см. *Феномен обкрадывания внутримозговой*[1].

ФЕНО́МЕН СКРЫ́ТОГО ШЕЛУШЕ́НИЯ — появление отрубевидных шелушений при поскабливании сыпи; симптом каплевидного парапсориаза.

ФЕНО́МЕН СТЕАРИ́НОВОГО ПЯТНА́ — образование на поверхности папулы мягких серебристо-белых чешуек, легко отделяемых при поскабливании; симптом псориаза.

ФЕНО́МЕН ТЕРМИНА́ЛЬНОЙ ПЛЁНКИ — см. *Феномен псориатической пленки.*

ФЕНО́МЕН ТОЛЧКА́ — см. *Фуа — Тевенара симптом.*

ФЕНО́МЕН ТО́ЧЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕ́НИЯ (син.: Аупитца симптом, феномен кровяной росы) — появление точечных кровотечений из папулы при полном соскабливании покрывающих ее чешуек; симптом псориаза.

ФЕНО́МЕН ТРАНСПЛАНТАЦИО́ННОЙ РЕЗИСТЕ́НТНОСТИ — снижение прививаемости опухоли после предварительного введения реципиентам вируса, индуцировавшего данную опухоль, или клеток, содержащих те же трансплантационные опухолевые антигены, что и прививаемая опухоль.

ФЕНО́МЕН УМОЛКА́НИЯ — внезапное полное или частичное спонтанное исчезновение симптомов психоза.

ФЕНО́МЕН УСКОРЕ́НИЯ НАРАСТА́НИЯ ГРО́МКОСТИ — см. *Рекрутмент.*

ФЕНО́МЕН ФЕНЕСТРА́ЦИИ — небольшое пульсирующее выпячивание на неподвижном или почти неподвижном контуре рентгеновской тени сердца, чаще в области его верхушки; рентгенологический признак констриктивного перикардита при наличии отверстия в окружающих сердце сращениях.

ФЕНО́МЕН ЦАРА́ПАНИЯ — см. *Поспелова феномен.*

ФЕНО́МЕН «Я́БЛОЧНОГО ЖЕЛЕ́» — желто-коричневая окраска бугорков в коже, выявляемая при диаскопии; признак обыкновенной волчанки или лейшманиоза.

ФЕНОМЕ́НОВА ДЕКАПИТА́ЦИЯ (Н. Н. Феноменов, 1855—1913, отеч. акушер-гинеколог) — плодоразрушающая операция, при которой отделение головки плода от туловища производят специальными ножницами.

ФЕНОМЕ́НОВА НО́ЖНИЦЫ (Н. Н. Феноменов) — ножницы для рассечения мягких и костных тканей плода при плодоразрушающих операциях, имеющие короткие лезвия и длинные рукоятки, между к-рыми укреплена пружина, облегчающая раскрытие инструмента.

ФЕНОМЕ́НОВА ПЕРФОРА́ТОР (Н. Н. Феноменов) — акушерский инструмент для прободения головки плода при плодоразрушающих операциях; по форме напоминает бурав с четырьмя торцовыми и двумя продольными режущими гранями, снабженный скользящей защитной гильзой, надеваемой на рабочую часть Ф. п. и смещающейся к рукоятке по мере погружения инструмента в кость.

ФЕНОСАФРАНИ́Н — краситель из группы основных азокрасителей, применяемый для выявления клеточных ядер и окрашивающий их в красный цвет.

ФЕНОТИ́П (*фено-* + тип) — совокупность всех свойств и признаков особи на определенной стадии развития, сформировавшаяся в результате взаимодействия генотипа с окружающей средой.

ФЕ́НЦА ФЕНО́МЕН (E. Fenz, совр. австрийский врач) — появление боли в области шеи при вращении больным наклоненной вперед головой; признак остеохондроза шейного отдела позвоночника.

ФЕОХРОМОБЛА́СТ (phaeochromoblastus; греч. phaios серый, темный + chrōma цвет, окраска + blastos росток, зародыш) — см. *Хромаффинобласт.*

ФЕОХРОМОБЛАСТО́МА (phaeochromoblastoma; *феохромобласт* + *-ома*) — см. *Феохромоцитома.*

ФЕОХРОМОЦИ́Т (phaeochromocytus; греч. phaios серый, темный + chrōma цвет, окраска + гист. cytus клетка) — см. *Хромаффиноцит.*

ФЕОХРОМОЦИТО́МА (phaeochromocytoma; *феохромоцит* + *-ома*; син.: опухоль хромаффинная, феохромобластома, хромаффинома, хромаффиноцитома) — гормонально-активная опухоль, происходящая из зрелых клеток хромаффинной ткани, чаще из мозгового вещества надпочечников.

ФЕ́РА ДИСТРОФИ́Я РОГОВИ́ЦЫ (O. Fehr, род. в 1871 г., нем. офтальмолог; син. дистрофия роговицы пятнистая) — наследственная болезнь глаз, характеризующаяся постепенно прогрессирующим помутнением роговиц с появлением на них сероватых непрозрачных пятен и снижением остроты зрения; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

ФЕРАГУ́ТА И́НДЕКС (Feragut; син. Ферагута — Крейнбюля индекс) — индекс, характеризующий сократимость миокарда и представляющий собой отношение величины индекса Глисона — Браунвальда к величине изометрического напряжения.

ФЕРАГУ́ТА — КРЕ́ЙНБЮЛЯ И́НДЕКС (Feragut; Kreinbüll) — см. *Ферагута индекс.*

ФЕ́РВОРТА — ВО́ЛЬФФА СРЕДА́ (H. Vervoort, род. в 1871 г., голландский врач; J. W. Wolff) — жидкая питательная среда для выращивания лептоспир, содержащая пептон, фосфатную бу-

ферную смесь, воду и сыворотку крови кролика.

ФЕ́РГЮСОНА СИМПТО́М (Fergusson) — появление болей в подвздошно-крестцовом сочленении у больного, стоящего на стуле на одной ноге, при попытке опустить вторую ногу ниже уровня стула; признак сакроилеита.

ФЕ́РГЮСОНА — ХУ́КА СРЕДА́ (W. W. Ferguson; A. E. Hook) — дифференциально-диагностическая питательная среда, содержащая мочевину и крезоловый красный; используется для определения активности уреазы у культивируемого микроорганизма, напр. при диагностике дифтерии.

ФЕРЕЕ́ЙЕНА «ЗВЁЗДОЧКИ» (stellulae Verheyenii; Ph. Verheyen, 1648—1710, фламандский анатом) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1394*.

ФЕРЕО́ЛЯ — БЕНЬЕ́ ЭРИТРОДЕРМИ́Я (L. H. F. Féréol, 1825—1891, франц. врач; E. Besnier, 1831—1909, франц. дерматолог) — см. *Эритема скарлатиноподобная рецидивирующая*.

ФЕРМЕ́НТ(-Ы) (лат. fermentum брожение, бродильное начало; син.: биокатализатор, энзим) — белок, выполняющий функцию специфического катализатора превращения веществ в организме; Ф. содержатся во всех живых клетках.

Ф. АДАПТИ́ВНЫЙ (син. Ф. индуцибельный) — Ф., синтезируемый клеткой при появлении в среде вещества, превращение к-рого он катализирует.

Ф. АЛЛОСТЕРИ́ЧЕСКИЙ (син. Ф. регуляторный) — Ф., активность к-рого регулируется химическими соединениями, отличными от веществ, превращение к-рых он катализирует, и взаимодействующими с ферментом на другом участке его молекулы.

Ф. ВЕТВЯЩИЙ — см. *Фермент гликоген-ветвящий*.

Ф. ГЛИКОГЕН-ВЕТВЯ́ЩИЙ (син.: Ф. ветвящий, фермент 1,4-α-глюканветвящий) — Ф. класса трансфераз (КФ 2.4.1.18), катализирующий образование новых точек ветвления в молекуле гликогена; генетически обусловленное отсутствие в организме Ф. г.-в. приводит к гликогенозу IV типа.

ФЕРМЕ́НТ 1,4-α-ГЛЮКАН-ВЕТВЯ́ЩИЙ — см. *Фермент гликоген-ветвящий*.

Ф. ДЫХА́ТЕЛЬНЫЙ (син. Ф. тканевого дыхания) — общее название Ф., принимающих участие в процессах тканевого дыхания.

Ф. ЖЁЛТЫЕ (устар.) — см. *Флавопротеиды*.

Ф. ИНДУЦИ́БЕЛЬНЫЙ — см. *Фермент адаптивный*.

Ф. КОНСТИТУТИ́ВНЫЙ — Ф., присутствующий в клетке данного типа постоянно и в практически неизменном количестве.

Ф. ПИЩЕВАРИ́ТЕЛЬНЫЕ — общее название Ф., участвующих в процессах расщепления пищевых веществ (у человека — в просвете пищеварительного тракта).

Ф. ПРОТЕОЛИТИ́ЧЕСКИЕ (син. протеазы) — Ф. класса гидролаз (КФ 3.4.21—24), катализирующие расщепление белков и пептидов по пептидным связям; участвуют в процессах белкового обмена в организме.

Ф. РЕГУЛЯТО́РНЫЙ — см. *Фермент аллостерический*.

Ф. ТКАНЕВО́ГО ДЫХА́НИЯ — см. *Фермент дыхательный*.

ФЕРМЕ́НТНЫЕ СРЕ́ДСТВА (praeparata fermentalia) — лекарственные средства, основным действующим началом к-рых являются ферменты (напр., пепсин, трипсин, гиалуронидаза).

ФЕРМЕНТОПАТИ́Я (fermentopathia; *фермент* + греч. pathos страдание, болезнь) — см. *Энзимопатия*.

ФЕРМЕНТОТЕРАПИ́Я (*фермент* + *терапия*) — см. *Энзимотерапия*.

ФЕРОМО́НЫ (греч. pherō нести, переносить + hormaō приводить в движение, побуждать) — вещества, вырабатываемые специальными железами или клетками животных, выделяемые в окружающую среду и имеющие сигнальное значение (напр., аттрактанты); отдельные Ф. применяют для управления поведением животных, напр. с целью предупреждения нападения кровососущих членистоногих на людей.

ФЕ́РРА́РО — ВАН-БО́ГАРТА — НИ́ССЕНА БОЛЕ́ЗНЬ (A. Ferraro; L. van Bogaert, род. в 1897 г., бельгийский невропатолог; Nissen) — семейная болезнь ц. н. с., характеризующаяся атрофией коры полушарий большого мозга и дегенерацией базальных ядер; проявляется в возрасте 40—45 лет развитием деменции и акинетико-ригидного синдрома.

ФЕРРЕ́ЙНА ЛУЧИ́ (A. Ferrein, 1693—1769, франц. анатом и хирург) — см. *Лучистая часть корковых долек*.

ФЕРРЕ́ЙРА-МА́РКИША СИНДРО́М (J. Ferreira-Marques) — см. *Атрофия жировой ткани кольцевидная*.

ФЕРРЕ́РИ ОПЕРА́ЦИЯ (G. Ferreri, род. в 1856 г., итал. оториноларинголог) — хирургическая операция: закрытие стойкой ларинго- или трахеостомы, заключающееся в формировании двух четырехугольных кожных лоскутов, имеющих питающую ножку у краев свища, после чего один из лоскутов завертывают кожей внутрь, другой укладывают над ним и пришивают.

ФЕРРЕ́ТИ ПРИЗНАК (Ferreti) — ослабление и укорочение перкуторного звука над правой передневерхней остью подвздошной кости; необязательный признак аппендицита.

ФЕРРИГЕМОГЛОБИ́Н — см. *Метгемоглобин*.

ФЕРРИТИ́Н (лат. ferrum железо) — железосодержащий белок печени, селезенки, костного мозга и нек-рых других тканей; служит резервным источником железа в организме.

ФЕ́РСТЕРА СИМПТО́М (O. Foerster, 1873—1941, нем. невропатолог и психиатр) — восприятие всех раздражений как болевых; характерен для поражения таламуса.

ФЕ́РСТЕРА СИНДРО́М (O. Foerster) — форма детского церебрального паралича, обусловленная недоразвитием лобных долей большого мозга и лобно-мостомозжечковых путей, проявляющаяся резким снижением мышечного тонуса, гиперкинезами, задержкой развития психики и двигательной сферы.

ФЕ́РСТЕРА — А́ББИ ОПЕРА́ЦИЯ (O. Foerster, 1873—1941, нем. невропатолог и психиатр; R. Abbe, 1851—1928, амер. хирург; син. радикотомия субдуральная) — хирургическая операция: субдуральное пересечение задних корешков спинного мозга.

ФЕ́РСТЕРА — АЛЬТЕНБУ́РГЕРА МИОСТАТИ́ЧЕСКИЙ РЕФЛЕ́КС (O. Foerster, 1873—1941, нем. невропатолог и психиатр; Altenburger) — см. *Лидделла — Шеррингтона рефлекс*.

ФЕРТИ́ЛЬНОСТЬ (лат. fertilis плодородный) — см. *Коэффициент общей плодовитости*.

ФЕРТИ́ЛЬНЫЙ (fertilis) — способный к деторождению.

ФЕРШРО́БЕН (нем. verschroben взбалмошный) — тип изменения личности, при к-ром у больного наблюдаются непонятные поступки, жесты и мимика, манерные движения, преобладание в речи вычурных, неподходящих по смыслу слов и неологизмов.

ФЕТА́ЛЬНЫЙ (fetalis; лат. fetus порождение, потомство) — относящийся к плоду, характерный для плода.

ФЕТА́ЛЬНЫЙ ПЕРИО́Д (син. плодный период) — период внутриутробного развития, характеризующийся преобладанием процессов роста и дифференцировки при законченном формировании организма; у человека Ф. п. охватывает 3—10-й лунные месяцы внутриутробного развития.

ФЕ́Т- (фето-; лат. fetus порождение, потомство, отпрыск) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к плоду, к фетальному периоду».

ФЕТИШИ́ЗМ (франц. fétiche идол, талисман) в сексопатологии — половое извращение, при к-ром половое влечение направлено на какие-либо предметы, чаще детали женского туалета.

ФЕТО- — см. *Фет-*.

ФЕТО́З (fetosis; *фет-* + *-оз*) — общее название болезней плода невоспалительной природы.

ФЕТОМЕТРИ́Я (fetometria; *фето-* + греч. metreō измерять, определять) — общее название методов определения размеров плода или его отдельных частей, напр. посредством рентгенографии, эхографии.

ФЕТОПАТИ́Я (fetopathia; *фето-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название болезней плода, возникающих с начала 4-го лунного месяца внутриутробного развития, проявляющихся аномалиями развития или врожденными болезнями, нередко заканчивающихся асфиксией плода и обусловливающих преждевременные роды.

Ф. БАКТЕРИА́ЛЬНАЯ (f. bacterialis) — Ф., обусловленная бактериальной инфекцией в организме матери.

Ф. ВИ́РУСНАЯ (f. viralis) — Ф., обусловленная вирусной инфекцией в организме матери.

Ф. ДИАБЕТИ́ЧЕСКАЯ (f. diabetica) — Ф., обусловленная сахарным диабетом матери, проявляющаяся гигантскими размерами плода, аномалиями его развития.

Ф. ИНФЕКЦИО́ННАЯ (f. infectiosa) — Ф., обусловленная инфекционной болезнью матери.

Ф. ЛИСТЕРИО́ЗНАЯ (f. listeriosa) — Ф., обусловленная заражением плода листериями; лежит в основе септикогранулематоза новорожденных.

Ф. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ (f. syphilitica) — Ф., обусловленная заражением плода сифилисом, проявляющаяся поражениями органов, свойственными врожденному сифилису.

Ф. ТОКСОПЛАЗМО́ЗНАЯ (f. toxoplasmotica) — Ф., обусловленная заражением плода возбудителем токсоплазмоза, проявляющаяся преимущественно поражением головного мозга и органов зрения.

Ф. ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ (f. tuberculosa) — Ф., обусловленная заражением плода микобактериями туберкулеза.

Ф. ЦИТОМЕГАЛИ́ЧЕСКАЯ (f. cytomegalica) — Ф., возникающая при заражении плода вирусом цитомегалии и протекающая в форме генерализованной цитомегалии.

ФЕТОПЛАЦЕНТА́РНАЯ НЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ (insufficientia fetoplacentaris; *фето-* + *плацента*) — недостаточность нек-рых функций плаценты (напр., гормональной, обмена веществ); приводит к нарушению развития плода вплоть до его гибели.

α-ФЕТОПРОТЕЙНЫ — см. *Альфафетопротеины.*

FOETOR EX ÓRE — дурной запах изо рта; может наблюдаться при различных патологических процессах в полости рта, а также при болезнях органов дыхания и пищеварения.

ФЕТОТОКСИ́ЧЕСКИЙ (fetotoxicus; *фето-* + *токсический*) — токсичный для плода.

ФЕТОФАНЕРО́З (нем. Fett жир + греч. phaneros видимый, явный + *-оз*)— см. *Дистрофия жировая.*

ФЕ́ХНЕРА ЗАКО́Н (G. Th. Fechner, 1801—1887, нем. ученый) — см. *Психофизический закон.*

ФЖЕЛ — см. *Жизненная емкость легких форсированная.*

ФИАЛОФО́РЫ (Phialophora) — род микроорганизмов сем. Dematiaceae (кл. несовершенных грибов), представляющих собой в материале, полученном от больного, овальные или круглые тельца желтовато-коричневого цвета, а в культуре — септированный мицелий темно-зеленого или черного цвета; некоторые виды Ф. являются возбудителями хромомикоза у человека (напр., Phialophora verrucosa, Phialophora pedrosi, Phialophora compacta).

ФИБР- (фибро-; лат. fibra волокно) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к волокнистой ткани», «волокнистый», «фиброзный».

ФИБРИЛЛОАРХИТЕКТО́НИКА (лат. fibrilla, уменьшительное от fibra волокно + архитектоника) — 1) расположение отдельных структурных единиц — волоконец — в составе волокон межклеточного вещества соединительной ткани; 2) раздел нейрогистологии, изучающий расположение нейрофибрилл в цитоплазме нейрона.

ФИБРИЛЛО́ЛИЗ (fibrillolysis; лат. fibrilla, уменьшительное от fibra волокно + греч. lysis распад, разложение) — расплавление фибрилл коллагена, преколлагена, ретикулина, миофибрилл или нейрофибрилл при какомлибо патологическом процессе.

ФИБРИ́ЛЛЫ КОЛЛАГЕ́НА (fibrillae collagenosae, LNH; лат. fibrilla, уменьшительное от fibra волокно) — структурные единицы коллагенового волокна, состоящие из белка коллагена.

ФИБРИ́ЛЛЫ ПРЕКОЛЛАГЕ́НА — см. *Волокна преколлагеновые.*

ФИБРИ́ЛЛЫ РЕТИКУЛИ́НА — см. *Волоконца ретикулярные.*

ФИБРИЛЛЯ́РНОЕ ПОДЁРГИВАНИЕ (син. фибрилляция) — быстрое сокращение отдельных мышечных волокон; признак поражения мотонейронов двигательных ядер черепных нервов и передних рогов спинного мозга.

ФИБРИЛЛЯ́РНОЕ РАСЩЕПЛЕ́НИЕ МЫШЦ (schisis musculorum fibrillaris) — разделение мышечных волокон на отдельные фибриллы при дистрофии, обусловленное нарушением внутриклеточных связей.

ФИБРИЛЛЯ́РНЫЙ (fibrillaris) — 1) состоящий из фибрилл; 2) относящийся к фибрилляции.

ФИБРИЛЛЯ́ЦИЯ (fibrillatio; лат. fibrilla, уменьшительное от fibra волокно) — см. *Фибриллярное подергивание.*

ФИБРИЛЛЯ́ЦИЯ ЖЕЛУ́ДОЧКОВ (fibrillatio ventriculorum; син. мерцание желудочков) — аритмия сердца, характеризующаяся полной асинхронностью сокращения миофибрилл желудочков, что ведет к прекращению насосной функции сердца.

ФИБРИЛЛЯ́ЦИЯ ПРЕДСЕ́РДИЙ (fibrillatio atriorum; син. мерцание предсердий) — аритмия сердца, характеризующаяся полной асинхронностью сокращений миофибрилл предсердий, проявляющейся прекращением их насосной функции.

ФИБРИ́Н (лат. fibra волокно) — нерастворимый в воде белок, образующийся из фактора I (фибриногена) при действии на него тромбина в процессе свертывания крови.

ФИБРИНА́ЗА — см. *Фактор XIII.*

ФИБРИ́НОВЫЙ СГУ́СТОК — образование, состоящее из переплетенных нитей фибрина, являющееся структурной основой тромба.

ФИБРИНОГЕ́Н (*фибрин* + греч. -genēs порождающий, производящий) — см. *Фактор I.*

ФИБРИНОГЕ́Н ТРОМБОЦИ́ТОВ — см. *Фактор 5 тромбоцитов.*

ФИБРИНОГЕНО́ЛИЗ (*фибриноген* + греч. lysis распад, разложение) — процесс расщепления молекулы фактора I (фибриногена) под действием плазмина, приводящий к нарушению образования фибринового сгустка.

ФИБРИНОГЕНО́ЛИЗ ТРУ́ПНОЙ КРО́ВИ — см. *Фибринолиз трупной крови.*

ФИБРИНОГЕНОПОДО́БНЫЙ ФА́КТОР — см. *Фактор 5 тромбоцитов.*

ФИБРИНО́ИД (*фибрин* + греч. -eidēs подобный) — 1) белково-полисахаридный комплекс, образующийся в соединительной ткани в результате фибриноидного превращения; 2) см. *Фибриноидное превращение.*

ФИБРИНО́ИДНОЕ ИЗМЕНЕ́НИЕ — см. *Фибриноидное превращение.*

ФИБРИНО́ИДНОЕ НАБУХА́НИЕ — см. *Фибриноидное превращение.*

ФИБРИНО́ИДНОЕ ПРЕВРАЩЕ́НИЕ (син.: дистрофия фибриноидная, фибриноид, фибриноидное изменение, фибриноидное набухание) — разновидность мезенхимальной дистрофии, в основе к-рой лежит разрушение коллагена и образование аномальных белково-полисахаридных комплексов.

ФИБРИНОКИНА́ЗЫ — протеолитические ферменты, катализирующие превращение плазмогена в плазмин.

ФИБРИНО́ЛИЗ (*фибрин* + греч. lysis распад, разложение) — процесс растворения фибринового сгустка в результате ферментативных реакций; при тромбозе Ф. приводит к канализации тромба.

Ф. ТРУ́ПНОЙ КРО́ВИ (син. фибриногенолиз трупной крови) — Ф. крови трупа при внезапной смерти, вследствие чего такая кровь остается несвернувшейся; причины Ф. т. к. неясны.

ФИБРИНОЛИЗИ́Н (нрк) — см. *Плазмин.*

ФИБРИНОЛИТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (fibrinolytica; *фибрин* + греч. lytikos способный растворять) — лекарственные средства, способствующие растворению фибринового сгустка и применяемые для лечения болезней, сопровождающихся тромбозом (напр., фибринолизин, стрептаза).

ФИБРИНОРО́ДНОЕ ВЕЩЕСТВО́ (нрк) — см. *Фактор I.*

ФИБРИНСТАБИЛИЗИ́РУЮЩИЙ ФА́КТОР — см. *Фактор XIII.*

ФИБРИНФЕРМЕ́НТ (*фибрин* + *фермент*) — см. *Тромбин.*

ФИБРО- — см. *Фибр-.*

ФИБРОАДЕНИ́Я СЕЛЕЗЁНКИ (fibroadenia lienis; *фибро-* + греч. adēn железа) — патологический процесс, в основе которого лежат склероз и утолщение стенок синусов селезенки, вследствие чего при микроскопическом исследовании ее ткань имеет вид железистого органа.

ФИБРОАДЕНО́МА (fibroadenoma; *фибро-* + *аденома*; син.: аденома фиброзная, аденофиброма) — аденома с хорошо выраженной соединительнотканной стромой.

Ф. МОЛО́ЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ ГИГА́НТСКАЯ (f. mammae giganteum)— см. *Опухоль молочной железы листовидная.*

Ф. МОЛО́ЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ ИНТРАКАНАЛИКУЛЯ́РНАЯ (f. mammae intracanaliculare) — Ф. молочной железы, характеризующаяся разрастанием соединительной ткани в просвет протоков.

Ф. МОЛО́ЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ́ ПЕРИКАНАЛИКУЛЯ́РНАЯ (f. mammae pericanaliculare) — Ф. молочной железы, характеризующаяся разрастанием соединительной ткани вокруг протоков.

Ф. ФИЛЛО́ИДНАЯ — см. *Опухоль молочной железы листовидная.*

ФИБРОАТЕЛЕКТА́З (fibroatelectasis; *фибро-* + *ателектаз*) — ателектаз, при к-ром спавшаяся ткань легкого замещена соединительной тканью.

ФИБРОБЛА́СТ (fibroblastus, LNH; *фибро-* + греч. blastos росток, зародыш) — клетка мезенхимного происхождения, способная синтезировать волокнистые структуры соединительной ткани.

ФИБРОБЛАСТО́МА МЕНИНГЕА́ЛЬНАЯ (fibroblastoma meningeale; *фибробласт* + *-ома*) — см. *Менингиома фибробластическая.*

ФИБРОБЛАСТО́МА ПЕРИНЕВРА́ЛЬНАЯ (fibroblastoma perineurale) — см. *Невринома.*

ФИБРОГАСТРОСКО́П (*фибро-* + *гастроскоп*) — см. *Гастрофиброскоп.*

ФИБРОГРАНУЛЁМА ПОДЪЯЗЫЧНАЯ (fibrogranuloma sublinguale; *фибро-* + *гранулема*) — см. *Риги болезнь.*

ФИБРО́З (fibrosis; *фибр-* + *-оз*) — разрастание волокнистой соединительной ткани, происходящее, напр., в исходе воспаления.

Ф. ЛЁГКИХ (f. pulmonum) — см. *Пневмосклероз*.

Ф. ЛУЧЕВО́Й (f. radialis) — Ф., развивающийся после воздействия на ткань ионизирующего излучения.

Ф. ПЕ́ЧЕНИ (f. hepatis) — Ф. паренхимы печени, характеризующийся в отличие от цирроза отсутствием ее регенерации и обусловленный нарушением оттока крови по печеночным венам.

ФИБРО́З ГЕПАТОЛИЕНА́ЛЬНЫЙ (fibrosis hepatolienalis; *гепато-* + лат. lien селезенка; син.: Банти гепатолиенальный фиброз, Банти синдром) — сочетание явлений гиперспленического синдрома и фиброза селезенки при циррозе печени.

ФИБРО́З КО́СТИ ЛОКА́ЛЬНЫЙ (fibrosis ossis localis) — см. *Остеодисплазия фиброзная*.

ФИБРО́З ПЕРИУРЕТЕРА́ЛЬНЫЙ СИММЕТРИ́ЧНЫЙ ДВУСТОРО́ННИЙ — см. *Ормонда болезнь*.

ФИБРО́З РЕТРОПЕРИТОНЕА́ЛЬНЫЙ (fibrosis retroperitonealis) — см. *Ормонда болезнь*.

ФИБРО́З УЗЕЛКО́ВЫЙ (fibrosis nodularis) — см. *Дерматофиброз лентикулярный диссеминированный*.

ФИБРО́З УЗЕЛКО́ВЫЙ СУБЭПИДЕРМА́ЛЬНЫЙ (fibrosis nodularis subepidermalis) — см. *Дерматофиброз лентикулярный диссеминированный*.

ФИБРО́З ЭНДОМИОКАРДИА́ЛЬНЫЙ (fibrosis endomyocardialis) — см. *Кардиомиопатия облитерирующая*.

ФИБРОЗИ́Т (fibrositis; гист. textus fibrosus фиброзная ткань + *-ит*) — дистрофическое и воспалительное изменение структур, построенных гл. обр. из волокнистой соединительной ткани (сухожилий, сухожильных влагалищ, синовиальных сумок, связок, фасций, апоневрозов).

Ф. БРУЦЕЛЛЁЗНЫЙ (f. brucellosa) — Ф., возникающий у больных бруцеллезом, чаще в окружности суставов, а также в поясничной, крестцовой и ягодичной областях.

Ф. ПОСЛЕСАЛЬВАРСА́ННЫЙ — см. *Артропатия сальварсанная*.

ФИБРО́ЗНАЯ КА́ПСУЛА (capsula fibrosa) — см. *Фиброзная оболочка*.

ФИБРО́ЗНАЯ ОБОЛО́ЧКА (tunica fibrosa; син. фиброзная капсула) — соединительнотканная оболочка, покрывающая снаружи паренхиматозный орган.

Ф. О. ГЛАЗНО́ГО Я́БЛОКА (t. f. bulbi oculi, PNA; tunica fibrosa oculi, BNA; tunica externa oculi, JNA) — Ф. о., придающая глазному яблоку форму и выполняющая защитную функцию; различают переднюю прозрачную часть — роговицу и заднюю — склеру.

Ф. О. ПЕ́ЧЕНИ [t. f. hepatis, PNA; син.: глиссонова капсула, глиссонова сумка] — Ф. о., покрывающая печень, сращенная с висцеральной брюшиной и проникающая вглубь паренхимы печени в области ее ворот.

ФИБРО́ЗНАЯ ПЛАСТИ́НКА (lacertus fibrosus) — см. т. 3, Перечень анат. терминов, *855*.

ФИБРО́ЗНОЕ(-ЫЕ) КОЛЬЦО́(-А) — 1) [anulus (annulus) fibrosus, PNA, BNA, JNA] — совокупность кольцевидно расположенных коллагеновых волокон, образующая периферическую часть межпозвоночного диска; 2) [anuli (annuli) fibrosi, PNA, JNA; annuli fibrosi (cordis), BNA] — кольцевидные соединительнотканные образования, окружающие отверстия аорты и легочного ствола.

ФИБРО́ЗНОЕ СОЕДИНЕ́НИЕ (articulatio fibrosa, PNA; junctura fibrosa) — непрерывное соединение костей посредством волокнистой соединительной ткани; различают 2 вида Ф. с.: синдесмоз и шов.

ФИБРО́ЗНЫЙ (fibrosus; лат. fibra волокно) — относящийся к фиброзу, к волокнистой соединительной ткани.

ФИБРО́ЗНЫЙ ДЕФЕ́КТ МЕТА́ФИЗА — см. *Фиброма кости неостеогенная*.

ФИБРО́ЗНЫЙ КОРТИКА́ЛЬНЫЙ ДЕФЕ́КТ — см. *Фиброма кости неостеогенная*.

ФИБРО́ИД Я́ИЧНИКА (устар.; fibroidum ovarii; *фиброо-* + греч. -eidēs подобный) — см. *Фиброма яичника*.

ФИБРОКЕРАТО́МА У́ННЫ (*фиброо-* + *кератома*) — см. *Кожный рог*.

ФИБРОКСАНТО́МА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (fibroxanthoma malignum; *фиброо-* + *ксантома*) — см. *Гистиоцитома злокачественная*.

ФИБРОЛЕЙОМИО́МА (fibroleiomyoma; *фиброма* + *лейомиома*) — см. *Лейомиофиброма*.

ФИБРОЛИПОАНГИОМИО́МА (fibrolipoangiomyoma; *фиброо-* + греч. lipos жир + *ангиомиома*) — см. *Мезенхимома доброкачественная*.

ФИБРОЛИПО́МА (fibrolipoma; *фиброо-* + *липома*; син. липофиброма) — доброкачественная опухоль, состоящая из зрелой жировой ткани с массивными соединительнотканными прослойками.

ФИБРО́МА (fibroma; *фибр-* + *-ома*) — доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани.

Ф. КО́ЖИ ПЛО́ТНАЯ (f. cutis compactum) — см. *Дерматофиброма*.

Ф. ЛИМФАНГИЭКТАТИ́ЧЕСКАЯ (устар.; f. lymphangiectaticum) — мягкая Ф., содержащая многочисленные расширенные лимфатические сосуды.

Ф. МЯ́ГКАЯ (f. molle) — Ф., содержащая помимо волокнистой соединительной ткани элементы жировой ткани, большое количество сосудов или кисты.

Ф. НОСОГЛО́ТКИ ЮНОШЕСКАЯ (f. nasopharyngeale juvenile) — ангиофиброма, исходящая из глоточно-основной фасции в области основания черепа, купола носоглотки, крылонебной ямки; встречается в возрасте 10—20 лет.

Ф. ПАПИЛЛЯ́РНАЯ (f. papillare; син. фиброма полипозная) — Ф., имеющая форму полипа.

Ф. ПОЛИПО́ЗНАЯ (f. polyposum) — см. *Фиброма папиллярная*.

Ф. ТВЁРДАЯ (f. durum) — Ф., состоящая из веретенообразных клеток типа фибробластов или фиброцитов и большого количества коллагеновых волокон.

Ф. ТЕЛЕАНГИЭКТАТИ́ЧЕСКАЯ (устар.; f. teleangiectaticum) — мягкая Ф., содержащая многочисленные расширенные кровеносные сосуды.

Ф. ЭМБРИОНА́ЛЬНАЯ (f. embryonale) — Ф., все элементы к-рой напоминают соединительную ткань зародыша.

Ф. Я́ИЧНИКА (f. ovarii; син.: келоид яичника, фиброид яичника) — Ф., исходящая из соединительной ткани яичника; в отличие от текомы гормонально не активна.

ФИБРО́МА АМЕЛОБЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (fibroma ameloblasticum) — доброкачественная опухоль, состоящая из пролиферирующего одонтогенного эпителия и соединительной ткани.

ФИБРО́МА ДЕСМО́ИДНАЯ (fibroma desmoideum) — см. *Десмоид*.

ФИБРО́МА ИНВАЗИ́ВНАЯ (fibroma invasivum) — см. *Десмоид*.

ФИБРО́МА КО́СТИ НЕОССИФИЦИ́РОВАННАЯ — см. *Фиброма кости неостеогенная*.

ФИБРО́МА КО́СТИ НЕОСТЕОГЕ́ННАЯ (fibroma ossis non osteogenum; син.: метафизарный фиброзный дефект, фиброзный дефект метафиза, фиброзный кортикальный дефект, фиброма кости неоссифицированная) — патологическое изменение бедренной и большеберцовой костей неясной этиологии, характеризующееся очаговой резорбцией кортикального слоя их метафизов с замещением фиброзной тканью; протекает бессимптомно, приводит к патологическому перелому.

ФИБРО́МА ЛИСТОВИ́ДНАЯ (fibroma phylloideum) — см. *Опухоль молочной железы листовидная*.

ФИБРО́МА ТЕКАКЛЕ́ТОЧНАЯ КСАНТОМАТО́ЗНАЯ — см. *Текома*.

ФИБРО́МА ХОНДРОМИКСО́ИДНАЯ (fibroma chondromyxoideum; син. хондромиксома) — доброкачественная опухоль, состоящая из хрящевидного межуточного вещества, в к-ром расположены вытянутые и звездчатые клетки.

ФИБРО́МА ШО́УПА — см. *Шоупа фиброма*.

FIBRÓMA PÉNDULUM (лат. pendulus висящий, висячий) — см. *Невус фиброэпителиальный*.

ФИБРОМАТО́З [fibromatosis; *фиброма* (основа fibromat-) + *-оз*] — образование множественных фибром.

Ф. ВРОЖДЁННЫЙ СЕМЕ́ЙНЫЙ (f. congenita familiaris; син. полифиброматоз врожденный семейный) — врожденный Ф., при к-ром опухоли развиваются по ходу скелетных мышц.

Ф. КЕЛО́ИДНЫЙ (f. keloidalis) — Ф., при к-ром опухоли содержат большое количество коллагена.

Ф. ЮНОШЕСКИЙ АПОНЕВРОТИ́ЧЕСКИЙ (f. juvenilis aponeurotica) — Ф., при к-ром опухоли развиваются в юношеском возрасте из апоневрозов мышц.

ФИБРОМАТО́З АГРЕССИ́ВНЫЙ (fibromatosis aggressiva) — см. *Десмоид*.

ФИБРОМАТО́З ПАПУЛЁЗНЫЙ ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННЫЙ (fibromatosis papulosa generalisata; син. Тьера генерализованный папулезный фиброматоз) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся наличием пятен и папулобугорковых высыпаний, образующих при слиянии бляшки, напоминающие склеродерму.

ФИБРОМАТО́ЗНЫЙ У́ЗЕЛ «РОЖДА́ЮЩИЙСЯ» — лейомиофиброма, выходящая из расширенного канала шейки матки при ее сокращении.

ФИБРОМАТО́ИД [fibromatoidum; *фиброма* (основа fibromat-) + греч. -eidēs подобный] — небольшой островок здоровой кожи, свободно выступающий над рубцом, образовавшимся при колликвативном туберкулезе кожи.

ФИБРОМИКСОХОНДРОЭПИТЕЛИО́МА (fibromyxochondroepithelioma; *фибро-* + греч. myxa слизь + chondros хрящ + *эпителиома*) — см. *Опухоль смешанная.*

ФИБРОМИО́МА (fibromyoma; *фибро-* + *миома*) — см. *Лейомиофиброма.*

ФИБРОПАПИЛЛО́МА (fibropapilloma; *фибро-* + *папиллома*) — см. *Невус фиброэпителиальный.*

ФИБРОПЛАЗИ́Я РЕТРОЛЕНТА́ЛЬНАЯ (fibroplasia retrolentalis; *фибро-*+ греч. plasis образование; лат. retro сзади, за + анат. lens, lentis хрусталик; син. Терри синдром) — двустороннее поражение глаз у недоношенных детей, обусловленное высоким содержанием кислорода в воздухе (напр., в кувезе), характеризующееся образованием фиброзных пленок и тяжей в стекловидном теле, отеком и отслойкой сетчатки с последующим развитием атрофических процессов в глазном яблоке.

ФИБРОСАРКО́МА (fibrosarcoma; *фибро-* + *саркома*) — злокачественная опухоль, исходящая из волокнистой соединительной ткани.

Ф. КО́ЖИ БУГРИ́СТАЯ (f. cutis tuberosum) — см. *Дерматофибросаркома выбухающая.*

Ф. ПЕРИНЕВРА́ЛЬНАЯ (f. perineurale) — см. *Саркома нейрогенная.*

ФИБРОСКО́П (*фибро-* + греч. skopeō наблюдать, исследовать) — см. *Эндоскоп волоконный.*

ФИБРОСПЛЕНО́МА (fibrosplenoma; *фибро-* + *спленома*) — см. *Спленома.*

ФИБРОТО́РАКС (fibrothorax; *фибро-* + греч. thōrax грудь, грудная клетка) — зарастание плевральной полости волокнистой соединительной тканью; сопровождается смещением органов средостения в сторону поражения.

ФИБРОЦИ́Т (fibrocytus, LNH; *фибро-* + гист. cytus клетка) — высокодифференцированная, не способная к делению клетка соединительной ткани, образовавшаяся из фибробласта.

ФИБРОЭЛАСТО́З СУБЭНДОКАРДИА́ЛЬНЫЙ (fibroelastosis subendocardialis; *фибро-* + *эластоз*) — 1) (син.: кардиосклероз врожденный, миоэндокардит фиброэластический, склероз эндокарда врожденный, фиброэластоз эндокардиальный, эндомиокардиосклероз семейный) — врожденная болезнь сердца, характеризующаяся значительным утолщением эндокарда вследствие разрастания волокнистой соединительной ткани и эластических волокон, нередко в сочетании с патологическими изменениями миокарда и клапанов сердца; 2) (син. Ф. субэндокардиальный приобретенный)—осложнение коллагенозов, при к-ром возникают такие же патологические изменения в эндокарде, как при Ф. с.[1].

ФИБРОЭЛАСТО́З СУБЭНДОКАРДИА́ЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТЁННЫЙ (fibroelastosis subendocardialis acquisita) — см. *Фиброэластоз субэндокардиальный*[2].

ФИБРОЭЛАСТО́З ЭНДОКАРДИА́ЛЬНЫЙ (fibroelastosis endocardialis) — см. *Фиброэластоз субэндокардиальный*[1].

ФИБРОЭНДОСКО́П (*фибро-* + *эндоскоп*) — см. *Эндоскоп волоконный.*

ФИБРОЭПИТЕЛИО́МА СЛИ́ЗИСТАЯ ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (fibroepithelioma mucosum benignum; *фибро-* + *эпителиома*) — см. *Бреннера опухоль.*

ФИ́ВОЛДА МЕ́ТОД (H. L. Fevold, род. в 1902 г., амер. биохимик) — способ обнаружения лютеинизирующего гормона путем оценки изменения веса яичников у инфантильных крыс после введения им исследуемого материала.

ФИГУ́РА БА́БОЧКИ — рентгеновская тень позвонка, состоящая из двух клиновидных половин, сходящихся вершинами по средней линии; рентгенологический признак врожденной расщелины позвонка, расположенной в сагиттальной плоскости.

ФИГУ́РА ЗВЕЗДЫ́ — 1) обнаруживаемое при офтальмоскопии изменение глазного дна в области желтого пятна сетчатки, напоминающее многолучевую звезду; наблюдается при нек-рых формах ретинита; 2) см. *Хрусталиковая звезда.*

ФИГУ́РА МО́ЛНИИ — см. *Знак молнии.*

ФИГУ́РА ОМЕ́ГИ — контур складок кожи верхней части лица, напоминающий греческую букву Ω (омега); наблюдается при депрессии и обусловлен сокращением мышц, сдвигающих брови, с образованием продольной складки кожи, над которой расположены поперечные складки.

ФИГУ́РА ПОЛУМЕ́СЯЦА — обращенная вогнутостью кнутри полулунная тень на прямой рентгенограмме тазобедренного сустава, расположенная в области проекции краев вертлужной впадины; служит ориентиром при оценке синтопии элементов тазобедренного сустава.

ФИГУ́РА СЛЕЗЫ́ — см. *Келера запятая.*

ФИГУ́РНОВА ОПЕРА́ЦИЯ (К. М. Фигурнов, 1887—1961, сов. акушер-гинеколог) — хирургическая операция: подшивание боковых отделов задней стенки и дна мочевого пузыря к сухожильной дуге тазовой фасции; применяется при недержании мочи у женщин.

ФИ́ДЛЕРА МИОКАРДИ́Т (C. L. Fiedler, 1835—1921, нем. врач) — см. *Миокардит идиопатический.*

ФИЕ́СКИ ОПЕРА́ЦИЯ (D. Fieschi, совр. итал. хирург) — хирургическая операция: двусторонняя перевязка внутренних грудных артерий; предложена при хронической коронарной недостаточности с целью усиления коллатерального кровоснабжения сердца.

ФИЗА́ЛИЯ — см. *Португальский кораблик.*

ФИЗИАТРИ́Я (physiatria; греч. physis природа, природные свойства + iatreia лечение) — см. *Физиотерапия.*

ФИЗИКА́ТЫ (истор.; греч. physikē изучение природы) — органы управления городским здравоохранением в Петербурге и Москве, существовавшие с 1737 по 1797 г.

ФИЗИО- (греч. physis природа, природные свойства) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к природе, к природным свойствам, к физическим факторам».

ФИЗИОГНО́МИКА (греч. physiognōmonika) — изучение выражения лица и общего физического облика; в медицине используется для диагностики болезней.

ФИЗИОКИНЕЗОТЕРАПИ́Я (physiokinesitherapia; *физио-* + греч. kinēsis движение + *терапия*) — комплекс лечебных мероприятий, включающий активную и пассивную гимнастику, использование физических факторов, массаж и психотерапию с целью восстановления функций при повреждениях опорно-двигательного аппарата; в отечественной литературе термин используется редко.

ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ О́ПТИКА — раздел физиологии и оптики, изучающий закономерности восприятия света органом зрения и зрительным анализатором человека.

ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ СИСТЕ́МА СОЕДИНИ́ТЕЛЬНОЙ ТКА́НИ (истор.) — система клеток и межклеточного вещества соединительной ткани, участвующая в процессах промежуточного обмена и защитно-приспособительных реакциях организма; термин предложен А. А. Богомольцем.

ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ СТО́ИМОСТЬ РАБО́ТЫ — объем затрат функциональных ресурсов организма, необходимых для выполнения данного вида работы; проявляется в функциональном напряжении организма при труде (рабочем напряжении).

ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЕ РАСТВО́РЫ — общее название изотонических водных растворов, близких к сыворотке крови не только по осмотическому давлению, но и активной реакции среды и буферным свойствам; по составу солей используются в качестве лекарственных средств, в лабораторной практике и физиологических экспериментах.

ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ИДЕАЛИ́ЗМ (истор.) — субъективно-идеалистическое учение, согласно которому ощущения рассматривались не как образ объективного мира, а лишь как его символы, всецело зависящие от нейрофизиологических особенностей, состояния и организации органов чувств; Ф. и. был распространен среди врачей и биологов середины 19 века.

ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ МИ́НИМУМ БЕЛКА́ — см. *Азотистый минимум.*

ФИЗИОЛО́ГИЯ (*физио-* + греч. logos учение, наука) — медико-биологическая наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей — систем, органов, тканей, клеток — выявляющая причины, механизмы и закономерности жизнедеятельности организма и взаимодействия его с окружающей средой.

Ф. АВИАЦИО́ННАЯ — раздел Ф. и авиационной медицины, изучающий реакции организма человека на воздействие факторов атмосферного полета (гипоксии, перепадов атмосферного давления, вибраций и др.) с целью разработки методов и средств защиты летного состава от их неблагоприятного воздействия.

Ф. ВОЕ́ННОГО ТРУДА́ — раздел Ф. и военной медицины, изучающий закономерности регуляции функций организма в условиях учебно-боевой и боевой обстановки.

Ф. ВОЗРАСТНА́Я — раздел Ф., изучающий возрастные особенности жизнедеятельности, закономерности формирования и угасания функций организма.

Ф. КОСМИ́ЧЕСКАЯ — раздел Ф. и космической медицины, изучающий реакции организма человека на воздействие факторов космического полета (невесомость, гиподинамия и др.) с целью разработки методов и средств защиты человека от их неблагоприятного воздействия.

Ф. СРАВНИ́ТЕЛЬНАЯ — раздел эволюционной Ф., изучающий сходство и различие каких-либо функций у разных представителей животного мира с целью выявления причин и общих закономерностей изменения функций или появления новых.

Ф. ТРУДА́ — раздел Ф., изучающий изменения функционального состояния организма человека под влиянием его трудовой деятельности, обосновывающий методы и средства организации труда, способствующие длительному поддержанию работоспособности человека на высоком уровне.

Ф. ЭВОЛЮЦИО́ННАЯ — раздел Ф., изучающий общие закономерности и особенности формирования и совершенствования функций организма в процессе эволюционного приспособления к среде.

Ф. ЭКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — раздел Ф., изучающий особенности жизнедеятельности организма в зависимости от климато-географических условий и конкретной среды обитания.

ФИЗИОЛО́ГИЯ ПАТОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (син. патофизиология) — медицинская наука, изучающая общие закономерности возникновения, развития, течения и исхода болезней и патологических процессов.

ФИЗИОЛО́ГИЯ РАЗВИ́ТИЯ (устар.) — см. *Эмбриология экспериментальная.*

ФИЗИОПАТИ́И (physiopathiae; *физио-* + греч. pathos страдание, болезнь) — параличи и контрактуры, возникающие в военное время после легких ранений нервов и суставов; локализуются в областях, анатомически не связанных с пострадавшим нервом или суставом, чаще в дистальных отделах конечностей; основную роль в возникновении Ф. играют психогенные факторы.

ФИЗИОПРОФИЛА́КТИКА (*физио-* + *профилактика*) — профилактика заболеваний человека, основанная на использовании укрепляющего и тренирующего воздействия естественными и искусственно создаваемыми физическими факторами.

ФИЗИОТЕРАПЕ́ВТ — врач-специалист, получивший подготовку в области применения естественных и искусственно создаваемых физических факторов для лечения, профилактики и медицинской реабилитации.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКАЯ ПО́МОЩЬ — вид специализированной медицинской помощи, оказываемой населению врачами-специалистами физиотерапевтами лечебно-профилактических учреждений (или под их руководством) и основанной на использовании природных и искусственно создаваемых физических факторов.

ФИЗИОТЕРА́ПИЯ (*физио-* + *терапия*; син.: терапия физикальная, терапия физическая, физиатрия) — область клинической медицины, изучающая лечебные свойства природных и искусственно создаваемых физических факторов и разрабатывающая способы их применения (без разрушения тканей) для лечения и профилактики болезней, а также для медицинской реабилитации; нек-рые физические факторы (ионизирующие излучения, значительно повышенное давление воздуха и др.) изучаются не Ф., а другими областями медицины.

ФИЗИ́ЧЕСКАЯ КУЛЬТУ́РА (син. физкультура) — часть общей культуры общества, включающая систему физического воспитания, а также совокупность научных знаний и материальных средств, необходимых для его осуществления.

ФИЗКУЛЬТУ́РА — см. *Физическая культура.*

ФИЗКУЛЬТУ́РА ЛЕЧЕ́БНАЯ — 1) метод лечения, профилактики и медицинской реабилитации, основанный на использовании физических упражнений и других средств физической культуры; 2) раздел клинической медицины, изучающий механизмы терапевтического действия физических упражнений, а также других средств физической культуры и разрабатывающий методы их применения с лечебно-профилактической и реабилитационной целью.

ФИЗИ́ЧЕСКАЯ НАГРУ́ЗКА — степень интенсивности и продолжительность мышечной работы; определяется величиной энергетических затрат организма, развиваемой мощности или произведенной работы.

Ф. Н. ЛОКА́ЛЬНАЯ — Ф. н., характеризующая работу, в к-рую вовлечено менее $^1/_3$ мышечной массы тела человека.

Ф. Н. О́БЩАЯ — Ф. н., характеризующая работу, в к-рую вовлечено более $^2/_3$ мышечной массы тела человека.

Ф. Н. РЕГИОНА́ЛЬНАЯ — Ф. н., характеризующая работу, в к-рую вовлечено от $^1/_3$ до $^2/_3$ мышечной массы тела человека.

ФИЗИ́ЧЕСКАЯ ПОДГОТО́ВКА — использование физических упражнений в целях содействия овладению каким-либо специальным видом деятельности (Ф. п. летчика, спортсмена и т. д.).

ФИЗИ́ЧЕСКАЯ ПОДГОТО́ВКА ВОЙСК — составная часть боевой подготовки Вооруженных Сил СССР, основанная на использовании физических упражнений, предусматривающая всестороннее развитие и совершенствование психофизических качеств военнослужащих для подготовки их к несению военной службы и боевой деятельности; проводится при участии и под контролем военно-медицинской службы.

ФИЗИ́ЧЕСКАЯ ПОДГОТО́ВЛЕННОСТЬ — уровень развития физических качеств, навыков и умений, необходимых для успешного выполнения данного вида деятельности; отражает результат физической подготовки.

ФИЗИ́ЧЕСКИЕ ПРИ́ЗНАКИ ВЫРОЖДЕ́НИЯ (устар.) — см. *Стигмы дегенеративные физические.*

ФИЗИ́ЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕ́НТ РЕНТГЕ́НА (устар.; ФЭР) — единица поглощенной дозы ионизирующего излучения, соответствующая энергии рентгеновского или гамма-излучения, поглощаемой мягкими тканями при экспозиционной дозе 1 *р*; 1 ФЭР для мышечной ткани равен 93 *эрг/г* ($0{,}93 \cdot 10^{-2}$ Гр).

ФИЗИ́ЧЕСКОЕ ВОСПИТА́НИЕ — часть общего воспитания (в социалистических странах — коммунистического воспитания), представляющая собой организованный педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья и всестороннее развитие физических способностей, выработку важных для жизненной практики двигательных навыков человека.

ФИЗИ́ЧЕСКОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕ́НИЕ — нарушение здоровья, чаще по типу острой сердечной или сосудистой недостаточности, вызванное выполнением чрезмерной физической нагрузки, не соответствующей функциональным возможностям организма.

ФИЗИ́ЧЕСКОЕ РАЗВИ́ТИЕ — 1) процесс изменения морфологических и функциональных свойств организма в процессе его индивидуального развития; 2) совокупность морфологических и функциональных свойств организма, определяющих запас его физических сил, выносливость и дееспособность; оценивается методом антропометрии, обобщенные данные к-рой служат одним из показателей состояния здоровья населения.

ФИ́КА МЕ́ТОД (A. Fick, 1829—1901, нем. врач) — метод измерения минутного объема сердца, основанный на определении разницы в содержании кислорода или двуокиси углерода в крови, взятой из правых отделов сердца, и в артериальной крови, а также одновременном определении потребления кислорода или выделения двуокиси углерода.

ФИ́КА ФО́РМУЛА (A. Fick) — формула для расчета минутного объема сердца (в *л*), согласно к-рой он равен отношению (умноженному на 100) количества потребленного кислорода или выделенной двуокиси углерода (в *л/мин*) к соответствующему значению разности процентного содержания кислорода или двуокиси углерода в артериальной и венозной крови.

ФИКОМИЦЕ́ТЫ (Phycomycetes) — класс низших грибов, характеризующихся неклеточным мицелием; включает патогенные для человека виды сем. мукоровых.

ФИКСА́ТОР в биологии — жидкость, применяемая для предупреждения посмертных изменений в тканях и сохранения тканевой и клеточной структуры; различные Ф. применяются, напр., при изготовлении анатомических или гистологических препаратов.

ФИКСА́ЦИЯ (лат. figo, fixum укреплять, закреплять, устанавливать) в биологии — воздействие на живые клетки и ткани с целью предотвращения посмертных изменений их структуры, напр. при изготовлении анатомических, гистологических и микробиологических препаратов.

ФИЛ- (фило-; греч. phylon род, племя) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к роду, виду, классу».

ФИЛА́ГРИУСА ОПЕРА́ЦИЯ (Philagrius, греч. врач 4 в.) — хирургическая операция: иссечение аневризматического мешка вместе с участком поврежденной артерии и перевязка приводящих и отводящих сосудов и коллатералей.

ФИЛАМЕНТА́ЦИЯ (filamentatio; лат. filamentum нить) — образование нитей псевдомицелия у дрожжеподобных грибов в результате удлинения клеток и расположения их в виде цепочек, что осложняет их идентификацию.

ФИЛА́ТОВА БОЛЕ́ЗНЬ (Н. Ф. Филатов, 1847—1902, отеч. педиатр) — см. *Мононуклеоз инфекционный.*

ФИЛА́ТОВА МЕ́ТОД (Н. Ф. Филатов, 1847—1902, отеч. педиатр) — метод

выявления увеличенных паратрахеальных лимфатических узлов при первичном туберкулезе легких путем тихой перкуссии справа и слева от рукоятки грудины.

ФИЛА́ТОВА МЕ́ТОД КЕРАТОПЛА́СТИКИ (В. П. Филатов, 1875—1956, сов. офтальмолог) — частичная сквозная кератопластика, производимая при помощи трепана Филатова — Марцинковского с использованием трансплантата из роговицы трупа, консервированной охлаждением.

ФИЛА́ТОВА ПЯ́ТНА (Н. Ф. Филатов, 1847—1902, отеч. педиатр) — см. *Бельского — Филатова — Коплика пятна.*

ФИЛА́ТОВА СТЕ́БЕЛЬ (В. П. Филатов, 1875—1956, сов. офтальмолог; син.: круглый стебель, лоскут круглый, лоскут стебельчатый, трубчатый стебель) — аутотрансплантат, представляющий собой кожную ленту с подкожной клетчаткой, сшитую на период перемещения в форме трубки, оба конца к-рой соединены с кожей.

Ф. С. МИГРИРУЮЩИЙ (син. лоскут мигрирующий)—Ф. с., сформированный вдали от места трансплантации и подведенный к нему путем нескольких последовательных трансплантаций с подшиванием то одного, то другого конца.

Ф. С. О́СТРЫЙ — Ф. с., у к-рого ширина кожно-жировой ленты вдвое меньше ее длины.

ФИЛА́ТОВА ТКАНЕВА́Я ТЕРАПИ́Я (В. П. Филатов, 1875—1956, сов. офтальмолог) — см. *Терапия тканевая.*

ФИЛА́ТОВА ТРЕПА́Н (В. П. Филатов, 1875—1956, сов. офтальмолог) — см. *Филатова — Марцинковского трепан.*

ФИЛА́ТОВА ТРЕУГО́ЛЬНИК (Н. Ф. Филатов, 1847—1902, отеч. педиатр) — свободный от сыпи треугольный участок кожи в области носа, губ и подбородка, своей бледностью выделяющийся на фоне ярко-розовых или красных щек; симптом скарлатины.

ФИЛА́ТОВА — ДЬЮ́КСА БОЛЕ́ЗНЬ (Н. Ф. Филатов, 1847—1902, отеч. педиатр; C. Dukes, 1845—1925, англ. дерматолог) — см. *Краснуха скарлатинозная.*

ФИЛА́ТОВА — КА́ЛЬФЫ ДИАДЕ́МА (В. П. Филатов, 1875—1956, сов. офтальмолог; С. Ф. Кальфа, род. в 1892 г., сов. офтальмолог) — приспособление, накладываемое на лицо больного с целью иммобилизации века во время операций на глазном яблоке, особенно при кератопластике.

ФИЛА́ТОВА — КА́ЛЬФЫ ЭЛАСТОТОНО́МЕТР (В. П. Филатов, 1875—1956, сов. офтальмолог; С. Ф. Кальфа, род. в 1892 г., сов. офтальмолог; син. эластотонометр) — набор из 4 тонометров весом 5; 7,5; 10 и 15 *г*, предназначенный для исследования внутриглазного давления методом эластотонометрии.

ФИЛА́ТОВА — КА́ЛЬФЫ ЭЛАСТОТОНОМЕТРИ́Я (В. П. Филатов, 1875—1956, сов. офтальмолог; С. Ф. Кальфа, род. в 1892 г., сов. офтальмолог; син. эластотонометрия) — метод ранней диагностики глаукомы, основанный на определении характера деформации оболочек глаза при последовательном воздействии на глазное яблоко тонометров возрастающего веса (5; 7,5; 10 и 15 *г*).

ФИЛА́ТОВА — КО́ПЛИКА ПЯ́ТНА (Н. Ф. Филатов, 1847—1902, отеч. педиатр; H. Koplik, 1858—1927, амер. педиатр) — см. *Бельского — Филатова — Коплика пятна.*

ФИЛА́ТОВА — МАРЦИНКО́ВСКОГО НАБО́Р (В. П. Филатов, 1875—1956, сов. офтальмолог; А. П. Марцинковский) — набор инструментов для частичной сквозной и послойной кератопластики; состоит из четырех трепанов Филатова — Марцинковского, специального копьевидного ножа, двух круглых ножей, крючка, роговичного пинцета и других инструментов.

ФИЛА́ТОВА — МАРЦИНКО́ВСКОГО ТРЕПА́Н (В. П. Филатов; А. П. Марцинковский; син. Филатова трепан) — общее название четырех трепанов, предназначенных для образования в роговице глаза цилиндрического отверстия (диам. 4,05—5 *мм*) и для подготовки соответствующего трансплантата при частичной сквозной или послойной кератопластике.

ФИЛИМО́НОВА СИНДРО́М (И. Н. Филимонов, отеч. невропатолог) — сочетание вялой тетраплегии с центральным параличом мышц, иннервируемых тройничным, лицевым, языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, при полной сохранности сознания и функции глазодвигательного, блокового, отводящего и добавочного нервов; наблюдается при двустороннем поражении основания моста мозга в его средней трети.

ФИЛИПО́ВИЧА СИМПТО́М (K. Filipowicz, совр. польский врач) — желтушное окрашивание ладоней и подошв при длительной лихорадке; чаще отмечается у больных брюшным тифом.

ФИЛИ́ППСОНА РЕ́ФЛЕКС (M. Philippson) — см. *Рефлекс разгибательный перекрестный.*

ФИЛИФО́РМНЫЙ (filiformis; лат. filum нить + -formis подобный, похожий) — имеющий форму нити.

ФИЛЛИПСА РЕА́КЦИЯ (R. A. Phillips, род. в 1906 г., амер. врач) — метод определения количества белка в сыворотке крови или плазме по ее удельному весу.

ФИЛЛОХИНО́НЫ (phyllochinona; син. витамин К) — жирорастворимые витамины, участвующие в синтезе протромбина; содержатся в шпинате, капусте, томатах, печени; при недостаточности Ф. развиваются гипопротромбинемия, геморрагический синдром.

ФИЛО- — см. *Фил-.*

ФИЛОГЕНЕ́З (*фило-* + *генез*; син. филогения) — процесс исторического развития той или иной таксономической группы организмов.

ФИЛОГЕНЕ́ТИКА (*фило-* + *генетика*) — раздел биологии, изучающий закономерности филогенеза.

ФИЛОГЕНИ́Я (*фило-* + греч. genea рождение, происхождение) — см. *Филогенез.*

ФИЛОГИСТОГЕНЕ́З (*фило-* + *гистогенез*) — 1) сравнительно-анатомический метод изучения развития отдельных тканей в филогенезе; 2) развитие отдельной ткани в филогенезе.

ФИЛОДЕ́З (filodesis; лат. filum нить, ткань + греч. desis связывание, скрепление) — хирургическая операция: ограничение подвижности сустава с использованием пучка нитей или полоски ткани, в т. ч. из искусственных полимерных материалов.

ФИЛОКЛЕЙЗИ́Я (philocleisia; греч. phileō любить, иметь склонность + kleisis закрытие, запирание) — см. *Клаустрофилия.*

ФИЛОСО́ФОВА СИМПТО́М ЧА́ШИ (П. И. Философов, 1879—1935, сов. терапевт) — расширение перкуторных границ верхнего отдела переднего средостения; признак хронического медиастинита.

ФИЛЬТР[1] (франц. filtre, от позднелат. filtrum войлок) — прибор, приспособление или пористое тело для отделения жидкости или газа от взвешенных в них частиц.

Ф. АПТЕ́ЧНЫЙ ПОЛЕВО́Й — Ф. для ускоренной очистки растворов лекарственных средств, применяемый при их приготовлении в полевых условиях.

Ф. АЭРОЗО́ЛЬНЫЙ — Ф. для улавливания аэрозолей при очистке воздуха или каких-либо газов, напр. выбрасываемых в атмосферу.

Ф. БАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ — мелкопористый Ф., предназначенный для отделения от жидкой среды бактерий и других микроорганизмов, видимых при световой микроскопии.

Ф. БАКТЕРИЦИ́ДНЫЙ — Ф., изготовленный из материалов, в состав которых входят вещества, обладающие бактерицидным действием на задержанные фильтром микроорганизмы.

ФИЛЬТР БЕ́РКЕФЕЛЬДА — см. *Беркефельда фильтр.*

Ф. БИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ — см. *Биофильтр.*

Ф. ВОЗДУ́ШНЫЙ — Ф. для очистки от пыли наружного или рециркулирующего воздуха, подаваемого в помещения системами приточной вентиляции или кондиционирования воздуха.

Ф. МЕМБРА́ННЫЙ — Ф. для улавливания микроскопических частиц, в т. ч. микробных клеток из жидкостей и воздуха (газов), изготовленный из микропористой нитроцеллюлозной пленки.

ФИЛЬТР ПЕТРЯ́НОВА — см. *Петрянова фильтр.*

Ф. ТКАНЕУ́ГОЛЬНЫЙ — Ф. для очистки воды в полевых условиях, содержащий слои ткани и активированного угля.

Ф. УНИВЕРСА́ЛЬНЫЙ НОСИ́МЫЙ — переносный Ф. для очистки питьевой воды от радиоактивных и отравляющих веществ, микробов, токсинов и ядов путем фильтрации под давлением, создаваемым ручным насосом.

ФИЛЬТР[2] — устройство, разделяющее или выделяющее излучения, частицы или электрические токи, обладающие определенными характеристиками.

Ф. ВЫРА́ВНИВАЮЩИЙ — см. *Фильтр компенсаторный.*

Ф. КЛИНОВИ́ДНЫЙ в радиологии — Ф., ослабляющий одну часть пучка излучения больше, чем другую, обеспечивая заданную деформацию дозного поля, создаваемого в облучаемом теле.

Ф. КОМПЕНСАТО́РНЫЙ (син.: Ф. выравнивающий, Ф. компенсационный) в радиологии — Ф., используемый для достижения равномерного распределения дозы излуче-

ния путем неодинакового ослабления разных частей пучка.

Ф. КОМПЕНСАЦИО́ННЫЙ — см. *Фильтр компенсаторный.*

Ф. РЕНТГЕ́НОВСКИЙ — Ф., применяемый в рентгеновских установках для уменьшения степени неоднородности их излучения, напр. для отделения рассеянного излучения.

ФИЛЬТР-ПОГЛОТИ́ТЕЛЬ — устройство для очистки воздуха от вредных аэрозолей, паров и газов, используемое в фильтровентиляционных системах.

ФИЛЬТРАЦИО́ННАЯ ФРА́КЦИЯ почечного кровотока (FF) — показатель состояния клубочковой фильтрации, представляющий собой отношение (в процентах) клиренса нек-рого вещества, выделяемого в результате фильтрации в клубочках, к клиренсу того же вещества, выделяемого в результате секреции в почечных канальцах.

ФИЛЬТРА́ЦИЯ ВОДЫ́ (лат. filtratio процеживание) — 1) естественное отделение от воды взвешенных в ней частиц при прохождении сквозь пористую среду; 2) технологический прием освобождения воды от взвешенных частиц при ее очистке, заключающийся в пропускании воды через фильтры.

ФИЛЬТРА́ЦИЯ ГЛОМЕРУЛЯ́РНАЯ — см. *Фильтрация клубочковая.*

ФИЛЬТРА́ЦИЯ ИЗЛУЧЕ́НИЯ — уменьшение степени неоднородности пучка излучения или выделение определенной компоненты смешанного излучения, осуществляемое с помощью фильтров.

ФИЛЬТРА́ЦИЯ КЛУБО́ЧКОВАЯ (син. фильтрация гломерулярная) — совокупность процессов перехода веществ, содержащихся в крови, через стенку капилляра клубочка почки в полость его капсулы, что приводит к образованию первичной мочи.

ФИЛЬТРОВА́ЛЬНАЯ СТА́НЦИЯ — предприятие в системе водоснабжения, включающее сооружения, предназначенные для улучшения качества природной воды до степени удовлетворения требований определенного ГОСТа (напр., на питьевую воду).

ФИ́ЛЬЦЫ — зуботехнические инструменты для шлифования искусственных зубов, моделей, протезов.

ФИЛЯРИА́ТОЗ (filariatosis) — общее название гельминтозов, вызываемых филяриями (вухереріоз, онхоцеркоз и др.).

ФИЛЯ́РИИ (Filariidae) — подотряд нематод отр. Spirurida, объединяющий паразитов полостей тела и тканей млекопитающих, личиночные стадии к-рых длительно циркулируют в крови и передаются кровососущими насекомыми; включает виды, являющиеся возбудителями филяриатозов человека.

ФИ́МБРИИ (лат. fimbria бахрома) — нитевидные структуры на поверхности нек-рых бактериальных клеток, отличные от половых ворсинок.

ФИМО́З (phimosis; греч. phimōsis замыкание, закрытие отверстия, сужение, от phimoō крепко стягивать, сжимать) — патологическое сужение отверстия крайней плоти, не позволяющее обнажить головку полового члена.

ФИ́НГЕРА ПСЕВДОФУРУНКУЛЁЗ (E. A. F. Finger, 1856—1939, австрийский патолог) — см. *Псевдофурункулез.*

ФИ́НДЕРЛЕ ВА́КУУМ-ЭКСТРА́КТОР (V. Finderle) — аппарат для искусственного родоразрешения путем извлечения плода за головку, представляющий собой покрытый резиной металлический колпак в форме рога, соединенный с большим шприцем, посредством к-рого под колпаком создается отрицательное давление, необходимое для присасывания его к головке плода.

ФИ́НЗЕНА РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ (нрк; Finsen) — см. *Финсена ранорасширитель.*

ФИ́НКА (устар.) — см. *Финна.*

ФИ́НКА РЕКЛИНА́ЦИЯ (T. Fink) — реклинация позвоночника путем постоянного давления на его наиболее выступающую часть с помощью ватных валиков, подкладываемых больному, длительно находящемуся в гипсовой кроватке.

ФИ́НКЕЛЬБУРГА КРЕМА́СТЕРНЫЙ РЕФЛЕ́КС — физиологический рефлекс: подтягивание яичка и легкая эрекция полового члена при штриховом раздражении подошвы стопы.

ФИНЛЯ́НДСКАЯ ЖА́БА (устар.) — см. *Симановского — Плаута — Венсана ангина.*

ФИ́ННА (нем. Finne; син. финка — устар.) — общее название личиночных форм гельминтов отр. цепней кл. цестод, паразитирующих у промежуточного хозяина и имеющих вид пузыря.

ФИННЕ́Я ОПЕРА́ЦИЯ (J. M. T. Finney, 1863—1942, амер. хирург) — хирургическая операция: образование пиелоуретероанастомоза при гидронефрозе, заключающееся в продольном рассечении почечной лоханки и прилоханочного отдела мочеточника, после чего их сшивают в поперечном направлении.

ФИННЕ́Я ПИЛОРОПЛА́СТИКА (Y. M. T. Finney) — сочетание пилоропластики с гастродуоденостомией, предложенное для лечения язвенной болезни.

ФИННО́З (*финна* + *-оз*) — паразитирование личиночных форм теннид у промежуточных хозяев — крупного рогатого скота и свиней.

ФИННО́ЗНОЕ МЯСО — мясо, зараженное финнами Taeniarinchus saginatus (бычьего цепня) или Taenia solium (свиного цепня); употребление Ф. м. в пищу без соответствующей обработки приводит к заболеванию тениидозами.

ФИНОКЬЕ́ТТО РАСШИРИ́ТЕЛЬ (E. Finochietto, 1881—1948, аргентинский хирург) — ранорасширитель для хирургических операций на органах грудной полости, отличающийся тем, что перемещение одной из рабочих частей инструмента относительно другой происходит по стержню с зубчатой нарезкой с помощью зубчатого колеса с ручкой; применяется в тех случаях, когда расширение раны требует значительных усилий.

ФИ́НСЕНА БОЛЕ́ЗНЬ (J. C. Finsen, 1826—1885, исландский врач) — см. *Плевродиния эпидемическая.*

ФИ́НСЕНА РАНОРАСШИРИ́ТЕЛЬ (Finsen; син. Финзена ранорасширитель — нрк) — инструмент для расширения операционной раны, представляющий собой пружинную ленту, согнутую в полупетлю, имеющую на рабочих частях крючки (4 на одной ветви и 3 на другой); применяется чаще при операциях на слезном мешке.

ФИ́НСТЕРЕРА РЕЗЕ́КЦИЯ ЖЕЛУ́ДКА (H. Finsterer, 1877—1955, австрийский хирург) — модификация резекции желудка по способу Бильрот-II., при к-рой накладывают анастомоз «конец в бок» между ближайшей к большой кривизне частью культи желудка и тощей кишкой, а оставшуюся часть культи зашивают без подшивания к ней приводящей петли кишки.

ФИ́СКА — СА́ББАРОУ МЕ́ТОД (C. H. Fiske, род. в 1890 г., амер. биохимик; Y. Subbarow) — метод количественного определения неорганического фосфора, основанный на способности фосфатов образовывать с молибденовой кислотой комплексное соединение, дающее с восстановителями синее окрашивание.

ФИССУ́РА (fissura; лат. «щель, трещина») — см. *Трещина кожи.*

ФИССУРОРАФИ́Я (fissurorrhaphia; *фиссура* + греч. rhaphē шов) — хирургическая операция: сшивание краев расщелины при врожденном незаращении верхней губы и (или) неба.

ФИ́СТУЛА (fistula; лат. «трубка, свищ») — см. *Свищ.*

ФИ́СТУЛА ДЕРМО́ИДНАЯ (fistula dermoidea) — см. *Эпителиальный копчиковый ход.*

ФИ́СТУЛА ЛАБИРИ́НТА (fistula labyrinthi) — внутренний свищ барабанной полости, соединяющий ее с внутренним ухом, чаще с боковым полукружным каналом; возникает обычно как осложнение хронического гнойного эпитимпанита.

ФИ́СТУЛА ПРЕАУРИКУЛЯ́РНАЯ ВРОЖДЁННАЯ (fistula praeauricularis congenita) — аномалия развития: наличие на ушной раковине слепого канала, расположенного над козелком и впереди завитка; обусловлена неполным заращением первой жаберной щели.

ФИ́СТУЛА ПРОМЕ́ЖНОСТИ (fistula perinealis) — см. *Свищ уретроперинеальный.*

ФИ́СТУЛА СЛЁЗНОГО МЕШКА́ (fistula sacci lacrimalis) — наружный свищ слезного мешка; образуется в результате флегмоны слезного мешка или как осложнение дакриоцистэктомии.

ФИ́СТУЛА УРЕТРОПЕРИНЕА́ЛЬНАЯ (fistula urethroperinealis; анат urethra мочеиспускательный канал + perineum промежность) — см. *Свищ уретроперинеальный.*

ФИСТУЛОГРАФИ́Я (*фистула* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография свища после его заполнения контрастным веществом.

ФИСТУЛОПЛЕВРОГРАФИ́Я (*фистула* + *плевра* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография плевральной полости после введения в нее контрастного вещества через плевральный свищ.

ФИСТУЛОХОЛАНГИОГРАФИ́Я (*фистулография* + греч. cholē желчь + angeion сосуд) — фистулография свищевых ходов желчных протоков.

ФИСТУЛОХОЛЕЦИСТОХОЛАНГИОГРАФИ́Я (*фистулография* + греч. cholē желчь + kystis пузырь + angeion сосуд) — фистулография свищевых ходов желчного пузыря и желчных протоков.

ФИТО- (греч. phyton растение, побег) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к растению».

ФИТОБЕЗОА́Р (*фито-* + *безоар*) — безоар, состоящий в основном из неперевареных растительных волокон.

ФИТОГЕМАГГЛЮТИНИ́НЫ (*фито-* + *гемагглютинины*; син. гемагглютинины растительные) — гликопротеиды растительного происхождения, способные вызывать агглютинацию эритроцитов и других клеток крови.

ФИТОНЦИ́ДЫ (греч. phyton растение + лат. caedo убивать) — биологически активные вещества, выделяемые растениями (преимущественно высшими), способные убивать бактерии и паразитические грибки или подавлять их рост и развитие.

ФИТОСТЕРИ́НЫ (*фито-* + *стерины*) — стерины растительного происхождения; нек-рые Ф. применяются как лекарственные средства или как исходные продукты синтеза стероидных гормонов.

ФИТОТЕРАПИ́Я (phytotherapia; *фито-* + *терапия*) — лечение, основанное на применении лекарственных растений.

ФИТОТОКСИКОЛО́ГИЯ (*фито-* + *токсикология*) — раздел токсикологии, изучающий токсины, содержащиеся в растениях, в т. ч. в лекарственных.

ФИЦИ́Н — растительный фермент класса гидролаз (КФ 3.4.22.3), катализирующий гидролиз пептидов, амидов и сложных эфиров; извлекается из сока инжира и используется для ферментации мяса.

ФИ́ШЕРА МЕ́ТОД[1] (B. Fischer-Wasels, 1877—1941, нем. патолог) — 1) метод вскрытия трупа, при к-ром с целью сохранения целости кожи передней поверхности шеи секционный разрез проводят сбоку от сосцевидных отростков наискось до рукоятки грудины; 2) метод вскрытия головного мозга, заключающийся в его рассечении параллельными разрезами во фронтальной плоскости.

ФИ́ШЕРА МЕ́ТОД[2] (A. H. W. Fischer, род. в 1901 г., нем. врач) — метод контрастирования толстой кишки при рентгенологическом исследовании, заключающийся в одновременном ее заполнении взвесью бария и воздухом, вводимыми через задний проход с помощью зонда.

ФИ́ШЕРА СИМПТО́М (Th. Fischer, 1863—1949, англ. врач) — 1) систолический шум или свистящие хрипы, выслушиваемые над грудиной при максимальном запрокидывании больным головы; признак увеличения внутригрудных лимфатических узлов и сдавления ими крупных сосудов и воздухоносных путей; 2) пресистолический шум, изредка выслушиваемый при спаечном перикардите вследствие сдавления сердца в области предсердно-желудочкового фиброзного кольца.

ФИ́ШЕРА СИНДРО́М (H. Fischer, 1884—1943, нем. дерматолог; син. Бушке — Фишера синдром) — наследственная болезнь, проявляющаяся в раннем детском возрасте сочетанием кератодермии, ладонно-подошвенного гипергидроза, онихогрифоза, переходящего в онихолизис, скудного роста волос и утолщения дистальных фаланг пальцев кистей и стоп; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

ФИ́ШЕРА СТЕРЕОСКОПИ́ЧЕСКИЕ КАРТИ́НКИ (E. M. Фишер, сов. офтальмолог) — набор цветных стереопар, используемый при лечении нарушений бинокулярного зрения.

ФИ́ШЕРА — БРЮ́ГГЕ СИНДРО́М (H. Fischer, 1884—1943, нем. дерматолог; Brügge; син. синдром периоральный) — стойкое покраснение кожи вокруг рта; проявление ангиотрофоневроза.

ФИ́ШЕРА — Э́ВАНСА СИНДРО́М (J. A. Fisher; R. S. Evans, совр. амер. врач) — см. *Эванса синдром*.

ФИ́ШЕР-ВА́ЗЕЛЬСА РЕГЕНЕРАЦИО́ННО-МУТАЦИО́ННАЯ ТЕО́РИЯ (истор.; B. Fischer-Wasels, 1877—1941, нем. патолог) — теория, объяснявшая происхождение опухолей мутациями, возникающими в зонах регенерации клеток (опухолевых зачатках).

ФИ́ШКИНА КО́СТНЫЙ ШОВ (В. И. Фишкин, сов. хирург-ортопед) — метод фиксации костных фрагментов при высокой остеотомии бедра с помощью металлического погружного фиксатора с анкерным устройством.

ФИ́ШМАНА РАЗРЕ́З (Л. Г. Фишман, род. в 1898 г., сов. хирург) — хирургическая операция: вскрытие сухожильного панариция продольным разрезом по переднебоковым поверхностям проксимальной фаланги и дополнительным разрезом на ладони.

ФЛАВИ́Н (лат. flavus желтый) — гетероциклическое соединение желтого цвета с желто-зеленой флуоресценцией; входит в состав рибофлавина (витамина B_2) и некоторых коферментов оксидоредуктаз.

ФЛАВИНАДЕНИНДИНУКЛЕОТИ́Д (ФАД) — кофермент многих оксидоредуктаз, представляющий собой производное рибофлавина (витамина B_2), содержащее два остатка фосфорной кислоты.

ФЛАВИНМОНОНУКЛЕОТИ́Д — кофермент многих оксидоредуктаз, представляющий собой производное рибофлавина (витамина B_2), содержащее остаток фосфорной кислоты.

ФЛАВОВИ́РУСЫ (Flavivirus; син. арбовирусы группы Б) — род вирусов сем. тогавирусов, содержащих одноцепочечную рибонуклеиновую кислоту и имеющих нуклеокапсид сферической формы, покрытый оболочкой; относится к арбовирусам; нек-рые виды Ф. патогенны для человека.

ФЛАВОПРОТЕ́ИДЫ (син. ферменты желтые — устар.) — ферменты нек-рых окислительно-восстановительных реакций в организме, представляющие собой сложные белки, простетическая группа к-рых представлена флавинаденинди-нуклеотидом или флавинмононуклеотидом.

ФЛАГЕЛЛЯ́ЦИЯ (лат. flagello, flagellatum бичевать) — половое извращение, характеризующееся возникновением полового возбуждения при избиении партнера или при избиении партнером; разновидность мазохизма или садизма.

ФЛАМБИ́РОВАНИЕ (франц. flamber опаливать, прокаливать) — обработка поверхности пламенем; применяется для стерилизации различных предметов, а также для фиксирования гистологических и микробиологических препаратов.

ФЛАТА́У ПОЛОВА́Я СТЕРИЛИЗА́ЦИЯ (Flatau) — хирургическая операция: отделение маточной трубы от брыжейки и завязывание ее узлом с целью исключения возможности зачатия.

ФЛАТА́У РЕФЛЕ́КС (E. Flatau, 1869—1932, польский невропатолог) — см. *Рефлекс носоподбородочный*.

ФЛАТА́У СИМПТО́М (E. Flatau) — расширение зрачков при интенсивном пассивном сгибании головы; признак менингита.

ФЛАТА́У ФОНАСТЕНИ́Я (E. Flatau) — тихая немодулированная речь, угасающая до афонии; признак выраженной депрессии.

ФЛАТА́У ЭРЕКЦИО́ННЫЙ РЕФЛЕ́КС (E. Flatau) — патологический рефлекс: эрекция полового члена при энергичном пассивном сгибании туловища; наблюдается при туберкулезном менингите.

ФЛАЯ́НИ БОЛЕ́ЗНЬ (истор.; G. Flajani, 1741—1808, итал. анатом и хирург) — см. *Зоб диффузный токсический*.

ФЛЕБ- (флебо-; греч. phleps, phlebos вена) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к венам».

ФЛЕБИ́Т (phlebitis; *флеб-* + *-ит*) — воспаление вены.

Ф. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ БЛУЖДА́ЮЩИЙ (p. allergica migrans) — хронический Ф., возникающий как аллергическая реакция, протекающий обычно доброкачественно и последовательно поражающий различные, преимущественно поверхностные вены.

Ф. БЕ́ЛЫЙ БОЛЕВО́Й (p. alba dolens; син. phlegmasia alba dolens) — острый тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, характеризующийся молочно-белой окраской кожи, местным отеком и умеренными болями по ходу вен; встречается чаще в послеродовом периоде.

Ф. МИГРИ́РУЮЩИЙ (p. migrans) — см. *Тромбофлебит мигрирующий*.

Ф. ЦЕРЕБРА́ЛЬНЫЙ (p. cerebralis) — Ф. головного мозга, чаще обусловленный бактериальной эмболией, проявляющийся головными болями, гипертензивным синдромом и, нередко, очаговыми неврологическими симптомами.

ФЛЕБИ́Т СИ́НИЙ БОЛЕВО́Й (p. coerulea dolens; син. phlegmasia coerulea dolens) — острый тромбоз бедренных и подвздошной вен с выраженным нарушением гемодинамики в конечности; характеризуется внезапной резкой болью в конечности, массивным ее отеком, цианозом и отсутствием пульсации артерий.

ФЛЕБО- — см. *Флеб-*.

ФЛЕБОГРА́ММА (*флебо-* + греч. gramma запись, изображение) — рентгенограмма вены (нескольких вен) после введения в кровь контрастного вещества.

ФЛЕБОГРАФИ́Я[1] (*флебо-* + греч. graphō писать, изображать; син. венография) — рентгенография вен после введения в кровь контрастного вещества.

Ф. МА́ТОЧНАЯ — Ф. матки после введения контрастного вещества в стенку матки.

Ф. ОРБИТА́ЛЬНАЯ — Ф. вен орбиты после введения контрастного вещества обычно в лицевую вену.

Ф. ПО́ЧЕЧНАЯ — Ф. почки после введения контрастного вещества путем селективной катетеризации почечных вен через нижнюю полую вену.

Ф. СЕЛЕЗЁНОЧНАЯ — см. *Спленопортография*.

Ф. СПИНА́ЛЬНАЯ — см. *Веноспондилография*.

Ф. ТА́ЗОВАЯ ЧРЕСКО́СТНАЯ — Ф. области таза после введения контрастного вещества в кость с помощью

ее пункции, обычно — горизонтальной ветви лобковой кости.

Ф. ЦЕРЕБРА́ЛЬНАЯ — Ф. вен головного мозга.

Ф. ЦЕРЕБРА́ЛЬНАЯ РЕТРОГРА́ДНАЯ — церебральная Ф., при к-рой контрастное вещество вводят в венозные синусы твердой мозговой оболочки против тока крови.

Ф. ЧРЕЗРЁБЕРНАЯ — Ф. средостения после введения контрастного вещества в одно из нижних ребер.

ФЛЕБОГРАФИ́Я[2] — общее название методов графической регистрации пульсовых колебаний стенки вены.

ФЛЕБОКАВОГРАФИ́Я (*флебо-* + анат. vena cava полая вена + греч. graphō писать, изображать) — см. *Кавография.*

ФЛЕБО́ЛИЗ (phlebolysis; *флебо-* + греч. lysis развязывание, освобождение) — хирургическая операция: выделение вены из окружающей рубцовой ткани.

ФЛЕБОЛИ́Т (phlebolithus; *флебо-* + греч. lithos камень) — см. *Конкремент венный.*

ФЛЕБОЛО́ГИЯ (*флебо-* + греч. logos учение, наука) — раздел ангиологии, изучающий вены.

ФЛЕБОПАТОЛО́ГИЯ (*флебо-* + *патология*) — раздел частной патологии, изучающий патологические состояния и болезни вен.

ФЛЕБОПЬЕЗОГРА́ММА (*флебо-* + *пьезограмма*) — кривая, отражающая пульсовые колебания стенки вены, зарегистрированная с помощью пьезоэлектрического датчика.

ФЛЕБОПЬЕЗОГРАФИ́Я (*флебо-* + *пьезография*) — метод исследования венозного кровообращения, заключающийся в графической регистрации пульсовых колебаний стенки вены с помощью пьезоэлектрических датчиков.

ФЛЕБОСКЛЕРО́З (phlebosclerosis; *флебо-* + *склероз*) — см. *Флебофиброз.*

ФЛЕБОСТЕНО́З (phlebostenosis; *флебо-* + *стеноз*) — сужение просвета вены (вен), обусловленное патологическими изменениями ее стенки; наблюдается, напр., при эндофлебитах и тромбофлебитах.

ФЛЕБОТЕНЗИОГРА́ММА (*флебо-* + лат. tensio напряжение + греч. gramma запись, изображение; син. флеботонограмма) — кривая, отображающая изменения венозного давления во времени.

ФЛЕБОТЕНЗИОГРАФИ́Я (*флебо-* + лат. tensio напряжение + греч. graphō писать, изображать; син. флеботонография) — графическая регистрация изменений венозного давления во времени.

ФЛЕБОТЕ́НЗИОМЕТРИ́Я (*флебо-* + *тензиометрия*; син.: венотензиометрия, венотонометрия, флеботонометрия) — измерение венозного давления.

Ф. БЕСКРО́ВНАЯ — см. *Флеботензиометрия непрямая.*

Ф. КРОВА́ВАЯ — см. *Флеботензиометрия прямая.*

Ф. НЕПРЯМА́Я (син. Ф. бескровная) — Ф., при к-рой область прохождения вены сдавливают пелотом из толстостенной резины, соединенным с манометром, а затем постепенно уменьшают степень сдавливания до момента восстановления кровотока.

Ф. ПРЯМА́Я (син. Ф. кровавая) — Ф., основанная на введении в просвет вены иглы, соединенной трубками с манометром, или катетера с укрепленным на его конце миниатюрным электроманометром.

ФЛЕБОТОДЕРМИ́Я (phlebotodermia; флеботомус + греч. derma кожа) — тропический дерматоз, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к секрету слюнных желез москитов рода Phlebotomus; проявляется зудящей узелковой сыпью.

ФЛЕБОТОМИ́Я (*флебо-* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Венотомия.*

ФЛЕБОТО́МУС — см. *Phlebotomus.*

PHLEBOTÓMUS (флеботомус) — род кровососущих москитов сем. Phlebotomidae, отр. Diptera; включает переносчиков возбудителей флеботомной лихорадки, лейшманиозов, бартонеллеза.

P. ARGENTÍPES — вид P., являющийся основным переносчиком возбудителя индийского висцерального лейшманиоза.

P. CAUCÁSICUS — вид P., являющийся одним из основных переносчиков возбудителей лейшманиозов на юге СССР.

P. PAPATÁSII — вид P., являющийся одним из основных переносчиков возбудителей флеботомной лихорадки и лейшманиозов в странах Средиземноморья, Передней и Средней Азии.

P. PERNICIÓSUS — вид P., являющийся основным переносчиком возбудителя средиземноморского висцерального лейшманиоза.

P. SERGÉNTI — вид P., являющийся одним из основных переносчиков антропонозного кожного лейшманиоза в Индии, странах Средиземноморья и Передней Азии.

P. CHINÉNSIS — вид P., являющийся одним из основных переносчиков возбудителя висцерального лейшманиоза в Китае, странах Средиземноморья, Передней и Средней Азии.

ФЛЕБОТОНОГРА́ММА (*флебо-* + *тонограмма*) — см. *Флеботензиограмма.*

ФЛЕБОТОНО́ГРАФ (*флебо-* + *тонограф*) — прибор для флеботензиографии, позволяющий одновременно получать две флеботензиограммы и кривую, отображающую дыхательные движения грудной клетки (пневмограмму).

ФЛЕБОТОНОГРАФИ́Я (*флебо-* + *тонография*) — см. *Флеботензиография.*

ФЛЕБОТОНО́МЕТР (*флебо-* + *тонометр*) — манометрический прибор для измерения венозного давления.

ФЛЕБОТОНОМЕТРИ́Я (*флебо-* + *тонометрия*) — см. *Флеботензиометрия.*

ФЛЕБОТРОМБО́З (phlebothrombosis; *флебо-* + *тромбоз*) — образование тромба в вене, ведущее к ее частичной или полной закупорке.

ФЛЕБОФИБРО́З (phlebofibrosis; *флебо-* + *фиброз*; син. флебосклероз) — патологический процесс, характеризующийся заменой эластических волокон и мышечных элементов средней оболочки вены соединительной тканью, что приводит к уплотнению венозной стенки.

ФЛЕБЭКТАЗИ́Я (phlebectasia; *флеб-* + *эктазия*; син. венэктазия) — стойкое расширение вены (вен).

ФЛЕБЭКТОМИ́Я (phlebectomia; *флеб-* + *эктомия*; син. венэктомия) — хирургическая операция: удаление (иссечение) вены.

ФЛЕ́ВОРНЫЕ ВЕЩЕСТВА́ (англ. flavour придавать вкус, приправлять) — пищевые добавки, применяемые для улучшения вкуса и запаха пищевых продуктов или готовых блюд (напр., глютамат натрия).

ФЛЕГМАЗИ́Я (греч. phlegmasia набухание, воспаление, от phlegma огонь, жар, воспаление) — см. *Гангрена циркуляторная венозная.*

PHLEGMASÍA ÁLBA DÓLENS — см. *Флебит белый болевой.*

PHLEGMASÍA COERÚLEA DÓLENS— см. *Флебит синий болевой.*

ФЛЕГМАТИ́ЧЕСКИЙ ТИП (греч. phlegma слизь) — см. *Тип высшей нервной деятельности сильный уравновешенный инертный.*

ФЛЕГМО́НА (phlegmone; греч. phlegmonē воспаление, от phlegma огонь, жар, воспаление) — острое, четко не отграниченное гнойное воспаление клетчатки.

Ф. ГОРТА́НИ (устар.; p. laryngis) — см. *Ларингит абсцедирующий.*

Ф. ДВЕНАДЦАТИПЕ́РСТНОЙ КИ́ШКИ (p. duodeni) — см. *Дуоденит флегмонозный.*

Ф. НЕКРОТИ́ЧЕСКАЯ НОВОРОЖДЁННЫХ (p. necrotica neonatorum) — см. *Флегмона новорожденных.*

Ф. НОВОРОЖДЁННЫХ (p. neonatorum; син. Ф. некротическая новорожденных) — Ф. подкожной клетчатки у детей первого месяца жизни, характеризующаяся быстрым распространением, выраженным некрозом и нередко осложняющаяся сепсисом с образованием метастатических очагов гнойного воспаления в различных органах.

Ф. ОДОНТОГЕ́ННАЯ (p. odontogena) — Ф. околочелюстной клетчатки; развивается в результате распространения возбудителей гнойной инфекции из очага воспаления, локализованного в тканях зуба или в пародонте.

Ф. ПОДНАДКО́СТНИЧНАЯ (p. subperiostealis) — см. *Периостит злокачественный.*

Ф. СЛЁЗНОГО МЕШКА́ (p. sacci lacrimalis; син.: дакриоцистит острый, дакриоцистит флегмонозный) — Ф. клетчатки, окружающей слезный мешок; возникает как осложнение его гнойного воспаления.

Ф. СУБПЕКТОРА́ЛЬНАЯ (p. subpectoralis; лат. приставка sub- под + musculus pectoralis грудная мышца) — Ф. клетчатки, расположенной под грудными мышцами; возникает обычно как осложнение подмышечной аденофлегмоны.

ФЛЕГМО́НА ГА́ЗОВАЯ (phlegmone gaseosa) — см. *Инфекция анаэробная.*

ФЛЕГМО́НА ДЕРЕВЯНИ́СТАЯ (phlegmone lignosa) — см. *Реклю деревянистая флегмона.*

ФЛЕГМО́НА КОРИ́ЧНЕВАЯ — см. *Инфекция анаэробная.*

ФЛЕГМО́НА РО́ЖИСТАЯ (phlegmone erysipelatosa) — см. *Рожа вторичная.*

ФЛЕГМО́НА СУСТА́ВА (нрк; phlegmone articulationis) — см. *Панартрит.*

ФЛЕГМО́НА-ЗАТЁК — см. *Войно-Ясенецкого флегмона-затек.*

ФЛЕГМОНО́ЗНЫЙ (phlegmonosus) — относящийся к флегмоне, характеризующийся развитием флегмоны.

ФЛЕ́КСИГА МЕ́ТОД (P. E. Flechsig, 1847—1929, нем. невролог) — 1) метод окраски миелиновых оболочек нервных волокон в гистологических препаратах осмиевой кислотой и гематоксилином; 2) метод вскрытия головного мозга, заключающийся в его рассечении разрезом, проведенным в горизонтальной плоскости.

ФЛЕ́КСИГА ПУЧО́К (P. E. Flechsig) — см. *Спиномозжечковый путь задний.*

ФЛЕ́КСИЯ (flexio; лат. «сгибание», от flecto, flexum сгибать) — см. *Сгибание.*

ФЛЕ́КСНЕРА ДИЗЕНТЕРИ́ЙНАЯ БАКТЕ́РИЯ (Shigella flexneri, Ber; S. Flexner, 1863—1946, амер. микробиолог) — вид бактерий рода Shigella сем. Enterobacteriaceae; неподвижная, грамотрицательная палочка длиной 1,5 *мкм*; аэроб или факультативный анаэроб; один из возбудителей дизентерии.

ФЛЕ́КСНЕРА ДИЗЕНТЕРИ́Я (S. Flexner) — клинико-этиологический вариант дизентерии, вызываемый дизентерийными бактериями Флекснера, характеризующийся в типичных случаях явлениями колита с очаговым поражением слизистой оболочки и перезкой интоксикацией.

ФЛЕ́КСОР (musculus flexor; от лат. flecto, flexum сгибать) — см. *Сгибатель.*

ФЛЕКСО́РНЫЕ ЛИ́НИИ (лат. flecto, flexum сгибать; син. сгибательные борозды) — поперечные складки кожи на ладонях и подошвах.

ФЛЕ́ТЧЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (W. Fletcher, 1872—1938, англ. врач) — см. *Мелиоидоз.*

ФЛЕ́ТЧЕРА ДЕНТИ́Н (H. Fletcher, 1849—1919, амер. фабрикант) — пломбировочный материал, представляющий собой смесь окиси цинка (66%), обезвоженного сульфата цинка (24%) и каолина (10%); используется для временных пломб.

ФЛИКТЕ́НА (phlyctaena; греч. phlykatina волдырь, пузырь) — 1) в дерматологии — поверхностная пустула в виде пузыря, наполненного серозным экссудатом и окруженного венчиком гиперемии кожи; 2) в офтальмологии — инфильтрат, расположенный в поверхностных слоях роговицы (чаще в области лимба) или конъюнктивы глазного яблока, состоящий гл. обр. из лимфоидных и эпителиоидных клеток.

ФЛИКТЕ́НА БЛУЖДА́ЮЩАЯ (phlyctaena migrans) — см. *Кератит пучковидный.*

ФЛИКТЕ́НА МИЛИА́РНАЯ (phlyctaena miliaris) — разновидность туберкулезно-аллергического кератоконъюнктивита, характеризующаяся образованием большого количества мелких фликтен.

ФЛИКТЕ́НА СОЛИТА́РНАЯ (phlyctaena solitaris) — разновидность туберкулезно-аллергического кератоконъюнктивита, характеризующаяся образованием единичных, сравнительно крупных (1—2 *мм* в диаметре) фликтен.

ФЛИКТЕ́НА СТРА́НСТВУЮЩАЯ — см. *Кератит пучковидный.*

ФЛИ́НТА ШУМ (A. Flint, 1812—1886, амер. врач) — пресистолический шум, выслушиваемый у верхушки сердца; признак недостаточности аортального клапана.

ФЛИ́ССА ТО́ЧКИ (W. Fliess, 1858—1928, нем. оториноларинголог) — участки слизистой оболочки носа (чаще на передней части нижней и средней раковины и на бугорке перегородки носа), воздействие на к-рые (напр., смазывание раствором новокаина, электрофорез раствора новокаина) вызывает изменения функционального состояния различных органов и систем; используются при рефлексотерапии.

ФЛОККУЛЯ́НТЫ (лат. flocculi клочья, хлопья) — вещества, способствующие образованию в жидкости хлопьевидных осадков; применяются при коагулировании воды в процессе ее очистки.

ФЛОККУЛЯЦИО́ННАЯ ПРО́БА — см. *Коагуляционная проба.*

ФЛОККУЛЯ́ЦИЯ (англ. flocculation, от лат. flocculi клочья, хлопья) в иммунологии — появление опалесценции или образование мелкодисперсного осадка при реакции токсин — антитоксин; разновидность преципитации.

ФЛО́РА (лат. Flora богиня цветов и весны) — совокупность видов растений, произрастающих на какой-либо территории.

ФЛО́РА МИКРО́БНАЯ — см. *Микрофлора.*

ФЛОРА́НСА ПРО́БА (A. Florence, 1851—1927, франц. врач-фармаколог) — ориентировочный метод выявления наличия спермы в пятне, основанный на ее способности образовывать кристаллы в виде параллелепипедов светло-коричневого цвета в присутствии смеси растворов йода и йодата калия.

ФЛО́РИ ФА́КТОР I (E. Florey) — см. *Фактор I.*

ФЛОТА́ЦИЯ СРЕДОСТЕ́НИЯ (flotatio mediastini; англ. floatation плавание) — маятникообразное смещение средостения синхронно с дыханием; наблюдается при широко открытом пневмотораксе.

ФЛЮКТУА́ЦИЯ[1] (fluctuatio; лат. «колебание»; син. зыбление) в патологии — колебания в полости, наполненной жидкостью (напр., гноем, транссудатом), вызываемые толчком пальцами одной руки и ощущаемые пальцами другой руки при двуручной пальпации.

ФЛЮКТУА́ЦИЯ[2] в генетике — общее название случайных колебаний выраженности наследуемого признака у генетически родственных особей.

ФЛЮКТУОРИЗА́ЦИЯ (лат. fluctuor колебаться) — лечебное применение электрического тока, частота к-рого беспорядочно меняется в диапазоне 20 *гц*—20 *кгц*; используется преимущественно в стоматологии; оказывает болеутоляющее, противовоспалительное и противоотечное действие.

ФЛЮОРЕСЦЕЙНОВАЯ ПРО́БА в офтальмологии — 1) метод обнаружения дефектов поверхности роговицы и конъюнктивы, основанный на их окрашивании раствором флюоресцеина, вводимым в конъюнктивальный мешок; 2) канальцевая проба с применением раствора флюоресцеина.

ФЛЮОРЕСЦЕ́НЦИЯ (лат. fluor течение, поток) — кратковременная люминесценция, затухающая в течение 10^{-9}—10^{-8} сек. после прекращения возбуждения; используется для качественного и количественного анализа биологически активных соединений.

ФЛЮОРЕСЦЕ́НТНЫЙ АНА́ЛИЗ — общее название методов качественного и количественного анализа, основанных на флюоресценции исследуемых веществ; применяется в лабораторной практике.

ФЛЮОРИ- (флюоро-; лат. fluor течение, поток) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к флюоресценции».

ФЛЮОРИЗА́ЦИЯ ВОДЫ́ (лат. Fluorum фтор) — см. *Фторирование воды.*

ФЛЮОРИ́МЕТР (*флюори-* + греч. metreō измерять, определять) — см. *Флюорометр.*

ФЛЮОРО- — см. *Флюори-.*

ФЛЮОРО́ГРАФ (*флюоро-* + греч. graphō писать, изображать; син.: радиофотограф, рентгенофотограф, фоторентгенограф — устар.) — устройство для фотографирования рентгеновского изображения с просвечивающего экрана; чаще применяется при массовом обследовании.

ФЛЮОРОГРАФИ́Я (*флюоро-* + греч. graphō писать, изображать; син.: радиофотография, рентгенофлюорография — устар., рентгенофотография, фоторентгенография) — метод рентгенологического исследования, заключающийся в фотографировании рентгеновского изображения исследуемого объекта с просвечивающего экрана.

ФЛЮОРО́З (лат. Fluorum фтор + *-оз*) — хроническая болезнь, обусловленная избыточным поступлением в организм фтора, напр. при его содержании в питьевой воде в концентрации более 1,5 *мг/л*; проявляется гл. обр. остеосклерозом и гипоплазией эмали зубов.

ФЛЮОРОКАРДИОМЕТРИ́Я [*флюоро(графия)* + греч. kardia сердце + metreō измерять, определять] — определение линейных размеров и объема сердца на основании анализа его флюорограмм.

ФЛЮОРОКИМОГРАФИ́Я [*флюоро(графия)* + *кимография*] — метод рентгенологического исследования, сочетающий флюорографию с рентгенокимографией.

ФЛЮОРО́МЕТР (*флюоро-* + греч. metreō измерять; син. флюориметр) — прибор для измерения интенсивности люминесценции; в медицине Ф. применяются для обнаружения и количественного определения люминесцирующего вещества в различных средах и материалах.

ФЛЮОРОСКОПИ́Я (устар.; *флюоро-* + греч. skopeō смотреть, наблюдать) — см. *Рентгеноскопия.*

ФЛЮС (устар.; нем. Fluss) — см. *Периостит одонтогенный острый.*

ФОБИ́Я (phobia; греч. phobos страх, боязнь; син. страх навязчивый) — навязчивое состояние в виде непреодолимой боязни пек-рых предметов, движений, действий, поступков, ситуаций; содержанием Ф. может быть любое явление обыденной жизни.

Ф. ЭЛЕМЕНТА́РНАЯ — Ф., ограниченная отдельным, конкретным предметом или явлением.

ФОБОФОБИ́Я (phobophobia; греч. phobos страх; син. страх страха) — боязнь появления навязчивого страха.

ФОВ — см. *Отравляющие вещества фосфорорганические.*

ФОВЕА́ЛЬНЫЙ (анат. fovea centralis центральная ямка) — относящийся

к центральной ямке желтого пятна (пятна сетчатки).

ФОВИ́ЛЛЯ СИНДРО́М (A. L. F. Foville, 1799—1878, франц. невропатолог и психиатр) — понтинный альтернирующий синдром: сочетание паралича или пареза мышц, иннервируемых лицевым и отводящим нервами, на стороне очага поражения моста мозга (варолиева моста) с гемиплегией или гемипарезом на противоположной стороне.

ФО́ВИНКЕЛЯ СИНДРО́М (K. H. Vohwinkel, нем. дерматолог 20 в.) — см. *Кератодермия мутилирующая.*

ФО́ВЛЕРА ПОЛОЖЕ́НИЕ (прк; G. R. Fowler, 1848—1906, амер. хирург) — см. *Фаулера положение.*

ФО́ГЕСА — ПРОСКА́УЭРА РЕА́КЦИЯ (O. Voges, род. в 1867 г., нем. бактериолог; B. Proskauer, 1851—1915, нем. бактериолог) — метод обнаружения бактерий сем. Enterobacteriaceae и Vibrionaceae, а также спорообразующих аэробных бактерий, основанный на том, что при их культивировании на среде Кларка накапливается ацетоин (продукт анаэробного превращения глюкозы), обнаруживаемый по розовому окрашиванию среды после добавления р-ра едкого кали.

ФО́ГТ СИНДРО́М (C. Vogt, 1875—1962, нем. невропатолог) — сочетание центральной диплегии с атетозом, наблюдающееся у больных детским церебральным параличом и обусловленное поражением стриопаллидарной системы.

ФО́ГТА КА́РТА (O. Vogt, 1870—1959, нем. невропатолог; C. Vogt, 1875—1962, нем. невропатолог) — графическое отображение миелоархитектоники коры большого мозга с делением ее приблизительно на 200 полей.

ФО́ГТА МЕ́ТОД (A. Vogt, 1879—1943, швейц. офтальмолог) — бесскелетная рентгенография глаза, проводимая для определения местоположения инородного тела в переднем отделе глазного яблока.

ФО́ГТА ОПЕРА́ЦИЯ (A. Vogt, 1879—1943, швейц. офтальмолог) — хирургическая операция при отслойке сетчатки, заключающаяся в наложении на склеру швов, вызывающих ее прогибание или образование складки.

ФО́ГТА ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ ПОРОШКООБРА́ЗНАЯ КАТАРА́КТА (A. Vogt, 1879—1943, швейц. офтальмолог) — см. *Катаракта Коппок.*

ФО́ГТА — КОЯНА́ГИ СИНДРО́М (A. Vogt, 1879—1943, швейц. офтальмолог; Y. Koyanagi, род. в 1880 г., японский офтальмолог; син. Фогта — Коянаги — Харады синдром) — сочетание двустороннего переднего увеита с патологическими изменениями цереброспинальной жидкости и трофическими расстройствами (напр., гнездным облысением, поседением волос и ресниц), иногда — со снижением слуха; разновидность увеоменингеального синдрома.

ФО́ГТА — КОЯНА́ГИ — ХАРА́ДЫ СИНДРО́М (A. Vogt, 1879—1943, швейц. офтальмолог; Y. Koyanagi, род. в 1880 г., японский офтальмолог; E. Harada, совр. японский офтальмолог) — см. *Фогта — Коянаги синдром.*

ФО́ЙГТА МЕТАМЕРИ́ЧЕСКИЕ ЛИ́НИИ (Ch. A. Voigt, 1809—1890, австрийский анатом) — воображаемые линии направления роста волос.

ФОКА́ЛЬНЫЙ (focalis, от лат. focus очаг) — 1) относящийся к очагу патологического процесса; 2) относящийся к фокусу оптической системы.

ФОКОМЕЛИ́Я (phocomelia; греч. phōkē тюлень + melos часть тела, конечность) — аномалия развития: отсутствие или значительное недоразвитие проксимальных отделов конечностей, вследствие чего нормально развитые стопы и (или) кисти кажутся прикрепленными непосредственно к туловищу.

ФО́КСА ВОЛЧА́НКА ФОЛЛИКУЛЯ́РНАЯ ДИССЕМИНИ́РОВАННАЯ (G. H. Fox, 1846—1937, амер. дерматолог) — см. *Туберкулез кожи лица милиарный диссеминированный.*

ФО́КСА ИМПЕТИ́ГО (G. H. Fox) — см. *Импетиго стрептококковое.*

ФО́КСА — ФО́РДАЙСА БОЛЕ́ЗНЬ (G. H. Fox, 1846—1937, амер. дерматолог; J. A. Fordyce, 1858—1925, амер. дерматолог) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся плотными коническими красновато-буроватыми зудящими узелками, сгруппированными в подмышечных впадинах, на околососковом кружке, на добке.

ФО́КУСНОЕ ПЯТНО́ в рентгенотехнике — участок анода рентгеновской трубки, на к-ром происходит генерирование рабочего пучка рентгеновского излучения.

ФО́КУСНОЕ РАССТОЯ́НИЕ в рентгенодиагностике — 1) расстояние между фокусным пятном источника излучения и объектом; 2) расстояние между фокусным пятном источника излучения и рентгеновской пленкой.

ФОЛЕ́Я КАТЕ́ТЕР-БАЛЛО́Н (F. E. B. Foley, род. в 1891 г., амер. уролог) — см. *Померанцева — Фолея катетер-баллон.*

ФОЛЕ́Я ОПЕРА́ЦИЯ (F. E. B. Foley; син. Швайзера — Фолея операция) — пластическая операция при гидронефрозе, обусловленном стриктурой мочеточника; заключается в том, что из боковой стенки почечной лоханки выкраивают треугольный лоскут, от вершины к-рого разрез продлевают на прилоханочную часть мочеточника через его стриктуру и в этот разрез вшивают выкроенный треугольный лоскут.

FOLÍE Á DEUX (франц. «психоз у двоих») — форма индуцированного бреда, при к-ром одинаковые по содержанию бредовые идеи наблюдаются у двух лиц.

FOLÍE Á DOUBLE FÓRME (франц. «психоз сдвоенный») — 1) тип течения маниакально-депрессивного психоза, при к-ром маниакальный или депрессивный приступ непосредственно сменяется противоположным, после чего наступает интермиссия; 2) (истор.) — психическая болезнь, в течение к-рой аффективный приступ (напр., маниакальный) непосредственно сменяется приступом с противоположным аффектом (напр., депрессивным).

FOLÍE Á TRÓIS (франц. «психоз у троих») — форма индуцированного бреда, при к-ром одинаковые по содержанию бредовые идеи наблюдаются у трех лиц.

ФО́ЛИЕВАЯ КИСЛОТА́ (син.: витамин B_9, витамин B_c, витамин M, птероилглютаминовая кислота) — водорастворимый витамин, содержащийся в овощах, злаках, продуктах животного происхождения, участвующий в биосинтезе пуриновых и пиримидиновых оснований; при недостаточности Ф. к. развивается анемия.

ФО́ЛИНА — ЧОКАЛТЕ́У РЕАКТИ́В (O. K. O. Folin, 1867—1934, шведский физиолог и химик; V. Ciocalteu, 1890—1947, румынский врач и биохимик) — смесь растворов вольфрамовокислого и молибденовокислого натрия, к к-рой добавляют последовательно фосфорную, соляную кислоту и, после кипячения, сульфат лития, а также несколько капель бромной воды; используется при количественном определении белков по методу Лаури.

ФО́ЛЛИЕВ ОТРО́СТОК [C. Folli (Folius), 1615—1650, итал. анатом] — см. *Передний отросток.*

ФОЛЛИ́КУЛ яичниковый (folliculus; лат. «кожаный мешочек») — структурный компонент яичника, состоящий из овогонии, окруженной яичниковыми фолликулоцитами.

Ф. АТРЕТИ́ЧЕСКИЙ (f. atreticus) — Ф., подвергшийся обратному развитию, не достигнув зрелости.

Ф. ВЕЗИКУЛЯ́РНЫЙ (f. ovaricus vesiculosus, PNA; син.: граафов пузырек, фолликул зрелый) — Ф., представляющий собой крупный (диаметром 15—20 *мм*), заполненный жидкостью пузырь с соединительнотканной оболочкой, содержащий зрелую яйцеклетку, расположенную у его стенки в толще многослойного фолликулярного эпителия, выстилающего полость Ф.

Ф. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (f. haemorrhagicus) — Ф., содержащий в своей полости кровь, излившуюся вследствие разрыва капилляров; одна из стадий развития желтого тела.

Ф. ЗРЕ́ЛЫЙ (f. maturus) — см. *Фолликул везикулярный.*

Ф. ЗРЕ́ЮЩИЙ (f. maturans; син. Ф. растущий) — общее название Ф. на промежуточных этапах развития примордиального Ф. в зрелый.

Ф. КИСТО́ЗНЫЙ (f. cysticus) — Ф. в виде кисты, образующийся из нормально сформированного зрелого Ф., не прошедшего стадию овуляции.

Ф. ЛЮТЕИНИЗИ́РОВАННЫЙ (f. luteinisatus) — патологически сформированный Ф., в фолликулярном эпителии к-рого откладывается пигмент желтого цвета.

Ф. ПЕРВИ́ЧНЫЙ (f. ovaricus primarius, PNA) — см. *Фолликул примордиальный.*

Ф. ПРИМОРДИА́ЛЬНЫЙ (f. primordialis; син. Ф. первичный) — Ф., состоящий из овогонии, окруженной одним слоем яичниковых фолликулоцитов и соединительнотканной оболочкой.

Ф. РАСТУ́ЩИЙ — см. *Фолликул зреющий.*

ФОЛЛИ́КУЛ ВО́ЛОСА (folliculus pili, PNA, BNA, JNA, LNH; син.: волосяной мешочек, волосяной фолликул) — совокупность двух эпителиальных и соединительнотканной оболочек корня волоса.

ФОЛЛИ́КУЛ ЛИМФАТИ́ЧЕСКИЙ (folliculus lymphaticus; син. лимфоидный узелок) — ограниченное скопление лимфоидной ткани, в к-ром происходит развитие лимфоцитов; имеются в лимфатических узлах, миндалинах, селезенке, слизистой оболочке желудка, кишечника, гортани и пек-рых других органов.

ФОЛЛИ́КУЛ ТИРЕО́ИДНЫЙ — см. *Фолликул щитовидной железы.*

ФОЛЛИ́КУЛ ТРАХОМАТО́ЗНЫЙ — см. *Трахоматозные зерна.*

ФОЛЛИ́КУЛ ЩИТОВИ́ДНОЙ ЖЕЛЕ́ЗЫ (folliculus glandulae thyroideae, LNH; син. фолликул тиреоидный) — структурный компонент щитовидной железы, представляющий собой замкнутый пузырек, стенка к-рого образована однослойным эпителием, а полость заполнена коллоидным секретом.

ФОЛЛИКУЛЁЗ КОНЪЮНКТИ́ВЫ (folliculosis conjunctivae; *фолликул* + *-оз*) — гиперплазия лимфатических фолликулов конъюнктивы в виде бледно-розовых образований на переходных складках нижних век обоих глаз.

ФОЛЛИКУЛИ́Т (folliculitis; *фолликул-* + *-ит*) — пустула или узелок конусовидной формы, пронизанные в центре волосом, обусловленные воспалением фолликула волоса.

ФОЛЛИКУЛИ́Т АТРОФИ́ЧЕСКИЙ (folliculitis atrophica) — см. *Ulerythema ophryogenes.*

ФОЛЛИКУЛИ́Т ДЕКАЛЬВИ́РУЮЩИЙ (folliculitis decalvans; лат. decalvo лишать волос; син. Кеnко болезнь) — стафилодермия волосистой части головы, характеризующаяся длительными фолликулитами, оставляющими после себя плоские рубцы и рубцовую алопецию.

ФОЛЛИКУЛИ́Т ЗОЛОТУ́ШНЫХ — см. *Туберкулез кожи лихеноидный.*

ФОЛЛИКУЛИ́Т КЕЛО́ИДНЫЙ (folliculitis keloidea) — см. *Acne keloidea.*

ФОЛЛИКУЛИ́Т СЕ́ТЧАТЫЙ РУБЦУ́ЮЩИЙСЯ ЭРИТЕМАТО́ЗНЫЙ (folliculitis reticularis cicatricalis erythematosa) — см. *Атрофодермия червеобразная.*

ФОЛЛИКУЛИ́Т СИКОЗИФО́РМНЫЙ АТРОФИ́ЧЕСКИЙ ГО́ФФМАННА — см. *Сикоз люпоидный.*

ФОЛЛИКУЛИ́Т И ПЕРИФОЛЛИКУЛИ́Т ГОЛОВЫ́ АБСЦЕДИ́РУЮЩИЙ ПОДРЫВА́ЮЩИЙ ГО́ФФМАННА — см. *Гоффманна абсцедирующий подрывающий фолликулит и перифолликулит головы.*

ФОЛЛИКУЛИ́Т СТАФИЛОКО́ККОВЫЙ ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ (folliculitis staphylococcica superficialis) — см *Импетиго стафилококковое.*

ФОЛЛИКУЛО́МА (folliculoma; *фолликул* + *-ома*) — см. *Опухоль гранулезоклеточная.*

ФОЛЛИКУЛОЦИ́Т ЯИЧНИКОВЫЙ (folliculocytus ovaricus, LNH; *фолликул-* + гист. cytus клетка; син. клетка фолликулярная) — клетка фолликулярного эпителия яичника.

ФОЛЛИКУЛЯ́РНАЯ ЖИ́ДКОСТЬ (liquor follicularis) — жидкость, заполняющая полость зреющего и зрелого фолликула; содержит эстрогены.

ФОЛЛИКУЛЯ́РНАЯ ПОДУ́ШКА (pulvinar folliculare, LNH; син. сандерсоновская подушка) — участок эпителия щитовидной железы, выступающий в полость ее фолликула в виде утолщения и состоящий из высоких призматических клеток.

ФОЛЛИКУЛЯ́РНАЯ ФА́ЗА (phasis follicularis) — первая фаза яичникового цикла, характеризующаяся ростом и созреванием фолликула.

ФОЛЛИКУЛЯ́РНЫЙ (follicularis) — относящийся к фолликулу.

ФО́ЛЬГАРДА ПРО́БА (F. Volhard, 1872—1950, нем. врач) — 1) вариант водной пробы, при к-рой больной выпивает 1500 *мл* воды, а сбор мочи производится в течение 4-х часов через каждые 30 мин.; 2) вариант пробы на концентрацию, при к-рой сухоядение проводят в течение суток, а сбор мочи — в течение 8 часов через каждые 2 часа.

ФО́ЛЬГАРДА СИМПТО́М (F. Volhard) — волнообразное перемещение пульсации передней стенки грудной клетки по обе стороны от срединной линии; непостоянный признак слипчивого перикардита, обусловленный асинхронностью сокращений желудочков сердца и наличием плевроперикардиальных сращений.

ФО́ЛЬГЕРА МЕ́ТОД (Folger; син. Фольгера — Золле метод) — метод забора материала из зева для бактериологического исследования на дифтерийную палочку с помощью стерильного тампона, пропитанного лошадиной сывороткой, к-рый затем помещают в термостат на 4—6 часов и используют для приготовления мазка.

ФО́ЛЬГЕРА — ЗО́ЛЛЕ МЕ́ТОД (Folger; Solle) — см. *Фольгера метод.*

ФО́ЛЬКМАННА АРТРОТОМИ́Я (R. Volkmann, 1830—1889, нем. хирург) — артротомия коленного сустава, при к-рой после переднего поперечного разреза мягких тканей производят распил надколенника и рассечение крестообразных и боковых связок.

ФО́ЛЬКМАННА ИШЕМИ́ЧЕСКАЯ КОНТРАКТУ́РА (R. Volkmann; син. контрактура ишемическая) — контрактура кисти (реже стопы) и пальцев, возникающая вследствие острой ишемии мышц и нервов, обусловленной сдавлением конечности тесной гипсовой повязкой.

ФО́ЛЬКМАННА КРЮЧО́К (R. Volkmann) — хирургический инструмент в виде вилки, зубцы к-рой плавно изогнуты под углом более 90°, а ручка снабжена кольцом для пальца.

ФО́ЛЬКМАННА ОПЕРА́ЦИЯ (R. Volkmann) — корригирующая клиновидная подвертельная остеотомия бедренной кости; производится при анкилозе тазобедренного сустава в порочном положении.

ФО́ЛЬКМАННА ПЛАНТОГРАФИ́Я (R. Volkmann) — плантография, при к-рой отпечаток стопы на листе закопченной бумаги фиксируют раствором шеллака в спирте.

ФО́ЛЬКМАННА СА́ННЫЙ АППАРА́Т (истор.; R. Volkmann) — одно из первых устройств для лечения вытяжением переломов нижних конечностей, состоявшее из деревянного ложа, помещенного на рамку с колесами, к к-рому прибинтовывалась конечность и подвешивался груз.

ФО́ЛЬКМАННА ЭХИНОКОККЭКТОМИ́Я (истор.; R. Volkmann) — см. *Эхинококкэктомия двухмоментная.*

ФО́ЛЬКМАННОВСКИЙ КАНА́Л (A. W. Volkmann, 1800—1877, нем. физиолог) — см. *Питательный канал.*

ФО́ЛЯ ЖИ́ДКОСТЬ (H. Fol, 1845—1892, нем. эмбриолог) — жидкость для фиксации гистологических препаратов, представляющая собой смесь растворов хромовой, осмиевой и уксусной кислот.

ФОН ИОНИЗИ́РУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕ́НИЯ — относительно постоянный уровень радиоактивного излучения, воздействующего на население или на объект исследования.

Ф. И. И. ЕСТЕ́СТВЕННЫЙ (син. Ф. ионизирующего излучения природный) — Ф. и. и., состоящий из космического излучения и излучения природных радиоактивных веществ в окружающей среде.

Ф. И. И. ИСКУ́ССТВЕННЫЙ — Ф. и. и., обусловленный радиоактивным загрязнением окружающей среды, наличием посторонних источников излучения и наведенной радиоактивностью.

Ф. И. И. ПРИРО́ДНЫЙ — см. *Фон ионизирующего излучения естественный.*

ФОН- (фоно-; греч. phōnē звук, голос) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к звуку, к голосу».

ФОНАСТЕ́НИЯ (phonasthenia; *фон-* + греч. astheneia слабость) — дисфония или афония при отсутствии ларингоскопически определяемых изменений гортани, возникающая в результате чрезмерной нагрузки аппарата голосообразования, напр. у певцов, педагогов.

ФОНАСТЕ́НИЯ ФЛАТА́У — см. *Флатау фонастения.*

ФОНА́ЦИЯ (греч. phōnē голос) — см. *Голосообразование.*

ФОНЕНДОСКО́П (*фон-* + греч. endon внутри + skopeō исследовать) — прибор для аускультации, состоящий из звукоприемного устройства в виде капсулы с мембраной, гибких резиновых или пластмассовых звукопроводов, заканчивающихся оливами.

ФОНИАТРИ́Я (*фон-* + греч. iatreia врачевание) — раздел оториноларингологии, посвященный вопросам лечения и профилактики нарушений функции голосового аппарата.

ФО́НИО МЕ́ТОД (A. Fonio, род. в 1889 г., швейц. хирург) — метод определения количества тромбоцитов в крови путем микроскопии мазка крови фиксированного 14% раствором сульфата магния, при к-рой одновременно подсчитывают тромбоциты и эритроциты и вычисляют их отношение (в промилле).

ФОНО- — см. *Фон-.*

ФОНОГРА́ММА (*фоно-* + греч. gramma запись) в медицине — кривая, отражающая изменения во времени частоты, силы и тембра звуковых колебаний, возникающих в результате деятельности внутренних органов.

ФОНОГРАФИ́Я (*фоно-* + греч. graphō писать, изображать) в медицине — графическая регистрация звуковых колебаний, возникающих в результате деятельности внутренних органов; основные виды Ф.: фонокардиография и Ф. крупных сосудов.

ФОНОКАРДИОГРА́ММА (*фоно-* + *кардиограмма*) — кривая, отражающая частоту и амплитуду звуковых колебаний, возникающих в результате деятельности сердца.

ФОНОКАРДИО́ГРАФ (*фоно-* + *кардиограф*) — прибор для осциллографической регистрации звуковых колебаний, возникающих в результате деятельности сердца.

ФОНОКАРДИОГРАФИ́Я (*фоно-* + *кардиография*) — графическая регистрация звуковых колебаний, возникающих в результате деятельности сердца.

Ф. БЕСКОНТА́КТНАЯ — Ф., проводимая путем регистрации изменений электрической емкости между поверхностью грудной клетки и пластиной зонда-электрода, расположенной

в непосредственной близости, но не контактирующей с ней, что позволяет снизить уровень шума.

Ф. ИНТЕГРА́ЛЬНАЯ — Ф., при к-рой изменения амплитуды звуковых колебаний в широком диапазоне частот записываются одной кривой.

Ф. КАЛИБРО́ВАННАЯ — Ф., основанная на сравнении амплитуды звуковых колебаний, возникающих при работе сердца, с амплитудой колебаний искусственного звукового сигнала определенной силы.

Ф. СПЕКТРА́ЛЬНАЯ — Ф., при к-рой синхронно регистрируются изменения амплитуды звуковых колебаний в нескольких относительно узких диапазонах частот.

ФОНОКАТЕ́ТЕР (*фоно-* + *катетер*) — см. *Катетер микрофонный.*

ФОНОПЕДИ́Я ВОКА́ЛЬНАЯ (*фоно-* + греч. paideia воспитание, обучение) — метод лечения заболеваний гортани, сопровождающихся расстройствами певческого голоса; основан на использовании упражнений для тренировки дыхательной, артикуляционной и голосообразующей системы.

ФОНОПСИ́Я (phonopsia; *фон-* + греч. opsis зрение; син. слух цветной) — вид синестезии: окрашенность каждого звукового образа в определенный цвет.

ФОНОРЕЦЕ́ПТОРЫ (*фоно-* + *рецептор*) — см. *Рецепторы слуховые.*

ФОНОФОБИ́Я (phonophobia; *фоно-* + *фобия*) — см. *Акустикофобия.*

ФОНОФОРЕ́З (*фоно-* + греч. phorēsis несение, перенос; син.: сонофорез, ультрафонофорез) — метод лечения, заключающийся в сочетанном воздействии на определенные участки тела больного ультразвуком и нанесенными на их поверхность растворами, эмульсиями или мазями.

ФОНОЭЛЕКТРОКАРДИО́ГРАФ (*фоно-* + *электрокардиограф*; син. электрофонокардиограф) — прибор для исследования сердечной деятельности, синхронно регистрирующий фонокардиограмму и электрокардиограмму.

«ФОНТАНЕ́ЛЬ» (истор.; франц. fontanelle ·родничок) — искусственно созданный и поддерживаемый инородным телом (лигатурной нитью, шерстяной тесьмой) или повторными прижиганиями, гноящийся небольшой дефект кожи и подкожной клетчатки; считалось, что через Ф. организм освобождается от «дурной материи».

ФОНТА́НОВЫ ПРОСТРА́НСТВА (A. F. Fontana, 1720—1805, итал. анатом) — см. *Пространства радужно-роговичного угла.*

ФО́РБСА АМПУТА́ЦИЯ (W. S. Forbes, 1831—1905, амер. хирург) — ампутация стопы, при к-рой с целью улучшения функции культи сохраняют пяточную, таранную, ладьевидную и часть кубовидной кости.

ФО́РБСА БОЛЕ́ЗНЬ (G. B. Forbes, род. в 1915 г., амер. педиатр) — см. *Гликогеноз III типа.*

ФО́РБСА КО́СТНАЯ ПЛА́СТИКА (W. S. Forbes, 1831—1905, амер. хирург) — метод костной пластики при ложных суставах большеберцовой кости с использованием тонких пластинок губчатой кости, взятых с крыла подвздошной кости.

ФО́РБСА — О́ЛБРАЙТА СИНДРО́М (A. P. Forbes, совр. эндокринолог; F. Albright, род. в 1900 г., совр. амер. врач; син. Аргонса — дель Кастильо синдром) — сочетание аменореи и галактореи, часто сопровождающееся ожирением и гирсутизмом; обусловлен гиперфункцией гипофиза.

ФО́РГА ПРИ́ЗНАК (E. Forgue, 1860—1943, франц. хирург) — деформация кисти в виде тыльного смещения I пальца до прямого угла с I пястной костью; признак тыльного вывиха I пальца.

ФО́РДАЙСА БОЛЕ́ЗНЬ (J. A. Fordyce, 1858—1925, амер. дерматолог; син.: Дельбанко болезнь, Дельбанко — Дивансо болезнь) — наличие желтоватых точечных узелков в слизистой оболочке щек, губ, десен и наружных половых органов, обусловленное гетеротопическим расположением сальных желез.

ФО́РДАЙСА ОГРАНИ́ЧЕННАЯ АНГИОКЕРАТО́МА МОШО́НКИ (J. A. Fordyce) — см. *Ангиокератома ограниченная невиформная мошонки.*

ФО́РДАЙСА СИММЕТРИ́ЧНАЯ АТРОФИ́Я КО́ЖИ (J. A. Fordyce) — см. *Акродерматит атрофический хронический.*

ФО́РДАЙСА СИНДРО́М (J. A. Fordyce) — см. *Ангиокератома ограниченная невиформная мошонки.*

ФО́РДАЙСА — СА́ТТОНА АНГИОКЕРАТО́МА МОШО́НКИ (J. A. Fordyce, 1858—1925, амер. дерматолог; R. L. Sutton, 1878—1952, амер. дерматолог) — см. *Ангиокератома ограниченная невиформная мошонки.*

ФОРЕ́ЛЯ ПЕРЕКРЕ́СТ (A. Forel, 1848—1931, швейц. невролог и психиатр) — см. *Перекрест покрышки среднего мозга вентральный.*

ФОРЕ́ЛЯ ПОЛЯ́ (A. Forel) — участок промежуточного мозга, расположенный спереди от красного ядра и содержащий гл. обр. волокна, соединяющие базальные ядра и зубчатое ядро мозжечка с таламусом и красным ядром.

ФОРЕ́ЛЯ ПУЧКИ́ (A. Forel) — эфферентные волокна полосатого тела, отделяющие неопределенную зону, с одной стороны от таламуса, а с другой — от подбугорного ядра.

ФОРЕ́ЛЯ СПА́ЙКА (A. Forel) — см. *Спайка подбугорная задняя.*

ФОРЕСТИЗА́ЦИЯ (англ. forest лес) — см. *Фульгурация.*

ФОРМАЛИ́Н — 40% водный раствор альдегида муравьиной кислоты (формальдегида); обладает бактерицидным действием; в медицине применяется гл. обр. для дезинфекции.

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕ́НТЫ КРО́ВИ — общее название клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов).

ФОРМИКА́ЦИЯ (франц. formication, от лат. formica муравей) — тактильные галлюцинации в виде ощущения ползания, укусов муравьев или других насекомых.

ФОРМОЛВАКЦИ́НА — см. *Вакцина формализированная.*

ФОРМО́ЛОВАЯ ПРО́БА — метод выявления диспротеинемии, основанный на образовании студенистой массы при взаимодействии с формалином сыворотки крови, содержащей повышенное количество γ-глобулинов и фибриногена.

ФОРМООБРАЗОВА́НИЕ — см. *Морфогенез.*

ФО́РМУЛА ОБОДРЕ́НИЯ — словесная формулировка, применяемая врачом при психотерапии или самим больным при аутогенной тренировке и направленная на устранение болезненного ощущения или состояния.

ФОРНЕ́Я СИНДРО́М (нрк) — см. *Форни синдром.*

ФО́РНИ СИНДРО́М (W. R. Forney, амер. врач; син. Форнея синдром — нрк) — семейная наследственная болезнь, характеризующаяся сочетанием врожденного митрального порока сердца с отосклерозом и остеохондродистрофией.

ФОРНИКОТОМИ́Я (fornicotomia; анат. fornix cerebri свод мозга + греч. tomē разрез, рассечение) — стереотаксическая операция: разрушение передних отделов свода мозга (обычно над передней спайкой) при лечении эпилепсии.

ФОРО́МЕТР [(*гетеро*)*фория* + греч. metreō измерять, определять] — прибор для определения характера и степени гетерофории, основанный на использовании тангенциальной шкалы (шкалы Меддокса).

ФОРПО́СТ-СИНДРО́М (нем. Vorposten передовой пост) — психопатологический эпизод (аффективный, невроподобный, галлюцинаторный, галлюцинаторно-параноидный и др.), наблюдавшийся за несколько лет до возникновения психоза.

ФО́РССМАНА АНТИГЕ́Н (J. Forssman, 1868—1950, шведский патолог и иммунолог) — гетерогенный антиген, обнаруженный первоначально в почке морской свинки и эритроцитах барана, а в дальнейшем и у нек-рых других видов животных.

ФО́РТНЕРА МЕ́ТОД (J. Fortner, род. в 1893 г., ветеринар-бактериолог) — метод выделения анаэробов, заключающийся в выращивании их совместно с облигатными аэробами на твердой питательной среде в герметически закрытых чашках Петри.

ФОРХГЕ́ЙМЕРА ПРИ́ЗНАК (нрк; F. Forchheimer, 1853—1913, амер. терапевт и педиатр) — см. *Энантема коревая.*

ФО́РШПИЛЬ (нем. Vorspiel) — см. *Ласки подготовительные.*

ФО́ССА МЕ́ТОД (B.-V. Voss, нем. хирург-ортопед) — хирургическая операция: тенотомия приводящих мышц бедра и отсечение мышц, прикрепляющихся к большому вертелу с целью уменьшения давления головки бедренной кости на вертлужную впадину; применяется при деформирующих артрозах тазобедренного сустава.

ФО́ССИУСА КОЛЬЦЕВИ́ДНАЯ КАТАРА́КТА (A. Vossius, 1855—1925, нем. офтальмолог) — см. *Фоссиуса кольцо.*

ФО́ССИУСА КОЛЬЦО́ (A. Vossius; син. Фоссиуса кольцевидная катаракта) — наблюдаемое после контузии глазного яблока помутнение передней части капсулы хрусталика, обусловленное отложением на ней частиц пигмента радужки.

ФО́СТЕРА — КЕ́ННЕДИ СИНДРО́М — см. *Кеннеди синдром.*

ФОСФАГЕ́НЫ — группа природных органических фосфорных соединений, играющих в организме роль накопителей энергии (в форме энергии фосфатных связей), а также роль источника фосфатных остатков для синтеза аденозинтрифосфорной кислоты; наиболее важный Ф. у человека — креатинфосфат.

ФОСФА́Т — общее название солей и эфиров фосфорной кислоты.

ФОСФАТА́ЗНЫЙ ТЕСТ — метод определения эффективности пастериза-

ции молока и термической обработки готовых блюд; основан на определении активности щелочной фосфатазы, температура инактивации к-рой немного превышает температуру гибели большинства термоустойчивых микроорганизмов, встречающихся в молоке и других пищевых продуктах, в том числе микобактерий туберкулеза.

ФОСФАТА́ЗЫ — ферменты, катализирующие гидролиз сложных эфиров фосфорной кислоты и таким образом участвующие в обмене фосфатов в организме; в зависимости от оптимальной реакции среды различают кислые и щелочные Ф.

ФОСФА́Т-ДИАБЕ́Т (diabetes phosphaticus; син. диабет фосфатный) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением реабсорбции фосфора в почечных канальцах; характеризуется остеопорозом, остеомаляцией, деформацией костей, гипофосфатемией и высокой активностью щелочной фосфатазы в крови; наследуется по рецессивному типу.

ФОСФАТИДИЛСЕРИ́НЫ — см. *Серинфосфатиды.*

ФОСФАТИДИЛХОЛИ́НЫ — см. *Лецитины.*

ФОСФАТИ́ДЫ — см. *Фосфолипиды.*

ФОСФАТУРИ́Я (phosphaturia; фосфаты + греч. uron моча) — выделение с мочой повышенного количества двузамещенных солей фосфорной кислоты.

ФОСФЕ́Н (греч. phōs свет + phainō являть, делать видимым) — зрительное ощущение, возникающее при электрическом или механическом раздражении какого-либо участка зрительного анализатора.

ФОСФОГЛЮКОМУТА́ЗА — фермент класса трансфераз (КФ 2.7.5.1), катализирующий перенос остатка фосфорной к-ты в молекуле глюкозы из первого в шестое положение; участвует в процессах анаэробного расщепления глюкозы и синтеза гликогена в организме.

ФОСФОКРЕАТИ́Н — см. *Креатинфосфат.*

ФОСФОЛИПА́ЗЫ (син. лецитиназы)— ферменты класса гидролаз (КФ 3.1.4.3. и 3.1.4.4), катализирующие расщепление сложноэфирных связей в фосфолипидах.

ФОСФОЛИПИ́ДЫ (син. фосфатиды) — сложные липиды, содержащие фосфорную кислоту; входят в состав липопротеидов крови, являются важнейшим компонентом биологических мембран.

ФОСФОПЕНТО́ЗЫ (син. пентозофосфорные кислоты — нрк) — фосфорилированные производные пентоз, являющиеся промежуточными продуктами превращения углеводов в организме; входят в состав нуклеиновых кислот и многих коферментов.

ФОСФОПИРИДОКСА́ЛЬ — см. *Пиридоксальфосфат.*

ФОСФОПИРУВА́Т-ГИДРАТА́ЗА(син. енолаза) — фермент класса лиаз (КФ 4.2.1.11), катализирующий отщепление молекулы воды от 2-фосфо-D-глицериновой кислоты с образованием фосфоенолпировиноградной кислоты; участвует в процессах гликолиза и спиртового брожения.

ФОСФО́ПРОТЕЙДЫ (син. фосфопротеины) — сложные белки, в состав которых в качестве небелкового компонента входит фосфорная кислота; к Ф. относятся казеин молока, овальбумин, вителлин куриного яйца и нек-рые ферменты.

ФОСФОПРОТЕИ́НЫ — см. *Фосфопротеиды.*

ФО́СФОР (Phosphorus; от греч. phōs-, phoros светоносный) — химический элемент V группы периодической системы Д. И. Менделеева; ат. номер 15, ат. вес (масса) 30,97; присутствует в живых клетках в виде орто- и пирофосфорной кислот и их производных.

ФО́СФОР РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов фосфора с массовым числом от 28 до 34 и периодом полураспада от 0,28 сек. до 25 дней; отдельные изотопы используются с диагностической и лечебной целью.

ФОСФОРЕСЦЕ́НЦИЯ — люминесценция, продолжающаяся после прекращения действия возбуждающего фактора; на явлении Ф. основано действие рентгеновских экранов, электронно-лучевых трубок и др.

ФОСФОРИЛА́ЗЫ — ферменты класса трансфераз (КФ 2.4.1.1), катализирующие присоединение остатка фосфорной кислоты к углеводам и другим веществам; участвуют в расщеплении гликогена и крахмала.

ФОСФОРИЛИ́РОВАНИЕ — химическая реакция присоединения остатков фосфорных кислот, осуществляющаяся, напр., в процессах биологического окисления и биосинтеза.

ФОСФОРО́ЛИЗ — ферментативный процесс расщепления гликозидных связей с образованием эфиров фосфорной кислоты, протекающий в живых организмах, напр. при биосинтезе и распаде гликогена, крахмала, нуклеозидов.

ФОСФОРИЛТИОХОЛИ́НЫ — группа фосфорорганических отравляющих веществ, отличающихся особо высокой токсичностью, особенно при воздействии через кожу.

ФОСФОТРАНСФЕРА́ЗЫ (син. фосфоферазы — устар.) — ферменты, катализирующие перенос групп, содержащих фосфор; нек-рые Ф. участвуют в обмене веществ и энергии в организме человека.

ФОСФОФЕРА́ЗЫ (устар.)— см. *Фосфотрансферазы.*

ФОСФОФРУКТОКИНА́ЗА — фермент класса трансфераз (КФ 2.7.1.11), катализирующий перенос фосфатного остатка с аденозинтрифосфорной кислоты на фруктозо-6-фосфат с образованием фруктозо-1,6-дифосфата; один из важнейших ферментов гликолиза в тканях организма.

ФОСФОЭТАНОЛАМИНУРИ́Я — см. *Гипофосфатазия.*

ФОТА́РИЙ (греч. phōs, phōtos свет) — помещение, оборудованное для группового облучения людей ультрафиолетовым излучением с профилактической целью.

ФОТЕ́ ОПЕРА́ЦИЯ — хирургическая операция, предложенная для лечения хронической коронарной недостаточности, заключающаяся в перевязке большой вены сердца, денервации вен, резекции сосудистых сплетений аорты и легочного ствола с алкоголизацией этих сосудов.

ФОТИ́ЗМА (photisma; греч. phōtisma освещение) — световое ощущение, возникшее в результате раздражения какого-либо анализатора, но не зрительного (напр., при резком звуке).

ФОТО- (греч. phōs, phōtos свет) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «относящийся к свету, к световому излучению»; 2) «относящийся к фотографии».

ФОТОАЛЛЕРГЕ́НЫ (*фото-* + *аллергены*) — вещества, поступающие в организм, или продукты их превращения в организме, вызывающие повышение его фоточувствительности.

ФОТОАУТОТРО́ФЫ (*фото-* + *аутотрофы*) — организмы, способные ассимилировать углекислоту за счет использования солнечной энергии.

ФОТОВЕНТРИКУЛОГРА́ММА (*фото-* + анат. ventriculus желудочек + греч. gramma запись, изображение) — изображение полостей желудочков головного мозга (боковых и третьего), полученное с помощью фотовентрикулоскопа.

ФОТОВЕНТРИКУЛОСКО́П (*фото-* + *вентрикулоскоп*) — медицинский эндоскоп для осмотра полостей и стенок желудочков головного мозга, снабженный устройством для их фотографирования.

ФОТОГАСТРО́ГРАФ (*фото-* + *гастрограф*) — 1) (син. гастрокамера) — миниатюрная фотокамера с ярким источником света, предназначенная для фотографирования слизистой оболочки желудка; 2) прибор для фоторегистрации механических движений желудка.

ФОТОГАСТРОСКО́П (*фото-* + *гастроскоп*) — эндоскоп для исследования слизистой оболочки желудка путем ее осмотра и фотографирования.

ФОТОДЕРМАТИ́Т (photodermatitis; *фото-* + *дерматит*) — дерматит, обусловленный воздействием на кожу светового излучения (напр., солнца, электрической дуги, расплавленного металла).

ФОТОДЕРМАТО́З (photodermatosis; *фото-* + *дерматоз*; син. актинодерматоз) — дерматоз, обусловленный повышенной чувствительностью кожи к солнечному излучению.

ФОТОДОЗИ́МЕТР (*фото-* + *дозиметр*; син. дозиметр фотографический)— прибор для индивидуальной дозиметрии ионизирующих излучений, в к-ром в качестве регистрирующего элемента применена фотопленка.

ФОТОДОЗИМЕТРИ́Я (*фото-* + *дозиметрия*) в физиотерапии — измерение количества энергии оптического (инфракрасного, видимого и ультрафиолетового) излучения, падающей на облучаемую поверхность тела больного.

ФОТОКЕРАТОГРА́ММА (*фото-* + *кератограмма*) — см. *Кератограмма.*

ФОТОКЕРАТОГРАФИ́Я (*фото-* + *кератография*) — см. *Кератография.*

ФОТОКЕРАТОМЕТРИ́Я (*фото-* + греч. keras, keratos рог, вещество рога + metreō измерять, определять) — метод определения топографии передней поверхности роговицы с помощью кератограмм, напр. для расчета формы индивидуальной контактной линзы.

ФОТОКЕРАТОСКО́П (*фото-* + *кератоскоп*) — прибор для фотографирования роговицы с целью выявления отклонений ее формы и ориентировочной оценки роговичного астигматизма.

ФОТОКИМО́ГРАФ (*фото-* + *кимограф*) — регистрирующее устройство с лентопротяжным механизмом, осуществляющее запись информации на фотопленке или фотобумаге с помощью све-

тового луча, отклоняемого от среднего положения.

ФОТОКОАГУЛЯ́ТОР (*фото-* + лат. coagulo, coagulatum вызывать свертывание; син. светокоагулятор) — аппарат для коагулирования тканей путем воздействия мощным потоком светового излучения, источником к-рого могут быть, напр., лазеры, ксеноновые лампы.

ФОТОКОАГУЛЯ́ЦИЯ (*фото-* + *коагуляция*; син. светокоагуляция) — искусственная коагуляция патологически измененных тканей путем воздействия мощным потоком светового излучения, напр. ксеноновой лампы или лазера; используется гл. обр. в офтальмологии, напр. при отслойке сетчатки, небольших опухолях глазного дна.

ФОТОКОЛЬПОСКО́П (*фото-* + *кольпоскоп*) — эндоскопический прибор для осмотра и фотографирования влагалища и шейки матки, представляющий собой соединение кольпоскопа с фотоаппаратом.

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ (*фото-* + *люминесценция*) — люминесценция, возникающая под действием ультрафиолетового или видимого излучения; используется при лабораторных исследованиях.

ФОТО́МЕТР (*фото-* + греч. metreō измерять) — оптический прибор для измерения нек-рых световых величин (силы света, светового потока, освещенности, яркости и др.); различные Ф. широко используются в клинико-биохимических и гигиенических исследованиях.

ФОТОМЕТРИ́Я (*фото-* + греч. metreō измерять) — совокупность методов измерения энергетических параметров оптического излучения, характеризующих процессы его испускания, распространения, поглощения и рассеяния.

Ф. АБСОРБЦИО́ННАЯ — Ф., основанная на измерении светопоглощения анализируемым объектом; применяется в лабораторной практике, напр. для количественного анализа биологически активных веществ.

Ф. ПЛА́МЕННАЯ (син. ф. эмиссионная) — Ф., основанная на измерении спектральных характеристик исследуемых веществ; применяется, напр., для определения ионного состава биологических жидкостей.

Ф. ЭМИССИО́ННАЯ — см. *Фотометрия пламенная.*

ФОТОНИСТАГМОГРАФИ́Я (*фото-* + *нистагмография*) — метод исследования нистагма путем регистрации на фотокимографе колебаний луча света, отраженного зеркалом, помещенным на глазное яблоко.

ФОТООКИСЛИ́ТЕЛИ — см. *Фотооксиданты.*

ФОТООКСИГЕМО́ГРАФ (*фото-* + *оксигемограф*) — см. *Оксигемограф.*

ФОТООКСИГЕМО́МЕТР (*фото-* + *оксигемометр*) — см. *Оксигемометр.*

ФОТООКСИДА́НТЫ (син. фотоокислители) — обладающие окислительными свойствами продукты фотохимических реакций, протекающих в загрязненном атмосферном воздухе под влиянием ультрафиолетового излучения Солнца; оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки; входят в состав «смога».

ФОТООФТАЛЬМИ́Я (photoophthalmia; *фото-* + *офтальмия*) — поражение конъюнктивы и кожи век ультрафиолетовым, мощным видимым или инфракрасным излучением, проявляющееся слезотечением, светобоязнью и блефароспазмом.

ФОТООФТАЛЬМОМЕТРИ́Я (*фото-* + *офтальмометрия*) — метод определения преломляющей силы оптических сред глаза, заключающийся в фотографировании оптических срезов, получаемых с помощью щелевой лампы, и последующем их измерении на фотоснимках.

ФОТООФТАЛЬМОТОНО́МЕТР (*фото-* + *офтальмотонометр*; син. электротонометр) — прибор для измерения внутриглазного давления фотоэлектрическим способом.

ФОТОПЕРИОДИ́ЗМ — совокупность изменений интенсивности обмена веществ и энергии, обусловленных изменением освещенности окружающей среды (гл. обр. сменой дня и ночи).

ФОТОПРОТЕ́КЦИЯ (*фото-* + лат. protectio прикрытие, защита) — снижение чувствительности микроорганизмов к ультрафиолетовому излучению с длиной волны 253 *нм* после предварительного ультрафиолетового облучения с длиной волны 320—370 *нм.*

ФОТОПСИ́Я (photopsia; *фото-* + греч. opsis зрение) — появление в поле зрения мелькающих искр, пятен, зигзагообразных линий и т. п.; возникает при поражениях сетчатки, а также в качестве элементарных зрительных галлюцинаций при нек-рых психических расстройствах.

ФОТОРЕАКТИВА́ЦИЯ (*фото-* + *реактивация*) — реактивация бактериофага, инактивированного воздействием ультрафиолетового излучения, наступающая после облучения инфицированной бактериальной клетки видимым светом.

ФОТОРЕНТГЕНО́ГРАФ (устар.) — см. *Флюорограф.*

ФОТОРЕНТГЕНОГРАФИ́Я (устар.) — см. *Флюорография.*

ФОТОРЕЦЕ́ПТОРЫ в физиологии человека (*фото-* + *рецепторы*) — см. *Рецепторы зрительные.*

ФОТОСЕНСИБИЛИЗА́ЦИЯ (*фото-* + *сенсибилизация*) — повышение чувствительности организма к действию солнечного излучения, выражающееся обычно воспалением подвергшихся воздействию света участков кожи и слизистых оболочек.

ФОТОСЕНСИБИЛИЗИ́РУЮЩИЕ СРЕ́ДСТВА — лекарственные средства, увеличивающие чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетового излучения и стимулирующие образование в ней меланина; применяются при лечении витилиго и гнездной алопеции (бероксан, аммифурин, псорален, пеуцеданин).

ФОТОСТИМУЛЯ́ТОР (*фото-* + *стимулятор*) — прибор, генерирующий световые сигналы с заданными параметрами (интенсивностью, длительностью, частотой и т. п.) для воздействия на зрительный анализатор.

ФОТОСТРЕ́СС (*фото-* + *стресс*; син. световой удар) — эффект воздействия на глаз интенсивного светового раздражения, характеризующийся временным более или менее значительным понижением зрительных функций (остроты зрения, цветоощущения и др.).

ФОТОСТРЕ́СС-ТЕСТ (*фото-* + *стресс* + *тест*) — метод исследования зрительного анализатора, основанный на вызывании временного понижения какой-либо зрительной функции воздействием на глаз сильным световым раздражителем с последующим измерением времени восстановления этой функции.

ФОТОТА́КСИС (*фото-* + *таксис*) — таксис, вызванный воздействием оптического излучения.

ФОТОТЕРАПИ́Я (*фото-* + *терапия*) — см. *Светолечение.*

ФОТОФОБИ́Я (photophobia; *фото-* + *фобия*) — 1) возникновение приступа судорог при воздействии светового раздражителя — симптом бешенства; 2) см. *Светобоязнь.*

ФОТОФОНОСТИМУЛЯ́ТОР (*фото-* + греч. phōnē звук, голос + *стимулятор*) — прибор, генерирующий световые и звуковые сигналы с заданными параметрами (интенсивностью, длительностью, частотой и т. п.) для воздействия на зрительный и слуховой анализаторы.

ФОТОХИМИ́ЧЕСКАЯ РЕА́КЦИЯ — общее название химических реакций, возбуждаемых оптическим излучением, напр. в фотосенсорных клетках сетчатки.

ФОТОХРОМАТИ́ЧЕСКИЙ ИНТЕРВА́Л — см. *Бесцветный интервал.*

ФОТОЦИСТОСКО́П (*фото-* + *цистоскоп*) — эндоскопический прибор для осмотра и фотографирования полости и внутренней поверхности мочевого пузыря.

ФОТОЦИСТОСКОПИ́Я (*фото-* + *цистоскопия*) — метод исследования мочевого пузыря, основанный на фотографировании его слизистой оболочки.

ФОТОЦИТОМЕТРИ́Я (*фото-* + *цитометрия*) — см. *Цитоспектрофотометрия.*

ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИ́МЕТР (*фото-* + электрический + *колориметр*) — прибор для определения концентрации вещества в растворе по величине поглощения монохроматического света; в биологии и медицине используется, напр., для качественного и количественного анализа биологически активных веществ и лекарственных средств.

ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРИ́Я — общее название методов определения концентрации веществ в растворе с помощью фотоэлектроколориметров.

ФОТОЭЛЕКТРОПЛЕТИЗМО́ГРАФ (*фото-* + электроплетизмограф) — прибор для определения изменений объема органа, обусловленных его кровенаполнением, и основанный на преобразовании этих изменений в изменения электрического напряжения или силы тока, регистрируемые при помощи фотозаписи.

ФО́ХТА МЕ́ТОД ВНУШЕ́НИЯ — метод гипнотерапии, при к-ром требуемой глубины гипноза достигают путем неоднократного чередования погружения больного в это состояние и быстрого выведения из него.

ФОША́РА БОЛЕ́ЗНЬ (истор.; P. Fauchard, 1678—1761, франц. стоматолог) — см. *Пародонтоз.*

FRAGILITAS ÓSSIUM (лат. «ломкость костей») — см. *Остеогенез несовершенный.*

Fab-ФРАГМЕ́НТ (лат. fragmentum обломок, кусок) — часть молекулы иммуноглобулина, отщепляемая папаином и состоящая из легкой цепи и аминоконцевой половины тяжелой цепи; несет антидетерминанту антитела.

Fc-ФРАГМЕ́НТ — часть молекулы иммуноглобулина, отщепляемая с помощью папаина и состоящая из двух С-концевых участков тяжелых цепей; не взаимодействует с антигеном; с Fc-фрагментом связаны способности иммуноглобулина фиксироваться на клетках, связывать комплемент, участвовать в реакции пассивной кожной анафилаксии.
Fd-ФРАГМЕ́НТ — аминоконцевая половина тяжелой цепи иммуноглобулина; участвует в построении антидетерминанты антитела.
ФРАГМЕНТА́ЦИЯ МИОКА́РДА (fragmentatio myocardii) — распад мышечных волокон миокарда на отдельные фрагменты; наблюдается, напр., при ишемической болезни сердца.
ФРАГМЕНТА́ЦИЯ ПОДНО́ЖНОЙ ПЛАСТИ́НКИ СТРЕ́МЕНИ — хирургическая операция при отосклерозе, заключающаяся в разделении основания (подножной пластинки) стремени на части.
ФРА́КМАНА БУЖ-ПЕРФОРА́ТОР (Э. А. Фракман, род. в 1894 г., сов. уролог) — инструмент для тоннелизации непроходимых стриктур заднего отдела мочеиспускательного канала и шейки мочевого пузыря; представляет собой трубку для бужирования со скрытым в ней ножом, выдвигаемым нажатием кнопки, расположенной на рукояти инструмента.
ФРАКЦИОНА́ТОР КРО́ВИ (лат. fractio разламывание, дробление; син. гемофракционатор) — центрифуга, оснащенная приспособлениями для разделения крови на фракции.
ФРАМБЕ́ЗИД (framboesidum; *фрамбезия* + греч. -eidēs подобный) — общее название высыпаний на коже при фрамбезии.
Ф. ЛИХЕНО́ИДНЫЙ (f. lichenoideum) — Ф. в виде множественных мелких плотных лихеноидных папул.
Ф. ЛЮПО́ИДНЫЙ (f. lupoideum) — Ф. в виде мелких мягких сливающихся папул, распадающихся с образованием грубо рубцующихся язв.
Ф. ПАПУЛЁЗНЫЙ (f. papulosum) — Ф. в виде папулы розового цвета с центральным западением, постепенно покрывающейся веррукозными разрастаниями, внешне напоминающими ягоды малины.
Ф. ПИГМЕ́НТНЫЙ (f. pigmentosum) — Ф. в виде пигментных пятен неправильной формы, покрытых серебристо-белыми отрубевидными чешуйками.
Ф. ПЯТНИ́СТЫЙ (f. maculatum) — Ф. в виде отечных пятен розового цвета диаметром до 1 *см*, трансформирующихся в папулы или оставляющих после себя участки атрофии кожи.
ФРАМБЕЗИО́МА (framboesioma; *фрамбезия* + *-ома*) — фрамбезид в виде крупной папулы.
ФРАМБЕ́ЗИЯ (framboesia; франц. framboise малина; син.: гангоза, гранулема тропическая, пиан, сифилис невенерический, сифилис тропический, фрамбезия тропическая) — тропическая инфекционная болезнь из группы спирохетозов, вызываемая Treponema pertenue и характеризующаяся поражением кожи, а также костей и суставов; внутренние органы при Ф. не поражаются.
Ф. ВТОРИ́ЧНАЯ (f. secundaria) — стадия Ф., развивающаяся в результате генерализации инфекции и характеризующаяся обильной сыпью на туловище и конечностях.
Ф. ПЕРВИ́ЧНАЯ (f. primaria) — первая стадия Ф., характеризующаяся появлением фрамбезиомы, регионарного лимфангиита и лимфаденита.
Ф. ТРЕТИ́ЧНАЯ (f. tertiaria) — последняя стадия Ф., характеризующаяся образованием гумм в коже, подкожной клетчатке, костях и суставах.
Ф. ТРОПИ́ЧЕСКАЯ (f. tropica) — см. *Фрамбезия*.
ФРАМБЕЗИ́Я БРАЗИ́ЛЬСКАЯ (framboesia braziliana) — см. *Фрамбезия лесная*.
ФРАМБЕЗИ́Я ЛЕСНА́Я (син. фрамбезия бразильская) — клинико-эпидемиологический вариант кожного лейшманиоза Нового света, вызываемый Leishmania braziliensis guyanensis, эндемичный для Гайаны и Суринама; по проявлениям сходна с бразильским кожно-слизистым лейшманиозом, но слизистые оболочки при Ф. л. поражаются несколько реже.
ФРА́НГИ — см. *Беджель*.
ФРА́НКА ГАСТРОСТОМИ́Я (R. Frank, 1862—1913, австрийский хирург) — хирургическая операция: наложение желудочного свища путем проведения вытянутой в виде конуса стенки желудка через подкожную клетчатку и подшивание к краям дополнительного разреза кожи выше левой реберной дуги.
ФРА́НКА ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКАЯ АЛЕЙКИ́Я (истор.; A. E. Frank, род. в 1884 г., нем. врач) — сочетание агранулоцитоза и тромбоцитопении, проявляющееся геморрагическим диатезом.
ФРА́НКА ДЕЗИНФЕ́КЦИЯ БУЖЕ́Й — метод дезинфекции бужей парами формальдегида в стеклянном сосуде или в пароформалиновой камере в течение 24 часов.
ФРА́НКА КАТЕТЕРИЗА́ЦИЯ СЛУХОВО́Й ТРУБЫ́ — вдувание воздуха в среднее ухо через слуховую (евстахиеву) трубу с помощью катетера, ориентирами для введения к-рого служат глоточный карман и хрящевой валик слуховой трубы.
ФРА́НКА СИМПТО́М (A.E.Frank, род. в 1884 г., нем. врач) — наличие на коже спины и груди сети расширенных капилляров; наблюдается при туберкулезе легких или туберкулезном бронхадените.
ФРА́НКА ЭССЕНЦИА́ЛЬНАЯ ТРОМБОПЕ́НИЯ (устар.; A. E. Frank, род. в 1884 г., нем. врач) — см. *Псевдогемофилия печеночная*.
ФРА́НКА — СТА́РЛИНГА ЗАКО́Н (O. Frank, 1865—1944, нем. физиолог; E. H. Starling, 1866—1927, англ. физиолог) — см. *Старлинга закон*.
ФРА́НКЕ ИГЛА́ (истор.; K.E. Francke, 1859—1920, нем. врач) — инструмент для прокола кожи с целью получения пробы крови, представляющий собой трубку с ланцетовидной иглой и пружиной, выталкивающей иглу на регулируемую длину.
ФРАНКЛИНИЦИЗА́ЦИЯ — см. *Душ электростатический общий*.
ФРА́НКЛЬ-ХО́ХВАРТА СИНДРО́М (L. Frankl-Hochwart, 1862—1914, австрийский невропатолог) — сочетание двусторонней глухоты и атаксии с застойными дисками зрительных нервов, концентрическим сужением полей зрения, парезом взора вверх; наблюдается при опухолях шишковидного тела.
ФРА́НКФУРТСКАЯ ГОРИЗОНТА́ЛЬ — см. *Глазнично-ушная горизонталь*.
ФРА́НСИСА БОЛЕ́ЗНЬ (истор.; E. Francis, 1872—1957, амер. бактериолог) — см. *Туляремия*.
FRANCISELLA TULARÉNSIS — см. *Палочка туляремийная*.
ФРАНСУА́ ДИСТРОФИ́Я РОГОВИ́ЦЫ (J. François, род. в 1907 г., бельг. офтальмолог; син. дистрофия роговицы семейная крапчатая) — наследственная дистрофия роговицы с развитием на обоих глазах множественных мелких сероватых очагов помутнения в ее строме; проявляется небольшой светобоязнью.
ФРА́НЦА ШИ́НА (C. A. Franz, род. в 1870 г., нем. хирург) — транспортная шина для иммобилизации нижней конечности без вытяжения при повреждениях бедра и тазобедренного сустава; выполнена в виде желоба на участке, накладываемом на бедро, и уплощена в верхней части, прилегающей к туловищу.
ФРА́НЦЕЛЯ СИМПТО́М (Frantzel) — диастолический шум над верхушкой сердца, начинающийся со вторым тоном сердца, к середине диастолы постепенно ослабевающий (или исчезающий), но затем вновь усиливающийся и сливающийся с первым тоном следующего сердечного цикла; признак стеноза левого предсердно-желудочкового отверстия.
ФРАНЦУ́ЗОВА ОПЕРА́ЦИЯ (Б. Л. Французов, сов. оториноларинголог) — модификация радикальной операции на среднем ухе: разрез серповидной формы производится так, чтобы верхняя стенка наружного слухового прохода осталась покрытой кожей.
ФРАНЦУ́ЗСКИЙ СПО́СОБ ПЛА́СТИКИ — см. *Цельса метод пластики*.
ФРАНЦУ́ЗСКИЙ ТИП ИММУНОПАРЕ́ЗА — см. *Алимфоцитоз*.
ФРАНЧЕСКЕ́ТТИ ЭКТОДЕРМА́ЛЬНАЯ ДИСПЛАЗИ́Я (A. Franceschetti, 1896—1968, швейц. офтальмолог) — см. *Дисплазия эктодермальная врожденная гидротическая*.
ФРАНЧЕСКЕ́ТТИ — ЦВА́ЛЕНА СИНДРО́М (A. Franceschetti, 1896—1968, швейц. офтальмолог; P. Zwahlen, 1916—1972, швейц. офтальмолог) — см. *Дизостоз челюстно-лицевой*.
ФРАНЧЕСКЕ́ТТИ — ЯДАССОНА СИНДРО́М (A. Franceschetti, 1896—1968, швейц. офтальмолог; W. Jadassohn, 1897—1973, швейц. дерматолог) — см. *Негели синдром*.
ФРЕГО́ЛИ СИМПТО́М (по имени итал. актера L. Fregoli; 1867—1936) — разновидность симптома Капгра, при к-ром больного якобы преследует лицо, перевоплощающееся в различные известные ему лица.
ФРЕДЕ́ — РА́МШТЕДТА ПИЛОРОТОМИ́Я (P. Fredet, 1870—1946, франц. хирург; W. C. Ramstedt, 1867—1963, нем. хирург; син. пилоропластика экстрамукозная) — хирургическая операция: продольное рассечение серозно-мышечного слоя привратника без разреза слизистой оболочки; предложена для лечения пилоростеноза.
ФРЕДЕРИ́КА СИНДРО́М (L. Fredericq, 1851—1935, бельг. физиолог) — см. *Фредерика феномен*.
ФРЕДЕРИ́КА ФЕНО́МЕН (L. Fredericq; син. Фредерика синдром) —

сочетание мерцания предсердий с полной атриовентрикулярной блокадой; клинически проявляется только очень редким ритмичным пульсом и распознается на основании данных электрокардиографии.

ФРЕЗА́ (франц. fraise) — многолезвийный вращающийся режущий инструмент для обработки твердых материалов; в медицине Ф. применяются при хирургических вмешательствах на плотной ткани (кости, зубы).

ФРЕЙ СИМПТО́М (L. Frey, совр. франц. врач; син. симптом балкона) — выступание лба над лицевой частью черепа; признак гидроцефалии.

ФРЕЙ СИНДРО́М (L. Frey) — см. *Синдром ауриколотемпоральный.*

ФРЕЙ — БАЙЯРЖЕ́ СИНДРО́М (L. Frey, совр. франц. врач; J. G. F. Baillarger, 1809—1890, франц. психиатр) — см. *Синдром ауриколотемпоральный.*

ФРЕЙБЕ́РГА БОЛЕ́ЗНЬ (A. H. Freiberg, 1869—1940, амер. хирург) — остеохондропатия головки II плюсневой кости, проявляющаяся отеком тыла стопы, болями в области плюснефаланговых суставов, усиливающимися при надавливании на головку II плюсневой кости.

ФРЕ́ЙДА ПРИ́НЦИП РЕА́ЛЬНОСТИ (S. Freud, 1856—1939, австрийский психиатр и психолог) — положение учения Фрейда, согласно к-рому поведение человека, направленное на удовлетворение его влечений и желаний коррегирует с требованиями окружающего реального мира.

ФРЕ́ЙДА ПРИ́НЦИП УДОВО́ЛЬСТВИЯ (S. Freud) — положение учения Фрейда, согласно к-рому в основе поведения человека с раннего детства лежит стремление к достижению удовольствия и к избежанию неудовольствия.

ФРЕ́ЙДА УЧЕ́НИЕ (S. Freud) — идеалистическая теория, трактующая психику человека в целом как сферу господства бессознательных сексуальных влечений к удовольствию (либидо), к-рые, маскируясь, проникают в сознание и постоянно угрожают духовному единству «Я», определяют формирование личности, ее поведение, социальное отношение, становятся причиной неврозов и психозов.

ФРЕ́ЙДЕНТАЛЯ ПАПУЛЁЗНАЯ МИКСЕДЕ́МА КО́ЖИ (W. Freudenthal, нем. дерматолог) — см. *Муциноз кожи папулезный.*

ФРЕЙДИ́ЗМ — общее название направлений в современной буржуазной науке (психиатрии, психологии, социологии, антропологии, литературоведении и др.), пытающихся объяснить явления психики и общественной жизни с помощью учения Фрейда.

ФРЕ́ЙДИНА ЛИНЕ́ЙКА (Л. М. Фрейдин, род. в 1909 г., сов. рентгенолог) — прибор для рентгенологического определения глубины залегания инородного тела путем пересчета параллаксного смещения объекта при его рентгенографии с двух направлений.

ФРЕ́ЙЕРА АДЕНОМЭКТОМИ́Я (P. J. Freyer, 1851—1921, англ. хирург) — хирургическая операция: удаление аденомы предстательной железы через мочевой пузырь после надлобковой цистотомии.

ФРЕ́ЙКИ ПОДУ́ШКА (B. Frejka, 1890—1972, австрийский ортопед) — приспособление для лечения дисплазии тазобедренного сустава, представляющее собой подушку, фиксируемую на туловище и бедрах ребенка и удерживающую их в положении сгибания и отведения в тазобедренных суставах.

ФРЕ́ЙНДА АДЪЮВА́НТ (J. Th. Freund, 1890—1960, амер. патолог; син. Фрейнда адъювант полный) — адъювант, представляющий собой масляную эмульсию, содержащую деривaты ланолина (жирные кислоты) и вакцину БЦЖ или липополисахариды микобактерий туберкулеза.

ФРЕ́ЙНДА АДЪЮВА́НТ НЕПО́ЛНЫЙ (J. Th. Freund) — адъювант Фрейнда, в состав к-рого не входит вакцина БЦЖ или какие-либо фракции микобактерий туберкулеза.

ФРЕ́ЙНДА АДЪЮВА́НТ ПО́ЛНЫЙ (J. Th. Freund) — см. *Фрейнда адъювант.*

ФРЕ́ЙФЕЛЬДА ОКРА́СКА (Е. И. Фрейфельд, 1888—1960, сов. гематолог) — метод выявления патологической зернистости нейтрофилов, заключающийся в окраске мазков крови карболфуксин-метиленовым синим.

ФРЕ́ЛИХА БОЛЕ́ЗНЬ (A. Fröhlich, 1871—1953, австрийский невропатолог и фармаколог) — см. *Дистрофия адипозогенитальная.*

ФРЕ́ЛИХА СИНДРО́М (A. Fröhlich) — см. *Дистрофия адипозогенитальная.*

FREMISSEMENT CATAIRE (франц.) — см. *Кошачье мурлыканье.*

ФРЕНЕЗИ́Я (истор.; греч. phrēn ум, разум) — см. *Френит.*

ФРЕНИКО- (анат. nervus phrenicus диафрагмальный нерв) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к диафрагмальному нерву».

ФРЕНИКОАЛКОГОЛИЗА́ЦИЯ (phrenicoalcoholisatio; *френико-* + *алкоголизация*) — хирургическая операция: введение в ствол диафрагмального нерва 1—2 *мл* 85% этилового спирта; метод коллапсохирургии.

ФРЕНИКОТОМИ́Я (phrenicotomia; *френико-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: пересечение диафрагмального нерва; метод коллапсотерапии.

ФРЕНИКОТРИПСИ́Я (phrenicotripsia; *френико-* + греч. tripsis растирание, раздавливание) — хирургическая операция: раздавливание (размозжение) обнаженного диафрагмального нерва; метод коллапсохирургии.

ФРЕНИКОЭКЗЕРЕ́З (устар.; phrenicoexaeresis; *френико-* + греч. exairesis изъятие, извлечение) — хирургическая операция: выкручивание или вырывание диафрагмального нерва в его шейном отделе; метод коллапсохирургии.

ФРЕ́НИКУС-СИМПТО́М (phrenicus-symptoma; анат. nervus phrenicus диафрагмальный нерв) — см. *Георгиевского — Мюсси симптом.*

ФРЕНИ́Т [истор. phrenitis; греч. phrēnitis (nosos) душевная болезнь, безумие, помешательство; син.: френезия, френолепсия] — обозначение психических расстройств, возникших при лихорадочных состояниях; термин использовался в 19 в.

ФРЕ́НКЕЛЬ МЕ́ТОД — метод выделения гемокультуры возбудителей сепсиса, заключающийся в посеве крови на регенерированную питательную среду Тароцци.

ФРЕ́НКЕЛЯ ДИПЛОКО́КК (A. Fränkel, 1848—1916, австрийский врач) — см. *Пневмококк.*

ФРЕ́НКЕЛЯ СИМПТО́М (A. Fränkel, 1848—1916, австрийский врач) — пониженный тонус мышц тазового пояса при tabes dorsalis.

ФРЕ́НКЕЛЯ СРЕДА́ — питательная среда для культивирования Balantidium coli, содержащая молочнокислый аммоний, аспарагиновокислый натрий, лошадиную сыворотку, фосфат калия и хлорид натрия.

ФРЕ́НКНЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (P. Frenckner, совр. отолог) — хирургическая операция: вскрытие гнойного очага в верхушке пирамиды височной кости доступом через полукружные каналы; производят только при отсутствии функции лабиринта.

ФРЕ́НО- — 1) (греч. phrēn, phrēnes грудобрюшная преграда, диафрагма) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к диафрагме», «диафрагмальный»; 2) (греч. phrēn средоточие чувств, душевных свойств) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к уму, к психическим свойствам человека».

ФРЕНОКАРДИ́Я (*френо-* + греч. kardia сердце) — психогенно обусловленная боль в области сердца.

ФРЕНОЛЕПСИ́Я (истор.; phrenolepsia; френо- + греч. lēpsis нападение, приступ) — см. *Френит.*

ФРЕНОЛО́ГИЯ (истор.; *френо-* + греч. logos учение) — антинаучная теория о возможности распознавания характерологических и других психических особенностей человека по форме его черепа.

ФРЕНОПТО́З (phrenoptosis; *френо-* + греч. ptōsis опущение) — опущение диафрагмы.

ФРЕНОСПА́ЗМ (phrenospasmus; *френо-* + *спазм*) — см. *Кардиоспазм.*

ФРЕНЭКТОМИ́Я (frenectomia; лат. frenulum уздечка + *эктомия*) — хирургическая операция: иссечение уздечки языка или губы.

ФРЕ́ШЕЛЬСА СИМПТО́М (E. Fröschels, род. в 1883 г., австрийский оториноларинголог) — пониженная тактильная чувствительность кожи наружного слухового прохода; наблюдается при отосклерозе.

ФРЕ́ШЕЛЬСА — ЦЕ́МАХА РЕФЛЕ́КС (E. Fröschels, род. в 1883 г., австрийский оториноларинголог) — физиологический рефлекс: отклонение глазных яблок в сторону источника звука с одновременным наклоном головы и туловища в противоположную сторону.

ФРЕ́Я ПРО́БА (M. V. Frey, 1852—1932, нем. физиолог) — метод выявления роговичного рефлекса, заключающийся в касании роговицы тонким волоском.

ФРЕ́Я ПУЧО́К (E. Frey) — совокупность волокон зрительного нерва, идущих к ядрам гитоталамуса.

ФРЕ́Я РЕАКТОГЕ́Н (W. S. Frei, 1885—1943, нем. дерматолог) — аллерген, применяемый для диагностики пахового лимфогранулематоза; изготовляется из гноя невскрывшегося бубона.

ФРЕ́Я РЕА́КЦИЯ (W. S. Frei, 1885—1943, нем. дерматолог) — внутрикожная аллергическая диагностическая проба при паховом лимфогранулематозе с реактогеном Фрея.

ФРИГИ́ДНОСТЬ (frigiditas; лат. frigidus холодный) — см. *Половая холодность.*

ФРИ́ДЛАНДА АРТРОДЕ́З (М. О. Фридланд, 1888—1967, сов. ортопед-травматолог) — внесуставной артродез голеностопного сустава, при к-ром на передневнутренней поверхности большеберцовой кости формируют костный аутотрансплантат и перемещают его в щель, создаваемую между внутренней лодыжкой, таранной и пяточной костями; одновременно производят укорочение разгибателей стопы и ее пальцев.

ФРИ́ДЛАНДА КО́СТНЫЙ ШОВ (М. О. Фридланд) — соединение отломков костей с помощью желобоватых металлических зондов, вводимых в костномозговой канал.

ФРИ́ДЛАНДА ЛИ́РА (М. О. Фридланд) — устройство для лечения контрактур кисти и пальцев, представляющее собой фигурную металлическую раму, снабженную эластичными тягами для пальцев, прикрепляемую к предплечью с помощью съемной гипсовой или кожаной гильзы.

ФРИ́ДЛАНДА МЕ́ТОД АЛКОГОЛИЗА́ЦИИ (М. О. Фридланд) — вариант спирт-новокаиновой блокады, при к-ром основным анестезирующим средством является раствор, содержащий 2 *г* новокаина в 80 *мл* 95% этилового спирта с 20 *мл* дистиллированной воды.

ФРИ́ДЛАНДА ОПЕРА́ЦИЯ (М. О. Фридланд) — 1) хирургическая операция при привычном вывихе плеча, заключающаяся в создании акромиально-плечевой и клювовидно-плечевой связок с помощью фасциальной ленты, выкроенной из широкой фасции бедра; 2) хирургическая операция при привычном вывихе надколенника, заключающаяся в мобилизации прямой мышцы бедра вместе со связкой надколенника, их перемещении в медиальном направлении с фиксацией к сухожилиям портняжной, большой приводящей и медиальной широкой мышц бедра и ушивании суставной капсулы с медиальной стороны в продольную складку.

ФРИ́ДЛАНДА ПОДОМЕТРИ́Я (М. О. Фридланд) — см. *Подометрия*.

ФРИ́ДЛАНДА — ЦИПО́РКИНА ЛИ́РА (М. О. Фридланд, 1888—1967, сов. ортопед-травматолог) — устройство для лечения контрактур кисти и пальцев, представляющее собой овальную металлическую дугу, снабженную металлическими ползунами с эластичными тягами для пальцев, прикрепляемую к предплечью с помощью манжеты.

ФРИ́ДЛЕНДЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (устар.; C. Friedländer, 1847—1887, нем. патологоанатом) — см. *Эндартериит облитерирующий*.

ФРИ́ДЛЕНДЕРА ПА́ЛОЧКА (C. Friedländer, 1847—1887, нем. патологоанатом) — см. *Клебсиелла пневмонии*.

ФРИ́ДЛЕНДЕРОВСКАЯ ПНЕВМО́НИЯ (C. Friedländer, 1847—1887, нем. патологоанатом) — очаговая или долевая пневмония, вызываемая клебсиеллой пневмонии и характеризующаяся обильным образованием слизеподобного экссудата и тенденцией воспалительных очагов подвергаться некрозу.

ФРИ́ДМАНА РЕА́КЦИЯ (М. Н. Friedman, род. в 1903 г., амер. физиолог) — метод диагностики ранних сроков беременности, основанный на обнаружении изменений в яичниках и матке крольчихи после введения ей в ушную вену женской мочи; реакция положительная, если в моче содержится хорионический гонадотропин.

ФРИ́ДМАННА СИНДРО́М (M. Friedmann, 1858—1925, нем. невропатолог) — 1) сочетание интенсивных головных болей, головокружения, раздражительности, чувства тоски, страха, бессонницы и понижения памяти; наблюдается при посттравматической энцефалопатии в связи с сосудистыми нарушениями в головном мозге (расширение мелких сосудов и капилляров, капиллярные геморрагии); 2) см. *Пикнолепсия*.

ФРИ́ДРЕЙХА НАСЛЕ́ДСТВЕННАЯ АТАКСИ́Я (N. Friedreich, 1825—1882, нем. врач) — наследственная болезнь, характеризующаяся прогрессирующей атаксией, деформациями скелета (позвоночника, грудной клетки, стоп и др.), дистрофическими изменениями миокарда; наследуется по аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному типу.

ФРИ́ДРЕЙХА СИМПТО́М (N. Friedreich) — некоторое спадение набухших яремных вен в фазе диастолы сердца; непостоянный признак констриктивного перикардита.

ФРИ́ДРЕЙХА СТОПА́ (N. Friedreich) — деформация стопы в виде ее укорочения, избыточно высокого свода и неправильного положения пальцев (основные фаланги разогнуты, ногтевые согнуты); наблюдается, напр., при наследственной атаксии Фридрейха.

ФРИ́ДРЕЙХА ФЕНО́МЕН (N. Friedreich) — повышение и укорочение тимпанического перкуторного звука на вдохе (по сравнению с выдохом); наблюдается над большой полостью в легком.

ФРИ́ДРИХА СИНДРО́М (H. Friedrich, род. в 1893 г., нем. хирург) — асептический субхондральный некроз грудинного конца ключицы, проявляющийся болезненным отеком и покраснением в области грудинно-ключичного сочленения.

ФРИ́ДРИХА СПО́СОБ (P. L. Friedrich, 1864—1916, нем. хирург) — способ первичной хирургической обработки раны, заключающийся в иссечении ее стенок и дна в пределах неповрежденных тканей.

ФРИ́КА ОПЕРА́ЦИЯ (G. Frick, 1793—1870, амер. офтальмолог) — способ блефаропластики, при к-ром дефект замещают лоскутом на ножке, выкраиваемым из кожи соседних областей (лба, щеки, височной области).

ФРИ́КЦИИ КОПУЛЯТИ́ВНЫЕ (лат. frictio трение) — движения полового члена во влагалище во время коитуса.

ФРИНОДЕ́РМА (phrynoderma; греч. phrynos жаба + derma кожа; син. кератоз фолликулярный авитаминозный) — фолликулярный кератоз, при к-ром участки ороговения окружены зоной депигментации; проявление гиповитаминоза А.

Ф. ГИПОТИРЕОТИ́ЧЕСКАЯ (p. hypothyreoticum; син. Вилановы — Каньяделя синдром) — Ф., локализующаяся гл. обр. на спине и конечностях, сочетающаяся с признаками гипотиреоидизма; встречается у лиц молодого возраста.

ФРИ́ЧА ПОЛОВА́Я СТЕРИЛИЗА́ЦИЯ (H. Fritsch, 1844—1915, нем. хирург) — хирургическая операция: перевязка каждой из маточных труб в двух местах и их резекция между местами перевязки с целью выключения генеративной функции.

ФРИ́ША СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШОВ (O. Frisch, род. в 1877 г., австрийский хирург) — способ соединения концов сухожилий швом, проведенным внутриствольно четырьмя стежками на каждом конце с узлом на поверхности сухожилия.

ФРИ́ША — ВОЛКО́ВИЧА ПА́ЛОЧКА (Klebsiella rhinoscleromatis, Ber; A. R. Frisch, 1849—1917, нем. врач; Н. М. Волкович, 1858—1928, сов. хирург; син. палочка риносклеромы) — вид бактерий рода Klebsiella, сем. Enterobacteriaceae; неподвижная, грамотрицательная палочка с закругленными концами, располагающаяся одиночно или короткими цепями, не образующая спор, образующая капсулу; аэроб или факультативный анаэроб; возбудитель склеромы у человека.

ФРО́ЛИКА НЕСОВЕРШЕ́ННЫЙ ОСТЕОГЕНЕ́З (W. Vrolik, 1801—1863, голландский врач) — см. *Остеогенез несовершенный врожденный*.

ФРО́ЛИКА СИНДРО́М (W. Vrolik) — см. *Остеогенез несовершенный врожденный*.

ФРОМА́НА — ВЕГЕЛИ́НА СИНДРО́М (J. Froment, 1878—1946, франц. невропатолог; Wegelin) — парестезии рук в виде ощущения жжения и (или) болей, возникающие по ночам у женщин с повышенной возбудимостью симпатической части вегетативной нервной системы.

ФРОНТА́ЛЬНЫЙ (frontalis, лат. frons, frontis лоб) в медицине — 1) лобный, относящийся ко лбу; 2) относящийся к вертикальной плоскости, перпендикулярной к сагиттальной плоскости.

ФРОНТИ́Т (frontitis; анат. sinus frontalis лобная пазуха + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки лобной пазухи.

Ф. О́СТРЫЙ (f. acuta) — Ф., проявляющийся припухлостью и болями в соответствующей половине лба, затруднением носового дыхания, гиперемией и отеком слизистой оболочки носа; может сопровождаться повышением температуры тела.

Ф. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (f. chronica) — длительно протекающий Ф., проявляющийся периодическими болями в соответствующей половине лба и выделениями из носа, гиперплазией слизистой оболочки с развитием полипов и грануляций.

ФРОНТООРБИТА́ЛЬНЫЙ (лат. frons, frontis лоб + анат. orbita глазница) — относящийся одновременно ко лбу и глазнице.

ФРО́РИПА ГА́НГЛИЙ (A. Froriep, 1849—1917, нем. анатом) — скопление нейронов, расположенное вдоль корешков добавочного нерва у 6—8-недельного зародыша человека; в ходе последующего развития редуцируется.

ФРО́СТБЕРГА ПРИ́ЗНАК (N. Frostberg, совр. шведский рентгенолог) — деформация внутреннего контура нисходящей части двенадцатиперстной кишки в виде зеркально отраженной цифры 3; рентгенологический признак хронического панкреатита или злокачественной опухоли поджелудочной железы, прорастающей в двенадцатиперстную кишку.

ФРОТТА́Ж (франц. frottage натирание) — форма полового извращения у

мужчин, при к-ром половое возбуждение и удовлетворение достигаются трением половых органов о верхнюю одежду женщин в общественных местах.

ФРУКТО́ЗА (син. левулеза) — моносахарид класса гексоз, входящий в состав сахарозы и ряда полисахаридов, в т. ч. содержащихся в тканях растений.

ФРУКТОЗЕМИ́Я (fructosaemia; фруктоза + греч. haima кровь) — см. *Непереносимость фруктозы.*

ФРУКТОЗОБИСФОСФА́Т-АЛЬДОЛА́ЗА (син.: альдолаза — устар., кетозо-1-фосфат-альдолаза — устар.) — фермент класса лиаз (КФ 4.1.2.13), катализирующий распад Д-фруктозо-1,6-дифосфата на диоксиацетонфосфат и глицеринальдегид-3-фосфат; обнаруживается во всех органах и тканях человека, наиболее активен в мышцах и печени; повышение активности Ф.-а. в крови наблюдается при острых гепатитах, прогрессирующей мышечной дистрофии и некоторых других болезнях.

ФРУКТОЗУРИ́Я (fructosuria; фруктоза + греч. uron моча; син. левулезурия) — повышенное содержание фруктозы в моче, наблюдаемое при непереносимости фруктозы и болезнях печени.

ФРУКТОКИНА́ЗА — фермент класса трансфераз (КФ 2.7.1.4), катализирующий реакцию фосфорилирования фруктозы в печени и кишечной стенке; участвуют в углеводном обмене.

β-ФРУКТОФУРАНОЗИДА́ЗА (син.: инвертаза, сахараза) — фермент класса гидролаз (КФ 3.2.1.26), катализирующий гидролитическое расщепление β-Д-фруктофуранозидов, в том числе сахарозы на Д-фруктозу и глюкозу; участвует в переваривании углеводов в кишечнике.

ФРУСТРА́ЦИЯ (лат. frustratio обман, неудача, тщетная надежда) — 1) в психологии — состояние психики, возникающее у человека в результате осознания крушения надежд, невозможности достижения поставленных целей и проявляющееся сочетанием подавленного настроения с напряжением и тревогой; 2) в сексопатологии — эрекция, сопровождаемая эротическим возбуждением, но не завершаемая эякуляцией.

ФРУ́ЭНА СИНДРО́М (G. Froin, род. в 1874 г., франц. врач) — см. *Синдром блока.*

ФРУ́ЭНА — НО́ННЕ СИНДРО́М (G. Froin, род. в 1874 г., франц. врач; M. Nonne, 1861—1959, нем. невропатолог) — см. *Синдром блока.*

ФТИЗ-(фтизио-; греч. phthisis истощение, чахотка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к туберкулезу».

ФТИЗИАТРИ́Я (*фтиз-* + греч. iatreia лечение; син. фтизиология) — раздел клинической медицины, изучающий этиологию и патогенез туберкулеза, разрабатывающий методы его диагностики, лечения и профилактики, а также организации оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

ФТИЗИО- — см. *Фтиз-.*

ФТИЗИОЛАРИНГОЛО́ГИЯ [*фтизио-* + (*ото*)*ларингология*] — раздел оториноларингологии и фтизиатрии, посвященный туберкулезному поражению гортани, трахеи и бронхов.

ФТИЗИОЛО́ГИЯ (*фтизио-* + греч. logos учение) — см. *Фтизиатрия.*

ФТИЗИОФОБИ́Я (phthisiophobia; *фтизио-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь заразиться и заболеть туберкулезом.

ФТИЗИОХИРУРГИ́Я (phthisiochirurgia; *фтизио-* + *хирургия*) — раздел хирургии и фтизиатрии, посвященный разработке методов хирургического лечения туберкулеза легких.

ФТИРИА́З (phthiriasis; Phthirus pubis лобковая вошь + *-иаз*) — паразитирование лобковых вшей на коже, преимущественно в области лобка, бедер и нижней части живота.

ФТИРИОФОБИ́Я (phthiriophobia; греч. phtheir вошь + *фобия*) — см. *Педикулофобия.*

PHTHÍRUS PÚBIS (вошь лобковая, площица) — вид кровососущих насекомых сем. Pediculidae, отр. Anoplura; эктопаразит человека, обитающий преимущественно на коже лобка, бедер и нижней части живота.

ФТОР (Fluorum; F) — химический элемент VII группы периодической системы Д. И. Менделеева, ат. номер 9, ат. вес (масса) 18,998; относится к галогенам; бледно-желтый газ с резким запахом; соединения Ф. содержатся в тканях организма, гл. обр. в костях и зубной эмали.

ФТОР РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов фтора с массовыми числами от 17 до 21 и периодом полураспада от 5 сек. до 1,87 час.; отдельные изотопы используются с диагностической целью и в медико-биологических исследованиях.

ФТОРИ́РОВАНИЕ ВОДЫ (син. флюоризация воды) — обогащение питьевой воды растворимыми соединениями фтора (до 1—1,5 *мг/л*); проводится с целью профилактики кариеса зубов.

ФУА́ СИНДРО́М (Ch. Foix, 1882—1927, франц. невропатолог) — см. *Синдром пещеристого синуса.*

ФУА́ — АЛАЖУАНИ́НА СИНДРО́М (Ch. Foix, 1882—1927, франц. невропатолог; Th. Alajouanine, совр. франц. невропатолог) — болезнь, обусловленная патологическим разрастанием сосудов спинного мозга и его оболочек с последующим некрозом ткани спинного мозга; проявляется очаговыми неврологическими симптомами соответственно локализации поражений.

ФУА́ — ИЛЛЕМА́НА СИНДРО́М (Ch. Foix, 1882—1927, франц. невропатолог; P. Hillemand, род. в 1895 г., франц. врач) — врожденное сочетание аплазии крестцовой и копчиковой костей с дисплазией нижних сегментов спинного мозга; проявляется нижней периферической параплегией с нарушением функций органов таза.

ФУА́ — ТЕВЕНА́РА РЕФЛЕ́КС ОСА́НКИ (Ch. Foix, 1882—1927, франц. невропатолог; A. Thévenard, 1898—1959, франц. невропатолог; син. Дельма-Марсале рефлекс элементарной осанки) — позотонический рефлекс, способствующий сохранению вертикального положения тела при внезапном толчке его вперед, назад или в сторону.

ФУА́ — ТЕВЕНА́РА СИМПТО́М (Ch. Foix, 1882—1927, франц. невропатолог; A. Thévenard, 1898—1959, франц. невропатолог; син.: симптом толкания, феномен толчка) — потеря больным равновесия в вертикальном положении при легком толчке его в сторону; признак поражения мозжечка.

ФУА́ — ТЕВЕНА́РА ФЕНО́МЕН ГО́ЛЕНИ (Ch. Foix, 1882—1927, франц. невропатолог; A. Thévenard, 1898—1959, франц. невропатолог) — см. *Феномен голени.*

ФУА́ — ШАВАНЬ́ — ИЛЛЕМА́НА СИНДРО́М (Ch. Foix, 1882—1927, франц. невропатолог; J. A. Chavany, франц. невропатолог 20 в.; P. Hillemand, род. в 1895 г., франц. врач) — двусторонняя симметричная миоклония мягкого неба и гортани; наблюдается при поражении продолговатого мозга или мозжечка (чаще верхней мозжечковой ножки).

ФУ́ГА (лат. fuga бег) в психиатрии — внезапное и кратковременное двигательное возбуждение в форме элементарных движений или действий (раздевание, бег и др.), к-рое сопровождается сумеречным помрачением сознания; симптом эпилепсии и органических заболеваний ц. н. с.

ФУЗАРИОТОКСИКО́З (fusariotoxicosis) — общее название токсикозов, вызываемых употреблением в пищу продуктов из зерна, пораженного несовершенными грибами рода Fusarium.

ФУЗИО́МЕТР (лат. fusio плавление, сплавление + греч. metreō измерять, определять; син. измеритель КЧСМ) — электронный прибор для воздействия на глаз световыми сигналами заданной частоты, преимущественно в диапазоне частот 16—60 *гц*, с целью определения критической частоты слияния мельканий.

ФУЗИО́ННЫЕ ПОЛЯ (син. Панума поля) — симметричные зоны сетчатки обоих глаз, одновременное возбуждение к-рых вызывает эффект фузии.

ФУЗИФО́РМНЫЙ (fusiformis; лат. fusus веретено + -formis подобный, похожий) — веретенообразный, по форме напоминающий веретено.

ФУ́ЗИЯ (fusio; лат. плавление, сплавление) в офтальмологии — физиологический процесс — слияние двух монокулярных изображений на сетчатке правого и левого глаза в единый зрительный образ.

ФУЗОБАКТЕ́РИИ (Fusobacteria; лат. fusus веретено + *бактерии*) — см. *Бактерии веретенообразные.*

FUSOBACTÉRIUM FUSIFÓRME — см. *Плаута — Венсана веретенообразная бактерия.*

ФУЗОСПИРИЛЛЁЗ (fusospirillosis; син. фузоспирохетоз) — общее название поражений кожи и слизистых оболочек, вызываемых веретенообразной бактерией Плаута — Венсана в симбиозе со спирохетой Венсана; к Ф. относятся эрозивный круговидный баланит, эрозивный баланопостит, ангина Симановского — Плаута — Венсана и др.

ФУЗОСПИРОХЕТО́З [fusospirochaetosis; *фузо*(*бактерии*) + *спирохеты* + *-оз*] — см. *Фузоспириллез.*

ФУ́КАЛЫ ОПЕРА́ЦИЯ (V. Fucala, 1847—1911, австрийский офтальмолог) — хирургическая операция: удаление нормального хрусталика с целью коррекции близорукости высокой степени.

ФУКО́ЗА — моносахарид класса гексоз, один из стереоизомеров к-рого (L-фукоза) входит в состав гликопротеидов крови, различных тканей и секретов организма.

ФУ́КСА ГЕТЕРОХРОМИ́Я (E. Fuchs, 1851—1930, австрийский офтальмолог) — см. *Фукса синдром.*

ФУ́КСА ДИКТИО́МА (E. Fuchs) — см. *Диктиома.*

ФУ́КСА КАТАРА́КТА (E. Fuchs) — см. *Катаракта гетерохромная.*

ФУ́КСА КЕРАТИ́Т (E. Fuchs) — см. *Кератит точечный поверхностный.*

ФУ́КСА СИМПТО́М (E. Fuchs) — непроизвольное поднятие верхнего века при взгляде вниз; наблюдается на стороне пареза глазодвигательного нерва в периоде его обратного развития в случае неправильной регенерации поврежденных нервных волокон.

ФУ́КСА СИНДРО́М (E. Fuchs) — 1) болезнь неясной этиологии, характеризующаяся множественными буллезными высыпаниями на коже и слизистых оболочках полости рта, глаз, половых органов, тяжелым общим состоянием; 2) (син.: гетерохромия осложненная, Фукса гетерохромия) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся дистрофическими изменениями ресничного тела, гетерохромией радужки и развитием катаракты.

ФУ́КСА ЧЁРНОЕ ПЯТНО́ (E. Fuchs) — пигментный очаг темного цвета в области желтого пятна (пятна сетчатки), возникающий после кровоизлияний в эту область при высокой близорукости.

ФУКСИ́Н КАРБО́ЛОВЫЙ (син. Пфейффера фуксин) — гистологический краситель, состоящий из спиртового раствора фуксина в 5% карболовой воде.

ФУКСИ́Н ОСНОВНО́Й — краситель, представляющий собой смесь хлористо-водородных солей розанилина и пararозанилина; широко применяется в микробиологической и гистологической практике.

ФУКСИНОФИ́ЛЬНЫЕ ТЕЛЬЦА́ (corpora fuchsinophilica; фуксин + греч. philia любовь, склонность; син. русселевские тельца) — гиалиноподобные капли, интенсивно окрашивающиеся основным фуксином, образующиеся в цитоплазме плазматических клеток при гиперпродукции и задержке в них иммуноглобулинов, например при хронических воспалительных процессах.

ФУЛЬГУРА́ЦИЯ (fulguratio; лат. «сверкание молнии»; син. форесгизация) — прижигание тканей искрой переменного тока высокой частоты; применяется в косметологии.

ФУЛЬГУРИ́Т (лат. fulgur молния + греч. -eidēs подобный) — см. *Знак молнии.*

ФУ́ЛЬДА — ГРО́ССА — МИХАЭ́ЛИСА МЕ́ТОД (E. Fuld, род. в 1873 г., нем. терапевт; O. Gross, род. в 1881 г., нем. терапевт; L. Michaelis, 1875—1945, нем. биохимик) — метод измерения активности трипсина в панкреатическом соке, основанный на определении максимальной степени разведения, при к-рой он способен переварить определенное количество казеина.

ФУЛЬМИНА́НТНЫЙ (fulminans, fulminantis, от лат. fulmino метать молнии, fulmen, fulminis молния) — молниеносный; внезапно и быстро развивающийся.

ФУМАГИЛЛИ́Н (fumagillinum) — антибиотик, продуцируемый Aspergillus fumigatus, высоко активный по отношению к возбудителю амебиаза.

ФУМА́РОВАЯ КИСЛОТА́ — непредельная дикарбоновая кислота ациклического ряда, участвующая в цикле трикарбоновых кислот и в биосинтезе аспарагиновой кислоты.

ФУМИГА́НТЫ (fumigantia; лат. fumigo дымить, окуривать) в медицине — вещества, применяемые для дезинсекции и дератизации методом окуривания.

ФУМИГА́ЦИЯ (fumigatio; лат. «окуривание») в медицине — 1) воздействие сухим дымом на раневые и язвенные поверхности с лечебной целью; 2) см. *Окуривание.*

ФУНГИФО́РМНЫЙ (fungiformis; лат. fungus гриб + -formis подобный, похожий) — по форме напоминающий гриб.

ФУНГИЦИ́ДНОСТЬ (лат. fungus гриб + caedo убивать) — способность останавливать рост и деление грибов, напр. паразитических грибков — возбудителей микозов человека.

ФУНГИЦИ́ДЫ (fungicida; лат. fungus гриб + caedo убивать) в медицине — вещества, применяемые для борьбы с паразитическими грибками, патогенными для человека.

ФУ́НГУС ПУПКА́ (fungus umbilici; лат. fungus гриб) — грибовидное разрастание грануляционной ткани при затянувшемся заживлении пупочной ранки у новорожденного.

ФУНДА́ЛЬНЫЙ (лат. fundus дно) — относящийся к дну какого-либо органа (чаще желудка).

ФУНДОПЛИКА́ЦИЯ (fundoplicatio; анат. fundus ventriculi дно желудка + лат. plica складка; син. Ниссена операция) — хирургическая операция: подшивание желудка к диафрагме вокруг пищеводного отверстия с фиксацией его малой кривизны к брюшной стенке для восстановления острого угла между дном желудка и брюшной частью пищевода; применяется для лечения рефлюксэзофагита и скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

ФУНИКУЛ- (funiculo-; лат. funiculus канатик; анат. funiculus spermaticus семенной канатик) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к какому-либо канатику», напр. к семенному.

ФУНИКУЛИ́Т (funiculitis; *funikul-* + *-it*) — 1) воспаление корешков спинного мозга в месте их соединения в общий канатик за межпозвоночным узлом (до образования нервного сплетения); 2) воспаление семенного канатика.

ФУНИКУЛО- — см. *Funikul-.*

ФУНИКУЛОПЕКСИ́Я (funiculopexia; *funikulo-* + греч. pēxis закрепление) — хирургическая операция: фиксация семенного канатика при варикозном расширении его вен.

ФУНИКУЛОЦЕ́ЛЕ (funiculocele; *funikulo-* + греч. kēlē выбухание, вздутие) — см. *Водянка семенного канатика.*

ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ КРОВА́ТЬ — кровать, конструкция к-рой обеспечивает возможность придания больному требуемого положения тела.

ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ НАГРУ́ЗКА — стандартная нагрузка (дозированная или с максимальным напряжением) на орган, систему или организм в целом, предназначенная для оценки их состояния и функциональных возможностей, а также для выявления скрытых (компенсированных) изменений.

ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ПОДВИ́ЖНОСТЬ — см. *Лабильность.*

ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ПРО́БА — общее название методов оценки деятельности органа или системы органов, основанных на использовании функциональных нагрузок.

ФУНКЦИОНА́ЛЬНОЕ ЗОНИ́РОВАНИЕ — разделение территории населенного пункта на зоны с разным функциональным назначением (жилая, промышленная и т. п.) с целью устранения или уменьшения неблагоприятного влияния окружающей среды на население.

ФУНКЦИОНА́ЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ́НИЕ — организационно и, чаще, территориально отделенная составная часть медицинского учреждения (этапа медицинской эвакуации), решающая определенный, свойственный только ей круг задач из числа возложенных на данное учреждение.

ФУ́НКЦИЯ (лат. functio деятельность) в физиологии — деятельность и свойство клетки, органа и системы организма, проявляющиеся как физиологический процесс или совокупность процессов.

Ф. АДАПТАЦИО́ННО-ТРОФИ́ЧЕСКАЯ — Ф. органа (системы органов), заключающаяся в приспособлении организма к меняющимся условиям его существования путем регуляции обмена веществ и возбудимости его органов и тканей.

Ф. БАРЬЕ́РНАЯ — Ф. тканей и органов, заключающаяся в защите организма или отдельных его частей от воздействия изменений окружающей среды и в сохранении относительного постоянства состава, физико-химических и биологических свойств внутренней среды организма.

Ф. ГЕНЕРАТИ́ВНАЯ (лат. genero рождать, производить) — Ф. организма, заключающаяся в воспроизведении себе подобного.

ФУ́НКЦИЯ ВРАЧЕ́БНОЙ ДО́ЛЖНОСТИ — расчетный норматив годовой нагрузки на одну врачебную должность (по определенной специальности) в амбулаторно-поликлиническом учреждении, выраженный числом врачебных посещений в год; устанавливается исходя из часовых норм работы врача по приему больных и по обслуживанию на дому, а также из числа рабочих дней в году.

ФУ́НКЦИЯ КО́ЙКИ — см. *Оборот койки.*

ФУНТ АПТЕ́КАРСКИЙ (истор.) — старинная мера аптекарского веса, равная примерно 360 граммам или 12 унциям.

ФУРНЬЕ́ ГАНГРЕ́НА (J. A. Fournier, 1832—1915, франц. дерматовенеролог) — острый некроз тканей полового члена и мошонки, обусловленный внедрением в кожу анаэробных микроорганизмов.

ФУРНЬЕ́ ЗУ́БЫ (J. A. Fournier) — первые большие коренные зубы с укороченными коронками и гипоплазией эмали на жевательной поверхности; наблюдаются при врожденном сифилисе.

ФУРНЬЕ́ СИМПТОМОКО́МПЛЕКС (J. A. Fournier) — сочетание интенсивных головных болей, головокружения, снижения интеллекта, ухудшения памяти и астенического синдрома с преходящими гемипарезами, часто с поражением глазодвигательного, отводящего и лицевого нервов; наблюдается в

поздней стадии сифилитического менингоэнцефалита.

ФУРНЬЕ́ ТРЕТИ́ЧНАЯ РОЗЕ́ОЛА (J. A. Fournier) — см. *Розеола сифилитическая третичная.*

FÚROR MANIACÁLIS (устар.; лат. «маниакальное буйство») — резко выраженное психомоторное возбуждение при маниакальном состоянии.

FÚROR EPILÉPTICUS (устар.; лат. «эпилептическое буйство») — внезапная вспышка необузданной ярости и агрессии у больного эпилепсией.

ФУРУ́И — МИСИ́МЫ ПРОГРЕССИ́РУЮЩИЙ АКРОМЕЛАНО́З (Furuya; Mishima) — см. *Акромеланоз прогрессирующий.*

ФУРУ́НКУЛ (лат. furunculus) — острое гнойно-некротическое воспаление фолликула волоса и окружающей ткани, обусловленное внедрением стафилококков.

ФУРУНКУЛЁЗ (furunculosis; *фурункул* + *-оз*) — стафилодермия, характеризующаяся появлением множественных фурункулов; возникает на фоне нарушений обмена веществ, особенно углеводного, а также пониженной сопротивляемости организма.

ФУТЛЯ́Р-СТЕРИЛИЗА́ТОР — металлическая или пластмассовая емкость с крышкой и подпружиненным сердечником, предназначенная для стерилизации, хранения в стерильных условиях и транспортировки инъекционных игл и шприцев.

ФЭР — см. *Физический эквивалент рентгена.*

ФЮЛЛЕБО́РНА МЕ́ТОД (F. Fülleborn, 1866—1933, нем. паразитолог) — метод обогащения при гельминтоовоскопии кала, основанный на том, что в насыщенном растворе поваренной соли яйца гельминтов одних видов (с небольшим удельным весом) всплывают и накапливаются в поверхностной пленке, а других (с большим удельным весом) — оседают на дно.

ФЮ́РБРИНГЕРА ОБРАБО́ТКА РУК (истор.; P. Fürbringer, 1849—1930, нем. врач) — обработка рук щеткой, мытье их теплой водой с мылом в течение 1 мин., чистка ногтей, обтирание рук 80% спиртом в течение 1 мин. и раствором сулемы 1:1000 в течение 1—2 мин. для подготовки рук хирурга к операции; в более поздней модификации спирт применялся после раствора сулемы.

ФЮ́РБРИНГЕРА СИМПТО́М (P. Fürbringer) — соответствующие дыхательным движениям колебания пункционной иглы, введенной в полость поддиафрагмального абсцесса; в случае введения иглы в наддиафрагмальную гнойную полость колебания иглы отсутствуют; дифференциально-диагностический признак.

ФЮ́РТА МЕ́ТОД (O. Fürth, 1867—1938, австрийский биохимик) — см. *Фюрта проба.*

ФЮ́РТА ПРО́БА (O. Fürth; син. Фюрта метод) — метод определения чувствительности микроорганизмов к известному или исследуемому бактериофагу путем одновременного посева различных микроорганизмов в разные участки плотной питательной среды, содержащей бактериофаг, с последующей оценкой степени лизиса бактериальных культур.

X

ХА́БЕРЛАНДА ОПЕРА́ЦИЯ (H. F. O. Haberland, род. в 1887 г., нем. хирург) — хирургическая операция: имплантация окончаний тонких ветвей подъязычного нерва в мимические мышцы лица при параличе лицевого нерва.

ХА́ВА ТРАПЕЗУ́НДСКАЯ (истор.) — см. *Лихорадка флеботомная.*

ХА́ВКИНА ПРИЁМ (А. Б. Хавкин) — способ дифференцирования шума трения плевры от дыхательных шумов, основанный на том, что при уменьшении надавливания ухом на стетоскоп выслушивается только шум трения плевры.

ХА́ГА БОЛЕ́ЗНЬ (G. Hug) — см. *Гликогеноз IX типа.*

ХА́ГЕДОРНА ИГЛА́ (истор.; W. Hagedorn, 1831—1894, нем. хирург) — хирургическая игла с круглым ушком без прорези.

ХА́ГЕДОРНА — ЙЁНСЕНА МЕ́ТОД (H. Ch. Hagedorn, род. в 1888 г., датский фармаколог; B. N. Jensen, совр. датский биохимик) — количественный метод определения уровня сахара в крови, основанный на способности сахаров восстанавливать в щелочной среде красную кровяную соль в желтую; о содержании сахара судят по избытку красной кровяной соли, определяемому титрометрией.

ХА́ГЕМАНА ДЕФЕ́КТ (W. Hageman, род. в 1908 г., нем. гематолог) — недостаточность фактора XII свертывания крови; характеризуется удлинением времени кровотечения, положительным симптомом жгута.

ХА́ГЕМАНА ФА́КТОР (W. Hageman) — см. *Фактор XII.*

ХА́ГЛУНДА — ШИ́НЦА БОЛЕ́ЗНЬ (P. S. E. Haglund, 1870—1937, шведский хирург-ортопед; H. R. Schinz; син. остеохондроз апофиза пяточной кости) — остеохондропатия с поражением апофиза пяточной кости; проявляется припухлостью и болью в области прикрепления пяточного (ахиллова) сухожилия.

ХА́ДДЛСОНА РЕА́КЦИЯ (I. F. Huddleson, род. в 1893 г., амер. бактериолог; син. Хеддлсона реакция) — метод ускоренной серологической диагностики бруцеллеза путем проведения реакции агглютинации на стекле с использованием неразведенной сыворотки крови больного и концентрированного антигена (взвеси убитых бруцелл в 12% растворе хлорида натрия), к которому прибавлены краски — генциановый фиолетовый и бриллиантовый зеленый.

ХАЙДЕЛЬБЕ́РГЕРА МЕ́ТОД (M. Heidelberger, род. в 1888 г., амер. микробиолог и иммунолог) — метод количественного определения содержания антител, основанный на реакции преципитации с определением количества белка антител в преципитате.

ХА́ЙНЕСА — БРА́УНА ПРО́БА (E. A. Hines, род. в 1906 г., амер. врач; G. E. Brown, 1885—1935, амер. врач) — метод диагностики латентной артериальной гипертензии, основанный на наблюдаемом при ней эффекте резкого повышения артериального давления после погружения руки больного в воду с толченым льдом.

ХАЙРОФОБИ́Я (chairophobia; греч. chairō радоваться + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь появления чувства радости, веселья.

ХА́КИМА РЕА́КЦИЯ (истор.; Hakim; син. малигнолипия) — метод диагностики злокачественных новообразований, основанный на обнаружении в сыворотке крови фосфолипида (малигнолипина), якобы являющегося продуктом жизнедеятельности клеток злокачественных опухолей.

ХАКСТХА́УСЕНА СИНДРО́М (H. Haxthausen, 1892—1959, датский дерматолог) — см. *Кератодермия климактерическая.*

ХАЛА́ЗИОН (устар.; chalazion; греч. «узелок», «затвердение», уменьшительное от chalaza градина; син. градина) — плотный узелок в толще хряща века, обусловленный хроническим воспалением желез хряща века (мейбомиевых желез).

ХАЛАЗИ́Я КА́РДИИ (chalasia cardiae; греч. chalasis расслабление; син.: зияние кардии, недостаточность кардии) — стойкое расширение кардиального отверстия, обусловленное, напр., нарушением иннервации пищевода и приводящее к желудочно-пищеводному рефлюксу; проявляется рвотой, признаками эзофагита.

ХАЛАЗОДЕРМИ́Я (chalasodermia; греч. chalasis расслабление + derma кожа) — см. *Кожа вялая.*

ХА́ЛЛЕРМАННА — ШТРА́ЙФФА — ФРАНСУА́ СИНДРО́М (W. Hallermann, нем. офтальмолог 20 в.; E. B. Streiff, род. в 1908 г., швейц. офтальмолог; J. François, род. в 1907 г., бельг. офтальмолог; син. дизморфия мандибулоокулофациальная) — аномалия развития: сочетание микрофтальма, катаракты, атрофии кожи, нарушений роста скелета (особенно черепа), зубов и волос.

ХАЛО́НЫ (греч. chalainō ослаблять) — см. *Кейлоны.*

ХАЛЬКО́З (chalcosis; греч. chalkos медь + *-оз*; син. омеднение) — отложение частиц меди в органах и тканях.

ХАЛЬКО́З ХРУСТА́ЛИКА (chalcosis lentis; син. катаракта медная) — передняя субкапсулярная катаракта, возникающая при наличии в глазном яблоке инородного тела, содержащего медь, и обусловленная отложением ее солей в хрусталике; при офтальмоскопии наблюдается помутнение хрусталика, напоминающее цветок подсолнечника.

ХА́МИЛТОНА ПРИ́ЗНАК (F. H. Hamilton, 1813—1886, амер. хирург) — соприкосновение концов линейки, приложенной к наружной поверхности плеча, одновременно с латеральным мыщелком плечевой кости и акромионом; признак нижнемедиального вывиха головки плечевой кости.

ХА́ММЕНА СИМПТО́М (L. V. Hamman, 1877—1946, амер. врач) — громкий хрустящий или щелкающий звук, выслушиваемый над грудиной синхронно той или иной фазе сердечного цикла; патогномоничный симптом пневмоперикарда.

ХА́ММЕНА — РИ́ЧА СИНДРО́М (L. V. Hamman, 1877—1946, амер. врач; A. R. Rich, род. в 1893 г., амер. врач) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся быстро прогрессирующим диффузным пневмофиброзом с развитием дыхательной недостаточности, гипертензии малого круга кровообращения и легочного сердца.

ХАНГАНУ́ЦИУ — ДА́ЙХЕРА — ПА́УЛЯ — БУ́ННЕЛЛЯ РЕА́КЦИЯ (M. Hanganutziu, румынский иммунолог 20 в.; H. Deicher, нем. врач 20 в.; J. R. Paul, род. в 1893 г., амер.врач; W. W. Bunnell, род. в 1902 г., амер. врач) — см. *Пауля — Буннелля реакция.*

ХА́НГАРТА СИНДРО́М (E. Hanhart, 1891—1973, швейц. врач-генетик) — сочетание врожденного диссеминированного ладонно-подошвенного кератоза с кератитом и липоматозом.

ХА́НЛОНА — БЛЕ́ЛОКА ОПЕРА́ЦИЯ (C. R. Hanlon, амер. хирург; A. Blalock, 1899—1944, амер. хирург) — хирургическая операция: создание дефекта межпредсердной перегородки; предложена для лечения полной транспозиции аорты и легочного ствола.

ХА́НТА ЗО́НА (J. R. Hunt; 1874—1937, амер. невропатолог) — область уха, вовлекаемая в патологический процесс при синдроме Ханта (ушная раковина, наружный слуховой проход и барабанная перепонка).

ХА́НТА МИОКЛОНИ́ЧЕСКАЯ МОЗЖЕЧКО́ВАЯ ДИССИНЕРГИ́Я (J. R. Hunt; син. Ханта эпилепсия — устар.) — болезнь нервной системы, обусловленная дегенерацией зубчатого ядра мозжечка и красного ядра среднего мозга; проявляется сочетанием миоклоний с мозжечковым синдромом и эпилептическими припадками.

ХА́НТА СИНДРО́М (J. R. Hunt; син.: Рамзая Ханта синдром, синдром коленчатого ганглия) — форма опоясывающего лишая при поражении ганглия коленца; проявляется высыпаниями в области наружного слухового прохода и ушной раковины, сильными болями в ухе, иррадиирующими в область лица, затылка и шеи, часто явлениями неврита лицевого нерва.

ХА́НТА ЭПИЛЕ́ПСИЯ (устар.; J. R. Hunt) — см. *Ханта миоклоническая мозжечковая диссинергия.*

ХА́НТИНГТОНА ХОРЕ́Я (G. S. Huntington, 1851—1916, амер. врач) — см. *Гентингтона хорея.*

ХАРА́ДЫ — МО́РИ МЕ́ТОД (Y. Harada, совр. японский гельминтолог; O. Mori, совр. японский гельминтолог) — метод диагностики анкилостомидозов, основанный на выявлении личинок анкилостомид путем микроскопии осадка из пробирки с 3 *мл* воды, в к-рую была погружена полоска фильтровальной бумаги, покрытая калом больного.

ХАРА́КТЕР (греч. charaktēr отличительная черта, особенность) — совокупность основных отличительных свойств человека, проявляющихся в особенностях его поведения и отношения к окружающей действительности.

ХАРА́КТЕР ПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ — см. *Психопатия.*

ХАРАКТЕРОПАТИ́Я (characteropathia; *характер* + греч. pathos страдание, болезнь) — дисгармония личности с заострением отдельных черт характера.

ХА́РГРЕЙВСА КЛЕ́ТКИ (M. M. Hargraves, совр. амер. дерматолог) — см. *Клетки красной волчанки.*

ХА́РГРЕЙВСА РОЗЕ́ТКА (M. M. Hargraves) — скопление сегментоядерных лейкоцитов вокруг свободного ядра клетки, разрушенной воздействием антинуклеарных антител; начальная стадия образования клеток красной волчанки.

ХА́РГРЕЙВСА ФЕНО́МЕН (M. M. Hargraves) — см. *Волчаночно-клеточный феномен.*

ХА́РДИ — ВЕ́ЙНБЕРГА ЗАКО́Н (G. H. Hardy, англ. математик 20 в.; W. Weinberg, нем. врач 20 в.) — закономерность, согласно к-рой частоты генотипов приходят в равновесное состояние, предсказываемое формулой Харди — Вейнберга, за одно поколение для одного локуса и асимптотически для более чем одного.

ХА́РДИ — ВЕ́ЙНБЕРГА УРАВНЕ́НИЕ (G. H. Hardy; W. Weinberg) — см. *Харди — Вейнберга формула.*

ХА́РДИ — ВЕ́ЙНБЕРГА ФО́РМУЛА (G. H. Hardy; W. Weinberg; син. Харди — Вейнберга уравнение) — математическое выражение, отражающее распределение генотипов и фенотипов в панмиктической популяции неограниченного размера с неперекрывающимися поколениями, не испытывающей мутационного и селекционного давления; согласно Х.— В. ф., доля любой гомозиготы равна квадрату доли соответствующего аллеля, а доля гетерозиготы — удвоенному произведению долей соответствующих аллелей; справедлива для любого количества аллелей.

ХА́РКАВИ СИНДРО́М (J. Harkavy, амер. врач 20 в.) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся эозинофильной инфильтрацией тканей организма и эозинофилией крови, множественным очаговым некрозом коллагеновых волокон (особенно стенок вен), а также повышенной чувствительностью к небактериальным антигенам (табак, пыль, пищевые продукты).

ХА́РКЕ МЕ́ТОД — метод вскрытия околоносовых пазух при секции путем распиливания костей основания черепа в сагиттальной плоскости.

ХА́РКЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (D. E. Harken, род. в 1910 г., амер. хирург) — хирургическая операция: частичная резекция межжелудочковой перегородки доступом через устье аорты; предложена для лечения идиопатического мышечного стеноза выходного отдела левого желудочка.

ХА́РРИСА — ГРИ́НЧАКА ОПЕРА́ЦИЯ (S. H. Harris, 1883—1937, австралийский хирург; Th. Hryntschak, 1889—1952, австрийский уролог) — аденомэктомия с помощью доступа через мочевой пузырь с последующим ушиванием образовавшейся полости и зашиванием раны мочевого пузыря.

ХА́РТЛИ — КРА́УЗЕ ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; F. Hartley, 1857—1913, амер. хирург; F. Krause, 1857—1937, нем. хирург) — хирургическая операция: удаление тройничного узла при тяжелой невралгии тройничного нерва.

ХА́РТМАННА ЗАЖИ́М (H. A. Ch. A. Hartmann, 1860—1952, франц. хирург; син. Гартманна зажим — нрк.) — хирургический инструмент в виде окончатых щипцов с браншами треугольной формы, предназначенный для извлечения червеобразного отростка в рану при аппендэктомии.

ХА́РТМАННА ОПЕРА́ЦИЯ (H. A. Ch. A. Hartmann) — трансабдоминальная резекция прямой и сигмовидной ободочной кишки с наложением одноствольного anus praeternaturalis.

ХА́РТНУПА БОЛЕ́ЗНЬ (E. Hartnup) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением всасывания триптофана в кишечнике и его реабсорбции в почечных канальцах; проявляется мозжечковой атаксией, пеллагроподобными изменениями кожи, аминоацидурией, повышенным содержанием в моче индикана и индольных соединений; наследуется по рецессивному типу.

ХА́РЦЕРА СИНДРО́М (F. A. Harzer, совр. нем. врач) — локализация сердечного толчка в эпигастральной области; наблюдается при значительном увеличении правых отделов сердца.

ХА́РШАКА ОПЕРА́ЦИЯ (М. Я. Харшак, 1871—1940, сов. оториноларинголог) — ларинготрахеостомия с последующим сшиванием слизистой оболочки гортани и трахеи с кожей; применяется при хронических (реже острых) стенозах гортани.

ХА́РЫ БОЛЕВЫ́Е ТО́ЧКИ (J. Hara, японский невропатолог; син. Гара болевые точки — нрк) — участки тела, болезненные при надавливании у больного пояснично-крестцовым радикулитом, расположенные в области поперечных отростков IV—V поясничных позвонков, задней верхней ости гребешка подвздошной кости, подвздошно-крестцового сочленения, пяточного (ахиллова) сухожилия и (или) пяточной кости, а также по средней линии живота, несколько ниже пупка.

ХАСИМО́ТО ЗОБ (H. Hashimoto, 1881—1934, японский патолог; син.: бластома щитовидной железы лимфаденоидная, зоб лимфоматозный, зоб лимфоцитарный, тиреоидит лимфоматозный, тиреоидит хронический) — тиреоидит аутоиммунной природы, клинически проявляющийся зобом и симптомами гипотиреоза.

ХА́ССА АРТРОДЕ́З (J. Hass, род. в 1884 г., австрийский хирург-ортопед) — внесуставной артродез тазобедренного сустава; производится путем отсечения большого вертела у основания с частью проксимального конца бедренной кости и формирования по верхнему краю вертлужной впадины костного козырька из кортикальной пластинки с последующим смещением большого вертела вдоль линии остеотомии медиально и кверху так, чтобы он вошел в соприкосновение с подвздошной костью под козырьком.

ХАТСУСИ́МЫ — ХАКАМО́РИ БОЛЕ́ЗНЬ — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена полисахаридов с их накоплением в виде гранул в клетках паренхиматозных органов и в ретикулоцитах; проявляется увеличением печени, селезенки и лимфатических узлов, развитием цирроза печени.

ХА́ТЫ ФЕНО́МЕН (S. Hata, 1872—1938, японский бактериолог) — обост-

рение проявлений инфекционной болезни под влиянием малой дозы противомикробного средства.

ХА́УАТА ПРО́БА (Howat) — метод исследования функции поджелудочной железы, основанный на определении в сыворотке крови ферментов (диастазы и липазы) и бикарбонатов после последовательного (через 30 мин.) введения секретина и панкреозимина; при панкреатите это воздействие вызывает повышение содержания указанных веществ в крови.

ХА́УГА ОПЕРА́ЦИЯ (W. Haug, род. в 1883 г., нем. хирург) — пластическая операция при оттопыренных ушных раковинах, заключающаяся в удалении двух овальных участков кожи на задней поверхности ушной раковины и в области сосцевидного отростка; после сращения раневых поверхностей между собой ушная раковина принимает нормальное положение.

ХА́УРОВИТЦА ТЕО́РИЯ ОБРАЗОВА́НИЯ АНТИТЕ́Л (F. Haurowitz; син. матричная теория образования антител) — теория антителообразования, согласно к-рой антиген является мутагеном, направленно изменяющим синтез иммуноглобулинов.

ХА́УСТОНА СКЛА́ДКИ (J. Houston, 1802—1845, ирланд. анатом и хирург) — см. *Складки прямой кишки поперечные.*

ХА́УЭЛЛА МЕ́ТОД (W. H. Howell, 1860—1945, амер. физиолог) — метод исследования активности свертывающей системы крови, заключающийся в определении времени свертывания оксалатной плазмы крови пациента после добавления к ней раствора хлорида кальция.

ХА́УЭЛЛА — ЖОЛЛИ́ ТЕЛЬЦА́ (W. H. Howell, 1860—1945, амер. физиолог; J. M. J. Jolly, 1870—1953, франц. гистолог) — см. *Жолли тельца.*

ХАХУ́ТОВА МЕ́ТОД (М. Д. Хахутов, сов. хирург-ортопед) — см. *Олби костная пластика.*

ХВАТА́ТЕЛЬНЫЙ ФЕНО́МЕН ПА́ЛЬЦЕВ СТОПЫ́ — см. *Германа симптом.*

ХВОСТА́ТЫЙ ОТРО́СТОК (processus caudatus, PNA, BNA, JNA) — отросток хвостатой доли печени, разделяющий на ее висцеральной поверхности ямку желчного пузыря и борозду полой вены.

ХВО́СТЕКА СИМПТО́М (F. Chvostek, 1835—1884, австрийский хирург; син. лицевой феномен) — сокращение мышц лица в ответ на удар молоточком в области прохождения лицевого нерва; признак повышения нервно-мышечной возбудимости, напр. при гипокальциемии, алкалозе, гипомагниемии.

ХВОСТОКО́ЛЫ (Dasyatidae) — семейство хрящевых рыб отр. хвостоколообразных скатов, хвост к-рых несет иглу, снабженную железами, выделяющими токсичный для человека секрет; представитель Х.— морской кот (Dasyatis pastinaca) — встречается в Черном и Азовском морях.

ХДПБ-РЕА́КЦИЯ — см. *Пауля — Буннелля реакция.*

ХЕГА́РА ИГЛОДЕРЖА́ТЕЛЬ (A. Hegar) — инструмент для удерживания хирургических игл при наложении швов, имеющий прямые или изогнутые губки с продольной выемкой на рабочей поверхности и прямые ручки с кольцами на концах.

ХЕГА́РА РАСШИРИ́ТЕЛЬ (A. Hegar) — см. *Хегара буж.*

ХЕГА́РА СИМПТО́М (A. Hegar; син.: Горвица — Хегара симптом, Эгара симптом — нрк) — ранний признак беременности, заключающийся в том, что при двуручном влагалищно-брюшностеночном исследовании определяется значительная податливость тканей матки, особенно в области ее перешейка, что позволяет легко сблизить пальцы обеих рук.

ХЕ́ГГЛИНА АНОМА́ЛИЯ (R. M. Hegglin, 1907—1969, швейц. терапевт; син. Хеггглина синдром) — наследственная аномалия состава крови, характеризующаяся тромбоцитопенией, наличием гигантских тромбоцитов, а также нейтрофилов, в к-рых при окраске азур-эозином выявляются включения в виде голубоватых комочков; иногда сопровождается геморрагическим синдромом; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

ХЕ́ГГЛИНА СИНДРО́М (R. M. Hegglin) — см. *Хегглина аномалия.*

ХЕ́ГЛЕРА СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШОВ (C. S. Haegler) — соединение концов сухожилия с помощью трех узловых швов; два шва накладывают во взаимно параллельных плоскостях, а третий — в перпендикулярной им плоскости так, чтобы он предохранял первые два от прорезывания.

HED — см. *Доза кожно-эритемная.*

ХЕ́ДБЛОМА СИНДРО́М (A. F. Hedblom, род. в 1898 г., шведский врач) — боль при вдохе, быстро стихающая и сочетающаяся с ограничением дыхательных движений верхней части передней брюшной стенки; признак острого миозита диафрагмы.

ХЕ́ДДЛСОНА РЕА́КЦИЯ (J. F. Huddleson, род. в 1893 г., амер. бактериолог) — см. *Хаддлсона реакция.*

ХЕ́ЕРФОРДТА СИНДРО́М (Ch. F. Heerfordt, 1871—1953, датский офтальмолог) — см. *Увеопаротит.*

ХЕЙЛ- (хейло-; греч. cheilos губа) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к губам».

ХЕЙЛИ́Т (cheilitis; *хейл-* + *-ит*) — воспаление красной каймы, слизистой оболочки и (или) кожи губ.

Х. АБРАЗИ́ВНЫЙ ПРЕКАНКРО́ЗНЫЙ (c. abrasiva praecancrosa) — см. *Манганотти хейлит.*

Х. АКТИНИ́ЧЕСКИЙ (c. actinica; греч. aktis, aktinos луч; син.: хейлит световой, Эйрса световой хейлит) — Х., вызванный воздействием повышенной солнечной радиации и проявляющийся ощущением жжения, зуда, застойной гиперемией, отечностью и шелушением.

Х. АНГУЛЯ́РНЫЙ (c. angularis; лат. angulus угол) — см. *Заеда.*

Х. ГЛАНДУЛЯ́РНЫЙ (c. glandularis) — Х., характеризующийся воспалением мелких слюнных желез, расположенных в слизистой оболочке губы.

Х. ГЛАНДУЛЯ́РНЫЙ АПОСТЕМАТО́ЗНЫЙ (c. glandularis aposthematosa; син. хейлит гландулярный глубокий) — гнойный Х. г., при к-ром образуются абсцессы.

Х. ГЛАНДУЛЯ́РНЫЙ ГЛУБО́КИЙ (c. glandularis profunda) — см. *Хейлит гландулярный апостематозный.*

Х. ГЛАНДУЛЯ́РНЫЙ ПРОСТО́Й (c. glandularis simplex) — см. *Пуэнте — Асеведо хейлит.*

Х. ГНО́ЙНЫЙ (c. purulenta) — гландулярный Х., характеризующийся хроническим течением, болезненной воспалительной инфильтрацией стромы вокруг мелких слюнных желез, образованием рецидивирующих эрозий.

Х. ГРАНУЛЕМАТО́ЗНЫЙ (c. granulomatosa) — см. *Мишера хейлит.*

Х. ГРИБКО́ВЫЙ (c. mycotica) — см. *Хейлит кандидозный.*

Х. ДРОЖЖЕВО́Й — см. *Хейлит кандидозный.*

Х. ИНТЕРСТИЦИА́ЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (c. interstitialis tuberculosa) — Х. при туберкулезе, характеризующийся разлитым отеком губ вследствие развития в них специфических гранулем.

Х. КАНДИДО́ЗНЫЙ (c. candidosa; син.: Х. грибковый, Х. дрожжевой, Х. микотический) — Х. в форме длительно не заживающих трещин углов рта, вызываемый дрожжеподобными грибками рода Candida.

Х. КАТАРА́ЛЬНЫЙ (c. catarrhalis) — Х., характеризующийся обильной экссудацией без нарушения целости эпителиального покрова губы.

ХЕЙЛИ́Т МАНГАНО́ТТИ — см. *Манганотти хейлит.*

Х. МИКОТИ́ЧЕСКИЙ (c. mycotica) — см. *Хейлит кандидозный.*

ХЕЙЛИ́Т МИ́ШЕРА — см. *Мишера хейлит.*

ХЕЙЛИ́Т ПУЭ́НТЕ — АСЕВЕ́ДО — см. *Пуэнте — Асеведо хейлит.*

Х. СВЕТОВО́Й — см. *Хейлит актинический.*

Х. ЭКЗЕМАТО́ЗНЫЙ (c. eczematosa) — экзема, локализующаяся на губах.

Х. ЭКСФОЛИАТИ́ВНЫЙ (c. exfoliativa) — см. *Микулича — Кюммеля эксфолиативный хейлит.*

ХЕ́ЙЛИ — ХЕ́ЙЛИ БОЛЕ́ЗНЬ (W. H. Hailey, род. в 1898 г., амер. дерматолог; H. Hailey, род. в 1909 г., амер. дерматолог) — см. *Пузырчатка доброкачественная семейная хроническая.*

ХЕЙЛО- — см. *Хейл-.*

ХЕЙЛОГНАТОПАЛАТОСХИ́ЗИС (cheilognathopalatoschisis; *хейло-* + греч. gnathos челюсть + лат. palatum нёбо + греч. schisis расщепление) — аномалия развития: расщелина губы и нёба.

ХЕЙЛО́З (cheilosis; *хейл-* + *-оз*) — дистрофия покровов в области красной каймы губ; проявляется гиперемией, шелушением и образованием трещин; наблюдается при гиповитаминозе B_2.

ХЕЙЛОПЛА́СТИКА (cheiloplastica; *хейло-* + *пластика*) — общее название пластических операций для устранения дефектов или деформаций губ.

ХЕЙЛОСХИ́ЗИС (cheiloschisis; *хейло-* + греч. schisis расщепление, расщелина) — см. *Расщелина губы.*

ХЕЙЛОФА́ГИЯ (cheilophagia; *хейло-* + греч. phagein есть) — навязчивое действие в форме постоянного прикусывания губ.

ХЕ́ЙМА ПРИ́ЗНАК (E. L. Heim, 1747—1834, нем. врач) — см. *Хейма — Крейсига симптом.*

ХЕ́ЙМА — КРЕ́ЙСИГА СИМПТО́М (E. L. Heim, 1747—1834, нем. врач; F. L. Kreysig, 1770—1839, нем. врач; син.: Гайма — Крайзига симптом, Хейма признак) — втяжение межреберных промежутков в прекордиальной и левой подмышечной области во время систолы сердца; непостоянный признак спаечного перикардита и плевроперикардита.

ХЕ́ЙМОФОБИ́Я (cheimophobia; греч. cheima зима + *фобия*) — см. *Психофобия.*

ХЕ́ЙРА СИНДРО́М (E. S. Hare, 1812—1838, англ. хирург) — см. *Панкоста синдром.*

ХЕЙРО- (хиро-; греч. cheir рука) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к рукам», «выполняемый с помощью рук».

ХЕЙРОМЕГАЛИ́Я (cheiromegalia; *хейро-* + греч. megas, megalu большой) — аномалия развития: чрезмерная длина верхних конечностей.

ХЕЙРОСКО́П (*хейро-* + греч. skopeō смотреть) — прибор для тренировочных упражнений с целью закрепления центральной фиксации амблиопического глаза и выработки нормального бинокулярного зрения.

ХЕ́ЙУЭРДА ОПЕРА́ЦИЯ (Hayward) — хирургическая операция: подшивание диафрагмы к пищеводу при скользящих грыжах пищеводного отверстия.

ХЕЛИ́МСКОГО СИМПТО́М (М. А. Хелимский, 1898—1970, сов. хирург) — появление боли в области таза при попытке поднять верхнюю часть туловища больного, лежащего на спине; признак перелома костей таза.

ХЕ́ЛЛЕРА ПРО́БА (устар.; J. F. Heller, 1813—1871, австрийский патолог) — способ обнаружения белка в моче или цереброспинальной жидкости, основанный на появлении кольцевидного помутнения в месте их соприкосновения с раствором азотной кислоты.

ХЕ́ЛЛЕРСТРЕМА ТУБЕРКУЛО́ИДНАЯ ТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ ГРАНУЛЁМА (S. C. A. Hellerström, род. в 1901 г., шведский дерматолог) — см. *Гранулема туберкулоидная травматическая.*

ХЕМИ- — см. *Химио-.*

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ (*хеми-* + *люминесценция*) — люминесценция, сопровождающая нек-рые химические реакции; разновидностью Х. является биолюминесценция.

ХЕМО- — см. *Химио-.*

ХЕМОДЕКТО́МА (chemodectoma; *хемо-* + греч. dektēs берущий, принимающий + *-ома*; син. параганглиома нехромаффинная) — опухоль, развивающаяся из нейроэпителиальной ткани нехромаффинных параганглиев, не продуцирующая сосудосуживающих веществ.

ХЕМОДЕКТО́МА КАРОТИ́ДНАЯ (chemodectoma caroticum; син.: опухоль каротидная, параганглиома каротидная, струма каротидной железы) — опухоль, развивающаяся из сонного гломуса, расположенного в развилке сонных артерий.

ХЕМО́З (chemosis; греч. chēmē зияние + *-оз*) — отек конъюнктивы глазного яблока.

ХЕМОПАЛЛИДЭКТОМИ́Я (chemopallidectomia; *хемо-* + анат. globus pallidus бледный шар + *эктомия*) — стереотаксическая операция: разрушение ядер бледного шара введением в него химических веществ (чаще этилового спирта).

ХЕМОРЕЦЕ́ПТОР (*хемо-* + *рецептор*; син.: хемоцептор, химиорецептор) — рецептор, раздражителем к-рого является изменение концентрации какого-либо вещества или его ионов.

ХЕМОРЕЦЕ́ПЦИЯ (*хемо-* + *рецепция*) — процесс восприятия изменений концентрации тех или иных веществ или их ионов.

ХЕМОСИ́НТЕЗ (*хемо-* + *синтез*) — синтез нек-рыми бактериями органических веществ из двуокиси углерода за счет энергии, полученной при окислении неорганических веществ, напр. аммиака, соединений серы.

ХЕМОСТА́Т (*хемо-* + греч. statos стоящий, установленный) — аппарат для непрерывного культивирования бактерий, обеспечивающий оптимальные температурные условия и постоянное поступление свежей питательной среды при одновременном удалении части бактериальной культуры.

ХЕМОСТЕРИЛИЗА́ЦИЯ (*хемо-* + *стерилизация*) — метод дезинсекции, основанный на использовании химических веществ, лишающих членистоногих способности размножаться; чаще применяется для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений.

ХЕМОСТИМУЛЯ́ТОР ЛОКА́ЛЬНЫЙ (*хемо-* + *стимулятор*) — см. *Хемотрод.*

ХЕМОТА́КСИС (*хемо-* + *таксис*) — таксис, обусловленный пространственными различиями концентраций какого-либо вещества.

ХЕМОТРО́Д (син. хемостимулятор локальный) — канюля для введения в ткани или желудочки головного мозга каких-либо жидкостей.

ХЕМОЦЕ́ПТОР — см. *Хеморецептор.*

ХЕ́МПТОНА ЛИ́НИЯ (A. O. Hampton) — светлая полоска, пересекающая основание ниши на рентгенограмме желудка при язвенной болезни; соответствует воспалительному валу, окружающему кратер язвы.

ХЕ́НДА — ШЮЛЛЕРА — КРИ́СЧЕНА БОЛЕ́ЗНЬ (A. Hand, 1868—1949, амер. педиатр; A. Schüller, 1874—1958, австрийский невропатолог и психиатр; H. A. Christian, 1876—1951, амер. врач; син.: гистиоцитоз Х, гранулематоз липоидный, Крисчена — Шюллера болезнь, липогранулематоз) — болезнь из группы гистиоцитозов, характеризующаяся образованием в костях, коже, лимфатических узлах, костном мозге и внутренних органах очагов пролиферации клеток (предположительно оседлых макрофагов), в цитоплазме к-рых значительно увеличено содержание липидов; клинически проявляется несахарным диабетом, экзофтальмом, очагами деструкции костей (особенно черепа).

ХЕ́НКСА СОЛЕВО́Й РАСТВО́Р (J. N. Hanks) — изотонический буферный солевой раствор, применяемый в вирусологии.

ХЕ́ННЕРА СИМПТО́М (K. Henner, 1895—1967, чехословацкий невропатолог) — нарастающее отклонение тела назад при ходьбе, приводящее больного к падению; признак поражения коры лобных долей полушарий большого мозга.

ХЕНОДЕЗОКСИХО́ЛЕВАЯ КИСЛОТА́ — см. *Антроподезоксихолевая кислота.*

ХЁПФНЕРА ЗАЖИ́М (E. Höpfner, род. в 1873 г., нем. хирург; син. Гепфнера зажим — ирк) — кровоостанавливающий зажим с широкими эластичными губками, имеющими на рабочей поверхности продольные канавки, препятствующие сползанию инструмента даже при незначительном сдавлении тканей.

ХЕ́РЛЕЙНА МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИ́Я (Ph. H. Hörlein, 1882—1954, нем. врач и химик) — см. *Метгемоглобинемия наследственная II типа.*

ХЕ́РЛИТЦА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ БУЛЛЁЗНЫЙ ЭПИДЕРМО́ЛИЗ (G. Herlitz, род. в 1902 г., шведский педиатр) — см. *Эпидермолиз буллезный врожденный летальный.*

ХЕ́РРЕНШВАНДА СИНДРО́М (F. Herrenschwand, род. в 1881 г., нем. офтальмолог) — гетерохромия радужки, вызванная поражением симпатического нерва; нередко сочетается с синдромом Бернара — Горнера.

ХЕ́РРИНГА ТЕЛЬЦА́ (P. Th. Herring, 1872—1967, англ. физиолог) — глыбки нейросекрета в задней доле гипофиза, сместившиеся из переднего гипоталамуса по аксонам гипоталамо-гипофизарного пучка.

ХЕ́РТЦЕЛЯ СИМПТО́М (Hertzel; син. Гертцеля симптом) — повышение систолического артериального давления в плечевой артерии на 50 *мм* рт. ст. и более после наложения жгутов на обе ноги и другую руку; признак атеросклероза аорты, обусловленный снижением эластических свойств ее стенки.

ХЕРУВИ́ЗМ (син.: болезнь поликистозная семейная, дисплазия фиброзная семейная) — фиброзная остеодисплазия нижней челюсти, характеризующаяся ее симметричным вздутием в области углов и ветвей, в результате чего лицо становится округлым, напоминая изображения лиц ангелов.

ХЕ́СТРИНА ме́тод — метод определения активности холинэстеразы сыворотки крови по степени гидролиза ацетилхолина, остаток к-рого определяют колориметрически с помощью цветной реакции с гидроксиламином и хлорным железом.

ХИА́ЗМА [chiasma; греч. chiasmos расположение в виде греч. буквы χ (хи)] — 1) см. *Зрительный перекрест;* 2) в генетике — Х-образная структура, образующаяся в профазе мейоза вследствие конъюгации и кроссинговера двух хроматид бивалента.

HYALÓMMA — род клещей сем. Ixodidae, отр. Parasitiformes; многие виды Н. участвуют в передаче возбудителей Ку-лихорадки, крымской геморрагической лихорадки, туляремии, бруцеллеза.

ХИА́РИ БОЛЕ́ЗНЬ (H. Chiari, 1851—1916, австрийский патолог) — см. *Киари болезнь.*

ХИ́ББСА СПИНОЗОПЛА́СТИКА (R. A. Hibbs, 1869—1932, амер. хирург; анат. processus spinosus остистый отросток + *пластика*) — костно-пластическая операция: фиксация позвоночника при спондилите; основным элементом является остеотомия остистых отростков с накладыванием каждого вышележащего отростка на основание нижележащего с расчетом на последующее образование костных спаек.

ХИВИТЦА ТРАНЗИТО́РНЫЙ СЛОЙ (J. H. Chievitz, 1850—1901, датский

анатом) — тонкий бесклеточный слой между внутренним и наружным слоями нейробластов в развивающейся сетчатке глаза на 7-й неделе эмбриогенеза.

ХИЛ- (хило-; греч. chylos сок, млечный сок) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к лимфе», «содержащий лимфу».

ХИЛАДЕНЭКТАЗИ́Я (chyladenectasia; *хил-* + греч. adēn железа + *эктазия*) — расширение лимфатических сосудов и увеличение лимфатических узлов при нарушении лимфооттока, обусловленном их воспалением или обтурацией сосудов опухолью.

ХИЛАНГИО́МА (chylangioma; *хил-* + *ангиома*) — см. *Лимфангиома.*

ХИЛЁЗНАЯ ЦИСТЕ́РНА (cysterna chyli) — см. *Млечная цистерна.*

ХИ́ЛЛА МЕ́ТОД (A. V. Hill, род. в 1886 г., англ. физиолог) — метод исследования теплообразования в сокращающейся мышце с помощью высокочувствительных термодатчиков.

ХИ́ЛЛА ПРИ́ЗНАК (L. E. Hill, 1866—1952, англ. физиолог) — см. *Хилла — Флека симптом.*

ХИ́ЛЛА — ТЕСЬЕ́ СИМПТО́М (L. E. Hill, 1866—1952, англ. физиолог; P. Teissier, род. в 1864 г., франц. врач) — см. *Хилла — Флека симптом.*

ХИ́ЛЛА — ФЛЕ́КА СИМПТО́М (L. E. Hill, 1866—1952, англ. физиолог; M. W. Flack, 1852—1931, англ. физиолог; син.: Гилла — Флека симптом, Хилла признак, Хилла — Тесье симптом) — значительное (на 80 *мм* рт. ст. и более) превышение систолического давления в артериях голеней по сравнению с лучевой артерией; наблюдается чаще при стенозе артерий, отходящих от дуги аорты.

ХИЛО- — см. *Хил-.*

ХИЛО́ВА КАЧЕ́ЛИ (К. Л. Хилов, 1893—1975, сов. оториноларинголог) — установка для исследования и тренировки вестибулярного аппарата, представляющая собой качели с площадкой, сохраняющей при раскачивании горизонтальное положение.

ХИЛО́ВА МОДИФИКА́ЦИЯ (К. Л. Хилов) — модификация радикальной операции на среднем ухе по методу братьев Тис, заключающаяся в отсепаровке кожно-надкостничного лоскута верхнезаднего отдела наружного слухового прохода, что значительно улучшает обозримость операционного поля.

ХИЛО́ВА ОПЕРА́ЦИЯ (К. Л. Хилов) — см. *Хилова отопластика.*

ХИЛО́ВА ОТОПЛА́СТИКА (К. Л. Хилов; син. Хилова операция) — костнопластическая операция при заращении костного отдела наружного слухового прохода, заключающаяся в рассечении его задней стенки с последующим закрытием костной раны треугольными лоскутами на ножке из кожи слухового прохода и заушной области в сочетании с кожной пластикой по Тиршу.

ХИЛО́ВА СПО́СОБ (К. Л. Хилов) — способ остановки кровотечения из внутренней сонной артерии в области носовой части глотки путем сдавления сосуда у места его входа в пирамиду височной кости.

CHILOMÁSTIX MESNÍLI — вид простейших сем. Retortomonadidae отр. Polymastigida, кл. жгутиковых; непатогенный обитатель толстой кишки человека.

ХИЛОМИКРО́Н (*хило-* + микрон) — частица нейтрального жира диаметром около 1 *мкм*; в большом количестве содержатся в лимфе, особенно после приема жирной пищи.

ХИЛОМИКРОНЕМИ́Я (chylomicronaemia; *хиломикрон* + греч. haima кровь) — повышенное количество в крови хиломикронов; иногда термин используется для обозначения факта наличия в крови хиломикронов.

ХИЛОПЕРИКА́РД (chylopericardium; *хило-* + *перикард*) — скопление лимфы в полости перикарда; возникает, напр., при сдавлении грудного протока опухолью.

ХИЛОПИОПНЕВМОТО́РАКС (chylopyopneumothorax; *хило-* + греч. pyon гной + pneuma воздух + thōrax грудь, грудная клетка) — скопление в плевральной полости лимфы и гноя, сочетающееся с наличием в ней воздуха; возникает чаще после проникающих ранений грудной клетки.

ХИЛОПНЕВМОТО́РАКС (chylopneumothorax; *хило-* + греч. pneuma воздух + thōrax грудь, грудная клетка) — скопление лимфы и воздуха в плевральной полости; возникает чаще после проникающих ранений грудной клетки.

ХИЛОСТА́З (chylostasis; *хило-* + греч. stasis стояние, неподвижность) — застой лимфы в лимфатических путях.

ХИЛОТО́РАКС (chylothorax; *хило-* + греч. thōrax грудь, грудная клетка) — скопление лимфы в плевральной полости; наблюдается при повреждениях грудного протока.

ХИЛОЦЕ́ЛЕ СЕМЕННО́ГО КАНА́ТИКА (chylocele funiculi spermatici; *хило-* + греч. kēlē выбухание, вздутие) — кистовидное образование в общей оболочке яичка и семенного канатика, содержащее лимфу.

ХИЛУРИ́Я (chyluria; *хил-* + греч. uron моча; син.: галактурия, лактацидурия, лимфурия) — наличие примеси лимфы в моче; наблюдается при расширении лимфатических сосудов почки, напр. в результате окклюзии грудного лимфатического протока.

ХИЛЬГЕНРЕ́ЙНЕРА СХЕ́МА (H. Hilgenreiner, род. в 1870 г., чешский хирург-ортопед) — совокупность ориентиров и индексов для анализа рентгенограмм тазобедренного сустава у детей грудного возраста; важнейшими ориентирами Х. с. являются наивысшая точка диафиза, центр вертлужной впадины и ядро окостенения головки бедра.

ХИЛЭКТАЗИ́Я (chylectasia; *хил-* + *эктазия*) — стойкое расширение лимфатических сосудов.

ХИМАСТЛО́З (himasthlosis)—малоизученный гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый Himasthla mühlensi.

ХИМЕ́РА (Chimaira — в древнегреческой мифологии огнедышащее чудовище с головой льва, козьим туловищем и хвостом дракона) — 1) см. *Мозаик*; 2) мозаик, полученный в эксперименте.

ХИМЕ́РА ИММУНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ— особь, клетки к-рой содержат антигены, контролируемые генами своего и другого генотипов; различают естественные и искусственные Х. и.

ХИМЕРГИ́ЧЕСКАЯ РЕА́КЦИЯ — см. *Аллергическая реакция немедленного типа.*

ХИМИО- [хеми-, хемо-; средневеков. арабское (al-) kimiyā; греч. chymeia и chēmeia искусство сплавления металлов] — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к химии, к химическим элементам и соединениям».

ХИМИОКА́УСТИКА (*химио-* + греч. kaustikos жгучий, едкий) — разрушение патологически измененных тканей воздействием на них агрессивными химическими соединениями.

ХИМИОПРОФИЛА́КТИКА инфекционных болезней (*химио-* + *профилактика*) — профилактика инфекционных болезней путем назначения лицам, подвергающимся опасности заражения, химиотерапевтических средств, обладающих специфическим действием на соответствующих возбудителей.

ХИМИОПРОФИЛА́КТИКА МАЛЯРИ́И КЛИНИ́ЧЕСКАЯ — см. *Химиопрофилактика малярии паллиативная.*

ХИМИОПРОФИЛА́КТИКА МАЛЯРИ́И ЛИ́ЧНАЯ — применение гематошизотропных средств с целью защиты от заражения или заболевания малярией только самих лиц, принимающих эти средства.

ХИМИОПРОФИЛА́КТИКА МАЛЯРИ́И МЕЖСЕЗО́ННАЯ — общественная химиопрофилактика малярии, проводимая в период, предшествующий наступлению сезона заражаемости комаров.

ХИМИОПРОФИЛА́КТИКА МАЛЯРИ́И ОБЩЕ́СТВЕННАЯ — прием гаматропных средств больными или носителями возбудителя малярии (в т. ч. одновременно с химиотерапией) с целью предупреждения распространения болезни среди населения.

ХИМИОПРОФИЛА́КТИКА МАЛЯРИ́И ПАЛЛИАТИ́ВНАЯ (син. химиопрофилактика малярии клиническая) — регулярный прием гематошизотропных средств больным малярией с целью предупреждения ее приступов.

ХИМИОПРОФИЛА́КТИКА МАЛЯРИ́И РАДИКА́ЛЬНАЯ — применение гистошизотропных средств с целью вызвать гибель возбудителей малярии в случае их внедрения в организм.

ХИМИОРЕЦЕ́ПТОР — см. *Хеморецептор.*

ХИМИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА — лекарственные средства, подавляющие жизнедеятельность микроорганизмов или клеток опухолей (антибиотики, сульфаниламиды, противоопухолевые средства и др.).

ХИМИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ И́НДЕКС — показатель широты терапевтического действия химиотерапевтического средства, представляющий собой отношение его минимальной эффективной дозы к максимальной переносимой.

ХИМИОТЕРАПИ́Я (*химио-* + *терапия*) — терапия, основанная на применении химиотерапевтических средств.

ХИМИОТЕРАПИ́Я ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ — терапия злокачественных опухолей, основанная на применении противоопухолевых лекарственных средств.

Х. ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ВНУТРИАРТЕРИА́ЛЬНАЯ — регионарная Х. п., при к-рой лекарственные средства вводят в просвет артерии, кровоснабжающей опухоль.

Х. ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ВНУТРИЛИМФАТИ́ЧЕСКАЯ — регионарная Х. п., при к-рой лекарственные средства вводят в лимфатические сосуды.

Х. ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ВНУТРИПОЛОСТНА́Я — Х. п., при которой лекарственные средства вводят в грудную или брюшную полость.

Х. ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ МЕСТНАЯ — Х. п., при к-рой лекарственные средства вводят в ткань опухоли путем инъекции или аппликации.

Х. ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ПЕРФУЗИОННАЯ — Х. п., при к-рой содержащую лекарственные средства жидкость с помощью аппарата искусственного кровообращения длительно пропускают через изолированные от круга кровообращения сосуды, кровоснабжающие опухоль.

Х. ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ — Х. п., проводимая вслед за оперативным удалением злокачественного новообразования с целью воздействия на возможно оставшиеся опухолевые клетки.

Х. ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ РЕГИОНАРНАЯ — Х. п., при проведении которой лекарственные средства вводят в кровеносные или лимфатические сосуды, идущие к опухоли, для создания высокой концентрации в зоне злокачественного новообразования и уменьшения токсического действия.

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ — оружие массового поражения, действие к-рого основано на использовании токсических свойств нек-рых веществ по отношению к человеку, животным и растениям; применение Х. о. запрещено Женевским протоколом в 1925 г.

ХИМОТРИПСИН — фермент секрета поджелудочной железы, относящийся к классу гидролаз (КФ 3.4.21.1), катализирующий гидролитическое расщепление белков, пептидов, амидов и сложных эфиров аминокислот при переваривании пищи в кишечнике.

ХИМОТРИПСИНОГЕН — неактивный предшественник химотрипсина, синтезируемый в поджелудочной железе и активируемый трипсином и химотрипсином.

ХИМСВОРТА ПРОБА (H. P. Himsworth, род. в 1905 г., англ. врач) — метод диагностики истинной инсулинорезистентности у больных сахарным диабетом, основанный на том, что при одновременном введении инсулина и глюкозы лицам с истинной инсулинорезистентностью у них не наблюдается уменьшения концентрации глюкозы в крови.

ХИМУС (греч. chymos сок) — содержимое желудка или кишечника, представляющее собой кашицеобразную массу частично переваренной пищи, смешанной с пищеварительными соками.

ХИНИНОВАЯ ПРОБА — метод определения кислотности желудочного сока по количеству хинина в моче через 2 часа после приема определенного количества ионита, насыщенного хинином.

ХИННАЯ ПРОБА БРАМА — см. *Брама хинная проба.*

ХИОНОФОБИЯ (chionophobia; греч. chiōn снег + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь снега.

ХИРО- — см. *Хейро-.*

ХИРОПРАКТИКА (*хиро-* + греч. praxis действие) — концепция, согласно к-рой возникновение нек-рых болезней обусловлено вывихом определенного позвонка, в связи с чем излечение этих болезней должно достигаться вправлением вывиха соответствующим ручным приемом или поколачиванием специальным деревянным молотком; распространена в нек-рых зарубежных странах и не имеет достаточного научного обоснования.

ХИРОСКОПИЯ (*хиро-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — способ идентификации личности, основанный на изучении индивидуальных особенностей строения кожи ладонной поверхности кисти.

ХИРТЦА ПРИЗНАК (M. M. Hirtz, 1809—1878, франц. врач) — облегчение тягостных ощущений больного только при принятии положения сидя с согнутым туловищем и подтянутыми к подбородку коленями или коленно-локтевого положения; признак выпотного перикардита, обусловленный перемещением экссудата в результате снижения внутрибрюшного давления.

ХИРУРГ (греч. cheir рука + ergon работа, действие) — врач-специалист, получивший подготовку по методам диагностики и хирургического лечения болезней и травм.

ХИРУРГ ВЕДУЩИЙ — наиболее опытный и квалифицированный хирург, на к-рого возложено нештатное руководство хирургической деятельностью данного военно-лечебного учреждения.

ХИРУРГ ДЕТСКИЙ — врач-специалист, получивший подготовку по методам диагностики и хирургического лечения болезней (в т. ч. аномалий развития) и травм у детей.

ХИРУРГ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ — врач-специалист (хирург), получивший подготовку по методам диагностики и хирургического лечения болезней и травм сердца и крупных сосудов.

ХИРУРГ ТОРАКАЛЬНЫЙ — врач-специалист (хирург), получивший подготовку по методам диагностики и хирургического лечения болезней и травм грудной клетки и органов грудной полости.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ БРИГАДА — группа медицинского персонала, создаваемая в лечебном учреждении (на этапе медицинской эвакуации) для проведения хирургических операций.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГРУППА КОРАБЕЛЬНАЯ — подразделение отряда специализированной медицинской помощи, имеющее в своем составе врачей-хирургов и предназначенное для усиления медицинской службы кораблей и корабельных соединений.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГРУППА УСИЛЕНИЯ (истор.) — подразделение отряда медицинского усиления или отряда специализированной медицинской помощи, имеющее в своем составе врачей-хирургов и другой подготовленный медицинский персонал, оснащенное необходимым инструментарием и предназначенное для усиления медико-санитарных батальонов, отдельных медицинских отрядов или госпиталей.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛОПАТКА — инструмент для расширения ран и отведения органов, находящихся в раневой полости, имеющий рабочую часть в виде гладкой пластинки.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ — хирургическая операция, направленная на создание благоприятных условий для заживления раны, на предупреждение и (или) борьбу с раневой инфекцией; включает удаление из раны нежизнеспособных и загрязненных тканей, окончательную остановку кровотечения, рассечение, иссечение раны и др.

Х. О. Р. ВТОРИЧНАЯ — Х. о. р., производимая по вторичным показаниям, т. е. по поводу последующих изменений, обусловленных развитием инфекции.

Х. О. Р. ПЕРВИЧНАЯ — первая по счету обработка раны у данного раненого.

Х. О. Р. ПЕРВИЧНАЯ ОТСРОЧЕННАЯ — первичная Х. о. р., производимая на вторые сутки после ранения.

Х. О. Р. ПОЗДНЯЯ — Х. о. р., производимая по истечении первых суток после ранения.

Х. О. Р. РАННЯЯ — Х. о. р., производимая в первые 24 час. после ранения.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПИЛА — хирургический режущий инструмент, имеющий рабочую часть в виде листовой, ленточной, дисковой или проволочной пилы.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ — бесшовные перчатки, изготовляемые из тонкой резины и предназначенные для обеспечения асептики при хирургических операциях и других манипуляциях.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК — молоток с металлической ручкой и бойком, имеющим резиновую накладку, применяемый совместно с долотом при хирургических операциях.

ХИРУРГИЯ (лат. chirurgia; греч. cheirurgia, от cheir рука + ergon работа, действие) — область клинической медицины, изучающая болезни и травмы, для лечения к-рых применяются оперативные методы, разрабатывающая эти методы и регламентирующая условия их эффективного и безопасного применения.

Х. АБДОМИНАЛЬНАЯ — раздел Х., относящийся к болезням и травмам органов брюшной полости.

Х. ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ — раздел Х. и военной медицины, изучающий патологию боевых повреждений, разрабатывающий методы их диагностики и лечения, а также организационные формы оказания хирургической помощи пораженным на этапах медицинской эвакуации.

Х. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ (син.: Х. пластическая, Х. реконструктивная) — раздел Х., разрабатывающий оперативные методы восстановления анатомической целости, формы и функции поврежденных органов и тканей.

Х. ГНОЙНАЯ—раздел Х., относящийся к болезням, характеризующимся возникновением гнойного воспаления.

Х. ДЕТСКАЯ — раздел Х., разрабатывающий методы диагностики и хирургического лечения болезней (в т. ч. аномалий развития) и травм у детей.

Х. КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ — см. *Хирургия сердечно-сосудистая.*

Х. ОБЩАЯ — раздел Х., изучающий основы патологии и общие принципы применения оперативных и других хирургических методов лечения безотносительно к частным проявлениям отдельных болезней и к техническим особенностям отдельных хирургических операций.

Х. ОПЕРАТИВНАЯ — раздел Х., изучающий и разрабатывающий от-

дельные хирургические доступы и оперативные приемы.

Х. ПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ — см. *Хирургия восстановительная.*

Х. РЕКОНСТРУКТИ́ВНАЯ — см. *Хирургия восстановительная.*

Х. СЕРДЕ́ЧНО-СОСУ́ДИСТАЯ (син. хирургия кардиоваскулярная) — раздел Х., изучающий болезни и травмы сердца и крупных сосудов.

Х. ТОРАКА́ЛЬНАЯ — раздел Х., изучающий болезни и травмы грудной клетки и органов грудной полости.

Х. ЧЕ́ЛЮСТНО-ЛИЦЕВА́Я — раздел хирургии, изучающий болезни и травмы челюстей и нек-рых других органов и тканей области лица.

ХИТИНЭКТОМИ́Я (chitinectomia; хитин + *эктомия*) — см. *Эхинококкэктомия.*

ХИТРО́ВА ОПЕРА́ЦИЯ (Ф. М. Хитров, род. в 1903 г., сов. хирург) — 1) хирургическая операция: перемещение сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча медиальнее малого бугорка с фиксацией его под костно-надкостничной створкой, вырубленной в проксимальном отделе диафиза плечевой кости; применяется для лечения привычного вывиха плеча; 2) пластическая операция: одномоментное формирование всех отделов носа из стебля Филатова.

ХИ́ЩНЫЕ (Carnivora) — отряд кл. млекопитающих, подкл. плацентарных, представители к-рого приспособлены к питанию преимущественно животной пищей; многие Х. являются носителями возбудителей зоонозов, а также паразитарных болезней, опасных для человека.

ХЛАМИ́ДИИ (Chlamydia, Ber; син. миягаванеллы) — род микроорганизмов сем. Chlamydiaceae (порядок Chlamydiales), объединяющий неподвижных коккоподобных грамотрицательных внутриклеточных паразитов, окрашивающихся по Романовскому — Гимзе; включает виды, вызывающие у человека трахому, конъюнктивит, пситтакоз, паховый лимфогранулематоз и другие заболевания.

ХЛАМИДОСПО́РЫ (греч. chlamys, chlamydos верхняя одежда, плащ + *споры*) — образования, возникающие при бесполом размножении некоторых грибов (в т. ч. паразитических); представляют собой крупные клетки, окруженные толстой оболочкой.

ХЛЕ́ВНАЯ ПЛЕ́СЕНЬ — см. *Нейроспора.*

ХЛОА́ЗМА (chloasma; греч. chloazō зеленеть) — гиперпигментация кожи лица в виде желтовато-коричневых пятен.

Х. БЕРЕ́МЕННЫХ (c. gravidarum; син.: маска беременных, melasma uterinum, меланодермия маточная, пятна маточные, хлоазма маточная, хлоазма овариогенная) — Х., развивающаяся у беременных и подвергающаяся медленной инволюции после родов.

Х. БРО́НЗОВАЯ (c. bronzinum) — солнечная Х., развивающаяся у людей европеоидной расы, живущих в тропической зоне.

Х. МА́ТОЧНАЯ — см. *Хлоазма беременных.*

Х. ОВАРИОГЕ́ННАЯ (c. ovariogenum) — см. *Хлоазма беременных.*

Х. ОКОЛОРОТОВА́Я ДЕ́ВИЧЬЯ — см. *Эритроз пигментный околоротовой.*

Х. СО́ЛНЕЧНАЯ (c. solare) — Х., иногда развивающаяся при длительной инсоляции.

ХЛО́ПИНА ТЕО́РИЯ (Н. Г. Хлопин, 1897—1961, сов. гистолог; син. теория дивергентного развития тканей) — теория, согласно к-рой эволюция тканей происходит на основе тех же закономерностей, что и эволюция организмов, т. е. прежде всего дивергентно.

ХЛОР (Chlorum, Cl; от греч. chlōros зеленовато-желтый, бледно-зеленый) — химический элемент подгруппы галогенов VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, ат. номер 17, ат. масса 35,453; газ желто-зеленого цвета с резким запахом; токсичен; используется, напр., для обеззараживания воды.

ХЛОР АКТИ́ВНЫЙ — хлор в составе химического соединения, способный при взаимодействии его водного раствора с йодистым калием вытеснять из последнего йод; содержание Х. а. в хлорсодержащих препаратах характеризует их бактерицидные свойства.

ХЛОР ОСТА́ТОЧНЫЙ — показатель качества обеззараживания воды, выражаемый содержанием в воде активного хлора (в *мг/л*) по окончании процессов его связывания при хлорировании.

ХЛОР РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов хлора с массовыми числами от 32 до 40 и периодом полураспада от нескольких долей секунды до $3{,}1 \cdot 10^5$ лет; отдельные изотопы используются в медико-биологических исследованиях.

ХЛОР- (греч. chlōros зеленовато-желтый, бледно-зеленый) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «зеленый»; 2) «содержащий хлор».

ХЛОРАЛИ́ЗМ (chloralismus; син. хлораломания) — токсикомания, связанная со злоупотреблением хлоралгидратом.

ХЛОРАЛОМАНИ́Я (chloralomania) — см. *Хлорализм.*

ХЛОРАНЕМИ́Я (истор.; chloranaemia; *хлор-* + *анемия*) — общее название симптоматических железодефицитных анемий, при к-рых наблюдается зеленовато-бледная окраска кожных покровов.

ХЛОРАНЕМИ́Я АХИЛИ́ЧЕСКАЯ (устар.; chloranaemia achylica) — см. *Анемия ахлоргидрическая.*

ХЛОРА́ТОР — установка или аппарат для дозирования хлора, вводимого в воду с целью ее обеззараживания.

ХЛОРИ́РОВАНИЕ ВОДЫ — метод обеззараживания воды введением в нее хлора или его соединений.

Х. В. ДВОЙНО́Е — Х. в., при котором хлор вводят в воду дважды: перед очисткой воды (до ввода коагулянта) и после очистки (фильтрации) перед подачей в водоразборную сеть; применяется в периоды паводков, а также при загрязнении воды сточными водами.

ХЛОРЛЕЙКЕМИ́Я (chlorleukaemia; *хлор-* + *лейкемия*) — см. *Хлорлейкоз.*

ХЛОРЛЕЙКО́З (chlorleucosis; *хлор-* + *лейкоз*; син.: Бальфура болезнь, миелосаркома — устар., миелосаркоматоз — устар., хлорлейкемия, хлорома) — вариант миелобластного лейкоза в детском и юношеском возрасте, характеризующийся наличием в костном мозге, лимфатических узлах и нек-рых внутренних органах лейкозных инфильтратов в виде опухолевидных образований зеленого цвета.

ХЛОРОДОНТИ́Я (chlorodontia; *хлор-* + греч. odus, odontos зуб) — появление зеленоватого оттенка в цвете молочных зубов, особенно их пришеечной части; наблюдается у детей, перенесших желтуху новорожденных в тяжелой форме.

ХЛОРО́З ЕГИ́ПЕТСКИЙ (chlorosis aegyptica) — см. *Анемия анкилостомная.*

ХЛОРО́З ПО́ЗДНИЙ (chlorosis tarda; *хлор-* + *-оз*; син. анемия железодефицитная эссенциальная) — железодефицитная анемия у женщин в возрасте старше 30 лет, обычно связанная с маточными или другими кровотечениями, проявляющаяся извращением вкуса и обоняния, признаками атрофии слизистой оболочки полости рта и пищевода, выпадением волос, искривлением ногтей, позже — выраженными признаками анемии.

ХЛОРО́З РА́ННИЙ (chlorosis praematura; син.: бледная немочь, хлороз ювенильный) — железодефицитная анемия у девушек в период полового созревания, проявляющаяся алебастровой бледностью кожи с зеленоватым оттенком, извращением вкуса, олигоменореей.

ХЛОРО́З ЮВЕНИ́ЛЬНЫЙ (chlorosis juvenilis) — см. *Хлороз ранний.*

ХЛОРО́МА (chloroma; *хлор-* + *-ома*) — 1) лейкозный инфильтрат в виде опухолевидного образования зеленого цвета, наблюдающийся при хлорлейкозе; 2) см. *Хлорлейкоз.*

ХЛОРОПСИ́Я (chloropsia; *хлор-* + греч. opsis зрение) — нарушение зрения, при к-ром окружающие предметы кажутся окрашенными в зеленый цвет.

ХЛОРОТО́ИД (устар.; греч. chlōrotēs бледно-зеленый цвет, бледность + -eidēs подобный) — алиментарная железодефицитная гипохромная анемия у грудных детей.

ХЛОРОФОРМОМАНИ́Я (chloroformomania; хлороформ + *мания*) — токсикомания, связанная со злоупотреблением хлороформом в виде его ингаляций или питья.

ХЛОРПОГЛОЩА́ЕМОСТЬ воды (син. хлорпотребность) — показатель загрязнения воды микроорганизмами, органическими и недоокисленными неорганическими веществами, представляющий собой количество хлора в миллиграммах на 1 *л* воды, связываемое ими при данных условиях контакта; используется для расчета дозы хлора при хлорировании воды.

ХЛОРПОТРЕ́БНОСТЬ воды — см. *Хлорпоглощаемость.*

ХМЕЛЕ́ВСКОГО РОДОСТИМУЛЯ́ЦИЯ (В. Н. Хмелевский, 1900—1959, сов. акушер-гинеколог) — метод стимуляции родовой деятельности в первом и во втором периодах родов путем внутривенного введения растворов глюкозы, хлористого кальция и аскорбиновой кислоты в сочетании с внутримышечным введением витамина B_1 (тиамина).

ХОАНОМАСТИГО́ТА (греч. choanē воронка + mastix, mastigos бич, кнут) — стадия жизненного цикла трипаносоматид, у к-рой жгутик заключен в воронкообразный резервуар; характерна для некоторых видов, являющихся паразитами членистоногих.

ХОА́НЫ (choanae, PNA, BNA, JNA; греч. choanē воронка) — отверстия,

соединяющие полости носа и носовой части глотки.

ХО́ДЖКИНА БОЛЕ́ЗНЬ (Th. Hodgkin, 1798—1866, англ. врач) — см. *Лимфогранулематоз.*

ХО́ДЖКИНА ГРАНУЛЁМА (Th. Hodgkin) — вариант лимфогранулематоза, характеризующийся преобладанием в лимфогранулемах анаплазированных ретикулярных клеток.

ХО́ДЖКИНА ПАРАГРАНУЛЁМА (Th. Hodgkin) — см. *Парагранулема.*

ХО́ДЖКИНА САРКО́МА (Th. Hodgkin) — вариант лимфогранулематоза, характеризующийся преобладанием в лимфогранулемах анаплазированных ретикулярных клеток.

ХОДОГЕНЕ́З (истор.; греч. hodos путь, направление + genesis происхождение, развитие) — теория регенерации нервных волокон, согласно к-рой прорастание осевого цилиндра из центрального отрезка поврежденного волокна в периферический стимулируется и направляется его соприкосновением с более плотными, чем тканевая жидкость, субстратами (клетки, волокна) периферического отрезка нерва.

ХО́ДЬБА АВТОМАТИ́ЧЕСКАЯ — см. *Рефлекс шаговый.*

ХО́ДЬБА ДОЗИ́РОВАННАЯ — дозированная физическая нагрузка в виде ходьбы, регламентированной по продолжительности, темпу, расстоянию и типу местности; используется как метод лечебной физкультуры, физической тренировки или функционального исследования.

ХОЗЯИН паразита — организм (биологический вид), в теле или на поверхности тела к-рого паразит обитает, кормится и размножается.

Х. ДЕФИНИТИ́ВНЫЙ — см. *Хозяин окончательный.*

Х. ДОПОЛНИ́ТЕЛЬНЫЙ — второй промежуточный Х. в цикле развития данного паразита, напр. рыбы для лентецов и нек-рых трематод.

Х. ОБЛИГА́ТНЫЙ — Х., к к-рому паразит эволюционно и экологически приспособлен (напр., возбудители заразных болезней человека).

Х. ОКОНЧА́ТЕЛЬНЫЙ (син. Х. дефинитивный) — Х., в к-ром обитает половозрелая стадия паразита или происходит его размножение половым путем, напр. человек для трематод, цепней и филярий.

Х. ОСНОВНО́Й — Х., обеспечивающий поддержание популяции паразита на той или иной стадии развития.

Х. ПРОМЕЖУ́ТОЧНЫЙ — Х., в к-ром обитает личиночная стадия паразита или происходит его размножение бесполым путем, напр. моллюски для трематод, человек для эхинококка или малярийного плазмодия.

Х. ФАКУЛЬТАТИ́ВНЫЙ — Х., к к-рому паразит филогенетически не приспособлен, обладает в нем слабой жизнеспособностью и низкой плодовитостью.

ХОЗЯ́ЙСТВЕННО-БЫТОВЫ́Е ФАКТО́РЫ СРЕ́ДЫ — см. *Антропогенные факторы среды.*

ХОЛ- (холе-; греч. cholē желчь) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к желчи», «желчный».

ХОЛАГО́ГА (cholagoga; *хол-* + греч. agōgos приводящий, вызывающий) — см. *Холекинетики.*

ХОЛАЛЕМИ́Я (устар.; cholalaemia; лат. acidum cholalicum холевая кислота + греч. haima кровь) — см. *Холемия.*

ХОЛАНГИО- (*хол-* + греч. angeion сосуд) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к желчным протокам».

ХОЛАНГИОГЕПАТИ́Т (*холангио-* + *гепатит*) — см. *Гепатохолангит.*

ХОЛАНГИОГРАФИ́Я (*холангио-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенологическое исследование желчных протоков после введения в них контрастного вещества.

Х. ИНТРАОПЕРАЦИО́ННАЯ (син. Х. субоперационная) — Х., проводимая в ходе оперативного вмешательства с введением контрастного вещества посредством пункции или катетеризации.

Х. ЛАПАРОСКОПИ́ЧЕСКАЯ — Х., при к-рой контрастное вещество вводят путем пункции печени через лапароскоп.

Х. РАДИОИЗОТО́ПНАЯ (нрк) — см. *Холеграфия радиоизотопная.*

Х. СУБОПЕРАЦИО́ННАЯ — см. *Холангиография интраоперационная.*

Х. ТРАНСДУОДЕНА́ЛЬНАЯ (лат. trans через + анат. duodenum двенадцатиперстная кишка) — Х., при к-рой контрастное вещество вводят через отверстие большого сосочка двенадцатиперстной кишки (фатерова соска) посредством катетеризации общего желчного протока под контролем дуоденоскопии или с помощью дуоденального зонда с надувными баллонами, позволяющими повысить давление в просвете двенадцатиперстной кишки.

Х. ЧРЕСКО́ЖНАЯ — Х., при к-рой контрастное вещество вводят в общий желчный проток или желчный пузырь посредством пункции через брюшную стенку.

Х. ЧРЕСКО́ЖНАЯ ЧРЕСПЕЧЁНОЧНАЯ — Х., при к-рой контрастное вещество вводят в общий желчный проток или желчный пузырь посредством пункции через брюшную стенку и ткань печени.

Х. ЧРЕСПЕЧЁНОЧНАЯ — интраоперационная Х., при к-рой контрастное вещество вводят в желчный пузырь или общий желчный проток посредством пункции через ткань печени.

ХОЛАНГИОКАРЦИНО́МА (cholangiocarcinoma; *холангио-* + *карцинома*) — см. *Рак холангиоцеллюлярный.*

ХОЛАНГИОКИНЕМАТОГРАФИ́Я (*холангио-* + кинематография) — рентгенокинематография контрастированных желчных путей.

ХОЛАНГИО́ЛА (cholangiola, LNH; *хол-* + гист. angiola уменьшительное от греч. angeion сосуд; син. Геринга промежуточный каналец печени) — узкая межклеточная щель в печеночной балке, переходящая в желчный капилляр.

ХОЛАНГИОЛИ́Т (cholangiolitis; *холангиола* + *-ит*) — воспаление холангиол..

ХОЛАНГИО́МА (cholangioma; *хол-* + греч. angeion сосуд + *-ома*; син. аденома желчных путей) — доброкачественная опухоль желчных протоков в форме одиночных или множественных узлов, представляющих собой конгломерат беспорядочно расположенных протоков, выстланных призматическим эпителием.

ХОЛАНГИОМАНОМЕТРИ́Я (*холангио-* + *манометрия*) — измерение давления внутри желчных протоков во время хирургической операции.

ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИ́Я РЕТРОГРА́ДНАЯ (*холангио-* + греч. pankreas поджелудочная железа + graphō писать, изображать) — см. *Панкреатохолангиорентгенография ретроградная.*

ХОЛАНГИОСКОПИ́Я (cholangioscopia; *холангио-* + греч. skopeō смотреть, наблюдать) — осмотр желчных протоков с помощью эндоскопа.

ХОЛАНГИОТИ́Ф (cholangiotyphus; *холангио-* + *тиф*) — воспаление желчных протоков, вызванное брюшнотифозной палочкой.

ХОЛАНГИОХОЛЕЦИСТОГРАФИ́Я ВНУТРИВЕ́ННАЯ (*холангио-* + греч. cholē желчь + kystis пузырь + graphō писать, изображать) — см. *Холеграфия внутривенная.*

ХОЛАНГИОЦИСТОСТОМИ́Я (cholangiocystostomia; *холангио-* + греч. kystis пузырь + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между печеночным протоком и кистой поджелудочной железы.

ХОЛАНГИОЭНТЕРОСТОМИ́Я (cholangioenterostomia; *холангио-* + греч. enteron кишка + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между печеночным желчным протоком и тонкой кишкой.

ХОЛАНГИ́Т (cholangitis; *хол-* + греч. angeion сосуд + *-ит*; син. ангиохолит) — воспаление желчных протоков.

Х. АБСЦЕДИ́РУЮЩИЙ (с. abscedens) — гнойный внутрипеченочный Х., сопровождающийся образованием абсцессов.

Х. ВНУТРИПЕЧЁНОЧНЫЙ ГНО́ЙНЫЙ (с. intrahepatica purulenta) — Х., характеризующийся гнойным воспалением внутрипеченочных желчных протоков.

Х. ВНУТРИПЕЧЁНОЧНЫЙ ПЕРВИ́ЧНЫЙ (с. intrahepatica primaria) — Х., при к-ром поражение внутрипеченочных желчных протоков не связано с застоем желчи или восходящей инфекцией; наблюдается при вирусном гепатите и нек-рых других инфекционных болезнях.

Х. ВОСХОДЯ́ЩИЙ — см. *Холангит энтерогенный.*

Х. ГАСТРОГЕ́ННЫЙ (с. gastrogena; син. холангия гастритная — устар.) — Х., возникающий иногда при болезнях желудка.

Х. ГЕМАТОГЕ́ННЫЙ (с. haematogena) — Х., обусловленный гематогенным распространением возбудителей инфекции.

Х. ГРАНУЛЕМАТО́ЗНЫЙ (с. granulomatosa) — Х., характеризующийся образованием гигантоклеточных гистиоцитарных гранулем; иногда наблюдается при лечении внутрипеченочного гнойного Х. сульфаниламидными препаратами.

Х. ОБЛИТЕ́РИРУЮЩИЙ (с. obliterans) — хронический Х., характеризующийся очаговыми воспалительными изменениями желчных путей, приводящими к рубцеванию и облитерации желчных протоков.

Х. ПАНКРЕАТИ́ЧЕСКИЙ (c. pancreatica) — см. *Холангит панкреатогенный.*

Х. ПАНКРЕАТОГЕ́ННЫЙ (c. pancreatogena; син. Х. панкреатический) — Х., возникающий при болезнях поджелудочной железы.

Х. ПОСТГЕПАТИ́ТНЫЙ (c. posthepatitica; лат. приставка post- после + *гепатит*) — Х., развивающийся как осложнение гепатита.

Х. СЕПТИ́ЧЕСКИЙ (c. septica) — гнойный Х., возникающий как проявление сепсиса.

Х. СКЛЕРОЗИ́РУЮЩИЙ (c. sclerosans) — Х., характеризующийся развитием склероза стенок желчных протоков.

Х. СТА́РЧЕСКИЙ (c. senilis) — Х. у лиц пожилого возраста, характеризующийся стертой клинической картиной и постепенным развитием хронического гепатита или цирроза печени.

Х. ТОКСИ́ЧЕСКИЙ (c. toxica) — Х., обусловленный интоксикацией нек-рыми ядами, напр. соединениями мышьяка или свинца, хлороформом, а также алкоголем.

Х. УРЕМИ́ЧЕСКИЙ (c. uraemica) — Х., наблюдающийся при уремии, обусловленный выделением большого количества мочевины печенью и слизистой оболочкой желчных протоков.

Х. ЭНТЕРОГЕ́ННЫЙ (c. enterogena; син. холангит восходящий) — Х., сопутствующий болезням тонкой кишки, напр. дуодениту, дивертикулезу, язвенной болезни с локализацией язвы в двенадцатиперстной кишке.

ХОЛАНГИ́Я ГАСТРИ́ТНАЯ (устар.)— см. *Холангит гастрогенный.*

ХОЛА́Т — общее название солей желчных кислот.

ХО́ЛДЕЙНА АППАРА́Т (J. S. Haldane, 1860—1936, англ. физиолог) — прибор для количественного определения содержания кислорода и углекислого газа в воздухе (в т. ч. выдыхаемом) путем последовательного пропускания исследуемой пробы через растворы соответствующих поглотителей и измерения объема оставшейся смеси газов.

ХО́ЛДИНА ЗАЖИ́М (С. А. Холдин, 1896—1974, сов. хирург-онколог) — хирургический зажим, имеющий гофрированные губки с каналом и проводимой через него длинной иглой; применяется при резекции желудка электрохирургическим методом.

ХО́ЛДИНА МАСТЭКТОМИ́Я (С. А. Холдин) — модификация расширенной радикальной мастэктомии, при к-рой парастернальные лимфатические узлы удаляют с помощью экстраплеврального доступа.

ХО́ЛДИНА ОПЕРА́ЦИЯ (С. А. Холдин) — хирургическая операция: наложение анастомоза между отделами толстой кишки с помощью зажимов Холдина; при Х. о. просвет кишки в течение всей операции остается закрытым.

ХО́ЛДИНА РЕЗЕ́КЦИЯ ЖЕЛУ́ДКА (С. А. Холдин) — хирургическая операция: резекция желудка по методу Бильрот-II, в модификации Финстерера, проводимая с помощью электрохирургических инструментов и зажима Холдина.

ХОЛЕ- — см. *Хол-.*

ХО́ЛЕВАЯ КИСЛОТА́ — желчная кислота, представляющая собой монокарбоновую триоксикислоту; в желчи находится в виде натриевых солей гликохолевой и таурохолевой кислот.

ХОЛЕГЛОБИ́Н — см. *Вердогемоглобин.*

ХОЛЕГРАФИ́Я (*холе-* + греч. graphō писать, изображать) — последовательная рентгенография желчных путей после введения в организм контрастных веществ, к-рые улавливаются из крови печенью и выделяются с желчью.

Х. ВНУТРИВЕ́ННАЯ (син. холангиохолецистография внутривенная) — Х., при к-рой контрастное вещество вводят внутривенно.

Х. ВНУТРИВЕ́ННАЯ УСКО́РЕННАЯ — Х. в., при к-рой вводят лекарственные средства, усиливающие желчевыделительную функцию печени.

Х. ИНФУЗИО́ННАЯ — Х., при к-рой сильно разведенное контрастное вещество вводят путем капельного вливания в вену, что обеспечивает более длительное контрастирование желчных путей и уменьшает побочные явления.

Х. ПЕРОРА́ЛЬНАЯ — Х., при к-рой контрастное вещество исследуемый принимает перорально.

ХОЛЕГРАФИ́Я РАДИОИЗОТО́ПНАЯ (син. холангиография радиоизотопная — нрк) — радиография желчных путей с помощью меченых соединений, поглощаемых печенью из крови и выделяемых с желчью.

ХОЛЕДОХО- (анат. ductus choledochus общий желчный проток, от греч. cholē желчь + dochē вместилище, сосуд) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к общему желчному протоку».

ХОЛЕДОХОГАСТРОСТОМИ́Я (choledochogastrostomia; *холедохо-* + греч. gastēr, gastros желудок + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между общим желчным протоком и желудком.

ХОЛЕДОХОДУОДЕ́НОСТОМИ́Я (choledochoduodenostomia; *холедохо-* + анат. duodenum двенадцатиперстная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между общим желчным протоком и двенадцатиперстной кишкой при невозможности холецистодуоденостомии; существует три варианта операции: ретро-, супра- и трансдуоденальная Х.

ХОЛЕДОХОЕЮНОСТОМИ́Я (choledochojejunostomia; *холедохо-* + анат. jejunum тощая кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между общим желчным протоком и тощей кишкой.

ХОЛЕДОХОЛИТИА́З (choledocholithiasis; *холедохо-* + греч. lithos камень + *-иаз*) — наличие при желчнокаменной болезни конкрементов в общем желчном протоке.

ХОЛЕДОХОЛИТОТОМИ́Я (choledocholithotomia; *холедохо-* + греч. lithos камень + tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: удаление конкремента из общего желчного протока путем вскрытия просвета последнего.

ХОЛЕДОХОПЛА́СТИКА (choledochoplastica; *холедохо-* + *пластика*) — общее название восстановительных операций на общем желчном протоке.

ХОЛЕДОХОСКО́П (*холедохо-* + греч. skopeō смотреть, наблюдать) — эндоскоп для осмотра общего желчного протока и выполнения манипуляций в них под контролем зрения во время хирургической операции.

ХОЛЕДОХОСКОПИ́Я (*холедохо-* + греч. skopeō смотреть, наблюдать) — эндоскопия общего желчного протока; выполняется гл. обр. во время хирургической операции.

ХОЛЕДОХОСТОМИ́Я (choledochostomia; *холедохо-* + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение наружного свища общего желчного протока.

ХОЛЕДОХОТОМИ́Я (choledochotomia; *холедохо-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение стенки общего желчного протока.

ХОЛЕДОХОЭНТЕРОСТОМИ́Я (choledochoenterostomia; *холедохо-* + греч. enteron кишка + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между общим желчным протоком и тонкой кишкой.

ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРО́Л (cholecalciferolum; син. витамин D_3) — жирорастворимый витамин, источником к-рого для человека являются печень млекопитающих, птиц и рыб, а также яичный желток и рыбий жир; при недостатке Х. в пище у детей возникает рахит, а у взрослых остеопороз, мышечные боли, парестезии.

ХОЛЕКИНЕ́З (*холе-* + греч. kinēsis движение) — см. *Желчевыделение.*

ХОЛЕКИНЕ́ТИКИ (cholekinetica; *холе-* + греч. kinētikos относящийся к движению; син. холагога) — спазмолитические средства, расслабляющие сфинктер печеночно-поджелудочной ампулы, способствующие выведению желчи в кишечник (атропин, папаверин, сульфат магния и др.).

ХОЛЕЛИТИА́З (*холе-* + греч. lithos камень + *-иаз*) — см. *Болезнь желчнокаменная.*

ХОЛЕМИ́Я (cholaemia; *хол-* + греч. haima кровь; син.: желчекровие — устар., холалемия — устар.) — повышенное содержание в крови составных частей желчи (желчных кислот, билирубинглюкуронида); наблюдается при закупорке желчных протоков и поражениях паренхимы печени.

ХОЛЕМИ́Я ВРОЖДЕ́ННАЯ СЕМЕ́ЙНАЯ (cholaemia congenita familiaris) — см. *Жильбера — Мейленграхта синдром.*

ХОЛЕМИ́Я ПРОСТА́Я СЕМЕ́ЙНАЯ (cholaemia simplex familiaris) — см. *Жильбера — Мейленграхта синдром.*

ХОЛЕ́РА (cholera; греч. от cholē желчь + rheō течь, истекать; возможно, от греч. cholera водосточный желоб или от древнееврейск. chaul rah дурная болезнь; син. холера азиатская) — острая инфекционная болезнь из группы кишечных, вызываемая холерным вибрионом (Vibrio cholerae), характеризующаяся фекально-оральным механизмом передачи и протекающая в типичных случаях с обильным водянистым поносом и рвотой, приводящими к обезвоживанию организма; отнесена к карантинным инфекциям.

Х. АЗИА́ТСКАЯ (c. asiatica) — см. *Холера.*

Х. МОЛНИЕНО́СНАЯ — см. *Холера сухая.*

Х. СУХА́Я (c. sicca; син. Х. молниеносная) — клиническая форма Х., характеризующаяся сильнейшей интоксикацией при отсутствии поноса и рвоты.

Х. ЭЛЬ-ТОР (с. el-tor) — этиологический вариант Х., вызываемый вибрионом Эль-Тор (Vibrio cholerae биовар eltor), обладающий всеми основными клиническими и эпидемиологическими характеристиками классической Х.

ХОЛЕРЕ́З (cholaeresis; возможно, от *хол-* + греч. eressō грести, приводить в движение) — см. *Желчеобразование.*

ХОЛЕРЕ́ТИКИ (choleretica; возможно, от *хол-* + греч. eretikos относящийся к гребле, приводящий в движение, выталкивающий) — лекарственные средства, усиливающие образование желчи (напр., дегидрохолевая кислота, аллохол, оксафенамид, циквалон, никодин, кукурузные рыльца).

ХОЛЕРИ́ЧЕСКИЙ ТИП (от греч. cholē желчь) — см. *Тип высшей нервной деятельности сильный неуравновешенный.*

«ХОЛЕ́РНЫЕ ОЧКИ́» — сочетание резко выраженного цианоза вокруг глаз с западением глазных яблок при тяжелом обезвоживании организма, гл. обр. у больных холерой.

ХОЛЕРОГЕ́Н (cholerogenum; *холера* + греч. -genēs порождаемый; син.: токсин холерный — нрк, экзотоксин холерный, энтеротоксин холерный) — токсин белковой природы, продуцируемый холерными вибрионами, фиксируемый рецепторами клеток слизистой оболочки тонкой кишки и обусловливающий синдром диареи при холере.

ХОЛЕСТА́З (cholestasis; *холе-* + греч. stasis неподвижность, застой; син.: застой желчи, стаз желчный) — нарушение продвижения желчи в виде застоя в желчных протоках и (или) проточках.

ХОЛЕСТЕАТО́МА [cholesteatoma; *холе(стерин)* + греч. stear, steatos жир + *-ома*; син. опухоль жемчужная] — опухолевидное образование, представляющее собой скопление кератина, кристаллов холестерина и слущенного ороговевшего эпителия, окруженное соединительнотканной капсулой.

Х. ВРОЖДЁННАЯ (c. congenitum) — см. *Холестеатома истинная.*

Х. ВТОРИ́ЧНАЯ (c. secundarium) — см. *Холестеатома ложная.*

Х. ИМПЛАНТАЦИО́ННАЯ (c. post implantationem) — ложная Х., возникающая в результате механического переноса многослойного плоского эпителия, продуцирующего кератин, в место, где эта ткань в норме отсутствует.

Х. ИСТИННАЯ (c. verum; син.: Х. врожденная, Х. первичная) — Х., возникшая в результате неправильного формирования эктодермального зачатка на ранних стадиях эмбриогенеза.

Х. ЛО́ЖНАЯ (c. spurium; син.: псевдохолестеатома, Х. вторичная) — Х., возникшая в исходе воспаления или травмы.

Х. ПЕРВИ́ЧНАЯ (c. primarium) — см. *Холестеатома истинная.*

Х. СПИННО́ГО МО́ЗГА ПОСТПУНКЦИО́ННАЯ (c. medullae spinalis post punctionem) — имплантационная Х., возникшая вследствие заноса клеток кожного эпителия в оболочки спинного мозга иглой при спинномозговой пункции.

Х. УШНА́Я (c. auriculare) — ложная Х. в полости среднего уха, образующаяся при эпитимпаните.

ХОЛЕСТЕРИ́Н (син. холестерол) — вещество из группы стеринов, содержащееся во всех тканях организма человека и животных, гл. образом в нервной и жировой ткани, в печени; нарушения обмена Х. приводят к его отложению в стенках сосудов, к образованию конкрементов и другим патологическим процессам.

ХОЛЕСТЕРИ́Н О́БЩИЙ — суммарное содержание в сыворотке крови свободного и этерифицированного холестерина.

ХОЛЕСТЕРИ́Н СВОБО́ДНЫЙ — содержание в сыворотке крови холестерина, химически не связанного с жирными кислотами.

ХОЛЕСТЕРИ́Н ЭТЕРИФИЦИ́РОВАННЫЙ — содержание в сыворотке крови холестерина в виде его соединений с жирными кислотами (эфиров).

ХОЛЕСТЕРИНЕМИ́Я (холестерин + греч. haima кровь) — см. *Гиперхолестеринемия.*

ХОЛЕСТЕРИНО́З ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯ́РНЫЙ (cholesterinosis extracellularis; холестерин + *-оз*) — см. *Ксантоматоз.*

ХОЛЕСТЕРО́З ВНЕКЛЕ́ТОЧНЫЙ У́РБАХА — см. *Гиалиноз кожи и слизистых оболочек.*

ХОЛЕСТЕРО́З ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ́ (cholesterosis vesicae felleae; син.: липоидоз желчного пузыря, холецистит липоидный) — болезнь обмена веществ, характеризующаяся отложением эфиров холестерина в слизистой оболочке желчного пузыря и проявляющаяся признаками нарушения его сократительной способности; встречается чаще у тучных женщин старше 35 лет.

ХОЛЕСТЕРО́Л — см. *Холестерин.*

ХОЛЕСТЕРО́Л - ЭСТЕРА́ЗА — фермент класса гидролаз (КФ 3.1.1.13), катализирующий гидролитическое расщепление эфиров холестерина.

ХОЛЕТОМОГРАФИ́Я (*холе-* + *томография*) — томография желчных путей.

ХОЛЕЦИСТ- (холецисто-; *холе-* + греч. kystis пузырь) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к желчному пузырю».

ХОЛЕЦИСТИ́Т (cholecystitis; *холецист-* + *-ит*) — воспаление желчного пузыря.

Х. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ (c. allergica) — Х., возникающий как аллергическая реакция слизистой оболочки желчного пузыря на аллергены пищевого или бактериального происхождения.

Х. БЕСКА́МЕННЫЙ (c. incalculosa) — Х., не сопровождающийся образованием желчных конкрементов.

Х. БРЮШНОТИФО́ЗНЫЙ (c. abdominotyphosa) — катаральный или гнойный Х., развивающийся как осложнение брюшного тифа.

Х. ВТОРИ́ЧНЫЙ (c. secundaria; син. Х. сопутствующий) — хронический Х. с вялым течением, сопровождающий хронические болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Х. ГА́ЗОВЫЙ (c. gaseosa; син.: пневмохолецистит, Х. эмфизематозный) — Х., протекающий со скоплением газа в желчном пузыре; вызывается возбудителями анаэробной инфекции.

Х. ГАНГРЕНО́ЗНЫЙ (c. gangraenosa) — Х., характеризующийся некрозом и гангренозным воспалением стенки желчного пузыря; обычно вызывается возбудителями анаэробной инфекции.

Х. ГНОЙНО-Я́ЗВЕННЫЙ (c. purulentoulcerosa) — гнойный Х. с изъязвлением слизистой оболочки желчного пузыря.

Х. ГНО́ЙНЫЙ (c. purulenta) — Х., вызванный возбудителями гнойной инфекции и характеризующийся скоплением гноя в полости пузыря.

Х. ДИФТЕРИТИ́ЧЕСКИЙ (c. diphtheritica) — 1) Х., являющийся осложнением дифтерии; 2) Х. в виде фибринозного воспаления с некрозом слизистой оболочки и образованием на ней беловатых или серых налетов.

Х. ИНФЕКЦИО́ННЫЙ (c. infectiosa) — Х., возникающий при инфекционной болезни и обусловленный ее возбудителем.

Х. КАЛЬКУЛЁЗНЫЙ (c. calculosa) — Х., при к-ром в желчном пузыре обнаруживаются конкременты.

Х. КАТАРА́ЛЬНЫЙ (c. catarrhalis) — поверхностное воспаление слизистой оболочки желчного пузыря с выделением серозного или слизисто-серозного экссудата.

Х. ЛИПО́ИДНЫЙ (c. lipoidea) — см. *Холестероз желчного пузыря.*

Х. О́СТРЫЙ (c. acuta) — Х., продолжающийся не более 3 месяцев, проявляющийся сильными болями в правом подреберье, диспептическими явлениями, лихорадкой, лейкоцитозом и ускоренной РОЭ.

Х. РЕГУРГИТАЦИО́ННЫЙ (c. regurgitationalis) — Х., обусловленный забрасыванием в желчный пузырь панкреатического сока с повреждением слизистой оболочки трипсином.

Х. СОПУ́ТСТВУЮЩИЙ — см. *Холецистит вторичный.*

Х. ТОКСИ́ЧЕСКИЙ (c. toxica) — Х., вызванный каким-либо токсическим воздействием на слизистую оболочку желчного пузыря.

Х. ФЛЕГМОНО́ЗНЫЙ (c. phlegmonosa) — острый Х., характеризующийся поражением всей (или практически всей) стенки желчного пузыря со скоплением в его полости гнойного или гнойно-геморрагического экссудата.

Х. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (c. chronica) — Х., характеризующийся длительным течением с болями в правом подреберье, диспептическими явлениями, уменьшением желчеотделения; нередко сочетается с желчнокаменной болезнью.

Х. ЭМБОЛИ́ЧЕСКИЙ (c. embolica) — Х., вызванный попаданием возбудителя инфекции в желчный пузырь с инфицированным эмболом (напр., при подостром септическом эндокардите).

Х. ЭМФИЗЕМАТО́ЗНЫЙ (c. emphysematosa) — см. *Холецистит газовый.*

ХОЛЕЦИСТО- — см. *Холецист-.*

ХОЛЕЦИСТОГАСТРОСТОМИ́Я (cholecystogastrostomia; *холецисто-* + греч. gastēr, gastros желудок + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между желчным пузырем и желудком; применяется при

непроходимости общего желчного протока.

ХОЛЕЦИСТОГЕПАТИ́Т (cholecystohepatitis; *холецисто-* + греч. hēpar, hēpatos печень + *-ит*) — сочетанное воспаление желчного пузыря, желчных протоков и печени.

ХОЛЕЦИСТОГРАФИ́Я (*холецисто-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография желчного пузыря после введения в организм контрастного вещества, к-рое улавливается из крови печенью, выделяется с желчью и концентрируется в желчном пузыре, что обеспечивает его изображение на рентгенограмме.

Х. ЛАПАРОСКОПИ́ЧЕСКАЯ — Х., проводимая в ходе хирургического вмешательства с вскрытием брюшной полости, причем контрастное вещество вводят непосредственно в желчный пузырь при его пункции.

Х. ОРА́ЛЬНАЯ — см. *Холецистография пероральная.*

Х. ПЕРОРА́ЛЬНАЯ (син. Х. оральная) — Х., при к-рой исследуемый принимает контрастное вещество перорально.

Х. СЕРИ́ЙНАЯ — Х. с повторной рентгенографией в процессе заполнения желчного пузыря контрастированной желчью, что позволяет оценить его концентрационную функцию.

ХОЛЕЦИСТОГРАФИ́Я РАДИОИЗОТО́ПНАЯ (син. радиохолецистография) — радиография желчного пузыря с введением в организм меченого соединения, к-рое улавливается из крови печенью, выделяется с желчью и накапливается в желчном пузыре.

ХОЛЕЦИСТОДУОДЕНО́СТОМИЯ (cholecystoduodenostomia; *холецисто-* + анат. duodenum двенадцатиперстная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой; применяется при непроходимости общего желчного протока.

ХОЛЕЦИСТОЕЮНОСТОМИ́Я (cholecystojejunostomia; *холецисто-* + анат. jejunum тощая кишка + греч. stoma отверстие; син.: Монастырского операция, холецистоэнтеростомия) — хирургическая операция: наложение анастомоза между желчным пузырем и тощей кишкой; применяется обычно при невозможности произвести холецистодуоденостомию.

ХОЛЕЦИСТОКИНИ́Н (*холецисто-* + греч. kineō двигать; син. панкреозимин) — биологически активное вещество, образующееся в слизистой оболочке двенадцатиперстной и тонкой кишки при поступлении в них желудочного содержимого, вызывающее сокращение и опорожнение желчного пузыря.

ХОЛЕЦИСТОКОЛОСТОМИ́Я (cholecystocolostomia; *холецисто-* + греч. kolon толстая кишка + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между желчным пузырем и толстой кишкой.

ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИ́Т (cholecystopancreatitis; *холецисто-* + греч. pankreas, pankreatos поджелудочная железа + *-ит*) — сочетанное воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы.

ХОЛЕЦИСТОПАТИ́Я (cholecystopathia; *холецисто-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название болезней желчного пузыря.

ХОЛЕЦИСТОПЕКСИ́Я (cholecystopexia; *холецисто-* + греч. pēxis прикрепление) — хирургическая операция: фиксация желчного пузыря к соседним органам при его чрезмерной подвижности.

ХОЛЕЦИСТОРАФИ́Я (cholecystorrhaphia; *холецисто-* + греч. rhaphē шов) — наложение швов на рану желчного пузыря.

ХОЛЕЦИСТОСКАНИ́РОВАНИЕ (*холецисто-* + *сканирование*; син. холецистосканография) — радиоизотопное сканирование желчного пузыря.

ХОЛЕЦИСТОСКАНОГРАФИ́Я (*холецисто-* + сканирование + греч. graphō писать, изображать) — см. *Холецистосканирование.*

ХОЛЕЦИСТОСТОМИ́Я (cholecystostomia; *холецисто-* + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение наружного свища желчного пузыря; применяется в тех случаях острого холецистита, когда состояние больного не допускает более сложного оперативного вмешательства.

ХОЛЕЦИСТОТОМИ́Я (cholecystotomia; *холецисто-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие полости желчного пузыря.

ХОЛЕЦИСТОТОМОГРАФИ́Я (*холецисто-* + *томография*) — томография желчного пузыря.

ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГИ́Т (cholecystocholangitis; *холецисто-* + греч. cholē желчь + angeion сосуд + *-ит*; син. ангиохолецистит) — сочетанное воспаление желчного пузыря и желчных протоков.

ХОЛЕЦИСТОЭНТЕРОСТОМИ́Я (cholecystoenterostomia; *холецисто-* + греч. enteron кишка + stoma отверстие) — см. *Холецистоеюностомия.*

ХОЛЕЦИСТЭКТАЗИ́Я (cholecystectasia; *холецист-* + греч. ektasis расширение) — расширение желчного пузыря; возникает при повышенном давлении желчи в нем или пониженном тонусе его стенок.

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИ́Я (cholecystectomia; *холецист-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление желчного пузыря.

ХОЛИ́ЗМ (греч. holos весь, целый) — идеалистическая теория, рассматривающая мир как результат ступенчатой эволюции, направляемой нематериальным и непознаваемым «фактором целостности».

ХОЛИ́Н (cholinum; син. витамин B_4) — триметиламино-этиловый спирт, содержащийся в злаках, сое, печени, яйцах; в организме человека и животных служит источником образования ацетилхолина и фосфолипидов; относится к витаминоподобным веществам.

ХОЛИНАЦЕТИЛА́ЗА (нрк) — см. *Холин-ацетилтрансфераза.*

ХОЛИ́Н-АЦЕТИЛТРАНСФЕРА́ЗА (син. холинацетилаза — нрк) — фермент класса трансфераз (КФ 2.3.1.6), катализирующий перенос ацетильного остатка с ацетил-КоА на холин с образованием ацетилхолина; участвует в процессе передачи возбуждения в холинергических синапсах.

ХОЛИНЕРГИ́ЧЕСКИЕ СИСТЕ́МЫ — см. *Холинорецепторы.*

ХОЛИНЕРГИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (cholinergica; холин + греч. ergon действие) — лекарственные средства, блокирующие или облегчающие передачу импульсов в холинергических синапсах.

ХОЛИНОЛИ́ТИКИ (cholinolytica; холин + греч. lytikos способный растворять, ослабляющий) — см. *Холинолитические средства.*

М-ХОЛИНОЛИ́ТИКИ — см. *М-холинолитические средства.*

Н-ХОЛИНОЛИ́ТИКИ — см. *Н-холинолитические средства.*

ХОЛИНОЛИТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (cholinolytica; холин + греч. lytikos способный растворять, ослабляющий; син.: холинолитики, холинонегативные средства) — холинергические средства, препятствующие взаимодействию медиаторов с холинорецепторами и тем самым блокирующие передачу импульсов в холинергических синапсах без нарушения процесса образования медиатора и выделения его из нервных окончаний.

М-ХОЛИНОЛИТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (син.: М.-холинолитики, М-холинонегативные средства) — Х. с., препятствующие взаимодействию медиаторов с М-холинорецепторами (атропин, скополамин, платифиллин и др.).

Н-ХОЛИНОЛИТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (син.: Н-холинолитики, Н-холинонегативные средства) — Х. с., препятствующие взаимодействию медиаторов с Н-холинорецепторами (бензогексоний, димеколин, d-тубокурарин-хлорид, дитилин и др.).

ХОЛИНОМИМЕ́ТИКИ (cholinomimetica; холин + греч. mimētikos способный к подражанию, подражающий) — см. *Холиномиметические средства.*

М-ХОЛИНОМИМЕ́ТИКИ — см. *М-холиномиметические средства.*

Н-ХОЛИНОМИМЕ́ТИКИ — см. *Н-холиномиметические средства.*

ХОЛИНОМИМЕТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (cholinomimetica; холин + греч. mimētikos способный к подражанию, подражающий; син.: холиномиметики, холинопозитивные средства) — холинергические средства с различным механизмом действия, вызывающие эффекты, характерные для возбуждения холинорецепторов.

М-ХОЛИНОМИМЕТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (син.: М-холиномиметики, М-холинопозитивные средства) — Х. с., возбуждающие или способствующие возбуждению М-холинорецепторов (пилокарпин, ацеклидин и др.).

Н-ХОЛИНОМИМЕТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (син.: Н-холиномиметики, Н-холинопозитивные средства) — Х. с., возбуждающие или способствующие возбуждению Н-холинорецепторов (лобелин, цитизин и др.).

ХОЛИНОНЕГАТИ́ВНЫЕ СРЕ́ДСТВА — см. *Холинолитические средства.*

М-ХОЛИНОНЕГАТИ́ВНЫЕ СРЕ́ДСТВА — см. *М-холинолитические средства.*

Н-ХОЛИНОНЕГАТИ́ВНЫЕ СРЕ́ДСТВА — см. *Н-холинолитические средства.*

ХОЛИНОПОЗИТИ́ВНЫЕ СРЕ́ДСТВА — см. *Холиномиметические средства.*

М-ХОЛИНОПОЗИТИ́ВНЫЕ СРЕ́ДСТВА — см. *М-холиномиметические средства.*

Н-ХОЛИНОПОЗИТИ́ВНЫЕ СРЕ́ДСТВА — см. *Н-холиномиметические средства.*

ХОЛИНОРЕАКТИ́ВНЫЕ СИСТЕ́МЫ — см. *Холинорецепторы.*

ХОЛИНОРЕАКТИ́ВНЫЕ СТРУКТУ́РЫ — см. *Холинорецепторы.*

ХОЛИНОРЕЦЕ́ПТОРЫ (холин + *рецепторы*; син.: холинергические системы, холинореактивные системы, холинореактивные структуры) — биохимические структуры клеток, взаимодействующие с ацетилхолином и преобразующие энергию этого взаимодействия в энергию специфического эффекта (нервного импульса, мышечного сокращения).

М-ХОЛИНОРЕЦЕ́ПТОРЫ — Х., возбуждаемые мускарином; расположены в постсинаптической мембране клеток эффекторных органов у окончаний постганглионарных парасимпатических волокон, а также в ц. н. с.

Н-ХОЛИНОРЕЦЕ́ПТОРЫ — Х., возбуждаемые малыми дозами никотина; расположены в постсинаптической мембране ганглионарных клеток у окончаний всех преганглионарных волокон, в нервно-мышечных синапсах и др.

ХОЛИНФОСФАТИ́ДЫ — см. *Лецитины.*

ХОЛИНЭСТЕРА́ЗА — 1) (син. ацилхолин-ацилгидролаза) — фермент класса гидролаз (КФ 3.1.1.8), катализирующий гидролитическое расщепление ацилхолинов на холин и соответствующую кислоту; 2) в широком смысле — общее название ацетилхолинэстеразы и холинэстеразы[1].

ХО́ЛЛА МЕ́ТОД (M. C. Hall, 1881—1938, амер. паразитолог) — метод диагностики энтеробиоза путем перианального соскоба с помощью кусочка целлофана, к-рый затем подвергают микроскопии.

ХО́ЛЛА СИМПТО́М (J. N. Hall, 1858—1939, амер. врач) — пальпаторно определяемое в нагрудинной ямке сотрясение трахеи в период диастолы сердца; непостоянный признак аневризмы аорты.

ХО́ЛЛЕНДЕРА — СИ́МОНСА БОЛЕ́ЗНЬ ЛОКА́ЛЬНАЯ (E. Holländer, 1867—1932, нем. хирург; A. Simons, род. в 1872 г., нем. врач) — см. *Липодистрофия прогрессирующая сегментарная.*

ХО́ЛМСА ОПЕРА́ЦИЯ (T. Holmes, 1825—1907, англ. хирург) — хирургическая операция: удаление пяточной кости с пересечением сухожилий малоберцовых мышц.

ХО́ЛМСА СИМПТО́М (F. A. Holmes; син. Голмса симптом — прк) — выраженное увеличение поперечника основания сердца на ортодиаграмме, произведенной в положении Тренделенбурга, сочетающееся с увеличением суммы поперечных размеров правого и левого сердца при вертикальном положении больного; признак экссудативного перикардита.

ХОЛОДЕ́НКО СИМПТО́М (М. И. Холоденко, 1906—1979, сов. невропатолог) — менингеальный симптом: непроизвольное сгибание ног в коленных суставах при попытке исследующего поднять больного за предплечья из положения лежа со сложенными на груди руками.

«ХОЛО́ДНЫЙ» У́ЗЕЛ — участок ткани или органа, не накапливающий радиоактивное вещество или накапливающий его в меньшей степени, чем окружающие ткани.

ХОЛОДО́ВАЯ ПРО́БА — общее название методов исследования, основанных на быстром значительном охлаждении какой-либо части тела или участка его поверхности, напр., при неврологическом исследовании, при диагностике феохромоцитомы.

ХОЛОДО́ВАЯ ТО́ЧКА — мельчайший участок кожи, при раздражении к-рого возникает особенно четкое ощущение холода; предполагается, что на каждом квадратном сантиметре кожи имеется 12—15 Х. т.

ХОЛОФЕРМЕ́НТ (греч. holos весь, полностью + *фермент*) — фермент, состоящий из неактивной белковой части — апофермента и активирующей ее небелковой группы — кофактора.

ХО́ЛСТЕДА СИМПТО́М (W. S. Halsted, 1852—1922, амер. хирург) — цианоз кожи в области живота при панкреатите.

ХО́ЛСТЕДА ШОВ (W. S. Halsted) — 1) двухрядный непрерывный хирургический шов, накладываемый двумя нитями, одна из к-рых проходит в подкожной клетчатке, другая — внутрикожно; 2) разновидность узлового серо-серозного шва, накладываемого при операциях на кишечнике.

ХО́ЛСТЕДА — ГЕ́РМАННА ОПЕРА́ЦИЯ (W. S. Halsted, 1852—1922, амер. хирург; Hermann) — хирургическая операция: закрытие кишечного свища путем наложения анастомоза между приводящей и отводящей петлями с одновременным сшиванием концов кишечной петли, несущей свищ, что превращает ее в кольцо.

ХО́ЛТА — О́РАМА СИНДРО́М (M. Holt, совр. англ. педиатр; S. Oram, род. в 1913 г., англ. кардиолог) — наследственное сочетание аномалий больших пальцев рук и дефекта межпредсердной перегородки; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

ХО́ЛТЕРА КЛА́ПАНЫ (Holter, амер. инженер) — специальные клапаны дренажной системы, применяемой при вентрикулоатриостомии, предотвращающие ток крови из правого предсердия в желудочки головного мозга.

ХО́ЛЬМГРЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (G. Holmgren, 1875—1954, шведский оториноларинголог; син. Гольмгрена операция) — хирургическая операция при отосклерозе, заключающаяся в образовании отверстия на мысе лабиринтной стенки барабанной полости или в горизонтальном полукружном канале костного лабиринта с последующим закрытием его надкостничным лоскутом.

ХО́ЛЬМГРЕНА СПО́СОБ (A. F. Holmgren, 1831—1897, шведский физиолог) — метод исследования цветового зрения с помощью набора мотков шерсти, различающихся по цвету, насыщенности и яркости окраски.

ХО́ЛЬТА ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; S. Holth, 1863—1937, норвежский офтальмолог) — первоначальный вариант иридэнклейзиса, при к-ром в ране между лимбом и склерой ущемлялись края радужки, рассеченной меридионально.

ХО́ЛЬЦЕРА ОКРА́СКА (W. Holzer, род. в 1906 г., австрийский невролог) — метод выявления нейроглии в гистологическом препарате путем его окраски раствором кристаллического фиолетового в спирт-хлороформе после фиксации в формалине.

ХОНДР- (хондро-; греч. chondros зерно, хрящ; chondrion зернышко) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к хрящу», «хрящевой».

ХОНДРИ́Н — коллаген, входящий в состав волокон межклеточного вещества хрящевой ткани (хондриновых волокон).

ХОНДРИ́Т (chondritis; *хондр-* + *-ит*) — воспаление хряща.

Х. БРЮШНОТИФО́ЗНЫЙ (с. abdominotyphosa) — гнойный Х. преимущественно V — VIII ребер, реже носовой перегородки или гортани, развивающийся как осложнение брюшного тифа в периоде реконвалесценции.

Х. РЁБЕРНЫЙ (с. costalis) — см. *Титце синдром.*

Х. СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЙ (с. syphilitica) — см. *Вирхова сифилитический хондрит.*

ХОНДРО- — см. *Хондр-*.

ХОНДРОБЛА́СТ (chondroblastus, LNH; *хондро-* + греч. blastos росток, зародыш) — малодифференцированная, способная к делению клетка хрящевой ткани, превращающаяся в хондроцит.

ХОНДРОБЛАСТОКЛАСТО́МА (chondroblastoclastoma; *хондробласт* + греч. klastos разбитый на куски, раздробленный + *-ома*) — см. *Хондробластома.*

ХОНДРОБЛАСТО́МА (chondroblastoma; *хондробласт* + *-ома*; син.: Кодмана опухоль, опухоль гигантоклеточная обызвествляющаяся, опухоль гигантоклеточная доброкачественная эпифизарная, опухоль гигантоклеточная хрящеобразующая, остеобластома хондроматозная, остеокластома хондроматозная, хондробластокластома) — доброкачественная опухоль эпифизов длинных трубчатых костей, развивающаяся в детском и юношеском возрасте; характеризуется большим количеством округлых, полигональных и гигантских многоядерных клеток; подвергается обызвествлению и оссификации.

ХОНДРОГЕНЕ́З (*хондро-* + греч. genesis происхождение, развитие) — процесс образования хрящевой ткани.

ХОНДРОГЕНЕ́З НЕСОВЕРШЕ́ННЫЙ (chondrogenesis imperfecta; син.: Русакова несовершенный хондрогенез, хондродистрофия гиперпластическая) — врожденная болезнь, характеризующаяся неправильным развитием хрящевой ткани и проявляющаяся нарушениями формирования скелета.

ХОНДРОДЕРМАТИ́Т УШНО́ГО ЗАВИТКА́ ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (chondrodermatitis chronica helicis; *хондро-* + *дерматит*; син. узелок ушной раковины болезненный) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся образованием болезненного полушаровидного спаянного с подлежащим хрящом узелка на краю завитка ушной раковины.

ХОНДРОДИСПЛАЗИ́Я (chondrodysplasia; *хондро-* + *дисплазия*) — общее название болезней, характеризующихся неправильным развитием хрящевой ткани.

ХОНДРОДИСПЛАЗИ́Я С АНГИОМАТО́ЗОМ — см. *Маффуччи синдром.*

ХОНДРОДИСПЛАЗИ́Я ДЕФОРМИ́РУЮЩАЯ (chondrodysplasia deformans) — см. *Экзостозы костно-хрящевые множественные.*

ХОНДРОДИСПЛАЗИ́Я ЭКТОДЕРМА́ЛЬНАЯ (chondrodysplasia ectoder-

malis) — см. *Эллиса — Ван-Кревельда синдром.*

ХОНДРОДИСТРОФИ́Я (chondrodystrophia; *хондро-* + *дистрофия*; син.: аплазия диафизарная, ахондроплазия, ахондроплазия плода, Парро — Мари болезнь, хондродистрофия врожденная, хондродистрофия гипопластическая) — врожденная болезнь, характеризующаяся нарушением энхондрального остеогенеза; проявляется карликовостью, короткими конечностями при обычной длине туловища, деформацией нижних конечностей и позвоночника.

ХОНДРОДИСТРОФИ́Я ВРОЖДЁННАЯ (chondrodystrophia congenita) — см. *Хондродистрофия.*

ХОНДРОДИСТРОФИ́Я ГИПЕРПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (chondrodystrophia hyperplastica) — см. *Хондрогенез несовершенный.*

ХОНДРОДИСТРОФИ́Я ГИПОПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (chondrodystrophia hypoplastica) — см. *Хондродистрофия.*

ХОНДРОДИСТРОФИ́Я КАЛЬЦИФИЦИ́РУЮЩАЯ (chondrodystrophia calcarea; син.: Конради болезнь, Конради — Хюнерманна синдром) — врожденная болезнь, характеризующаяся карликовостью, обусловленной наличием у новорожденных обызвествленных очагов некробиоза хрящевых участков костей.

ХОНДРОДИСТРОФИ́Я СУСТАВНА́Я ДЕФОРМИ́РУЮЩАЯ МНО́ЖЕСТВЕННАЯ (chondrodystrophia articularis deformans multiplex) — см. *Волкова болезнь.*

ХОНДРОЗАМИ́Н — см. *Галактозамин.*

ХОНДРОИТИНСЕ́РНЫЕ КИСЛО́ТЫ (син. хондроитинсульфаты) — мукополисахариды соединительной ткани, представляющие собой высокополимерные продукты конденсации уроновых кислот и D-галактозамина; участвуют в водно-солевом обмене, в регулировании клеточного деления, обладают антикоагулирующим действием.

ХОНДРОИТИНСУЛЬФА́ТЫ — см. *Хондроитинсерные кислоты.*

ХОНДРОКАЛЬЦИНО́З (chondrocalcinosis; *хондро-* + *кальциноз*) — отложение солей кальция в хряще суставов; встречается при гиперпаратиреозе, гемохроматозе, алкаптонурии, акромегалии и других состояниях, сопровождающихся нарушением кальциевого обмена.

ХОНДРОЛО́ГИЯ (chondrologia; *хондро-* + греч. logos учение, наука) — раздел гистологии, изучающий развитие, строение и функции хрящевой ткани.

ХОНДРО́МА (chondroma; *хондр-* + *-ома*) — доброкачественная опухоль, источником развития к-рой является гиалиновый хрящ.

Х. ПРОЛИФЕРИ́РУЮЩАЯ (c. proliferans) — Х. с повышенным содержанием клеточных элементов и малым количеством межуточного вещества, распространяющаяся без четких границ по костномозговым пространствам.

Х. ЭКТОПИ́ЧЕСКАЯ (c. ectopicum) — см. *Гамартома хондроматозная.*

ХОНДРОМАЛЯ́ЦИЯ (chondromalacia; *хондро-* + греч. malakia мягкость) — изменение хрящевой ткани, характеризующееся ее размягчением и утратой упругости, что приводит к развитию деформаций и тугоподвижности суставов.

Х. НАДКОЛЕ́ННИКА (c. patellae) — см. *Бюдингера — Лудлоффа—Левена болезнь.*

ХОНДРОМАТО́З КОСТЕ́Й [chondromatosis ossium; *хондрома* (основа chondromat-) + *-оз*; син.: дисхондроплазия, Оллье болезнь] — врожденная болезнь, характеризующаяся нарушением процессов роста и развития костной ткани; проявляется задержкой роста конечностей, а также развитием множественных энхондром в длинных трубчатых костях.

ХОНДРОМАТО́З КО́СТИ НАРУ́ЖНЫЙ (chondromatosis ossis externa) — см. *Экзостозы костно-хрящевые множественные.*

ХОНДРОМАТО́З СИНОВИА́ЛЬНЫЙ (chondromatosis synovialis) — см. *Хондроматоз сустава.*

ХОНДРОМАТО́З СУСТА́ВА (chondromatosis articulationis; син.: Лотша коралловый сустав, остеохондроматоз синовиальный, хондроматоз синовиальный) — доброкачественная опухоль синовиального слоя капсулы сустава в виде множественной очаговой хрящевой метаплазии с последующим отделением образовавшихся узлов в полость сустава и их кальцинозом.

ХОНДРОМИКСО́МА (chondromyxoma; *хондро-* + *миксома*) — см. *Фиброма хондромиксоидная.*

ХОНДРОМУКО́ИДЫ — см. *Хондромукопротеиды.*

ХОНДРОМУКОПРОТЕЙДЫ (син. хондромукоиды) — мукопротеиды соединительной ткани, содержащие в качестве небелкового компонента хондроитинсерную кислоту.

ХОНДРО́Н — группа хрящевых клеток единого происхождения в комплексе с прилежащим к ним межклеточным веществом.

ХОНДРОНЕКРО́З (chondronecrosis; *хондро-* + *некроз*) — некроз хряща или его участка.

Х. ЛУЧЕВО́Й (c. radialis) — Х., вызванный воздействием ионизирующего излучения.

ХОНДРООСТЕОДИСТРОФИ́Я (chondroosteodystrophia; *хондро-* + греч. osteon кость + *дистрофия*) — см. *Гаргоилизм.*

ХОНДРОПЕРИХОНДРИ́Т (chondroperichondritis; *хондро-* + анат. perichondrium надхрящница + *-ит*) — хондрит, при к-ром воспалительный процесс захватывает надхрящницу и окружающие ткани.

ХОНДРОСАРКО́МА (chondrosarcoma; *хондро-* + *саркома*) — злокачественная опухоль кости, исходящая из клеток хрящевой ткани.

ХОНДРО́ФИТ (chondrophytus; *хондро-* + греч. phyton нечто вырастающее) — вырост эпифизарного хряща длинной трубчатой кости; обычно подвергается обызвествлению или оссификации.

ХОНДРОЦИ́Т (chondrocytus, LNH; *хондро-* + гист. cytus клетка; син. клетка хрящевая) — зрелая клетка хрящевой ткани, образующаяся из хондробласта.

ХО́ПФА ВЕРРУКО́ЗНЫЙ АКРОКЕРАТО́З (G. Hopf, род. в 1900 г., нем. дерматолог) — см. *Акрокератоз бородавчатый.*

ХО́РДА (chorda; греч. chordē кишка, струна) — 1) см. *Спинная струна*; 2) в урологии — фиброзный тяж между наружным отверстием уретры и головкой полового члена при гипоспадии.

ХОРДА́ЛЬНЫЙ КАНА́Л (canalis chordalis) — рудиментарный канал, иногда встречающийся в центральной части тела позвонка там, где у зародыша проходила спинная струна.

ХОРДА́ЛЬНЫЙ ОТРО́СТОК (син. головной отросток) — клеточный тяж, образующийся из материала хордальной пластинки в результате ее подворачивания через дорсальную губу бластопора; зачаток хорды.

ХО́РДОВЫЕ (Chordata) — тип высших животных, характеризующийся наличием спинной струны (хорды), спинной нервной трубки и жаберных щелей; основную массу Х. составляет подтип позвоночных.

ХОРДО́МА (эмбриол. chorda dorsalis спинная струна + -ома) — опухоль, исходящая из остатков спинной струны зародыша.

ХОРДОТОМИ́Я (chordotomia; греч. chordē кишка, струна + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: пересечение проводящих путей спинного мозга.

Х. ПО ПА́ТНЕМУ — см. *Комиссуротомия передняя.*

Х. ПЕРЕДНЕБОКОВА́Я — Х., при к-рой пересекают передний и латеральный спиноталамические пучки; проводится при неустранимых болях в области туловища и (или) конечностей.

ХОРЕОАТЕТО́З (choreoathetosis; *хорея* + *атетоз*) — сочетание хореического гиперкинеза с атетозом; наблюдается при поражении полосатого тела.

ХОРЕОМАНИ́Я (истор.; choreomania; *хорея* + *мания*) — см. *Хорея большая.*

ХОРЕОПА́ТЫ (*хорея* + греч. pathos страдание, болезнь; син. Керера хореопаты) — психопаты, являющиеся близкими родственниками больных хореей Гентингтона.

ХОРЕОФРАЗИ́Я (choreophrasia; греч. choreia хоровод, пляска + phrasis оборот речи) — бессмысленное повторение психически больным частей слов или отрывков фраз.

ХОРЕ́Я (chorea; греч. choreia хоровод, пляска) — устаревшее общее название хореического гиперкинеза и болезней, при к-рых этот синдром наблюдается (напр., малая хорея, хорея Гентингтона).

ХОРЕ́Я БОЛЬША́Я (истор.; chorea major; син. хореомания) — коллективный психоз, наблюдавшийся в средние века и проявлявшийся интенсивным двигательным возбуждением с некоординированными движениями, подергиваниями и судорогами на фоне аффективно-суженного сознания.

ХОРЕ́Я ГЕНТИНГТО́НА — см. *Гентингтона хорея.*

ХОРЕ́Я ДЕГЕНЕРАТИ́ВНАЯ (chorea degenerativa) — см. *Гентингтона хорея.*

ХОРЕ́Я ИСТЕРИ́ЧЕСКАЯ (устар.; chorea hysterica) — двигательное возбуждение с напоминающими хорею подергиваниями всего тела или конечностей; предшествует истерическому судорожному припадку или сопровождает его.

ХОРЕ́Я МА́ЛАЯ (chorea minor; син.: болезнь английская — устар., пляска святого Вита, пляска святого Гвидона,

Сиденгама болезнь, хорея обыкновенная, хорея ревматическая) — болезнь ц. н. с. ревматической этиологии, характеризующаяся поражением базальных ядер головного мозга и проявляющаяся хореическими гиперкинезами, мышечной гипотонией, изменением рефлексов, нарушением эмоций, иногда другими психическими расстройствами.

ХОРЕ́Я МОЛНИЕНО́СНАЯ ДУБИ́НИ — см. *Дубини молниеносная хорея.*

ХОРЕ́Я МОРВА́НА — см. *Морвана синдром.*

ХОРЕ́Я МЯ́ГКАЯ (chorea mollis; син. хорея паралитическая) — малая хорея с резкой мышечной гипотонией, имитирующей параличи.

ХОРЕ́Я НАСЛЕ́ДСТВЕННАЯ (chorea hereditaria) — см. *Гентингтона хорея.*

ХОРЕ́Я ОБЫКНОВЕ́ННАЯ (chorea vulgaris) — см. *Хорея малая.*

ХОРЕ́Я ПАРАЛИТИ́ЧЕСКАЯ (chorea paralytica) — см. *Хорея мягкая.*

ХОРЕ́Я ПРОГРЕССИ́РУЮЩАЯ ХРОНИ́ЧЕСКАЯ (chorea progressiva chronica) — см. *Гентингтона хорея.*

ХОРЕ́Я РЕВМАТИ́ЧЕСКАЯ (chorea rheumatica) — см. *Хорея малая.*

ХОРЕ́Я ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКАЯ ДУБИ́НИ — см. *Дубини молниеносная хорея.*

ХОРИА́ЛЬНАЯ ПЛАСТИ́НКА — основа стенки хориона, выросты к-рой образуют ворсинки.

ХОРИО- — см. *Хориоид-.*

ХОРИОАМНИОНИ́Т (chorioamnionitis; *хорион* + *амнион* + *-ит*) — сочетанное воспаление хориона и амниона.

ХОРИОИД- (хорио-) — 1) (анат. choriodea собственно сосудистая оболочка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сосудистой оболочке глаза»; 2) (анат. plexus chorioideus сосудистое сплетение) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сосудистым сплетениям головного мозга».

CHORIOÏDEA (анат.; от греч. chorioeidēs похожий на кожу, на оболочку) — см. *Собственно сосудистая оболочка.*

ХОРИОИДЕРЕМИ́Я (chorioideremia; *хориоид-* + греч. erēmia отсутствие; син. атрофия сосудистой оболочки прогрессирующая) — наследственная болезнь глаз, проявляющаяся понижением остроты зрения, концентрическим сужением полей зрения, гемералопией и близорукостью, что сопровождается характерными изменениями глазного дна (почти полное отсутствие сосудистого рисунка, резкие контуры и красновато-коричневый цвет желтого пятна, нечеткость границ диска зрительного нерва); наследуется по аутосомно-рецессивному и сцепленному с полом рецессивному типу.

ХОРИОИДИ́Т (chorioiditis; *хориоид-* + *-ит*; син. увеит задний — нрк) — воспаление собственно сосудистой оболочки глаза.

Х. АМЁБНЫЙ (c. amoebica) — Х., вызванный патогенными амебами (чаще дизентерийными).

Х. ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ (c. disseminata; син. Х. рассеянный) — Х., при к-ром мелкие воспалительные очаги расположены в различных участках сосудистой оболочки.

Х. ДИФФУЗНЫЙ (c. diffusa) — Х., характеризующийся наличием крупного воспалительного очага с расплывчатыми границами.

Х. ОЧАГО́ВЫЙ (c. focalis) — Х., характеризующийся наличием отдельных ограниченных воспалительных очагов.

Х. ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКИЙ (c. peripherica; син. Шепенса периферический хориоидит) — Х., локализующийся на периферии глазного дна.

Х. РАССЕ́ЯННЫЙ (c. disseminata) — см. *Хориоидит диссеминированный.*

Х. САРКО́ИДНЫЙ (c. sarcoidea) — Х. при саркоидозе в виде мелких очагов, расположенных на периферии глазного дна.

Х. СИМПАТИ́ЧЕСКИЙ (c. sympathica) — Х., возникающий в связи с проникающим ранением другого глаза; разновидность симпатической офтальмии.

Х. СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЙ (c. syphilitica) — Х. при приобретенном сифилисе, характеризующийся расположением на периферии сосудистой оболочки очагов, часто сливающихся между собой.

Х. СОТОВИ́ДНЫЙ ДО́ЙНА — см. *Дегенерация сетчатки коллоидная.*

Х. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (c. tuberculosa) — Х., вызванный гематогенным метастазированием микобактерий туберкулеза.

Х. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ МИЛИА́РНЫЙ (c. tuberculosa miliaris) — Х. с наличием множественных мелких бугорков; наблюдается при милиарном туберкулезе.

ХОРИОИДКАРЦИНО́МА (chorioidcarcinoma; *хориоид-* + *карцинома*; син.: плексускарцинома, рак сосудистого сплетения) — злокачественная опухоль, исходящая из эпителия сосудистых сплетений желудочков головного мозга.

ХОРИО́ИДНОЕ СПЛЕТЕ́НИЕ (plexus chorioideus) — см. *Сосудистое сплетение желудочков мозга.*

ХОРИОИДПАПИЛЛО́МА (chorioidpapilloma; *хориоид-* + *папиллома*; син.: папиллома сосудистого сплетения, плексуспапиллома, хориоидэпителиома) — доброкачественная опухоль, исходящая из эпителия сосудистых сплетений, чаще IV желудочка головного мозга; повторяет ворсинчатое строение сплетения.

ХОРИОИДЭКТОМИ́Я (chorioidectomia; *хориоид-* + *эктомия*) — хирургическая операция: иссечение участка сосудистой оболочки глаза; производится, напр., при небольших отграниченных меланобластомах.

ХОРИОИДЭПИТЕЛИО́МА (chorioidepithelioma; *хориоид-* + *эпителиома*) — см. *Хориоидпапиллома.*

ХОРИОКАПИЛЛЯ́РНАЯ ПЛАСТИ́НКА (lamina choriocapillaris, LNH) — слой собственно сосудистой оболочки глаза, содержащий узкопетлистую капиллярную сеть и расположенный между сосудистой и базальной пластинками.

ХОРИОКАРЦИНО́МА (choriocarcinoma; *хорион* + *карцинома*; син.: децидуома злокачественная — устар., карцинома синцитиальная, плацентома — устар., хорионэпителиома) — злокачественная опухоль, исходящая из клеток трофобласта.

ХОРИОМЕНИНГИ́Т (choriomeningitis; *хорио-* + *менингит*) — воспаление мозговых оболочек, в к-рое вовлечены сосудистые сплетения головного мозга.

ХОРИОМЕНИНГИ́Т ЛИМФОЦИТА́РНЫЙ (choriomeningitis lymphocytica; син.: Армстронга острый серозный менингит, менингит доброкачественный, менингит острый лимфоцитарный) — инфекционная болезнь, вызываемая одноименным вирусом рода аденовирусов, характеризующаяся развитием хориоменингита с доброкачественным течением и повышенным содержанием лимфоцитов в цереброспинальной жидкости.

ХО́РИОН (chorion, LNE; греч. «кожа», «оболочка», «плодная оболочка»; син. ворсинчатая оболочка) — наружная оболочка зародыша млекопитающих и человека, развивающаяся из трофобласта и подстилающей его мезенхимы; снабжена выростами (ворсинками), врастающими в слизистую оболочку матки, образуя плаценту.

Х. БЕЗВОРСИ́НЧАТЫЙ — см. *Хорион гладкий.*

Х. ВОРСИ́НЧАТЫЙ (c. villosum) — часть Х., покрытая ворсинками; входит в состав плаценты, образуя ее зародышевую (плодную) часть.

Х. ГЛА́ДКИЙ (c. laeve; син.: хорион безворсинчатый, хорион лысый) — часть Х., лишенная ворсинок и не входящая в состав плаценты.

Х. ЛЫСЫЙ — см. *Хорион гладкий.*

ХОРИОНАДЕНО́МА (chorionadenoma; *хорион* + *аденома*) — см. *Пузырный занос.*

ХОРИОНЭПИТЕЛИО́МА (chorionepithelioma; *хорион* + *эпителиома*) — см. *Хориокарцинома.*

ХОРИОРЕТИНИ́Т (chorioretinitis; *хорио-* + анат. retina сетчатка + *-ит*; син. ретинохориоидит) — сочетанное воспаление сетчатки и собственно сосудистой оболочки глаза.

Х. СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЙ (c. syphilitica) — хориоретинит при врожденном сифилисе, характеризующийся обычно наличием большого количества светло-желтых и черных очагов на периферии глазного дна.

Х. ТОКСОПЛАЗМО́ЗНЫЙ (c. toxoplasmotica; син. ретинит токсоплазмозный) — Х. при токсоплазмозе, характеризующийся в типичных случаях наличием обширных воспалительных очагов с четкой пигментной каймой.

Х. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (c. tuberculosa) — Х., вызванный гематогенным метастазированием микобактерий туберкулеза.

Х. ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ АНГИОНЕВРОТИ́ЧЕСКИЙ (c. centralis angioneurotica) — см. *Ретинопатия центральная серозная.*

Х. ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ МИОПИ́ЧЕСКИЙ (c. centralis myopica; син. макулит миопический) — Х., развивающийся в области желтого пятна (пятна сетчатки) вследствие повторных кровоизлияний в сетчатку и сосудистую оболочку глаза при близорукости высокой степени.

Х. ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ СЕРО́ЗНЫЙ (c. centralis serosa) — см. *Ретинопатия центральная серозная.*

ХОРИОРЕТИНОПАТИ́Я (chorioretinopathia; *хорио-* + анат. retina сетчатка + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название нек-рых невоспалительных поражений сетчатки и сосудистой оболочки глаза.

ХОРИОЭНЦЕФАЛИ́Т (chorioencephalitis; *хорио-* + *энцефалит*) — сочетанное воспаление вещества головного мозга и его сосудистых сплетений, обычно вирусной этиологии.

ХОРИОЭПЕНДИМАТИ́Т (chorioependymitis; *хорио-* + *эпендиматит*) — воспаление сосудистых сплетений головного мозга с преимущественной локализацией в эпендиме желудочков мозга.

ХОРИ́СТИЯ (choristia; от греч. chōristos отделенный) — участок нормально сформированной ткани, локализованный в месте, где эта ткань в норме не встречается.

ХОРИСТОБЛАСТО́МА (choristoblastoma; *хористия* + *бластома*) — злокачественная опухоль, развивающаяся из хористии.

ХОРИСТО́МА (choristoma; *хористия* + *-ома*) — опухолевидное образование, развивающееся из хористии.

ХО́РНА СИМПТО́М (C. ten Horn) — см. *Тен-Хорна симптом.*

ХО́РСЛИ ОПЕРА́ЦИЯ (V. A. H. Horsley, 1857—1916, англ. хирург) — хирургическая операция, производимая с целью лечения эпилепсии, заключающаяся в удалении участка коры головного мозга и подкоркового белого вещества в зоне эпилептогенного очага на глубину до 1,5—2 *см* от поверхности мозга.

ХО́РСЛИ ЩИПЦЫ́ (V. A. H. Horsley) — инструмент, применяемый при ламинэктомии, представляющий собой одношарнирные щипцы, губки которых изогнуты по плоскости и заострены.

ХО́РТОНА МИГРЕ́НЬ (B. T. Horton, род. в 1895 г., амер. врач) — см. *Хортона синдром.*

ХО́РТОНА СИНДРО́М (B. T. Horton; син.: Хортона мигрень, цефалгия гистаминовая) — возникновение через 1—2 часа после засыпания приступа односторонних головных болей, преимущественно в одной и той же области, сопровождающихся слезотечением, припухлостью век и слизистой оболочки носа, ринореей с той же стороны; чаще наблюдается у женщин.

ХО́РТОНА — МА́ГАТА — БРА́УНА СИНДРО́М (B. T. Horton, род. в 1895 г., амер. врач; T. B. Magath, совр. амер. врач; G. E. Brown, 1885—1935, амер. врач) — см. *Артериит гигантоклеточный.*

ХО́ТТИНГЕРА АГА́Р (R. Hottinger, бразильский врач) — плотная питательная среда для культивирования микроорганизмов, содержащая агар и бульон Хоттингера.

ХО́ТТИНГЕРА БУЛЬО́Н (R. Hottinger) — жидкая питательная среда для культивирования микроорганизмов, приготовляемая на основе разведенного перевара Хоттингера.

ХО́ТТИНГЕРА ПЕРЕВА́Р (R. Hottinger) — продукт переваривания мяса с помощью панкреатина или ткани поджелудочной железы, характеризующийся высоким содержанием пептидов и аминокислот и высокой буферной емкостью; используется при приготовлении питательных сред для микроорганизмов.

ХО́УПА СИМПТО́М (J. Hope, 1801—1841, англ. врач) — расщепление или раздвоение первого и второго тонов сердца; непостоянный признак аневризмы аорты; обусловленное асинхронностью сокращения желудочков и закрытия полулунных заслонок клапанов аорты и легочного ствола.

ХО́ФБАУЭРА КЛЕ́ТКИ (I. I. Hofbauer, 1879—1961, австрийский гинеколог) — см. *Кащенко — Хофбауэра клетки.*

ХО́ФЕРА — ЛЕ́ЙДЛЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (G. Hofer, род. в 1887 г., австрийский оториноларинголог; R. Leidler, род. в 1880 г., австрийский оториноларинголог) — хирургическая операция, производимая с целью исправления формы оттопыренной ушной раковины: удаление полоски хряща оттопыренной ушной раковины через разрез на ее задней поверхности по противозавитку до противокозелка.

ХО́ФФА — ШИ́ЛЬДЕРА ФЕНО́МЕН «ПОПЫ́ТКИ ПОДРАЖА́НИЯ» (H. Hoff; P. F. Schilder, 1886—1940, нем. невропатолог и психиатр) — см. *Вейсмана симптом.*

ХО́ХОДКИ — МАРИО́НА ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; Chochodka; G. J.-B. C. Marion, 1869—1960, франц. хирург) — хирургическая операция формирование искусственного мочеиспускательного канала при гипоспадии путем создания хода в толще головки полового члена, через который проводят трубку, сформированную из кожного лоскута.

ХРЕМАТОФОБИ́Я (chrematophobia; греч. chrēmata деньги + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь прикоснуться к денежным купюрам и монетам.

ХРИЗИА́З ПО́ЧЕК (chrysiasis renum; греч. chrysos золото + *-иаз*) — поражение почек токсико-аллергической, реже токсической природы, возникающее при поступлении в организм солей золота, характеризующееся их накоплением в ткани почек; проявляется нефротическим синдромом, а в тяжелых случаях — нефронекрозом.

ХРИЗОИДИ́Н — краситель, используемый для окраски микроорганизмов, а также как индикатор активной реакции среды (pH), изменяющий окраску от оранжевой до желтой в интервале pH от 4,0 до 7,0.

ХРИЗОТЕРАПИ́Я (chrysotherapia; греч. chrysos золото + *терапия*) — применение препаратов золота (санокризин, кризанол и др.) с лечебной целью, гл. обр. при ревматоидном артрите.

ХРИ́ПЫ (rhonchi) — дыхательные шумы, обусловленные сужением дыхательных путей или наличием в них патологического содержимого.

Х. ВЛА́ЖНЫЕ (r. humidi) — Х., выслушиваемые при наличии жидкого (полужидкого) содержимого в просвете дыхательных путей и напоминающие звук лопающихся пузырьков; в зависимости от высоты звука различают мелко-, средне- и крупнопузырчатые Х. в.

Х. ПАРАКАВЕРНО́ЗНЫЕ ВА́ЛЛЬГРЕНА — см. *Валльгрена паракавернозные хрипы.*

Х. СУХИ́Е (r. sicci) — Х., выслушиваемые при сужении просвета дыхательных путей, обусловленном спазмом, набуханием слизистой оболочки или наличием на ней слоя вязкой слизи; в зависимости от тембра Х., связанного с диаметром бронха, различают жужжащие и свистящие Х. с.

Х. ТРЕСКУ́ЧИЕ — звонкие влажные Х., выслушиваемые только на вдохе и возникающие при разлипании ацинусов.

ХРИ́СТЕНА ЭНЕРГО́МЕТР (истор.; Th. Christen, 1875—1920, швейц. рентгенолог) — см. *Энергометр сердечный.*

ХРО́БАКА ПРО́БА (R. Chrobak, 1843—1910, нем. гинеколог) — метод распознавания рака влагалищной части шейки матки, заключающийся в легком надавливании тонким зондом на подозрительный участок слизистой оболочки; появление кровянистого отделяемого рассматривается как признак рака.

ХРОМ (Chromium; Cr) — химический элемент периодической системы элементов Д. И. Менделеева; ат. номер 24, ат. масса 51,996; твердый металл серо-стального цвета; Х. и его соединения токсичны для человека.

ХРОМ РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов хрома с массовыми числами от 48 до 55 и периодом полураспада от 0,4 сек. до 28 суток; отдельные изотопы Х. р. используются в радиоизотопной диагностике, напр. болезней крови.

ХРОМ- (хромат-, хромато-, хромо-; греч. chrōma, chrōmatos кожа, цвет кожи; цвет, окраска) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к цвету, к окраске».

ХРОМАТ- — см. *Хром-.*

ХРОМАТИ́ДА (*хромат-* + греч. eidos вид) — одна из двух продольных структурных и функциональных единиц хромосомы, образующихся при редупликации в процессе клеточного деления.

ХРОМАТИ́Н — вещество клеточного ядра, состоящее из дезоксирибонуклеиновой и небольшого количества рибонуклеиновых кислот, а также белков, напр. гистонов, хорошо окрашивающихся основными красителями; в интерфазе рассеян в кариоплазме, в период клеточного деления сконденсирован в хромосомах.

Х-ХРОМАТИ́Н — см. *Хроматин половой женский.*

Y-ХРОМАТИ́Н — см. *Хроматин половой мужской.*

Х. ПОЛОВО́Й ЖЕ́НСКИЙ (син.: Барра тельце, Х-хроматин) — плотно окрашиваемый крупный участок Х. треугольной, круглой или палочковидной формы, расположенный на периферии ядра соматической клетки женского организма; представляет собой конденсированную Х-хромосому.

Х. ПОЛОВО́Й МУЖСКО́Й (син. Y-хроматин) — крупная глыбка Х. в ядре соматической клетки мужского организма, ярко светящаяся при окраске флюорохромами — производными акридинового оранжевого, напр. акрихином; представляет собой конденсированный участок длинного плеча Y-хромосомы.

ХРОМАТО- — см. *Хром-.*

ХРОМАТОБЛА́СТ (chromatoblastus; *хромато-* + греч. blastos росток, зародыш) — см. *Хроматофор.*

ХРОМАТО́ГРАФ (*хромато-* + греч. graphō писать, изображать) — прибор для разделения смесей веществ с целью их исследования или очистки; применяется при лабораторных, напр. биохимических, гигиенических, судебно-медицинских исследованиях, при анализе лекарственных средств.

ХРОМАТОГРАФИ́ЧЕСКАЯ КОЛО́НКА — устройство в виде сосуда, заполненного сорбентом, предназначен-

ное для разделения смесей веществ на компоненты за счет различной скорости их перемещения через сорбент; применяется для хроматографии.

ХРОМАТОГРАФИ́Я (*хромато-* + греч. graphō писать, изображать) — метод разделения и анализа смесей веществ, основанный на различном распределении их компонентов между подвижной (газ или жидкость) и неподвижной (твердый сорбент) фазами; применяется, напр., в биохимических исследованиях, при производстве лекарственных средств.

ХРОМАТО́ИДНЫЕ ТЕЛА́ (*хромато-* + греч. -eidēs подобный) — спирализованные упаковки рибосом в цистах амеб, интенсивно окрашивающиеся основными красителями.

ХРОМАТО́ЛИЗ (chromatolysis; *хромато-* + греч. lysis растворение; син. тигролиз) — уменьшение или исчезновение базофильного вещества цитоплазмы нейронов при патологических процессах в них.

Х. ПЕРИНУКЛЕА́РНЫЙ — см. *Хроматолиз центральный.*

Х. ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКИЙ — Х., охватывающий преимущественно периферические отделы нейрона с сохранением базофильного вещества вокруг ядра; наблюдается при интоксикациях.

Х. ТОТА́ЛЬНЫЙ — Х., заключающийся в полном исчезновении базофильного вещества цитоплазмы; наблюдается при тяжелых ишемических поражениях нейронов.

Х. ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ (син. Х. перинуклеарный) — Х., наблюдающийся преимущественно вокруг ядра с сохранением базофильного вещества на периферии нейрона; отмечается при повреждении аксона.

ХРОМАТОПСИ́Я (chromatopsia; *хромат-* + греч. opsis зрение) — см. *Зрение цветовое.*

ХРОМАТОФОБИ́Я (chromatophobia; *хромато-* + *фобия*) — см. *Хромофобия.*

ХРОМАТОФО́Р (*хромато-* + греч. phoros несущий; син.: пигментофор, хромобласт) в гистологии — клетка, содержащая пигмент (меланин), но не синтезирующая его.

ХРОМАТОФОРО́МА (chromatophoroma; *хроматофор* + *-ома*) — см. *Меланома.*

ХРОМАФФИ́ННОЕ ТЕ́ЛО АО́РТЫ (*хром-* + лат. affinis родственный, сродный) — см. *Параганглий аортальный поясничный.*

ХРОМАФФИ́ННОЕ ТЕ́ЛЬЦЕ (corpusculum chromaffinum) — скопление хромаффиноцитов за пределами мозгового вещества надпочечников и параганглиев.

ХРОМАФФИНОБЛА́СТ (chromaffinoblastus, LNH; *хром-* + лат. affinis родственный, сродный + греч. blastos росток, зародыш; син. феохромобласт) — малодифференцированная клетка адреналовой системы, превращающаяся в хромаффиноцит.

ХРОМАФФИНО́МА [chromaffinoma; *хромаффино(цит)* + *-ома*] — см. *Феохромоцитома.*

ХРОМАФФИНОЦИ́Т (chromaffinocytus, LNH; *хром-* + лат. affinis родственный, сродный + гист. cytus клетка; син.: клетка феохромная, клетка хромаффинная, феохромоцит) — клетка мозгового вещества надпочечников и параганглиев, вырабатывающая катехоламины; секреторные гранулы Х. окрашиваются красителями, содержащими соли хрома.

ХРОМАФФИНОЦИТО́МА (*хромаффиноцит* + *-ома*) — см. *Феохромоцитома.*

ХРОМИДРО́З (chromhidrosis; *хром-* + греч. hidrōs пот + *-оз*) — окрашенный пот у людей, контактирующих с кобальтом, медью и нек-рыми другими веществами.

ХРОМО- — см. *Хром-.*

ХРОМОБАКТЕРИО́З (chromobacteriosis; син. болезнь манилльская) — инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая пигментообразующей палочкой Chromobacterium violaceum, проникающей через поврежденную кожу и слизистые оболочки; характеризуется септицемией, образованием многочисленных очагов некроза в лимфатических узлах и внутренних органах.

ХРОМОБЛАСТОМИКО́З (chromoblastomycosis; *хромо-* + *бластомикоз*) — см. *Хромомикоз.*

ХРОМОГЕ́Н (*хромо-* + греч. -genēs порождающий) — органическое вещество, содержащее в молекуле хромофорные группы; к Х. относятся, напр., пигменты.

ХРОМОДИАГНО́СТИКА (*хромо-* + *диагностика*) — 1) диагностика, основанная на прижизненном введении красителей в органы и ткани организма для выявления функциональных и морфологических изменений; 2) диагностика поражений органов и тканей по изменению их естественного цвета.

ХРОМО́ЛИЗ (chromolysis; *хромо-* + греч. lysis разложение, растворение) — обесцвечивание эритроцитов в результате выхода из них гемоглобина; первая стадия гемолиза.

ХРОМОЛИМФОГРАФИ́Я (*хромо-* + *лимфография*) — метод выявления лимфатических сосудов посредством введения красителя в ткани, откуда он поступает в эти сосуды.

ХРОМОЛИПО́ИД (*хромо-* + греч. lipos жир + -eidēs подобный) — см. *Липофусцин.*

ХРОМОМИКО́З (chromomycosis; *хромо-* + *микоз*; син.: дерматит веррукозный, Педрозо болезнь, хромобластомикоз, хромофитоз) — хронический глубокий микоз, вызываемый паразитическими грибками рода Phialophora (сем. Dematiaceae, кл. несовершенных грибов), характеризующийся преимущественным поражением кожи и подкожной клетчатки конечностей с образованием одиночных коричневых или красно-фиолетовых узелков, к-рые впоследствии изъязвляются или превращаются в папилломатозные разрастания; иногда поражаются внутренние органы и головной мозг с образованием микроабсцессов; встречается гл. обр. в тропической зоне.

ХРОМОНЕ́МА (*хромо-* + греч. nēma нить) — непрерывный пучок хромофибрилл.

ХРОМОПРОТЕИ́Д (*хромо-* + *протеиды*) — белок, в состав молекулы к-рого в качестве небелкового компонента входит окрашенное соединение; к Х. относят, напр., гемоглобин и миоглобин.

ХРОМОРАДИО́МЕТР (истор.; *хромо-* + *радиометр*; син. Гольцкнехта хроморадиометр) — прибор для измерения дозы рентгеновского излучения, основанный на изменении под его воздействием цвета двойной соли — платиноцианистого бария.

ХРОМОСКОПИ́Я[1] (*хромо-* + греч. skopeō смотреть, наблюдать) в гастроэнтерологии — метод исследования экскреторной функции желудка путем определения момента появления в желудочном соке нейтрального красного после его внутривенного введения.

ХРОМОСО́МА(-Ы) (*хромо-* + греч. sōma тело) — структурный элемент клеточного ядра, содержащий дезоксирибонуклеиновую кислоту, различимый в виде образования определенного размера и формы только во время деления клетки; самоудвоение и закономерное распределение Х. по дочерним клеткам обеспечивает передачу наследственной информации.

Х-ХРОМОСО́МА — половая Х., сочетание пары к-рых в зиготе определяет развитие организма гомогаметного (у человека — женского) пола.

Y-ХРОМОСО́МА — половая Х., сочетание к-рой с Х-хромосомой в зиготе определяет развитие организма гетерогаметного (у человека — мужского) пола; Y-хромосома обычно меньше Х-хромосомы.

Х. АКРОЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [греч. akros конец, край + *центро(мера)*] — палочковидная Х. с одним длинным и одним очень коротким плечом.

Х. АТЕЛОМИТИ́ЧЕСКАЯ (греч. a- отрицательная приставка + telos конец) — Х., у к-рой отсутствует терминальная локализация центромеры.

Х. ГЕТЕРОМО́РФНЫЕ (греч. heteromorphos отличающийся по виду, особый) — гомологичные Х., различающиеся формой или размерами.

Х. ГЕТЕРОТРО́ПНЫЕ (греч. heteros другой, разный + tropos поворот, направление) — Х., не имеющие гомологичных хромосом (половые Х.).

Х. ГЕТЕРОХРОМАТИ́ЧЕСКАЯ (греч. heteros другой, разный + chrōma цвет, окраска) — сверхкомплектная, генетически инертная, полностью гетерохроматизированная Х.

Х. ГЕТЕРОЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [греч. heteros другой, разный + *центро(мера)*] — дицентрическая Х., у к-рой одна центромера мало активна, благодаря чему Х. г. в митозе ведет себя как моноцентрическая.

Х. ГОМОЛОГИ́ЧНЫЕ — структурно-идентичные Х., в которых аналогичные локусы расположены в одинаковой последовательности.

Х. ГОМОМО́РФНЫЕ (греч. homos одинаковый + morphē форма) — Х., не отличающиеся по форме и размерам, способные к конъюгации.

Х. ДИЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [греч. dis дважды + *центро(мера)*] — Х. с двумя центромерами.

Х. КОЛЬЦЕ́ВАЯ — структурно измененная Х., образующая кольцо.

Х. КРОССО́ВЕРНЫЕ — Х., обменявшиеся участками в мейозе.

Х. МАРКЁРНАЯ (франц. marquer отличаться) — структурно измененная Х., не свойственная в норме данному кариотипу и используемая в качестве отличительного признака (маркера) в цитогенетическом исследовании.

Х. МЕТАФА́ЗНАЯ — Х. в стадии метафазы митоза, представляющая

собой две хроматиды, соединенные в одной точке центромерой.

Х. МЕТАЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [греч. meta после, между + *центро(мера)*] — Х. с плечами равной или почти равной длины.

Х. МОНОЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [греч. monos один + *центро(мера)*] — Х. с одной центромерой.

Х. НЕОЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [греч. neos новый + *центро(мера)*] — Х., у к-рой в мейозе функция центромеры переходит к другому или другим участкам Х.

Х. ПОЛИЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [греч. polys многий, многочисленный + *центро(мера)*] — Х. с множеством центромер.

Х. ПОЛОВА́Я (син.: аллосома, аллохромосома, гетеросома, гетерохромосома, гоносома, гонохромосома, идиохромосома — устар.) — общее название Х., определяющих половую принадлежность особи — Х-хромосомы и Y-хромосомы.

Х. СУБМЕТАЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [лат. sub под, ниже + греч. meta после, между + *центро(мера)*] — Х. с плечами неравной длины.

Х. ТЕЛОЦЕНТРИ́ЧЕСКАЯ [*тело* (*мера*) + *центро* (*мера*)] — Х. с крайним, максимально близким к теломере расположением центромеры.

Х. ФИЛАДЕЛЬФИ́ЙСКАЯ — хромосома № 22 кариотипа человека, в к-рой произошла делеция длинного плеча; обнаруживается в лейкоцитах при хроническом миелолейкозе.

Х. ЯДРЫШКОВАЯ — Х., участвующая в формировании ядрышка и морфологически связанная с ним.

ХРОМОСО́МНАЯ КА́РТА (син. генетическая карта) — изображение расположения генов или их участков по длине хромосомы с указанием их взаимного расположения и расстояния между ними.

ХРОМОСО́МНАЯ ПЕРЕТЯ́ЖКА — слабо спирализованный участок хромосомы в профазе или метафазе.

Х. П. ВТОРИ́ЧНАЯ — Х. п., принимающая участие в образовании ядрышка.

Х. П. ПЕРВИ́ЧНАЯ — Х. п., в к-рой локализуется центромера и к-рая делит хромосому на плечи.

ХРОМОСО́МНАЯ ТЕО́РИЯ НАСЛЕ́ДСТВЕННОСТИ — теория наследственности, согласно к-рой передача признаков от родителей потомству происходит через хромосомы; экспериментально подтверждена Т. Морганом.

ХРОМОТА́ (claudicatio) — нарушение походки, характеризующееся асимметрией движений ног.

ХРОМОТА́ ПЕРЕМЕЖА́ЮЩАЯСЯ (claudicatio intermittens; син. Шарко синдром) — периодическое возникновение при ходьбе парестезий и болей в голенях (чаще в одной), вынуждающих больного остановиться; признак сужения просвета артерий конечности, напр. при облитерирующем атеросклерозе.

ХРОМОТРО́ПИЯ (*хромо-* + греч. tropos поворот, направление) — наличие в ткани веществ, вызывающих метахромазию, т. е. изменение цвета водных растворов нек-рых основных красителей (метиленовый синий, азур А, тионин, толуидиновый синий и др.).

ХРОМОТРО́ПЫ (*хромо-* + греч tropos поворот, направление) — вещества, изменяющие цвет водных р-ров нек-рых основных красителей; используются для метахроматического окрашивания гистологических препаратов.

ХРОМОФА́ГИ (chromophagi; *хромо-* + греч. phagos пожирающий) — макрофаги, фагоцитирующие хромопротеиды.

ХРОМОФИБРИ́ЛЛА (*хромо-* + *фибрилла*; син.: нить хромосомы элементарная, субхромонема) — продольная структура хромосомы диаметром 10—20 *нм*, различимая лишь при электронной микроскопии.

ХРОМОФИТО́З (chromophytosis; *хромо-* + греч. phyton нечто вырастающее + *-оз*) — см. *Хромомикоз.*

ХРОМОФО́БИЯ (chromophobia; *хромо-* + *фобия*; син.: хроматофобия, цветобоязнь) — навязчивый страх — боязнь какого-либо цвета или окрашенных предметов.

ХРОМОФО́БНЫЙ (*хромо-* + греч. phobos боязнь) — плохо или совсем не поддающийся окраске.

ХРОМОХОЛЕГРАФИ́Я (*хромо-* + *холеграфия*) — метод исследования функции желчного пузыря, заключающийся в одновременном проведении холеграфии и дуоденального зондирования с предварительным пероральным введением красителя.

ХРОМОЦЕ́НТР — сильно спирализованный, интенсивно окрашивающийся участок хромосомы в интерфазе.

ХРОМОЦИСТОСКОПИ́Я (*хромо-* + *цистоскопия*) — метод исследования функции почек и проходимости мочеточников, заключающийся во внутривенном введении индигокармина с последующим наблюдением (с помощью цистоскопа) за его выделением из устьев мочеточников.

ХРОН- (хроно-; греч. chronos время)— составная часть сложных слов, означающая «относящийся ко времени», «временной».

ХРОНАКСИ́МЕТР (*хронаксия* + греч. metreō измерять) — прибор для измерения хронаксии, состоящий из источника постоянного электрического тока и устройств, дозирующих его напряжение и длительность раздражающего воздействия.

ХРОНАКСИМЕТРИ́Я (*хронаксия* + греч. metreō измерять) — измерение хронаксии.

ХРОНАКСИ́Я (*хрон-* + греч. axia количество) — показатель возбудимости ткани, представляющий собой наименьшую продолжительность воздействия электрическим током силой (или напряжением) в 2 реобазы, достаточную для возникновения возбуждения.

ХРОНИОСЕ́ПСИС (устар.)— см. *Сепсис хронический.*

ХРО́НИСА ОПЕРА́ЦИЯ (P. Chronis, нем. офтальмолог 20 в.) — хирургическая операция: истончение хряща века с удалением покрывающей его мышцы; применяется при рубцовом завороте века и трихиазе.

ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (chronicus; греч. chronikos долговременный) — медленно развивающийся, затяжной, длительный (о заболевании, патологическом процессе).

ХРОНО- — см. *Хрон-.*

ХРОНОБИОЛО́ГИЯ (*хроно-* + *биология*) — раздел биологии, изучающий временны́е характеристики биологических, в т. ч. физиологических, процессов (биоритмы, сезонность и др.).

ХРОНОГНОЗИ́Я (chronognosia; *хроно-* + греч. gnōsis познавание, знание)— способность определять продолжительность отрезка времени, длительность и последовательность событий; нарушается при нек-рых психозах и органических поражениях головного мозга.

ХРОНО́ГРАФ (*хроно-* + греч. graphō писать, записывать) — 1) прибор для измерения коротких промежутков времени с большой точностью (до 10^{-5} сек.); 2) прибор для графической регистрации момента возникновения и продолжительности исследуемого физиологического явления путем отметки временных промежутков на ленте самопишущего прибора.

ХРОНОМЕТРА́Ж (*хроно-* + греч. metreō измерять) — метод изучения затрат времени на выполнение рабочей операции путем наблюдения и измерения продолжительности циклически повторяющихся ее элементов; используется в физиологии труда и эргономике для характеристики условий труда и оценки состояния работоспособности человека, а в организации здравоохранения — для нормирования деятельности медицинского персонала.

ХРОНОМИОРЕФЛЕКСО́МЕТР (*хроно-* + греч. mys, myos мышца + *рефлексометр*) — прибор для измерения временны́х характеристик двигательных и речевых реакций человека.

ХРОНОПЕРИМЕТРИ́Я (*хроно-* + *периметрия*) — разновидность кинетической периметрии, при к-рой учитывают временны́е параметры различения тестовых объектов.

ХРОНОСКО́П (*хроно-* + греч. skopeō смотреть, наблюдать) — прибор для измерения коротких промежутков времени с высокой точностью (от 1 до 0,1 *мсек*); применяется, напр., при физиологических и психофизиологических исследованиях времени реакции человека на какие-либо раздражители.

ХРОНОСКОПИ́Я (*хроно-* + греч. skopeō смотреть, наблюдать) — измерение (с точностью от 1 до 0,1 *мсек*) коротких интервалов времени протекания физиологических и психических реакций; применяется, напр., в физиологии высшей нервной деятельности, в спортивной, авиационной и космической медицине.

ХРОНОТРО́ПНОЕ ДЕ́ЙСТВИЕ (*хроно-* + греч. tropos поворот, направление) — действие какого-либо фактора, изменяющее частоту сердечных сокращений (положительное Х. д. увеличивает, а отрицательное Х. д. уменьшает частоту).

ХРОНОФОТОГРА́ММА — серия фотографических изображений движущегося объекта через равные промежутки времени.

ХРОНОФОТОГРАФИ́Я (*хроно-* + фотография) — метод исследования различных, в т. ч. биологических и физиологических, процессов, характеризующихся перемещением объекта наблюдения, основанный на его многократном фотографировании через короткие равные промежутки времени.

ХРОНОФОТОКА́МЕРА (*хроно-* + фотокамера) — прибор для регистрации перемещения какого-либо объекта путем многократного фотографирования через заданные промежутки времени; применяется в физиологии и медицине (напр., спортивной).

ХРОНОФОТОЦИКЛОГРА́ММА (*хроно-* + греч. phōs, phōtos свет + *циклограмма*) — см. *Хроноциклограмма.*
ХРОНОФОТОЦИКЛОГРАФИ́Я (*хроно-* + греч. phōs, phōtos свет + *циклография*) — см. *Хроноциклография.*
ХРОНОЦИКЛОГРА́ММА (*хроно-* + *циклограмма*; син. хронофотоциклограмма) — хронофотограмма циклических движений.
ХРОНОЦИКЛОГРАФИ́Я (*хроно-* + *циклография*; син. хронофотоциклография) — хронофотография циклических движений, при к-рой получают изображения отдельных маркированных точек движущегося объекта, напр. тела человека.
ХРУ́ПКОСТЬ ВОЛО́С — см. *Трихоклазия.*
ХРУСТА́ЛИК (lens, PNA; lens crystallina, BNA, JNA) — двояковыпуклое прозрачное тело изменяемой кривизны, расположенное внутри глазного яблока позади радужной оболочки; часть оптической системы глаза.
ХРУСТА́ЛИК ИСКУ́ССТВЕННЫЙ — линза, внедряемая оперативным путем в переднюю или заднюю камеру глаза с целью коррекции афакии.
ХРУСТА́ЛИКОВАЯ ЗВЕЗДА́ (син. фигура звезды) — система швов старческого ядра хрусталика, образованная на месте соединения волокон хрусталика с капсулой и определяемая при биомикроскопическом исследовании в виде 8—10 ветвящихся линий, напоминающих звезду.
ХРУСТА́ЛИКОВЫЙ ПУЗЫРЁК — зачаток хрусталика в виде пузырька, возникшего в результате впячивания и отшнурования хрусталиковой плакоды от кожной эктодермы.
ХРЯЩ (cartilago) — анатомическое образование, состоящее из хрящевой ткани и выполняющее опорную функцию.
ХРЯЩ ВЕ́КА [tarsus (superior et inferior), PNA, BNA; tarsus palpebrae, JNA; син. тарзальная пластинка] — пластинка из плотной волокнистой соединительной ткани, расположенная внутри века, ближе к его задней поверхности, и прикрепленная связками к краям глазницы.
ХРЯЩ ВОЛОКНИ́СТЫЙ (fibrocartilago) — см. *Ткань хрящевая волокнистая.*
ХРЯЩ ГИАЛИ́НОВЫЙ — см. *Ткань хрящевая гиалиновая.*
ХРЯЩ КЛИНОВИ́ДНЫЙ (cartilago cuneiformis, PNA, BNA, JNA; син. врисбергов хрящ) — непостоянный хрящ, расположенный в черпалонадгортанной складке над рожковидным хрящом.
ХРЯЩ КОЛЛАГЕ́НОВО-ВОЛОКНИ́СТЫЙ — см. *Ткань хрящевая волокнистая.*
ХРЯЩ КОЛЬЦЕВИ́ДНЫЙ — см. *Хрящ перстневидный.*
ХРЯЩ НАДГОРТА́ННЫЙ (cartilago epiglottidis) — см. *Надгортанник.*
ХРЯЩ ПЕ́РСТНЕВИ́ДНЫЙ (cartilago cricoidea, PNA, BNA; cartilago cricoides, JNA; син. хрящ кольцевидный) — хрящ в форме кольца, расположенный в основании гортани; входит в состав скелета гортани.
ХРЯЩ РОЖКОВИ́ДНЫЙ (cartilago corniculata, PNA; син. санториниев хрящ) — небольшой конический хрящ, расположенный над верхушкой черпаловидного хряща гортани в черпало-надгортанной складке.
ХРЯЩ СОШНИКО́ВО-НОСОВО́Й (cartilago vomeronasalis, PNA, BNA, JNA; син. Якобсона сошниково-носовой хрящ) — хрящевая пластинка, расположенная у нижнего края хрящевой части перегородки носа рядом с сошниково-носовым органом.
ХРЯЩ СУСТАВНО́Й (cartilago articularis, PNA, BNA, JNA) — слой гиалиновой или волокнистой хрящевой ткани, покрывающий суставную поверхность кости.
ХРЯЩ УШНО́Й РАКОВИНЫ (cartilago auriculae, PNA, BNA, JNA) — воронкообразная пластинка эластической хрящевой ткани со сложным рельефом, расположенная в ушной раковине и определяющая ее форму.
ХРЯЩ ЧЕРПАЛОВИ́ДНЫЙ (cartilago arytenoidea, PNA, BNA; cartilago arytenoides, JNA) — парный хрящ гортани, имеющий форму трехгранной пирамиды, основание к-рой соединено при помощи сустава с пластинкой перстневидного хряща.
ХРЯЩ ЩИТОВИ́ДНЫЙ (cartilago thyroidea, PNA; cartilago thyreoidea, BNA; cartilago thyreoides, JNA) — крупный непарный хрящ гортани, образующий гортанный выступ.
ХРЯЩ ЭЛАСТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Ткань хрящевая эластическая.*
ХРЯЩ ЭПИФИЗА́РНЫЙ (cartilago epiphysialis, PNA; син. эпифизарная пластинка) — соединяющая эпифиз и диафиз пластинка хрящевой ткани, в к-рой локализуется ростовая зона кости; существует до возникновения синостоза между эпифизом и диафизом.
ХРЯЩЕВА́Я ПЛАСТИ́НКА РО́СТА — см. *Слой размножающихся хондроцитов.*
ХРЯЩЕВА́Я СТРУ́ЖКА (син. хрящевой фарш) — измельченные кусочки хряща, применяемые при аутопластических операциях на костях с целью пломбирования костных полостей, а также при соединении костей с помощью ультразвука.
ХРЯЩЕВО́Е СОЕДИНЕ́НИЕ (articulatio cartilaginea, PNA; synchondrosis, BNA, JNA) — см. *Синхондроз.*
ХРЯЩЕВО́Й ФАРШ — см. *Хрящевая стружка.*
ХТОНОФАГИ́Я (греч. chthōn, chthōnos земля + phagein есть) — см. *Геофагия.*
ХУ́ВЕ СИНДРО́М (J. Van der Hoev, совр. голландский офтальмолог) — см. *Ван-дер-Хуве синдром.*
ХЬЮЗА ОПЕРА́ЦИЯ (W. L. Hughes, род. в 1900 г., амер. офтальмолог) — хирургическая операция: восстановление нижнего века при отсутствии глаза с использованием кожных лоскутов из щеки и верхнего века.
ХЭ́МА ТЕ́СТ (Th. H. Ham, род. в 1905 г., амер. терапевт) — метод диагностики пароксизмальной ночной гемоглобинурии, основанный на феномене гемолиза эритроцитов больного в подкисленной среде.

Ц

ЦА́НГА Я́МКА (Ch. B. Zang, 1772—1835, австрийский хирург) — см. *Надключичная ямка малая.*
ЦА́НГЕМЕЙСТЕРА МЕ́ТОД (W. Zangemeister, 1871—1930, нем. гинеколог) — метод оценки соотношения размеров головки плода и малого таза роженицы путем сравнения размера Цангемейстера с наружной конъюгатой.
ЦА́НГЕМЕЙСТЕРА РАЗМЕ́Р (W. Zangemeister) — измеряемое тазомером расстояние от верхней точки крестцового ромба до наиболее выступающей точки головки плода при полном раскрытии шейки матки; используется для оценки соотношений размеров головки плода и малого таза роженицы.
ЦА́НГЕМЕЙСТЕРА ТРИА́ДА (W. Zangemeister) — сочетание трех признаков нефропатии беременных: артериальной гипертензии, отеков и протеинурии.
ЦА́ПКА — инструмент для крепления операционного белья в виде пинцета или зажима с перекрещивающимися крючковидными губками.
ЦАРА́ПИНА — см. *Экскориация.*
ЦА́УФАЛЯ ОПЕРА́ЦИЯ (E. Zaufal, 1837—1910, чешский оториноларинголог) — радикальная операция на ухе при хроническом гнойном среднем отите, осложненном кариесом кости или холестеатомой; заключается в том, что после разреза мягких тканей позади ушной раковины вскрывают полость среднего уха, резецируют верхнюю часть задней стенки и заднюю часть верхней стенки наружного слухового прохода, удаляют патологически измененные ткани из полости среднего уха и производят пластику наружного слухового прохода.
ЦВЕТ — свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии с его спектральным составом.
ЦВЕТ АХРОМАТИ́ЧЕСКИЙ — цвет, характеризующийся лишь определенным уровнем светлоты (белый, серый, черный).
ЦВЕТА́ ДОПОЛНИ́ТЕЛЬНЫЕ — два цвета, к-рые при оптическом смешении дают ахроматический цвет.
ЦВЕТА́ ОСНОВНЫ́Е (син. цвета первичные) — три спектральных цвета (красный, зеленый, синий), из к-рых при оптическом смешении в различных сочетаниях можно получить остальные спектральные цвета.
ЦВЕТА́ ПЕРВИ́ЧНЫЕ — см. *Цвета основные.*
ЦВЕТА́ СПЕКТРА́ЛЬНЫЕ — семь цветов, на к-рые условно разделяют спектр видимого излучения (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).
ЦВЕТКО́ВА ПИНЦЕ́Т (В. А. Цветков, сов. офтальмолог) — пинцет с заостренными губками, предназначенный для удаления инородных тел из роговицы.
ЦВЕТНО́Й ПОКАЗА́ТЕЛЬ КРО́ВИ — индекс, представляющий собой частное от деления найденного содержания

гемоглобина (в граммах на литр крови) к найденному количеству эритроцитов в 1 *мкл* крови; применяется для дифференциальной диагностики анемий.

ЦВЕТНО́Й РЯД — см. *Гисса среды.*

ЦВЕ́ТНОСТЬ ВОДЫ́ — санитарный показатель качества воды, позволяющий судить о наличии в ней примесей; определяется колориметрически в градусах платино-кобальтовой или хромово-кобальтовой шкалы.

ЦВЕТОБОЯ́ЗНЬ — см. *Хромофобия.*

ЦВЕТОВО́Е ТЕ́ЛО — наглядная пространственная модель многообразия цветов, отражающая и их количественные характеристики (светлоту и насыщенность).

ЦВЕТОВО́Й ИНТЕРЬЕ́Р — сочетание цветовых компонентов отделки и оборудования помещений; рассматривается гигиеной и инженерной психологией как один из факторов окружающей среды, воздействующих на человека в производственных условиях и в быту.

ЦВЕТОВО́Й КРУГ — круг, сектора которого окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов, причем пурпурный цвет связывает крайние (красный и фиолетовый) цвета; применяется в качестве наглядной модели многообразия цветов.

ЦВЕТООЩУЩЕ́НИЕ — см. *Зрение цветовое.*

ЦВЕТОРАЗЛИЧЕ́НИЕ — см. *Зрение цветовое.*

ЦВЕТОТЕ́СТ — прибор для исследования бинокулярного зрения, основанный на разделении полей зрения правого и левого глаза с помощью цветных светофильтров, имеющихся в самом приборе и в прилагаемых к нему специальных очках.

ЦВИ́РИНА ЖГУТ — кровоостанавливающий жгут, изготовленный из проволоки в виде гибкой спиральной пружины, обшитой материей и снабженной автоматическим замком.

ЦЕБОЦЕФАЛИ́Я (cebocephalia; греч. kēbos обезьяна + kephalē голова) — аномалия развития: недоразвитие наружного носа вплоть до его отсутствия, сочетающееся с уменьшенным расстоянием между глазами, вследствие чего лицо больного напоминает морду обезьяны.

ЦЕ́ЗИЕВАЯ ЕДИНИ́ЦА — единица содержания радиоактивного изотопа ^{137}Cs в биологических объектах, соответствующая содержанию 1 *мккюри* ^{137}Cs на 1 *г* калия, входящего в состав данного биологического объекта.

ЦЕ́ЗИЙ РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название группы радиоактивных изотопов цезия с массовыми числами от 123 до 144 и периодом полураспада от миллиардных долей секунды до 27 лет; нек-рые изотопы используются с диагностической и лечебной целью.

ЦЕЙКИ СИМПТО́М (J. J. Cejka, 1812—1862, чешский врач) — постоянство размеров сердечной тупости в различные фазы дыхания; признак экссудативного перикардита.

ЦЕЙСА ЖЕЛЕЗА́ (E. Zeis, 1807—1868, нем. хирург) — см. *Железа сальная, века.*

ЦЕЙССА ПЕТЛЕВИ́ДНЫЙ КАТЕ́ТЕР (L. Zeiss, 1900—1958, нем. уролог) — см. *Катетер-петля.*

ЦЕЙССА ПЕ́ТЛЯ (L. Zeiss) — см. *Катетер-петля.*

ЦЕЙССЛЕРА АППАРА́Т (J. Zeissler, род. в 1883 г., нем. микробиолог) — аппарат для выращивания анаэробных бактерий, состоящий из толстостенной стеклянной банки с крышкой, из которой откачивают воздух до давления 20—10 *мм* рт. ст., а оставшийся кислород поглощают с помощью химического поглотителя.

ЦЕЙССЛЕРА СРЕДА́ (J. Zeissler) — плотная питательная среда для культивирования анаэробов, содержащая мясопептонный агар, глюкозу и кровь.

ЦЕКА́ЛЬНЫЙ (cecalis, caecalis; анат. cecum слепая кишка) — относящийся к слепой кишке.

ЦЕКО- (анат. cecum, лат. intestinum caecum слепая кишка, от caecus слепой) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к слепой кишке».

ЦЕКОПЕКСИ́Я (cecopexia; *цеко-* + греч. pēxis прикрепление; син. тифлопексия) — хирургическая операция: фиксация чрезмерно подвижной слепой кишки к париетальной брюшине.

ЦЕКОПЛИКА́ЦИЯ (cecoplicatio; *цеко-* + лат. plica складка) — хирургическая операция: уменьшение размеров слепой кишки путем наложения на ее купол гофрирующих швов.

ЦЕКОСТОМИ́Я (cecostomia; *цеко-* + греч. stoma отверстие; син. тифлостомия) — хирургическая операция: наложение наружного свища на слепую кишку.

ЦЕКОТОМИ́Я (cecotomia; *цеко-* + греч. tomē рассечение; син. тифлотомия) — хирургическая операция: рассечение стенки слепой кишки.

ЦЕ́ЛЕНА СИНДРО́М (W. Ceelen, 1884—1964, нем. патолог) — см. *Гемосидероз легких идиопатический.*

ЦЕ́ЛЕНА — ГЕ́ЛЛЕРСТЕДТА СИНДРО́М (W. Ceelen, 1884—1964, нем. патолог; N. Gellerstedt, род. в 1896 г., шведский патолог) — см. *Гемосидероз легких идиопатический.*

ЦЕЛИАКИ́Я (coeliakia; греч. koiliakos кишечный, страдающий расстройством кишечника, от koilia брюшная полость; син.: Гейбнер-гертеровская болезнь, Ги — Гертера — Гейбнера болезнь)— хроническое заболевание, обусловленное недостаточностью ферментов, участвующих в переваривании глютена, и проявляющееся снижением питания, стеатореей, резким увеличением живота, признаками авитаминоза и нарушения фосфорно-кальциевого обмена; наблюдается у детей.

ЦЕЛИАКИ́Я ГЛЮТЕНЧУВСТВИ́ТЕЛЬНАЯ — см. *Болезнь глютеновая.*

ЦЕЛИАКОГРАФИ́Я (анат. truncus celiacus чревный ствол + греч. graphō писать, изображать) — селективная артериография чревного ствола.

ЦЕЛИО- (греч. koilia полость, брюшная полость) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к брюшной полости».

ЦЕЛИОСКОПИ́Я (*целио-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — см. *Перитонеоскопия.*

ЦЕЛИОСТОМИ́Я (coeliostomia; *целио-* + греч. stoma отверстие) — метод экспериментального соединения двух животных путем сшивания предварительно рассеченных участков кожи, мышц и брюшины.

ЦЕЛЛОИДИ́Н — вязкое вещество, изготовляемое из коллодия и применяемое в виде спирт-эфирного раствора для заливки кусочков ткани в процессе изготовления гистологических препаратов.

ЦЕЛЛЮЛИ́Т (cellulitis; гист. cellula клетка + *-ит*) — см. *Панникулит.*

ЦЕЛЛЮЛИ́Т БРУЦЕЛЛЁЗНЫЙ (cellulitis brucellosa) — панникулит при бруцеллезе, иногда возникающий на туловище и конечностях.

ЦЕЛЛЮЛИ́Т ПЬЮЗИ — см. *Гоффманна абсцедирующий и подрывающий фолликулит и перифолликулит головы.*

ЦЕЛЛЮЛО́ЗА (франц. cellulosa, от лат. cellula маленькая комната, клетка; син. клетчатка) — полисахарид, образованный остатками глюкозы, являющийся составной частью клеточных стенок растений; входит в состав растительной пищи, практически не усваивается организмом.

ЦЕЛЛЮЛЯ́РНЫЙ (cellularis; гист. cellula клетка) — клеточный, относящийся к клетке.

ЦЕЛО́М (coeloma; греч. koilōma углубление, полость; син.: вторичная полость, дейтероцель, метацель) — полость зародыша, выстланная мезотелием, возникающая путем раздвигания клеток плотного мезодермального зачатка, либо (напр., у иглокожих, ланцетника) путем отшнуровывания от первичной кишки: у млекопитающих и человека из Ц. образуются перикардиальная, плевральная и брюшинная полости.

Ц. ВНЕЗАРО́ДЫШЕВЫЙ (c. extraembryonale; син. экзоцелом) — часть Ц., расположенная вне туловища зародыша, напр. между амнионом и хорионом, хорионом и желточным мешком.

Ц. ВНУТРИЗАРО́ДЫШЕВЫЙ (c. intraembryonale; син. эндоцелом) — часть Ц., расположенная в пределах туловища зародыша.

ЦЕЛОМИ́ЧЕСКАЯ ЖИ́ДКОСТЬ (liquor coelomicus) — жидкость, заполняющая целом и секретируемая выстилающим его мезотелием.

ЦЕЛОТЕЛИО́МА (coelothelioma; гист. устар. coelothelium мезотелий + *-ома*) — см. *Мезотелиома.*

ЦЕЛЬ в ф и з и о л о г и и — нереализованная часть программы функциональной системы (напр., наличие мотивации), в соответствии с к-рой организм мобилизует комплекс реакций, направленных на достижение полезного результата (по П. К. Анохину).

ЦЕ́ЛЬСА КЕ́РИОН (Aulus Cornelius Celsus, римский ученый конца 1 в. до н. э.— середины 1 в. н. э.) — инфильтративно-нагноительная трихофития, при к-рой поражения локализуются на волосистой части головы.

ЦЕ́ЛЬСА МЕ́ТОД ПЛА́СТИКИ (Aulus Cornelius Celsus; син. французский способ пластики) — метод кожной пластики путем перемещения соседнего участка кожи.

ЦЕМЕ́НТ з у б а (cementum, LNH) — плотная ткань, покрывающая дентин корня зуба, состоящая из основного вещества, пронизанного беспорядочно расположенными коллагеновыми волокнами, и не содержащая кровеносных сосудов.

Ц. БЕСКЛЕ́ТОЧНЫЙ — Ц., не содержащий клеток и расположенный

преимущественно в верхней части корня зуба.

Ц. ВТОРИ́ЧНЫЙ — см. *Цемент клеточный.*

Ц. КЛЕ́ТОЧНЫЙ (cementum cellulare, LNH; син. Ц. вторичный) — Ц., содержащий большое количество цементоцитов, напоминающий по строению грубоволокнистую костную ткань и расположенный в нижней части корня зуба.

ЦЕМЕНТИ́КЛЬ (cementiculum) — образование шаровидной формы, расположенное в периодонте, состоящее из цемента.

ЦЕМЕНТО́МА (cementoma; цемент + *-ома*) — доброкачественная опухоль, ткань к-рой напоминает по строению цемент зуба; развивается редко, гл. обр. в ветви нижней челюсти, вблизи от зубов мудрости.

ЦЕМЕНТОЦИ́ТЫ (cementocyti, LNH; цемент + гист. cytus клетка) — зрелые клетки цемента зуба, напоминающие по строению остеоциты.

ЦЕМЕ́НТОЭКЗОСТО́З (cementoexostosis; цемент + *экзостоз*) — деформация корня зуба в виде выступов на его поверхности, образовавшихся в результате чрезмерного отложения цемента.

ЦЕМНО́ВИЧА ОПЕРА́ЦИЯ (Zemnowich) — хирургическая операция: отведение цереброспинальной жидкости из подпаутинного пространства спинного мозга в губчатую ткань тела позвонка; применяется при открытой гидроцефалии.

ЦЕНЗУ́РА ВНУТРИПСИХИ́ЧЕСКАЯ — применяемое в психоанализе обозначение представления об осуществляемом «супер-эго» контроле психических процессов, переходящих из сферы подсознательного в сферу сознательного.

ЦЕ́НКЕРА ДИВЕРТИ́КУЛ (F. A. Zenker, 1825—1898, нем. патолог; син. ценкеровский дивертикул) — мешковидный дивертикул глоточного конца пищевода, образующийся сначала на его задней стенке, а затем распространяющийся и на боковую.

ЦЕ́НКЕРА СМЕСЬ (K. Zenker, нем. гистолог 19 в.) — смесь водных растворов бихромата калия, сульфата натрия и сулемы, применяемая для фиксации гистологических препаратов.

ЦЕ́НКЕРОВСКАЯ ДИСТРОФИ́Я (F. A. Zenker, 1825—1898, нем. патолог) — см. *Некроз восковидный.*

ЦЕ́НКЕРОВСКИЙ ДИВЕРТИ́КУЛ (F. A. Zenker, 1825—1898, нем. патолог) — см. *Ценкера дивертикул.*

ЦЕ́НКЕРОВСКИЙ НЕКРО́З (F. A. Zenker, 1825—1898, нем. патолог) — см. *Некроз восковидный.*

ЦЕ́НКЕР-ФОРМО́Л (K. Zenker, нем. гистолог 19 в.) — смесь Ценкера, к к-рой непосредственно перед употреблением добавлен формалин; применяется для фиксации гистологических препаратов.

ЦЕ́НОГЕНЕ́З (греч. kainos новый + genesis зарождение, образование) — появление у зародыша или личинки приспособлений к условиям существования, не свойственных взрослым стадиям, напр. образование оболочек у зародышей высших животных.

ЦЕ́НТР нервной системы (син. нервный центр) — система нервных образований на разных уровнях ц. н. с., осуществляющая регуляцию специализированной функции организма; напр., регуляцию дыхания осуществляет дыхательный Ц.

ЦЕ́НТР МНОГОПО́ЛЬНОГО ОБЛУЧЕ́НИЯ — точка пересечения осей пучков ионизирующего излучения при многопольном перекрестном облучении.

ЦЕ́НТР ОКОСТЕНЕ́НИЯ — см. *Точка окостенения.*

ЦЕ́НТР РАЗМНОЖЕ́НИЯ — см. *Светлый центр.*

ЦЕ́НТР РОТА́ЦИИ (лат. rotatio круговое движение, вращение) — точка пересечения оси вращения пучка ионизирующего излучения с плоскостью, в к-рой он перемещается при ротационном облучении.

ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ Я́МКА сетчатки (fovea centralis, PNA, BNA, JNA) — углубление в центре желтого пятна (пятна сетчатки), характеризующееся наибольшей концентрацией и поверхностным расположением фоторецепторов.

ЦЕНТРА́ЛЬНОЕ ТЕ́ЛЬЦЕ — см. *Центросома.*

ЦЕНТРА́ЛЬНЫЕ ВЕ́ТВИ передней мозговой артерии (rami centrales, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *105.*

ЦЕНТРА́ЛЬНЫЕ ОТДЕ́ЛЫ ЛЁГКОГО — отделы легкого, прилегающие к его корню.

ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ КАНА́Л (canalis centralis, PNA, BNA, JNA; син.: канал спинного мозга центральный, спинномозговой канал) — продольный канал, проходящий в сером веществе спинного мозга; вверху сообщается с полостью IV желудочка головного мозга, внизу образует расширение — конечный желудочек.

ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ ЛУЧ — ось пучка ионизирующего излучения; часто рассматривается как ось симметрии дозного поля излучения в направлении его распространения в облучаемом теле.

ЦЕНТРА́ТОР (лат. centrum центр круга; син. локализатор) — приспособление для точной установки оси пучка излучения в направлении заданного объекта.

Ц. МЕХАНИ́ЧЕСКИЙ — Ц., в к-ром пучок излучения или его ось имитируется с помощью выдвижных деталей.

Ц. ОПТИ́ЧЕСКИЙ — Ц., в к-ром пучок излучения или его ось имитируется с помощью пучка видимого света.

Ц. РЕНТГЕ́НОВСКИЙ — Ц., в к-ром направление пучка рентгеновского излучения контролируется по его изображению на флюороскопическом экране.

ЦЕНТРИ- (центро-; лат. centrum центр круга) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к центру», «расположенный в центре».

ЦЕНТРИО́ЛИ (лат. centrum центр круга) — хромофильные тельца цилиндрической формы (два, иногда более), образующие клеточный центр, расходящийся к полюсам клетки, и реродуцирующиеся при ее делении; определяют ориентацию веретена.

ЦЕНТРИПЕТА́ЛЬНЫЙ (*центри-* + лат. peto направляться, устремляться) — центростремительный, направленный от периферии к центру.

ЦЕНТРИ́РОВАНИЕ в рентгенологии — процедура установки центрального пучка излучения в направлении на заданную точку объекта, подлежащего облучению.

ЦЕНТРИСКО́П (*центри-* + греч. skopeō смотреть, наблюдать) — прибор для качественной проверки правильности положения оптического центра корригирующей очковой линзы относительно центра зрачка глаза.

ЦЕНТРИФУ́ГА (нем. Zentrifuge; *центри-* + лат. fuga бег, быстрое движение) — аппарат для механического разделения неоднородной смеси (суспензии, эмульсии и др.) на составные части различной плотности, основанный на воздействии большой центробежной силы; широко применяется в науке и промышленности, в т. ч. при лабораторных, медицинских и медико-биологических исследованиях, изготовлении лекарственных средств.

ЦЕНТРИФУ́ГА-ТРЕНАЖЁР — технический комплекс, предназначенный для воздействия на человека ускорениями заданной величины и направления, основанный на использовании центробежной силы; применяется в авиационной и космической медицине для имитации условий деятельности пилота (космонавта).

ЦЕНТРИФУГИ́РОВАНИЕ — разделение неоднородных смесей (напр., суспензий, эмульсий) на составные части различной плотности с помощью центрифуги.

ЦЕНТРО- — см. *Центри-.*

ЦЕНТРОДЕ́СМА (centrodesma; *центро-* + греч. desmos связь, связка, соединение) — перемычка между центриолями, образующаяся в профазе и состоящая из цитоплазматических нитей.

ЦЕНТРОМЕ́РА (centromerus; *центро-* + греч. meros часть; син.: кинетохор, киномера) — участок хромосомы в области ее первичной перетяжки, к-рым она связана с нитями веретена.

ЦЕНТРОСО́МА (centrosoma; *центро-* + греч. sōma тело; син.: центральное тельце, центросфера) — плотный участок цитоплазмы, окружающий центриоли и образующий с ними клеточный центр.

ЦЕНТРОСФЕ́РА (centrosphaera; *центро-* + греч. sphaira шар) — см. *Центросома.*

ЦЕНТРЭНЦЕФАЛИ́ЧЕСКАЯ ТЕО́РИЯ — см. *Пенфилда центрэнцефалическая теория.*

ЦЕ́НУР — личинка цестод отр. Cyclophyllidea в виде крупного пузыря с ввернутыми внутрь многочисленными головками.

ЦЕНУРО́З (coenurosis) — инвазия личинками (ценурами) цестод рода Multiceps; личинки Multiceps multiceps локализуются в головном мозге, вызывая его очаговые поражения; личинки Multiceps serialis и Multiceps brauni вызывают образование опухолевидных разрастаний под кожей, в мышцах, в брюшной и грудной полостях; человек заражается редко, при контакте с собаками, больными соответствующим цестодозом.

ЦЕПЕНЬ (син. солитер) — общее название нек-рых цестод отр. Cyclophyllidea.

Ц. БЫ́ЧИЙ — см. *Taeniarhynchus saginatus.*

Ц. ВООРУЖЁННЫЙ — см. *Taenia solium.*

Ц. КА́РЛИКОВЫЙ — см. *Hymenolepis nana.*

Ц. КРЫСИ́НЫЙ — см. *Hymenolepis diminuta.*

Ц. НЕВООРУЖЁННЫЙ — см. *Taeniarhynchus saginatus.*

Ц. СВИНО́Й — см. *Taenia solium.*

Ц. ТЫКВОВИ́ДНЫЙ — см. *Dipylidium caninum.*

ЦЕПЬ ПИТА́НИЯ (син.: пищевая цепочка, пищевая цепь, трофическая цепь) — последовательный ряд видов животных и микроорганизмов, в к-ром каждый предыдущий служит источником пищи для последующего; первым членом Ц. п. всегда является аутотрофное растение или микроорганизм.

ЦЕРА́ТЫ (истор.; cerata) — сплавы из воска и жира с добавлением лекарственных и ароматических веществ; по консистенции находятся между мазями и пластырями.

ЦЕРВИК- (цервико-, цервиц-; лат. cervix, cervicis шея, шейка) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к шее», «относящийся к шейке матки».

ЦЕРВИКАЛГИ́Я (cervicalgia; *цервик-* + греч. algos боль) — боль в области шеи, обусловленная поражением шейного отдела позвоночника или мышц этой области.

ЦЕРВИКА́ЛЬНЫЙ (cervicalis; лат. cervix шея, шейка) — 1) расположенный в области шеи, относящийся к шее; 2) относящийся к шейке матки.

ЦЕРВИКА́ЛЬНЫЙ КАНА́Л (canalis cervicis uteri) — см. *Канал шейки матки.*

ЦЕРВИКО- — см. *Цервик-.*

ЦЕРВИКОАРТРО́З (cervicoarthrosis; *цервико-* + *артроз*) — см. *Спондилоартроз шейный.*

ЦЕРВИЦ- — см. *Цервик-.*

ЦЕРВИЦИ́Т (cervicitis; *цервиц-* + *-ит*) — воспаление шейки матки.

ЦЕРЕБЕЛЛЯ́РНО-РУБРОСПИНА́ЛЬНЫЙ ПУТЬ — см. *Мозжечково-красноядерно-спинномозговой путь.*

ЦЕРЕБЕЛЛЯ́РНЫЙ (cerebellaris; анат. cerebellum мозжечок) — мозжечковый, относящийся к мозжечку.

ЦЕРЕБР- (церебро-; лат. cerebrum головной мозг) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к головному мозгу».

ЦЕРЕБРАСТЕНИ́Я (cerebrasthenia; *церебр-* + *астения*; син. энцефаластения) — сочетание астении с головными болями, головокружениями, нек-рым ухудшением памяти и другими признаками поражения головного мозга; наблюдается при травме, инфекции, интоксикации или в начальной стадии органического заболевания головного мозга.

Ц. ТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ (с. traumatica) — Ц. после перенесенной черепно-мозговой травмы, характеризующаяся преобладанием раздражительной слабости, сосудистыми и вестибулярными расстройствами.

ЦЕРЕ́БРО- — см. *Церебр-.*

ЦЕРЕБРО́ЗА — см. *Галактоза.*

ЦЕРЕБРОПАТИ́Я (cerebropathia; *церебро-* + греч. pathos страдание, болезнь) — см. *Энцефалопатия.*

ЦЕРЕБРОСПИНА́ЛЬНАЯ ЖИ́ДКОСТЬ (liquor cerebrospinalis; син.: ликвор, спинномозговая жидкость) — жидкая среда, заполняющая полости спинного и головного мозга; исследование состава Ц. ж. используется для дифференциальной диагностики болезней **ц. н. с.**

ЦЕРЕБРОСПИНА́ЛЬНЫЙ (cerebrospinalis; *церебро-* + анат. medulla spinalis спинной мозг) — относящийся к головному и спинному мозгу.

ЦЕ́РИЙ РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название радиоактивных изотопов церия с массовыми числами от 131 до 146 и периодом полураспада от 55 сек. до $5 \cdot 10^{15}$ лет; отдельные изотопы используются при медико-биологических исследованиях и лучевой терапии.

ЦЕРКА́РИЙ (греч. kerkos хвост) — последняя стадия личинки трематод, развивающаяся в промежуточном хозяине (моллюске) и покидающая его.

Ц. ИНЦИСТИ́РОВАННЫЙ — см. *Метацеркарий.*

ЦЕРУЛОПЛАЗМИ́Н — металлопротеид плазмы крови, относящийся к альфа-глобулинам, содержащий медь и обладающий свойствами окислительного фермента; уменьшение содержания Ц. в плазме крови играет важную роль в патогенезе гепатоцеребральной дистрофии.

ЦЕСТОДО́ЗЫ (cestodoses) — гельминтозы, возбудители к-рых относятся к подклассу цестод кл. Cestoidea типа плоских червей.

ЦЕСТО́ДЫ (Cestoda; син. черви ленточные) — подкласс паразитических червей кл. Cestoidea типа плоских червей; характеризуются лентовидным телом, состоящим из члеников и сколекса, отсутствием полости тела и пищеварительной системы, развитием со сменой хозяев; являются возбудителями цестодозов.

ЦЕ́ТТНОВА ЖИ́ДКОСТЬ (H. O. E. Zettnow, 1842—1927, нем. бактериолог) — насыщенный раствор бихромата калия в серной кислоте, применяемый для очистки предметных и покровных стекол.

ЦЕФАЛ- (цефало-, кефал-, кефало-; греч. kephalē голова) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к голове».

ЦЕФАЛГИ́Я (cephalgia; *цефал-* + греч. algos боль) — см. *Боль головная.*

ЦЕФАЛГИ́Я ГИСТАМИ́НОВАЯ — см. *Хортона синдром.*

ЦЕФАЛО- — см. *Цефал-.*

ЦЕФАЛО́МЕТР (*цефало-* + греч. metreō измерять) — см. *Краниометр.*

ЦЕФАЛОМЕТРИ́Я (*цефало-* + греч. metreō измерять) — определение размеров головки плода на рентгенограмме для прогнозирования родов при узком тазе.

ЦЕФАЛОПА́Г (cephalopagus; *цефало-* + греч. pagos прикрепленный) — см. *Краниопаг.*

ЦЕФАЛОСПО́РИОЗ (cephalosporiosis; син.: акремониоз, акроасталагмоз) — плесневой микоз, вызываемый различными видами паразитических грибков рода Cephalosporium, характеризующийся поражением кожи, слизистых оболочек, ногтей, а иногда и внутренних органов.

CEPHALOSPÓRIUM — род микроорганизмов сем. Moniliaceae кл. несовершенных грибов, характеризующийся эллиптическими конидиями, склеивающимися слизью и образующими «головку»; возбудитель цефалоспориоза у человека.

ЦЕФАЛОТОМИ́Я (cephalotomia; *цефало-* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Краниотомия.*

ЦЕФАЛОТОРАКОПА́Г (cephalothoracopagus; *цефало-* + греч. thōrax, thōrakos грудь, грудная клетка + pagos прикрепленный) — сращенные близнецы, соединенные в областях головы и груди.

ЦЕ́ФАЛОЦЕ́ЛЕ (cephalocele; *цефало-* + греч. kēlē выбухание, вздутие) — черепно-мозговая грыжа, содержанием к-рой является вещество мозга и (или) его оболочки.

ЦИАН- (циано-; греч. kyanos темно-синий) — составная часть сложных слов, означающая: «синюшный», «имеющий темно-синюю окраску».

ЦИАНИ́ДЫ — соли цианистоводородной (синильной) кислоты, ядовитые (как и сама кислота) для человека; блокируют многие ферменты, нарушая тканевое дыхание.

ЦИАНО- — см. *Циан-.*

ЦИАНОДЕРМИ́Я (cyanodermia; *циано-* + греч. derma кожа; син. дисгематоз) — цианоз кожи; термин употребляется редко.

ЦИАНО́З (cyanosis; *циан-* + *-оз*) — синюшный оттенок кожи и слизистых оболочек, обусловленный недостаточным насыщением крови кислородом.

ЦИАНОКОБАЛАМИ́Н (син.: антианемический фактор — устар., витамин B_{12}, Касла внешний фактор, протеинцианкобаламин) — водорастворимый витамин, содержащийся гл. обр. в печени, почках, яйцах, сое; участвует в биосинтезе метионина и нуклеиновых кислот, в углеводном и жировом обмене; недостаточность Ц. приводит к пернициозной анемии и фуникулярному миелозу.

ЦИАНОСПЕРМИ́Я (cyanospermia; *циано-* + греч. sperma семя, сперма) — фиолетовая окраска спермы; наблюдается, напр., после хромоцистоскопии с индигокармином.

ЦИАНОТИ́ЧЕСКАЯ МА́СКА (син. экхимотическая маска) — диффузная припухлость и резкий цианоз кожных покровов с множественными экхимозами, не исчезающими при надавливании пальцем; развивается на голове, шее и верхней части грудной клетки при ее сдавлении.

ЦИАНОТИ́ЧНЫЙ (греч. kyanos темно-синий) — синюшный, характеризующийся цианозом.

ЦИАНУРИ́Я (cyanuria; *циан-* + греч. uron моча) — синяя или фиолетовая окраска мочи; наблюдается, напр., после хромоцистоскопии с индигокармином.

ЦИ́ЕНА ТОРСИО́ННЫЙ НЕВРО́З (G. Th. Ziehen, род. в 1862 г., нем. невропатолог и психиатр) — см. *Дистония торсионная.*

ЦИКЛ РАЗВИ́ТИЯ — совокупность всех последовательно сменяющих друг друга стадий в онтогенезе организма.

ЦИКЛ ТРИКАРБО́НОВЫХ КИСЛО́Т (син.: Кребса цикл, лимоннокислый цикл) — совокупность ферментативных реакций, приводящих к полному окислению активированной уксусной кислоты до воды и двуокиси углерода, чем завершается распад углеводов, жиров и белков в живом организме; сопровождается накоплением энергии в макрэргических соединениях.

ЦИКЛ- — см. *Цикло-.*

ЦИКЛИ́Т (cyclitis; *цикл-* + *-ит*) — воспаление ресничного тела глаза.

ЦИКЛИ́ЧНОСТЬ ЭПИДЕМИ́ЧЕСКОГО ПРОЦЕ́ССА — закономерное че-

редование периодов подъема и спада уровня заболеваемости; Ц. э. п. присуща преимущественно инфекционным болезням с воздушно-капельным путем передачи возбудителя и обусловлена колебаниями величины иммунной прослойки среди населения.

ЦИКЛО- (цикл-; греч. kyklos круг, цикл; нечто, имеющее округлую форму; глаз) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «круг», «цикл»; 2) «глазное яблоко», «ресничное тело».

ЦИКЛОГЕКСИМИ́Д — см. *Актидион.*

ЦИКЛОГОНИОТОМИ́Я (cyclogoniotomia; *цикло-* + греч. gōnia угол + tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: рассечение радужно-роговичного угла передней камеры глаза в области трабекулярной сети (кзади от склеральной шпоры) с одновременным отслаиванием ресничного тела от склеры с целью создания искусственного сообщения между передней камерой и околососудистым (супрахориоидальным) пространством; предложена для лечения глаукомы.

ЦИКЛОГРА́ММА (*цикло-* + греч. gramma запись, изображение) — изображение одного или нескольких циклов нек-рого движения, полученное методом циклографии.

ЦИКЛОГРАММЕТРИ́Я (*циклограмма* + греч. metreō измерять) — измерение параметров циклограммы с целью определения скоростей и ускорений точек и частей тела в различные фазы движения.

ЦИКЛОГРАФИ́Я (*цикло-* + греч. graphō писать, изображать) — метод исследования циклических движений, заключающийся в регистрации траекторий перемещения характерных точек тела за один или несколько циклов движения.

ЦИКЛОДИА́ЛИЗ (cyclodialysis; *цикло-* + греч. dialysis отделение) — хирургическая операция: отслаивание ресничного тела от склеры с целью создания искусственного сообщения между передней камерой глаза и околососудистым (супрахориоидальным) пространством; производится при глаукоме для улучшения оттока водянистой влаги.

ЦИКЛОДИАТЕРМИ́Я (cyclodiathermia; *цикло-* + *диатермия*) — диатермокоагуляция склеры в области ресничного тела; производится при глаукоме с целью уменьшения секреции водянистой влаги.

Ц. НЕПЕРФОРИ́РУЮЩАЯ — Ц., производимая при помощи тупоконечного круглого электрода без перфорации склеры.

Ц. ПЕРФОРИ́РУЮЩАЯ (син. циклодиатермопунктура) — Ц., производимая при помощи электрода в форме иглы и сочетающаяся с перфорацией склеры.

ЦИКЛОДИАТЕРМОПУНКТУ́РА (*циклодиатермия* + лат. pungo, punctum колоть) — см. *Циклодиатермия перфорирующая.*

ЦИКЛО́З (греч. kykloō кружить, вращать) — внутриклеточное движение цитоплазмы, происходящее без внешней деформации клетки.

ЦИКЛОИДИ́Я (cycloidia; греч. kykloeidēs кругообразный) — 1) аномалия личности, достигающая степени психопатии с чередованием фаз приподнятого и подавленного настроения и активности; 2) по Кречмеру — промежуточная ступень между циклотимическими вариантами характера и маниакально-депрессивным психозом.

ЦИКЛОКОАГУЛЯ́ЦИЯ ЛА́ЗЕРНАЯ (*цикло-* + *коагуляция*) — метод лечения гиперсекреторной формы глаукомы, заключающийся в воздействии излучением лазера на ресничное тело с целью уменьшения продукции водянистой влаги.

ЦИКЛОЛЕНТИКУЛЯ́РНЫЙ БЛОК (*цикло-* + анат. lens, lentis хрусталик) — нарушение оттока водянистой влаги, обусловленное смещением вперед ресничного тела и хрусталика.

ЦИКЛО́Н (греч. kyklōn вращающийся) в технике — аппарат для очистки воздуха или газов от аэрозолей посредством воздействия центробежной силы; применяется, напр., для пылеулавливания в системах очистки промышленных выбросов в атмосферу и в вентиляционных системах.

ЦИКЛОПЕНТАНПЕРГИДРОФЕНАНТРЕ́Н — органическое соединение, лежащее в основе строения молекул многих биологически и физиологически активных стероидов; состоит из конденсированной системы полностью гидрированного фенантрена и циклопентана.

ЦИКЛОПИ́Я (cyclopia; греч. Kyklōps одноглазый великан Циклоп; син. циклоцефалия) — аномалия развития: наличие только одного глаза, расположенного по средней линии лица.

ЦИКЛОПЛЕГИ́ЧЕСКИЙ ТЕСТ (*циклоплегия*) — определение рефракции глаза в условиях медикаментозного выключения его адаптации.

ЦИКЛОПЛЕГИ́Я (cycloplegia; *цикло-* + греч. plēgē удар, поражение) — см. *Паралич аккомодации.*

ЦИКЛО́ПЫ (Cyclopidae) — подотряд преимущественно пресноводных ракообразных отр. веслоногих (Copepoda), обитающих почти повсеместно; представители нек-рых родов (Cyclops Paracyclops, Mesocyclops и др.) являются промежуточными хозяевами широкого лентеца и других возбудителей дифиллоботриозов, а также ришты.

ЦИКЛОСЕРИ́Н (Cycloserinum) — антибиотик, продуцируемый Streptomyces orchidaceus или Streptomyces gorуphalus, обладающий широким спектром антибактериального действия.

ЦИКЛОСОМИ́Я (cyclosomia; *цикло-* + греч. sōma тело) — периодическое возникновение депрессивных фаз циклотимии или маниакально-депрессивного психоза с преобладанием расстройств, имитирующих какие-либо болезни внутренних органов.

ЦИКЛОСПА́ЗМ (cyclospasmus; *цикло-* + *спазм*) — см. *Спазм аккомодации.*

ЦИКЛОТИМИ́Я (cyclothymia; *цикло-* + греч. thymos настроение, чувство) — легкая форма маниакально-депрессивного психоза.

Ц. СОМАТИ́ЧЕСКАЯ — см. *Депрессия маскированная.*

ЦИКЛОТИМОПОДО́БНЫЕ РАССТРО́ЙСТВА — общее название субдепрессивных и гипоманиакальных состояний, возникающих изолированно или чередующихся; наблюдаются при вялом течении нек-рых психических болезней (шизофрении, эпилепсии, травматической энцефалопатии и др.).

ЦИКЛОФО́РИЯ (cyclophoria; *цикло-* + греч. phoros несущий) — гетерофория с тенденцией к повороту глазного яблока вокруг сагиттальной оси; в зависимости от направления поворота верхней части глаза различают инциклофорию (поворот кнутри) и эксциклофорию (поворот кнаружи).

ЦИКЛОФРЕ́НИЯ (cyclophrenia; *цикло-* + греч. phrēn душа, ум, разум) — см. *Психоз маниакально-депрессивный.*

ЦИКЛОЦЕФАЛИ́Я (cyclocephalia; *цикло-* + греч. kephalē голова) — см. *Циклопия.*

ЦИКЛОШПА́ТЕЛЬ (истор.; *цикло-* + *шпатель*) — инструмент в виде шпателя с изгибом, соответствующим окружности глазного яблока, применявшийся при циклодиализе.

ЦИКЛЭКТОМИ́Я (cyclectomia; *цикл-* + *эктомия*) — хирургическая операция: иссечение части ресничного тела; производится, как правило, при удалении злокачественной опухоли.

ЦИКУТОТОКСИ́Н — токсин, содержащийся в корневище ядовитого веха (Cicuta virosa) и вызывающий тяжелое отравление при употреблении корневища в пищу.

ЦИ́ЛЕРА ОЗНОБЛЁННАЯ ГРАНУЛЁМА (K. Zieler) — см. *Волчанка озноблённая.*

ЦИЛИА́РНОЕ ТЕ́ЛО (corpus ciliare; лат. cilium ресница) — см. *Ресничное тело.*

ЦИЛИА́РНЫЕ ОТРО́СТКИ — см. *Ресничные отростки.*

ЦИЛИА́РНЫЙ ВЕ́НЧИК — см. *Ресничный венчик.*

ЦИЛИА́РНЫЙ КРУЖО́К — см. *Ресничный кружок.*

ЦИЛИНДР- (цилиндро-; лат. cylindrus, от греч. kylindros цилиндр) — составная часть сложных слов, означающая «имеющий цилиндрическую форму».

ЦИЛИНДРО- — см. *Цилиндр-.*

ЦИЛИНДРО́ИД (*цилиндр-* + греч. -eidēs подобный) — слизистая нить, обнаруживаемая в осадке мочи, внешне напоминающая гиалиновый цилиндр, но не имеющая диагностического значения.

ЦИЛИНДРО́МА (cylindroma; *цилиндр-* + *-ома*) — злокачественная опухоль, исходящая из эпителия придатков кожи, слюнных, слизистых, слезных и молочных желез, характеризующаяся образованием цилиндрических структур и гиалинозом стромы.

ЦИЛИНДРО́МА КО́ЖИ (cylindroma cutis; син.: опухоль тюрбанная, Шпиглера опухоль) — доброкачественная опухоль, исходящая из эпителия потовых желез или фолликулов волос; локализуется преимущественно на волосистой части головы.

ЦИЛИНДРО́МА Я́ИЧНИКА (cylindroma ovarii) — см. *Опухоль гранулезоклеточная.*

ЦИЛИНДРОСКИАСКОПИ́Я (*цилиндро-* + *скиаскопия*) — метод исследования рефракции астигматического глаза, при к-ром скиаскопию сочетают с использованием сферических и цилиндрических линз.

ЦИЛИНДРУРИ́Я (cylindruria; *цилиндры* + греч. uron моча) — выделение цилиндров с мочой; значительная Ц. является признаком патологического процесса в паренхиме почки.

ЦИЛИ́НДРЫ мочевые (лат. cylindrus, от греч. kylindros цилиндр)—элементы осадка мочи, имеющие цилиндрическую форму и являющиеся «слепками» отдельных отрезков почечных канальцев.

Ц. ВОСКОВИ́ДНЫЕ — крупные, толстые слабо-желтоватые Ц. с поперечными линиями и раструбами; встречаются при тяжелых поражениях почек (напр., при некронефрозе).

Ц. ГЕМОГЛОБИ́НОВЫЕ — темноватые Ц., содержащие остатки гемоглобина; встречаются при гемоглобинурии.

Ц. ГИАЛИ́НОВЫЕ — нерезко очерченные, почти прозрачные Ц., содержащие значительное количество белка; могут встречаться в нормальной моче (за сутки не больше 20 000).

Ц. ЗЕРНИ́СТЫЕ — Ц., состоящие из распавшегося почечного эпителия, имеющие зернистую структуру, к-рая обусловлена наличием на их поверхности капель жира или частиц белка; встречаются при некронефрозе и липоидном нефрозе.

Ц. КРОВЯНЫЕ — Ц., состоящие из эритроцитов и их оболочек, наблюдающиеся в моче при гематурии.

Ц. ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЕ — Ц., состоящие из почечного эпителия; встречаются при нефропатиях, сопровождающихся значительным слущиванием эпителия.

ЦИ́ЛЯ — НЕ́ЛЬСЕНА ОКРА́СКА (F. Ziehl, 1857—1926, нем. бактериолог; F. K. A. Neelsen, 1854—1894, нем. патологоанатом) — метод окраски кислотоустойчивых микроорганизмов нагретым карболовым фуксином Циля с последующим обесцвечиванием серной кислотой и этиловым спиртом и докраской метиленовым синим.

ЦИ́ЛЯ ФУКСИ́Н (F. Ziehl, 1857—1926, нем. бактериолог) — раствор фуксина в карболовой кислоте, применяемый для окраски кислотоустойчивых микроорганизмов, напр. микобактерий туберкулеза.

ЦИМБОЦЕФАЛИ́Я (cymbocephalia; греч. kymbē чаша, лодка + kephalē голова) — аномалия развития: форма головы, резко вытянутая в сагиттальном направлении.

CIMEX LECTULÁRIUS (клоп постельный) — кровососущее бескрылое насекомое сем. Cimicidae, паразитирующее на человеке, грызунах, летучих мышах, птицах; клопы могут сохранять в себе возбудителей чумы, туляремии, сыпного и возвратного тифов, Ку-лихорадки и нек-рых других инфекционных болезней.

ЦИ́ММЕРМАННА СПО́СОБ (W. Zimmermann, род. в 1910 г., нем. бактериолог и химик) — метод определения 17-кетостероидов в моче, основанный на образовании веществ красно-фиолетового цвета при их взаимодействии с m-динитробензолом в щелочной среде.

ЦИНГА́ (scorbutus; син.: Барлоу болезнь, скорбут) — болезнь, обусловленная недостаточным поступлением с пищей витамина С или нарушением его всасывания; проявляется гингивитом, слабостью, кровоизлияниями в мышцы, суставы, подкожную клетчатку и внутренние органы.

ЦИНГА́ ЗВЕРОВА́Я — см. *Чинга.*

ЦИНГА́ МОРСКА́Я — см. *Чинга.*

ЦИНГУЛОТОМИ́Я (cingulotomia; анат. gyrus cinguli поясная извилина + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: разрушение определенных отделов поясной извилины большого мозга при нек-рых психопатологических состояниях или неукротимых болях.

ЦИНК (Zincum; Zn) — химический элемент II группы периодической системы Д. И. Менделеева; ат. номер 30, ат. масса 65,38; микроэлемент организма человека, входящий в состав инсулина, ряда ферментов и участвующий в процессах кроветворения.

ЦИНК РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название группы радиоактивных изотопов цинка с массовыми числами от 60 до 72 и периодом полураспада от $8{,}5 \cdot 10^{-6}$ сек. до 245 суток; отдельные изотопы применяются в радиоизотопной диагностике, гл. образом в качестве метки цинксодержащих ферментов.

ЦИ́НКОВАЯ ПРО́БА (син.: Кункеля проба, цинк-сульфатная проба) — коагуляционная проба, при к-рой в качестве коагулирующего фактора используют сульфат цинка.

ЦИНК-СУЛЬФА́ТНАЯ ПРО́БА — см. *Цинковая проба.*

ЦИ́ННОВА СВЯ́ЗКА (J. G. Zinn, 1727—1759, нем. анатом) — см. *Ресничный поясок.*

ЦИ́ННОВО КОЛЬЦО́ (J. G. Zinn) — см. *Сухожильное кольцо общее.*

ЦИ́ННОВО СОСУ́ДИСТОЕ КОЛЬЦО́ (J. G. Zinn) — см. *Сосудистое кольцо зрительного нерва.*

ЦИ́НССЕРА — КО́УЛА — ЭНГМЕ́НА СИНДРО́М (F. Zinsser, 1865—1952, нем. дерматолог; H. N. Cole, совр. амер. дерматолог; M. F. Engman, 1869—1953, амер. дерматолог) — см. *Дискератоз врожденный.*

ЦИРКО́НИЙ РАДИОАКТИ́ВНЫЙ — общее название группы радиоактивных изотопов циркония с массовыми числами от 86 до 99 и периодом полураспада от 30 сек. до $9{,}5 \cdot 10^5$ лет; нек-рые изотопы являются высокорадиотоксичными.

ЦИРКУЛОГРАФИ́Я (мед. лат. circulatio sanguinis кровообращение + греч. graphō писать, изображать) — см. *Радиоциркулография.*

ЦИ́РКУЛЬ СКОЛЬЗЯ́ЩИЙ — инструмент типа штангенциркуля для измерения небольших прямолинейных расстояний между антропометрическими точками на теле и скелете человека.

ЦИ́РКУЛЬ ТОЛСТО́ТНЫЙ БОЛЬШО́Й — инструмент для измерения поперечных размеров тела человека, представляющий собой две длинные изогнутые ножки, соединенные шарниром и снабженные дугообразной измерительной шкалой.

ЦИ́РКУЛЬ ТОЛСТО́ТНЫЙ МА́ЛЫЙ — инструмент для измерения размеров головы и черепа человека, отличающийся от большого толстотного циркуля только размерами.

ЦИ́РКУЛЬ-КА́ЛИПЕР — антропометрический прибор для измерения толщины подкожно-жировой складки, снабженный устройством, обеспечивающим стандартное усилие сдавливания складки.

ЦИРКУЛЯТО́РНЫЙ (circulatorius; мед. лат. circulatio sanguinis кровообращение) — относящийся к кровообращению.

ЦИРКУЛЯ́ЦИЯ ВОЗБУДИ́ТЕЛЯ — постоянная и последовательная передача возбудителя инфекционной болезни от одного восприимчивого организма другому, обеспечивающая существование возбудителя как биологического вида.

ЦИРКУЛЯ́ЦИЯ ПЕСТИЦИ́ДОВ — совокупность процессов распространения пестицидов из мест применения и их накопления в окружающей среде, а также процессов перемещения пестицидов отдельными факторами среды.

ЦИРКУМДУ́КЦИЯ (лат. circumductio кругообращение) — круговое движение части тела или органа (напр., конечности, глазного яблока).

ЦИРРО́З (cirrhosis; греч. kirrhos лимонно-желтый + *-оз*) — разрастание фиброзной ткани в паренхиматозном органе, сопровождающееся перестройкой его структуры и сморщиванием.

Ц. ЛЁГКОГО (с. pulmonis; син. пневмоцирроз) — Ц. ткани легкого, развивающийся при длительном воспалительном процессе; часто сопровождается формированием бронхоэктазов и эмфиземой.

Ц. ЛЁГКОГО МУ́СКУЛЬНЫЙ (с. pulmonis muscularis; син. Ц. легкого мускулярный) — Ц. л., при к-ром в прослойках фиброзной ткани содержатся пучки гипертрофированных гладкомышечных клеток.

Ц. ЛЁГКОГО МУСКУЛЯ́РНЫЙ — см. *Цирроз легкого мускульный.*

ЦИРРО́З ПЕ́ЧЕНИ (cirrhosis hepatis; син. цирроз печени истинный — устар.) — хроническая прогрессирующая болезнь, характеризующаяся дистрофией и некрозом печеночной паренхимы, сопровождающимися ее узловой регенерацией, диффузным разрастанием соединительной ткани и глубокой перестройкой архитектоники печени.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ АЛИМЕНТА́РНЫЙ (с. hepatis alimentaria) — Ц. п. развивающийся при недостаточном питании (гл. обр. при дефиците белков и витаминов) или при нарушении всасывания пищевых веществ в кишечнике.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ АЛКОГО́ЛЬНЫЙ (с. hepatis alcoholica) — Ц. п., развивающийся при хронической алкогольной интоксикации, обычно при ее сочетании с недостаточностью в питании белков и витаминов.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ АНО́ — см. *Цирроз печени билиарный.*

Ц. ПЕ́ЧЕНИ БИЛИА́РНЫЙ (с. hepatis biliaris; лат. bilis желчь; син.: Ано цирроз печени, Гано цирроз печени — нрк, цирроз печени холангиолитический) — Ц. п., обусловленный воспалительным процессом в желчных протоках и застоем желчи.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ БИЛИА́РНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ (с. hepatis biliaris congenita) — Ц. п. у новорожденного, развившийся в результате аномалии развития — атрезии внепеченочных желчных протоков.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ БРО́НЗОВЫЙ (с. hepatis bronzea) — Ц. п., развивающийся при нарушении обмена хромопротеидов с отложением в ткани печени больших количеств гемосидерина, липофусцина и меланина.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ГАНО́ — см. *Цирроз печени билиарный.*

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ДЕКОМПЕНСИ́РОВАННЫЙ (с. hepatis decompensata) — Ц. п. с выраженными клиническими признаками печеночной недостаточности.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ДИФФУ́ЗНЫЙ (с. hepatis diffusa) — Ц. п., морфологиче-

ски характеризующийся разрастанием соединительной ткани и диффузной перестройкой структуры всего органа.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ЖИ́РНЫЙ (с. hepatis adiposa; син. печень жирная) — Ц. п., морфологически характеризующийся диффузной жировой дистрофией гепатоцитов в сочетании с умеренным разрастанием соединительной ткани.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ИДИОПАТИ́ЧЕСКИЙ (с. hepatis idiopathica) — общее название Ц. п. не установленной этиологии.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ИСТИННЫЙ (устар.)— см. *Цирроз печени.*

Ц. ПЕ́ЧЕНИ КОМПЕНСИ́РОВАННЫЙ (с. hepatis compensata) — Ц. п., при к-ром отсутствуют выраженные клинические признаки печеночной недостаточности.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ КСАНТОМАТО́ЗНЫЙ (с. hepatis xanthomatotica) — см. *Таннхаузера цирроз печени.*

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ЛАЭННЕ́КА — см. *Цирроз печени портальный.*

Ц. ПЕ́ЧЕНИ МОНОЛОБА́РНЫЙ (с. hepatis monolobaris; греч. monos один + lobos доля) — Ц. п. с наличием морфологических изменений лишь в одной доле печени.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ОБМЕ́ННЫЙ (истор.; с. hepatis metabolica) — Ц. п., развившийся вследствие нарушений обмена веществ, напр. при болезнях накопления.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ПОРТА́ЛЬНЫЙ (с. hepatis portalis; син.: Лаэннека цирроз печени, Ц. печени септальный) — Ц. п., морфологически характеризующийся разрастанием вокруг печеночных долек фиброзных тяжей.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ПОСТГЕПАТИ́ТНЫЙ (с. hepatis post hepatitidem) — Ц. п., развившийся после перенесенного гепатита.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ПОСТИНФЕКЦИО́ННЫЙ (с. hepatis postinfectiosa) — Ц. п., развившийся в исходе какой-либо инфекционной болезни.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ПОСТНЕКРОТИ́ЧЕСКИЙ (с. hepatis postnecrotica) — Ц. п., развившийся в исходе массивного некроза паренхимы печени (чаще при вирусном гепатите); характеризуется разрастанием соединительной ткани в виде обширных участков («широких полей»).

Ц. ПЕ́ЧЕНИ СЕПТА́ЛЬНЫЙ (с. hepatis septalis) — см. *Цирроз печени портальный.*

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ТАННХА́УЗЕРА — см. *Таннхаузера цирроз печени.*

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ТО́КСИКО-АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ (с. hepatis toxicoallergica) — Ц. п., обусловленный воздействием на печень нек-рых химических веществ, в том числе лекарственных средств (напр., сульфаниламидов, аминазина, хлороформа), при индивидуальной повышенной чувствительности к ним.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ТОКСИ́ЧЕСКИЙ (с. hepatis toxica) — Ц. п., обусловленный острой или хронической интоксикацией, напр. при пищевом или профессиональном отравлении гепатотропными ядами.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ФЕТА́ЛЬНЫЙ (с. hepatis fetalis)— общее название Ц. п., развившихся у новорожденных во внутриутробном периоде.

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ХОЛАНГИОЛИТИ́ЧЕСКИЙ (с. hepatis cholangiolytica) — см. *Цирроз печени билиарный.*

Ц. ПЕ́ЧЕНИ ХОЛЕСТАТИ́ЧЕСКИЙ (с. hepatis cholestatica; греч. cholē желчь + statikos неподвижный) — Ц. п., развившийся в результате застоя желчи в желчных протоках и характеризующийся разрастанием соединительной ткани преимущественно вокруг них.

ЦИРРО́З ПЕ́ЧЕНИ ПЕРИКАРДИТИ́ЧЕСКИЙ ЛО́ЖНЫЙ (cirrhosis hepatis pericarditica spuria) — см. *Пика псевдоцирроз печени.*

ЦИРРО́З ПЕ́ЧЕНИ СЕРДЕ́ЧНЫЙ (cirrhosis hepatis cardiaca) — фиброз печени, развивающийся при недостаточности сердечной деятельности.

ЦИРРО́З ПИГМЕ́НТНЫЙ — см. *Гемохроматоз.*

ЦИРРО́З-РАК (cirrhosis-cancer) — рак печени, развившийся на фоне ее цирроза.

ЦИСГЕТЕРОГЕНО́ТА (лат. cis- приставка, означающая «по эту сторону» + *гетерогенота*) — сингенота, у к-рой доминантные аллели двух или нескольких локусов расположены только в эндогеноте или только в экзогеноте.

ЦИСГЕТЕРОЗИГО́ТА (лат. cis- приставка, означающая «по эту сторону» + *гетерозигота*) — гетерозигота по двум локусам, у к-рой рецессивные аллели расположены в одной из гомологичных хромосом, а доминантные — в другой.

ЦИС-КОНФИГУРА́ЦИЯ (лат. cis- приставка, означающая «по эту сторону» + конфигурация) — см. *Цис-положение.*

ЦИС-ПОЛОЖЕ́НИЕ (лат. cis- приставка, означающая «по эту сторону»; син. цис-конфигурация) в генетике — расположение тесно сцепленных рецессивных аллелей двух или нескольких локусов в одной из хромосом гомологичной пары, а доминантных — в другой.

ЦИСТ- (цисто-; греч. kystis пузырь, мешок, мочевой пузырь) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «относящийся к мочевому пузырю»; 2) «относящийся к кисте», «кистозный».

ЦИ́СТА (cysta; греч. kystis пузырь) — форма существования многих простейших в неблагоприятных условиях, характеризующаяся наличием плотной оболочки; паразитические виды в форме Ц. передаются через окружающую среду (простейшие кишечника) или переживают в тканях хозяина (токсоплазмы).

ЦИСТАДЕНОКАРЦИНО́МА (cystadenocarcinoma; *цист-* + *аденокарцинома*) — общее название злокачественных эпителиальных опухолей яичника, часто образующих кисты.

Ц. СЕРО́ЗНАЯ (с. serosum) — см. *Кистома яичника цилиоэпителиальная малигнизированная.*

Ц. ЭНДОМЕТРИО́ИДНАЯ (с. endometrioideum) — см. *Кистома яичника эндометриоидная малигнизированная.*

ЦИСТАДЕНО́МА (cystadenoma; *цист-* + *аденома*; син.: аденома кистозная, аденоцистома, кистаденома) — общее название доброкачественных эпителиальных опухолей яичника, часто образующих кисты.

Ц. КОЛЛО́ИДНАЯ (с. ovarii colloidale) — см. *Кистома яичника псевдомуцинозная сецернирующая.*

Ц. МЕЗОНЕФРО́ИДНАЯ СВЕТЛОКЛЕ́ТОЧНАЯ (с. mesonephroideum clarocellulare; син.: аденома мезонефроидная, кистома яичника мезонефроидная светлоклеточная) — Ц., развившаяся из остатков первичной почки.

Ц. МУКО́ИДНАЯ (с. mucoideum) — см. *Кистома яичника псевдомуцинозная сецернирующая.*

Ц. МУЦИНО́ЗНАЯ (с. mucinosum) — см. *Кистома яичника псевдомуцинозная сецернирующая.*

Ц. МУЦИНО́ЗНАЯ ПРОЛИФЕРИ́РУЮЩАЯ (с. mucinosum proliferans) — см. *Кистома яичника псевдомуцинозная пролиферирующая.*

Ц. ПАПИЛЛЯ́РНАЯ ЛИМФОМАТО́ЗНАЯ (с. papillare lymphomatosum) — см. *Аденолимфома.*

Ц. ПАПИЛЛЯ́РНАЯ ПРОЛИФЕРИ́РУЮЩАЯ СЕРО́ЗНАЯ (с. serosum proliferans papillare) — см. *Кистома яичника папиллярная пролиферирующая.*

Ц. ЭНДОМЕТРИО́ИДНАЯ (с. endometrioideum) — см. *Кистома яичника эндометриоидная.*

ЦИСТАДЕНОФИБРО́МА (cystadenofibroma; *цист-* + *аденофиброма*; син. цистофиброма) — доброкачественная опухоль яичников, состоящая из участков типа фибромы с кистозными полостями, выстланными одним из видов эпителия яичников.

ЦИСТАЛГИ́Я (cystalgia; *цист-* + греч. algos боль) — частые, болезненные мочеиспускания при отсутствии объективных признаков поражения мочевого пузыря.

ЦИСТАМИ́Н — продукт декарбоксилирования цистеина, входящий в состав кофермента А.

ЦИСТЕ́ИН — заменимая в питании человека моноаминомонокарбоновая, содержащая сульфгидрильные группы аминокислота, входящая в состав всех белков и глутатиона; в организме недоношенных детей биосинтез Ц. недостаточен.

ЦИСТЕИНДЕСУЛЬФГИДРА́ЗА — см. *Цистотионин-γ-лиаза.*

ЦИСТЕ́ЙНОВАЯ КИСЛОТА́ — промежуточный продукт окисления цистеина в процессе образования таурина.

ЦИСТЕ́РНА ПОДПАУТИ́ННАЯ (cisterna subarachnoidalis, PNA, BNA; cisterna leptomeningica, JNA) — общее название расширений подпаутинного пространства в бороздах и углублениях на основании головного мозга; выделяют цистерну боковой ямки большого мозга, цистерну перекреста, мозжечково-мозговую и межножковую цистерны.

ЦИСТЕ́РНА ЦИТОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКОЙ СЕ́ТИ — участок цитоплазмы, ограниченный внутриклеточными мембранами.

ЦИСТЕРНОГРАФИ́Я (*цистерна подпаутинная* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография подпаутинных цистерн после их контрастирования.

ЦИСТИ́Н — диаминодикарбоновая серосодержащая аминокислота, образующаяся в белке при окислении сульфгидрильных групп двух остатков цистеина с образованием дисульфидной связи, формирующей третичную структуру белковой молекулы.

ЦИСТИНДЕСУЛЬФГИДРА́ЗА — см. *Цистотионин-γ-лиаза.*

ЦИСТИНО́З (cystinosis; цистин + *-оз*; син.: Абдергальдена — Кауфмана — Линьяка синдром, Абдергальдена — Фанкони синдром, диабет гликофосфаминный, Линьяка синдром, Линьяка — Фанкони синдром) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена цистина с отложением его кристаллов в ретикулярных клетках костного мозга, печени, селезенки и лимфатической системы, а также в клетках роговицы и конъюнктивы; характеризуется задержкой роста, развитием рахитоподобных изменений в костях, нарушением зрения, аминоацидурией, глюкозурией, гипофосфатемией и анемией; наследуется по рецессивному типу.

ЦИСТИНУ́РИЯ (cystinuria; цистин + греч. uron моча) — 1) наследственная болезнь, обусловленная нарушением реабсорбции в почечных канальцах и повышенным выведением с мочой цистина, лизина, аргинина, орнитина; проявляется симптомами пиелита, пиелонефрита, мочекаменной болезни, гастрита, язвенной болезни и холепатий; наследуется по аутосомно-рецессивному типу; 2) повышенное содержание цистина в моче.

ЦИСТИ́Т (cystitis; *цист-* + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.

Ц. БИЛЬГАРЦИО́ЗНЫЙ (c. bilharziosa) — см. *Цистит шистосомозный.*

Ц. БУЛЛЁЗНЫЙ (c. bullosa) — Ц., характеризующийся выраженным отеком слизистой оболочки с образованием пузырей, содержащих серозную жидкость.

Ц. ГАНГРЕНО́ЗНЫЙ (c. gangraenosa) — острый Ц. с некрозом стенки мочевого пузыря.

Ц. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (c. haemorrhagica) — острый Ц. с кровоизлияниями в слизистую оболочку.

Ц. ГРАНУЛЯ́РНЫЙ (c. granularis) — хронический Ц., характеризующийся появлением множественных мелких инфильтратов в слизистой оболочке.

Ц. ДЕФЛОРАЦИО́ННЫЙ (c. deflorativa) — острый Ц., развившийся после дефлорации, сопровождавшейся травмой мочеиспускательного канала.

Ц. ИНВОЛЮЦИО́ННЫЙ (c. involutionalis) — хронический Ц., нередко развивающийся у женщин в климактерическом периоде.

Ц. ИНКРУСТИ́РУЮЩИЙ (c. incrustata) — см. *Цистит щелочной.*

Ц. КИСТО́ЗНЫЙ (c. cystica) — хронический Ц., характеризующийся образованием мелких кист в слизистой оболочке, окруженных зоной воспаления.

Ц. ЛУЧЕВО́Й (c. radialis) — Ц., обусловленный воздействием на мочевой пузырь ионизирующего излучения.

Ц. МЕМБРАНО́ЗНЫЙ (c. membranosa) — острый Ц., при к-ром от стенки мочевого пузыря отделяются пленки из некротизированных тканей.

Ц. МИКОТИ́ЧЕСКИЙ (c. mycotica) — Ц., вызванный паразитическими грибками.

Ц. О́СТРЫЙ (c. acuta) — остро развившийся Ц., проявляющийся частым, болезненным мочеиспусканием и пиурией.

Ц. ПРОЛИФЕРАТИ́ВНЫЙ (c. proliferativa) — хронический Ц. с разрастанием эпителия слизистой оболочки.

Ц. ПРОЛИФЕРАТИ́ВНЫЙ ПОЛИПО́ЗНЫЙ (c. proliferativa polyposa) — Ц. п., при к-ром разрастание слизистой оболочки происходит в виде полипов, расположенных чаще в области шейки мочевого пузыря.

Ц. ПСЕВДОМЕМБРАНО́ЗНЫЙ (c. pseudomembranosa) — острый Ц., при к-ром происходит некроз участков слизистой оболочки с образованием плотных фибринозно-некротических пленок, не отделяющихся от стенки мочевого пузыря.

Ц. ФИБРИНО́ЗНЫЙ (c. fibrinosa) — острый Ц., характеризующийся отложением фибрина на слизистой оболочке.

Ц. ФОЛЛИКУЛЯ́РНЫЙ (c. follicularis) — хронический Ц., характеризующийся образованием в слизистой оболочке множественных узелков, по гистологическому строению напоминающих лимфатические фолликулы.

Ц. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (c. chronica) — Ц., характеризующийся длительным рецидивирующим течением с дизурией и упорной пиурией.

Ц. ШЕ́ЕЧНЫЙ (c. cervicis; син. коллицистит — устар.) — Ц., при к-ром воспалительный процесс локализуется в области шейки мочевого пузыря.

Ц. ШИСТОСОМО́ЗНЫЙ (c. schistosomosa; син. Ц. бильгарциозный) — Ц., возникающий как одно из основных проявлений мочеполового шистосомоза, характеризующийся кровоизлияниями в слизистую оболочку, ее разрастанием и изъязвлением, а также наличием на ней скоплений яиц паразита, имеющих вид бугорков и пятен.

Ц. ЩЕЛОЧНО́Й (c. alcalina; син. Ц. инкрустирующий) — хронический Ц., характеризующийся отложением на слизистой оболочке фосфата кальция.

Ц. ЭМФИЗЕМАТО́ЗНЫЙ (c. emphysematosa) — Ц., характеризующийся образованием на слизистой оболочке и в подслизистом слое мочевого пузыря пузырьков, наполненных газом.

Ц. Я́ЗВЕННЫЙ (c. ulcerosa) — Ц., характеризующийся образованием язв на слизистой оболочке.

ЦИСТИЦЕ́РК — личинка цестод отр. Cyclophyllidea в виде пузыря с вывернутым внутрь сколексом; типичен для гельминтов родов Taenia и Taeniarhynchus.

ЦИСТИЦЕРКО́З (cysticercosis) — гельминтоз из группы цестодозов, вызываемый цистицерками свиного цепня (Taenia soleum), паразитирующими в различных органах (чаще в головном мозге и в глазу); клинические проявления Ц. зависят от локализации, количества и величины гельминтов; возможна аутореинвазия.

ЦИСТИЦЕРКО́ИД — личинка цестод отр. Cyclophyllidea, характеризующаяся наличием хвостовой части с эмбриональными крючьями; типичен для гельминтов рода Hymenolepis.

ЦИСТО- — см. *Цист-*.

ЦИСТОГРАФИ́Я (*цисто-* + греч. graphō писать, изображать; син. рентгеноцистография) — рентгенологическое исследование мочевого пузыря, заполненного контрастным веществом.

Ц. ВОСХОДЯ́ЩАЯ (син. Ц. ретроградная) — Ц., при к-рой контрастное вещество вводят в мочевой пузырь через катетер.

Ц. С ДВОЙНЫ́М КОНТРАСТИ́РОВАНИЕМ — Ц., при к-рой мочевой пузырь наполняют газом и водорастворимым контрастным веществом, что позволяет получить более четкое изображение рельефа внутренней поверхности пузыря.

Ц. КОМБИНИ́РОВАННАЯ — сочетание восходящей и нисходящей Ц.

Ц. ЛАКУНА́РНАЯ (лат. lacuna углубление, промежуток) — вариант Ц. с двойным контрастированием, при к-рой в мочевой пузырь сначала вводят небольшое количество водорастворимого контрастного вещества, а затем газ до появления у исследуемого ощущения растяжения мочевого пузыря.

Ц. МИКЦИО́ННАЯ (нрк) — см. *Цистоуретрография микционная.*

Ц. НИСХОДЯ́ЩАЯ (син. Ц. экскреторная) — Ц., при к-рой контрастное вещество поступает в мочевой пузырь с мочой из почек.

Ц. ОСА́ДОЧНАЯ (син. пневмоцистография осадочная) — вариант Ц., основанный на свойстве поверхности опухоли задерживать частицы сульфата бария и заключающийся во введении в полость пузыря сначала взвеси сульфата бария, а после опорожнения пузыря — газа.

Ц. РЕТРОГРА́ДНАЯ — см. *Цистография восходящая.*

Ц. ЭКСКРЕТО́РНАЯ — см. *Цистография нисходящая.*

ЦИСТО́ИДЫ мочеточника (cystoida ureteris; *цисто-* + греч. eidos вид) — участки мочеточника с наиболее выраженной способностью к перистальтике; различают верхний, средний и нижний Ц.

ЦИСТОИЛЕОПЛА́СТИКА (cystoileoplastica; *цисто-* + анат. ileum подвздошная кишка + *пластика*) — хирургическая операция: создание искусственного мочевого пузыря из изолированной петли тонкой кишки.

ЦИСТОКАРЦИНО́МА ЯИ́ЧНИКА ПСЕВДОМУЦИНО́ЗНАЯ (cystocarcinoma ovarii pseudomucinosum; *цисто-* + *карцинома*) — см. *Кистома яичника псевдомуцинозная малигнизированная.*

ЦИСТОКОЛОПЛА́СТИКА (cystocoloplastica; *цисто-* + греч. kolon толстая кишка + *пластика*) — хирургическая операция: создание искусственного мочевого пузыря из изолированной петли толстой кишки.

ЦИСТОЛИТИА́З (cystolithiasis; *цисто-* + греч. lithos камень + *-иаз*) — болезнь, характеризующаяся образованием конкрементов в мочевом пузыре.

ЦИСТОЛИТОТРИПСИ́Я (*цисто-* + *литотрипсия*) — камнедробление под контролем зрения, осуществляемое с помощью цистолитотриптора.

ЦИСТОЛИТОТРИПСИ́Я ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИ́ЧЕСКАЯ — камнедробление, основанное на применении электрогидравлического удара.

ЦИСТОЛИТОТРИ́ПТОР (*цисто-* + литотриптор; син.: литотриптор-цистоскоп, цистоскоп-литотриптор) — инструмент для дробления камней в мочевом

пузыре под контролем зрения, состоящий из цистоскопа и литотриптора.

ЦИСТО́МА (cystoma; *цист-* + *-ома*) — см. *Кистома.*

ЦИСТО́МЕТР (*цисто-* + греч. metreō измерять) — прибор для исследования тонуса и сократительной способности мышечной оболочки мочевого пузыря путем измерения внутрипузырного давления; представляет собой водяной манометр, соединенный при помощи трехходового крана с катетером, вводимым в мочевой пузырь.

ЦИСТОМЕТРИ́Я (*цисто-* + греч. metreō измерять) — исследование тонуса и сократительной способности мышечной стенки мочевого пузыря путем измерения гидростатического давления в нем с помощью манометра.

ЦИСТОМЕТРОГРА́ММА (*цистометрия* + греч. gramma запись, изображение) — кривая, отображающая изменения давления в полости мочевого пузыря, определяемые с помощью манометра.

ЦИСТОПЛА́СТИКА (cystoplastica; *цисто-* + *пластика*) — общее название пластических операций на мочевом пузыре.

ЦИСТОПЛЕГИ́Я (cystoplegia; *цисто-* + греч. plēgē удар, поражение) — паралич мускулатуры мочевого пузыря.

ЦИСТОПРОСТАТОВЕЗИКУЛЭКТО́МИЯ (cystoprostatovesiculectomia; *цисто-* + анат. prostata предстательная железа + vesicula seminalis семенной пузырек + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление нижней половины мочевого пузыря, предстательной железы и семенных пузырьков с последующей пересадкой мочеточников в оставшуюся часть мочевого пузыря; производится при раке шейки мочевого пузыря.

ЦИСТОПРОСТАТОГРАФИ́Я (*цисто-* + анат. prostata предстательная железа + греч. graphō писать, изображать) — рентгенография предстательной железы, производимая вместе с цистографией.

ЦИСТОСИГМОИДОСТОМИ́Я (истор.; cystosigmoidostomia; *цисто-* + анат. colon sigmoideum сигмовидная ободочная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: пересадка мочевого пузыря в сигмовидную кишку при экстрофии мочевого пузыря.

ЦИСТОСКО́П (*цисто-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — медицинский эндоскоп для исследования мочевого пузыря путем осмотра его полости, а также для проведения в ней диагностических и лечебных манипуляций под контролем зрения; вводится через мочеиспускательный канал.

Ц. ИРРИГАЦИО́ННО-ПРОМЫВНО́Й — см. *Цистоскоп эвакуационный.*

Ц. ИРРИГАЦИО́ННЫЙ — см. *Цистоскоп эвакуационный.*

Ц. КАТЕТЕРИЗАЦИО́ННЫЙ — Ц., имеющий специальный канал для мочеточникового катетера и приспособления для введения катетера в мочеточник и почечную лоханку.

Ц. ОПЕРАЦИО́ННЫЙ — Ц. для проведения внутрипузырных хирургических операций под контролем зрения; отличается большим диаметром канала для введения инструментов, управляемых снаружи.

Ц. ПРОМЫВНО́Й — см. *Цистоскоп эвакуационный.*

Ц. СМОТРОВО́Й — Ц., снабженный лишь оптической системой и не имеющий приспособлений для проведения диагностических и лечебных манипуляций в полости мочевого пузыря.

Ц. ЭВАКУАЦИО́ННЫЙ (устар.; син.: Ц. ирригационно-промывной, Ц. ирригационный, Ц. промывной) — Ц. с извлекающейся оптической системой, снабженный устройствами для промывания мочевого пузыря.

ЦИСТОСКО́П-ЛИТОТРИ́ПТОР — см. *Цистолитотриптор.*

ЦИСТОСКОПИ́Я (*цисто-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — метод исследования мочевого пузыря, заключающийся в осмотре его внутренней поверхности с помощью цистоскопа.

ЦИСТОСПА́ЗМ (cystospasmus; *цисто-* + *спазм*) — спазм гладкой мускулатуры мочевого пузыря.

ЦИСТОСТОМИ́Я (cystostomia; *цисто-* + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: создание наружного свища мочевого пузыря.

ЦИСТОТИОНИ́Н-γ-ЛИА́ЗА (син.: цистеиндесульфгидраза, цистиндесульфгидраза) — фермент класса лиаз (КФ 4.4.1.1), входящий в состав пиридоксальфосфата и катализирующий распад L-цистеина с образованием пировиноградной кислоты, аммиака и сероводорода, а также распад L-цистина с образованием тиоцистеина, пировиноградной кислоты и аммиака.

ЦИСТОТО́М (*цисто-* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Капсулотом.*

ЦИСТОТО́М ГРЕ́ФЕ — см. *Грефе цистотом.*

ЦИСТОТОМИ́Я (cystotomia; *цисто-* + греч. tomē разрез, рассечение; син. сечение мочевого пузыря) — хирургическая операция: вскрытие полости мочевого пузыря.

Ц. ВЛАГА́ЛИЩНАЯ (c. vaginalis) — Ц., производимая доступом через стенку влагалища.

Ц. ВЫСО́КАЯ (син.: sectio alta, эпицистотомия) — Ц. в области верхушки пузыря, производимая внебрюшинно через разрез передней брюшной стенки над лобком.

Ц. ПРОМЕ́ЖНОСТНАЯ (c. perinealis) — Ц., проводимая доступом через ткани промежности между мочеиспускательным каналом и прямой кишкой.

Ц. ЧРЕЗБРЮШИ́ННАЯ (c. transabdominalis) — Ц. в области верхушки и задней стенки мочевого пузыря, производимая доступом через брюшную полость.

ЦИСТОТРАХЕЛОГРАФИ́Я (*цисто-* + греч. trachēlos шейка + graphō писать, изображать) — одновременное рентгенологическое исследование мочевого пузыря и шейки матки, представляющее собой сочетание цистографии и метрографии.

ЦИСТОУРЕ́ТРОГРАФИ́Я (*цисто-* + анат. urēthra мочеиспускательный канал + греч. graphō писать, изображать; син. рентгеноцистоуретрография) — одновременное рентгенологическое исследование мочевого пузыря и мочеиспускательного канала после заполнения их контрастным веществом.

Ц. МИКЦИО́ННАЯ (лат. mictio мочеиспускание; цистография микционная — нрк) — Ц., при к-рой контрастное вещество поступает в мочеиспускательный канал из мочевого пузыря во время мочеиспускания.

ЦИСТОФИБРО́МА (cystofibroma; *цисто-* + *фиброма*) — см. *Цистаденофиброма.*

ЦИСТОЦЕ́ЛЕ (cystocele; *цисто-* + греч. kēlē выбухание, припухлость) — смещение вниз мочепузырного треугольника и шейки мочевого пузыря у женщин в результате опущения передней стенки влагалища.

ЦИС-ТРАНС-ЭФФЕ́КТ (лат. cis- приставка, означающая «по эту сторону» + trans- приставка, означающая «за пределами» + эффект) — различие фенотипических проявлений двух мутантных генов в зависимости от их расположения в одной и той же или в разных гомологичных хромосомах.

ЦИСТРО́Н — сегмент дезоксирибонуклеиновой или рибонуклеиновой кислоты, кодирующий синтез информационной или транспортной рибонуклеиновой кислоты.

ЦИСТРО́Н СТРУКТУ́РНЫЙ — см. *Ген структурный.*

ЦИСТЭКТОМИ́Я (cystectomia; *цист-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление мочевого пузыря.

ЦИТИДИ́Н — нуклеозид, состоящий из цитозина и рибозы; входит в состав нуклеиновых кислот и нуклеотидов.

ЦИТИДИНФОСФА́ТЫ — производные цитидина, содержащие от одного до трех остатков фосфорной кислоты; участвуют в биосинтезе фосфатидов.

ЦИТО- (гист. cytus клетка, от греч. kytos пустота, полость, сосуд, вместилище) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к клетке», «клеточный».

ЦИТО ГВОЗДЬ (Центральный институт травматологии и ортопедии) — приспособление для внутрикостного остеосинтеза при переломах бедра, представляющее собой полый металлический стержень, заостренный с обоих концов и имеющий небольшие отверстия на одном из них.

ЦИТО ШИ́НА ДЛЯ ТАЗОБЕ́ДРЕННОГО СУСТА́ВА — приспособление для лечения врожденных вывихов тазобедренного сустава у детей в возрасте от двух недель до одного года; представляет собой регулируемую по длине металлическую распорку, на концах которой имеются кожаные манжеты для укрепления шины под лодыжками ребенка.

ЦИТОАРХИТЕКТО́НИКА (*цито-* + *архитектоника*) — раздел архитектоники коры большого мозга, посвященный величине, форме и расположению ее клеток.

ЦИТОБЛАСТО́МА (cytoblastoma; *цито-* + *бластома*; син. меристома) — общее название опухолей, состоящих из малодифференцированных клеток неясного происхождения.

ЦИТО́ВИЧА О́ПЫТ (М. Ф. Цитович, 1869—1936, сов. оториноларинголог) — способ выявления анкилоза стремени: ножку звучащего камертона устанавливают на сосцевидном отростке, а зондом надавливают на латеральный отросток молоточка; ухудшение восприятия звука (Ц. о. положительный) свидетельствует об отсутствии анкилоза, а отсутствие ухудшения (Ц. о. отрицательный) — о наличии анкилоза стремени.

ЦИТОГЕНЕ́ТИКА (*цито-* + *генетика*) — раздел генетики, изучающий закономерности наследственности и изменчивости на уровне клетки и субклеточных структур (гл. обр. хромосом).

ЦИТОГОНИ́Я (*цито-* + греч. gonē поколение, потомство) — размножение клетки путем простого деления на две.
ЦИТОДИАГНО́СТИКА (*цито-* + *диагностика*) — см. *Диагностика цитологическая.*
ЦИТО́З (cytosis; *цито-* + *-оз*) — повышенное (в сравнении с нормой) содержание клеточных элементов в исследуемом объекте; термин обычно используется при описании состава цереброспинальной жидкости.
ЦИТОЗИ́Н — пиримидиновое основание, входящее в состав нуклеиновых кислот и нуклеотидов.
ЦИТОЛЕ́ММА (cytolemma; *цито-* + греч. lemma корка, оболочка) — см. *Клеточная оболочка.*
ЦИТО́ЛИЗ (cytolysis; *цито-* + греч. lysis разложение, растворение) — разрушение клеток.
ЦИТОЛИЗИ́НЫ — 1) вещества, вызывающие цитолиз; 2) в иммунологии — антитела к антигенам клеточной оболочки, вызывающие цитолиз в присутствии комплемента.
ЦИТОЛИЗОСО́МА (*цито-* + *лизосома*) — см. *Аутолизосома.*
ЦИТОЛО́ГИЯ (*цито-* + греч. logos учение, наука) — наука о строении, развитии и функциях животных и растительных клеток.
Ц. СРАВНИ́ТЕЛЬНАЯ — раздел Ц., изучающий особенности строения и функции клеток у различных представителей животных и растений.
ЦИТОМЕГАЛИ́Я (cytomegalia; *цито-* + греч. megas, megalu большой; син. болезнь инклюзионная) — инфекционная болезнь, вызываемая вирусом из группы герпеса, характеризующаяся преимущественным поражением слюнных желез с образованием в тканях гигантских клеток с внутриядерными включениями; встречается гл. обр. у детей грудного возраста.
Ц. ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННАЯ (c. generalisata) — Ц., при к-рой вслед за поражением слюнных желез патологические изменения возникают в почках, легких, печени, поджелудочной железе, щитовидной железе, в органах желудочно-кишечного тракта, надпочечниках, миокарде.
Ц. ЛОКАЛИЗО́ВАННАЯ (c. localisata) — Ц., при к-рой патологические изменения обнаруживают только в слюнных железах.
α-ЦИТОМЕМБРА́НА (*цито-* + *мембрана*; син. паравезикулярная мембрана) — мембрана, входящая в состав гранулярной эндоплазматической сети и связанная с рибосомами.
β-ЦИТОМЕМБРА́НА (метавезикулярная мембрана) — мембрана, входящая в состав агранулярной эндоплазматической сети, не связанная с рибосомами.
γ-ЦИТОМЕМБРА́НА (син. ортовезикулярная мембрана) — мембрана пластического комплекса (комплекса Гольджи), ограничивающая его цистерны, пузырьки и вакуоли.
ЦИТОМЕТРИ́Я (*цито-* + греч. metreō измерять, определять) — совокупность методов определения количества клеток, измерения объема клеток и их ядер.
ЦИТОМЕТРИ́Я СУБМИКРОСКОПИ́ЧЕСКАЯ — см. *Ультраструктурометрия.*
ЦИТОМИКО́З ДА́РЛИНГА (*цито-* + *микоз*) — см. *Гистоплазмоз.*
ЦИТОМИКО́З РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИА́ЛЬНЫЙ (*цито-* + *микоз*) — см. *Гистоплазмоз.*
ЦИТОМОРФОЛО́ГИЯ (*цито-* + *морфология*) — раздел цитологии, изучающий структуру клетки и ее компонентов.
ЦИТОПАТОЛО́ГИЯ (cytopathologia; *цито-* + *патология*) — раздел патоморфологии, изучающий течение патологических процессов на уровне клетки и ее компонентов.
ЦИТОПЕДИ́КУЛЫ (*цито-* + лат. pediculus ножка) — см. *Цитоподии.*
ЦИТОПЕНИ́Я (cytopenia; *цито-* + греч. penia бедность, недостаток) — уменьшенное по сравнению с нормой содержание клеток определенного вида в объекте исследования.
Ц. АУТОИММУ́ННАЯ (c. autoimmunis) — Ц., вызванная аутоиммунной реакцией по отношению к тем клеткам, дефицит которых наблюдается.
ЦИТОПЛА́ЗМА (cytoplasma; *цито-* + *плазма*) — протоплазма клетки, не входящая в состав ядра.
Ц. ОСНОВНА́Я — см. *Гиалоплазма.*
ЦИТОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКАЯ МЕМБРА́НА — см. *Клеточная оболочка.*
ЦИТОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКАЯ ОБОЛО́ЧКА — см. *Клеточная оболочка.*
ЦИТОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКАЯ СЕТЬ — см. *Эндоплазматическая сеть.*
ЦИТОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКИЙ МА́ТРИКС — см. *Гиалоплазма.*
ЦИТОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКИЙ ФА́КТОР (син. детерминанта цитоплазматическая) — общее название генетических структур, расположенных в цитоплазме.
ЦИТОПО́ДИИ (cytopodia, LNH; *цито-* + греч. pus, podos нога, ножка; син. цитопедикулы) — многочисленные мелкие отростки цитоплазмы, отходящие от цитотрабекул подоцитов, обнаруживаемые при электронной микроскопии.
ЦИТОСЕГРЕСО́МА (*цито-* + лат. segrego отделять, обособлять + греч. sōma тело) — см. *Аутолизосома.*
ЦИТОСПЕКТРОФОТОМЕТРИ́Я (*цито-* + *спектрофотометрия*; син.: фотоцитометрия, цитофотометрия) — метод изучения химического состава клеток, основанный на избирательном поглощении веществом, входящим в состав клетки, напр., гемоглобином света с определенной длиной волны.
ЦИТОСТА́ТИКИ (cytostatica; *цито-* + греч. statikos останавливающий) — см. *Цитостатические средства.*
ЦИТОСТАТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА (син. цитостатики) — лекарственные средства, подавляющие деление клеток; используются гл. обр. для лечения злокачественных опухолей.
ЦИТОСТО́М (*цито-* + греч. stoma рот, отверстие; син. рот клеточный) — участок клетки у нек-рых простейших, где происходит заглатывание пищи с образованием пищеварительной вакуоли.
ЦИТОТОКСИ́Н (*цито-* + *токсин*) — общее название веществ, токсичных для клеток.
ЦИТОТОКСИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА — лекарственные средства, вызывающие повреждения клеток вплоть до их гибели; используются гл. обр. для лечения злокачественных опухолей.
ЦИТОТОКСИ́ЧЕСКИЙ ТЕСТ — метод оценки повреждающего действия на культивируемые клетки каких-либо факторов (физических, химических, биологических), заключающийся в подсчете доли погибших клеток после дозированного воздействия повреждающего фактора.
ЦИТОТРАБЕ́КУЛЫ (cytotrabeculae, LNH; *цито-* + лат. trabecula небольшая балка) — широкие отростки цитоплазмы подоцитов.
ЦИТОТРОФОБЛА́СТ (cytotrophoblastus, LNH; *цито-* + *трофобласт*; син. Лангханса слой) — внутренний слой трофобласта, образованный базальным слоем клеток и клеточными колонками — зачатками новых ворсинок; играет роль камбия трофобласта, а во второй половине беременности вырабатывает хориальный гонадотропин.
ЦИТОФИЗИОЛО́ГИЯ (*цито-* + *физиология*) — раздел цитологии, изучающий физиологические функции клетки и ее компонентов.
ЦИТОФОТОМЕТРИ́Я (*цито-* + *фотометрия*) — см. *Цитоспектрофотометрия.*
ЦИТОХИ́МИЯ (*цито-* + *химия*) — раздел цитологии, изучающий химический состав клетки и ее компонентов, а также обменные процессы и химические реакции, к-рые лежат в основе жизнедеятельности клетки.
ЦИТОХО́ЛЕВАЯ РЕА́КЦИЯ — см. *Закса — Витебского реакция.*
ЦИТОХРОМОКСИДА́ЗА (син. Варбурга дыхательный фермент — устар.) — фермент класса оксидоредуктаз (КФ 1.9.3.1), содержащий железо и медь, катализирующий перенос электронов с цитохрома С на молекулярный кислород; участвует в процессах тканевого дыхания.
ЦИТОХРО́МЫ — протеиды, в состав которых в качестве небелкового компонента входят железосодержащие соединения, близкие по структуре к гему; в организме выполняют функцию переносчика электронов и (или) водорода от окисляемых веществ к молекулярному кислороду, тем самым участвуя в тканевом дыхании.
ЦИТОЭКОЛО́ГИЯ (*цито-* + *экология*) — раздел цитологии, изучающий закономерности адаптации клеток к условиям окружающей среды.
ЦИТРУЛЛИ́Н — аминокислота, являющаяся промежуточным продуктом биосинтеза аргинина и образования мочевины в организме; в состав белков не входит.
ЦИТРУЛЛИНУРИ́Я (citrullinuria; цитруллин + греч. uron моча) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена цитруллина; характеризуется задержкой психического развития, нарушением формирования костного скелета, гепатомегалией, гипотиреозом, атрофией головного мозга; наследуется по рецессивному типу.
CL_{50} — см. *Концентрация смертельная средняя.*
CL_{100} — см. *Концентрация смертельная абсолютная.*
ЦОВЬЯ́НОВА РУЧНО́Е ПОСО́БИЕ (Н. А. Цовьянов, 1882—1965, сов. акушер-гинеколог) — акушерский прием при чистом ягодичном предлежании плода, проводимый с целью предотвращения запрокидывания ручек в периоде изгнания; заключается в прижатии ножек плода к его животу и направлении туловища по оси родового канала.
ЦО́ЛЛИНГЕРА — ЭЛЛИСОНА СИНДРО́М (R. M. Zollinger, род. в 1903 г., амер. врач; E. H. Ellison, род.

в 1918 г., амер. врач) — см. *Золлингера — Эллисона синдром.*

ЦРБ — см. *Больница районная центральная.*

ЦУВЕРКА́ЛОВА ДИЗЕНТЕРИ́Н (Я. А. Цуверкалов, сов. иммунолог) — гидролизат дизентерийных бактерий Флекснера или Зонне, применяемый в качестве аллергена при диагностике дизентерии, преимущественно у детей.

ЦУ́ККЕРКАНДЛЯ ИЗВИ́ЛИНА (E. Zuckerkandl, 1849—1910, австрийский анатом) — см. *Извилина паратерминальная.*

ЦУ́ККЕРКАНДЛЯ О́РГАН (E. Zuckerkandl) — см. *Параганглий аортальный поясничный.*

ЦУ́МБУША БЕ́ЛЫЙ ЛИ́ХЕН — (L. R. Zumbusch, род. в 1874 г., австрийский дерматолог) — см. *Склеродермия каплевидная.*

ЦУР НЕ́ДДЕНА МЕ́ТОД (zur M. W. Nedden, нем. офтальмолог) — см. *Неддена метод.*

ЦУЦУГАМУ́ШИ (tsutsugamushi; син.: акамуши, лихорадка кедани, лихорадка клещевая индийская, лихорадка клещевая Суматры, лихорадка Пескадорских островов, лихорадка речная японская, лихорадка тсутсугамуши, лихорадка цуцугамуши, тиф джунглей, тиф клещевой тропический, тиф кустарниковый, тиф сельский, тсутсугамуши — нрк) — острая инфекционная природноочаговая болезнь из группы риккетсиозов, вызываемая Rickettsia tsutsugamushi; передается личинками краснотелковых клещей; характеризуется первичным аффектом, регионарным лимфаденитом, внезапным подъемом температуры тела и появлением к концу первой недели болезни генерализованной макулопапулезной кожной сыпи; встречается в Юго-Восточной Азии.

ЦЫПЛЯ́ЕВА МЕ́ТОД (истор.; П. И. Цыпляев; син. Цыпляева — Яновского метод) — бескровный метод определения венозного давления, основанный на сдавлении подкожной вены пелотом до прекращения в ней кровотока с последующим дозированным уменьшением давления пелота на вену до восстановления кровотока; величина давления пелота, при которой происходит восстановление кровотока, принимается за значение венозного давления.

ЦЫПЛЯ́ЕВА — ЯНО́ВСКОГО МЕ́ТОД — см. *Цыпляева метод.*

ЦЮ́ЛЬЦЕРА — О́ГДЕНА БОЛЕ́ЗНЬ (W. W. Zuelzer, род. в 1909 г., амер. педиатр; F. N. Ogden, совр. амер. врач) — гипохромная анемия у детей грудного возраста, обусловленная недостатком в питании цианокобаламина, фолиевой и аскорбиновой кислот; характеризуется геморрагическим диатезом, мегалобластической формой гемопоэза, гепатоспленомегалией.

Ч

ЧА́ДДОКА РЕФЛЕ́КС (Ch. G. Chaddok, 1861—1936, амер. невропатолог) — разгибание большого пальца стопы при штриховом раздражении кожи ниже наружной лодыжки; наблюдается при поражении пирамидных путей.

ЧА́КЛИНА АРТРОДЕ́З (В. Д. Чаклин, 1892—1976, сов. хирург-ортопед) — внесуставной артродез тазобедренного сустава аутотрансплантатом из большеберцовой кости, пересаженным одним концом в щель у основания большого вертела, а другим — в паз, сделанный в подвздошной кости над вертлужной впадиной.

ЧА́КЛИНА ИНТРАЭКСТРАМЕДУЛЛЯ́РНАЯ КО́СТНАЯ ПЛА́СТИКА (В. Д. Чаклин) — метод остеосинтеза при ложных суставах; заключается во вскрытии и расширении костномозговых полостей, введении в них длинного и массивного аутотрансплантата из коркового вещества кости, последующей фиксации кетгутом на наружной поверхности костных фрагментов второго аутотрансплантата, перекрывающего линию ложного сустава.

ЧА́КЛИНА ОПЕРА́ЦИЯ (В. Д. Чаклин) — 1) хирургическая операция, имеющая целью ограничение подвижности «болтающегося» коленного сустава после перенесенного полиомиелита; заключается в удалении хряща надколенника и пластинки кортикального слоя с передней поверхности эпифиза бедренной кости, отсечении сухожилия прямой мышцы бедра от надколенника и фиксации его на бедренной кости; 2) хирургическая операция для стабилизации позвоночника при сколиозе; заключается в пересадке костного трансплантата из большеберцовой кости в костное ложе между остистыми отростками и дугами позвонков на вогнутой стороне позвоночника и одновременном артродезе межпозвоночных сочленений с заполнением оставшихся зазоров костной стружкой; 3) хирургическая операция для стабилизации позвоночника при спондилолистезе; заключается в резекции тел V поясничного и I крестцового позвонков и внедрении костного аутотрансплантата в образовавшийся дефект.

ЧА́КЛИНА СИМПТО́М (В. Д. Чаклин) — 1) наличие мышечного валика вдоль выпуклой стороны дуги позвоночника при сколиозе, обусловленное торсией позвонков; 2) атрофия медиальной широкой мышцы бедра при повреждении медиального мениска коленного сустава.

ЧА́КЛИНА СПО́СОБ (В. Д. Чаклин) — способ вправления паралитического вывиха головки бедренной кости; заключается во вскрытии тазобедренного сустава, углублении вертлужной впадины и фиксации головки круглой связкой через отверстие в вертлужной впадине.

ЧА́ПЕКА СРЕДА́ (F. Czapek, 1868—1921, чешский ботаник) — жидкая или плотная синтетическая питательная среда для культивирования плесеней (Aspergillus и Penicillium).

ЧА́ПИНА — ЛИ́ПШЮТЦА О́СТРАЯ Я́ЗВА ВУ́ЛЬВЫ (Д. С. Чапин; B. Lipschütz, 1878—1931, австрийский дерматолог; син.: язва вульвы острая, язва псевдовенерическая) — острая болезнь женских наружных половых органов, обусловленная сенсибилизацией организма палочкой Дедерлейна и характеризующаяся образованием множественных гнойных язв на слизистой оболочке наружных половых органов.

ЧА́ПМЕНА — БЕ́РНСА СРЕДА́ (G. H. Chapman) — плотная дифференциально-диагностическая среда для выделения патогенных стафилококков, содержащая мясопептонный агар, кристалвиолет, лактозу и большое количество (7,5%) хлорида натрия.

ЧА́ПОДИ МЕ́ТОД (Csapody, венгерский офтальмолог 20 в.) — хирургическая операция: создание ложа для глазного протеза при полном заращении конъюнктивального мешка; заключается в трансплантации свободного кожного лоскута с помощью специального двустворчатого винта, фиксирующего и растягивающего трансплантат до образования полости требуемого размера.

ЧА́РЛИНА СИНДРО́М (C. Charlin, род. в 1886, г., чилийский офтальмолог; син.: синдром носового нерва, синдром носоресничного нерва) — сочетание приступов болей в медиальном углу глаза и медиальной половине носа с отеком, гиперестезией, гиперсекрецией конъюнктивы, глубокой инъекцией склер, иридоциклитом, кератитом и гипопионом; обусловлен поражением носоресничного нерва.

ЧА́РЛТОНА ФЕНО́МЕН (W. Charlton, род. в 1889 г., нем. врач) — см. *Феномен гашения сыпи.*

ЧАСОВЫ́Е СТЕ́КЛЫШКИ — см. *Гиппократа ноготь.*

α-ЧАСТИ́ЦА — см. *Альфа-частица.*

β-ЧАСТИ́ЦА — см. *Бета-частица.*

ЧАСТОТА́ ГЕ́НА (син. генная концентрация) — доля определенного аллеля среди всех аллелей данного гена в рассматриваемой популяции.

ЧАСТОТА́ ИНДУЦИ́РОВАННЫХ МУТА́ЦИЙ — частота мутаций, вызванных мутагеном.

ЧАСТОТА́ МУТА́ЦИЙ — 1) *при половом размножении* — доля гамет с вновь возникшими мутациями в общем количестве гамет одного поколения; 2) *при бесполом размножении* — доля клеток или особей с вновь возникшими мутациями в общем количестве клеток или особей того же поколения.

ЧАСТОТА́ ОБМЕ́НОВ (син. частота рекомбинаций) — относительная частота нарушений сцепления между аллелями разных генов одной хромосомы в результате кроссинговера; рассчитывается как отношение числа гамет с новой комбинацией генов к общему числу гамет.

ЧАСТОТА́ РЕКОМБИНА́ЦИЙ — см. *Частота обменов.*

ЧАСТОТА́ СПОНТА́ННЫХ МУТА́ЦИЙ — частота мутаций в обычных для данного биологического вида условиях обитания без видимого участия мутагенов.

ЧАСТОТА́ ХИА́ЗМ — среднее число хиазм, приходящихся на бивалент, клетку или кариотип при данных условиях.

ЧАХО́ТИНА МЕ́ТОД (С. С. Чахотин; син. ультрафиолетовый микроукол) — способ локального повреждения клетки путем воздействия тонким пучком ультрафиолетового излучения.

ЧАХО́ТКА КО́СТНОГО МО́ЗГА (устар.) — см. *Панмиелофтиз.*

ЧАХО́ТКА ЛЁГОЧНАЯ НЕСПЕЦИФИ́ЧЕСКАЯ (устар.) — общее название хронических воспалительных процессов в легких, характеризующихся волнообразным течением, бронхогенным распространением и выраженным пневмосклерозом; относят ныне к неспецифическим хроническим заболеваниям легких.

ЧАХО́ТКА ЧЁРНАЯ (устар.) — см. *Силикотуберкулез.*

ЧАЧА́ВЫ — ВАШАКИ́ДЗЕ ВА́КУУМ-ЭКСТРА́КТОР (К. В. Чачава, 1919—1979, сов. акушер-гинеколог; П. Д. Вашакидзе, сов. акушер-гинеколог) — аппарат для искусственного родоразрешения путем извлечения плода за головку; представляет собой соединенный с вакуум-насосом резиновый колпак воронкообразной формы, надеваемый на головку плода по ее периметру и присасывающийся к ней при создании под колпаком отрицательного давления, после чего производят тракцию.

ЧА́ККО МЕ́ТОД (С. Ciaccio, род. в 1877 г., итал. патолог) — метод выявления липидов в гистологических препаратах, при к-ром как в составе фиксирующей жидкости, так и при последующей обработке применяется раствор бихромата калия.

ЧА́ШЕЧНО-ВЕНО́ЗНЫЙ КАНА́Л — свищ между малой почечной чашечкой в области свода и веной; проявляется гематурией.

ЧЕДИА́КА — ХИГА́СИ СИНДРО́М (A. M. Chediak, совр. кубинский врач; O. Higashi, японский врач) — наследственная болезнь, характеризующаяся наличием включений в лейкоцитах в виде крупных гранул, нарушением их фагоцитарной функции с понижением резистентности организма к гнойной инфекции, полным или частичным альбинизмом, фотофобией, гипергидрозом, гепатоспленомегалией; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

ЧЕ́ЙНА — СТО́КСА ДЫХА́НИЕ (J. Cheyne, 1777—1836, шотл. врач; W. Stokes, 1804—1878, ирланд. врач) — дыхание, при к-ром поверхностные и редкие дыхательные движения постепенно учащаются и углубляются и, достигнув максимума, вновь ослабляются и урежаются, после чего наступает пауза; в норме нередко наблюдается у детей младшего возраста, иногда у взрослых во время сна; патологическое Ч.— С. д. возникает при повышенном внутричерепном давлении, сердечной недостаточности, нек-рых интоксикациях и пр.

ЧЕЛОВЕ́К (Homo sapiens) — высший представитель отряда приматов; общественное существо, способное производить и использовать орудия труда, обладающее сложно организованным мозгом, сознанием и членораздельной речью.

ЧЕЛОВЕ́К ИЗ БРО́КЕН-ХИ́ЛЛА — ископаемый человек, относящийся к палеоантропам.

ЧЕЛОВЕ́К ГЕЙДЕЛЬБЕ́РГСКИЙ (Homo heidelbergensis) — ископаемый человек, относящийся к архантропам.

«ЧЕЛОВЕ́К СТАНДА́РТНЫЙ» — совокупность средних величин антропометрических, анатомических и физиологических показателей, характеризующих человека, обычно конкретизированная для групп населения, выделенных по возрасту, полу и национальной принадлежности; применяется в гигиенической и эргономической практике.

ЧЕ́ЛЮСТНО-ЖЕВА́ТЕЛЬНАЯ О́БЛАСТЬ — см. *Подвисочная область.*

ЧЕ́ЛЮСТНО-ПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ БОРОЗДА́ (sulcus mylohyoideus, PNA, BNA, JNA) — линейное углубление на внутренней поверхности тела нижней челюсти; место прохождения сосудов и нервов.

ЧЕ́ЛЮСТНО-ПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ ВЕТВЬ (ramus mylohyoideus, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *482.*

ЧЕ́ЛЮСТЬ ВЕ́РХНЯЯ (maxilla, PNA, BNA, JNA; maxilla superior) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *81.*

ЧЕ́ЛЮСТЬ НИ́ЖНЯЯ (mandibula, PNA, BNA, JNA; maxilla inferior) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *80.*

ЧЕ́МБЕРЛЕНА СИМПТО́М (E. W. Chamberlain, 1892—1947, амер. рентгенолог) — рентгенологически обнаруживаемое смещение компонентов лонного сочленения при попеременном стоянии исследуемого то на правой, то на левой ноге; признак патологической подвижности крестцово-подвздошных суставов.

«ЧЕПЕ́Ц» — повязка из мягкого бинта, укрепляемая завязываемой на подбородке его полосой, под к-рую проходят все туры бинта, покрывающие волосистую часть головы.

ЧЕРВЕНЯ́НСКОГО БИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ЭНДОПРОТЕ́З (J. Červeňanský, чешский ортопед) — аутотрансплантат, приготовленный из проксимального конца малоберцовой кости, к-рый вводят в шейку и головку бедренной кости при ее несросшемся переломе.

ЧЕРВЕОБРА́ЗНЫЙ ОТРО́СТОК (processus vermiformis) — см. *Аппендикс.*

ЧЕ́РВИ — первичноротые беспозвоночные животные с вытянутым телом; представители нек-рых видов Ч. паразитируют у человека и животных.

ЧЕ́РВИ КРУ́ГЛЫЕ (Nemathelminthes; син. черви первичнополостные) — тип червей с округлым в поперечном сечении несегментированным телом, характеризующимся билатеральностью; наибольший класс Ч. к.— нематоды.

ЧЕ́РВИ ЛЕ́НТОЧНЫЕ — см. *Цестоды.*

ЧЕ́РВИ ПАРАЗИТИ́ЧЕСКИЕ — см. *Гельминты.*

ЧЕ́РВИ ПЕРВИЧНОПОЛОСТНЫ́Е — см. *Черви круглые.*

ЧЕ́РВИ ПЛО́СКИЕ (Plathelminthes) — тип червей с двусторонне-симметричным, сплющенным в дорсовентральном направлении телом; нек-рые представители Ч. п., напр. фасциолы, цепни, эхинококк, являются возбудителями гельминтозов человека и животных.

ЧЕ́РВИ ЯДОВИ́ТЫЕ — черви, продуцирующие ядовитые вещества, напр. свободноживущие морские аннелиды, имеющие ядовитые щетинки или снабженные ядовитыми крючьями, расположенными на челюсти.

ЧЕРВЬ МОЗЖЕ́ЧКА́ (vermis, PNA, BNA, JNA) — средняя, филогенетически древняя часть мозжечка, расположенная между его полушариями.

ЧЕ́РЕП (cranium, PNA, BNA, JNA) — скелет головы.

Ч. БАЗЕОПЕТА́ЛЬНЫЙ (анат. basis cranii основание черепа + лат. peto стремиться) — Ч., характеризующийся небольшой высотой и выраженным развитием заднего отдела основания.

Ч. БРАХИЦЕФАЛИ́ЧЕСКИЙ (с. brachycephalicum; греч. brachys короткий + kephalē голова) — широкий Ч., черепной индекс к-рого превышает 81.

Ч. ВИСЦЕРА́ЛЬНЫЙ (с. viscerale) — см. *Череп лицевой.*

Ч. ДОЛИХОЦЕФАЛИ́ЧЕСКИЙ (с. dolichocephalicum; греч. dolichos длинный + kephalē голова) — удлиненный Ч., черепной индекс к-рого не достигает 75.

Ч. КЛИНОЦЕФАЛИ́ЧЕСКИЙ (с. clinocephalicum; греч. klinō наклонять, сгибать + kephalē голова) — см. *Череп седловидный.*

Ч. КОСО́Й — Ч. с резко выраженной асимметрией мозгового отдела; образуется при неравномерном зарастании черепных швов.

Ч. КРАНИОСТЕНОТИ́ЧЕСКИЙ (греч. kranion череп + stenotēs узость) — равномерно суженный Ч. с уменьшенным объемом; образуется при раннем заращении всех или многих черепных швов.

Ч. ЛИЦЕВО́Й (с. viscerale, BNA; splanchnocranium; син.: спланхнокран, Ч. висцеральный) — отдел Ч., образующий костную основу лица; состоит из верхней и нижней челюстей, парных носовых, слезных, небных, скуловых костей и нижних раковин, непарного сошника, а также включает расположенную на шее подъязычную кость.

Ч. ЛАДЬЕВИ́ДНЫЙ (с. scaphocephalicum) — см. *Череп лодкообразный.*

Ч. ЛОДКООБРА́ЗНЫЙ (с. scaphocephalicum; син.: Ч. ладьевидный, Ч. скафоцефалический) — удлиненный узкий Ч.; образуется при раннем заращении сагиттального шва.

Ч. МЕЗОЦЕФАЛИ́ЧЕСКИЙ (с. mesocephalicum; греч. mesos средний, промежуточный + kephalē голова) — Ч., черепной индекс к-рого находится у мужчин в пределах от 76 до 80,9, у женщин — от 77 до 81,9.

Ч. МЕТОПИ́ЧЕСКИЙ — (с. metopicum; греч. metōpon лоб) — Ч. с несросшимся лобным швом.

Ч. МОЗГОВО́Й (с. cerebrale, BNA; neurocranium) — отдел Ч., образующий вместилище для головного мозга и нек-рых органов чувств; состоит из лобной, затылочной, решетчатой и парных теменных и височных костей.

Ч. ОКЦИПИТОПЕТА́ЛЬНЫЙ (с. occipitopetale; лат. occiput, occipitis затылок + peto стремиться) — Ч. с преимущественным развитием затылочного отдела.

Ч. ПАРИЕТОПЕТА́ЛЬНЫЙ (с. parietopetale; лат. paries, parietis стенка + peto стремиться) — Ч., характеризующийся большой высотой и слабым развитием заднего отдела основания.

Ч. СЕДЛОВИ́ДНЫЙ (с. clinocephalicum; син. Ч. клиноцефалический) — удлиненный Ч. с вдавлением в теменной области.

Ч. СКАФОЦЕФАЛИ́ЧЕСКИЙ (c. scaphocephalicum; греч. skaphē лодка + kephalē голова) — см. *Череп лодкообразный.*

Ч. ФРОНТИПЕТА́ЛЬНЫЙ (c. frontipetale; лат. frons, frontis лоб + peto стремиться) — Ч. с преимущественным развитием лобного отдела.

ЧЕ́РЕП БА́ШЕННЫЙ (turricephalia, acrocephalia) — см. *Акроцефалия.*

ЧЕ́РЕП РАСЩЕПЛЁННЫЙ (cranium bifidum) — см. *Краниосхизис.*

ЧЕРЕПНА́Я Я́МКА ЗА́ДНЯЯ (fossa cranii posterior, PNA, BNA, JNA) — часть внутреннего основания черепа, образованная затылочной костью, пирамидами височных костей и телом клиновидной кости; вмещает мозговой ствол и мозжечок.

ЧЕРЕПНА́Я Я́МКА ПЕРЕ́ДНЯЯ (fossa cranii anterior, PNA, BNA, JNA) — часть внутреннего основания черепа, образованная лобной, решетчатой и клиновидной костями; вмещает лобные доли полушарий большого мозга.

ЧЕРЕПНА́Я Я́МКА СРЕ́ДНЯЯ (fossa cranii media, PNA, BNA, JNA) — часть внутреннего основания черепа, образованная клиновидной и височными костями; в средней части Ч. я. с. (турецком седле) расположен гипофиз, а в парных боковых углублениях — нижние части височных долей полушарий большого мозга.

ЧЕРЕПНО́Й И́НДЕКС (син.: продольно-широтный индекс, черепной указатель) — антропологический показатель формы черепа, представляющий собой отношение его поперечного диаметра к продольному, умноженное на 100.

ЧЕРЕПНО́Й СВОД — см. *Свод черепа.*

ЧЕРЕПНО́Й УКАЗА́ТЕЛЬ — см. *Черепной индекс.*

ЧЕРЕПНЫ́Е (Cranialia) — см. *Позвоночные.*

ЧЕРКЕ́С-ЗАДЕ́ ШИ́НА (Д. И. Черкес-заде, род. в 1930 г., сов. хирург-травматолог) — устройство для лечения переломов плюсневых костей методом постоянного скелетного вытяжения, состоящее из стремени, укрепляемого в гипсовой повязке, к к-рому посредством пружин присоединены цапки, фиксирующие ногтевые фаланги.

ЧЕ́РМАКА ПУЧО́К (J. N. Czermak, 1828—1873, чешский врач и физиолог) — см. *Покрышечно-бульбарный путь.*

ЧЕ́РМАКА РЕФЛЕ́КС (J. N. Czermak) — физиологический рефлекс; замедление пульса на 8—10 ударов в 1 мин. при сдавлении шеи под нижней челюстью в местах прохождения блуждающих нервов.

ЧЕРНА́ВСКОГО МЕ́ТОД (В. А. Чернавский, сов. хирург) — метод пластики пяточного (ахиллова) сухожилия с помощью лоскута на ножке; лоскут выкраивают из апоневроза трехглавой мышцы, откинутого к пятке, и вшивают в расщепленный периферический конец пяточного сухожилия.

ЧЕ́РНИ ДО́СТУП (V. Czerny, 1842—1916, нем. хирург) — 1) косой поясничный разрез, служащий внебрюшинным доступом к почке; 2) поперечный разрез в правом подреберье, продолженный по средней линии до мечевидного отростка, служащий доступом к желчным путям.

ЧЕ́РНИ КИШЕ́ЧНЫЙ ШОВ (V. Czerny, 1842—1916, нем. хирург) — серозно-мышечный кишечный шов, при к-ром иглу вкалывают со стороны серозной оболочки кишки и выводят на раневой поверхности над слизистой оболочкой, а на противоположной стороне раны иглу проводят в обратном порядке, в результате чего при затягивании шва края раны соприкасаются серозными поверхностями.

ЧЕ́РНИ ОПЕРА́ЦИЯ (V. Czerny, 1842—1916, нем. хирург) — см. *Леопольда — Черни операция.*

ЧЕ́РНИ СИМПТО́М (A. Czerny, 1863—1941, нем. педиатр) — втягивание брюшной стенки и подъем диафрагмы на вдохе; наблюдается при малой хорее у детей.

ЧЕ́РНИ — КЛЕ́ЙНШМИДТА СМЕ́СИ (A. Czerny, 1863—1941, нем. педиатр; H. Kleinschmidt, род. в 1885, нем. педиатр) — молочные смеси для искусственного вскармливания детей грудного возраста, состоящие из коровьего молока, разведенного водой, с добавлением сливочного масла, муки и сахарного сиропа.

ЧЕРНОГУ́БОВА БОЛЕ́ЗНЬ (устар., Б. А. Черногубов, 1879—1957, сов. терапевт) — см. *Эндокардит септический подострый.*

ЧЕРНОГУ́БОВА МЕ́ТОД (Н. А. Черногубов, 1883—1942, сов. дерматовенеролог) — метод подготовки материала от больного (кусочки ногтей, чешуйки кожи) для микроскопического исследования на наличие паразитических грибков; заключается в измельчении материала, продолжительном кипячении в 10—30% растворе едкого кали и отделении осадка центрифугированием.

ЧЕРНОГУ́БОВА ХРОНИ́ЧЕСКАЯ ЯЗВЕННАЯ ВЕГЕТИ́РУЮЩАЯ ПИОДЕРМИ́Я (Н. А. Черногубов, 1883—1942, сов. дерматовенеролог) — см. *Пиодермия хроническая язвенная вегетирующая.*

ЧЕ́РНОЕ ВЕЩЕСТВО́ (substantia nigra, PNA, BNA; nncleus niger, JNA; син. Земмерринга вещество) — ядро экстрапирамидной системы, расположенное в ножке большого мозга; состоит из нервных клеток, содержащих меланин.

ЧЕРПАЛОНАДГОРТА́ННАЯ СКЛА́ДКА (plica aryepiglottica, PNA, BNA, JNA) — складка слизистой оболочки, соединяющая верхушку черпаловидного хряща с надгортанником и ограничивающая сбоку вход в гортань.

ЧЕСО́ТКА (scabies; син. Ч. зудневая) — дерматоз, вызываемый клещом Sarcoptes scabiei, паразитирующим в роговом слое кожи; проявляется расчесами, парными папуловезикулами, чесоточными ходами, ночным зудом в складках кожи, чаще между пальцами кистей рук.

ЧЕСО́ТКА ВОДЯНА́Я — см. *Анкилостомидозы кожи.*

ЧЕСО́ТКА ЗЕМЛЯНА́Я — см. *Анкилостомидозы кожи.*

ЧЕСО́ТКА ЗЕРНОВА́Я (scabies ventricosa; син.: чесотка матрацная, чесотка соломенная, чесотка ячменная) — дерматоз, вызываемый клещом Pediculoides ventricosus, характеризующийся зудящими уртикарно-везикулезными и эритематозно-папулезными высыпаниями и крупными пузырями, часто с мелкими везикулами на их поверхности.

ЧЕСО́ТКА ЗУДНЕВА́Я — см. *Чесотка.*

ЧЕСО́ТКА МАТРА́ЦНАЯ — см. *Чесотка зерновая.*

ЧЕСО́ТКА НИ́КЕЛЕВАЯ — профессиональный дерматоз рабочих, систематически контактирующих с растворами солей никеля; характеризуется возникновением на кистях и предплечьях (реже на лице и груди) зудящих папул над фолликулами волос и (или) пустул на фоне эритемы и отека.

ЧЕСО́ТКА НОРВЕ́ЖСКАЯ (scabies norvegica) — форма чесотки при пониженной реактивности организма, характеризующаяся толстыми плотными грязно-серыми чешуйками, отсутствием зуда; иногда наблюдается полиморфная сыпь или эритродермия.

ЧЕСО́ТКА СОЛО́МЕННАЯ — см. *Чесотка зерновая.*

ЧЕСО́ТКА ЯЧМЕ́ННАЯ — см. *Чесотка зерновая.*

ЧЕСО́ТОЧНЫЕ ХОДЫ́ — извилистые ходы в роговом слое кожи, проделанные самками чесоточных клещей.

ЧЕТВЕРОХО́ЛМИЕ — см. *Пластинка крыши.*

ЧЕТЫРЁХУГО́ЛЬНАЯ МЕМБРА́НА (membrana quadrangularis; PNA) — верхняя часть фиброзно-эластической мембраны гортани, представляющая собой соединительнотканную пластинку, прикрепляющуюся вверху к латеральной поверхности надгортанника, спереди — к щитовидному хрящу, сзади — к рожковидному и черпаловидному хрящам; свободный нижний край Ч. м. образует связку преддверья.

ЧЕЧЕВИЦЕОБРА́ЗНАЯ ПЕ́ТЛЯ (ansa lenticularis, PNA, BNA, JNA) — изогнутый пучок нервных волокон, выходящий гл. обр. из бледного шара, соединяющий полосатое тело с ядрами гипоталамуса, красным ядром и ретикулярной формацией среднего мозга.

ЧЕ́ЧИ АМПУТА́ЦИЯ (A. Ceci, 1852—1920, итал. хирург) — высокая ампутация плеча, при к-рой на конце культи создают мышечную петлю из сгибателей и разгибателей с целью последующей кинематизации культи.

ЧЕШУ́ЙКА (squama) — вторичный морфологический элемент кожных сыпей в виде тонкой роговой пластинки; возникает вследствие пара- или гиперкератоза.

ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ-ТЕРАПИ́Я — см. *Иглоукалывание.*

ЧИ́ВЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (D. Cheever, род. в 1876 г., амер. хирург) — хирургическая операция: удаление небных миндалин доступом со стороны шеи.

ЧИВИНИ́НИЕВ ОТРО́СТОК (F. Civinini, 1805—1854, итал. анатом) — см. *Крылоостистый отросток.*

ЧИГУАТЕ́РА — см. *Сигватера.*

ЧИЖА́ СИМПТО́М (В. Ф. Чиж, 1855—1914, отеч. психиатр) — серосвинцовый блеск глаз при эпилепсии.

ЧИКУНГУ́НЬЯ (син. лихорадка Чикунгунья) — острая инфекционная болезнь из группы тропических комариных лихорадок, вызываемая одноименным арбовирусом группы «А»; характеризуется сильнейшими болями в суставах, двухволновой лихорадкой с появлением на ее второй волне макулопапулезной сыпи.

CHILBLAIN LUPUS (англ. chilblain ознобление + мед. лат. lupus волчанка) — см. *Гетчинсона ознобленная волчанка.*

ЧИ́ЛЛАГА БОЛЕ́ЗНЬ (J. Csillag) — см. *Склеродермия каплевидная.*

ЧИ́НГА (син.: цинга зверовая, цинга морская) — инфекционный хронический моноартрит пальцев рук, возникающий у жителей побережья Белого и Баренцева морей, занимающихся добычей тюленей и других ластоногих; вызывается диплококком, проникающим через поврежденную кожу; характеризуется постепенным развитием анкилоза и контрактуры при общем удовлетворительном состоянии.

ЧИНЬОЛИ́НИ МНОГОЩЕЛЕВО́Й РЕНТГЕНОКИМО́ГРАФ (истор.; P. Cignolini, итал. рентгенолог) — устройство для рентгенокимографии сердца, в к-ром была применена свинцовая решетка, имевшая 11 щелей, установленных на разных уровнях сердечно-сосудистого контура справа и слева; не получил распространения.

ЧИСЛО́ ГЕЛЬМИНТО́ЗНЫХ ЕДИНИ́Ц — показатель пораженности популяции гельминтами, представляющий собой общее количество инвазий в данной группе людей или животных, причем инвазии одного человека (животного) разными гельминтами учитываются отдельно; поэтому Ч. г. е. обычно больше числа инвазированных людей (особей).

ЧИСЛО́ ОМЫЛЕ́НИЯ — показатель качества жиров, представляющий собой количество едкого кали (*мл*), необходимое для нейтрализации всех кислот, содержащихся в 1 *г* исследуемого жира.

ЧИСТО́ВИЧА — ЮРЕ́ВИЧА АНТИФАГИ́НЫ (Н. Я. Чистович, 1860—1926, сов. терапевт; В. А. Юревич, род. в 1872 г.) — термостабильные вещества в смывах агаровых культур, защищающих патогенные бактерии от фагоцитоза.

ЧИСТЯКО́ВОЙ МЕ́ТОД (А. П. Чистякова) — способ наложения стерильной повязки на культю пуповины новорожденного с помощью треугольной косынки.

ЧИТЕ́ЛЛИ АБСЦЕ́СС (S. Citelli, 1875—1947, итал. оториноларинголог; син. Чителли мастоидит) — глубокий натечный абсцесс шеи, образующийся как осложнение мастоидита вследствие прорыва гноя из перисинуозного абсцесса.

ЧИТЕ́ЛЛИ МАСТОИДИ́Т (S. Citelli) — см. *Чителли абсцесс.*

ЧИХА́НЬЕ (sternutatio) — рефлекторный толчкообразный форсированный выдох через нос, вызываемый раздражением слизистой оболочки носа, особенно средней носовой раковины и перегородки; частый признак ринита.

ЧЛЕНИСТОНО́ГИЕ (Arthropoda) — тип беспозвоночных животных, передвигающихся с помощью конечностей, подразделенных на подвижно соединенные с телом и друг с другом членики; к Ч. относятся переносчики и возбудители болезней человека из классов насекомых, паукообразных и ракообразных.

ЧЛЕ́НОВА ДОРСА́ЛЬНЫЙ РЕФЛЕ́КС АДДУ́КТОРОВ (Л. Г. Членов, 1895—1959, сов. невропатолог) — см. *Рефлекс аддукторный дорсальный.*

ЧЛЕ́НОВА — МАК-КА́РТИ РЕФЛЕ́КС (Л. Г. Членов, 1895—1959, сов. невропатолог; D. J. McCarthy, амер. невропатолог) — см. *Рефлекс аддукторный дорсальный.*

ЧЛЕНОВРЕДИ́ТЕЛЬСТВО — умышленное причинение вреда своему здоровью с целью уклонения от выполнения определенных обязанностей.

ЧО́ПРЫ — ГУ́ПТЫ ПРО́БА (R. Chopra, род. в 1882 г., индийский врач и фармаколог; J. C. Gupta, индийский врач) — см. *Суръмовая проба.*

ЧРЕ́ВНАЯ О́БЛАСТЬ (regio mesogastrica) — см. *Чревье.*

ЧРЕ́ВНЫЙ СТВОЛ (truncus celiacus, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *154.*

ЧРЕВОВЕЩА́НИЕ (ventriloquio) — речеобразование при неподвижных губах с помощью незаметных для глаза артикуляционных движений органов полости рта.

ЧРЕВОСЕЧЕ́НИЕ (laparotomia) — см. *Лапаротомия.*

Ч. ВНЕБРЮШИ́ННОЕ ПО ПИРОГО́ВУ — см. *Пирогова внебрюшинное чревосечение.*

Ч. НАРУ́ЖНОЕ (l. externa) — см. *Пирогова внебрюшинное чревосечение.*

ЧРЕ́ВЬЕ (mesogastrium, PNA; regio mesogastrica, BNA; regio abdominis media, JNA; син.: мезогастрий, чревная область) — область живота, расположенная между линией, соединяющей наиболее низкие точки X ребер, и линией, соединяющей передневерхние подвздошные ости.

ЧРЕСПРИВРА́ТНИКОВАЯ ПЛО́СКОСТЬ (planum transpyloricum, PNA; син. транспилорическая плоскость) — горизонтальная плоскость, равноудаленная от яремной вырезки грудины и лобкового симфиза; соответствует остистому отростку I поясничного позвонка и, нередко, привратнику желудка.

ЧТЕ́НИЕ С ГУБ — зрительное восприятие речи по движениям губ; используется глухими и страдающими тугоухостью как способ общения.

ЧУВСТВИ́ТЕЛЬНАЯ ПЕ́ТЛЯ (lemniscus sensitivus, BNA) — см. *Медиальная петля.*

ЧУВСТВИ́ТЕЛЬНОСТЬ[1] (sensibilitas) — способность организма воспринимать раздражения, исходящие из окружающей среды или от собственных тканей и органов.

Ч. БОЛЕВА́Я (s. dolorosa; син. Ч. ноцицептивная) — Ч., при к-рой повреждающее раздражение вызывает ощущение боли.

Ч. ВИБРАЦИО́ННАЯ — Ч. к низкочастотным колебаниям; разновидность проприоцептивной Ч.

Ч. ВИСЦЕРА́ЛЬНАЯ (s. visceralis) — Ч. к раздражениям, действующим на рецепторы внутренних органов.

Ч. ВКУСОВА́Я (s. gustatoria) — Ч. к химическому воздействию, реализующаяся возникновением ощущения вкуса воздействующего вещества.

Ч. ГЛУБО́КАЯ (s. profunda) — см. *Чувствительность проприоцептивная.*

Ч. ДИРЕКЦИО́ННАЯ — Ч. к нек-рым свойствам окружающей среды, реализующаяся пространственным ориентированием, выделением в ней определенного направления.

Ч. ДИСКРИМИНАЦИО́ННАЯ (s. discriminativa) — разновидность Ч., заключающаяся в способности различать два одновременных одинаковых раздражения различной локализации, напр. на различных участках кожи.

Ч. ДИФФЕРЕНЦИА́ЛЬНАЯ (s. differentialis; син. Ч. разностная) — разновидность Ч., заключающаяся в способности воспринимать изменение интенсивности раздражения.

Ч. ИНТЕРОЦЕПТИ́ВНАЯ (s. interoceptiva) — Ч. к раздражениям, исходящим из внутренних сред тканей и органов.

Ч. КО́ЖНАЯ (s. cutanea) — Ч. к раздражению различных (тактильных, температурных, болевых) рецепторов кожи.

Ч. НОЦИЦЕПТИ́ВНАЯ (s. nociceptiva) — см. *Чувствительность болевая.*

Ч. ОБОНЯ́ТЕЛЬНАЯ (s. olfactoria) — Ч. к химическому воздействию, реализующаяся возникновением запаха воздействующего вещества.

Ч. ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (s. superficialis) — см. *Чувствительность экстероцептивная.*

Ч. ПРОПРИОЦЕПТИ́ВНАЯ (s. proprioceptiva; син.: батиэстезия, чувствительность глубокая) — Ч. к раздражению мышц, сухожилий, связок и других элементов суставов.

Ч. ПРОТОПАТИ́ЧЕСКАЯ (s. protopathica; греч. prōtos первый, первичный + pathos чувство, страдание, болезнь) — филогенетически древний вид Ч., характеризующийся ограниченными возможностями дифференциации раздражений по их модальности, интенсивности и локализации.

Ч. РА́ЗНОСТНАЯ — см. *Чувствительность дифференциальная.*

Ч. СВЕТОВА́Я (s. visualis) — Ч. к воздействию видимого излучения.

Ч. СЛО́ЖНАЯ (s. composita) — Ч., основанная на интеграции деятельности рецепторов различной модальности.

Ч. СЛУХОВА́Я (s. auditiva) — Ч. к воздействию звука.

Ч. ТЕМПЕРАТУ́РНАЯ (s. thermaesthetica) — Ч. к изменению температуры окружающей среды.

Ч. ЭКСТЕРОЦЕПТИ́ВНАЯ (s. exteroceptiva; син. Ч. поверхностная) — Ч. к раздражениям, исходящим из окружающей среды.

Ч. ЭЛЕКТРОКО́ЖНАЯ (s. electrocutanea) — разновидность кожной Ч., заключающаяся в способности воспринимать раздражение при воздействии электрическим током.

Ч. ЭПИКРИТИ́ЧЕСКАЯ (s. epicritica, греч. epicrisis решение, суждение) — филогенетически новый вид Ч., обеспечивающий возможность количественной и качественной дифференцировки раздражений (по модальности, интенсивности, локализации).

ЧУВСТВИ́ТЕЛЬНОСТЬ[2] в фармакологии — способность организма, его систем, органов или тканей реагировать на воздействие данного лекарственного средства.

ЧУ́ВСТВО БЕСПРЕДМЕ́ТНОЕ в психиатрии — общее название аффективных состояний (страх, внутреннее беспокойство, тревога, тоска, веселость, счастье и др.), возникающих у психически больного без причинной связи с ситуацией и не имеющих определенного содержания.

ЧУ́ВСТВО ЛОКАЛИЗА́ЦИИ (син. топестезия) — разновидность чувствительности, заключающаяся в способности определять место раздражения.
ЧУ́ВСТВО МЫ́ШЕЧНОЕ — см. *Кинестезия.*
ЧУ́ВСТВО МЫ́ШЕЧНО-СУСТА́ВНО́Е — см. *Кинестезия.*
ЧУ́ВСТВО НЕПОЛНОЦЕ́ННОСТИ в психиатрии — переживание психически больным своей физической, интеллектуальной или моральной неполноценности, имеющее характер навязчивого состояния, сверхценных идей, депрессии и (или) бреда.
ЧУ́ВСТВО О́БЩЕЕ — см. *Койнестезия.*
ЧУ́ВСТВО ПРОСТРА́НСТВЕННОЕ — разновидность чувствительности, заключающаяся в способности определять местонахождение источника раздражения в пространстве.
ЧУ́ВСТВО «Я» — см. *Сознание идентичности «Я».*
ЧУГА́ЕВА ПРО́БА (Л. А. Чугаев, 1873—1922, отеч. химик; син. Чугаева реакция) — 1) метод обнаружения ионов никеля по выпадению ярко-розового осадка при его взаимодействии с диметилглиоксимом и аммиаком; 2) метод обнаружения холестерина по появлению малиновой окраски при его взаимодействии с бензолом и хлористым цинком.
ЧУГА́ЕВА РЕА́КЦИЯ (Л. А. Чугаев) — см. *Чугаева проба.*
ЧУДЕ́СНАЯ СЕТЬ (retc mirabile, PNA, BNA, JNA) — сеть капилляров, начинающаяся из артерии и впадающая в артерию (напр., в почке) или начинающаяся из вены и впадающая в вену (напр., в печени).
ЧУДО́ВСКОГО МОДИФИКА́ЦИЯ ДЕКАПИТА́ЦИИ (В. А. Чудовский, отеч. акушер-гинеколог конца 19 века) — декапитация плода, производимая крючком Брауна, введенным под кожу через разрез на шее.
ЧУМА́ (pestis) — инфекционная природно-очаговая болезнь из группы бактериальных зоонозов, вызываемая Yersinia pestis; передается человеку контактным, воздушно-капельным и алиментарным путем, а также переносчиками — блохами; отнесена к карантинным инфекциям.
Ч. БУБО́ННАЯ (p. bubonica) — клиническая форма Ч., развивающаяся при проникновении возбудителя через кожу и характеризующаяся образованием резко болезненных бубонов, высокой лихорадкой и выраженной интоксикацией.
Ч. ВТОРИ́ЧНО-СЕПТИ́ЧЕСКАЯ (p. secundarioseptica) — клиническая форма Ч., развивающаяся при гематогенной генерализации процесса из первичного аффекта (бубона), наличие к-рого отличает данную форму от первично-септической Ч.
Ч. КО́ЖНО-БУБО́ННАЯ (p. cutaneobubonica) — клиническая форма Ч., сходная с бубонной Ч., но отличающаяся от нее образованием пустул, язв или карбункулов на коже в месте проникновения возбудителя.
Ч. ЛЁГОЧНАЯ ВТОРИ́ЧНАЯ (p. pulmonalis secundaria) — клиническая форма Ч., возникающая в результате гематогенного заноса возбудителя в легкие из первичного аффекта (бубона), характеризующаяся крайней тяжестью течения с развитием геморрагической пневмонии; представляет высокую опасность в эпидемиологическом отношении.
Ч. ЛЁГОЧНАЯ ПЕРВИ́ЧНАЯ (p. pulmonalis primaria) — клиническая форма Ч., возникающая при аспирационном пути заражения, характеризующаяся крайней тяжестью течения, быстрым развитием геморрагической пневмонии с резкой интоксикацией; представляет высокую опасность в эпидемиологическом отношении.
Ч. ПЕРВИ́ЧНО-СЕПТИ́ЧЕСКАЯ (p. primarioseptica) — клиническая форма Ч., развивающаяся при массивном заражении и малой сопротивляемости организма, характеризующаяся быстрой гематогенной генерализацией инфекции без местных явлений, тяжелой интоксикацией, выраженным геморрагическим синдромом, расстройствами ц. н. с. и сердечно-сосудистой системы.
ЧУМА́ МА́ЛАЯ — см. *Туляремия.*
ЧУРА́ЕВА РЕФЛЕ́КС — сгибание пальцев стопы при раздражении кожи подошвы в направлении от пятки к пальцам: признак поражения пирамидных путей.

III

ША́БЕР (нем. Schaber) в стоматологии — зуботехнический инструмент в виде небольшого напильника с расширенной рабочей частью, применяемый для ручной обработки съемных зубных протезов.
ШАВАНИ́ МИГРЕ́НЬ (J. A. Chavany, франц. невропатолог 20 в.) — постоянная головная боль, приступообразно усиливающаяся, особенно при эмоциональном напряжении, утомлении или при длительной фиксации головы в одном положении, сопровождающаяся вегетативными расстройствами, сонливостью или бессонницей; обусловлена обызвествлением (вероятно, наследственным) серповидного отростка твердой мозговой оболочки.
ША́ВАССА ТЕНОТОМИ́Я (B. Chavasse, 1889—1941, англ. офтальмолог) — тенотомия нижней косой мышцы глаза через разрез кожи века.
ША́ГАСА БОЛЕ́ЗНЬ (C. Chagas, 1879—1934, бразильский врач) — см. *Трипаносомоз американский.*
ША́ГАСА СИНДРО́М (C. Chagas) — патологическое расширение полых органов (мегаколон, мегадуоденум, мегацистис), обусловленное деструкцией клеток нервных ганглиев; отдаленное последствие острой формы американского трипаносомоза.
«ШАГО́МА» ВТОРИ́ЧНАЯ (по имени бразильского врача Шагаса (C. Chagas) — плотный спаянный с кожей узел в подкожной клетчатке, возникающий при американском трипаносомозе в результате гематогенной диссеминации возбудителя.
«ШАГО́МА» ПЕРВИ́ЧНАЯ (по имени бразильского врача Шагаса (C. Chagas — первичный аффект при американском трипаносомозе, представляющий собой воспалительный инфильтрат с лимфангиитом и регионарным лимфаденитом, не подвергающийся нагноению.
ША́ДЕ ТЕО́РИЯ ВОСПАЛЕ́НИЯ (H. Schade, 1876—1935, нем. биохимик и патолог) — теория воспаления, рассматривающая физико-химические изменения в тканях в качестве механизма развития воспалительного процесса.
ШАЛО́ — ЛЫСЕ́НКОВА ОПЕРА́ЦИЯ (Chalot; Н. К. Лысенков, 1865—1941, сов. анатом и хирург; син. Шало — Лысенкова ампутация — нрк) — экзартикуляция плеча с предварительной перевязкой магистральных сосудов.
ША́МБЕРГА БОЛЕ́ЗНЬ (J. F. Schamberg, 1870—1934, амер. дерматолог; син.: гемосидероз кожи сетчатый прогрессирующий) — дерматоз неясной этиологии из группы гемосидерозов, характеризующийся постепенным возникновением многочисленных симметричных красных пятен и телеангиэктазий на голенях, иногда на бедрах, ягодицах и пояснице, еще реже на верхних конечностях и лице.
ША́МБЕРЛА́НА СВЕ́ЧИ (Ch. E. Chamberland, 1851—1908, франц. бактериолог) — бактериальные фильтры, изготовленные из каолина.
ШАМБО́ ОПЕРА́ЦИЯ (G. E. Shambaugh, род. в 1903 г., амер. оториноларинголог) — хирургическая операция при отосклерозе, заключающаяся во вскрытии надбарабанного углубления и передней части сосцевидной пещеры, удалении наковальни и головки молоточка, после чего в латеральном полукружном канале образуют новое овальное окно.
ША́МОВА ОПЕРА́ЦИЯ (В. Н. Шамов, 1882—1962, сов. хирург) — хирургическая операция: создание внегрудного искусственного пищевода из свободного трансплантата тонкой кишки, со всех сторон обернутого кожей.
ШАМПИ́ ФИКСА́Ж (Ch. Champy, род. в 1885 г., франц. гистолог) — гистологический фиксатор для выявления в клетках пластинчатого комплекса (аппарата Гольджи) и митохондрий, представляющий собой смесь растворов хромовой и осмиевой кислот и бихромата калия.
ШАМПИ́ — КУ́ЛЛЯ МЕ́ТОД (Ch. Champy, род. в 1885 г., франц. гистолог; H. Kull, нем. анатом) — см. *Кулля метод.*
ШАНКР (франц. chancre «язва») — язва или эрозия, возникающая в месте внедрения возбудителя при нек-рых инфекционных болезнях.
ШАНКР БИПОЛЯ́РНЫЙ (франц. chancre bipolaire) — твердый шанкр, одновременно развившийся на половых органах и на других участках кожи.

ШАНКР ГУ́НТЕРОВСКИЙ — см. *Шанкр твердый.*

ШАНКР КОМБУСТИФО́РМНЫЙ (ulcus durum combustiforme; лат. combustio ожог + -formis похожий, подобный) — твердый шанкр в виде обширной эрозии с темно-красной зернистой поверхностью.

ШАНКР ЛИМФОГРАНУЛЕМАТО́ЗНЫЙ (ulcus lymphogranulomatosum) — резко ограниченная небольшая поверхностная язва, окруженная венчиком эритемы и не имеющая инфильтрата в своем основании; возникает в месте внедрения возбудителя пахового лимфогранулематоза.

ШАНКР МЯ́ГКИЙ (ulcus molle; син.: шанкроид, язва венерическая) — венерическая болезнь, вызываемая стрептобациллой (палочкой мягкого шанкра) и характеризующаяся множественными глубокими болезненными язвами с гнойным отделяемым, расположенными преимущественно на половых органах, лимфангиитом и регионарным лимфаденитом.

Ш. МЯ́ГКИЙ ВОРОНКООБРА́ЗНЫЙ (u. molle infundibuliforme) — форма Ш. м., при к-рой глубокая язва расположена в шейке головки полового члена.

Ш. МЯ́ГКИЙ ГАНГРЕНО́ЗНЫЙ (u. molle gangraenosum) — форма Ш. м., характеризующаяся гангренозным расплавлением тканей в связи с присоединением фузоспириллеза или анаэробной инфекции.

Ш. МЯ́ГКИЙ ДИФТЕРИТИ́ЧЕСКИЙ (u. molle diphthericum) — форма Ш. м., при к-рой язвы покрыты зеленовато-серым фибринозным налетом в связи с присоединившимся заражением ложнодифтерийной палочкой.

Ш. МЯ́ГКИЙ ИМПЕТИГИНО́ЗНЫЙ (u. molle impetiginosum) — форма Ш. м., клинически сходная с импетиго.

Ш. МЯ́ГКИЙ СЕРПИГИНО́ЗНЫЙ (u. molle serpiginosum; франц. serpigineux ползучий) — форма Ш. м., при к-рой язва заживает рубцом с одного края и увеличивается с другого.

Ш. МЯ́ГКИЙ ФОЛЛИКУЛЯ́РНЫЙ (u. molle folliculare) — форма Ш. м., при к-рой возникают множественные маленькие язвы со слегка приподнятыми краями и глубоким уплотненным дном, что обусловлено проникновением возбудителей в протоки сальных желез или в волосяные фолликулы.

ШАНКР СМЕ́ШАННЫЙ (ulcus mixtum) — язва, характерная для мягкого шанкра, а затем приобретающая черты твердого шанкра; наблюдается при одновременном заражении сифилисом и мягким шанкром.

ШАНКР СПОРОТРИХО́ЗНЫЙ (ulcus sporotrichoticum) — частично покрытая коркой язва с неровными краями, инфильтрированным, иногда папилломатозным основанием и скудным гнойным отделяемым, возникающая в месте внедрения возбудителя споротрихоза в кожу (на кистях, лице, реже на ногах).

ШАНКР ТВЁРДЫЙ (ulcus durum; син.: гунтеровский шанкр, сифилома первичная, язва сифилитическая) — эрозия или поверхностная язва с пластинчатым уплотнением в основании, возникающая в месте внедрения бледной трепонемы.

ШАНКР-АМИГДАЛИ́Т (франц. chancre-amygdalite) — твердый шанкр, расположенный на миндалине.

ШАНКР-ПАНАРИ́ЦИЙ (ulcus durum digiti) — твердый шанкр в виде глубокой болезненной язвы на конце пальца кисти (чаще указательного), сопровождающейся воспалением окружающих тканей.

ШАНКРО́ИД (chancroidum; франц. chancre шанкр + греч. eidos вид) — см. *Шанкр мягкий.*

ША́НЦА ВА́ТНО-МА́РЛЕВЫЙ ВОРОТНИ́К (A. Schanz, 1868—1931, нем. хирург) — ватно-марлевая повязка в виде стоячего воротника; накладывают для иммобилизации шейного отдела позвоночника.

ША́НЦА ОПЕРА́ЦИЯ (A. Schanz) — 1) хирургическая операция: удаление проксимальной половины I фаланги большого пальца стопы при hallux valgus; 2) хирургическая операция: подвертельная остеотомия бедренной кости с фиксацией отломков под углом толстыми металлическими стержнями и созданием упора в седалищную кость; применяется при застарелых врожденных вывихах бедра у подростков.

ША́ПОШНИКОВА СПО́СОБ (Б. М. Шапошников) — способ пункции перикарда, при к-ром иглу проводят через третье или четвертое межреберья у правого края грудины или через шестое межреберье у левого края грудины.

ША́РДИНГЕРА ФЕРМЕ́НТ (F. Schardinger, австрийский биохимик 19 — 20 в.) — см. *Ксантиноксидаза.*

ША́РИКИ (globuli) — см. *Влагалищные шарики.*

ШАРКО́ БОЛЕ́ЗНЬ (J. M. Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог) — см. *Склероз боковой амиотрофический.*

ШАРКО́ БОЛЬША́Я ИСТЕРИ́Я (устар.; J. M. Charcot) — истерия, протекающая с выраженными двигательными расстройствами (истерические припадки, параличи или парезы) и (или) нарушениями функций органов чувств (напр., амавроз, глухота).

ШАРКО́ ДУШ (J. M. Charcot; син. душ струевой) — водолечебная процедура, заключающаяся в воздействии компактной струи воды под давлением попеременно на различные части тела; процедура начинается и заканчивается воздействием веерной струи воды.

ШАРКО́ ИСТЕРИ́ЧЕСКАЯ ДУГА́ (J. M. Charcot) — см. *Истерическая дуга.*

ШАРКО́ ИСТЕРОГЕ́ННЫЕ ЗО́НЫ (J. M. Charcot) — см. *Истерогенные зоны.*

ШАРКО́ МА́ЛАЯ ИСТЕРИ́Я (устар.; J. M. Charcot) — истерия с двигательными расстройствами в виде тика, тремора, подергиваний отдельных мышц.

ШАРКО́ ПНЕВМОНИ́Я (J. M. Charcot) — хроническая П., возникающая как следствие плеврита и отличающаяся преобладанием продуктивных изменений в легочной ткани.

ШАРКО́ СИМПТО́М (J. M. Charcot) — 1) дрожание рук при тиреотоксикозе; 2) более высокое стояние брови на стороне периферического пареза мимических мышц и более низкое ее стояние при их контрактуре; наблюдается при периферическом поражении лицевого нерва; 3) см. *Симптом каски.*

ШАРКО́ СИНДРО́М (J. M. Charcot) — см. *Хромота перемежающаяся.*

ШАРКО́ СУСТА́В (J. M. Charcot) — см. *Артропатия нейрогенная.*

ШАРКО́ ТРИА́ДА (J. M. Charcot) — сочетание трех важных признаков рассеянного склероза: нистагма, скандированной речи и интенционного дрожания.

ШАРКО́ — БРИССО́ СИМПТО́М (J. M. Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог; E. Brissaud, 1852—1909, франц. патолог; син. спазм губоязычный) — оттягивание угла рта и отклонение языка в ту же сторону; наблюдается при истерии.

ШАРКО́ — ВЮЛЬПИА́НА БОЛЕ́ЗНЬ (J. M. Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог; E. F. Vulpian, 1826—1887, франц. врач) — см. *Склероз рассеянный.*

ШАРКО́ — ЛЕ́ЙДЕНА КРИСТА́ЛЛЫ (J. M. Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог; E. V. Leyden, 1832—1910, нем. невропатолог; син. Биццоцеро — Неймана кристаллы) — гладкие бесцветные кристаллы в форме октаэдров, обнаруживаемые при микроскопическом исследовании мокроты у больных бронхиальной астмой или астмоидным бронхитом.

ШАРКО́ — МАРИ́ АМИОТРОФИ́Я (J. M. Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог; P. Marie, 1853—1940, франц. невропатолог) — см. *Амиотрофия наследственная невральная.*

ШАРКО́ — МАРИ́ МЫШЕЧНАЯ АТРОФИ́Я (J. M. Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог; P. Marie, 1853—1940, франц. невропатолог) — см. *Амиотрофия наследственная невральная.*

ШАРКО́ — МАРИ́ — ТУ́ТА БОЛЕ́ЗНЬ (J. M. Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог; P. Marie, 1853—1940, франц. невропатолог; H. H. Tooth, 1856—1925, англ. невропатолог) — см. *Амиотрофия наследственная невральная.*

ШАРКО́ — МАРИ́ — ТУ́ТА — ГО́ФФМАННА БОЛЕ́ЗНЬ (J. M. Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог; P. Marie, 1853—1940, франц. невропатолог; H. H. Tooth, 1856—1925, англ. невропатолог; J. Hoffmann, 1857—1919, нем. невропатолог) — см. *Амиотрофия наследственная невральная.*

ШАРЛАТА́НСТВО МЕДИЦИ́НСКОЕ — заведомый обман больного при его лечении с корыстной целью.

ША́РПА — ШУ́БА СПО́СОБ (A. S. Sharp, 1700—1778, англ. хирург) — способ пункции перикарда, при к-ром иглу проводят у левого края грудины в третье межреберье.

ШАРПАНТЬЕ́ ФЕНО́МЕН (Charpentier, 1852—1916, франц. офтальмолог; син. симптом расстройства адаптации) — усиление ажитированной депрессии при изменении окружающей больного обстановки; наблюдается при эндогенных депрессиях, инволюционной меланхолии, сосудистых и сенильных психозах.

ШАРПЕ́ЕВО ВОЛОКНО́ (W. Sharpey, 1802—1880, англ. анатом и патолог) — см. *Волокно прободающее.*

ША́РЦА ОПЕРА́ЦИЯ (C. E. Шарц, сов. офтальмолог) — хирургическая операция: исправление положения слезной точки при ее выворота, заключающееся в проведении под слезной точкой специальной системы разрезов с последующим их ушиванием.

ШАРРЬЕ́РА ШКАЛА́ (J. F. B. Charrière, 1803—1876, франц. мастер по изготовлению мед. инструментов) — устройство для определения диаметра бужей и катетеров, представляющее собой металлическую пластинку с нумерованными круглыми отверстиями возрастающего диаметра.

ШАСЛЕ́НА ДИСКОРДА́НТНОСТЬ (Ph. Chaslin, 1857—1923, франц. психиатр) — см. *Атаксия интрапсихическая.*

ШАССЕНЬЯ́КА АРТРОТОМИ́Я (Ch. M. E. Chassaignac, 1805—1879, франц. хирург) — артротомия коленного сустава через боковой разрез по латеральному краю надколенника, сухожилия четырехглавой мышцы и связки надколенника.

ШАССЕНЬЯ́КА БУГОРО́К (Ch. M. E. Chassaignac) — см. *Сонный бугорок.*

ШАССЕНЬЯ́КА ЩИПЦЫ́ (истор.; Ch. M. E. Chassaignac) — разборные геморроидальные щипцы без кремальеры с рабочими губками в форме четырехзубчатых крючков.

ШАТЕ́РНИКОВА КА́МЕРА (истор.; М. Н. Шатерников, 1870—1939, сов. физиолог) — установка для продолжительного исследования газообмена человека или животного, представлявшая собой герметичную камеру, снабженную устройствами для автоматической подачи кислорода, поглощения двуокиси углерода и паров воды, а также для поддержания атмосферного давления и температуры на заданном уровне.

ША́ТЦА — УНТЕРБЕ́РГЕРА ПРИ́ЗНАК (Ch. F. Schatz, 1841—1920, нем. гинеколог; F. Unterberger, род. в 1882 г., нем. гинеколог) — расположение пограничного кольца на уровне пупка или немного ниже; признак полного раскрытия шейки матки в родах.

ША́УДИННА ЖИ́ДКОСТЬ (F. R. Schaudinn, 1871—1906, нем. зоолог; син. Шаудинна смесь) — жидкость для фиксации мазков или отпечатков органов и тканей, состоящая из насыщенного раствора сулемы (2 части) и абсолютного этилового спирта (1 часть).

ША́УДИННА СМЕСЬ (F. R. Schaudinn) — см. *Шаудинна жидкость.*

ША́УЛЯ МЕ́ТОД РЕНТГЕНОТЕРАПИ́И (истор.; H. Chaoul, род. в 1887 г., нем. радиолог) — рентгенотерапия поверхностного рака кожи, осуществлявшаяся при расстоянии источник — кожа, равном 5—7 *см.*

ША́УМАННА ВКЛЮЧЕ́НИЯ (J. N. Schaumann, 1879—1953, шведский дерматолог; син. Шауманна тельца) — овальные или круглые, часто кальцифицированные включения в гигантских клетках; встречаются в саркоидной и бериллиевой гранулемах.

ША́УМАННА ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННЫЙ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТО́З (J. N. Schaumann) — см. *Саркоидоз.*

ША́УМАННА ТЕ́ЛЬЦА (J. N. Schaumann) — см. *Шауманна включения.*

ШАХМА́ТОВА ТРУ́БКА (А. П. Шахматов, 1889—1947, сов. паразитолог) — устройство для забора слизи с целью исследования на яйца гельминтов, представляющее собой стеклянную трубку с боковыми отверстиями у конца, вводимого в прямую кишку на глубину 3 *см.*

ША́Я — ДРЕ́ЙДЖЕРА СИНДРО́М (G. M. Shy, 1919—1967, амер. невропатолог; G. A. Drager, род. в 1917 г., амер. невропатолог) — хроническая болезнь нервной системы, характеризующаяся сочетанием ортостатической артериальной гипотензии (без учащения пульса), ангидроза, расстройств функций тазовых органов, паркинсонизма, мышечной гипотрофии, атаксии, признаков поражения пирамидных путей; наблюдается в возрасте 40—60 лет, чаще у мужчин.

ШВА́БА СИНДРО́М (S. I. Schwab, род. в 1871 г., амер. невропатолог) — сочетание промахивания одной из рук при пальценосовой пробе, тенденции к падению в сторону этой руки при ходьбе и в позе Ромберга, акинетико-ригидного синдрома на той же стороне; наблюдается при опухоли височной доли большого мозга.

ШВА́БАХА О́ПЫТ (D. Schwabach, 1846—1920, нем. оториноларинголог) — метод дифференциальной диагностики поражений слухового анализатора путем сравнения костной проводимости у больного и здорового человека при исследовании камертоном C_{128}, установленным на середине темени или сосцевидном отростке; меньшая длительность восприятия звука больным свидетельствует о поражении звуковоспринимающего аппарата, а большая — звукопроводящего аппарата.

ШВА́ЙЗЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (истор.; A. Schwyzer, род. в 1864 г., амер. хирург) — пластическая операция: восстановление проходимости начального отдела мочеточника при гидронефрозе; заключается в выкраивании и перемещении треугольного лоскута из передней стенки почечной лоханки.

ШВА́ЙЗЕРА ПОЛОВА́Я СТЕРИЛИЗА́ЦИЯ (A. Schwyzer) — хирургический способ стерилизации женщин путем обертывания ампулярного конца маточной трубы участком париетальной брюшины, взятым между мочевым пузырем и круглой связкой матки, с фиксацией маточной трубы к переднему листку широкой связки матки.

ШВА́ЙЗЕРА — ФО́ЛЕЯ ОПЕРА́ЦИЯ (A. Schwyzer, род. в 1864 г., амер. хирург; F. E. B. Foley, род. в 1891 г., амер. уролог) — см. *Фолея операция.*

ШВА́ЛЬБЕ ЗА́ДНЕЕ ПОГРАНИ́ЧНОЕ КОЛЬЦО́ (G. A. Schwalbe, 1844 — 1916, нем. анатом; син. склеральная шпора) — видимая при гониоскопии циркулярная белая полоса в области радужно-роговичного угла, соответствующая положению лимба.

ШВА́ЛЬБЕ ЯДРО́ (G. A. Schwalbe) — см. *Ядро преддверное медиальное.*

ШВА́ННОВСКАЯ ГЛИ́Я (Th. Schwann, 1810—1882, нем. гистолог и физиолог) — совокупность леммоцитов (шванновских клеток), образующих оболочки нервных волокон.

ШВА́ННОВСКАЯ КЛЕ́ТКА (Th. Schwann) — см. *Леммоцит.*

ШВА́ННОВСКАЯ ОБОЛО́ЧКА (Th. Schwann) — оболочка миелинового нервного волокна, состоящая из леммоцитов и расположенная между неврилеммой и миелиновой оболочкой.

ШВАННОГЛИО́МА (shwannoglioma; *шванновская глия* + *-ома*) — см. *Невринома.*

ШВАННО́З ЦЕНТРА́ЛЬНЫЙ ДИФФУ́ЗНЫЙ (shwannosis centralis diffusa; Th. Schwann, 1810—1882, нем. гистолог и физиолог) — см. *Глиобластоз диффузный.*

ШВАННО́МА (schwannoma; Th. Schwann) — см. *Невринома.*

ШВАННО́МА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (schwannoma malignum) — см. *Саркома нейрогенная.*

ШВА́РТА — см. *Спайка.*

ШВА́РТЦЕ ОПЕРА́ЦИЯ (H. H. R. Schwartze, 1837—1910, нем. оториноларинголог) — см. *Мастоидотомия.*

ШВА́РТЦЕ СИМПТО́М (H. H. R. Schwartze) — просвечивание розовоокрашенной гиперемированной слизистой оболочки в области мыса через истонченную барабанную перепонку; признак активной стадии отосклероза.

ШВА́РТЦМАНА ФЕНО́МЕН (G. Schwartzman, 1896—1965, амер. бактериолог) — быстрое развитие у экспериментального животного кровоизлияния и некроза в месте внутрикожного введения фильтрата бактериальной культуры, если ему через сутки внутривенно ввести тот же или другой токсин; реакция является моделью альтернативного воспаления.

ШВА́РЦА СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШОВ (E. W. Schwarz, род. в 1890 г., нем. хирург) — способ соединения концов сухожилия, при к-ром их перевязывают по типу лигатуры и сшивают узловым швом.

ШВА́РЦА ТРЕУГО́ЛЬНИК (G. Schwarz, род. в 1880 г., нем. рентгенолог) — рентгеновская тень треугольной формы, расположенная в углу, образованном левым контуром сердца и диафрагмой, наблюдаемая в передней проекции; создается жировыми отложениями в перикарде.

ШВА́ХМАНА ТЕСТ (H. Schwachman) — метод обнаружения повышенной концентрации хлоридов в поте, заключающийся в получении отпечатка ладони на агаровой среде, содержащей нитрат серебра, к-рый, взаимодействуя с хлоридами, изменяет свой цвет.

ШВЕ́ЙГГЕРА И́РИС-ПИНЦЕ́Т (C. Schweigger, нем. офтальмолог конца 19 в.) — инструмент для захвата радужной оболочки в виде пинцета, тонкие концы рабочих губок к-рого изогнуты и снабжены зубчиками.

ШВЕ́ЙГГЕРА КА́ПСУЛЬНЫЙ ПИНЦЕ́Т (C. Schweigger; син. Швейггера пинцет) — инструмент для разрушения части передней капсулы хрусталика при экстракапсулярной экстракции катаракты; представляет собой пинцет с тонкими изогнутыми губками, имеющими по три зубца, расположенные на стороне, противоположной изгибу.

ШВЕ́ЙГГЕРА ПИНЦЕ́Т (C. Schweigger) — см. *Швейггера капсульный пинцет.*

ШВЕЙЦА́РСКИЙ ТИП ИММУНОПАРЕ́ЗА — см. *Агаммаглобулинемия лимфопеническая.*

ШВЕ́ННИНГЕРА — БУ́ЦЦИ АНЕТОДЕРМИ́Я (E. Schweninger, 1850—1924, нем. патологоанатом и дерматолог; F. Buzzi, род. в 1889 г., нем. дерматолог) — см. *Анетодермия опухолевидная.*

ШЕВАЛЁВА ОПЕРА́ЦИЯ (В. Е. Шевалев, сов. офтальмолог) — 1) хирургическая операция: пересадка протока околоушной железы в конъюнктивальный мешок, производимая при ксерофтальмии; 2) хирургическая операция;

несквозное иссечение полоски склеры в области экватора глаза, производимое при отслойке сетчатки.

ШЕВАССЮ СИМПТО́М (M. Chevassu, 1877—1957, франц. хирург) — выделение крови по мочеточниковому катетеру во время его проведения мимо опухоли мочеточника; при дальнейшем продвижении катетера выделение крови прекращается.

ШЕВАССЮ — ГРЕГУА́РА ОПЕРА́ЦИЯ (M. Chevassu, 1877—1957, франц. хирург; W. Grégoire, совр. бельгийский хирург) — хирургическая операция: удаление забрюшинной клетчатки и расположенных в ней лимфатических узлов единым блоком; применяется при злокачественных опухолях яичка.

ШЕВКУНЕ́НКО РАЗРЕ́З (В. Н. Шевкуненко, 1872—1952, сов. хирург) — оперативный доступ к органам поясничной, подвздошной областей и малого таза; представляет собой модификацию внебрюшинного чревосечения по Пирогову: разрез проходит от вершины угла между XII ребром и краем подвздошно-реберной мышцы к точке, расположенной на два «поперечных пальца» выше верхней передней подвздошной ости и дальше параллельно паховой связке к лобковому бугорку.

ШЁГРЕНА СИНДРО́М — 1) (K. G. T. Sjögren, род. в 1896 г., шведский невропатолог и психиатр) — сочетание двусторонней врожденной катаракты с олигофренией, задержкой физического развития и мозжечковой атаксией; 2) (H. S. C. Sjögren, род. в 1899 г., шведский офтальмолог) — см. *Гужеро — Шегрена синдром*.

ШЁГРЕНА — ЛА́РССОНА СИНДРО́М (K. G. T. Sjögren, род. в 1896 г., шведский невропатолог и психиатр; T. Larsson, совр. шведский психиатр) — наследственная болезнь, характеризующаяся олигофренией легкой и средней степени в сочетании со спастической походкой, врожденным ихтиозом, дегенерацией сетчатки, карликовым или гигантским ростом, гипоплазией половых органов и анемией; наследуется по рецессивному типу.

ШЁГРЕНА — ХЕ́ЙБЛА ФЕНО́МЕН — иммунитет у взрослых экспериментальных животных к имплантированным им клеткам опухолей, вызываемых вирусами полиомы мышей, саркомы Рауса, лейкоза мышей или аденовирусами, развивающийся после однократного введения этих вирусов.

ШЕ́ДЕ АППА́РАТ (F. Schede, род. в 1882 г., нем. ортопед; син. Шеде шина) — устройство для лечения перелома дистального отдела лучевой кости; представляет собой металлическую желобоватую пластину с двойным изгибом, в к-рой фиксируют руку, придавая необходимое положение лучезапястному суставу и пальцам.

ШЕ́ДЕ ВЫТЯЖЕ́НИЕ (F. Schede) — способ вытяжения при переломе бедренной кости у детей до трех лет; производят с помощью лент лейкопластыря, наложенных на боковые поверхности вертикально поднятой конечности.

ШЕ́ДЕ МЕ́ТОД АРТРОТОМИ́И (F. Schede) — оперативный доступ к тазобедренному суставу по внутреннему краю портняжной мышцы через толщу мышц бедра.

ШЕ́ДЕ ОПЕРА́ЦИЯ (F. Shede) — хирургическая операция при hallux valgus; заключается в краевой резекции головки I плюсневой кости вместе с костно-хрящевыми разрастаниями.

ШЕ́ДЕ СТОЛ (F. Schede) — устройство для коррекции позвоночника при его деформациях, представляющее собой облегченный ортопедический стол, изготовленный из металлических труб, с набором манжет для вытяжения за конечности и голову, а также других приспособлений.

ШЕ́ДЕ ШИ́НА (F. Schede) — см. *Шеде аппарат*.

ШЕ́ДЕЛЯ ЗАЖИ́М (Schedel) — инструмент для прикрепления операционного белья к краям раны, представляющий собой пластинчатый пинцет с перекрещивающимися губками, концы к-рых иглообразно заострены.

ШЕ́ЕЛЕ КОЛЬЦЕВИ́ДНАЯ ПЛА́СТИКА (K. Scheele, нем. хирург) — пластическая операция: замещение части мочевого пузыря изолированным кольцевидно сшитым отрезком тонкой кишки.

ШЕ́ЕЧНО-ВЛАГА́ЛИЩНАЯ ВЕТВЬ (ramus cervicovaginalis) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *811*.

ШЕ́ЕЧНЫЙ ПУЗЫРЁК матки (vesicula cervicalis; син. овоид шеечный) — замкнутая полость, заполненная слизистым секретом, образующаяся при отшнуровании от эпителия желез шейки матки.

ШЕ́ЙЕ БОЛЕ́ЗНЬ (H. G. Scheie, род. в 1909 г., амер. офтальмолог) — см. *Мукополисахаридоз V типа*.

ШЕ́ЙЕ СИНДРО́М (H. G. Scheie) — см. *Мукополисахаридоз V типа*.

ШЕ́ЙЕРМАННА БОЛЕ́ЗНЬ (H. W. Scheuermann, 1877—1960, датский хирург-ортопед) — остеохондропатия акромиона лопатки; характеризуется появлением в нем участка асептического некроза и деформации, ограничением движений в плечевом суставе.

ШЕ́ЙЕРМАННА — МА́У БОЛЕ́ЗНЬ (H. W. Scheuermann, 1877—1960, датский хирург-ортопед; K. Mau, 1890—1958, нем. хирург-ортопед; син.: кифоз остеохондропатический, кифоз подростковый, кифоз учеников-подмастерьев, кифоз юношеский, Шморля болезнь) — остеохондропатия апофизов грудных, преимущественно VII — X позвонков; проявляется стойким кифозом этого отдела позвоночника и компенсаторным лордозом шейного и поясничного отделов.

ШЕ́ЙКА ЗУ́БА (collum dentis, PNA, BNA, JNA) — часть зуба между коронкой и корнем, охваченная десной.

ШЕ́ЙКА МА́ТКИ (cervix uteri, PNA, BNA, JNA) — нижняя суженная часть матки, вдающаяся во влагалище.

ШЕ́ЙКА МОЧЕВО́ГО ПУЗЫРЯ́ (cervix vesicae urinariae, PNA) — нижняя суженная часть мочевого пузыря, переходящая в мочеиспускательный канал.

ШЕ́ЙНАЯ ПЕ́ТЛЯ (ansa cervicalis, PNA; ansa nervi hypoglossi, BNA, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *1549*.

ШЕ́ЙНИСА ОПЕРА́ЦИЯ (В. Н. Шейнис, род. в 1908 г., сов. хирург) — хирургическая операция, производимая при слоновости, не сопровождающейся видимым поражением кожи; заключается в иссечении патологически измененных тканей с последующим закрытием дефекта одним свободным кожным лоскутом, снятым дерматомом с удаленной кожи.

ШЕ́ЙНИСА ПРО́БА (В. Н. Шейнис) — см. *Трехжгутовая проба*.

ШЕ́ЙНЫЙ ТРЕУГО́ЛЬНИК ЗА́ДНИЙ (trigonum cervicale posterius, PNA) — см. *Область шеи латеральная*.

ШЕ́ЙНЫЙ ТРЕУГО́ЛЬНИК ПЕРЕ́ДНИЙ (trigonum cervicale anterius, PNA) — см. *Область шеи передняя*.

ШЕ́ЙТХАУЭРА — МАРИ́ — СЕНТО́НА СИНДРО́М (G. Scheuthauer, 1837—1894, нем. хирург; P. Marie, 1853—1940, франц. невропатолог; R. Sainton, 1868—1958, франц. врач) — см. *Дизостоз ключично-черепной*.

ШЕ́КВИСТА ОПЕРА́ЦИЯ (O. Sjöqvist, 1901—1955, шведский нейрохирург; син. Шоквиста операция) — хирургическая операция: пересечение спинномозгового пути тройничного нерва, производимая при его невралгии.

ШЁЛК ХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ — нить из натурального шелка-сырца с небольшим добавлением волокон хлопка высших сортов, применяемая в хирургии в качестве шовного или лигатурного материала.

ШЕ́ЛЛИ ГЛУБО́КАЯ ПОТНИ́ЦА (W. B. Shelley, амер. дерматолог) — см. *Ангидроз тропический*.

ШЕ́ЛЛИ ТЕСТ (W. B. Shelley) — см. *Базофильный тест*.

ШЕ́ЛЛОНГА ПРО́БА (F. Schellong, 1891—1953, нем. врач) — 1) функциональная проба при исследовании кровообращения, заключающаяся в измерении артериального давления и частоты пульса перед дозированной физической нагрузкой и после нее ежеминутно в течение 5—10 мин.; 2) ортостатическая проба при исследовании кровообращения, заключающаяся в измерении артериального давления и частоты пульса при переходе из горизонтального положения в вертикальное и обратно.

ШЕ́ЛЛОНГА — ШТРИ́ЗОВЕРА ФЕНО́МЕН (F. Schellong, 1891—1953, нем. врач; Strisower) — падение артериального давления при переходе больного из горизонтального положения в вертикальное; наблюдается при атеросклерозе аорты и крупных артерий в связи со снижением их эластичности, а также после приема нек-рых гипотензивных средств.

ШЕЛУ́ШЕНИЕ (desquamatio) — отделение с поверхности кожи роговых чешуек эпидермиса.

ШЕМА́КЕРА ЛИ́НИЯ (J. Schoemaker, род. в 1874 г., голландский хирург) — воображаемая линия от большого вертела к передней верхней ости подвздошной кости; топографо-анатомический ориентир для определения наличия смещения большого вертела.

ШЁНБОРНА ОПЕРА́ЦИЯ (K. Schönborn, 1840—1906, нем. хирург) — пластическая операция: частичное закрытие расщелины мягкого неба или его удлинение лоскутом из слизистой оболочки задней стенки глотки.

ШЁНДУБЕ ГИПОФИЗИ́НОВАЯ ПРО́БА (W. Schöndube) — метод исследования функции сфинктера Одди (сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы), основанный на том, что в норме прием гипофизина вызывает сокращение сфинктера с прекращением поступления желчи в двенадцатиперстную кишку.

ШЕ́НКА АППА́РАТ (Л. К. Шенк, 1873—1943, сов. ортопед) — комплект

оборудования для корригирующей лечебной физкультуры при лечении искривлений позвоночника.

ШЁНКА БОЛЕ́ЗНЬ (B. R. Schenck, 1872—1920, амер. гинеколог) — см. *Споротрихоз.*

ШЁНЛЕЙНА — ГЕ́НОХА БОЛЕ́ЗНЬ (J. L. Schönlein, 1793—1864, нем. врач; E. H. Henoch, 1820—1910, нем. педиатр) — см. *Васкулит геморрагический.*

ШЕ́НТОНА ЛИ́НИЯ (E. W. Shenton, 1872—1955, англ. радиолог) — дугообразная линия, образуемая на рентгенограмме тазобедренного сустава нижним контуром горизонтальной ветви лобковой кости и медиальным краем шейки бедренной кости; при смещении бедренной кости Ш. л. уступообразно прерывается.

ШЕ́ПЕНСА ПЕРИФЕРИ́ЧЕСКИЙ ХОРИОИДИ́Т (C. L. Schepens) — см. *Хориоидит периферический.*

ШЕРЕШЕ́ВСКОГО МЕ́ТОД (истор.; Н. А. Шерешевский, 1885—1961, сов. эндокринолог) — метод подготовки к операции больных диффузным токсическим зобом; заключается в назначении препаратов йода, валерианы и люминала.

ШЕРЕШЕ́ВСКОГО СИМПТО́М (Н. А. Шерешевский; син. симптом приседания) — невозможность встать из положения на корточках вследствие слабости проксимальных отделов ног; наблюдается при тиреотоксикозе, миопатии, полирадикулоневритах.

ШЕРЕШЕ́ВСКОГО — ТЁРНЕРА СИНДРО́М (Н. А. Шерешевский, 1885—1961, сов. эндокринолог; H. H. Turner, род. в 1892 г., амер. эндокринолог) — см. *Тернера синдром.*

ШЕРЕШЕ́ВСКОГО — ТЁРНЕРА — БОННЕВИ́ — У́ЛЛЬРИХА СИНДРО́М (Н. А. Шерешевский, 1885—1961, сов. эндокринолог; H. H. Turner, род. в 1892 г., амер. эндокринолог; K. Bonnevie, 1872—1950, норвежский зоолог; O. Ullrich, 1894—1957, нем. педиатр) — см. *Тернера синдром.*

ШЕ́РРИНГТОНА РЕФЛЕ́КС (Ch. S. Sherrington, 1857—1952, англ. физиолог) — сгибательные и разгибательные движения, напоминающие ходьбу, возникающие при попеременном болевом раздражении парализованных конечностей; защитный рефлекс при обширном поражении спинного мозга выше его поясничного утолщения.

ШЕ́РФА — ЗДА́НСКОГО ДВУХЩЕЛЕВА́Я РЕШЕ́ТКА (D. Scherf, австрийский врач 20 в.; E. Zdansky, австрийский рентгенолог 20 в.) — устройство для рентгенокимографии, в к-ром в качестве модулятора движений сердца применена свинцовая решетка с двумя щелями, расположенными на разных уровнях, что позволяет одновременно регистрировать движения двух заранее избранных противоположных несимметричных точек сердечного контура.

ШЕ́РШНИ (Vespa) — род насекомых сем. складчатокрылых ос (Vespidae) отр. перепончатокрылых (Hymenoptera); распространены преимущественно в тропической и субтропической зонах; продуцируют вещества, вводимые при уколе жалом и вызывающие у человека резкую болевую реакцию.

ШЕ́ФЕРА СИНДРО́М (E. Schäfer, нем. дерматолог 20 в.; син.: Турена — Гиссельбрехта врожденная эктодермальная полидисплазия, Турена — Сулиньяка врожденный гиперэктодермоз) — наследственная болезнь, характеризующаяся кератодермией, гипергидрозом, рассеянным фолликулярным кератозом с участками точечной алопеции.

ШЕ́ФЕРА СПО́СОБ ИСКУ́ССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯ́ЦИИ ЛЁГКИХ (истор.; E. A. Sharpey-Schafer, 1850—1935, англ. физиолог) — способ искусственной вентиляции легких, при к-ром выдох вызывают сдавлением грудной клетки пострадавшего, лежащего на животе, а вдох происходит пассивно.

ШЕ́ФЕРА — ЭМЕРСОНА — А́ЙВИ СПО́СОБ ИСКУ́ССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯ́ЦИИ ЛЁГКИХ (истор.; E. A. Sharpey-Schafer, 1850—1935, англ. физиолог; J. H. Emerson, англ. врач; R. H. Ivy, род. в 1881 г., амер. хирург) — способ искусственной вентиляции легких, при к-ром выдох вызывают сдавлением грудной клетки пострадавшего, лежащего на животе, а вдох — приподниманием его тела за таз.

ШЕ́ФФЕРА РЕФЛЕ́КС (M. Schäffer, 1852—1923, нем. невропатолог) — разгибание большого пальца стопы при сдавлении пяточного (ахиллова) сухожилия; признак поражения пирамидных путей.

ШЕ́Я (cervix, PNA, BNA, JNA) — часть тела, соединяющая голову с туловищем.

ШЕ́Я КРЫЛОВИ́ДНАЯ — см. *Птеригиум-синдром.*

ШИ ОПЕРА́ЦИЯ (J. J. Shea, род. в 1889 г., амер. оториноларинголог) — 1) хирургическая операция при отосклерозе, заключающаяся в удалении стремени (вместе с основанием), закрытии окна преддверия лоскутом, сформированным из стенки вены, и введении полиэтиленового трубчатого протеза между трансплантатом и лентикулярным отростком наковальни; 2) хирургическая операция при отосклерозе, заключающаяся в удалении ножек и головки стремени с образованием отверстия в его основании, после чего в это отверстие вводят конец тефлонового протеза, другую часть к-рого, имеющую форму кольца, надевают на длинную ножку наковальни.

ШИГЕ́ЛЛА НЬЮКА́СЛ (Shigella newcastle) — подвид дизентерийной бактерии Флекснера, отличающийся нек-рыми серологическими и ферментативными свойствами.

SHIGÉLLA (шигеллы) — род микроорганизмов сем. Enterobacteriaceae, объединяющий грамотрицательные аэробные неподвижные палочки, ферментирующие углеводы с выделением кислоты; возбудитель дизентерии.

S. BÓYDII — см. *Бойда подвид шигелл.*

S. DYSENTÉRIAE — см. *Григорьева — Шиги бактерия.*

S. FLÉXNERI — см. *Флекснера дизентерийная бактерия.*

S. NEWCÁSTLE — см. *Шигелла Ньюкасл.*

S. SÓNNEI — см. *Зонне дизентерийная бактерия.*

ШИГЕ́ЛЛЫ — см. *Shigella.*

ШИЗ- (шизо-; греч. schizō раскалывать, разделять, расщеплять) — составная часть сложных слов, означающая «разделение», «расщепление», «нарушение психики».

ШИЗО- — см. *Шиз-.*

ШИЗОБУЛИ́Я (schizobulia; *шизо-* + греч. bulē воля) — наличие у больного противоположных волевых тенденций и стремлений; симптом шизофрении.

ШИЗОГОНИ́Я (*шизо-* + греч. gonē поколение, потомство; син. деление множественное) — тип размножения простейших класса споровиков, характеризующийся многократным делением ядра и последующим распадением клетки на множество дочерних клеток (мерозоитов).

Ш. ЭКЗОЭРИТРОЦИТА́РНАЯ — Ш. у малярийного плазмодия, проникшего в организм; происходит в гепатоците и характеризуется образованием нескольких тысяч мерозоитов, внедряющихся в эритроциты.

Ш. ЭРИТРОЦИТА́РНАЯ — Ш. у малярийного плазмодия; происходит после внедрения мерозоита в эритроцит и характеризуется образованием 8—24 мерозоитов.

ШИЗОКА́РНОСТЬ (*шизо-* + греч. kara голова, вместилище разума) — злокачественное течение шизофрении с быстрым развитием слабоумия.

ШИЗОМАНИ́Я (schizomania; *шизо-* + *мания*) — общее название благоприятно протекающих атипичных форм шизофрении, возникающих на почве наследственного предрасположения.

ШИЗОНЕВРО́З (*шизо-* + *невроз*) — см. *Шизофрения неврозоподобная.*

ШИЗОНИХИ́Я (schizonychia; *шиз-* + греч. onyx, onychos ноготь) — см. *Онихошизис.*

ШИЗО́НТ (*шиз-* + греч. on, ontos сущее, существо) — стадия развития простейших класса споровиков, способная к бесполому размножению по типу шизогонии.

ШИЗОНТОЦИ́ДНЫЕ СРЕ́ДСТВА (schizonticida; *шизонт* + лат. caedo убивать; син. шизонтоциды) — противомалярийные средства, вызывающие гибель шизонтов возбудителей малярии (напр., акрихин, бигумаль, хиноцид).

ШИЗОНТОЦИ́ДЫ (schizonticida; *шизонт* + лат. caedo убивать) — см. *Шизонтоцидные средства.*

ШИЗОПАТИ́Я БЛЕЙЛЕРА (*шизо-* + греч. pathos страдание, болезнь) — см. *Блейлера шизопатия.*

ШИЗОТРО́ПНЫЕ СРЕ́ДСТВА (schizotropa; *шизо-* + греч. tropos поворот, направление) — см. *Гематошизотропные средства.*

ШИЗОФАЗИ́Я (schizophasia; *шизо-* + греч. phasis выражение, речь) — расстройство речи в виде отсутствия смысловой связи между словами и предложениями при правильности их грамматического строя.

ШИЗОФРЕНИ́ЧЕСКАЯ РЕА́КЦИЯ (reactio schizophrenica) — расстройство психики, проявляющееся симптомами и синдромами, свойственными шизофрении; термин применяется в нек-рых зарубежных классификациях психических болезней (напр., в США).

ШИЗОФРЕНИ́ЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕ́НИЯ ЛИ́ЧНОСТИ — см. *Шизофренический дефект.*

ШИЗОФРЕНИ́ЧЕСКИЙ ДЕФЕ́КТ (defectus schizophrenicus; син. шизофренические изменения личности) — совокупность стойких изменений личности больного шизофренией (снижение психической активности, аутизм, эмоциональное оскудение, утрата единства психических процессов).

ШИЗОФРЕНИ́Я (schizophrenia; *шизо-* + греч. phrēn ум, разум; син.: Блейлера болезнь, dementia praecox, психоз дискордантный, слабоумие раннее) — эндогенная психическая болезнь с непрерывным или приступообразным течением, проявляющаяся изменениями личности (снижение активности, эмоциональное оскудение, аутизм, утрата единства психических процессов, нарушение мышления) и различными продуктивными симптомами (бред, галлюцинации, аффективные расстройства, кататония и др.).

Ш. АМБУЛАТО́РНАЯ (s. ambulatoria) — медленно текущая или периодическая Ш., при к-рой клинические проявления выражены слабо, что допускает содержание и лечение больного вне психиатрического стационара.

Ш. ГАЛОПИ́РУЮЩАЯ — см. *Шизофрения ядерная.*

Ш. ГЕБО́ИДНАЯ (s. heboidea; син. гебоидофрения) — Ш., начинающаяся в подростковом или юношеском возрасте и проявляющаяся гебоидным синдромом с выраженным обеднением эмоций.

Ш. ГИПЕРТОКСИ́ЧЕСКАЯ (s. hypertoxica; син.: кататония смертельная, кататония фебрильная) — бурно развивающийся приступ Ш. с непрерывным неутомимым двигательным возбуждением и помрачением сознания, сопровождающийся высокой температурой, акроцианозом, подкожными кровоизлияниями, развитием истощения и комы, а также появлением после приступа изменений личности, иногда незначительных; нек-рые ученые рассматривают Ш. г. как разновидность delirium acutum.

Ш. ИПОХОНДРИ́ЧЕСКАЯ (s. hypochondrica) — Ш. с преобладанием у бо́льного навязчивой, сверхценной идеи или бреда о наличии тяжелой внутренней болезни.

Ш. ЛАТЕ́НТНАЯ (s. latens) — Ш., отличающаяся крайне медленным развитием и бедностью, «скрытостью» клинических проявлений.

Ш. МАЛОПРОГРЕДИЕ́НТНАЯ — см. *Шизофрения медленнотекущая.*

Ш. МЕДЛЕННОТЕКУ́ЩАЯ (син. Ш. малопрогредиентная) — Ш. с медленно нарастающими проявлениями болезни в виде навязчивых состояний, признаков деперсонализации, сенестопатий, ипохондрического синдрома или паранойяльного бреда.

Ш. НЕВРОЗОПОДО́БНАЯ (син.: шизоневроз, Ш. псевдоневротическая) — медленно текущая Ш. без бреда с преобладанием навязчивых состояний, астении, признаков деперсонализации и ипохондрического синдрома.

Ш. НЕПРЕРЫ́ВНО-ПРОГРЕДИЕ́НТНАЯ — Ш., текущая без ремиссий, с нарастанием проявлений болезни и углублением развивающегося дефекта.

Ш. О́СТРАЯ (s. acuta) — общее название форм Ш., при к-рых внезапно или бурно развиваются аффективно-бредовые, галлюцинаторно-бредовые, онейроидные и (или) кататонические расстройства.

Ш. ПАРАНО́ИДНАЯ (s. paranoidea; син. слабоумие параноидное — устар.) — непрерывно-прогредиентная Ш. с нарастанием изменений личности, сопровождающихся систематизированным бредом, галлюцинациями, психическими автоматизмами, отдельными явлениями парафрении и кататонического синдрома.

Ш. ПАРАНОЙЯ́ЛЬНАЯ (s. paranoialis) — 1) медленнотекущая Ш. с преобладанием монотематического систематизированного бреда, напр. ипохондрического, ревности, кверулянтов, реформаторства, изобретательства, сензитивного бреда отношения; 2) начальный этап развития непрерывно-прогредиентной Ш., в течение к-рого проявления болезни исчерпываются паранойяльным бредом.

Ш. ПАРАФРЕ́ННАЯ (s. paraphrenica) — общее название форм Ш., в клинической картине к-рых преобладает фантастический бред величия, сочетающийся с бредом преследования.

Ш. ПЕРЕМЕЖА́ЮЩЕ-ПОСТУПА́ТЕЛЬНАЯ — см. *Шизофрения приступообразно-прогредиентная.*

Ш. ПЕРИОДИ́ЧЕСКАЯ (s. periodica; син.: Ш. рекуррентная, Ш. ремиттирующая) — Ш., протекающая в виде приступов аффективных, аффективно-бредовых, онейроидно-кататонических, реже аментивноподобных расстройств, разделенных более или менее длительными ремиссиями с нерезко выраженными изменениями личности, не нарастающими от приступа к приступу.

Ш. ПРИВИ́ТАЯ — см. *Пфропфшизофрения.*

Ш. ПРИСТУПООБРА́ЗНАЯ — общее название периодической и приступообразно-прогредиентной Ш.

Ш. ПРИСТУПООБРА́ЗНО-ПРОГРЕДИЕ́НТНАЯ (син.: Ш. перемежающе-поступательная, Ш. шубообразная) — Ш., протекающая в форме приступов аффективно-бредовых, аффективно-галлюцинаторных, аффективно-кататонических, кататоно-онейроидных или других расстройств, перемежающихся ремиссиями с наличием выраженного стойкого шизофренического дефекта, глубина к-рого может увеличиваться от приступа к приступу или оставаться неизменной.

Ш. ПРОСТА́Я (s. simplex) — Ш., протекающая почти без продуктивных симптомов, но с быстрым образованием шизофренического дефекта.

Ш. ПСЕВДОНЕВРОТИ́ЧЕСКАЯ — см. *Шизофрения неврозоподобная.*

Ш. РЕКУРРЕ́НТНАЯ (s. recurrens) — см. *Шизофрения периодическая.*

Ш. РЕМИТТИ́РУЮЩАЯ (s. remittens) — см. *Шизофрения периодическая.*

Ш. СЕНЕСТИ́ЧЕСКАЯ ГУ́БЕРА — см. *Губера сенестическая шизофрения.*

Ш. СЕНЕСТОПАТИ́ЧЕСКАЯ (s. coenaesthopathica) — медленнотекущая Ш., исчерпывающаяся упорными, тягостными ощущениями в различных органах или областях тела и образованием нерезко выраженного шизофренического дефекта.

Ш. ЦИРКУЛЯ́РНАЯ (s. circularis) — периодическая Ш., протекающая в форме приступов депрессии или мании, иногда в виде их сочетания.

Ш. ШИЗОКА́РНАЯ — см. *Шизофрения ядерная.*

Ш. ШУБООБРА́ЗНАЯ (нем. Schub сдвиг, приступ) — см. *Шизофрения приступообразно-прогредиентная.*

Ш. ЯДЕРНАЯ (син.: Ш. галопирующая, Ш. шизокарная) — общее название форм Ш., при к-рых быстро наступает эмоциональное опустошение с распадом ранее существовавших позитивных симптомов (конечное состояние).

ШИЗОФРЕНИ́Я СИМПТОМАТИ́ЧЕСКАЯ (schizophrenia symptomatica) — общее название симптоматических психозов, проявления к-рых напоминают шизофрению.

ШИЗОЦИ́ТЫ (*шизо-* + гист. cytus клетка) — фрагменты эритроцитов, наблюдаемые в мазках крови при гемолизе.

ШИ́КА РЕА́КЦИЯ (B. Schick, 1877—1967, амер. педиатр) — кожная проба с дифтерийным токсином для оценки уровня антитоксического иммунитета, обусловливающего невосприимчивость человека к дифтерии.

ШИ́КА СИМПТО́М (B. Schick) — затруднение дыхания при сдавлении трахеи или крупных бронхов увеличенными лимфатическими узлами средостения.

ШИ́ККЕЛЕ ФЕНО́МЕН (G. Schickelé, 1875—1927, швейц. гинеколог) — сочетание судорожных сокращений шейки матки с ослаблением сокращений ее тела; признак нарушения родовой деятельности.

ШИК-РЕА́КЦИЯ — см. *Рас-реакция.*

ШИ́ЛЛЕРА ПРО́БА (W. Schiller, 1887—1960, австрийский гинеколог) — метод выявления подозрительных на злокачественное перерождение участков слизистой оболочки шейки матки, заключающийся в смазывании ее раствором Люголя, после чего такие участки остаются светлыми, не окрашенными йодом.

ШИ́ЛЛЕРА СИМПТО́М — способность больного перемещаться шагами в сторону, пораженную гемипарезом, более активно и свободно, чем в противоположную; признак центрального гемипареза.

ШИ́ЛЛИНГА ТЕСТ (R. F. Schilling, род. в 1919 г., амер. врач) — метод выявления нарушений всасывания цианокобаламина, заключающийся в приеме внутрь определенного количества витамина, меченного радиоактивным кобальтом, с последующим исследованием его содержания в моче, собранной за сутки.

ШИЛОВИ́ДНАЯ ТО́ЧКА (stylion) — антропометрическая точка: самая дистальная точка шиловидного отростка лучевой кости.

ШИЛОВИ́ДНЫЙ ВЫ́СТУП (prominentia styloidea, PNA, BNA, JNA) — возвышение на яремной стенке барабанной полости среднего уха.

ШИЛОВИ́ДНЫЙ ОТРО́СТОК (processus styloideus, PNA, BNA; processus styloides, JNA) — 1) отросток дистального конца лучевой кости, расположенный на ее латеральной поверхности; 2) отросток дистального конца локтевой кости, расположенный на ее медиальной поверхности; 3) вытянутый заостренный отросток височной кости, расположенный на нижней поверхности пирамиды.

ШИЛО́ВЦЕВА ОПЕРА́ЦИЯ (С. П. Шиловцев, 1898—1963, сов. хирург) — 1) хирургическая операция при кисте

поджелудочной железы; заключается во вскрытии кисты, электрокоагуляции ее дна с последующей обработкой стенок этиловым спиртом и йодом и сближении их швами; 2) хирургическая операция, обеспечивающая укрепление брюшной стенки при послеоперационных грыжах; заключается в погружении кожного рубца под апоневроз мышц живота.

ШИЛОСОСЦЕВИ́ДНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (foramen stylomastoideum, PNA, BNA, JNA) — наружное отверстие лицевого канала, расположенное на нижней поверхности пирамиды височной кости между шиловидным и сосцевидным отростками; место прохождения лицевого нерва и шилососцевидной артерии.

ШИ́ЛЬДЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (P. F. Schilder, 1886—1940, амер. невропатолог и психиатр; син.: аплазия аксонов диффузная экстракортикальная, лейкоэнцефалит периаксиальный диффузный, склероз интерглобулярный симметричный, склероз нервной системы диффузный, Шильдера диффузный периаксиальный энцефалит, энцефалит периаксиальный) — прогрессирующее демиелинизирующее заболевание головного мозга, характеризующееся ранней дистрофией аксонов, проявляющееся центральными параличами и парезами, гиперкинезами, эпилептиформными припадками, расстройствами зрения, психическими нарушениями с развитием слабоумия.

ШИ́ЛЬДЕРА БРАДИТЕЛЕКИНЕ́З (P. F. Schilder) — см. *Брадителекинезия.*

ШИ́ЛЬДЕРА ДИФФУ́ЗНЫЙ ПЕРИАКСИА́ЛЬНЫЙ ЭНЦЕФАЛИ́Т (P. F. Schilder) — см. *Шильдера болезнь.*

ШИ́ЛЬДЕРА ПРО́БА (P. F. Schilder) — метод выявления поражения мозжечка, при к-ром больному в положении стоя с вытянутыми вперед руками и закрытыми глазами предлагают резко повернуть голову; рука на стороне поражения приподнимается и обе руки отклоняются в ту же сторону.

ШИ́ЛЬДЕРА — ШТЕ́НГЛЯ СИМПТО́М (P. F. Schilder, 1886—1940, амер. невропатолог и психиатр; Stengl; син. asymbolia dolorosa) — утрата рефлексов на болевые раздражения при полной или частичной сохранности восприятия боли; наблюдается при поражении коры теменной доли большого мозга.

ШИМАНО́ВСКОГО РИНОПЛА́СТИКА (Ю. К. Шимановский, 1829—1868, отеч. хирург) — ринопластика с использованием лоскута, выкроенного из лобной кости, в качестве опоры для мягких тканей, предупреждающей западение сформированного носа.

ШИ́МАНСА — ДА́НСА СИМПТО́М (J. B. H. Dance, 1797—1832, франц. врач) — ощущение пустоты, возникающее при пальпации в правой подвздошной области; признак илеоцекальной инвагинации, обусловленный перемещением инвагинированного участка кишки в правое подреберье.

ШИММЕЛЬБУША БОЛЕ́ЗНЬ (C. Schimmelbusch, 1860—1895, нем. хирург) — см. *Мастопатия кистозно-пролиферативная.*

ШИММЕЛЬБУША РИНОПЛА́СТИКА (C. Schimmelbusch) — метод ринопластики, при к-ром нос формируют из кожно-надкостнично-костного лоскута, выкроенного из тканей лобной области, а носовую перегородку — из кожи краев грушевидного отверстия.

ШИ́НА (нем. Schiene) в медицине — приспособление, изготовленное из дерева, металла, гипсового бинта или другого материала, предназначенное для иммобилизации конечностей при повреждениях и заболеваниях костей и суставов или при обширных повреждениях мягких тканей.

Ш. АБДУКЦИО́ННАЯ — см. *Шина отводящая.*

Ш. ГИ́ПСОВАЯ — см. *Повязка гипсовая открытая.*

Ш. ОТВОДЯ́ЩАЯ (син. Ш. абдукционная) — Ш. для фиксации плеча в положении отведения от среднего физиологического до максимального.

Ш. ПНЕВМАТИ́ЧЕСКАЯ — транспортная Ш., представляющая собой мешок из эластичной ткани, в который нагнетают воздух.

Ш. СЕ́КТОРНАЯ — Ш., части которой соединены шарниром, обеспечивающим возможность постепенного периодического изменения фиксированного положения сустава.

Ш. ТЕРМОПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ — Ш., изготовленная из пластмассы, к-рая сохраняет форму, приданную ей при наложении в подогретом состоянии на конечность.

Ш. ТРА́НСПОРТНАЯ — Ш., предназначенная для временной иммобилизации на период транспортировки пораженного (пострадавшего, больного).

ШИ́НА-ЛО́ЖКА — стоматологический инструмент в виде металлического корытца, имеющего форму челюсти; применяется для временной иммобилизации верхней челюсти при переломах.

ШИ́НА-ТРАНСПЛАНТА́Т — костный ауто- или аллотрансплантат небольших размеров, к-рый укладывают при остеосинтезе на кость в месте перелома и фиксируют проволокой к отломкам.

ШИНДИЛЕ́З (schindylosis) — см. *Схиндилез.*

ШИНИ́РОВАНИЕ — иммобилизация с помощью шины (шин).

ШИНКАРЕ́НКО — МО́ХОВА ПРО́БА (И. П. Шинкаренко, 1917—1979, сов. токсиколог; Л. А. Мохов, совр. сов. токсиколог) — метод обнаружения паров этилового алкоголя в выдыхаемом воздухе по изменению оранжевой окраски индикатора, находящегося в трубке, через к-рую испытуемый производит выдох, в зеленый цвет.

ШИ́НЦА СИМПТО́М (H. R. Schinz) — наличие полоски просветления на рентгенограмме длинной трубчатой кости в области границы между эпифизом и метафизом; рентгенологический симптом гнойного артрита.

ШИ́НЦИНГЕРА — МА́ДЕЛУНГА СПО́СОБ (Schinzinger; O. W. Madelung, 1846—1926, нем. хирург) — хирургическая операция наложения anus praeternaturalis, при к-рой пересекают сигмовидную кишку, ее дистальный конец ушивают и погружают в брюшную полость, а проксимальный конец вшивают в рану брюшной стенки.

ШИПО́ ТРЕУГО́ЛЬНИК (A. Chipault, франц. хирург 19 в.) — 1) (истор.) — передневерхний участок сосцевидного отростка, ограниченный горизонтальной линией, проведенной через середину задней стенки наружного слухового прохода, и вертикальной линией, соответствующей костному гребешку на поверхности сосцевидного отростка; 2) участок сосцевидного отростка, ограниченный сзади вертикальной линией, проходящей через его вершину, сверху — продолжением нижней височной линии теменной кости на чешую височной кости, спереди — линией, идущей от вершины сосцевидного отростка к надпроходной ости (spina suprameatum); предпочтительное место антротомии.

ШИПОВА́ТОСТЬ — см. *Спинулозизм.*

ШИПОВА́ТЫЙ СЛОЙ ЭПИДЕ́РМИСА (stratum spinosum, LNH) — слой шиповатых эпидермоцитов, расположенный между базальным и зернистым слоями эпидермиса.

ШИ́РВИНДТА МИКРОРЕА́КЦИЯ (С. Д. Ширвиндт, совр. сов. дерматолог) — метод экспресс-диагностики сифилиса, основанный на образовании преципитата в смеси небольшого количества сыворотки крови больного сифилисом с цитохолевым антигеном; носит ориентировочный характер, положительный ответ требует подтверждения по принятому комплексу серологических реакций.

ШИРЕ́Я — РОЖЕ́ СИМПТО́М (Chiray; Roger) — невозможность стоять и ходить на пальцах ноги в связи с ее непроизвольным опусканием на пятку; признак поражения корешков спинномозговых нервов на уровне первого крестцового сегмента.

ШИ́РОДКАРА ОПЕРА́ЦИЯ (V. Shirodkar) — хирургическая операция при истмико-цервикальной недостаточности, заключающаяся в наложении кругового шва в области перешейка матки.

ШИРОКОГО́РОВА СИНДРО́М (И. И. Широкогоров, 1869—1946, сов. патологоанатом; син. синдром гепатолиеномедуллярный) — сочетание увеличения веса и объема селезенки и печени с миелоидной метаплазией костного мозга, обнаруживаемое при вскрытии трупов умерших от трехдневной малярии.

ШИРОТА́ ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКОГО ДЕ́ЙСТВИЯ — диапазон доз лекарственного средства от минимальной эффективной до минимальной токсической дозы.

ШИСТОСОМАТО́ЗЫ (нрк) — см. *Шистосомозы.*

SCHISTOSÓMA (шистосомы) — род трематод сем. Schistosomatidae отр. Fasciolidida, паразитирующих в просвете кровеносных сосудов млекопитающих; промежуточные хозяева—моллюски; распространен в тропической зоне; включает виды, активно внедряющиеся в организм человека через кожу или слизистые оболочки при купании в зараженных водоемах или питье зараженной воды.

S. HAEMATÓBIUM — вид трематод рода S., паразитирующих в венах гл. обр. мочевого пузыря человека и обезьян; яйца S. h. выделяются с мочой; возбудитель мочеполового шистосомоза.

S. MÁNSONI — вид трематод рода S., паразитирующих в венах брюшной полости человека и обезьян; яйца S. m. выделяются с калом; возбудитель кишечного шистосомоза.

S. JAPÓNICUM — вид трематод рода S., паразитирующих в венах брюш-

ной полости человека и обезьян; яйца S. j. выделяются с калом; возбудитель японского шистосомоза.

ШИСТОСОМО́ЗЫ (schistosomoses; син.: бильгарциоз, шистосоматозы — нрк) — общее название гельминтозов, вызываемых трематодами рода Schistosoma.

Ш. КИШЕ́ЧНЫЙ (s. intestinalis; син. Мансона шистосомоз) — Ш., вызываемый Schistosoma mansoni, протекающий с явлениями аллергии и повреждения слизистой оболочки толстой кишки мигрирующими яйцами гельминта; распространен в Африке и Южной Америке.

ШИСТОСОМО́З МА́НСОНА — см. *Шистосомоз кишечный.*

Ш. МОЧЕПОЛОВО́Й (s. urogenitalis; син. гематурия египетская) — Ш., вызываемый Schistosoma haematobium, протекающий с признаками повреждения мочевых путей мигрирующими яйцами гельминта; распространен в Африке.

Ш. ЯПО́НСКИЙ (s. japonica; син. болезнь Катаямы) — Ш., вызываемый Schistosoma japonicum, протекающий с явлениями аллергии, а позже колита, иногда гепатита с развитием цирроза печени; распространен в Японии, Китае, на Филиппинских островах.

ШИСТОСО́МЫ — см. *Schistosoma.*

ШИ́ФФА РЕАКТИ́В (H. Schiff, 1834—1915, нем. биохимик) — реактив для качественного определения альдегидной группы органических веществ, представляющий собой раствор фуксинсернистой кислоты; используется для гистохимического выявления углеводов и дезоксирибонуклеиновой кислоты.

ШИ́ХЕНА СИНДРО́М (H. L. Sheehan, род. в 1900 г., англ. патолог) — 1) сочетание аменореи, атрофии половых органов, агалактии, эмоциональной лабильности с преобладанием меланхолии и апатии, обусловленное некрозом клеток аденогипофиза при некомпенсированной кровопотере во время родов; 2) см. *Атаксия мозжечковая с гипогонадизмом.*

ШИШКОВИ́ДНОЕ ТЕ́ЛО (corpus pineale, PNA, BNA, JNA; син.: железа пинеальная, железа шишковидная, придаток мозга верхний, эпифиз) — железа внутренней секреции, представляющая собой образование треугольновальной формы, расположенное в промежуточном мозге (в области эпиталамуса).

ШИШКОВИ́ДНЫЙ КАРМА́Н — выпячивание верхней стенки III желудочка головного мозга, возникающее на 7-й неделе внутриутробного развития и представляющее собой зачаток шишковидного тела.

ШКО́ДЫ СИМПТО́М (J. Škoda, 1805—1881, чешский терапевт; син. Шкоды тимпанит) — тимпанический перкуторный звук над участком легкого, расположенным выше зоны перкуторной тупости, возникшей в результате массивного экссудативного плеврита или крупозной пневмонии в стадии опеченения; обусловлен викарной эмфиземой несдавленных участков легкого.

ШКО́ДЫ ТИМПАНИ́Т (J. Škoda) — см. *Шкоды симптом.*

ШКО́ЛА-ИНТЕРНА́Т (син. детский интернат) — общеобразовательная школа с общежитием для учащихся, гл. обр. для детей-сирот или детей с физическими или умственными недостатками.

ШКО́ЛА МАТЕРИ́НСТВА — форма санитарно-просветительной работы, заключающаяся в коллективном обучении беременных женщин и молодых матерей правилам ухода за ребенком и его воспитания; проводится в женской консультации, родильном доме, детской поликлинике по специальной программе.

ШКО́ЛЬНИКОВА КО́СТНЫЙ ШОВ (Л. Г. Школьников, сов. травматолог-ортопед) — остеосинтез костных отломков консервированной пуповиной.

ШКО́ЛЬНИКОВА НОВОКАИ́НОВАЯ БЛОКА́ДА (Л. Г. Школьников) — см. *Школьникова — Селиванова — Цодыкса блокада.*

ШКО́ЛЬНИКОВА — СЕЛИВА́НОВА — ЦО́ДЫКСА БЛОКА́ДА (Л. Г. Школьников, сов. травматолог-ортопед; В. П. Селиванов; В. М. Цодыкс; син. Школьникова новокаиновая блокада) — новокаиновая блокада при переломах костей таза; заключается во введении 300—600 *мл* 0,25% раствора новокаина в клетчатку полости таза через прокол в области передней верхней ости подвздошной кости.

ШЛА́КОВЫЕ ВО́ДЫ — жидкие отходы чугунолитейного производства, образующиеся в результате гашения шлака; применяются с лечебной целью в виде ванн.

ШЛАММ ЖЁЛЧНЫЙ — см. *Желчный шламм.*

ШЛА́НГЕ СИМПТО́М (H. Schlange, 1856—1922, нем. хирург) — полное отсутствие перистальтических шумов при аускультации живота; признак пареза кишечника.

ШЛАПОБЕ́РСКОГО — ГЛЕ́ЗЕРА АНЕСТЕ́ЗИЯ (В. Я. Шлапоберский, 1901—1966, сов. хирург; М. Ю. Глезер; син. Глезера анестезия) — проводниковая анестезия плечевого сплетения введением раствора анестезирующего вещества у наружного края грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

ШЛА́ТТЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (C. Schlatter, 1864—1934, швейц. хирург; син. Осгуда — Шлаттера болезнь) — остеохондропатия бугристости большеберцовой кости, проявляющаяся местной болезненной припухлостью; наблюдается чаще у мальчиков 13—17 лет.

ШЛЕ́ЗИНГЕРА СИМПТО́М (H. Schlesinger, 1866—1934, австрийский врач) — см. *Пула симптом.*

ШЛЕ́ЗИНГЕРА — ПУ́ЛА СИМПТО́М (H. Schlesinger, 1866—1934, австрийский врач; E. H. Pool, 1874—1949, амер. хирург) — см. *Пула симптом.*

ШЛЕМ ДЛЯ РАНЕННЫХ В ГО́ЛОВУ — специальная лицевая часть противогаза для защиты органов дыхания, глаз и лица раненных в голову; конструкция шлема исключает давление на пораженную область и обеспечивает возможность ухода за раненым.

ШЛЕ́ММОВ КАНА́Л (F. S. Schlemm, 1795—1858, нем. анатом) — см. *Венозный синус склеры.*

ШЛЕ́ППЕР (нем. Schlepper тягач, буксир) — молекула, являющаяся носителем антигенной детерминанты.

ШЛЕ́ССЕРА МЕ́ТОД ЛЕЧЕ́НИЯ (C. Schlösser, 1857—1925, нем. офтальмолог) — алкоголизация тройничного нерва при его невралгии, производимая через надглазничное, верхнечелюстное и подбородочное отверстия.

ШЛИФ (нем. Schliff) в гистологии — гистологический препарат кости или зуба в виде тонкой полированной пластинки.

ШЛО́ФФЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (H. Schloffer, 1868—1937, австрийский хирург) — 1) оперативный доступ к гипофизу путем вскрытия передней стенки турецкого седла; 2) трехэтапная операция по поводу рака толстой кишки, при к-рой на первом этапе накладывают цекостому (свищ слепой кишки), на втором — резецируют пораженный отдел кишки, на третьем — закрывают цекостому.

ШЛЮЗОВА́НИЕ в гигиене — 1) переход людей из условий повышенного давления воздуха (напр., из кессона) в условия нормального давления через камеру, в к-рой происходит постепенное понижение давления воздуха; необходимо для предотвращения кессонной болезни; 2) переход людей или перемещение оборудования и материалов из условий загрязненной воздушной среды в помещения с чистым воздухом и обратно, осуществляемое через вентилируемые камеры, препятствующие проникновению загрязненного воздуха.

ШМЕЛЁВА — ПИРКЕ́ ПРО́БА (Н. А. Шмелев, 1899—1976, сов. фтизиатр; C. P. Pirquet, 1874—1929, австрийский врач; син. туберкулиновая проба градуированная) — модификация пробы Пирке с использованием четырех различных разведений туберкулина; применяется для оценки активности туберкулезного процесса.

ШМЕ́РЦА КЛЕ́ММА (H. Schmerz, род. в 1880 г., австрийский хирург) — инструмент для скелетного вытяжения за пяточную кость, представляющий собой фигурно изогнутую скобу из пружинной проволоки, концы к-рой заострены для введения с двух сторон в кость.

ШМИ́ДЕНА ГРЫЖЕСЕЧЕ́НИЕ (истор.; V. Schmieden, 1874—1946, нем. хирург) — способ грыжесечения при прямой паховой грыже; заключается в извлечении яичка с семенным канатиком из мошонки и перемещении их обратно через отверстие, проделанное во внутренней косой и поперечной мышцах, с последующим зашиванием апоневроза наружной косой мышцы.

ШМИ́ДЕНА КИШЕ́ЧНЫЙ ШОВ (V. Schmieden) — непрерывный шов через все слои кишечной стенки, при к-ром иглу вкалывают только со стороны слизистой оболочки, в результате чего после затягивания шва слизистая оболочка оказывается полностью вывернутой в просвет кишки.

ШМИ́ДЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (V. Schmieden) — резекция локтевого сустава с последующим помещением между плечевой костью и костями предплечья лоскута на ножке, выкроенного из трехглавой мышцы и подшитого к двуглавой мышце плеча.

ШМИ́ДЕНА ШОВ (V. Schmieden; син. шов непрерывный вворачивающий) — хирургический шов, каждый стежок к-рого накладывают на стенку раны изнутри наружу и затягивают снаружи.

ШМИ́ДЕНА — ГЕ́РТЕЛЯ ШИ́НА (V. Schmieden, 1874—1946, нем. хирург; F. F. Härtel, род. в 1877 г., нем. хирург) — гипсовая повязка для фиксации головы и шейного отдела позвоночника.

ШМИ́ДТА РЕА́КЦИЯ (A. Schmidt, 1865—1918, нем. терапевт; син. Шмидта сулемовая проба) — метод обнаруже-

ния стеркобилина в кале, основанный на его взаимодействии с сулемой, приводящем к появлению розовой окраски.

ШМИ́ДТА РЕФЛЕ́КС (R. Schmidt, 1873—1945, нем. терапевт) — фасцикулярное подергивание мышц брюшной стенки на высоте вдоха у больного с начинающимся диафрагмальным плевритом.

ШМИ́ДТА СИНДРО́М (A. Schmidt, 1865—1918, нем. терапевт) — бульбарный альтернирующий синдром: сочетание паралича (пареза) мягкого неба, голосовой складки, трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышц с гемипарезом или гемиплегией на противоположной стороне тела.

ШМИ́ДТА СУЛЕ́МОВАЯ ПРО́БА (A. Schmidt, 1865—1918, нем. терапевт) — см. *Шмидта реакция*.

ШМИ́ДТА — ЛА́НТЕРМАННА НАСЕ́ЧКА (H. D. Schmidt, 1823—1888, амер. анатом; A. J. Lantermann, 1860—1920, нем. анатом) — см. *Насечка миелина*.

ШМИ́НКЕ О́ПУХОЛЬ (A. Schmincke, 1877—1953, нем. патолог, син.: лимфоэпителиома, рак миндалин эпидермальный, Шминке саркома) — злокачественная опухоль миндалин, состоящая из лимфоидных и эпителиальных клеток.

ШМИ́НКЕ САРКО́МА (A. Schmincke, 1877—1953, нем. патолог) — см. *Шминке опухоль*.

ШМО́РЛЯ БОЛЕ́ЗНЬ (Ch. G. Schmorl, 1861—1932, нем. патолог) — см. *Шейерманна — Мау болезнь*.

ШМО́РЛЯ ГРЫ́ЖА (Ch. G. Schmorl; син.: Шморля узелок, Шморля узелок хрящевой) — внедрение хрящевой ткани из межпозвоночного диска в губчатую кость тела позвонка при остеохондрозе позвоночника.

ШМО́РЛЯ ОКРА́СКА (Ch. G. Schmorl) — метод выявления остеоцитов путем окраски препаратов костной ткани тионином с пикриновой или фосфорно-вольфрамовой кислотой после декальцинации кости.

ШМО́РЛЯ УЗЕЛО́К (Ch. G. Schmorl) — см. *Шморля грыжа*.

ШМО́РЛЯ УЗЕЛО́К ХРЯЩЕВО́Й (Ch. G. Schmorl) — см. *Шморля грыжа*.

ШНЕ́ЙДЕРА ДЕПРЕ́ССИЯ ПО́ЧВЫ (K. Schneider, 1887—1967, нем. психиатр) — см. *Депрессия почвы*.

ШНЕ́ЙДЕРА ПЕРВИ́ЧНЫЙ БРЕД ОТНОШЕ́НИЯ (K. Schneider) — систематизированный бред отношения или преследования, протекающий без галлюцинаций и длительно выступающий как единственное проявление психоза.

ШНЕ́ЙДЕРА ПСИХО́ЗЫ СОМАТИ́ЧЕСКИ ОБУСЛО́ВЛЕННЫЕ (K. Schneider) — общее название психозов, возникающих при болезнях внутренних органов, интоксикациях и органических поражениях ц. н. с.; проявляются при остром течении преимущественно экзогенными типами реакций, а при хроническом — симптомами, напоминающими шизофрению или маниакально-депрессивный психоз, и снижением уровня личности вплоть до слабоумия.

ШНЕ́ЙДЕРА СИМПТО́МЫ ВТОРО́ГО РА́НГА (K. Schneider) — признаки шизофрении, обладающие второстепенным или относительным значением для диагностики болезни, напр. многие виды галлюцинаций и бреда, аффективные нарушения, растерянность.

ШНЕ́ЙДЕРА СИМПТО́МЫ ПЕ́РВОГО РА́НГА (K. Schneider) — признаки шизофрении, имеющие первостепенное значение для диагностики болезни, хотя и не патогномоничные для нее, напр. первичный бред отношения, вербальные галлюцинации в форме диалога и комментирующих голосов, синдром Кандинского — Клерамбо.

ШНИ́ДЕРА ДЕГЕНЕРА́ЦИЯ РОГОВИ́ЦЫ (W. Schnyder, род. в 1892 г., швейц. офтальмолог) — наследственная болезнь, проявляющаяся дисковидными помутнениями в центре роговицы; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

ШНИ́ТЦЛЕРА МЕТАСТА́З (J. Schnitzler, род. в 1865 г., австрийский хирург) —метастаз рака, расположенный в клетчатке малого таза между мочевым пузырем (или маткой) и прямой кишкой; признак рака какого-либо органа пищеварительного тракта, чаще желудка.

ШО́БА БОЛЕ́ЗНЬ (Schob) — атрофия одной половины головного мозга, гл. обр. за счет уменьшения третьего слоя коры полушария большого мозга, проявляющаяся психическим недоразвитием и эпилепсией.

ШОВ[1] хирургический (sutura chirurgica) — соединение тканей и краев раны с помощью хирургических инструментов и шовного материала.

Ш. БЛО́КОВЫЙ (син. Ш. полиспастный) — узловой Ш. с использованием особо прочной нити, проводимой через толщу обоих краев раны дважды, каждый раз охватывая неподатливые ткани (напр., ребро); применяется, когда затруднено сближение краев раны.

Ш. БОКОВО́Й — Ш., накладываемый на значительную часть окружности трубчатого органа или поверхности другого анатомического образования.

Ш. ВТОРИ́ЧНЫЙ — Ш., накладываемый на гранулирующую рану.

Ш. ВТОРИ́ЧНЫЙ ПО́ЗДНИЙ — Ш., накладываемый на рану 15—30-дневной, иногда большей давности после иссечения кожи, грануляций рубцов, измененных тканей и мобилизации краев раны.

Ш. ВТОРИ́ЧНЫЙ РА́ННИЙ — Ш., накладываемый на рану 8—15-дневной давности без предварительного иссечения грануляций и мобилизации краев раны.

Ш. ВЫВОРА́ЧИВАЮЩИЙ — Ш., наложением к-рого добиваются выворачивания краев раны (скорняжный Ш., матрацный Ш., Ш. кровеносного сосуда и др.).

Ш. ГЕМОСТАТИ́ЧЕСКИЙ — Ш., стежки к-рого захватывают и сдавливают кровеносные сосуды, расположенные в прошиваемых тканях; средство окончательной остановки кровотечения или уменьшения кровопотери при хирургической операции.

Ш. ГЕМОСТАТИ́ЧЕСКИЙ ЦЕПО́ЧЕЧНЫЙ — Ш. г., накладываемый нитью с двумя иглами, к-рые проводят через края раны крест-накрест, образуя петли обвивного Ш.

Ш. ЗАХЛЕ́СТЫВАЮЩИЙ — см. *Шов обвивной*.

Ш. ИНВАГИНИ́РУЮЩИЙ (син. Ш. погружающий) — Ш. (ряд швов), наложенный на стенку полого органа поверх ранее наложенного Ш. (напр., серо-серозный кишечный Ш. поверх серозно-мышечного).

Ш. КИСЕ́ТНЫЙ — непрерывный Ш., накладываемый вокруг отверстия или дефекта стенки какого-либо органа; при затягивании Ш. происходит погружение края обшитого отверстия в просвет органа либо его гофрирование.

Ш. КИШЕ́ЧНЫЙ — Ш., накладываемый на кишечную стенку.

Ш. КИШЕ́ЧНЫЙ Z-ОБРА́ЗНЫЙ — инвагинирующий серо-серозный Ш. к., накладываемый последовательным проведением нити через четыре попарно противолежащие точки кишки.

Ш. КИШЕ́ЧНЫЙ СЕРО́ЗНО-МЫШЕЧНЫЙ (син. Ш. кишечный серозо-мускулярный) — Ш. к., при наложении к-рого вместе с серозной оболочкой захватывают и мышечную оболочку кишки.

Ш. КИШЕ́ЧНЫЙ СЕРО́ЗО-МУСКУЛЯ́РНЫЙ — см. *Шов кишечный серозно-мышечный*.

Ш. КИШЕ́ЧНЫЙ СЕ́РО-СЕРО́ЗНЫЙ ИНВАГИНИ́РУЮЩИЙ — узловой или непрерывный Ш. к. с проведением нити только через серозную оболочку кишки, несколько отступя от краев дефекта.

Ш. КОРНЕОСКЛЕРА́ЛЬНЫЙ — узловой или непрерывный Ш., к-рым сшивают края роговицы и склеры после экстракции катаракты или при проникающих ранениях в области лимба роговицы.

Ш. КРУГОВО́Й (син. Ш. циркулярный) — Ш., к-рым соединяют по всей окружности концы трубчатого органа (мочеиспускательного канала, кровеносного сосуда и др.)., нервного ствола или другого анатомического образования.

Ш. ЛИНЕ́ЙНЫЙ — Ш., стежки к-рого расположены по одной линии.

Ш. МАТРА́ЦНЫЙ — непрерывный Ш., при наложении к-рого иглу выводят из ткани на ту же сторону края раны, где ее вводят, а следующий стежок делают на другом крае, вследствие чего нить на поверхности кожи ложится параллельно краям раны, а внутри раны — перпендикулярно к ним.

Ш. МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ — Ш., при наложении к-рого используют металлические материалы или изделия из металла (напр., скобки).

Ш. МЕХАНИ́ЧЕСКИЙ СКО́БОЧНЫЙ — Ш., при наложении к-рого ткани соединяют металлическими скобками с помощью полуавтоматических сшивающих аппаратов.

Ш. НАПРАВЛЯЮЩИЙ — см. *Шов ситуационный*.

Ш. НЕПРЕРЫВНЫЙ — Ш., накладываемый одной нитью на всю рану.

Ш. НЕПРЕРЫВНЫЙ ВВОРА́ЧИВАЮЩИЙ — см. *Шмидена шов*.

Ш. НЕПРЕРЫВНЫЙ ВНУТРИКО́ЖНЫЙ КОСМЕТИ́ЧЕСКИЙ — Ш. н., каждый стежок к-рого накладывают не выходя на поверхность кожи, параллельно ей и на одинаковой глубине.

Ш. НЕ́РВА (син. неврорафия) — Ш., накладываемый на поврежденный нерв.

Ш. НЕ́РВА ИНТЕРФАСЦИКУЛЯ́РНЫЙ — Ш. н., накладываемый на

оболочки отдельных пучков нервных волокон с их сопоставлением.
Ш. НЕ́РВА ЭНДОНЕВРА́ЛЬНЫЙ — Ш., накладываемый на эндоневрий.
Ш. НЕ́РВА ЭПИНЕВРА́ЛЬНЫЙ — Ш. н., накладываемый на эпиневрий.
Ш. ОБВИВНО́Й — 1) (син.: Мультановского шов, Ш. захлестывающий) — непрерывный Ш., каждый стежок к-рого захлестывают петлей, благодаря чему натяжение нити не передается на ранее наложенные стежки; 2) (истор.) — Ш., при наложении к-рого сближенные края прокалывали прямой иглой и ее выступающие концы обвивали несколькими 8-образными ходами шелковой нити.
Ш. ОДНОЭТА́ЖНЫЙ (син. Ш. одноярусный) — Ш., при наложении к-рого захватывают все слои тканей, подлежащие соединению.
Ш. ОДНОЯ́РУСНЫЙ — см. *Шов одноэтажный.*
Ш. ПЕРВИ́ЧНЫЙ — Ш., накладываемый на рану непосредственно после первичной хирургической обработки или на свежую операционную рану.
Ш. ПЕРВИ́ЧНЫЙ ОТСРО́ЧЕННЫЙ — Ш., наложенный на рану во время ее первичной хирургической обработки или операции, но затягиваемый через 24—72 часа при отсутствии клинических признаков раневой инфекции.
Ш. ПЛАСТИ́НОЧНЫЙ — узловой Ш., при наложении к-рого нити завязывают поверх металлических пластинок, пуговиц, марлевых валиков; применяется для предупреждения прорезывания нитей при значительном натяжении краев раны.
Ш. ПОГРУЖА́ЮЩИЙ — см. *Шов инвагинирующий.*
Ш. ПОГРУЖНО́Й — Ш., накладываемый в глубине раны (напр., на внутренние органы, мышцы), причем шовный материал впоследствии не снимают.
Ш. ПОЛИСПА́СТНЫЙ — см. *Шов блоковый.*
Ш. ПОСЛО́ЙНЫЙ — Ш., к-рым поочередно раздельно сшивают одноименные слои тканей, образующие края раны.
Ш. ПОЭТА́ЖНЫЙ — послойный Ш., накладываемый на стенки органов пищеварительного тракта.
Ш. ПРОВИЗО́РНЫЙ — Ш., накладываемый временно при выполнении какого-либо этапа операции или оперативного приема с последующим удалением шовного материала.
Ш. ПРОВИЗО́РНЫЙ ГЕМОСТАТИ́ЧЕСКИЙ (син. Гейденгайна цепочечный шов) — непрерывный Ш., накладываемый вокруг области предстоящего разреза на волосистой части головы с целью сдавления мягких тканей и предупреждения кровотечения во время операции.
Ш. РУЧНО́Й — Ш., накладываемый без использования сшивающего аппарата.
Ш. СВИНЦО́ВО-ШЁЛКОВЫЙ (истор.) — см. *Пирогова шов.*
Ш. СИТУАЦИО́ННЫЙ (син. Ш. направляющий) — узловой Ш. (несколько швов), накладываемый на рану сложной конфигурации в первую очередь, чтобы сблизить и правильно сопоставить края раны перед наложением Ш. по всему ее протяжению.
Ш. СКВОЗНО́Й — Ш., при наложении к-рого нить проводят через кожу и все более глубокие слои стенки раны.
Ш. СКОРНЯ́ЖНЫЙ — непрерывный Ш., при наложении к-рого иглу проводят через оба края раны таким образом, что нить на поверхности ложится под углом к краям, а внутри раны — перпендикулярно к ним.
Ш. СОСУДИ́СТЫЙ — Ш., накладываемый на стенку кровеносного сосуда.
Ш. СОСУ́ДИСТЫЙ ПРИСТЕ́НОЧНЫЙ — Ш. с., накладываемый на небольшой дефект стенки кровеносного сосуда.
Ш. СОСУ́ДИСТЫЙ ТРАНСВЕНО́ЗНЫЙ — Ш. с., накладываемый при артериовенозной аневризме на дефект стенки артерии из просвета сообщающейся с ней вены.
Ш. СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ — Ш., накладываемый на сухожилие для восстановления его целости.
Ш. СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ВНУТРИСТВО́ЛЬНЫЙ — Ш. с., при наложении к-рого нить проводят в толще обеих соединяемых частей сухожилия; при затягивании шва узлы погружаются между концами сухожилия или остаются на поверхности.
Ш. СЪЁМНЫЙ — Ш., при наложении к-рого предусматривают удаление шовного материала после заживления раны.
Ш. УЗДЕ́ЧКОВЫЙ Э́ЛЬШНИГА — см. *Эльшнига уздечковый шов.*
Ш. УЗЛО́ВОЙ — Ш., каждый стежок к-рого проводят отдельным отрезком нити и фиксируют узлом.
Ш. ЦЕПО́ЧЕЧНЫЙ ГЕЙДЕНГАЙНА — см. *Шов провизорный гемостатический.*
Ш. ЦИРКУЛЯ́РНЫЙ — см. *Шов круговой.*

ШОВ[2] черепа (sutura cranii, PNA, BNA, JNA; син. Ш. черепной) — фиброзное соединение прилегающих краев костей черепа.
Ш. ВЕНЕ́ЧНЫЙ (s. coronalis, PNA, BNA; s. coronaria, JNA) — Ш., соединяющий лобную и теменные кости.
Ш. ГАРМО́НИЙНЫЙ — см. *Шов ровный.*
Ш. ЗУ́БЧАТЫЙ (s. serrata, PNA, BNA, JNA; s. dentata) — Ш., соединяющий кости, края к-рых имеют зубцы (большинство костей свода черепа).
Ш. КЛИНОВИ́ДНО-СОШНИКО́ВЫЙ (s. sphenovomeriana, PNA) — Ш., соединяющий сошник с нижней поверхностью тела клиновидной кости.
Ш. ЛАМБДОВИ́ДНЫЙ (s. lambdoidea, PNA, BNA; s. lambdoides, JNA) — Ш., соединяющий чешую затылочной кости с теменными костями.
Ш. ЛО́БНЫЙ (s. frontalis, PNA, BNA, JNA; син. Ш. метопический) — непостоянный Ш., соединяющий по средней линии парные закладки лобной кости, не до конца сросшиеся.
Ш. МЕТОПИ́ЧЕСКИЙ (s. metopica) — см. *Шов лобный.*
Ш. РЕЗЦО́ВЫЙ (s. incisiva, PNA, BNA, JNA) — непостоянный Ш., соединяющий верхнюю челюсть с резцовой (межчелюстной) костью при ее обособлении или неполном сращении; обычно имеет вид борозды, расположенной в передней части твердого неба.
Ш. РО́ВНЫЙ (s. plana, PNA, BNA, JNA; син. Ш. гармонийный) — Ш., соединяющий кости черепа, имеющие ровные края.
Ш. САГИТТА́ЛЬНЫЙ (s. sagittalis, PNA, BNA, JNA; син. Ш. стреловидный) — Ш., соединяющий между собой правую и левую теменные кости.
Ш. СТРЕЛОВИ́ДНЫЙ — см. *Шов сагиттальный.*
Ш. ЧЕРЕПНО́Й — см. *Шов*[2].
Ш. ЧЕШУ́ЙЧАТЫЙ (s. squamosa, PNA, BNA; s. parietotemporalis, JNA) — Ш., соединяющий скошенные, налегающие один на другой края височной чешуи и теменной кости.

ШОВ КО́СТНЫЙ (sutura ossea) — см. *Остеосинтез.*

ШОВ-ДЕРЖА́ЛКА — длинная лигатура, проведенная через ткани, к-рую захватывают зажимом и натягивают в определенном направлении, чтобы облегчить последующие манипуляции хирурга, напр. вскрытие просвета полого органа.

ШО́ВНЫЙ МАТЕРИА́Л — общее название материалов, применяемых для соединения краев раны или для перевязки сосудов (напр., шелк, кетгут, лавсан, нейлон, капрон, конский волос, танталовая и кобальтовая проволока).

ШОК (франц. choc) — остро развивающийся, угрожающий жизни патологический процесс, обусловленный действием на организм сверхсильного патологического раздражителя и характеризующийся тяжелыми нарушениями деятельности ц. н. с., кровообращения, дыхания и обмена веществ.
Ш. АБДОМИНА́ЛЬНЫЙ — болевой Ш., обусловленный нек-рыми острыми патологическими процессами в органах брюшной полости (напр., прободением язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, острой непроходимостью кишечника).
Ш. АДРЕНАЛИ́НОВЫЙ — Ш., возникший в результате введения в организм большой дозы адреналина.
Ш. АНАФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ — Ш., возникающий как резко выраженное проявление анафилаксии или атопии.
Ш. АНАФИЛАКТО́ИДНЫЙ — Ш., возникающий как резко выраженное проявление анафилактоидной реакции.
Ш. БАКТЕРИЕМИ́ЧЕСКИЙ — токсический Ш. при бактериемии, обусловленный попаданием в кровь большой дозы бактериальных токсинов.
Ш. БОЛЕВО́Й — Ш., обусловленный сильным болевым раздражением, напр. при травме.
Ш. ГЕМОЛИТИ́ЧЕСКИЙ — Ш., возникающий при интенсивном гемолизе, напр. во время переливания несовместимой крови.
Ш. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ — Ш., вызванный значительной острой кровопотерей.
Ш. ГЕМОТРАНСФУЗИО́ННЫЙ (син. Ш. посттрансфузионный) — Ш., возникающий в случае переливания несовместимой крови как крайнее выражение посттрансфузионной реакции.

Ш. ГИПОГЛИКЕМИ́ЧЕСКИЙ — Ш., возникающий при резком снижении содержания глюкозы в крови, напр. после введения в организм или избыточного образования в нем инсулина.

Ш. ИНФЕКЦИО́ННО-ТОКСИ́ЧЕСКИЙ — токсический Ш. при инфекционной болезни, вызванный воздействием на организм большой дозы токсинов возбудителей болезни и (или) продуктов распада поврежденных тканей организма.

Ш. КАРДИОГЕ́ННЫЙ (син. коллапс кардиогенный) — Ш., возникающий как осложнение инфаркта миокарда.

Ш. КОЛЛОИДОКЛАСТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Коллоидоклазия.*

Ш. НЕФРОГЕ́ННЫЙ — болевой Ш., возникающий при почечной колике.

Ш. ОЖО́ГОВЫЙ — травматический Ш. при обширном ожоге.

Ш. ОПЕРАЦИО́ННЫЙ — травматический Ш., развивающийся во время хирургической операции, напр. при массивной кровопотере или недостаточном обезболивании.

Ш. ОПЕРАЦИО́ННЫЙ ВТОРИ́ЧНЫЙ — см. *Шок послеоперационный.*

Ш. ПЛЕВРОПУЛЬМОНА́ЛЬНЫЙ — травматический Ш., возникающий при повреждении (в т. ч. во время хирургической операции) в области грудной клетки и органов грудной полости вследствие чрезмерного раздражения рецепторов висцеральной и париетальной плевры.

Ш. ПОСЛЕОПЕРАЦИО́ННЫЙ (син. Ш. операционный вторичный) — Ш., развивающийся как проявление послеоперационных осложнений.

Ш. ПОСТТРАНСФУЗИО́ННЫЙ — см. *Шок гемотрансфузионный.*

Ш. ТОКСИ́ЧЕСКИЙ — Ш., обусловленный воздействием на организм токсических продуктов распада тканей или бактериальных токсинов, напр. при травматическом токсикозе, бактериемии.

Ш. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ — Ш., возникающий в результате травмы.

ШОК АКУШЕ́РСКИЙ (истор.) — общее название состояний, характеризующихся потерей сознания роженицей и обусловленных психическим и физическим перенапряжением, страхом, переутомлением или чрезмерной болезненностью схваток.

ШОК АФФЕКТИ́ВНЫЙ — см. *Шок психический.*

ШОК АЦЕТИЛХОЛИ́НОВЫЙ — припадок с кратковременной потерей сознания (без судорог), изменением частоты сердечных сокращений и дыхания, а также окраски кожных покровов, учащением мочеиспускания и другими вегетативными сдвигами; возникает при внутривенном введении бромацетилхолина с целью лечения шизофрении.

ШОК ГРАВИТАЦИО́ННЫЙ в спортивной медицине — совокупность функциональных расстройств, возникающих в организме бегуна после резкого прекращения бега и проявляющихся побледнением, тошнотой, потливостью, тахикардией, иногда обмороком.

ШОК ЗАТЯНУ́ВШИЙСЯ (син. кома затянувшаяся) — длительное коматозное или глубокое сопорозное состояние, возникшее при инсулинотерапии у больных шизофренией, сохраняющееся и при нормализации уровня глюкозы в крови.

ШОК ИНСУЛИ́НОВЫЙ (син. кома инсулиновая) — коматозное состояние на фоне гипогликемии, возникающее у психически больного при проведении ему инсулинотерапии.

ШОК МИКРО́БНЫЙ — тяжелое заболевание, развивающееся у безмикробных животных при внезапной встрече с обычной микрофлорой окружающей среды.

ШОК ОТСРО́ЧЕННЫЙ (син. кома отсроченная) — 1) повторное возникновение выраженной гипогликемии вплоть до гипогликемической комы спустя несколько часов после выведения больного из состояния инсулинового шока при лечении шизофрении; 2) развитие эпилептиформного припадка с потерей сознания при электросудорожной терапии не сразу после включения электрического тока, а спустя 10—60 сек.

ШОК ПСИХИ́ЧЕСКИЙ (син.: паралич эмоциональный — устар., шок аффективный, шок эмоциональный) — реактивный психоз, возникающий при внезапных угрожающих жизни обстоятельствах или ситуациях, влекущих за собой появление резкого аффекта страха, и проявляющийся в форме либо беспорядочного двигательного возбуждения, либо ступора.

ШОК СПИНА́ЛЬНЫЙ — временное резкое падение возбудимости нервных центров, расположенных ниже уровня повреждения спинного мозга, проявляющееся ослаблением соответствующих спинномозговых рефлексов.

ШОК ТОНКОКИШЕ́ЧНЫЙ — сочетание частых позывов на дефекацию и обильного поноса с головокружением, дрожанием рук, иногда с развитием коллапса; наблюдается при энтерите.

ШОК ЦИТРА́ТНЫЙ — сочетание снижения артериального давления, одышки, тахикардии и болей в сердце, возникающих при переливании больших количеств цитратной крови; обусловлено нарушением кислотно-щелочного равновесия в организме.

ШОК ЭМОЦИОНА́ЛЬНЫЙ — см. *Шок психический.*

ШО́КВИСТА ОПЕРА́ЦИЯ (O. Sjoqvist, 1901—1955, шведский нейрохирург) — см. *Шекеиста операция.*

ШО́ЛЬЦА — БИЛЬШО́ВСКОГО БОЛЕ́ЗНЬ (W. Scholz, род. в 1889 г., нем. невролог и психиатр; M. Bielschowsky, 1869—1940, нем. морфолог) — форма болезни Шоба с медленно прогрессирующим течением, проявляющаяся у детей в возрасте 8—11 лет судорогами, деменцией, корковой глухотой, расстройствами артикуляции, парезами черепных нервов, центральными параличами, хореоатетозом, снижением остроты зрения.

ШО́ЛЬЦА — ВАН-БО́ГАРТА БОЛЕ́ЗНЬ (W. Scholz, род. в 1889 г., нем. невролог и психиатр; L. Van Bogaert, род. в 1897 г., бельгийский невропатолог) — форма болезни Шоба, проявляющаяся у детей в возрасте 2—4 лет эпилептическими припадками, псевдобульбарными расстройствами, спастическими парезами и децеребрационной ригидностью в конечной стадии болезни.

ШО́ЛЬЦА — ГРИНФИЛДА ЛЕЙКОДИСТРОФИ́Я (W. Scholz, род. в 1889 г., нем. невролог и психиатр; J. G. Greenfield, 1884—1958, англ. невропатолог) — см. *Лейкодистрофия метахроматическая.*

ШО́МОДЬИ МЕ́ТОД (M. Somogyi, 1883—1971, амер. биохимик) — метод определения активности амилазы в сыворотке крови, основанный на количественном определении глюкозы (с помощью реактива Бенедикта), образовавшейся из добавленного крахмала.

ШО́НА СИНДРО́М (J. D. Shone, совр. амер. кардиолог) — врожденный порок сердца: недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана вследствие отхождения сухожильных хорд от одной сосочковой мышцы, локальная гипертрофия миокарда левого предсердия, ведущая к сужению левого предсердно-желудочкового отверстия, стеноз отверстия аорты и ее коарктация.

ШОПА́РА АМПУТА́ЦИЯ (F. Chopart, 1743—1795, франц. хирург) — ампутация стопы по линии поперечного сустава предплюсны (шопарова сустава) с сохранением пяточной, таранной кости и части плюсны и закрытием культи подошвенным лоскутом.

ШОПА́РА МЕ́ТОД (F. Chopart) — метод предупреждения отвисания культи стопы после ампутации по Шопару, заключающийся в подшивании сухожилий разгибателей стопы и пальцев к таранной и пяточной костям.

ШОПА́РОВ СУСТА́В (F. Chopart) — см. *Сустав предплюсны поперечный.*

ШО́РА СПО́СОБ ВСКРЫ́ТИЯ (Г. В. Шор, 1872—1948, сов. патологоанатом; син. метод полной эвисцерации) — способ вскрытия трупа, при к-ром внутренние органы извлекают единым комплексом.

ШО́ТТЕРА ИНСТРУМЕ́НТЫ (Л. Х. Шоттер, род. в 1917 г., сов. офтальмолог) — набор из трех миниатюрных остроконечных долотец с закругленными краями, вставляемых в рукоятку; предназначен для удаления инородных тел из роговицы.

ШО́ТТЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (Л. Х. Шоттер) — хирургическая операция: подшивание к ресничному телу оторвавшегося края радужки.

ШО́ТТМЮЛЛЕРА БАКТЕ́РИЯ (H. Schottmüller, 1867—1936, нем. терапевт и бактериолог) — см. *Salmonella shottmülleri.*

ШО́УЛДАЙСА МЕ́ТОД (E. Shouldice) — метод грыжесечения при больших паховых грыжах, отличающийся тем, что заднюю стенку пахового канала укрепляют путем удвоения поперечной фасции после ее рассечения параллельно паховой связке, а наружный апоневроз ушивают поверх семенного канатика.

ШО́УПА ВИ́РУС (R. E. Shope, род. в 1902 г., амер. вирусолог) — см. *Вирус папилломы кроликов.*

ШО́УПА ПАПИЛЛО́МА (R. E. Shope) — папиллома кожи кроликов, вызываемая вирусом Шоупа; часто подвергается малигнизации с превращением в плоскоклеточный рак; используется в экспериментальной онкологии.

ШО́УПА РАК (R. E. Shope) — плоскоклеточный рак кожи кроликов, возникающий из папилломы Шоупа, в отличие от к-рой вируса не содержит.

ШО́УПА ФИБРО́МА (R. E. Shope) — вирусная опухоль кожи кроликов, обычно подвергающаяся спонтанному рас-

сасыванию; используется в экспериментальной онкологии.

ШОФФА́РА ТРЕУГО́ЛЬНИК (A. E. Chauffard, 1855—1932, франц. врач) — см. *Шоффара — Риве зона.*

ШОФФА́РА — ЛЕРИ́ША ФО́РМА РА́КА (A. E. Chauffard, 1855—1932, франц. врач; R. Leriche, 1879—1955, франц. хирург) — рак тела и хвоста поджелудочной железы, протекающий с жестокими болями, тяжелой кахексией и резко выраженной слабостью.

ШОФФА́РА — РИВЕ́ ЗО́НА (A. E. Chauffard, 1855—1932, франц. врач; син. Шоффара треугольник) — область живота, ограниченная срединной линией тела, линией, проведенной от пупка вправо вверх под углом 45°, и горизонтальной линией, проведенной на 6 *см* выше пупка; болезненность в этой области характерна для панкреатита.

ШПА́НСКИЕ МУ́ШКИ (устар.) — см. *Жуки-нарывники.*

ШПА́ТЕЛЬ[1] (нем. Spatel лопатка, шпатель) — инструмент для отведения (оттеснения) органа или ткани при обследовании или хирургической операции, представляющий собой прямую или изогнутую продолговатую пластинку с закругленными краями.

ШПА́ТЕЛЬ БАРРАКЕ́РА — см. *Барракера шпатель.*

Ш. ГЛАЗНО́Й — миниатюрный Ш., снабженный ручкой, используемый при хирургических операциях на глазном яблоке.

ШПА́ТЕЛЬ ЕГЕ́РА — см. *Егера пластинка.*

Ш. МОЗГОВО́Й (син. Ш. нейрохирургический) — узкий Ш. для отведения мозговой ткани во время хирургической операции.

Ш. НЕЙРОХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ — см. *Шпатель мозговой.*

ШПА́ТЕЛЬ ПОДРЕ́ЗА — см. *Подреза шпатель.*

ШПА́ТЕЛЬ[2] — инструмент для смешивания или перемешивания сыпучих и вязких веществ в лабораторной и фармацевтической практике, представляющий собой узкую металлическую или пластмассовую пластинку.

ШПА́ТЕЛЬ БАКТЕРИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ — стеклянный или проволочный инструмент для распределения исследуемого материала или бактериальной взвеси по поверхности плотной питательной среды в чашке Петри.

ШПА́ТЕЛЬ ДРИГА́ЛЬСКОГО — см. *Дригальского шпатель.*

ШПА́ТЕЛЬ-ЭКСПРЕ́ССОР (лат. exprimo, expressum выжимать, выдавливать) — инструмент с ложкообразным рабочим органом, предназначенный, гл. обр., для выведения хрусталика и хрусталиковых масс при экстракции катаракты.

ШПЕ́МАННА ЦЕНТР (H. Spemann, 1869—1941, нем. биолог) — см. *Организатор.*

ШПЕ́НГЛЕРА МЕ́ТОД (C. Spengler, 1860—1937, швейц. врач) — способ окраски микобактерий туберкулеза путем последовательной обработки препарата карболовым фуксином Циля, соляной кислотой и пикриновым спиртом, в результате чего микобактерии туберкулеза приобретают красный цвет на желтом фоне препарата.

ШПЕ́РРУНГ (нем. Sperrung заграждение, остановка; син.: барраж, симптом остановки мыслей) — внезапный обрыв хода мысли или длительная задержка мыслительного процесса; характерен для шизофрении.

ШПИ́ГЛЕРА ОПУХО́ЛЬ (E. Spiegler, 1860—1908, австрийский дерматолог) — см. *Цилиндрома кожи.*

ШПИ́ГЛЕРА — ФЕ́НДТА САРКО́ИД (E. Spiegler, 1860—1908, австрийский дерматолог; H. Fendt, нем. дерматолог 19—20 вв.) — см. *Лимфоцитома кожи.*

ШПИ́ЛЬМЕЙЕРА О́СТРОЕ НАБУХА́НИЕ (W. Spielmeyer, 1879—1935, нем. невропатолог; син. Ниссля острое заболевание) — равномерное обратимое набухание нервной клетки и ее отростков с распылением субстанции Ниссля вплоть до полного ее исчезновения.

ШПИ́ЛЬМЕЙЕРА ПРОСТО́Е СМО́РЩИВАНИЕ (W. Spielmeyer) — см. *Шпильмейера сморщивание нервных клеток.*

ШПИ́ЛЬМЕЙЕРА РАСПЛАВЛЕ́НИЕ НЕ́РВНЫХ КЛЕ́ТОК (W. Spielmeyer; син. Ниссля тяжелое заболевание) — необратимое изменение нервных клеток с неравномерным хроматолизом, вакуолизацией цитоплазмы, гиперхроматозом ядер, последующим их распадом или лизисом и исчезновением нейрофибрилл, сопровождающееся дистрофическими изменениями глии.

ШПИ́ЛЬМЕЙЕРА СМО́РЩИВАНИЕ НЕ́РВНЫХ КЛЕ́ТОК (W. Spielmeyer; син.: Ниссля хроническое заболевание, Шпильмейера простое сморщивание) — уменьшение размеров нервных клеток и числа глыбок субстанции Ниссля в них со снижением содержания рибонуклеопротеидов и гомогенным окрашиванием цитоплазмы; конечной стадией Ш. с. н. к. является «склероз» клеток, выражающийся в их резком уменьшении, гиперхромности, неразличимости ядер.

ШПИ́ЛЬМЕЙЕРА — ФО́ГТА БОЛЕ́ЗНЬ (W. Spielmeyer, 1879—1935, нем. невропатолог; H. Vogt, род. в 1875 г., нем. невропатолог) — см. *Идиотия амавротическая юношеская.*

ШПИ́ЛЬМЕЙЕРА — ФО́ГТА — БА́ТТЕНА ФО́РМА АМАВРОТИ́ЧЕСКОЙ ИДИОТИ́И (W. Spielmeyer, 1879—1935, нем. невропатолог; H. Vogt, род. в 1875 г., нем. невропатолог; F. U. Batten, 1865—1918, англ. невропатолог) — см. *Идиотия амавротическая юношеская.*

ШПИ́ТЦА ОПЕРА́ЦИЯ (E. B. Spitz, совр. амер. нейрохирург) — см. *Вентрикулоатриостомия.*

ШПИ́ТЦА — ХО́ЛТЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (E. B. Spitz, совр. амер. нейрохирург; J. F. Holter, амер. инженер) — вентрикулоатриостомия при гидроцефалии, производимая с применением дренажной системы Холтера.

ШПО́РА ГАСТРОЭНТЕРОАНАСТОМО́ЗА — складка кишечной стенки, противолежащей гастроэнтероанастомозу, вклинивающаяся в него и разделяющая его на две части; возникает как осложнение гастроэнтеростомии.

ШПО́РА КО́СТНАЯ — см. *Шпора пяточная.*

ШПО́РА ПЯ́ТОЧНАЯ (calcar calcaneum; син. шпора костная) — разрастание костной ткани на нижней или задней поверхности пяточной кости.

ШПО́РА ТРАХЕ́И — стойкий продольный валик на стенке трахеи, противолежащей трахеостоме; возникает как осложнение трахеостомии.

ШПРЕ́НГЕЛЯ АРТРОТОМИ́Я (O. K. Sprengel, 1852—1915, нем. хирург) — артротомия тазобедренного сустава: сустав обнажают отсечением большой и малой ягодичной мышц от крыла подвздошной кости, отсеченные мышцы откидывают книзу.

ШПРЕ́НГЕЛЯ БОЛЕ́ЗНЬ (O. K. Sprengel) — аномалия развития: короткая и широкая лопатка, повернутая вокруг своей сагиттальной оси и отступающая от грудной клетки в виде «крыла».

ШПРЕ́НГЕЛЯ РАЗРЕ́З (O. K. Sprengel) — разрез передней брюшной стенки, проводимый от точки, расположенной несколько выше середины расстояния между мечевидным отростком и пупком, параллельно реберной дуге до наружного края левой прямой мышцы живота (с ее пересечением) и дальше вверх по ходу наружной косой мышцы живота; применяется как доступ к селезенке.

ШПРИ́НГЕРА ОСТЕОТОМИ́Я (K. Springer, род. в 1872 г., чехословацкий хирург) — хирургическая операция для исправления искривленной конечности, заключающаяся в поднадкостничной резекции деформированного участка диафиза и распиливании резецированной кости на фрагменты длиной до 1 *см*, вытяжении конечности и укладывании фрагментов в выровненный надкостничный футляр, к-рый затем зашивают, а конечность фиксируют.

ШПРИЦ (нем. Spritze) — инструмент в виде полого градуированного цилиндра с поршнем для нагнетания или отсасывания жидкостей, обычно через иглу или катетер, вводимые в ткани и полости организма.

ШПРИЦ АНЕ́ЛЯ — см. *Анеля шприц.*

ШПРИЦ БРА́УНА — см. *Брауна шприц.*

ШПРИЦ ГЮЙО́НА — см. *Гюйона шприц.*

ШПРИЦ ЖАНЕ́ — см. *Жане шприц.*

ШПРИЦ ЛЮЭ́РА — см. *Люэра шприц.*

Ш. НЕПРЕРЫ́ВНОГО ДЕ́ЙСТВИЯ — Ш. для массивных инфузий, имеющий боковую канюлю с обратным клапаном, через к-рую вводимая жидкость поступает в цилиндр Ш.

ШПРИЦ ПОЛИКА́РПОВА — см. *Поликарпова шприц.*

ШПРИЦ-АВТОМА́Т — шприц, снабженный механическим приспособлением, обеспечивающим заданную глубину прокола тканей иглой и введение заданного объема жидкости.

ШПРИЦ-ТЮ́БИК (син. сиретта) — устройство одноразового использования для введения лекарственных средств подкожно или внутримышечно, состоящее из эластичной емкости, заполненной вводимой жидкостью и соединенной со стерильной инъекционной иглой, герметично закрытой колпачком с мандреном.

ШРАПНЕ́ЛЛЕВА МЕМБРА́НА (H. J. Shrapnell, 1761—1841, англ. анатом) — см. *Ненатянутая часть.*

ШРА́УТА ПОВЯ́ЗКА — иммобилизирующая повязка, в к-рой в качестве фиксирующего вещества использовано жидкое стекло.

ШРЕ́ДЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (K. Schröder, 1838—1887, нем. гинеколог) — клиновидная ампутация влагалищной час-

ти шейки матки по поводу ее гипертрофии или эктропиона.

ШРЕ́ДЕРА ПРИ́ЗНАК (K. Schröder, 1838—1887, нем. гинеколог) — определяемое пальпаторно в последовом периоде увеличение высоты стояния дна матки над лобковым симфизом с отклонением ее вправо от средней линии; признак отделения плаценты.

ШРЕ́ДЕРА СИНДРО́М (H. A. Schroeder, род. в 1906 г., амер. врач) — сочетание артериальной гипертензии с ожирением и пониженным содержанием хлорида натрия в секрете потовых желез, обусловленное повышенной функцией коркового вещества надпочечников.

ШРЕ́ДЕРА ФАНТАСТИ́ЧЕСКИЙ ГАЛЛЮЦИНО́З (P. Schröder, род. в 1873 г., нем. невропатолог и психиатр)— галлюциноз с преобладанием энтероцептивных галлюцинаций фантастического содержания.

ШРЕ́ДЕРА ЩИПЦЫ́ (K. Schröder, 1838—1887, нем. гинеколог) — разборные маточные щипцы с острыми иглообразными рабочими губками и однозубой кремальерой.

ШРЕ́ТТЕРА НАБО́Р (истор.; L. Schroetter, 1837—1908, австрийский оториноларинголог) — набор инструментов для удаления полипов, состоявший из набора наконечников, ручки и приводного устройства, управляемого пальцем; по трубке наконечника с помощью приводного устройства перемещались инструменты типа ложечных щипцов и миниатюрных ножей.

ШРИ́ДДЕ МЕ́ТОД (H. Schridde, род. в 1875 г., нем. патолог) — метод окраски мазков крови фуксином, позволяющий выявить специфическую зернистость лимфоцитов.

ШРИ́ДДЕ — А́ЛЬТМАННА МЕ́ТОД (H. Schridde, род. в 1875 г., нем. патолог; B. Altmann, 1852—1900, нем. гистолог) — метод окраски митохондрий раствором анилина и кислого фуксина.

ШТАБ-ЛЕ́КАРЬ (истор.) — военно-врачебное звание войсковых врачей в русской армии XVIII—XIX вв.

ШТАБ МЕДИЦИ́НСКОЙ СЛУ́ЖБЫ ГРАЖДА́НСКОЙ ОБОРО́НЫ — орган управления медицинской службы Гражданской обороны в республике, крае, области или городе, предназначенный для организации медицинского обеспечения населения при возникновении очагов массовых поражений и при стихийных бедствиях.

ШТАДТ-ФИ́ЗИК (истор.; нем. Stadtphysikus) — см. *Городовой физик*.

ШТА́ККЕ ОПЕРА́ЦИЯ (L. Stacke, 1859—1918, нем. оториноларинголог) — радикальная операция на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите с кариесом кости или холестеатомой; заключается во вскрытии полости среднего уха путем удаления латеральной стенки надбарабанного углубления с последующим вскрытием сосцевидной пещеры и удалением патологического содержимого из среднего уха; операция завершается пластикой наружного слухового прохода.

ШТАММ (нем. Stamm) — культура микроорганизмов определенного вида, выделенная из данного источника, характеризующаяся нек-рыми признаками, отличающими ее от других культур того же вида.

ШТАММ АТТЕНУИ́РОВАННЫЙ — штамм патогенного микроорганизма, полученный в результате аттенуации; применяется для изготовления живой вакцины.

ШТАММ О́ПУХОЛЕВЫЙ — ткань перевиваемой опухоли после многократной ее трансплантации экспериментальным животным, характеризующаяся постоянством морфологических и физиологических свойств при последующих трансплантациях.

ШТАММ РЕЦИДИ́ВНЫЙ — популяция паразитических простейших (напр., трипаносом), отличающаяся в антигенном отношении от предшествовавших популяций в организме хозяина, к к-рым был выработан иммунитет, и обнаруживаемая при рецидиве болезни.

ШТА́ММА — СЕ́ННА — КА́ДЕРА ГАСТРОСТОМИ́Я (M. Stamm, 1847—1918, амер. хирург; N. Senn, 1844—1908, амер. хирург; B. Kader, 1863—1937, польск. хирург) — см. *Кадера гастростомия*.

ШТА́НГЕ — ГЕ́НЧА ПРО́БА (син. Генча проба) — функциональная проба для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, заключающаяся в определении максимальной продолжительности произвольной задержки дыхания после вдоха (проба Штанге) или после выдоха (проба Генча).

ШТАНЦМА́РКА (нем. stanzen чеканить, штамповать + Marke метка, клеймо) — отпечаток контура дульного среза оружия на коже вокруг входного отверстия раны при выстреле в упор.

ШТА́РГАРДТА ДЕГЕНЕРА́ЦИЯ ЖЁЛТОГО ПЯТНА́ (K. B. Stargardt, 1875—1927, нем. офтальмолог; син. дегенерация желтого пятна юношеская) — семейно-наследственная двусторонняя дегенерация сетчатки, развивающаяся в возрасте 8—15 лет и характеризующаяся поражением желтого пятна (пятна сетчатки); проявляется снижением остроты зрения, развитием центральной скотомы; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

ШТА́РКА РАСШИРИ́ТЕЛЬ (H. Starck, нем. хирург 20 в.) — инструмент для расширения кардиального отдела пищевода при его стенозе (кардиодилататор) с четырьмя металлическими планками, расходящимися при нажатии на рукоятку; снабжен набором эластичных проводников, помогающих вводить инструмент (в закрытом состоянии) в пищевод.

ШТА́УБА ФЕНО́МЕН (H. Staub, 1890—1967, швейц. фармаколог) — углубление гипогликемии и ухудшение состояния больного, возникающее после введения глюкозы при затяжной инсулиновой коме и обусловленное усиленным выделением инсулина.

ШТА́УБА — ТРА́УГОТТА ПРО́БА (H. Staub, 1890—1967, швейц. фармаколог; C. Traugott, род. в 1885 г., нем. врач) — см. *Тест с двойной нагрузкой глюкозой*.

ШТЕ́ЙНА МЕ́ТОД (A. Stein, род. в 1877 г., нем. гинеколог) — способ стимуляции сократительной деятельности матки сочетанным введением хинина перорально и питуитрина внутримышечно.

ШТЕ́ЙНА СИНДРО́М (J. F. Stein, род. в 1887 г., амер. гинеколог) — см. *Штейна — Левенталя синдром*.

ШТЕ́ЙНА — ЛЕВЕНТА́ЛЯ СИНДРО́М (J. F. Stein, род. в 1887 г., амер. гинеколог; M. L. Leventhal, род. в 1901 г., амер. гинеколог; син. Штейна синдром) — гинекологическое заболевание, характеризующееся поликистозом яичников с резким утолщением и склерозированием белочной оболочки, проявляющееся аменореей (иногда ациклическими маточными кровотечениями), гирсутизмом, ожирением, бесплодием.

ШТЕ́ЙНЕРА — ФЕ́РНЕРА СИНДРО́М (L. Steiner, нем. врач 20 в.; H. Voerner, нем. врач 19—20 в.; син. ангиоматоз милиарный) — сочетание точечных телеангиэктазий с эритемой лица, наблюдаемое при злокачественных опухолях внутренних органов.

ШТЕ́ЙНЕРТА — БА́ТТЕНА БОЛЕ́ЗНЬ (H. Steinert, нем. врач 20 в.; F. E. Batten, 1865—1918, англ. невролог) — см. *Миотония дистрофическая*.

ШТЕ́ЙНМАННА ГВОЗДЬ (F. Steinmann, 1872—1932, швейц. хирург) — инструмент для скелетного вытяжения, представляющий собой заостренный металлический стержень, на к-рый после вколачивания в кость надевают втулки пружинящего стремени с кольцом для крепления шнура с грузом.

ШТЕ́ЙНМАННА СИМПТО́М (F. Steinmann) — появление или усиление болей при наружной ротации голени, согнутой под прямым углом; признак повреждения внутреннего мениска.

ШТЕ́ЙНТАЛЯ РИНОПЛА́СТИКА (C. Steinthal, род. в 1859 г., нем. хирург) — метод ринопластики, при к-ром нос формируют из мигрирующего кожно-надкостничного лоскута с передней поверхности грудной клетки, в к-рый иногда включают кусочки реберного хряща.

ШТЕ́ЙНХАУЗЕНА СКАПУЛОПЕРИОСТА́ЛЬНЫЙ РЕФЛЕ́КС (W. Steinhausen, род. в 1887 г., нем. физиолог) — см. *Рефлекс лопаточный*.

ШТЕ́ККЕЛЯ ОПЕРА́ЦИЯ (W. Stoeckel, 1871—1961, нем. гинеколог; син. Гебелля — Франгенгейма — Штеккеля операция) — пластическая операция при недержании мочи у женщин; производится через влагалище и заключается в трансплантации под шейку мочевого пузыря лоскутов (на ножке) пирамидальных мышц живота с их фасцией и крестообразным сшиванием концов этих лоскутов.

ШТЕ́ККЕЛЯ ПОЛОВА́Я СТЕРИЛИЗА́ЦИЯ (W. Stoeckel) — хирургическая операция с целью половой стерилизации; заключается в выведении маточных труб через апоневроз под кожу и фиксации их швами.

ШТЕ́ЛЛЬВАГА СИМПТО́М (C. Stellwag; 1823—1904, австрийский офтальмолог) — редкое, неполное мигание; наблюдается при тиреотоксикозе, паркинсонизме.

ШТЕ́ЛЬЦНЕРА ВРОЖДЁННЫЙ АКРОАНГИОНЕВРО́З (W. Stölzner, род. в 1872 г., нем. педиатр) — см. *Акроэритроз*.

ШТЕ́НГЕРА О́ПЫТ (H.-H. Stenger, род. в 1914 г., нем. оториноларинголог) — метод выявления симуляции односторонней глухоты, основанный на исследовании феномена Штенгера — Хилова: при симуляции испытуемый, не воспринимая более слабого тона, подаваемого на ухо, объявленное им здоровым, не сообщает о поданном сигнале.

ШТЕ́НГЕРА — ХИЛО́ВА ФЕНО́МЕН (H.-H. Stenger, род. в 1914 г., нем. оториноларинголог; К. Л. Хилов, 1893—1975, сов. оториноларинголог) — при одновременном воздействии на оба уха двух тонов одинаковой высоты, но разной силы нормально слышащий человек указывает локализацию источника на стороне более интенсивного звука.

ШТЁРА ФЕНО́МЕН (Ph. Stöhr, 1849—1911, нем. анатом) — выход лимфоцитов из аденоидной ткани области зева в пищеварительный тракт; физиологическое явление.

ШТЕ́РНА СИМПТО́М (K. Stern, совр. нем. врач) — сочетание хватательных движений кисти с сосательными движениями губ при раздражении кожи ладони; признак поражения лобной доли большого мозга на противоположной стороне.

ШТЕ́РНА СИНДРО́М (K. Stern) — сочетание тяжелого слабоумия с исчезновением реакций зрачков на свет и конвергенцию, наличием хватательных и губных рефлексов; наблюдается при двусторонней симметричной атрофии таламуса.

ШТЕ́РНБЕРГА КЛЕ́ТКИ (K. Sternberg, 1872—1935, нем. патолог) — см. *Березовского — Штернберга клетки.*

ШТЕ́РНБЕРГА ЛЕЙКОСАРКОМАТО́З (K. Sternberg, 1872—1935, нем. патолог) — стадия лейкемизации лимфосаркомы.

ШТЕ́РНБЕРГА РЕФЛЕ́КС — см. *Бехтерева — Менделя рефлекс.*

ШТЕ́РНБЕРГА СИМПТО́М — 1) (А. Я. Штернберг, 1873—1927, сов. фтизиатр) — небольшая ригидность и болезненность мышц плечевого пояса с одной стороны; ранний симптом туберкулеза легких; 2) (K. Sternberg, 1872—1935, нем. патолог) — болезненность по ходу брыжейки тонкой кишки; признак мезаденита.

ШТЕ́РНГЕЙМЕРА — МА́ЛЬБИНА КЛЕ́ТКИ (R. Sternheimer, амер. врач; B. Malbin, амер. врач) — сегментоядерные нейтрофильные гранулоциты увеличенные вдвое, цитоплазма к-рых окрашивается спиртовым раствором сафронина с генцианвиолетом в бледно-голубой цвет, а ядра — в темный; обнаруживаются в осадке утренней мочи при пиелонефрите.

ШТЕ́ФФЕНА РЕА́КЦИЯ (C. Steffen) — метод выявления аутоантител к клеткам тканей, заключающийся в смешивании исследуемой сыворотки крови с взвесью соответствующих клеток, осаждении их центрифугированием и добавлении антиглобулиновой сыворотки с известным титром, уменьшение к-рого указывает на наличие аутоантител.

ШТИ́ККЕРА О́ПУХОЛЬ (G. Sticker, 1860—1960, нем. врач) — см. *Саркома венерическая.*

ШТИ́ЛЛЕ РЕДРЕССА́ТОР-ОСТЕОКЛА́СТ (Stille, шведская фирма мед. инструментов) — комбинированное устройство для редрессации стопы, а также для подкожной остеоклазии, представляющее собой два остеокласта Томаса, соединенные шарниром.

ШТИ́ЛЛЕРА СИНДРО́М (B. Stiller, 1837—1922, венгерский врач) — см. *Астения тотальная.*

ШТИ́ЛЛИНГА ГИРЛЯ́НДОВЫЕ ВОЛО́КНА МОЗЖЕЧКА́ (B. Stilling, 1810—1879, нем. анатом и хирург) — короткие ассоциативные нервные волокна, соединяющие соседние извилины коры мозжечка.

ШТИ́ЛЛИНГА КЛЕ́ТКИ (B. Stilling, 1810—1879, нем. анатом и хирург) — нейроны, расположенные в основании задних рогов шейного и поясничнокрестцового отделов спинного мозга; аналогичны нейронам грудного ядра (ядра Кларка).

ШТИ́ЛЛИНГА — ТЮ́РКА — ДУЭ́ЙНА СИНДРО́М (J. Stilling, 1842—1915, нем. офтальмолог; S. Türk, швейц. офтальмолог 19—20 вв.; A. Duane, 1858—1926, амер. офтальмолог; син.: Дуэйна синдром, синдром ретракции глазного яблока) — врожденный, чаще односторонний паралич прямых мышц глазного яблока, проявляющийся резким нарушением его движений и оттягиванием глаза кзади (ретракцией); часто сочетается с другими аномалиями развития.

ШТИ́ЛЛЬМАНА ТРОЙНО́Й ШАРНИ́Р (A. Stillman) — приспособление для соединения шин, обеспечивающее возможность их поворота относительно друг друга в трех плоскостях, причем поворот в любой из плоскостей может быть исключен с помощью специального ключа.

ШТИ́РЛИНА СИМПТО́М (E. Stierlin, 1878—1919, нем. хирург и рентгенолог) — отсутствие рентгеновской тени слепой кишки при заполнении толстой кишки контрастным веществом; признак хронического воспаления слепой кишки, обусловленный ее спастическим сокращением или рубцовыми изменениями стенки.

ШТИФТОВА́НИЕ в травматологии — остеосинтез, при к-ром отломки кости фиксируют введением в костномозговую полость штифта из аутоили аллокости, металла или других материалов.

ШТИ́ХЕЛЬ (нем. Stichel) — зуботехнический инструмент в виде долота или стамески с торцевой и боковой заточкой, употребляемый для обработки съемных протезов.

ШТОДМЕ́ЙСТЕРА АНОМА́ЛИЯ ЛЕЙКОЦИ́ТОВ (нрк) — см. *Штодтмейстера аномалия лейкоцитов.*

ШТОДТМЕ́ЙСТЕРА АНОМА́ЛИЯ ЛЕЙКОЦИ́ТОВ (R. Stodtmeister, род. в 1908 г., нем. врач) — наследственная болезнь крови, характеризующаяся наличием исключительно круглоядерных форм нейтрофильных гранулоцитов с бухтообразной выемкой и бахромчатостью ядра в виде нежных хроматиновых нитей, выступающих из него в цитоплазму.

ШТО́ККИНГЕРА ОКРА́СКА (Z. Stockinger, совр. австрийский гистолог) — окраска мазков крови метиленовым синим, выявляющая ядрышки в зрелых лимфоцитах.

ШТО́ЛЛЯ — ДЕЛИ́ЦЫНА РИХАНОТРЕПА́Н (А. А. Штолль; С. Н. Делицын, 1858—1918, отеч. хирург) — см. *Риханотрепан.*

ШТОПФЕ́Р (нем. Stopfer) — инструмент для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости, представляющий собой металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему.

ШТО́ФФЕЛЯ ОПЕРА́ЦИЯ (A. Stoffel, 1880—1937, нем. хирург-ортопед; син. Лоренца — Штоффеля нейротомия) — частичная нейротомия, проводимая с целью лечения спастических параличей, при к-рой перерезают лишь двигательные волокна смешанного нерва.

ШТРА́ЙТА ОПЕРА́ЦИЯ (H. Streit, совр. нем. оториноларинголог) — пластическая операция при оттопыренных ушных раковинах, заключающаяся в иссечении эллипсовидного участка кожи с задней поверхности раковины и полосок хряща шириной 2—3 *мм* соответственно положению противозавитка и его ножки с последующим наложением швов на образовавшийся дефект.

ШТРА́ССМАННА МЕТРОПЛА́СТИКА (P. F. Strassmann, 1866—1938, нем. гинеколог) — см. *Штрассманна способ.*

ШТРА́ССМАННА ПРИ́ЗНАК (P. F. Strassmann) — ощущение толчков при пальпации пуповины во время постукивания по дну матки; признак того, что плацента еще не отделилась.

ШТРА́ССМАННА СПО́СОБ (P. F. Strassmann, син. Штрассманна метропластика) — пластическая операция: создание однополостной матки из двураздельной или двурогой; заключается в поперечном разрезе дна матки от одной маточной трубы к другой и рассечении перегородки в полости матки с наложением на матку двух рядов швов.

ШТРА́УСА СИМПТО́М (I. Straus, 1845—1896, франц. врач) — значительное уменьшение потоотделения на парализованной стороне лица при инъекции пилокарпина больному с поражением лицевого нерва; признак, позволяющий дифференцировать периферическое поражение лицевого нерва от центрального.

ШТРА́УССА ПРОКТОГЕ́ННЫЙ ЗАПО́Р (proctostasis paradoxa; H. Strauss, 1868—1945, нем. врач) — длительное скопление твердых каловых масс в ампуле прямой кишки с образованием в них центрального канала, через к-рый с бурными позывами отходят жидкие испражнения.

ШТРА́УССА СИМПТО́М (I. Strauss) — см. *Блумера симптом.*

ШТРО́ШЕЙНА КРЮЧО́К (Stroschein) — инструмент для захватывания и удерживания сухожилий наружных глазных мышц при хирургических операциях по поводу косоглазия; представляет собой два крючка на одной рукоятке, к-рые могут быть сближены и удержаны сомкнутыми с помощью передвигаемой пальцем кнопки, находящейся на рукоятке инструмента.

ШТРУ́КА КЛЕ́ММА (Struck) — инструмент для удержания червеобразного отростка при ретроградной аппендэктомии, представляющий собой клемму с защитным устройством в виде полуовального щитка.

ШТРЮ́БИНГА — МАРКИАФА́ВЫ БОЛЕ́ЗНЬ (P. Strübing, нем. врач 19 в.; E. Marchiafava, 1847—1916, итал. врач и патологоанатом) — см. *Гемоглобинурия пароксизмальная ночная.*

ШТРЮМПЕЛЛЯ СПАСТИ́ЧЕСКАЯ ПАРАПЛЕГИ́Я (A. G. G. Strümpell, 1853—1925, нем. невропатолог; син. Эрба — Шарко — Штрюмпелля болезнь) — хроническая прогрессирующая наследственно-семейная болезнь нервной системы, характеризующаяся развитием центрального нижнего парапареза при сохранности функций тазовых органов; наследуется по ауто-

сомно-рецессивному и доминантному типам.

ШТРЮМПЕЛЛЯ ТИБИА́ЛЬНЫЙ ФЕНО́МЕН (A. G. G. Strümpell) — непроизвольное тыльное сгибание стопы при попытке больного согнуть паретичную ногу в коленном и тазобедренном суставах; патологическая синкинезия, наблюдаемая при центральном гемипарезе.

ШТРЮМПЕЛЛЯ — БЕ́ХТЕРЕВА — МАРИ́ БОЛЕ́ЗНЬ (A. G. G. Strümpell, 1853—1925, нем. невропатолог; В. М. Бехтерев, 1857—1927, сов. психоневролог и физиолог; P. Marie, 1853—1940, франц. невропатолог) — см. *Бехтерева болезнь*.

ШТРЮМПЕЛЛЯ — ЛЕ́ЙХТЕНШТЕРНА ЭНЦЕФАЛИ́Т (A. G. G. Strümpell, 1853—1925, нем. невропатолог; O. M. Leichtenstern, 1845—1900, нем. врач) — см. *Менингоэнцефалит геморрагический*.

ШТУ́МПФА МНОГОЩЕЛЕВО́Й РЕНТГЕНОКИМО́ГРАФ (P. Stumpf, род. в 1888 г., нем. рентгенолог) — устройство для рентгенокимографии сердца и крупных сосудов, в к-ром применена многощелевая свинцовая решетка, обеспечивающая одновременную регистрацию перемещения сердечно-сосудистого контура на всем его протяжении.

ШТУ́МПФА СТЕРЕООБИНО́КЛЬ (P. Stumpf) — оптический прибор, предназначенный для одновременного рассматривания двух стереорентгенограмм с целью получения стереоскопического рентгеновского изображения исследуемого объекта.

ШТУ́РГЕ — ВЕ́БЕРА БОЛЕ́ЗНЬ (нрк; W. A. Sturge, 1850—1919, англ. врач; F. P. Weber, 1863—1962, англ. врач) — см. *Стерджа — Вебера — Краббе синдром*.

ШТУ́РМА МЕ́ТОД ЛЕЧЕ́НИЯ (В. А. Штурм, сов. хирург) — метод безнаркозной редрессации стопы при врожденной косолапости у детей; заключается в повторном наложении гипсовых повязок (при максимальном отведении стопы) от верхней трети голени до предплюснево-плюсневых суставов (сустава Лисфранка), а позже — до поперечного сустава предплюсны (шопарова сустава).

ШТУ́РМАННА ОПЕРА́ЦИЯ — см. *Канфилда — Штурманна операция*.

ШТУ́РМДОРФА ОПЕРА́ЦИЯ (A. Sturmdorf, 1861—1934, амер. гинеколог) — хирургическая операция при резкой гипертрофии и хроническом воспалении влагалищной части шейки матки; заключается в конусовидном удалении измененной части шейки с восстановлением нормальной формы шейки и отверстия наружного зева матки.

ШТУ́ЦЕРА — ШМИ́ТЦА ДИЗЕНТЕРИ́ЙНАЯ БАКТЕ́РИЯ (М. И. Штуцер, 1879—1935, сов. микробиолог; K. E. F. Schmitz, род. в 1889 г., нем. бактериолог) — вид бактерий рода Shigella (по Международной классификации — Shigella dysenteriae серовар 2); неподвижная грамотрицательная палочка, факультативный анаэроб, не расщепляет лактозу, расщепляет галактозу до кислоты, образует индол; один из возбудителей дизентерии.

ШУБ (нем. Schub атака, приступ) — приступ психической болезни, после к-рого наблюдаются изменения личности или остаточные психопатологические расстройства.

ШУВА́РСКОГО — СИ́МСА — ХУ́НЕРА ПРО́БА (М. В. Шуварский, 1860—1922, отеч. акушер-гинеколог; H. M. Sims, амер. гинеколог; M. Huhner, 1873—1947, амер. уролог) — метод исследования оплодотворяющих свойств спермы, основанный на определении способности сперматозоидов проникать в слизь шейки матки.

ШУ́ГАРА ПИГМЕ́НТНАЯ ГЛАУКО́МА (H. Sugar) — см. *Глаукома пигментная*.

ШУКЕ́ВИЧА МЕ́ТОД — метод выделения чистой культуры протея, основанный на его способности перемещаться по поверхности скошенного агара из конденсационной жидкости, в к-рую засеян исследуемый материал.

ШУЛУ́ТКО ШИ́НА (Л. И. Шулутко, 1897—1971, сов. ортопед-травматолог) — шина для лечения переломов нижней конечности, обеспечивающая создание необходимого угла сгибания в коленном и тазобедренном суставах.

ШУ́ЛЬМАНА МЕ́ТОД (Е. С. Шульман, род. в 1899 г., сов. гельминтолог; син. метод «закручивания») — метод приготовления препаратов для микроскопического исследования фекалий на яйца и личинки гельминтов; основан на их захвате из водной взвеси фекалий быстровращаемой стеклянной палочкой с последующим перенесением образовавшейся на палочке капли на предметное стекло.

ШУ́ЛЬТЕССА СКОЛИОЗОМЕ́ТР (W. Schulthess, 1855—1917, ортопед) — прибор для измерения степени деформации позвоночника, с помощью к-рого, помимо уровня искривления и линейного уклонения от вертикали, определяют также дугу искривления в градусах.

ШУ́ЛЬЦА — ДЕ́ЙЛА РЕА́КЦИЯ (W. H. Schultz, 1873—1947, англ. физиолог; H. H. Dale, 1875—1968, англ. физиолог и фармаколог) — сокращение изолированного участка подвздошной кишки или рога матки сенсибилизированной морской свинки при воздействии специфическим аллергеном.

ШУ́ЛЬЦА — ЧА́РЛТОНА ФЕНО́МЕН (W. Schultz, 1878—1947, нем. терапевт; W. Charlton, род. в 1889 г., нем. врач) — см. *Феномен гашения сыпи*.

ШУ́ЛЬТЦЕ ВАРИА́НТ ВЫДЕЛЕ́НИЯ ПОСЛЕ́ДА (B. S. Schultze, 1827—1919, нем. гинеколог) — нормальный вариант выделения последа, при к-ром отделение плаценты от стенки матки начинается с центральной ее части, которая и выделяется из матки первой вместе с пуповиной.

ШУ́ЛЬТЦЕ КЛЕ́ТКА (M. J. S. Schultze, 1825—1874, нем. гистолог и анатом) — см. *Клетка обонятельная*.

ШУ́ЛЬТЦЕ МЕ́ТОД СЕРЕБРЕ́НИЯ (O. Schultze, 1859—1920, нем. гистолог) — метод выявления нейрофибрилл в гистологических препаратах, заключающийся в их импрегнации 10% раствором нитрата серебра после фиксации формалином и обработки едким натром.

ШУ́ЛЬТЦЕ НАДИ-ОКСИДА́ЗНАЯ РЕА́КЦИЯ (W. H. Schultze, род. в 1880 г., нем. патолог) — см. *М-надиоксидазная реакция*.

ШУ́ЛЬТЦЕ ПАРАМЕТРИ́Т (B. S. Schultze, 1827—1919, нем. гинеколог) — хронический параметрит, осложненный хроническим воспалением брюшины прямокишечно-маточного углубления (дугласова пространства), приводящий к уплотнению и укорочению крестцово-маточных связок.

ШУ́ЛЬТЦЕ СИМПТО́М (F. Schultze, 1848—1934, нем. невропатолог) — сокращение лицевых мышц, возникающее при легком ударе по щеке; признак тетании.

ШУМ[1] (murmur) в диагностике — звук, регистрируемый при аускультации сердца, легких, брюшной полости, кровеносного сосуда или сустава, характеризующий их функциональное состояние; для обозначения нек-рых видов таких звуков, напр. тонов сердца, термин «шум» не применяется.

Ш. АРТЕРИА́ЛЬНЫЙ (m. arteriale) — Ш. над артерией крупного калибра, выслушиваемый в области сужения или расширения сосуда, возникших вследствие какого-либо патологического процесса (стеноз, аневризма) или в результате преднамеренного сдавливания артерии, напр. при определении артериального давления по методу Короткова.

Ш. ВЕ́ННЫЙ (m. venosum) — непрерывный слабый Ш., обычно жужжащего или журчащего характера, выслушиваемый над крупной веной при пониженной вязкости крови или при нарушении гладкости поверхности венозной стенки.

Ш. ВЕРЕТЕНООБРА́ЗНЫЙ — систолический Ш., характеризующийся минимальной интенсивностью после первого тона, нарастанием интенсивности к середине и уменьшением к концу систолы; отображается ромбовидной или веретенообразной формой фонокардиограммы.

Ш. ВОЛЧКА́ — непрерывный жужжащий Ш., выслушиваемый над яремными венами при выраженной анемии и обусловленный пониженной вязкостью крови.

Ш. ГЛОТА́ТЕЛЬНЫЙ (m. deglutitionis) — общее название Ш., выслушиваемых после проглатывания пищи или воды над пищеводом (вдоль грудного отдела позвоночника и слева от трахеи) и над кардиальной частью желудка (между мечевидным отростком и левой реберной дугой).

ШУМ ГРЕ́ХЕМА СТИ́ЛЛА — см. *Грэма Стилла шум*.

Ш. ДВОЙНО́Й ВИНОГРА́ДОВА — ДЮРОЗЬЕ́ — см. *Виноградова — Дюрозье двойной шум*.

Ш. ДВОЙНО́Й МАШИ́ННЫЙ — см. *Шум машинный*.

Ш. ДИАСТОЛИ́ЧЕСКИЙ (m. diastolicum) — Ш. сердца, выслушиваемый на протяжении всей диастолы или одной из ее фаз.

Ш. ДЫХА́ТЕЛЬНЫЙ (m. respiratorium) — Ш., выслушиваемый над грудной клеткой и обусловленный перемещением воздуха по дыхательным путям.

Ш. ИЗГНА́НИЯ — систолический Ш., регистрируемый в период изгнания крови из желудочков сердца и обусловленный патологическими изменениями клапанов легочного ствола или аорты или резким надклапанным расширением этих сосудов.

Ш. КИШЕ́ЧНЫЙ (m. intestinale) — Ш., выслушиваемый на поверхности живота, обусловленный перемеще-

нием содержимого кишечника при его перистальтике.

Ш. КЛАПАННЫЙ (m. valvulare) — Ш. сердца, обусловленный поражением (деформацией, укорочением створок, перфорацией) его клапанов.

Ш. КОНСУЛЬТАНТА — Ш. сердца, выслушиваемый только при возбуждении его деятельности, напр. при волнении больного в связи с его осмотром консультантом.

Ш. КУЗНИЦЫ — см. *Боткина шум кузницы.*

ШУМ ЛАЭННЕКА — см. *Лаэннека шумы.*

Ш. ЛЕНТОВИДНЫЙ — Ш. сердца, характеризующийся одинаковой интенсивностью на всем его протяжении и отображаемый на фонограмме осцилляциями одинаковой амплитуды.

Ш. МАТОЧНЫЙ (m. uterinum) — Ш., выслушиваемый в области живота при продувании маточных труб, проходимость к-рых сохранена.

Ш. МАШИННЫЙ (син. Ш. двойной машинный) — грубый систолодиастолический Ш., напоминающий шум работы парового двигателя, обусловленный противоположным направлением тока крови во время систолы и диастолы, напр. при дефектах перегородок сердца, при незаращении артериального протока.

Ш. МЕЗОДИАСТОЛИЧЕСКИЙ (m. mesodiastolicum; греч. mesos средний + *диастола*) — Ш. сердца, выслушиваемый только в средней фазе диастолы.

Ш. МЕЗОСИСТОЛИЧЕСКИЙ (m. mesosystolicum; греч. mesos средний + *систола*) — Ш. сердца, выслушиваемый только в середине систолы.

Ш. МЕЛЬНИЧНОГО КОЛЕСА (син. Морель-Лавалле симптом) — булькающий, «хлюпающий» Ш., иногда выслушиваемый над грудной клеткой при ее проникающем ранении (особенно, при ранении сердца) со скоплением крови и воздуха в полости перикарда, а также при гидропневмоперикарде.

Ш. МУЗЫКАЛЬНЫЙ — Ш. сердца, приближающийся по звучанию к музыкальному тону в связи с отчетливым преобладанием в нем звуковых колебаний определенной частоты.

Ш. НАПОЛНЕНИЯ — диастолический Ш., выслушиваемый в период наполнения кровью желудочков сердца при суженных предсердно-желудочковых отверстиях.

Ш. ПАНСИСТОЛИЧЕСКИЙ (m. pansystolicum; греч. pan весь + *систола*) — Ш., выслушиваемый в течение всего периода систолы.

Ш. ПАРАКАРДИАЛЬНЫЙ (m. paracardiale; греч. para около + kardia сердце) — Ш., выслушиваемый над грудной клеткой в определенные фазы сердечного цикла, но по своему происхождению не связанный с поражением сердца и крупных сосудов.

Ш. ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ ЗЕЙТЦА — см. *Зейтца симптом.*

Ш. ПЕРИКАРДОПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ (m. pericardoperitoneale) — разновидность Ш. трения перикарда, при к-рой его интенсивность меняется в зависимости от положения тела больного и степени напряжения брюшной стенки; признак одновременного поражения органов средостения и верхней части брюшной полости.

Ш. ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ (m. peritoneale) — см. *Шум трения брюшины.*

Ш. ПИСКА — громкий высокочастотный систолический Ш., чаще выслушиваемый при недостаточности митрального клапана сердца, вызванной поражением сосочковых мышц.

Ш. ПЛЕВРОКАРДИАЛЬНЫЙ (m. pleurocardiale) — Ш. сердца, вызванный сдавлением каких-либо его отделов массивными сращениями в плевральной полости.

Ш. ПЛЕВРОПЕРИКАРДИАЛЬНЫЙ (m. pleuropericardiale) — грубый скребущий Ш., выслушиваемый в прекардиальной области в определенной фазе сердечного цикла, ослабевающий или исчезающий в определенной фазе дыхания; обусловлен наличием плевроперикардиальных сращений.

Ш. ПЛЕСКА — булькающий звук в желудке, выслушиваемый в положении лежа при коротких быстрых ударах пальцами по подложечной области; свидетельствует о наличии в желудке газа и жидкости, напр. при гиперсекреции желудка или при задержке эвакуации его содержимого.

Ш. ПЛЕСКА ГИППОКРАТА — см. *Гиппократа шум плеска.*

Ш. ПРЕСИСТОЛИЧЕСКИЙ (m. praesystolicum; лат. prae- перед, до + *систола*) — Ш. сердца, выслушиваемый только к концу диастолы (в период систолы предсердий) при суженных предсердно-желудочковых отверстиях.

Ш. ПРОСКАКИВАНИЯ — короткий шипящий Ш., выслушиваемый в углу между мечевидным отростком и левой реберной дугой тотчас после проглатывания пищи или воды при зияющем кардиальном отверстии желудка.

Ш. ПРОТАЛКИВАНИЯ — глухой, непродолжительный Ш., выслушиваемый в углу между мечевидным отростком и левой реберной дугой через несколько секунд после проглатывания пищи или воды при неполностью открытом кардиальном отверстии желудка.

Ш. ПРОТОДИАСТОЛИЧЕСКИЙ (m. protodiastolicum; греч. prōton сначала + *диастола*) — Ш. сердца, возникающий сразу после второго тона сердца и ослабляющийся в течение диастолы; наиболее характерен для недостаточности клапана аорты и клапана легочного ствола.

Ш. ПУПОВИНЫ (m. funiculi umbilicalis) — Ш., синхронный с пульсом, выслушиваемый через переднюю брюшную стенку беременной и обусловленный током крови в сосудах пуповины.

Ш. СЕРДЕЧНЫЙ — см. *Шум сердца.*

Ш. СЕРДЦА (m. cardiacum; син. шум сердечный) — Ш., выслушиваемый в нек-рых точках прекардиальной области, реже над другими участками грудной клетки, иногда распространяющийся по ходу сосудов, связанный с определенными фазами сердечного цикла и нек-рыми патологическими состояниями или физиологическими особенностями сердца.

Ш. СЕРДЦА ОРГАНИЧЕСКИЙ (m. cardiacum organicum) — Ш. с., обусловленный наличием морфологических изменений створок его клапанов, сухожильных хорд, сосочковых мышц, наличием в полостях сердца тромбов, аневризматическим расширением камер сердца или наличием дефекта межпредсердной или межжелудочковой перегородки.

Ш. СЕРДЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (m. cardiacum functionale) — Ш. с., не связанный с наличием органических поражений клапанного аппарата, дефектов перегородок сердца, изменений миокарда и других патологических состояний сердца; наблюдается, напр., при некоторых конституционных особенностях организма, в период быстрого роста, при анемии.

Ш. СИСТОЛИЧЕСКИЙ (m. systolicum) — Ш. сердца, выслушиваемый только во время систолы желудочков и обусловленный обычно перемещением крови через аномальные отверстия и (или) патологически несмыкающиеся клапаны или пониженной вязкостью крови.

Ш. СИСТОЛИЧЕСКИЙ ПОЗДНИЙ (m. systolicum tardum; син. Ш. телесистолический) — Ш. сердца, возникающий в конце систолы и сливающийся со вторым тоном сердца.

Ш. СИСТОЛОДИАСТОЛИЧЕСКИЙ (m. systolodiastolicum) — совокупность систолического и диастолического Ш., сливающихся друг с другом; выслушивается, напр., при незаращении межжелудочковой перегородки или артериального протока.

Ш. СОСУДИСТЫЙ (m. vasculare) — Ш., выслушиваемый над крупными кровеносными сосудами; в крупных артериях может представлять собой Ш. сердца, проведенный по ходу тока крови.

ШУМ СТИЛЛА — см. *Грэма Стилла шум.*

Ш. ТЕЛЕСИСТОЛИЧЕСКИЙ (m. telesystolicum; греч. tēle далеко + *систола*) — см. *Шум систолический поздний.*

Ш. ТЕРКИ — грубый громкий низкочастотный систолический шум, выслушиваемый над клапаном аорты и сочетающийся с систолическим дрожанием в той же области; признак сужения отверстия аорты.

Ш. ТРЕНИЯ БРЮШИНЫ (m. frictionis peritonei; син. Ш. перитонеальный) — Ш., выслушиваемый на передней брюшной стенке, обусловленный трением между собой листков брюшины при отложении на них фибрина.

Ш. ТРЕНИЯ ПЕРИКАРДА (m. frictionis pericardii) — царапающий, скребущий Ш. сердца, обусловленный трением между собой патологически измененных висцеральной и париетальной пластинок перикарда.

Ш. ТРЕНИЯ ПЛЕВРЫ (m. frictionis pleurae) — Ш., выслушиваемый над грудной клеткой во время глубокого вдоха при плеврите (обычно сухом), обусловленный трением между собой патологически измененных листков плевры.

ШУМ ФЛИНТА — см. *Флинта шум.*

ШУМ[2] в гигиене, в аудиометрии — любой звук, мешающий восприятию речи или музыки, работе или отдыху, нередко оказывающий неблагоприятное воздействие на организм человека.

Ш. БЕ́ЛЫЙ — Ш., в к-ром интенсивность звука всех частот, воспринимаемых ухом человека, примерно одинакова; используется при нек-рых способах аудиометрии.

Ш. МАСКИРО́ВОЧНЫЙ БЕ́ЛЫЙ — см. *Шум маскировочный широкополосный.*

Ш. МАСКИРО́ВОЧНЫЙ УЗКОПОЛО́СНЫЙ — используемый при аудиометрическом исследовании Ш., представляющий собой звук в узком диапазоне частот, близком к частоте звукового тона, восприятие к-рого исследуют.

Ш. МАСКИРО́ВОЧНЫЙ ШИРОКОПОЛО́СНЫЙ (син. шум маскировочный белый) — белый Ш., используемый при аудиометрическом исследовании с целью маскировки тона, восприятие к-рого исследуют.

ШУМ[3] в кибернетике — совокупность случайных сигналов различной природы на входе системы, затрудняющие ей выполнение своих функций.

ШУМ ТРЕ́СНУВШЕГО ГОРШКА́ — перкуторный звук над легкими, напоминающий звук, возникающий при постукивании по закрытому треснувшему сосуду (горшку); наблюдается при пневмотораксе, осложненном бронхоплевральным свищом, или при большой периферически расположенной полости в легком, дренируемой узким бронхом.

ШУМ В УША́Х — (sonitus aurium; син. ушной шум) — ощущение шума или звона при отсутствии соответствующих звуковых раздражителей; возникает, напр., при повышенной возбудимости спирального (кортиева) органа, при патологических изменениях барабанной перепонки, при спазме мышц барабанной полости, при склеротических изменениях базилярной артерии.

ШУМА́КЕРА АНАСТОМО́З (H. B. Shumacker) — анастомоз периферических концов верхней полой вены и правой легочной артерии, создаваемый оперативным путем у больных с полной транспозицией аорты и легочной артерии и атрезией трехстворчатого клапана.

ШУМА́ХЕРА ВЕРХНЕГРУДНА́Я СИМПАТЭКТОМИ́Я (E. D. Schumacher) — хирургическая операция: удаление II и III грудных ганглиев симпатического ствола, перерезка корешков II и III грудных нервов и их соединительных ветвей; осуществляется через косой парамедианный разрез в межлопаточной области.

ШУМЛЯ́НСКОГО — БО́УМЕНА КА́ПСУЛА (А. М. Шумлянский, 1748—1795, отеч. врач; W. Bowman 1816—1892, англ. анатом и офтальмолог) — см. *Капсула почечного клубочка.*

ШУМОМЕ́Р — прибор для измерения уровня громкости звука; применяется в гигиенической практике.

ШУНТ АОРТОРЕНА́ЛЬНЫЙ (англ. shunt ответвление, переключение, шунт) — анастомоз между аортой и почечной артерией, созданный оперативным путем с использованием искусственного трансплантата; применяется при стенозе почечной артерии, приводящем к артериальной гипертензии.

ШУНТ АРТЕРИОВЕНО́ЗНЫЙ[1] — анастомоз между артерией и веной, созданный оперативным путем с имплантацией трубок из синтетического материала или трансплантацией вен; применяется для экстракорпорального диализа или парентерального питания.

ШУНТ АРТЕРИОВЕНО́ЗНЫЙ[2] в мед. технике — 1) гибкая трубка из нейлона, дакрона или тефлона, вводимая в просвет артериального или венозного сосуда для создания нового пути кровотока в обход участка сосуда, выключаемого из кровообращения; 2) (син. шунт экстракорпоральный) носимое больным устройство с целью периодического соединения его кровеносных сосудов с аппаратом «искусственная почка», гемосорбции, парентерального питания.

ШУНТ ЛИМФОВЕНО́ЗНЫЙ — анастомоз между лимфатическим сосудом и веной, возникший при стойком нарушении лимфооттока.

ШУНТ СОСУ́ДИСТЫЙ — искусственно созданный обходной путь кровотока при выключении из кровообращения участка крупного кровеносного сосуда.

ШУНТ СОСУ́ДИСТЫЙ СПЛЕНОРЕНА́ЛЬНЫЙ (греч. splēn селезенка + лат. ren почка) — искусственный анастомоз между селезеночной и почечной артериями; создается для лечения портальной гипертензии.

ШУНТ ЭКСТРАКОРПОРА́ЛЬНЫЙ (лат. extra вне + corpus, corporis тело) — см. *Шунт артериовенозный*[2].

ШУНТ-ДЫХА́НИЕ — искусственно созданный временный обходной путь движения воздуха при выключении из дыхания участка трахеи или главного бронха.

ШУНТИ́РОВАНИЕ (англ. shunt отводить, шунтировать) — хирургическая операция: формирование обходного пути при выключении из кровообращения, лимфообращения или дыхания участка соответствующих анатомических образований.

ШУНТИ́РОВАНИЕ АОРТОКОРОНА́РНОЕ — создание искусственного анастомоза между восходящей аортой и коронарной артерией дистальнее места ее сужения; применяется при ишемической болезни сердца.

ШУ́ПИКА ОПЕРА́ЦИЯ (П. Л. Шупик) — уретропластика при гипоспадии с использованием филатовского стебля, выкроенного из кожи живота.

ШУРЫ́ГИНА РЕФЛЕ́КС (Н. А. Шурыгин, отеч. врач конца 19 — начала 20 вв.) — см. *Рефлекс улиткозрачковый.*

ШУ́СТОВОЙ СРЕДА́ (Л. Н. Шустова, совр. сов. бактериолог) — плотная селективная питательная среда для выделения сальмонелл, содержащая мясопептонный агар, тиосульфат натрия и раствор Люголя.

ШУ́ХАРДТА РАЗРЕ́З (K. A. Schuchardt, 1856—1901, нем. хирург) — перинеотомия, дополненная разрезом боковой стенки влагалища, фасций и мышц промежности в обход анального отверстия слева; применяется при нек-рых гинекологических операциях, требующих широкого доступа.

ШЮЛЕ СИМПТО́М (H. Schüle, 1840—1916, нем. психиатр) — наличие между надбровными дугами кожной складки, напоминающей греческую букву Ω (омега); наблюдается при депрессии.

ШЮЛЛЕРА СПО́СОБ (A. A. Schüller, совр. австрийский рентгенолог) — способ рентгенографии височной кости в боковой проекции, позволяющий получить общее представление о строении костных отделов органа слуха.

ШЮССЛЕРА СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШОВ (U. Schüssler, нем. хирург) — способ наложения сухожильного шва, при к-ром оба конца сухожилия прошивают одной нитью в виде петли с перекрестом, выводя концы пити на боковую поверхность сухожилия.

ШЮТЦА ПУЧО́К (H. Schütz, нем. невропатолог) — см. *Пучок продольный задний.*

ШЮФФНЕРА ЗЁРНА (W. Schüffner, 1867—1949, нем. патолог) — зерна красно-фиолетового цвета, равномерно распределенные в окрашенных по методу Романовского — Гимзы эритроцитах, пораженных Plasmodium vivax и Plasmodium ovale; служат вспомогательным признаком малярии при лабораторной диагностике.

ШЮФФНЕРА ЗЕРНИ́СТОСТЬ (W. Schüffner) — см. *Шюффнера зерна.*

Щ

ЩАВЕ́ЛЕВАЯ КИСЛОТА́ — широко распространенная дикарбоновая кислота, поступающая в организм с пищей, а также образующаяся как конечный продукт окислительного дезаминирования глицина; выделяется с мочой в виде оксалата кальция.

ЩАВЕ́ЛЕВО-У́КСУСНАЯ КИСЛОТА́ (син. кетоянтарная кислота) — кетодикарбоновая кислота, участвующая в цикле трикарбоновых кислот и в реакциях переаминирования аминокислот.

ЩАВЕ́ЛЕВО-ЯНТА́РНАЯ КИСЛОТА́ — трикарбоновая кислота, участвующая в цикле трикарбоновых кислот.

ЩЕКА́ (bucca, PNA, BNA, JNA) — часть лица, составляющая боковую стенку ротовой полости.

ЩЕЛЕВА́Я ЛА́МПА — прибор для биомикроскопии глаза, представляющий собой соединение бинокулярного стереоскопического микроскопа со специальным источником света, снабженным щелевой диафрагмой.

ЩЕЛО́ЧНОЙ РЕЗЕ́РВ КРО́ВИ — показатель функциональных возможностей буферной системы крови; представляет собой количество двуокиси углерода (в *мл*), к-рое может быть связано 100 *мл* плазмы крови, предварительно

приведенной в равновесие с газовой средой, в к-рой парциальное давление двуокиси углерода составляет 40 *мм* ртутного столба.

ЩЕЛЧО́К ОТКРЫ́ТИЯ МИТРА́ЛЬНОГО КЛА́ПАНА — см. *Тон открытия митрального клапана.*

ЩЕЛЬ ВЕ́К (rima palpebrarum, PNA, BNA, JNA; син. глазная щель) — ограниченное краями век отверстие, через к-рое световое излучение достигает глазного яблока.

ЩЕЛЬ МОЧЕИСПУСКА́ТЕЛЬНОГО КАНА́ЛА НИ́ЖНЯЯ (fissura urethrae inferior) — см. *Гипоспадия.*

ЩЕЛЬ ПРЕДДВЕ́РИЯ (rima vestibuli, PNA, BNA, JNA; син. голосовая щель ложная) — пространство между преддверием гортани и ее средней частью, ограниченное преддверными складками.

ЩЕРБАКА́ ГАЛЬВАНИ́ЧЕСКИЙ ВОРОТНИ́К (А. Е. Щербак, 1863—1934, сов. физиотерапевт, невропатолог и психиатр) — метод сегментарно-рефлекторного воздействия гальваническим током, при к-ром активный электрод располагают в нижней части шеи и верхней части туловища («воротниковая зона»), а индифферентный электрод значительно большей площади — в области поясницы.

ЩЕРБАКА́ ГЕНЕРАЛИЗО́ВАННАЯ РЕА́КЦИЯ (А. Е. Щербак) — совокупность изменений сосудистого тонуса, деятельности внутренних органов, биоэлектрической активности мышц и головного мозга, возникающих при гальванизации или лекарственном электрофорезе.

ЩЕРБАКА́ ИО́ННЫЙ РЕФЛЕ́КС (А. Е. Щербак) — изменение функционального состояния сердца и легких, вызываемое воздействием на кожу левого плеча гальванического тока и введенных с его помощью ионов лекарственных веществ.

ЩЕРБАКА́ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИО́ННЫЙ РЕФЛЕ́КС (А. Е. Щербак) — повышение ректальной температуры на 0,5° после погружения рук исследуемого в воду температурой 32° и постепенного ее нагревания до 42°; признак нормального состояния терморегуляции.

ЩЁТКИНА — БЛЮМБЕ́РГА СИМПТО́М (Д. С. Щеткин, род. в 1851 г., отеч. акушер; M. Blumberg, 1873—1955, нем. хирург) — усиление боли в животе при быстром снятии пальпирующей руки с брюшной стенки после легкого надавливания; признак перитонита.

ЩЁТОЧНАЯ КАЁМКА (limbus strigillatus, LNH) — система микроворсинок на апикальной поверхности клеток кишечного и почечного эпителия, увеличивающая его всасывающую поверхность.

ЩЁЧНО-ГЛО́ТОЧНАЯ ПЕРЕПО́НКА (membrana buccopharyngea) — см. *Глоточная перепонка.*

ЩЁЧНЫЕ ВЕ́ТВИ лицевого нерва (rami buccinatorii, JNA) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *122б.*

ЩЁЧНЫЙ ФЕНО́МЕН — см. *Вюрпа рефлекс.*

ЩИПЦЫ́ — инструмент, действие которого основано на принципе рычага, предназначенный для сжимания, захватывания, откусывания или удерживания каких-либо предметов или тканей; различные виды Щ. используются в медицине, напр. в хирургии, в акушерстве и др.

Щ. АБО́РТНЫЕ — прямые Щ. с ложкообразными губками, используемые для удаления из матки крупных частей плодного яйца и последа.

Щ. АКУШЕ́РСКИЕ — Щ., предназначенные для извлечения предлежащей части плода из родовых путей.

Щ. АКУШЕ́РСКИЕ КО́СТНЫЕ — см. *Краниокласт.*

Щ. ВЛАГАЛИЩНЫЕ — Щ., губки к-рых имеют поперечную насечку и на концах зубцы; предназначены для удаления инородных тел из влагалища у девочек.

Щ. ГЕМОРРОИДА́ЛЬНЫЕ — Щ. с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах браншей, предназначенные для захватывания и удержания геморроидальных узлов при хирургической операции.

Щ. ГОРТА́ННЫЕ — Щ. с удлиненными изогнутыми браншами и овальными плоскосмыкающимися губками с мелкой насечкой; предназначены для удаления инородных тел из гортани.

Щ. ГОРТА́ННЫЕ ПОЛИ́ПНЫЕ — Щ. с острыми ложечками-наконечниками, предназначенные для удаления полипов и фибром с истинных голосовых складок, а также для биопсии.

ЩИПЦЫ́ ГО́ФФМАННА — см. *Гоффманна щипцы.*

ЩИПЦЫ ГУМИЛЕ́ВСКОГО — см. *Гумилевского щипцы.*

ЩИПЦЫ ДЕ КЕРВЕ́НА — см. *Де Кервена щипцы.*

Щ. ЗУБОВРАЧЕ́БНЫЕ — Щ. для удаления зубов, имеющие форму щечек, соответствующую анатомическим особенностям отдельных зубов.

ЩИПЦЫ КИЛЛАНДА — см. *Килланда щипцы.*

Щ. КИШЕ́ЧНЫЕ ОКО́НЧАТЫЕ — Щ. с кольцеобразными губками, имеющими поперечное рифление, и с защелкой на рукоятках; предназначены для захватывания кишечной стенки при хирургических операциях.

Щ. КО́ЖНО-ГОЛОВНЫ́Е — Щ. с кремальерой, имеющие на концах браншей по пластинке с глубокими гофрами для захватывания и прочного удерживания складки кожи головки плода.

Щ. КО́СТНЫЕ — Щ. с полукружными вырезами по щечкам, предназначенные для удержания костных обломков при остеосинтезе.

Щ. КРАМПО́ННЫЕ (франц. crampon скоба, зажим) — Щ. с короткими губками особой формы, предназначенные для захватывания, перекусывания, сгибания и сплющивания различных металлических материалов; применяются при скелетном вытяжении, шинировании челюстей и др.

ЩИПЦЫ ЛАЗАРЕ́ВИЧА — см. *Лазаревича щипцы.*

ЩИПЦЫ ЛА́НГЕНБЕКА — см. *Лангенбека щипцы.*

ЩИПЦЫ ЛАННЕЛО́НГА — см. *Ланнелонга щипцы.*

ЩИПЦЫ ЛЕВКО́ВИЧА — см. *Левковича щипцы.*

ЩИПЦЫ ЛИ́СТОНА — см. *Листона костные кусачки.*

Щ. ЛОЖКООБРА́ЗНЫЕ — Щ. с рабочими частями в форме ложек, применяемые для удаления или биопсии опухолей мозга и мозговых оболочек.

ЩИПЦЫ́ ЛЮ́ЭРА — см. *Люэра кусачки.*

ЩИПЦЫ́ МЮЗЕ́ — см. *Мюзе зажим.*

Щ. ОВАРИА́ЛЬНЫЕ (анат. ovarium яичник) — прямые Щ. с окончатыми губками, имеющими крупную поперечную насечку, предназначенные для захватывания стенки кисты яичника и других мешотчатых опухолей.

ЩИПЦЫ́ ОВНАТАНЯ́НА — см. *Овнатаняна щипцы.*

Щ. ОКО́НЧАТЫЕ БРЮ́НИНГСА — см. *Брюнингса окончатые щипцы.*

Щ. ОРТОДОНТИ́ЧЕСКИЕ — Щ., предназначенные для регулирования аппаратов и устройств, применяемых с целью профилактики и лечения деформаций зубных рядов и челюстей.

Щ. ПОЛИ́ПНЫЕ ОКО́НЧАТЫЕ — Щ. с отверстиями в овальных губках, предназначенные для захватывания и извлечения полипов шейки матки или частей плодного яйца.

Щ. ПРЕДОХРАНИ́ТЕЛЬНЫЕ — Щ. с отверстием в верхней губке и выемкой в нижней, которую подводят под черепную кость при высверливании отверстия в крае костного дефекта, чтобы предупредить проваливание сверла в полость черепа.

Щ. ПУЛЕВЫ́Е — Щ. с изогнутыми губками, оканчивающимися острым зубцом; предназначались для извлечения мягких свинцовых пуль; ныне используются при различных гинекологических вмешательствах для захватывания и удержания шейки и тела матки.

Щ. СЕКВЕСТРА́ЛЬНЫЕ (лат. sequestro отделять) — Щ. с прямыми или изогнутыми губками, имеющими косую нарезку, предназначенные для удаления костных секвестров и осколков кости.

ЩИПЦЫ СИМПСОНА — ФЕНОМЕ́НОВА — см. *Симпсона — Феноменова щипцы.*

Щ. ТАМПО́ННЫЕ — Щ. с плоскими губками, имеющими насечку, предназначенные для введения тампонов в полости уха, носа и гортани и для извлечения инородных тел из этих полостей.

Щ. ТИ́ГЕЛЬНЫЕ — Щ. для захватывания и переноса тиглей и других предметов при лабораторных работах.

Щ. УРЕТРА́ЛЬНЫЕ — Щ. для удаления инородных тел из мочеиспускательного канала.

Щ. УШНЫЕ ПОЛИ́ПНЫЕ — Щ. с узкими губками для удаления полипов из барабанной полости.

ЩИПЦЫ́ ХО́РСЛИ — см. *Хорсли щипцы.*

ЩИПЦЫ́ ШАССЕНЬЯ́КА — см. *Шассеньяка щипцы.*

ЩИПЦЫ ШРЕ́ДЕРА — см. *Шредера щипцы.*

ЩИПЦЫ́-КЛИПСОДЕРЖА́ТЕЛИ — щипцы для клипирования сосудов с длинными ручками и изогнутыми губками, имеющими на концах упор для гемостатической клипсы.

ЩИТОВИ́ДНАЯ ВЫ́РЕЗКА ВЕ́РХНЯЯ (incisura thyroidea superior, PNA; incisura thyreoidea superior, BNA; incisura thyreoidea cranialis, JNA) — углубление треугольной формы между пластинками щитовидного хряща на середине его верхнего края.

ЩИТОВИ́ДНАЯ ВЫ́РЕЗКА НИ́ЖНЯЯ (incisura thyroidea inferior, PNA; incisura thyreoidea inferior, BNA; incisura thyreoidea caudalis, JNA) — широкое углубление нижнего края щитовидного хряща.

ЩИТОВИ́ДНОЕ СПЛЕТЕ́НИЕ НЕПА́РНОЕ (plexus thyroideus impar, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1441*.

ЩИТОВИ́ДНО-ШЕ́ЙНЫЙ СТВОЛ (truncus thyrocervicalis, PNA, BNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *777*.

ЩИТОВИ́ДНО-ЯЗЫ́ЧНЫЙ ПРОТО́К (ductus thyroglossus, PNA; ductus thyreoglossus, BNA, JNA; син. Гиса канал) — проток, соединяющий зачаток щитовидной железы с ротовой полостью зародыша; редуцируется к концу внутриутробного периода развития; может явиться источником возникновения кист и свищей.

ЩИТОВИ́ДНЫЙ БУГОРО́К ВЕ́РХНИЙ (tuberculum thyroideum superius, PNA; tuberculum thyreoideum superius, BNA; tuberculum thyreoideum craniale, JNA) — выступ у верхнего конца косой линии на наружной поверхности пластинки щитовидного хряща кпереди от основания его верхнего рога.

ЩИТОВИ́ДНЫЙ БУГОРО́К НИ́ЖНИЙ (tuberculum thyroideum inferius, PNA; tuberculum thyreoideum inferius, BNA; tuberculum thyreoideum caudale, JNA) — выступ у нижнего конца косой линии на наружной поверхности пластинки щитовидного хряща кпереди от его нижнего рога.

ЩУП — длинный тонкий прямой или изогнутый зонд с овальным концом, предназначенный, напр., для проверки проходимости естественных каналов организма, подвижности слуховых косточек.

Э

Э- — см. *Экс-*.

ЭББОТТА КРОВА́ТЬ (E. G. Abbott, 1871—1938, амер. ортопед) — ортопедическое устройство для коррекции сколиоза у детей перед наложением гипсового корсета; представляет собой раму, изготовленную из металлических труб, на к-рой с помощью системы подвесок и растяжек придается нужное положение телу ребенка.

ЭББОТТА РЕДРЕССИ́РУЮЩИЙ КОРСЕ́Т (E. G. Abbott; син. Абботта редрессирующий корсет — нрк) — гипсовый корсет для лечения искривлений позвоночника; накладывается в корригированном положении больного, причем на выпуклой стороне корсета вырезают окно, куда вкладывают сменяемые через 5—10 дней войлочные редрессирующие пелоты.

ЭБЕРТА МЕ́ТОД (C. J. Eberth, 1835—1926, нем. патологоанатом) — метод выявления альвеолярного эпителия легких в гистологических препаратах путем их серебрения 0,5% раствором нитрата серебра.

ЭБНЕРА ВОЛО́КНА (V. Ebner, 1842—1925, австрийский гистолог и анатом) — коллагеновые волокна в околопульпарном дентине, проходящие в тангенциальном направлении относительно оси зуба.

ЭБНЕРА ЖИ́ДКОСТЬ (V. Ebner) — насыщенный водный раствор хлорида натрия, содержащий соляную кислоту; применяется для декальцинации костной ткани при изготовлении гистологических препаратов.

ЭБНЕРОВСКИЕ ЖЕ́ЛЕЗЫ (V. Ebner) — см. *Железы желобовидных сосочков*.

ЭБУРНЕАЦИ́Я (eburneatio; лат. eburneus похожий на слоновую кость) — остеосклероз с резким утолщением и уплотнением кортикального слоя, приобретающего вид слоновой кости.

ЭБШТЕ́ЙНА АНОМА́ЛИЯ (W. Ebstein, 1836—1912, нем. терапевт) — врожденный порок сердца: смещение створок правого предсердно-желудочкового клапана вглубь правого желудочка с деформацией и распластыванием их по внутренней стенке правого желудочка, к-рый разделяется створками на две части; сопровождается увеличением диаметра фиброзного кольца и полости правого предсердия.

ЭБШТЕ́ЙНА ПРИ́ЗНАК (W. Ebstein) — тупой (вместо прямого) угол между правой границей абсолютной перкуторной тупости сердца и верхней границей печеночной тупости; симптом экссудативного перикардита.

ЭВ- — см. *Эу-*.

ЭВАГИНА́ЦИЯ (evaginatio; франц. evagination выпячивание, эвагинация, от лат. evagino, evaginatum извлекать из ножен) — выворот кишки наружу через заднепроходное отверстие или наружное отверстие кишечного свища.

ЭВАКОВМЕСТИ́МОСТЬ санитарного транспорта — число пораженных и больных, к-рое может быть размещено на единице санитарного транспорта определенного вида в соответствии с его техническими данными.

ЭВАКОГО́СПИТАЛЬ — см. *Госпиталь эвакуационный*.

ЭВАКОЁМКОСТЬ санитарного транспорта — расчетное число пораженных и больных, к-рое может быть размещено на санитарно-транспортных средствах в соответствии с их тактико-техническими данными и штатно-организационной структурой санитарно-транспортных частей (подразделений).

ЭВАКОПРИЁМНИК — см. *Эвакуационный приемник*.

ЭВАКОПУ́НКТ (истор.) — см. *Эвакуационный пункт*.

ЭВАКУА́ТОР (лат. evacuo, evacuatum опорожнять) в мед. технике — инструмент для удаления осколков раздробленных конкрементов из мочевого пузыря; состоит из металлического катетера большого диаметра (№ 26—30) и резиновой груши; входит в комплект литотриптора.

ЭВАКУАЦИО́ННАЯ КОМИ́ССИЯ (истор.) — орган управления медицинской эвакуацией и лечебно-эвакуационными учреждениями, развернутыми в местах погрузки и разгрузки железнодорожного транспорта; были созданы в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. и существовали до 1914 г.

ЭВАКУАЦИО́ННАЯ СИСТЕ́МА — система оказания медицинской помощи и лечения пораженных и больных на войне, предусматривающая как обязательный элемент их эвакуацию из зоны боевых действий в тыл.

ЭВАКУАЦИО́ННОЕ НАПРАВЛЕ́НИЕ — 1) в военной медицине — совокупность путей медицинской эвакуации из определенной группировки войск с действующими на этих путях этапами медицинской эвакуации и санитарно-транспортными средствами; 2) в гражданской обороне — территория с грунтовыми, железнодорожными и водными путями, по к-рым осуществляется эвакуация пораженных и больных из очага поражения в определенную больничную базу.

ЭВАКУАЦИО́ННЫЙ КОНВЕ́РТ — документ военно-медицинского учета военного времени, предназначенный для хранения в нем медицинских документов пораженного (больного) при его эвакуации, а также для записи на нем указаний сопровождающему медицинскому персоналу и регистрации лечебных мероприятий, проводимых во время транспортировки.

ЭВАКУАЦИО́ННЫЙ ОТРЯ́Д (истор.) — эвакуационно-транспортная часть медицинской службы дивизии Красной Армии, предназначавшаяся для эвакуации раненых и больных из войсковых частей; предусматривался на военное время в 1923—1935 гг.

ЭВАКУАЦИО́ННЫЙ ПА́СПОРТ — см. *Маршрутный лист*.

ЭВАКУАЦИО́ННЫЙ ПРИЁМНИК (ЭП; син. эвакоприемник) — учреждение медицинской службы Вооруженных Сил, предназначенное для временного размещения пораженных и больных, ожидающих эвакуации автомобильным, железнодорожным, авиационным или водным транспортом, а также для оказания им медицинской помощи по неотложным показаниям.

ЭВАКУАЦИО́ННЫЙ ПУНКТ (син. эвакопункт) — группа лечебных, санитарно-транспортных, противоэпидемических и других учреждений и частей медицинской службы Вооруженных Сил, объединенных под руководством специального органа (управления Э. п.), обеспечивавших эвакуацию и лечение пораженных и больных на театре военных действий и в тылу страны.

Э. П. АРМЕ́ЙСКИЙ (истор.) — Э.п., развертывавшийся в период гражданской войны на стыке грунтовых и железнодорожных путей эвакуации.

Э. П. ВСПОМОГА́ТЕЛЬНЫЙ (истор.; ВЭП) — Э. п., развертывавшийся в ряде случаев в период Великой Отечественной войны во фронтовом тылу на второстепенном эвакуационном направлении.

нокимографии или электрокимографии.

ЭЗОФАГОЛО́ГИЯ (*эзофаго-* + греч. logos учение, наука) — раздел гастроэнтерологии, изучающий болезни пищевода и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики.

ЭЗОФАГОМАЛЯ́ЦИЯ (oesophagomalacia; *эзофаго-* + греч. malakia мягкость) — посмертное размягчение стенок пищевода в результате забрасывания в пищевод кислого желудочного содержимого.

ЭЗОФАГОМАНОГРАФИ́Я [*эзофаго-* + *мано(метрия)* + греч. graphō писать, изображать] — см. *Эзофаготонография.*

ЭЗОФАГОМАНОМЕТРИ́Я (*эзофаго-* + *манометрия*; син. эзофаготонометрия) — метод диагностики болезней пищевода и прилежащих к нему органов, заключающийся в регистрации изменений давления в его полости с помощью электроманометра.

ЭЗОФАГОПАТИ́Я (oesophagopathia; *эзофаго-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название симптомокомплексов, характеризующих болезни пищевода.

ЭЗОФАГОПЛА́СТИКА (oesophagoplastica; *эзофаго-* + *пластика*) — общее название пластических операций замещения пищевода при полном или частичном его удалении.

Э. ПО БИ́РХЕРУ — см. *Бирхера эзофагопластика.*

Э. ПО ВУ́ЛЛЬШТЕЙНУ — см. *Вуллыптейна эзофагопластика.*

Э. ПО ГРЕ́НДАЛЮ — см. *Грендаля эзофагопластика.*

Э. ПО ЖИА́НУ — ГА́ЛЬПЕРНУ — см. *Жиану — Гальперна эзофагопластика.*

Э. ПО РУ — см. *Ру — Герцена операция.*

ЭЗОФАГОРАФИ́Я (oesophagorrhaphia; *эзофаго-* + греч. rhaphē шов) — ушивание стенки пищевода после ее разрыва или разреза.

ЭЗОФАГОСКО́П (*эзофаго-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — медицинский эндоскоп для осмотра внутренней поверхности пищевода и выполнения нек-рых диагностических и лечебных манипуляций.

ЭЗОФАГОСКОПИ́Я (*эзофаго-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — метод исследования пищевода, заключающийся в его осмотре с помощью эзофагоскопа.

ЭЗОФАГОСПА́ЗМ (oesophagospasmus; *эзофаго-* + *спазм*; син. эзофагизм) — дискинезия пищевода, характеризующаяся его периодическим спазмом.

ЭЗОФАГОСТО́МА — 1) (oesophagostoma; *эзофаго-* + греч. stoma отверстие) — искусственный наружный свищ пищевода; накладывается, напр., как этап создания искусственного пищевода; 2) (Oesophagostomum) — род гельминтов сем. Trichonematidae кл. нематод, объединяющий распространенных повсеместно геогельминтов, паразитирующих в толстых кишках жвачных животных, нек-рых обезьян; изредка встречается у человека.

ЭЗОФАГОСТОМИ́Я (oesophagostomia; *эзофаго-* + греч. stoma отверстие)— хирургическая операция: создание наружного свища пищевода.

Э. ДВОЙНА́Я (o. duplex) — см. *Баирова операция.*

ЭЗОФАГОТОМИ́Я (oesophagotomia; *эзофаго-* + греч. tomē разрез, рассечение)— хирургическая операция: вскрытие просвета пищевода.

Э. ВНУ́ТРЕННЯЯ (o. interna) — Э., производимая доступом через грудную или брюшную стенку.

Э. ВНУ́ТРЕННЯЯ ВНЕПЛЕВРА́ЛЬНАЯ (o. interna extrapleuralis) — Э., производимая доступом через заднее средостение.

Э. НАРУЖНАЯ (o. externa) — Э., при к-рой разрезом на шее вскрывают начальный отдел пищевода.

ЭЗОФАГОТОНОГРАФИ́Я (*эзофаго-* + *тонография*; син. эзофагоманография) — графическая регистрация изменений давления в полости пищевода, измеряемых с помощью электроманометра.

ЭЗОФАГОТОНОМЕТРИ́Я — см. *Эзофагоманометрия.*

ЭЗОФАГОФИБРОСКО́П (*эзофаго-* + *фиброскоп*) — медицинский эндоскоп для осмотра слизистой оболочки пищевода; его оптическая и светопроводящая системы состоят из пучков гибких световодов из стеклянных волокон.

ЭЗОФАГОФИБРОСКОПИ́Я (*эзофаго-* + *фиброскоп*) — метод диагностики болезней пищевода и контроля эффективности их лечения, заключающийся в осмотре его слизистой оболочки с помощью эзофагофиброскопа.

ЭЗОФАГОФРЕНОПЛА́СТИКА (oesophagophrenoplastica; *эзофаго-* + греч. phrēn диафрагма + *пластика*) — см. *Петровского операция.*

ЭЗОФАГОФУНДОСТОМИ́Я (oesophagofundostomia; *эзофаго-* + лат. fundus дно + stoma отверстие) — см. *Гастроэзофагостомия.*

ЭЗОФАГОЭЛЕКТРОКАРДИОГРА́ММА (*эзофаго-* + *электрокардиограмма*) — однополюсная электрокардиограмма, для регистрации к-рой активный электрод вводят в пищевод.

ЭЗОФАГОЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИ́Я (*эзофаго-* + *электрокардиография*) — метод электрокардиографии с использованием активного электрода, введенного в пищевод, и нулевого электрода; применяется при дифференциальной диагностике нек-рых аритмий сердца.

ЭЗОФАГЭКТАЗИ́Я (oesophagectasia; *эзофаг-* + греч. ektasis расширение)— патологическое расширение пищевода с растяжением его стенки.

ЭЗОФАГЭКТОМИ́Я (oesophagectomia; *эзофаг-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление пищевода.

ЭЗОФОРИ́Я (esophoria; *эзо-* + греч. phoros несущий) — гетерофория, характеризующаяся тенденцией к отклонению глаза кнутри.

ЭЙ- — см. *Эу-.*

ЭЙДЕТИ́ЗМ (греч. eidos вид, образ) — сохранение яркого образа предмета после прекращения его воздействия на органы чувств.

ЭЙДИ СИНДРО́М (W. J. Adie, 1886—1935, англ. невропатолог; син.: Аргайлла Робертсона псевдосиндром, арефлексия конституциональная, Вейлля — Рея — Эйди синдром, псевдотабес пупиллотонический, Эйди — Холмса синдром) — симптомокомплекс, характеризующийся сочетанием обычно одностороннего замедления зрачковой реакции на конвергенцию, анизокории и изменения величины зрачка в течение дня с отсутствием или ослаблением сухожильных рефлексов на нижних, реже на верхних конечностях; наблюдается чаще у женщин.

ЭЙДИ — ХО́ЛМСА СИНДРО́М (W. J. Adie, 1886—1935, англ. невропатолог; G. M. Holmes, 1876—1965, англ. невропатолог) — см. *Эйди синдром.*

ЭЙЗЕЛЬСБЕРГА ВЫКЛЮЧЕ́НИЕ ПРИВРА́ТНИКА (A. F. Eiselsberg, 1860—1939, нем. хирург) — хирургическая операция: выключение привратника при гастроэнтеростомии путем полного пересечения и зашивания наглухо привратниковой части желудка.

ЭЙЗЕЛЬСБЕРГА РЕЗЕ́КЦИЯ ЖЕЛУ́ДКА (A. F. Eiselsberg) — модификация резекции желудка по способу Бильрот II, при к-рой частично ушитую культю желудка вшивают в тощую кишку кпереди от поперечной ободочной кишки.

ЭЙЗЕЛЬСБЕРГА ТЕО́РИЯ (A. F. Eiselsberg) — теория патогенеза послеоперационных язв желудка и двенадцатиперстной кишки, согласно к-рой они обусловлены восходящим тромбозом сосудов культи резецированного сальника, а также венозной эмболией сосудов этих органов.

ЭЙЗЕНЛОРА СИНДРО́М (истор.; K. Eisenlohr, 1847—1896, нем. врач) — сочетание дизартрии, паралича губ, языка и мягкого неба, а также слабости конечностей, возникающее как осложнение брюшного тифа.

ЭЙЗЕНМЕНГЕРА КО́МПЛЕКС (V. Eisenmenger, 1864—1932, нем. врач) — см. *Эйзенменгера синдром.*

ЭЙЗЕНМЕНГЕРА СИНДРО́М (V. Eisenmenger; син. Эйзенменгера комплекс) — врожденный порок сердца: сочетание дефекта межжелудочковой перегородки с расширением легочного ствола и недостаточностью его клапана, а также нередко с декстропозицией аорты, отходящей от обоих желудочков непосредственно над дефектом перегородки.

ЭЙЗОПТРОФОБИ́Я (eisoptrophobia; греч. eisoptron зеркало + *фобия*; син. спектрофобия) — навязчивый страх — боязнь зеркал.

ЭЙКАПНИ́Я (*эй-* + греч. kapnos дым) — см. *Нормокапния.*

ЭЙКЕНА СПО́СОБ ГИПОФАРИНГОСКОПИ́И (C. Eicken, 1873—1960, нем. оториноларинголог; син. гипофарингоскопия глубокая) — способ непрямой ларингоскопии, при к-ром для облегчения осмотра надгортанник отдавливают кпереди с помощью гортанного зонда.

ЭЙКМАНА СРЕДА́ (Ch. Eykman, 1858—1930, голландский бактериолог) — жидкая питательная среда, содержащая пептон, поваренную соль и глюкозу; используется при исследовании воды на присутствие в ней кишечной палочки.

ЭЙКОНО́МЕТР (греч. eikōn изображение + metreō измерять, определять) — см. *Анизейконометр.*

ЭЙЛЕНБУРГА ПАРАМИОТОНИ́Я (A. Eulenburg, 1840—1917, нем. невро-

патолог) — см. *Парамиотония врожденная.*

ЭЙНГУС (нем. Einguss вливание) — приспособление в виде металлической формы для получения золотых дисков, используемых при изготовлении искусственных зубных коронок.

ЭЙНИСА МЕ́ТОД (В. Л. Эйнис, 1890—1979, сов. фтизиатр) — способ выявления патологических изменений в верхушках легких, заключающийся в сравнительной перкуссии по ключицам на высоте вдоха и при глубоком выдохе.

ЭЙНТХО́ВЕНА ПРА́ВИЛО (W. Einthoven, 1860—1927, голландский физиолог) — закономерность, согласно к-рой амплитуда зубцов электрокардиограммы, регистрируемая в одном из трех стандартных отведений, равна алгебраической сумме амплитуд, регистрируемых в двух других отведениях; лежит в основе определения электрической оси сердца.

ЭЙНТХО́ВЕНА ТЕО́РИЯ (W. Einthoven) — теория формирования электрокардиограммы, согласно к-рой сердце рассматривается как бесконечно малый диполь, расположенный в центре треугольника Эйнтховена и непрерывно меняющий величину и направление вектора электродвижущей силы; проекции вектора на каждую из сторон треугольника определяют форму электрокардиограммы в трех стандартных отведениях (с учетом смещения третьего угла на дистальную часть левой голени).

ЭЙНТХО́ВЕНА ТРЕУГО́ЛЬНИК (W. Einthoven) — условный равносторонний треугольник, вершины которого примерно соответствуют запястьям правой и левой руки и лонному сочленению; используется в теории электрокардиографии.

ЭЙРИТМИ́Я (eurhythmia; *эй-* + *ритм*) в кардиологии — нормальный ритм пульса или сердечных сокращений.

ЭЙРСА СВЕТОВО́Й ХЕЙЛИ́Т (S. Ayres, амер. врач 20 в.) — см. *Хейлит актинический.*

ЭЙТАНАЗИ́Я (euthanasia; *эй-* + греч. thanatos смерть) — намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного, находящегося в терминальном состоянии, с целью прекращения его страданий; по советскому законодательству рассматривается как преступление.

ЭЙТНЕРА ОПЕРА́ЦИЯ (Eitner) — хирургическая операция: исправление оттопыренных ушных раковин, заключающееся в иссечении эллипсовидных участков кожи и хряща вдоль всей задней поверхности ушной раковины и наложении швов на края образованного дефекта.

ЭЙТРОФИ́Я (*эй-* + греч. trophē питание) — состояние организма, характеризующееся оптимальным взаимоотношением процессов ассимиляции и диссимиляции при отсутствии отклонений в структуре и функции органов.

ЭЙФОРИКОМАНИ́Я (*эйфория* + *мания*) — см. *Наркомания.*

ЭЙФОРИ́Я (euphoria; *эй-* + греч. pherō нести, переносить) — повышенное благодушное настроение, сочетающееся с беспечностью и недостаточной критической оценкой своего состояния.

ЭЙФОРИ́Я ИПОХОНДРИ́ЧЕСКАЯ (euphoria hypochondriaca) — сочетание ипохондрии с эйфорией.

ЭЙХОФОБИ́Я (euchophobia; греч. euchos желание, пожелание + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь произносить или слушать пожелания.

ЭК- (экз-; греч. ek-, ex-) — приставка, означающая «вне, за пределами чего-либо».

ЭКАМЕ́ТР — номографическая линейка для анализа электрокардиограммы.

ЭКАЗА́НА АПРАКТОАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ СИНДРО́М — сочетание пространственной агнозии, анозогнозии, аутотопогнозии, нарушения праксиса, иногда апраксии одевания; возникает при поражении теменно-затылочной области коры правого полушария большого мозга.

ЭКБОМА СИНДРО́М (K. A. Ekbom, род. в 1907 г., шведский невропатолог) — см. *Бред дерматозойный.*

ЭКВА́ТОР ГЛА́ЗА — наибольшая окружность глазного яблока во фронтальной плоскости.

ЭКВА́ТОР ХРУСТА́ЛИКА — линия перехода передней поверхности хрусталика в заднюю.

ЭКВАТОРИА́ЛЬНАЯ ПЛАСТИ́НКА (lamina equatorialis, LNH) — скопление хромосом в срединной плоскости ахроматинового веретена во время метафазы митоза.

ЭКВИ- (лат. aequus ровный, соразмерный, равный) — составная часть сложных слов, означающая «равный», «в равной степени».

ЭКВИВАЛЕ́НТ ДЕПРЕ́ССИИ — расстройство деятельности внутренних органов, возникающее вместо приступа депрессии.

ЭКВИВАЛЕ́НТ КИСЛОРО́ДА КАЛОРИ́ЧЕСКИЙ — количество тепла, к-рое освобождается при окислении данного вещества (напр., пищи) кислородом из расчета на 1 *л* потребленного кислорода.

ЭКВИВАЛЕ́НТНАЯ ТЕМПЕРАТУ́РА — см. *Оперативная температура.*

ЭКВИ́НА (variola equina; лат. equinus лошадиный; син. оспа лошадей) — инфекционная болезнь лошадей, вызываемая вирусом, генетически близким к возбудителю натуральной оспы человека.

ЭКВИФА́ЗНОСТЬ ЗУБЦО́В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРА́ММЫ (*экви-* + *фаза*) — равенство амплитуды двух противоположно направленных зубцов электрокардиограммы в данном отведении.

ЭКВИФИНА́ЛЬНОСТЬ (*экви-* + лат. finalis конечный) — сходство психопатологических проявлений различных психических болезней на конечных этапах их развития.

ЭКГ — см. *Электрокардиограмма.*

ЭКЗ- — 1) см. *Эк-*; 2) см. *Экс-.*

ЭКЗАЛЬТАЦИО́ННАЯ ФА́ЗА — см. *Экзальтационный период.*

ЭКЗАЛЬТАЦИО́ННЫЙ ПЕРИ́ОД (син. экзальтационная фаза) — период повышенной возбудимости клетки или ткани, наступающий вслед за периодом относительной рефрактерности.

ЭКЗАЛЬТА́ЦИЯ (exaltatio; лат. «подъем, воодушевление») — повышенное настроение с оттенком неестественной восторженности.

ЭКЗАНТЕ́МА (exanthema; греч. exanthēma высыпание, сыпь, от exanthеō цвести, расцветать) — общее название сыпей на коже.

Э. ГРИППО́ЗНАЯ (e. gripposum) — Э. в виде обильных мелких очагов эритемы, иногда наблюдающаяся при гриппе.

Э. ДИСМЕНОРЕ́ЙНАЯ (e. dysmenorrhoicum; син. Э. менструальная) — Э., регулярно возникающая перед или во время менструации (нередко на одном и том же месте) и исчезающая по ее окончании.

Э. МЕНСТРУА́ЛЬНАЯ (e. menstruale) — см. *Экзантема дисменорейная.*

Э. СЫПНОТИФО́ЗНАЯ (e. typhosum) — Э. в виде обильной розеолезно-петехиальной (реже розеолезной) сыпи, появляющейся в типичных случаях сыпного тифа одномоментно на 4—5-й день болезни и локализующейся преимущественно на коже туловища и сгибательных поверхностей конечностей.

Э. ТОКСИ́ЧЕСКАЯ (e. toxicum) — см. *Токсидермия.*

ЭКЗАНТЕ́МА БО́СТОНСКАЯ (син. экзантема эпидемическая) — острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом из группы ECHO-вирусов, характеризующаяся лихорадкой, явлениями общей интоксикации и макулопапулезной сыпью.

ЭКЗАНТЕ́МА ВНЕЗА́ПНАЯ (exanthema subitum) — острая инфекционная болезнь детей раннего возраста, характеризующаяся внезапным подъемом температуры и ее критическим падением через 3—5 дней с последующим появлением мелкопятнистой сыпи на коже гл. обр. запястий и ягодиц.

ЭКЗАНТЕ́МА ЭПИДЕМИ́ЧЕСКАЯ (exanthema epidemicum) — см. *Экзантема бостонская.*

ЭКЗАРТИКУЛЯ́ЦИЯ (exarticulatio; *экз-*[2] + анат. articulatio сустав; син. вычленение) — хирургическая операция: отсечение всей конечности или ее дистальной части разрезом, проходящим через суставную щель.

ЭКЗАЦЕРБА́ЦИЯ (exacerbatio; лат. exacerbo раздражать, отягощать) — см. *Обострение.*

ЭКЗЕ́МА (eczema; греч. ekzema высыпание на коже, от ekzeō вскипать, вспыхивать) — рецидивирующий нейроаллергический дерматоз, характеризующийся развитием серозного воспаления сосочкового слоя дермы и очагового спонгиоза эпидермиса, проявляющийся полиморфной зудящей сыпью (везикулы, папулы, эритема и др.).

Э. ВАРИКО́ЗНАЯ (e. varicosum) — Э. в области голеней, возникающая при варикозном расширении вен.

Э. ГИПЕРКЕРАТОТИ́ЧЕСКАЯ (e. hyperkeratoticum) — см. *Экзема тилотическая.*

Э. ДЕ́ТСКАЯ (e. infantile, e. infantium) — Э., развивающаяся у детей на фоне экссудативного диатеза.

Э. ДИСГИДРОТИ́ЧЕСКАЯ (e. dyshidroticum) — Э., локализующаяся на ладонях и подошвах и сопровождающаяся образованием многокамерных пузырей.

Э. ИМПЕТИГИНО́ЗНАЯ (e. impetiginosum) — Э., осложненная импетиго.

Э. ИНТЕРТРИГИНО́ЗНАЯ (e. intertriginosum) — Э., локализован-

ная преимущественно в складках кожи.

Э. ИСТИННАЯ (e. verum) — Э. в виде симметричных рассеянных небольших очагов, не имеющих четких границ, чередующихся с участками здоровой кожи и располагающихся обычно на конечностях.

Э. КЕРАТОТИЧЕСКАЯ (e. keratoticum) — см. *Экзема тилотическая.*

Э. КОНТАКТНАЯ (e. contactum) — Э., развивающаяся в месте контакта с веществами, к к-рым чувствительность кожи повышена.

Э. ЛАДОННО-ПОДОШВЕННАЯ (e. palmoplantare) — см. *Экзема тилотическая.*

Э. МЕНСТРУАЛЬНАЯ (e. menstruale) — Э., обостряющаяся в предменструальный и менструальный периоды.

Э. МИКРОБНАЯ (e. microbicum) — Э., развивающаяся вокруг очага гнойного воспаления и характеризующаяся резкой границей в виде полоски отслаивающегося эпидермиса между пораженной и непораженной кожей.

Э. МОКНУЩАЯ (e. madidans) — Э., при к-рой наблюдается выраженное мокнутие.

Э. МОНЕТОВИДНАЯ (e. nummulare; син. Э. нуммулярная) — микробная Э., при к-рой участки пораженной кожи имеют округлую форму.

Э. НУММУЛЯРНАЯ (e. nummulare; лат. nummus монета) — см. *Экзема монетовидная.*

Э. ПАРАТРАВМАТИЧЕСКАЯ (e. paratraumaticum) — микробная Э., локализующаяся вокруг поврежденного участка кожи.

Э. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (e. professionale) — Э., чаще на кистях рук, возникающая в результате воздействия профессиональных вредностей.

Э. ПРУРИГИНОЗНАЯ (e. pruriginosum) — Э., при к-рой среди элементов сыпи преобладают папуловезикулы.

Э. РОГОВАЯ (e. keratoticum) — см. *Экзема тилотическая.*

Э. СЕБОРЕЙНАЯ (e. seborrhoicum) — Э. при себорее, развивающаяся на коже лица, волосистой части головы, груди и спины в виде эритематопапулезных высыпаний с выраженным крупнопластинчатым шелушением и отсутствием мокнутия.

Э. СОЛНЕЧНАЯ (e. solare) — Э., возникающая на открытых участках кожи при повышенной чувствительности к солнечному излучению; разновидность фотодерматоза.

Э. ТИЛОТИЧЕСКАЯ (e. tyloticum; греч. tylōsis омозолелость; син.: Э. гиперкератотическая, Э. кератотическая, Э. ладонно-подошвенная, Э. роговая) — Э. на ладонях и подошвах, сопровождающаяся гиперкератозом; развивается чаще у женщин в климактерическом периоде.

ЭКЗЕ́МА ВАКЦИНА́ЛЬНАЯ (eczema vaccinale) — форма генерализованной вакцинии, возникающая при попадании вируса осповакцины на участки патологически измененной кожи, напр. при экземе, нейродермите.

ЭКЗЕ́МА ГЕРПЕТИФО́РМНАЯ (eczema herpetiforme; *герпес* + лат. -formis подобный, похожий) — см. *Пустулез вариолиформный.*

ЭКЗЕ́МА КОНСТИТУЦИОНА́ЛЬНАЯ (eczema constitutionale) — см. *Нейродермит диффузный.*

ЭКЗЕ́МА ОКАЙМЛЁННАЯ — см. *Эпидермофития паховая.*

ЭКЗЕ́МА ЭНДОГЕ́ННАЯ (eczema endogenum) — см. *Нейродермит диффузный.*

ЭКЗЕМАТИЗА́ЦИЯ — возникновение патологических изменений кожи, клинически напоминающих экзему, обусловленное воздействием внешних раздражающих факторов, как правило на участки кожи, ранее пораженные каким-либо хроническим дерматозом.

ЭКЗЕМАТО́ЗНЫЕ КОЛО́ДЦЫ — микроскопические дефекты эпидермиса, образующиеся при экземе в результате опорожнения внутриэпидермальных пузырьков.

ЭКЗЕМАТО́ИД [eczematoidum; *экзема* (основа eczemat-) + греч. -eidēs подобный] — ограниченный поверхностный эпидермодермит, вызванный микроорганизмами и характеризующийся тенденцией к переходу в микробную экзему.

ЭКЗЕМАТО́ИД ПО́ЗДНИЙ ЭКССУДАТИ́ВНЫЙ — см. *Нейродермит диффузный.*

ЭКЗЕНТЕРА́ЦИЯ (exenteratio; лат. exentero извлекать внутренности, потрошить; от *экз-*[1] + греч. entera внутренности) — см. *Эвисцерация.*

ЭКЗЕНТЕРА́ЦИЯ ГЛА́ЗА (exenteratio oculi) — см. *Эвисцерация глаза.*

ЭКЗЕНТЕРА́ЦИЯ ГЛАЗНИ́ЦЫ (exenteratio orbitae) — хирургическая операция: удаление содержимого глазницы, напр. при злокачественной опухоли.

ЭКЗЕРЕ́З (устар.; exaeresis; греч. exairesis изъятие, извлечение; от *экз-*[1] + греч. haireō брать, взять; син. авульсия) — хирургическая операция: удаление инородного тела, органа, участка ткани путем выкручивания или вырывания, напр. Э. нерва, сосуда.

ЭКЗИСТЕНЦИА́ЛЬНЫЙ АНА́ЛИЗ (лат. existentia существование) — анализ биографии больного с целью определения смысла и целей его жизни, внутренних возможностей личности производить переоценку своих нравственных ценностей и идеалов; используется для выработки психотерапевтических рекомендаций больному; применяется гл. обр. в зарубежной психиатрии.

ЭКЗО- (греч. exō вне, снаружи, извне) — составная часть сложных слов, означающая «вне», «снаружи», «извне», «внешний», «наружный».

ЭКЗОАЛЛЕРГЕ́Н (exoallergenum; *экзо-* + *аллерген*) — см. *Аллерген экзогенный.*

ЭКЗОАЛЛЕРГИ́Я (exoallergia; *экзо-* + *аллергия*) — аллергия к экзогенному аллергену.

ЭКЗОБИОЛО́ГИЯ (*экзо-* + *биология*) — раздел биологии, изучающий возможность существования внеземных форм жизни.

ЭКЗОГЕНИ́Я (*экзо-* + греч. genea рождение, порождение) — обусловленность какого-либо процесса (в т. ч. патологического) причинами (факторами), находящимися вне организма; в психиатрии термин распространяют на все соматически обусловленные и психогенные заболевания.

ЭКЗОГЕ́ННЫЕ ТИ́ПЫ РЕА́КЦИЙ (син. синдром экзогенный) — общее название группы психозов, вызванных инфекционной болезнью, интоксикацией или травмой и проявляющихся определенной группой синдромов помрачения сознания: оглушением, делирием, аменцией, сумеречным помрачением сознания, а также эпилептиформным возбуждением, галлюцинозом.

ЭКЗОГЕ́ННЫЙ (*экзо-* + греч. -genēs порождаемый, происходящий) — возникающий под влиянием воздействия внешних факторов.

ЭКЗОГЕНО́ТА (*экзо-* + греч. genos род, происхождение) — фрагмент хромосомы, попавший в бактериальную клетку (сингеноту) в результате трансдукции или конъюгации.

ЭКЗОГЛОССИ́Я (exoglossia; *экзо-* + греч. glōssa язык) — увеличение языка, при к-ром он значительно выступает изо рта.

ЭКЗОПЕПТИДА́ЗЫ — ферменты группы гидролаз, действующие на концевые пептидные связи и катализирующие последовательное отщепление аминокислотных остатков с N- или С-конца полипептидной цепочки; участвуют в переваривании белков в тонкой кишке.

ЭКЗОРЦИ́ЗМ (exorcismus; греч. exorkizō заклинать) — лечение болезней, сопровождающихся психическими расстройствами, путем заклинаний с целью «изгнания дьявола, вселившегося в больного»; разновидность знахарства; Э. был распространен гл. обр. в средние века, но иногда практикуется и ныне в нек-рых, даже развитых, капиталистических странах.

ЭКЗОСТО́З (exostosis; *экзо-* + греч. osteon кость + *-оз*; син. остеома хондральная) — нарост на кости, образованный костной тканью.

ЭКЗОСТО́З КО́СТНО-ХРЯЩЕВО́Й (exostosis osteocartilaginea; син.: остеоид-хондрома, остеохондрома) — нарост на кости, образованный костной и хрящевой тканью.

ЭКЗОСТО́З СУ́МЧАТЫЙ (exostosis bursata) — экзостоз, над наружным покровом к-рого образовалась слизистая сумка.

ЭКЗОСТО́ЗЫ КО́СТНО-ХРЯЩЕВЫ́Е МНО́ЖЕСТВЕННЫЕ (exostoses osteocartilagineae multiplices; син.: аклазия диафизарная, хондродисплазия деформирующая, хондроматоз кости наружный, экзостозы хрящевые множественные, Эренфрида болезнь) — наследственная болезнь, характеризующаяся образованием множественных костно-хрящевых экзостозов в области метафизов и эпифизов длинных трубчатых костей, сопровождающимся нарушением роста костей и их деформацией.

ЭКЗОСТО́ЗЫ ХРЯЩЕВЫ́Е МНО́ЖЕСТВЕННЫЕ (exostoses cartilagineae multiplices) — см. *Экзостозы костно-хрящевые множественные.*

ЭКЗОТОКСИ́Н (*экзо-* + *токсин*; син. токсин истинный) — ядовитое вещество белковой природы, продуцируемое токсигенной бактерией и обнаруживаемое во внешней среде, а при культивировании накапливающееся в питательной среде.

ЭКЗОТОКСИ́Н ХОЛЕ́РНЫЙ — см. *Холероген.*

ЭКЗОТРОПИ́Я (exotropia; *экзо-* + греч. tropos поворот, направление) — см. *Косоглазие расходящееся.*

ЭКЗОФЕРМЕ́НТЫ БАКТЕ́РИЙ (*экзо-* + *ферменты*) — ферменты, выделяемые бактериями во внешнюю среду; накапливаются в питательной среде при культивировании бактерий.

ЭКЗОФИЛИ́Я (*экзо-* + греч. philia любовь, склонность) в паразитологии — особенность нек-рых кровососущих насекомых, заключающаяся в их способности переваривать кровь только в природных убежищах, а не в строениях или сооружениях; учитывается при проведении дезинсекции.

ЭКЗОФИ́Т (*экзо-* + греч. phyton нечто вырастающее) — см. *Остеофит.*

ЭКЗОФОРИ́Я (exophoria; *экзо-* + греч. phoros несущий) — гетерофория с тенденцией к отклонению глаза кнаружи.

ЭКЗОФТА́ЛЬМ (exophthalmus; *экз*[1] - + греч. ophthalmos глаз; син. пучеглазие — устар.) — смещение глазного яблока вперед, сопровождающееся расширением глазной щели.

Э. ВОСПАЛИ́ТЕЛЬНЫЙ (e. inflammatorius) — Э., вызванный воспалительным процессом в области глазницы.

Э. МНИ́МЫЙ (e. spurius) — Э., обусловленный увеличенным объемом жировой клетчатки глазницы (у тучных людей) или увеличенными размерами глазных яблок (напр., при близорукости высокой степени).

Э. ПЕРЕМЕ́ЖАЮЩИЙСЯ (e. intermittens) — Э., выявляемый при наклоне или других положениях головы, ведущих к венозному стазу в глазнице; наблюдается при варикозном расширении глазничных вен.

Э. ПУЛЬСИ́РУЮЩИЙ (e. pulsans) — Э., сочетающийся с пульсацией глаза и дующим шумом, выслушиваемым при аускультации височной области; наблюдается при разрыве внутренней сонной артерии в области пещеристого синуса с образованием каротидно-кавернозного анастомоза.

Э. ТИРЕОТОКСИ́ЧЕСКИЙ (e. thyreotoxicus) — Э. при диффузном токсическом зобе.

ЭКЗОФТА́ЛЬМ ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННЫЙ (exophthalmus malignus; син.: офтальмоплегия экзофтальмическая, офтальмотропизм аденогипофизарный, синдром гиперофтальмопатический, экзофтальм злокачественный прогрессирующий) — болезнь, обусловленная дисфункцией гипоталамо-гипофизарно-щитовидного комплекса, характеризующаяся прогрессирующим экзофтальмом, наружной офтальмоплегией, хемозом конъюнктивы, в тяжелых случаях — кератитом с возможной перфорацией роговицы.

ЭКЗОФТА́ЛЬМ ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕССИ́РУЮЩИЙ (exophthalmus malignus progressivus) — см. *Экзофтальм злокачественный.*

ЭКЗОФТАЛЬМИ́ЧЕСКИЙ ФА́КТОР ГИПО́ФИЗА — вещество белковой природы, вызывающее развитие экзофтальма у больных диффузным токсическим зобом; выделяется гипофизом и обнаруживается в сыворотке крови.

ЭКЗОФТАЛЬМО́МЕТР (*экзофтальм* + греч. metreō измерять, определять) — прибор для измерения выстояния роговицы (в *мм*) от наружного края глазницы.

ЭКЗОФТАЛЬМОМЕТРИ́Я (exophthalmometria; *экзофтальм* + греч. metreō измерять, определять) — определение степени выстояния глазного яблока из глазницы с целью исследования динамики экзофтальма.

ЭКЗОЦЕЛО́М (*экзо-* + *целом*) — см. *Целом внезародышевый.*

ЭКЗОЦИТО́З (*экзо-* + гист. cytus клетка + *-оз*) — процесс выделения клеткой вещества в виде секреторных гранул или вакуолей.

ЭКЗОЭРИТРОЦИТА́РНАЯ СТА́ДИЯ (*экзо-* + *эритроцит*) — стадия жизненного цикла малярийных паразитов, протекающая в организме хозяина вне его кровяного русла (у паразитов человека — в клетках печени).

ЭКЗЭНЦЕФАЛИ́Я (exencephalia; *экз*[1]- + греч. enkephalos головной мозг) — аномалия развития: полное или частичное отсутствие костей крыши черепа при правильно сформированном головном мозге.

ЭККА ФИ́СТУЛА (Н. В. Экк, 1849—1908, отеч. хирург и физиолог) — метод выключения функций печени в эксперименте на животном; заключается в наложении соустья между нижней полой и воротной венами с одновременной перевязкой воротной вены выше соустья, в результате чего кровь, минуя печень, поступает в нижнюю полую вену.

ЭКК-ПА́ВЛОВСКАЯ ФИ́СТУЛА (Н. В. Экк, 1849—1908, отеч. хирург и физиолог; И. П. Павлов, 1849—1936, сов. физиолог) — модификация фистулы Экка, при к-рой вместо воротной вены перевязывают над соустьем нижнюю полую вену, в результате чего увеличивается ток крови через печень.

ЭКЛАМПСИ́ЗМ (eclampsismus; греч. eklampsis вспышка, внезапное возникновение) — см. *Преэклампсия.*

ЭКЛАМПСИ́Я (eclampsia; греч. eklampsis вспышка, внезапное возникновение) — тяжелая форма позднего токсикоза беременных, проявляющаяся, как правило, судорожными припадками, артериальной гипертензией и (или) отеками.

Э. БЕЗ СУ́ДОРОГ (e. sine convulsione) — вариант Э., характеризующийся расстройствами сознания, артериальной гипертензией, отеками и значительными патологическими изменениями мочи при отсутствии судорожных припадков.

ЭКЛИНА БОЛЕ́ЗНЬ (Th. Ecklin, совр. швейц. педиатр) — доброкачественная анемия новорожденных, характеризующаяся гепатоспленомегалией и желтухой, иногда появлением небольшого количества эритробластов в периферической крови.

ЭКЛИ́ПС-ФА́ЗА (англ. eclipse phase; греч. ekleipsis отсутствие, исчезновение) — ранняя стадия внутриклеточной репродукции вирусов, во время к-рой родительский вирус уже не обнаруживается в клетке, а дочерние вирионы еще не образовались.

ЭКМНЕЗИ́Я (ekmnesia; *эк-* + греч. mnēsis воспоминание, память) — 1) перенесение в памяти психически больного событий прошлой жизни в настоящее; 2) перенесение в памяти психически больного событий настоящей жизни в прошлое с соответствующим уменьшением своего возраста; возникает на фоне прогрессирующей амнезии.

ЭКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ СРЕДА́ ЧЕЛОВЕ́КА — см. *Окружающая среда.*

ЭКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ СУКЦЕ́ССИЯ (лат. successio следование, преемственность) — закономерная смена биоценозов вслед за изменениями окружающей среды.

ЭКОЛО́ГИЯ (греч. oikos дом, место обитания + logos учение) — наука о взаимоотношениях организмов друг с другом и с окружающей средой.

Э. ГЕОХИМИ́ЧЕСКАЯ — раздел Э., изучающий взаимодействие организмов и их сообществ с геохимической средой в биосфере, разрабатывающий нормативы минерального и микроэлементного питания, методы предупреждения и лечения нек-рых эндемических болезней.

Э. РАДИАЦИО́ННАЯ (син.: биогеоценология радиационная, радиоэкология) — раздел Э., изучающий отношение живых организмов, их популяций и сообществ к воздействию ионизирующего излучения, характерного для среды обитания.

ЭКОЛО́ГИЯ ЧЕЛОВЕ́КА — наука, изучающая общие закономерности взаимоотношений природы и человека и разрабатывающая мероприятия, направленные на оптимизацию их взаимодействия.

ЭКОНО́МИКА ЗДРАВООХРАНЕ́НИЯ — область экономических наук и организации здравоохранения, изучающая экономическую эффективность мер по охране здоровья населения и разрабатывающая методы рационального использования ресурсов здравоохранения.

ЭКОНОМИ́ЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИ́ВНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕ́НИЯ — результативность деятельности органов и учреждений здравоохранения для развития общественного производства и роста национального дохода, определяемая как соотношение объема средств, вложенных в комплекс лечебно-профилактических мероприятий по снижению заболеваемости, инвалидности, смертности, и полученного эффекта, выраженного приростом (в стоимостном выражении) общего национального продукта за счет повышения уровня жизнедеятельности людей.

ЭКОНО́МО ТРИА́ДА (K. Economo, 1876—1931, австрийский невропатолог) — сочетание лихорадки, патологической сонливости и глазодвигательных нарушений у больных эпидемическим летаргическим энцефалитом Экономо в остром периоде болезни.

ЭКОНО́МО ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ ЛЕТАРГИ́ЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛИ́Т (K. Economo; син.: энцефалит летаргический, энцефалит сонный, энцефалит эпидемический) — инфекционная болезнь неясной (вероятно, вирусной) этиологии, характеризующаяся в острой стадии лихорадкой, катаральными явлениями, сонливостью, глазодвигательными нарушениями, а в хронической форме — поражением различных отделов центральной и вегетативной нервной системы с развитием паркинсонизма и изменением личности.

ЭКОНО́МО — КОСКИ́НАСА КА́РТА (K. Economo, 1876—1931, австрийский невропатолог; G. N. Koskinas) — схема архитектоники коры полушарий большого мозга, согласно к-рой поверхность каждого полушария по кле-

точному составу делится на 7 долей и 109 полей.

ЭКОНО́МО — ФИ́ШЕРА СИНДРО́М (K. Economo, 1876—1931, австрийский невропатолог; Fischer) — гемибаллизм, наблюдаемый при нарушениях кровообращения в головном мозге с поражением подбугорного ядра (люисова тела).

ЭКОСИСТЕ́МА (греч. oikos место обитания + система) — см. *Система экологическая.*

ЭКОСФЕ́РА (греч. oikos место обитания + sphaira шар) — см. *Биосфера.*

ЭКРАЗЁР (франц. écraseur) — см. *Энтеротриб.*

ЭКРА́Н (франц. écran щит, экран) — устройство для отражения, поглощения или преобразования определенного вида излучения; в медицине Э. используются, напр., для защиты от излучений, для получения изображений при диагностическом исследовании.

Э. РАДИОЗАЩИ́ТНЫЙ — Э., применяемый для защиты больных и персонала от воздействия ионизирующих излучений; изготовляется из материалов, обладающих высокой способностью их поглощения.

Э. РЕНТГЕ́НОВСКИЙ — Э. в виде пластины (пленки), покрытой люминофором, предназначенный для преобразования невидимого рентгеновского изображения в видимое.

Э. РЕНТГЕ́НОВСКИЙ УСИЛИВА́ЮЩИЙ — Э. р., вкладываемый в рентгеновскую кассету вместе с фотопленкой для усиления контрастности изображения на ней.

ЭКРАНИ́РОВАНИЕ — защита какого-либо объекта от воздействия электромагнитных полей или определенного вида излучений посредством установки соответствующей виду поля (излучения) преграды между объектом и источником; используется для защиты людей в производственных условиях или при облучении с диагностической или лечебной целью.

ЭКРАНИ́РОВАННАЯ КА́МЕРА — помещение для исследования биоэлектрических явлений, стены к-рого экранируют содержимое камеры (живые организмы, приборы) от воздействия внешних электромагнитных полей.

ЭКС- (э-; экз-; лат. ex-, e-) — приставка, означающая «удаление, извлечение чего-либо», «лишение, отсутствие чего-либо» или «освобождение от чего-либо».

ЭКСГИБИЦИОНИ́ЗМ (exhibitionismus; лат. exhibeo выставлять) — форма полового извращения, при к-рой половое удовлетворение достигается обнажением половых органов в присутствии лиц противоположного пола.

ЭКСГУМА́ЦИЯ (*экс-* + лат. humus земля) — извлечение трупа из места захоронения для его осмотра или судебно-медицинской экспертизы.

ЭКСИКА́ТОР (лат. exsicco, exsiccatum сушить, высушивать) — толстостенный стеклянный сосуд с пришлифованной крышкой, на дно к-рого помещают влагопоглощающее вещество; предназначен для высушивания или хранения высушенных материалов в фармацевтической и лабораторной практике.

ЭКСИКО́З (exsiccosis; лат. exsicco сушить, высушивать + *-оз*) — см. *Обезвоживание организма.*

ЭКСКАВА́ТОР СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ (лат. excavo, excavatum долбить, выдалбливать) — двусторонний инструмент с рабочими частями в виде мелких ложечек с острыми краями; применяется для извлечения из кариозной полости зуба пищевых остатков, размягченных слоев дентина, спиленных бором твердых тканей зуба, а также для удаления отложений на зубах и обработки зубодесневых карманов.

ЭКСКАВА́ЦИЯ диска зрительного нерва (excavatio disci nervi optici; лат. excavatio углубление) — углубление в диске зрительного нерва, наблюдаемое при офтальмоскопии.

Э. АТРОФИ́ЧЕСКАЯ (e. atrophica) — глаукоматозная Э. блюдцеобразной формы, занимающая весь диск зрительного нерва и сопровождающаяся перегибом сосудов сетчатки у его края.

Э. ГЛАУКОМАТО́ЗНАЯ (e. glaucomatosa; син. Э. краевая) — Э. при глаукоме, обусловленная атрофией нервных волокон.

Э. КРАЕВА́Я (e. marginata) — см. *Экскавация глаукоматозная.*

Э. ПЛО́СКАЯ (e. plana) — глаукоматозная Э., характеризующаяся небольшой величиной и сопровождающаяся побледнением диска без перегиба сосудов сетчатки у его края.

Э. ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ (e. physiologica) — см. *Углубление диска.*

ЭКСКОРИА́ЦИЯ (excoriatio; лат. excorio сдирать кожу; от *экс-* + corium кожа; син.: ссадина, царапина) — механическое, обычно линейное поверхностное нарушение целости кожи или слизистых оболочек, напр. в результате расчесывания.

ЭКСКОХЛЕА́ЦИЯ (excochleatio; *экс-* + лат. cochlear ложка; син. вычерпывание) — оперативный прием удаления тупой ложкой полужидкого содержимого какой-либо патологической полости без воздействия на ее стенки (в отличие от выскабливания).

ЭКСКРЕМЕ́НТЫ (лат. excrementum выделение) — см. *Кал.*

ЭКСКРЕ́Т (лат. excerno, excretum отделять, выделять) — конечный продукт обмена веществ, выделяемый организмом.

ЭКСКРЕТО́РНЫЙ (excretorius; лат. excerno, excretum отделять, выделять) — выполняющий выделительные функции, связанный с этими функциями.

ЭКСКРЕ́ЦИЯ (лат. excerno, excretum, отделять, выделять; от *экс-* + cerno различать, просеивать; син. выделение) — совокупность физиологических процессов, направленных на освобождение организма от конечных продуктов обмена, чужеродных веществ, а также избытка воды, минеральных и органических веществ, поступивших с пищей или образовавшихся в организме в процессе метаболизма.

ЭКСКРЕ́ЦИЯ КАНА́ЛЬЦЕВАЯ МАКСИМА́ЛЬНАЯ — показатель функционального состояния почек, представляющий собой количество парааминогиппуровой кислоты или диодраста (кардиотраста), выделяемое с мочой в среднем за 1 мин., приведенное к стандартному объему почечного кровотока.

ЭКСПАНСИ́ВНОСТЬ (франц. expansivité, от лат. expansio расширение, распространение) — особенность личности, выражающаяся в преобладании внешней направленности психической деятельности, высокой психической активности, склонности к переоценке собственной личности, собственных возможностей и физических сил.

ЭКСПЕРИМЕ́НТ АССОЦИАТИ́ВНЫЙ — метод исследования особенностей психики, напр. темпа психических процессов, характера ассоциаций и эмоциональных реакций, заключающийся в регистрации и изучении содержания ответов исследуемого на вопросы экспериментатора, а также скорости ответов.

ЭКСПЕРИМЕ́НТ ХРОНИ́ЧЕСКИЙ — физиологический эксперимент, при к-ром исследования проводят длительно на одном объекте без существенных нарушений его жизненных функций, напр. с наложением фистулы на исследуемый орган.

ЭКСПЕРИМЕ́НТ ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ — метод изучения эффективности препаратов для специфической профилактики инфекционных болезней, химиопрофилактики и дезинфекции, основанный на их применении в строго контролируемых условиях.

ЭКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНО-ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ТЕСТ — общее название методов исследования нек-рых сторон психической деятельности (памяти, внимания, восприятия, мышления и др.), основанных на оценке выполнения исследуемым стандартных заданий; в психиатрии Э.-п. т. используются в качестве вспомогательных приемов исследования.

ЭКСПЕРТИ́ЗА — изучение специалистом (или группой специалистов) вопроса, требующего для своего решения специальных знаний в какой-либо области науки (напр., медицинской), техники, искусства и др., с вынесением определенного суждения (заключения).

ЭКСПЕРТИ́ЗА ВЕТЕРИНА́РНО-САНИТА́РНАЯ — исследование продуктов питания с целью определения их пригодности в пищу, осуществляемое органами ветеринарной службы при заготовке и убое животных, а также при рыночной торговле мясом, мясными продуктами, молоком, молочными продуктами, яйцами, рыбой, продуктами пчеловодства, грибами и другими растительными продуктами.

ЭКСПЕРТИ́ЗА ВОЕ́ННО-ВРАЧЕ́БНАЯ (ВВЭ) — медицинское освидетельствование военнослужащих или призывников военно-врачебной комиссией с целью установления степени их годности к военной службе, в т. ч. к службе в определенных видах Вооруженных Сил и родах войск, в соответствии с «Расписанием болезней», утверждаемым Министерством обороны СССР.

ЭКСПЕРТИ́ЗА ВРАЧЕ́БНО-ЛЁТНАЯ — медицинское освидетельствование врачебно-летными комиссиями и врачебно-летными экспертными комиссиями лиц, поступающих в авиационные училища, с целью отбора способных по состоянию здоровья выполнять полеты на современных летательных аппаратах, а также переосвидетельствование летного состава и курсантов летных училищ.

ЭКСПЕРТИ́ЗА ВРАЧЕ́БНО-СТРАХОВА́Я — освидетельствование врачами-экспертами Инспекции государственного страхования лиц, получивших

травму, для определения степени утраты их трудоспособности с целью последующего расчета размера ущерба, подлежащего возмещению.

ЭКСПЕРТИ́ЗА ВРАЧЕ́БНО-ТРУДОВА́Я — определение степени постоянной или длительной нетрудоспособности человека в связи с заболеванием или увечьем, осуществляемое врачебно-трудовыми экспертными комиссиями с целью установления группы инвалидности, причин инвалидности, определения видов, условий и режимов труда, доступных инвалиду по состоянию здоровья, а также для рекомендации мер, способствующих восстановлению его трудоспособности (протезирование, обеспечение авто- и мототранспортом и др.).

ЭКСПЕРТИ́ЗА ВРЕ́МЕННОЙ НЕТРУДОСПОСО́БНОСТИ — определение степени и срока временной утраты трудоспособности в связи с временным нарушением состояния здоровья или другими причинами, предусмотренными законодательством по социальному страхованию (напр., уход за больным), осуществляемое врачебно-консультационной комиссией или лечащим врачом.

ЭКСПЕРТИ́ЗА ПСИХИАТРИ́ЧЕСКАЯ — определение психиатрами психического состояния лица путем его клинического обследования и (или) анализа сведений о нем (напр., медицинских документов, информации близких или знакомых лиц), производимое с целью решения вопросов о его вменяемости и дееспособности (судебно-психиатрическая экспертиза), а также трудоспособности.

ЭКСПЕРТИ́ЗА САНИТА́РНАЯ — исследование врачом-гигиенистом документа (проекта, технологического регламента и др.) на его соответствие санитарному законодательству; является формой предупредительного и текущего санитарного надзора.

ЭКСПЕРТИ́ЗА СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ — экспертиза, назначаемая судебно-следственными органами для изучения вопросов, возникших при расследовании уголовных и гражданских дел и требующих специальных медицинских (судебно-медицинских) знаний.

Э. СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ ДОПОЛНИ́ТЕЛЬНАЯ — Э. с.-м., назначаемая в дополнение к ранее проведенной для решения вопросов по вновь открывшимся в процессе расследования обстоятельствам.

Э. СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ КОМИССИО́ННАЯ — Э. с.-м., производимая группой врачей различных специальностей.

Э. СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ КО́МПЛЕКСНАЯ — Э. с.-м., производимая с привлечением специалистов немедицинских профессий (напр., физиков, инженеров).

Э. СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ ПЕРВИ́ЧНАЯ — Э. с.-м., впервые проводимая по данному делу.

Э. СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ ПОВТО́РНАЯ — Э. с.-м., назначаемая для уточнения выводов первичной Э. с.-м. и устранения выявленных противоречий.

ЭКСПЕРТИ́ЗА СУДЕ́БНО-ПСИХИАТРИ́ЧЕСКАЯ — освидетельствование экспертами-психиатрами лица, являющегося объектом судебного процесса (ответчик, свидетель, потерпевший, истец) или находящегося в местах лишения свободы, производимое в случае возникновения сомнения в его психическом здоровье; назначается судебно-следственными органами, к-рым эксперт представляет свое заключение.

ЭКСПЕРТИ́ЗА ТОКСИКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ — оценка токсичности химических веществ, материалов и изделий для животных и человека на основании результатов санитарно-гигиенических исследований.

ЭКСПИРА́ТОР ЛЕЛЬЧИ́ЦКОГО (лат. exspiro, exspiratum выдувать, выдыхать, от *экс-* + spiro дышать) — см. *Лельчицкого экспиратор.*

ЭКСПИРАТО́РНАЯ МО́ЩНОСТЬ ЛЁГКИХ — показатель состояния внешнего дыхания, представляющий собой давление воздуха в дыхательных путях в фазу выдоха с закрытыми носом и ртом при максимальном напряжении мускулатуры, осуществляющей выдох; выражается обычно в миллиметрах ртутного столба.

ЭКСПИРАТО́РНЫЙ (exspiratorius; лат. exspiro, exspiratum выдувать, выдыхать) — относящийся к выдоху.

ЭКСПИРА́ЦИЯ (exspiratio; лат. exspiro, exspiratum выдувать, выдыхать) — см. *Выдох.*

ЭКСПЛАНТА́ЦИЯ МА́ТКИ (истор.; explantatio uteri; лат. explanto, explantatum вырывать из почвы; син.: Порта операция, экстериоризация матки) — вариант внебрюшинного кесарева сечения при инфицированной матке, заключавшийся в том, что после удаления плода и последа матку оставляли вне брюшной полости, а по стихании гнойного процесса в матке ее вновь помещали в брюшную полость.

ЭКСПЛОЗИ́ВНАЯ РЕА́КЦИЯ (англ. explosive вспыльчивый) — внезапный приступ раздражительности и злобности, сопровождающийся выразительной жестикуляцией и мимикой, а иногда агрессивными действиями; наблюдается чаще при психопатиях, опьянении.

ЭКСПЛОЗИ́ВНОСТЬ (англ. explosive вспыльчивый) — склонность к проявлениям раздражительности, часто сопровождающимся агрессивными поступками.

ЭКСПОЗИЦИО́ННЫЙ ТЕСТ — см. *Тест экспозиции.*

ЭКСПОЗИ́ЦИЯ (лат. expositio выставление на показ, изложение) в гигиене — продолжительность действия вредного фактора (физического, химического, биологического) на организм.

ЭКСПОНИ́РОВАНИЕ КРО́ВИ (лат. expono выкладывать) — поступление крови из депо в общий объем циркулирующей крови.

ЭКСПРЕССИ́ВНОСТЬ гена (лат. expressus явный, выразительный) — степень развития признака, контролируемого данным геном.

ЭКСПРЕССИО́ННАЯ ПРО́БА — см. *Компрессионная проба.*

ЭКСПРЕ́ССИЯ ФОЛЛИ́КУЛОВ (expressio follicul orum; лат. expressio выдавливание) — хирургическая операция: выдавливание трахоматозных фоликулов из конъюнктивы глаза.

ЭКСПРЕ́СС-МЕ́ТОД (англ. express срочный; син. экспрессный метод) — общее название ускоренных методов лабораторного исследования.

ЭКСПРЕ́ССНЫЙ МЕ́ТОД — см. *Экспресс-метод.*

ЭКСПРЕ́ССОР КУ́НТА (лат. exprimo, expressum выжимать, выдавливать) — см. *Кунта экспрессор.*

ЭКСПРЕ́СС-ПРОТЕЗИ́РОВАНИЕ — изготовление временного протеза сразу после ампутации без снятия больного с операционного стола; обеспечивает раннее начало обучения пользованию протезом и подготовку культи к постоянному ношению протеза.

ЭКССУДА́Т (exsudatum; *экс-* + лат. sudo, sudatum потеть) — богатая белком жидкость, содержащая форменные элементы крови, выходящая из мелких вен и капилляров в окружающие ткани и полости тела при воспалении.

Э. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (e. haemorrhagicum) — Э., содержащий значительную примесь эритроцитов.

Э. ГНОЙНЫЙ (e. purulentum) — мутный вязкий Э., содержащий распавшиеся сегментоядерные лейкоциты, клетки воспаленной ткани и микроорганизмы.

Э. РАНЕВО́Й (e. vulnerale) — серозно-геморрагический, гнойный или серозный Э., покрывающий поверхность раны.

Э. СЕРО́ЗНО-ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (e. serohaemorrhagicum) — серозный Э., содержащий примесь эритроцитов.

Э. СЕРО́ЗНО-ФИБРИНО́ЗНЫЙ (e. serofibrinosum) — серозный Э., содержащий значительную примесь фибрина.

Э. СЕРО́ЗНЫЙ (e. serosum) — Э., состоящий преимущественно из плазмы и бедный форменными элементами крови.

Э. СЛИ́ЗИСТО-ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (e. mucohaemorrhagicum) — слизистый Э., содержащий примесь эритроцитов.

Э. СЛИ́ЗИСТЫЙ (e. mucosum) — Э., содержащий значительное количество муцина или псевдомуцина.

Э. ФИБРИНО́ЗНЫЙ (e. fibrinosum) — Э., содержащий значительное количество фибрина.

ЭКССУДАТИ́ВНЫЙ (exsudativus) — характеризующийся экссудацией.

ЭКССУДА́ЦИЯ (exsudatio; *экс-* + лат. sudo, sudatum потеть) — процесс перемещения богатой белком жидкости, часто содержащей форменные элементы крови, из мелких вен и капилляров в окружающие ткани и полости организма; проявление воспаления.

ЭКСТА́З (греч. ekstasis исступление, восхищение) — 1) высшая степень восторга, воодушевления; 2) в психиатрии — аффективное расстройство в виде Э.[1], сопровождающегося полным нарушением контакта с окружающим миром, а также нек-рыми изменениями сознания, напр. при гашишном опьянении, нек-рых формах шизофрении.

ЭКСТЕНЗИ́Я (extensio; лат. «вытягивание, выпрямление») — см. *Разгибание.*

ЭКСТЕ́НЗОР (extensor; лат. extendo, extensum растягивать, вытягивать) — см. *Разгибатель.*

ЭКСТЕНСИ́ВНЫЙ КОЭФФИЦИЕ́НТ (лат. extensivus растяжимый) — см. *Экстенсивный показатель.*

ЭКСТЕНСИ́ВНЫЙ ПОКАЗА́ТЕЛЬ (син. экстенсивный коэффициент) — относительная величина, показывающая, как велика отдельная часть по отноше-

нию ко всей изучаемой совокупности; выражается в процентах, реже в промилле; используется для характеристики структуры явления, напр. возрастной структуры или структуры заболеваемости населения.

ЭКСТЕРИОРИЗА́ЦИЯ (лат. exterior наружный, внешний; син. экстернализация) в психиатрии — выведение содержания ряда психопатологических расстройств (обвиняющие галлюцинации, бред самообвинения и др.) из предшествующего неправильного, «порочного» поведения больного; гипотеза Э. встречается в современной зарубежной психиатрии.

ЭКСТЕРИОРИЗА́ЦИЯ МА́ТКИ (истор.) — см. *Эксплантация матки.*

ЭКСТЕРНАЛИЗА́ЦИЯ (лат. externus наружный, внешний) — см. *Экстериоризация.*

ЭКСТЕРО- (лат. exter и exterus находящийся вне, наружный, внешний) — составная часть сложных слов, означающая «находящийся вне, за пределами чего-либо».

ЭКСТЕРОРЕФЛЕ́КС (лат. *экстеро-* + *рефлекс*) — рефлекс, вызываемый внешними раздражителями.

ЭКСТЕРОРЕЦЕ́ПТОР (*экстеро-* + *рецептор*) — см. *Экстероцептор.*

ЭКСТЕРОРЕЦЕ́ПЦИЯ (*экстеро-* + *рецепция*) — восприятие организмом раздражений, поступающих из окружающей среды.

ЭКСТЕРОЦЕПТИ́ВНЫЙ (*экстеро-* + лат. capio, cepi принимать, воспринимать) — относящийся к экстерорецепторам.

ЭКСТЕРОЦЕ́ПТОР (*экстеро-* + лат. capio, cepi принимать, воспринимать; син.: рецептор внешний, экстерорецептор) — рецептор, воспринимающий раздражение, поступающее из окружающей среды.

ЭКСТИРПА́ЦИЯ (exstirpatio; лат. exstirpo, exstirpatum искоренять) — хирургическая операция: полное удаление органа.

ЭКСТИРПА́ЦИЯ ЖЕЛУ́ДКА (exstirpatio ventriculi) — см. *Гастрэктомия.*

ЭКСТИРПА́ЦИЯ МА́ТКИ (exstirpatio uteri; син. гистерэктомия) — хирургическая операция: удаление матки.

Э. МА́ТКИ АБДОМИНА́ЛЬНАЯ (e. uteri abdominalis) — Э. матки через разрез передней брюшной стенки.

Э. МА́ТКИ ВЛАГА́ЛИЩНАЯ (e. uteri vaginalis) — Э. матки через разрезы влагалища.

Э. МА́ТКИ НАДВЛАГА́ЛИЩНАЯ (e. uteri supravaginalis) — Э. матки, при к-рой удаляют только ее тело, а шейку и придатки сохраняют.

Э. МА́ТКИ ПО́ЛНАЯ (e. uteri totalis) — Э. матки, при к-рой удаляют и ее шейку.

Э. МА́ТКИ РАДИКА́ЛЬНАЯ (e. uteri radicalis) — Э. матки, при к-рой удаляют также ее придатки, окружающую клетчатку и регионарные лимфатические узлы.

Э. МА́ТКИ РАСШИ́РЕННАЯ (e. uteri dilatata) — радикальная Э. матки, при к-рой удаляют также верхнюю треть влагалища; производится при раке шейки матки.

ЭКСТИРПА́ЦИЯ МОЧЕТО́ЧНИКА (exstirpatio ureteris) — см. *Уретерэктомия.*

ЭКСТИРПА́ЦИЯ СЛЁЗНОГО МЕШКА́ (exstirpatio sacci lacrimalis) — см. *Дакриоцистэктомия.*

ЭКСТРА- (лат. extra вне, снаружи) — составная часть сложных слов, означающая «вне», «сверх».

ЭКСТРАВАЗА́Т (extravasatum; *экстра-* + лат. vas сосуд) — скопление серозно-геморрагического экссудата или небольшого количества крови вокруг кровеносного сосуда.

ЭКСТРАВАСКУЛЯ́РНАЯ ЖИ́ДКОСТЬ — слой тканевой жидкости, находящийся в непосредственной близости к стенке кровеносного сосуда, через к-рую происходит обмен веществ между кровью и этим слоем.

ЭКСТРАВЕРТИ́РОВАННОСТЬ (*экстра-* + лат. verto поворачивать) — склад личности, характеризующийся преимущественной направленностью активности, установок, стремлений и интересов на внешний мир и окружающих людей.

ЭКСТРА́КТ (extractum; лат. extraho, extractum извлекать, вытягивать; син. вытяжка) в фармации — лекарственная форма, получаемая извлечением действующего начала из лекарственного сырья с помощью растворителя (экстрагента), по виду к-рого Э. разделяют на водные, водно-спиртовые, спиртовые, эфирные и др.

ЭКСТРАКТИ́ВНЫЕ ВЕЩЕСТВА́ — водорастворимые низкомолекулярные органические вещества, экстрагируемые из тканей.

ЭКСТРА́КТОР (лат. extraho, extractum извлекать, вытягивать) — общее название группы хирургических инструментов, предназначенных для экстракции каких-либо органов или тел, напр. хрусталика из глазного яблока, конкрементов из мочевого пузыря.

ЭКСТРА́КЦИЯ (лат. extraho, extractum извлекать, вытягивать) — 1) (extractio) в хирургии — хирургическая операция: извлечение из тела человека какого-либо органа или инородного тела без его рассечения на части или отсечения на большом протяжении от соседних тканей; 2) извлечение вещества (напр., лекарственного или биологически активного) из смеси веществ (напр., лекарственного сырья, ткани организма) с помощью жидкого растворителя.

ЭКСТРА́КЦИЯ КАТАРА́КТЫ (extractio cataractae) — хирургическая операция: удаление хрусталика при катаракте.

Э. КАТАРА́КТЫ ИНТРАКАПСУЛЯ́РНАЯ (e. cataractae intracapsularis) — Э. к., при к-рой хрусталик удаляют вместе с капсулой, не вскрывая ее.

Э. КАТАРА́КТЫ КОМБИНИ́РОВАННАЯ (e. cataractae combinata) — Э. к., производимая в сочетании с полной иридэктомией.

Э. КАТАРА́КТЫ С КРУ́ГЛЫМ ЗРАЧКО́М — Э. к., производимая в сочетании с периферической иридэктомией с сохранением круглого зрачка.

Э. КАТАРА́КТЫ ЭКСТРАКАПСУЛЯ́РНАЯ (e. cataractae extracapsularis) — Э. к., при к-рой вскрывают капсулу хрусталика и удаляют только ее переднюю часть.

ЭКСТРА́КЦИЯ ПЛОДА́ (extractio fetus; лат. extraho, extractum извлекать; син. извлечение плода) — акушерская операция: извлечение плода из матки без ее рассечения.

ЭКСТРАПЕРИТОНИЗА́ЦИЯ МОЧЕВО́ГО ПУЗЫРЯ́ (*экстра-* + анат. peritoneum брюшина) — этап резекции мочевого пузыря, заключающийся в отделении его верхушки от покрывающей брюшины.

ЭКСТРАСИ́СТОЛА(-Ы) (*экстра-* + *систола*) — сокращение (или только импульс возбуждения) сердца или его отделов, возникающее раньше, чем должно в норме произойти очередное сокращение, и, как правило, сопровождающееся компенсаторной паузой; импульс возбуждения при Э. исходит из очага гетеротопного автоматизма.

Э. АТРИОВЕНТРИКУЛЯ́РНАЯ (син. Э. предсердно-желудочковая) — Э., исходящая из очага гетеротопного автоматизма, расположенного в предсердно-желудочковом узле или в прилегающих к нему участках миокарда.

Э. БЛОКИ́РОВАННАЯ — предсердная Э. без сокращения желудочков сердца вследствие рефрактерности пучка проводящей системы сердца, соединяющего предсердия и желудочки, после предшествовавшего импульса возбуждения.

Э. ВСТА́ВОЧНАЯ (син. Э. интерполированная) — Э. в виде импульса возбуждения, отображенного на электрокардиограмме зубцами, расположенными на середине нормального интервала между двумя желудочковыми комплексами; единственный вид Э., не сопровождающийся компенсаторной паузой.

Э. ГРУППОВЫ́Е (син. Э. залповые) — Э., следующие непосредственно одна за другой и, по существу, представляющие собой короткий период пароксизмальной тахикардии.

Э. ЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ — Э., обусловленная импульсом, исходящим из очага гетеротопного автоматизма, расположенного в миокарде одного из желудочков сердца.

Э. ЗА́ЛПОВЫЕ — см. *Экстрасистолы групповые.*

Э. ИНТЕРПОЛИ́РОВАННАЯ — см. *Экстрасистола вставочная.*

Э. НАДЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ — см. *Экстрасистола предсердная.*

Э. ПРЕДСЕ́РДНАЯ (син.: Э. наджелудочковая, Э. суправентрикулярная) — Э., обусловленная импульсом, исходящим из очага гетеротопного автоматизма, расположенного в одном из предсердий.

Э. ПРЕДСЕ́РДНО-ЖЕЛУ́ДОЧКОВАЯ — см. *Экстрасистола атриовентрикулярная.*

Э. РЕЦИПРО́КНАЯ (лат. reciprocus возвращающийся) — Э., при к-рой импульс, возникший в каком-либо отделе сердца, распространившись в другие отделы, возвращается в исходный, вызывая его повторное сокращение.

Э. СИ́НУСОВАЯ — Э., обусловленная преждевременным возникновением импульса в синусно-предсердном узле; существование Э. с. признается не всеми исследователями.

Э. СУПРАВЕНТРИКУЛЯ́РНАЯ (лат. supra- выше, над + анат. ventriculus желудочек) — см. *Экстрасистола предсердная.*

ЭКСТРАСИСТОЛИ́Я (extrasystolia; *экстра-* + *систола*; син. аритмия сердца экстрасистолическая) — форма нарушения ритма сердца, характеризующаяся появлением экстрасистол; встречается почти при всех видах поражения миокарда, а также при расстройствах регуляции функции сердца без поражения миокарда.

Э. АЛЛОРИТМИ́ЧЕСКАЯ — см. *Аллоритмия.*

Э. НАПРЯЖЕ́НИЯ — Э., возникающая только во время физической нагрузки.

Э. ПОКО́Я — Э., возникающая только при пребывании больного в покое, особенно в горизонтальном положении; проявляется на фоне активности блуждающего нерва.

Э. ПОЛИТО́ПНАЯ (греч. poly- много + topos место) — Э., при к-рой импульсы возбуждения исходят из двух или более гетеротопных очагов автоматизма.

ЭКСТРАТЕРМИ́ЧЕСКИЙ ЭФФЕ́КТ (*экстра-* + греч. thermē теплота) — см. *Осцилляторный эффект.*

ЭКСТРАТО́Н (*экстра-* + *тон*) — дополнительный, не выслушиваемый в норме, тон сердца; наблюдается при нек-рых поражениях миокарда и клапанов сердца.

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕ́НИЕ ОБ ИНФЕКЦИО́ННОМ ЗАБОЛЕВА́НИИ, ПИЩЕВО́М, О́СТРОМ ПРОФЕССИОНА́ЛЬНОМ ОТРАВЛЕ́НИИ — оперативно-учетный документ, к-рым регистрируется каждый случай выявления врачом или средним медицинским персоналом инфекционного заболевания (или подозрения на него) из числа включенных в специальный перечень, а также пищевого или острого профессионального отравления.

ЭКСТРОФИ́Я МОЧЕВО́ГО ПУЗЫ́РЯ (extrophia vesicae urinariae; греч. ekstrophē смещение, выворачивание; от *эк-* + strophē поворачивание, поворот; син.: выворот мочевого пузыря, расщелина мочевого пузыря, эктопия мочевого пузыря) — аномалия развития: отсутствие нижней части передней брюшной стенки и тела мочевого пузыря, причем дефект брюшной стенки замещен задней стенкой мочевого пузыря (областью мочепузырного треугольника) с зияющими на ней отверстиями мочеточников.

ЭКСТУБА́ТОР (*экс-* + лат. tuba труба, трубка) — инструмент для удаления интубационной трубки, имеющий две изогнутые под прямым углом бранши, заканчивающиеся клювом с насечками.

ЭКСТУБА́ЦИЯ (*экс-* + лат. tuba труба, трубка) — извлечение интубационной трубки из просвета гортани и трахеи.

ЭКСФЛАГЕЛЛЯ́ЦИЯ (*экс-* + лат. flagellum бич) — выбрасывание жгутиков мужскими гамонтами у гемоспоридий в кишечнике переносчика.

ЭКСФОЛИА́ЦИЯ (exfoliatio; *экс-* + лат. folium лист) — отслоение пластов многослойного эпителия; наблюдается при нек-рых дерматозах.

ЭКСФОЛИА́ЦИЯ ПСЕВДОКАПСУЛЯ́РНАЯ (exfoliatio pseudocapsularis; син. псевдоэксфолиация) — образование хлопьевидных наслоений светло-серого цвета на передней капсуле хрусталика, цинновой связке, ресничном теле, пограничной мембране стекловидного тела, по зрачковому краю радужки, на передней и задней ее поверхности, роговице и в углу передней камеры; наблюдается, напр., при глаукоме и старческой катаракте.

ЭКСФУ́ЗИЯ КРО́ВИ (exfusio sanguinis; *экс-* + лат. fundo, fusum лить, выливать) — изъятие крови из кровеносного сосуда, напр. при обменном переливании крови.

ЭКСЦЕМЕНТО́З (excementosis; *экс-* + *цемент* + *-оз*) — локальное утолщение цемента корня зуба.

ЭКСЦЕРЕБРА́ТОР (*экс-* + лат. cerebrum головной мозг; син. Агафонова ложка-катетер) — акушерский инструмент в виде ложки, совмещенной с катетером, соединенным с кружкой Эсмарха; применяется при плодоразрушающих операциях для разрушения и удаления головного мозга плода после краниотомии.

ЭКСЦЕРЕБРА́ЦИЯ (excerebratio; *экс-* + лат. cerebrum головной мозг) — разрушение и удаление головного мозга плода после краниотомии.

ЭКСЦИ́ЗИЯ (excisio; лат. «вырезание», «иссечение») — см. *Иссечение.*

ЭКСЦИКЛОФОРИ́Я (excyclophoria; *экс-* + *циклофория*) — гетерофория с тенденцией к повороту глаза кнаружи вокруг сагиттальной оси.

EXCIPIENS (лат. excipio брать, принимать на себя) — см. *Наполнитель.*

ЭКСЦИСТИ́РОВАНИЕ (*экс-* + *циста*) — процесс выхода вегетативной формы простейших из цисты.

ЭКТАЗИ́Я (ectasia; греч. ektasis растягивание, расширение) — растяжение, расширение ткани или органа.

ЭКТАЗИ́Я ТУБУЛЯ́РНАЯ (ectasia tubularis) — расширение почечных канальцев.

ЭКТИМА (ecthyma; греч. ekthyma пустула) — пустула с округлым глубоким изъязвлением в центре, покрытая плотно прикрепленной коркой; в исходе Э. образуется рубец.

Э. ГАНГРЕНО́ЗНАЯ (e. gangraenosum) — см. *Эктима прободающая.*

Э. ДЕ́ТСКАЯ ИЗЪЯЗВЛЯЮЩАЯСЯ (e. infantium exulcerans) — см. *Эктима прободающая.*

Э. ОБЫКНОВЕ́ННАЯ (e. vulgare; син.: стрептодермия язвенная, Э. простая) — Э. при стрептодермии, локализующаяся преимущественно на нижних конечностях.

Э. ПРОБОДА́ЮЩАЯ (e. tenebrans; син.: Э. гангренозная, Э. детская изъязвляющаяся, ecthyma escharoticum) — Э., появляющаяся во множестве на ягодицах, бедрах и спине, превращающаяся в сливающиеся язвы с фестончатыми краями; наблюдается чаще у ослабленных детей.

Э. ПРОСТА́Я (e. simplex) — см. *Эктима обыкновенная.*

Э. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ (e. syphiliticum; син. сифилид пустулезный эктиматозный) — Э., покрытая грязно-бурой коркой и окруженная плотным инфильтратом, представляющая собой разновидность сифилида при вторичном сифилисе.

ECTHYMA ESCHARÓTICUM (греч. eschara очаг, струп) — см. *Эктима прободающая.*

ЭКТО- (греч. ektos вне, снаружи) — составная часть сложных слов, означающая «вне», «снаружи», «внешний», «наружный».

ЭКТОБЛА́СТ (ectoblastus; *экто-* + греч. blastos росток, зародыш) — см. *Эктодерма первичная.*

ЭКТОГЕНЕ́З (*экто-* + греч. genesis происхождение, развитие) — 1) в биологии — направление в эволюционном учении, рассматривающее историческое развитие живой природы как процесс приспособления организмов к среде обитания; 2) в медицине — учение, объясняющее возникновение болезней и симптомов воздействием на организм внешних факторов.

ЭКТОГЛИ́Я (*экто-* + *глия*) — см. *Нейроглия астроцитарная.*

ЭКТОДЕ́РМА (ectoderma, LNE; *экто-* + греч. derma кожа) — наружный зародышевый листок трехслойного зародыша; производными Э. являются эпидермис, нервная система и в значительной степени органы чувств.

Э. ВНЕЗАРОДЫШЕВАЯ (e. extraembryonicum) — продолжение Э. в составе нек-рых внезародышевых органов, гл. обр. в зародышевых оболочках.

Э. КО́ЖНАЯ (e. epidermale) — часть Э., из к-рой развивается эпидермис.

Э. НЕВРА́ЛЬНАЯ (e. neurale) — часть Э., из к-рой образуется нервная пластинка.

ЭКТОДЕ́РМА ПЕРВИ́ЧНАЯ (ectoderma primitivum; син.: эктобласт, эпибласт) — наружный листок двухслойного зародыша; у высших позвоночных Э. п. кроме собственно эктодермы включает также клеточный материал будущих мезодермы и хорды.

ЭКТОДЕРМА́ЛЬНЫЙ КРЕСТЦО́ВО-КО́ПЧИКОВЫЙ СИ́НУС (sinus sacrococcygealis ectodermalis) — см. *Эпителиальный копчиковый ход.*

ЭКТОМЕЗЕНХИ́МА (ectomesenchyma; *экто-* + *мезенхима*; син. нейромезенхима) — часть мезенхимы, возникающая путем «выселения клеток» из ганглиозной пластинки; дает начало части соединительной ткани головы и шеи (например, надгортанника), хроматофорам и др.

ЭКТОМИ́Я (ectomia; греч. ektomē вырезание, иссечение, удаление) — хирургическая операция: удаление тканей или органа; термин употребляется чаще как терминоэлемент, сочетающийся с наименованием соответствующей ткани или органа, напр. тонзиллэктомия — удаление миндалины.

ЭКТОПАРАЗИ́Т (*экто-* + *паразит*; син. паразит наружный) — паразит, обитающий на поверхности тела хозяина.

ЭКТОПИ́Я (ectopia; греч. ektopios отдаленный, удаленный от своего места) — врожденное или приобретенное смещение органа или ткани в необычное место.

ЭКТОПИ́Я ЗРАЧКА́ (ectopia pupillae) — отклонение зрачка от нормального расположения в центре радужки; возникает как аномалия развития, а также в результате травмы глаза или хирургической операции.

ЭКТОПИ́Я МОЧЕВО́ГО ПУЗЫ́РЯ (ectopia vesicae urinariae) — см. *Экстрофия мочевого пузыря.*

ЭКТОПИ́Я МОЧЕТО́ЧНИКА (ectopia ureteris) — аномалия развития, при к-рой устье мочеточника расположено не в мочевом пузыре, а, напр., в мочеиспускательном канале, во влагалище, на поверхности кожи промежности.

ЭКТОПИ́Я ХРУСТА́ЛИКА (ectopia lentis) — наследственная болезнь, характеризующаяся смещением хрусталика из стекловидной ямки.

ЭКТОПИ́Я ЯИ́ЧКА (ectopia testis) — аномалия развития: расположение яичка под кожей промежности, брюшной стенки или бедра.

ЭКТРОДАКТИЛИ́Я (ectrodactylia; греч. ektrōma преждевременное рождение + daktylos палец) — аномалия развития: отсутствие одного или нескольких пальцев.

ЭКТРОМЕЛИ́Я (ectromelia; греч. ektrōma преждевременное рождение + melos часть тела, конечность) — аномалия развития: значительное недоразвитие всей нижней конечности (бедра, голени и стопы).

ЭКТРОМЕЛИ́Я ИНФЕКЦИО́ННАЯ (ectromelia infectiosa; син. оспа мышей) — инфекционная вирусная болезнь животных, преимущественно мышей и крыс, приводящая к отпадению конечностей или к гибели; у лабораторных животных наблюдается в виде эпизоотий; человек к Э. и. невосприимчив.

ЭКТРО́ПИОН (ectropion; греч. ektrepō поворачивать наружу, выворачивать) — 1) (син. выворот слизистой оболочки канала шейки матки) в гинекологии — выпячивание слизистой оболочки канала шейки матки в просвет влагалища, возникающее чаще после разрыва матки в родах; 2) в офтальмологии — см. *Выворот века.*

ЭКФОРИ́Я ЭНГРА́ММ (ecphoria; греч. ekphoreō выносить) — оживление запечатленных в памяти каких-либо фрагментов воспоминаний (энграмм) и восстановление по ним целостного воспоминания.

ЭКХИМО́З (ecchymosis; греч. ekchymōsis, от ekchymoō проливать жидкость, кровь) — обширное кровоизлияние в кожу или слизистую оболочку.

ЭКХИМОТИ́ЧЕСКАЯ МА́СКА — см. *Цианотическая маска.*

ЭКХОНДРО́З (ecchondrosis; *эк-* + греч. chondros хрящ + *-оз*) — 1) опухолевидное разрастание хряща в виде нароста; 2) образование хрящевой ткани вне ее обычной локализации.

ЭКХОНДРО́МА (ecchondroma; *эк-* + *хондрома*) — хондрома кости, растущая за ее пределы.

ЭЛАСТ- (эласто-; греч. elastos тягучий, вязкий) — составная часть сложных слов, означающая «эластичный», «относящийся к эластическим волокнам, к эластической ткани».

ЭЛАСТА́ЗА (син. панкреатопептидаза Е) — фермент класса гидролаз (КФ 3.4.21.11), секретируемый поджелудочной железой, катализирующий расщепление пептидов и нек-рых белков (напр., эластина) преимущественно по связям, прилегающим к остаткам нейтральных аминокислот.

ЭЛАСТИ́Н — белок из группы склеропротеидов, являющийся основным компонентом соединительнотканных эластичных волокон.

ЭЛАСТИНОВОЛОКНИ́СТАЯ СЕТЬ — см. *Эластическая сеть.*

ЭЛАСТИ́ЧЕСКАЯ СЕТЬ (rete elasticum, LNH; син. эластиноволокнистая сеть) — сетевидная структура, состоящая из многочисленных переплетающихся эластических волокон (напр., в паренхиме легких).

ЭЛАСТИ́ЧЕСКИЙ КО́НУС (conus elasticus, PNA, BNA, JNA) — нижняя часть фиброэластической мембраны гортани, имеющая форму усеченного конуса, фиксированная спереди к внутренней поверхности щитовидного хряща, сзади — к голосовым отросткам черпаловидных хрящей, снизу — к верхнему краю дуги перстневидного хряща; верхние свободные края Э. к. образуют голосовые связки.

ЭЛАСТИ́ЧНЫЙ ЧУЛО́К МЕДИЦИ́НСКИЙ — чулок без носка и пятки, связанный из эластичной нити с резиновым шнурком, применяемый с лечебной целью гл. обр. при варикозном расширении вен нижних конечностей.

ЭЛАСТО- — см. *Эласт-.*

ЭЛАСТО́З (elastosis; *эласт-* + *-оз*) — общее название дерматозов, характеризующихся разрастанием эластических волокон.

ЭЛАСТО́З КО́ЖИ УЗЕЛКО́ВЫЙ КИСТО́ЗНЫЙ С КОМЕДО́НАМИ (elastosis cutis nodularis cystosa cum comedonibus) — см. *Дистрофия кожи коллоидная.*

ЭЛАСТО́З СТА́РЧЕСКИЙ (elastosis senilis) — см. *Эластома кожи диффузная.*

ЭЛАСТОКРИВА́Я — графическое изображение результатов эластотонометрии по Филатову — Кальфе.

ЭЛАСТО́ЛИЗ (elastolysis; *эласто-* + греч. lysis распад, разложение) — ферментативный распад эластических волокон.

ЭЛАСТО́МА ВНУТРИСОСО́ЧКОВАЯ ПЕРФОРИ́РУЮЩАЯ БОРОДА́ВЧАТАЯ МИ́ШЕРА (*эласт-* + *-ома*) — см. *Кератоз фолликулярный сперигинозный.*

ЭЛАСТО́МА КО́ЖИ (elastoma cutis) — см. *Псевдоксантома эластическая.*

ЭЛАСТО́МА КО́ЖИ ДИФФУ́ЗНАЯ (elastoma cutis diffusum; син.: Дюбрея диффузная эластома кожи, эластоз старческий) — слизистая дистрофия соединительнотканных элементов кожи вокруг глаз и на щеках, сочетающаяся с расширением устьев фолликулов; наблюдается в старческом возрасте.

ЭЛАСТОРЕ́КСИС ГЕНЕ́РАЛИЗО́ВАННЫЙ (elastorrhexis generalisata; *эласто-* + греч. rhēxis разрыв) — см. *Псевдоксантома эластическая.*

ЭЛАСТОРЕ́КСИС СИСТЕ́МНЫЙ ТУРЕ́НА — см. *Псевдоксантома эластическая.*

ЭЛАСТОТОНО́МЕТР (*эласто-* + *тонометр*) — см. *Филатова — Кальфы эластотонометр.*

ЭЛАСТОТОНОМЕТРИ́Я (*эласто-* + *тонометрия*) — см. *Филатова — Кальфы эластотонометрия.*

ЭЛАСТОФИБРО́МА (elastofibroma; *эласто-* + *фиброма*) — фиброма, содержащая большое количество коллагеновых и эластических волокон.

ЭЛАЦИ́Н — гомогенная масса склеившихся и частично подвергшихся эластолизу эластических волокон; обнаруживается при нек-рых патологических изменениях соединительной ткани.

ЭЛЕВА́ТОР (лат. elevo, elevatum поднимать; син. подъемник) — общее название рычагообразных хирургических инструментов из группы расширителей.

Э. ЗУБНО́Й — Э., применяемый для удаления корней зубов.

Э. КО́СТНЫЙ — Э. с утолщенной лопаткообразной рабочей частью, применяемый для подъема вдавленных или отпрепарованных участков костей.

Э. ДЛЯ КРОВЕНО́СНЫХ СОСУ́ДОВ — Э. в виде стержня, заканчивающегося с двух сторон крючками, применяемый для захвата и подъема сосуда без его пережатия.

Э. НЕЙРОХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ — Э., снабженный источником света или световодом, предназначенный для отведения мозговой ткани и освещения операционного поля при нейрохирургических операциях.

Э. НОСОВО́Й — 1) Э. с одной изогнутой рабочей частью лопаткообразной формы, применяемый для отделения надхрящницы и надкостницы носовой перегородки; 2) Э. с двумя прямыми рабочими частями лопаткообразной формы на концах рукоятки, применяемый для отделения мягких тканей от костно-хрящевой стенки носовой перегородки.

ЭЛЕВА́ЦИЯ ДИАФРА́ГМЫ (elevatio diaphragmatis; лат. elevatio поднятие, подъем) — см. *Релаксация диафрагмы.*

ЭЛЕВА́ЦИЯ СЕГМЕ́НТОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРА́ММЫ — смещение сегментов электрокардиограммы вверх от изоэлектрической линии.

ЭЛЕИДИ́Н — промежуточный продукт превращения кератогиалина в кератин, содержащийся в клетках блестящего слоя эпидермиса.

ЭЛЕИДИ́НОВЫЙ СЛОЙ ЭПИДЕ́РМИСА — см. *Блестящий слой эпидермиса.*

ЭЛЕККЕРА — ФИННЕ́Я ГАСТРОДУОДЕНОСТОМИ́Я (F. Oehlecker, 1874—1958, нем. хирург; J. M. T. Finney, 1863—1942, амер. хирург) — модификация гастродуоденостомии, заключающаяся в ее сочетании с пилоропластикой.

ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКАЯ ПОЗИ́ЦИЯ СЕ́РДЦА (син. электрическое положение сердца) — совокупность электрокардиографических признаков, в норме соответствующая определенному положению сердца в грудной клетке; в патологических условиях соответствие между анатомическим положением сердца и его электрической позицией может нарушаться.

ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКАЯ МЕ́ТКА — см. *Электрометка.*

ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕ́НИЕ СЕ́РДЦА — см. *Электрическая позиция сердца.*

ЭЛЕКТРО- (греч. ēlektron янтарь) — составная часть сложных слов, означающая «электрический», «обусловленный электрическими явлениями», «связанный с электрическим полем или током».

ЭЛЕКТРОАНАЛГЕЗИ́Я (*электро-* + *аналгезия*) — ослабление болевой чувствительности при воздействии электрического тока на ц. н. с. или непосредственно на область болевых ощущений.

ЭЛЕКТРОАНЕСТЕЗИ́Я (*электро-* + *анестезия*; син. электронаркоз) — метод наркоза, основанный на воздействии электрическим током определенной силы на ц. н. с.

ЭЛЕКТРОАСПИРА́ТОР (*электро-* + *аспиратор*) — см. *Электроотсасыватель.*

ЭЛЕКТРОАЭРОЗО́ЛЬ (*электро-* + *аэрозоль*) — аэрозоль, частицы к-рого несут электрический заряд; естествен-

ные и искусственные Э. используются с лечебной и профилактической целью.

ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛЬГЕНЕРА́ТОР — см. *Электроаэрозольный генератор.*

ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛЬИНГАЛЯ́ЦИЯ (*электроаэрозоль* + *ингаляция*) — лечебная процедура, заключающаяся во введении в организм больного через дыхательные пути аэрозоля электрически заряженных частиц лекарственного вещества.

ЭЛЕКТРОАЭРОЗО́ЛЬНЫЙ ГЕНЕРА́ТОР (син.: аппарат электроаэрозольный, электроаэрозольгенератор, электроаэрозолятор, электрозольгенератор) — аэрозольный генератор, снабженный устройством, придающим частицам аэрозоля электрический заряд; применяется для проведения электроаэрозольингаляции.

ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛЬТЕРАПИ́Я (*электроаэрозоль* + *терапия*) — применение электроаэрозолей с лечебной или профилактической целью.

ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛЯ́ТОР — см. *Электроаэрозольный генератор.*

ЭЛЕКТРОВИБРА́ТОР (*электро-* + *вибратор*) — аппарат для массажа слуховых косточек с целью мобилизации стремени при отосклерозе; представляет собой электрический генератор механических колебаний зонда, вводимого в ухо больного до соприкосновения с коротким отростком молоточка.

ЭЛЕКТРОВОЗБУДИ́МОСТЬ (*электро-* + возбудимость) — свойство возбудимых образований приходить в состояние возбуждения при раздражении электрическим током.

ЭЛЕКТРОГАСТРО́ГРАФ (*электро-* + *гастрограф*) — прибор для регистрации изменений во времени разности потенциалов электрического поля желудка.

ЭЛЕКТРОГАСТРОГРАФИ́Я (*электро-* + *гастрография*) — метод исследования моторной деятельности желудка, основанный на регистрации его биопотенциалов.

ЭЛЕКТРОГАСТРОЭНТЕРО́ГРАФ (*электро-* + греч. gastēr желудок + entera кишки, кишечник + graphō писать, изображать) — прибор для одновременной регистрации биопотенциалов различных отделов желудочно-кишечного тракта, что достигается выделением частот 0,04—0,06 *гц* для желудка, 0,1—0,3 *гц* — для тонкой кишки и 0,015—0,03 *гц* — для толстой кишки.

ЭЛЕКТРОГЕМОСКО́П (*электро-* + греч. haima кровь + skopeō смотреть, наблюдать; син. счетчик клеток крови кондуктометрический) — прибор для автоматического подсчета клеток крови; обеспечивает регистрацию каждой клетки, проходящей через микроотверстие датчика, по изменению электрического сопротивления.

ЭЛЕКТРОГЕНЕ́З (*электро-* + греч. genesis зарождение, развитие) — возникновение потенциала действия в объектах живой природы, обусловленное комплексом физико-химических процессов, обеспечивающих поддержание неравномерного распределения ионов внутри живой клетки и на поверхности оболочки или быстрое перемещение ионов через мембрану.

ЭЛЕКТРОГИДРОТЕРАПИ́Я (*электро-* + *гидротерапия*) — способ электротерапии, заключающийся в сочетанном воздействии на организм постоянного гальванического или импульсного тока и местной или общей ванны.

ЭЛЕКТРОГИМНА́СТИКА (*электро-* + *гимнастика*; син. электростимуляция мышц) — метод лечения, профилактики или тренировки путем воздействия на нервы или мышцы импульсного электрического тока с целью вызвать сокращение мышц.

ЭЛЕКТРОГИПСОРЕ́З — инструмент для разрезания гипсовых повязок, приводимый в движение электродвигателем.

ЭЛЕКТРОГРА́ММА СЕ́РДЦА ВНУТРИПОЛОСТНА́Я (*электро-* + греч. gramma запись) — кривая, отражающая изменение во времени потенциалов электрического поля сердца, регистрируемая с помощью электродов, вводимых по кровеносным сосудам в полости сердца.

ЭЛЕКТРОГРАФИ́Я ИНТРАКАРДИА́ЛЬНАЯ (*электро-* + греч. graphō писать, изображать; син. электрография сердца внутриполостная) — метод исследования сердечной деятельности, заключающийся в регистрации изменений во времени потенциалов электрического поля сердца с помощью электродов, размещенных на стенках его полостей; применяется для диагностики нек-рых нарушений ритма и проводимости сердца, а также выявления дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок.

ЭЛЕКТРОГРАФИ́Я СЕ́РДЦА ВНУТРИПОЛОСТНА́Я — см. *Электрография интракардиальная.*

ЭЛЕКТРОГРЯ́ЗЬ (нрк) — см. *Гальваногрязелечение.*

ЭЛЕКТРО́Д (*электро-* + греч. hodos путь, направление) в медицине — конструктивный элемент электронного или электротехнического диагностического прибора, физиотерапевтического или хирургического аппарата (установки), служащий для соединения его электрической цепи с определенным участком организма человека.

Э. АКТИ́ВНЫЙ — 1) Э. электрокардиографа, предназначенный для регистрации разности потенциалов между данной точкой тела и объединенным Э.; используется при записи однополюсных и усиленных однополюсных отведений электрокардиограммы; 2) Э., с к-рого вводят лекарственное средство при лекарственном электрофорезе; 3) Э. физиотерапевтического аппарата, оказывающий желаемое воздействие на организм.

Э. БИПОЛЯ́РНЫЙ (син. зонд биполярный) — зонд, снабженный катодным и анодным Э., предназначенный для электрической стимуляции мышцы сердца.

Э. ВЖИВЛЁННЫЙ (син. Э. долгосрочный) — Э., помещаемый на длительное время в ткани организма, напр. в определенные структуры головного мозга, для воздействия на них электрическим током или для периодической регистрации биопотенциалов.

Э. ДОЛГОСРО́ЧНЫЙ — см. *Электрод вживленный.*

Э. НУЛЕВО́Й (син.: Вильсона центральная терминаль, Уилсона центральная терминаль) — объединенный Э. для правой руки, левой руки и левой ноги; суммарный потенциал такого Э. близок к нулю.

Э. ОБЪЕДИНЁННЫЙ — параллельно соединенные два-три Э. электрокардиографа для конечностей; применяется при униполярных отведениях электрокардиограммы.

ЭЛЕКТРОДЕКАЛЬЦИНА́ЦИЯ (*электро-* + *декальцинация*) — освобождение костной ткани от солей с помощью методов электролитической диссоциации; применяется при изготовлении гистологических препаратов.

ЭЛЕКТРОДЕРМАТОГРА́ММА (*электро-* + *дерматограмма*; син. дерматограмма) — кривая, отражающая изменения во времени электрического сопротивления кожи; используется при исследовании функционального состояния вегетативной нервной системы и эмоциональной сферы.

ЭЛЕКТРОДЕРМАТО́ГРАФ (*электро-* + греч. derma, dermatos кожа + graphō писать, изображать) — прибор для измерения и графической регистрации изменений во времени электрического сопротивления кожи человека.

ЭЛЕКТРОДЕРМАТО́М (*электро-* + *дерматом*) — устройство, предназначенное для срезания лоскутов кожи заданной ширины и толщины с целью их трансплантации, приводимое в движение электродвигателем.

ЭЛЕКТРОДЕРМАТО́МЕТР (*электро-* + греч. derma, dermatos кожа + metreō измерять) — прибор для измерения изменений во времени электрического сопротивления кожи человека.

ЭЛЕКТРОДЕРМАТОМЕТРИ́Я (*электро-* + *дерматометрия*) — метод исследования функционального состояния вегетативной нервной системы и эмоциональной сферы путем измерения изменений во времени электрического сопротивления кожи.

ЭЛЕКТРОДИАГНО́СТИКА (*электро-* + *диагностика*) — метод диагностики двигательных нарушений, основанный на исследовании электровозбудимости нервов и мышц, позволяющий определить локализацию поражения.

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА́ТОР (*электро-* + *диализатор*) — аппарат для проведения ускоренного диализа в электрическом поле, представляющий собой цилиндрический сосуд, куда помещены полупроницаемые мембраны и два электрода, к которым подводят напряжение постоянного электрического тока.

ЭЛЕКТРОЗОЛЬГЕНЕРА́ТОР — см. *Электроаэрозольный генератор.*

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСА́ТОР (*электро-* + лат. impulsus толчок, побуждение; син. стимулятор импульсный) — аппарат для электрической стимуляции нервной и мышечной ткани (электростимулятор), генерирующий электрические импульсы прямоугольной формы и гальванический ток.

ЭЛЕКТРОИНТЕСТИНОГРАФИ́Я (*электро-* + лат. intestinum кишечник + греч. graphō писать, изображать) — метод исследования моторной деятельности кишечника, основанный на регистрации его биопотенциалов.

ЭЛЕКТРОКАЛОРИ́МЕТР (*электро-* + *калориметр*) — прибор для определения количества выделившегося тепла с помощью электрических методов измерения; в медицине применяется гл. обр. при исследованиях мелких лабораторных животных.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРА́ММА (*электро-* + *кардиограмма*; ЭКГ; син. актинокардиограмма — устар.) — кривая, отражающая изменения во времени разности потенциалов электрического поля (биопотенциалов) сердца при его сокращениях.

ЭЛЕ́КТРОКАРДИО́ГРАФ (*электро-* + *кардиограф*) — прибор для регистрации изменений разности потенциалов электрического поля (биопотенциалов) сердца.

Э. МА́ТЕРИ И ПЛОДА́ — Э., обеспечивающий одновременную регистрацию биопотенциалов сердца матери и сердца плода.

ЭЛЕ́КТРОКАРДИОГРАФИ́Я (*электро-* + *кардиография*) — 1) (син. актинокардиография — устар.) — метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности потенциалов его электрического поля (биопотенциалов); 2) (син. электрокардиология — нрк) — область электрофизиологии, изучающая электрические процессы в работающем сердце в нормальных и патологических условиях.

ЭЛЕКТРОКАРДИОЛО́ГИЯ (нрк; *электро-* + *кардиология*) — см. *Электрокардиография.*

ЭЛЕКТРОКАРДИОСКО́П (*электро-* + греч. kardia сердце + skopeō смотреть, наблюдать) — прибор для регистрации биоэлектрической активности сердца путем отображения на экране электронно-лучевой трубки изменений его электрического поля.

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯ́ТОР (*электро-* + *кардиостимулятор*; син.: водитель ритма искусственный, кардиостимулятор) — аппарат для стимуляции сердца генерируемыми электрическими импульсами.

Э. АСИНХРО́ННЫЙ — Э., подающий электрические импульсы с постоянной частотой; применяется у больных с полной поперечной блокадой сердца.

Э. БИОУПРАВЛЯ́ЕМЫЙ — Э., подающий электрические импульсы согласно сигналам, воспринимаемым от стимулируемого сердца.

Э. ЖДУ́ЩИЙ (син.: деманд-кардиостимулятор, Э. синхронный) — биоуправляемый Э., подающий электрические импульсы только в случае отсутствия собственного сокращения сердца через нормальный интервал после появления зубца *P* электрокардиограммы.

Э. ИМПЛАНТИ́РУЕМЫЙ (син. Э. интракорпоральный) — Э., помещаемый больному под кожу, снабженный автономным источником питания, обеспечивающим работу в течение нескольких лет.

Э. ИНТРАКОРПОРА́ЛЬНЫЙ — см. *Электрокардиостимулятор имплантируемый.*

Э. СИНХРО́ННЫЙ — см. *Электрокардиостимулятор ждущий.*

Э. Р-СИНХРО́ННЫЙ — биоуправляемый Э., воспринимающий импульс возбуждения предсердия (Р), усиливающий его и подающий с задержкой 0,10—0,16 сек. как стимулирующий импульс на желудочки сердца.

Э. *QRS*-СИНХРО́ННЫЙ — биоуправляемый Э., воспринимающий комплекс *QRS* электрокардиограммы и выдающий стимулирующий импульс в фазу рефрактерного периода, а при исчезновении комплексов *QRS* или их урежении ниже заданного предела переходящий в режим работы асинхронного Э.

ЭЛЕКТРОКА́РДИОФО́Н (*электро* + греч. kardia сердце + phōnē звук) — аппарат для преобразования биопотенциалов сердца в звуковые сигналы.

ЭЛЕКТРОКА́УСТИКА (*электро-* + греч. kaustikos жгучий) — см. *Гальванокаустика.*

ЭЛЕКТРОКА́УТЕР (*электро-* + греч. kautēr инструмент для обжига; син. гальванокаутер — нрк) — хирургический инструмент для теплового воздействия на ткань с целью ее коагуляции, нагреваемый электрическим током; разновидность термокаутера.

ЭЛЕКТРОКИМОГРА́ММА (*электро-* + *кимограмма*) — кривая, отражающая колебания рентгенооптической плотности какого-либо органа (напр., сердца, сосуда, легкого), полученная с рентгеновского экрана с помощью сцинтилляционного электрокимографа.

ЭЛЕКТРОКИМО́ГРАФ (*электро-* + *кимограф*) — кимограф с электрическим приводом.

ЭЛЕКТРОКИМО́ГРАФ СЦИНТИЛЛЯЦИО́ННЫЙ — прибор для графической регистрации изменений яркости рентгеновского экрана в области размещаемого на нем фотодатчика.

ЭЛЕКТРОКИМОГРАФИ́Я (*электро-* + греч. *кимография*; син. рентгеноэлектрокимография) — рентгенологический метод оценки вентиляционной функции легких, исследования пульсации контуров сердца и крупных сосудов, а также движений диафрагмы, основанный на регистрации колебаний оптической плотности изображения соответствующих объектов на рентгеновском экране.

ЭЛЕКТРОКОАГУЛОТОМИ́Я (*электрокоагуляция* + греч. tomē разрез, рассечение) — электрохирургический метод рассечения тканей путем медленного проведения через них электроножа при умеренной силе тока, что приводит к образованию зоны коагуляции по краям разреза.

ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯ́ЦИЯ (*электро-* + *коагуляция*) — хирургическая манипуляция, заключающаяся в коагуляции тканей воздействием электрического тока.

ЭЛЕКТРОКОНВУЛЬСА́ТОР (*электро-* + лат. convello, convulsum потрясать, колебать; син.: аппарат для лечения электрошоком — нрк, аппарат для электросудорожной терапии) — аппарат для дозированного воздействия на головной мозг низкочастотным синусоидальным или импульсным током с целью вызвать судорожный припадок; применяется при лечении психических расстройств.

ЭЛЕКТРОКОНИЗА́ЦИЯ ШЕ́ЙКИ МА́ТКИ — см. *Конизация шейки матки.*

ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРА́ММА (*электро-* + *кортикограмма*; ЭКоГ; син. кортикограмма) — кривая, отражающая изменения биопотенциалов коры полушарий большого мозга, зарегистрированные методом электрокортикографии.

ЭЛЕКТРОКОРТИКО́ГРАФ (*электро-* + анат. cortex cerebri кора большого мозга + греч. graphō писать, изображать) — прибор для регистрации биопотенциалов коры полушарий большого мозга с помощью небольших электродов, подведенных непосредственно к точно определенной области коры.

ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАФИ́Я (*электро-* + *кортикография*; син. кортикография) — метод функционального исследования коры полушарий большого мозга, заключающийся в регистрации ее биопотенциалов с помощью электродов, размещенных непосредственно на ее поверхности; применяется гл. обр. в ходе хирургической операции или в эксперименте на животных.

ЭЛЕКТРОКОРТИКОСТИМУЛЯ́ТОР (*электро-* + анат. cortex cerebri кора большого мозга + *стимулятор*) — аппарат для воздействия импульсным электрическим током на кору полушарий большого мозга с диагностической, лечебной или исследовательской целью.

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕ́НИЕ (син. электротерапия) — общее название методов лечения, основанных на использовании дозированного воздействия на организм электрического тока или электромагнитного поля.

ЭЛЕКТРОМАНОМЕТРИ́Я (*электро-* + манометрия) — измерение давления в полости тела или в просвете крупного кровеносного сосуда с помощью манометра, снабженного электронным датчиком давления, вводимым в соответствующую полость.

ЭЛЕКТРОМЕ́ТКА (син. электрическая метка) — участок поврежденных тканей (кожи или слизистых оболочек) в месте контакта с проводником электрического тока значительной силы и (или) напряжения, характеризующийся сухим некрозом тканей (вплоть до обугливания) и импрегнацией их металлом проводника.

ЭЛЕКТРОМЕТРОНО́М (*электро-* + *метроном*) — электротехнический аппарат для подачи ритмичных звуковых сигналов с их отметкой на ленте регистрирующего устройства; применяется при физиологических исследованиях.

ЭЛЕКТРОМИОГРА́ММА (*электро-* + *миограмма*; ЭМГ) — кривая, отражающая изменения во времени разности потенциалов электрического поля (биопотенциалов) скелетной мышцы.

ЭЛЕКТРОМИО́ГРАФ (*электро-* + *миограф*) — прибор для графической регистрации изменений во времени разности потенциалов электрического поля (биопотенциалов) скелетных мышц.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИ́Я (*электро-* + *миография*) — метод функционального исследования мышечной системы, заключающийся в графической регистрации биопотенциалов скелетных мышц.

ЭЛЕКТРОМИОМАСТИКАЦИОГРАФИ́Я (*электро-* + греч. mys, myos мышца + *мастикациография*) — одновременная графическая регистрация изменений биопотенциалов жевательных мышц и движений нижней челюсти.

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯ́ТОР (*электро-* + греч. mys, myos мышца + *стимулятор*) — аппарат для раздражения мышц электрическими импульсами с заданными параметрами.

ЭЛЕКТРОНАРКО́З (*электро-* + *наркоз*) — см. *Электроанестезия.*

ЭЛЕКТРОНЕЙРОГРА́ММА (*электро-* + греч. neuron нерв + gramma запись, изображение) — кривая, отображающая биоэлектрическую активность нерва, т. е. сумму потенциалов действия аксонов, составляющих нерв.

ЭЛЕКТРОНЕЙРО́ГРАФ (*электро-* + греч. neuron нерв + graphō писать, изображать) — прибор для графической регистрации биоэлектрических потенциалов нерва или нервного волокна.

ЭЛЕКТРОНЕЙРОГРАФИ́Я (*электро-* + греч. neuron нерв + graphō писать, изображать) — метод исследования нервной системы, основанный на графической регистрации изменений во времени биоэлектрической активности периферических нервов.

ЭЛЕКТРО́НИКА МЕДИЦИ́НСКАЯ — область техники, связанная с разработкой, конструированием и производством медицинских электронных приборов и аппаратов.

ЭЛЕКТРОНИСТАГМО́ГРАФ (*электро-* + *нистагм* + греч. graphō писать, изображать) — электронный прибор для регистрации нистагма по изменениям разности потенциалов электрического поля (биопотенциалов) глазного яблока с помощью датчиков, укрепляемых у краев глазницы.

ЭЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИ́Я (*электро-* + *нистагм* + греч. graphō писать, изображать; ЭНГ) — метод исследования нистагма, основанный на графической регистрации изменений биопотенциалов глазного яблока.

ЭЛЕКТРО́ННО-ОПТИ́ЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВА́ТЕЛЬ (ЭОП) — прибор, основанный на фотоэлектрическом эффекте, предназначенный для преобразования невидимого глазом изображения в видимое или для усиления видимого изображения; в медицине применяется при исследованиях в инфракрасном или ультрафиолетовом свете, а также для преобразования рентгеновского изображения.

ЭЛЕКТРОНО́Ж — хирургический инструмент для бескровного рассечения и коагуляции мягких тканей воздействием тока высокой частоты, подводимого к рабочей поверхности инструментов от генератора.

ЭЛЕКТРОНО́ЖНИЦЫ — хирургический инсгрумент для бескровного разделения мягких тканей путем воздействия на них электрическим током высокой частоты, который подведен от генератора к двум рабочим поверхностям инструмента, расположенным в виде ножниц.

ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНО́СТИКА (*электро-* + греч. odus, odontos зуб + *диагностика*) — исследование состояния пульпы зуба и периодонта путем определения возбудимости нервов зуба при воздействии электрическим током.

ЭЛЕКТРООКУЛОГРА́ММА (*электро-* + лат. oculus глаз + греч. gramma запись) — кривая, отражающая изменения биопотенциалов глаза при его движениях.

ЭЛЕКТРООКУЛО́ГРАФ (*электро-* + лат. oculus глаз + греч. graphō писать, изображать) — прибор для графической регистрации изменений разности потенциалов электрического поля (биопотенциалов) глаза с помощью электродов, установленных у наружных углов глаз.

ЭЛЕКТРООКУЛОГРАФИ́Я (*электро-* + лат. oculus глаз + греч. graphō писать, изображать; ЭОГ) — метод исследования функции глазодвигательных мышц или функционального состояния наружных слоев сетчатки, заключающийся в графической регистрации изменений биопотенциалов глаза при его движениях.

ЭЛЕКТРООТСА́СЫВАТЕЛЬ (син.: электроаспиратор, электроотсос) — аппарат для отсасывания жидкого содержимого при хирургических операциях и различных лечебных процедурах, снабженный электроприводом.

ЭЛЕКТРООТСО́С — см. *Электроотсасыватель*.

ЭЛЕКТРООФТАЛЬМИ́Я (electroophthalmia; *электро-* + греч. ophthalmos глаз; син. офтальмия электрическая) — фотоофтальмия, вызванная излучением электрических источников света (в т. ч. ультрафиолетового излучения).

ЭЛЕКТРООФТАЛЬМОДИАГНО́СТИКА (*электро-* + греч. ophthalmos глаз + *диагностика*) — совокупность методов диагностики глазных болезней, основанных на электрофизиологических исследованиях (электроретинография, электроокулография и др.).

ЭЛЕКТРООФТАЛЬМОДИНАМОГРАФИ́Я (*электро-* + *офтальмодинамография*) — метод диагностики функционального состояния сетчатки при заболеваниях сосудистой системы глаз, основанный на изучении изменений электроретинограммы при дозированном механическом давлении на глаз.

ЭЛЕКТРООФТАЛЬМОДИНАМО́МЕТР (*электро-* + *офтальмодинамометр*) — электромеханический прибор для офтальмодинамометрии.

ЭЛЕКТРООФТАЛЬМО́МЕТР (*электро-* + *офтальмометр*) — прибор для измерения радиуса кривизны передней поверхности роговицы, ее рефракции, а также для определения вида астигматизма и направления его главных осей, снабженный встроенным электрическим источником освещения.

ЭЛЕКТРООФТАЛЬМОСКО́П (*электро-* + *офтальмоскоп*) — см. *Офтальмоскоп электрический ручной*.

ЭЛЕКТРОПЕНЕТРА́ЦИЯ (устар.; *электро-* + лат. penetratio проникновение) — см. *Диатермия*.

ЭЛЕКТРОПИРЕКСИ́Я (*электро-* + греч. pyrexis жар, лихорадочное состояние; син. гипертермия электрическая) — способ электролечения, заключающийся в искусственном повышении температуры тела больного вследствие эндогенного образования тепла в тканях при поглощении ими энергии переменного электрического или электромагнитного поля ультравысокой или высокой частоты.

ЭЛЕКТРОПЛЕТИЗМО́ГРАФ (*электро-* + *плетизмограф*) — прибор для регистрации изменений кровенаполнения органа или участка тела по сопутствующим изменениям его объема путем непрерывного измерения емкости электрического конденсатора, образованного двумя металлическими электродами и исследуемым органом (участком тела).

ЭЛЕКТРОПЛЕТИЗМОГРАФИ́Я (*электро-* + *плетизмография*) — метод исследования кровенаполнения органа или участка тела, основанный на регистрации их электрического сопротивления или диэлектрических свойств, закономерно изменяющихся в процессе кровообращения.

ЭЛЕКТРОПНЕВМОТАХОГРА́ММА (*электро-* + *пневмотахограмма*)— кривая, отображающая изменения скорости потока вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в течение дыхательного цикла.

ЭЛЕКТРОПНЕВМОТАХОГРАФИ́Я (*электро-* + *пневмотахография*) — метод исследования внешнего дыхания, основанный на графической регистрации объемной скорости вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в течение дыхательного цикла.

ЭЛЕКТРОПНЕВМОЭНЦЕФАЛО́ГРАФ (*электро-* + *пневмоэнцефалография*) — прибор для измерения давления цереброспинальной жидкости, для автоматической дозированной подачи воздуха в полость черепа без выпускания цереброспинальной жидкости, для автоматической дозированной замены ее воздухом при пневмоэнцефалографии, а также для проведения и регистрации ликвородинамических проб.

ЭЛЕКТРОПРЕЦИПИТА́ТОР (*электро-* + лат. praecipito, praecipitatum падать, выпадать) — аппарат для ускоренного осаждения электрически заряженных частиц пыли (аэрозоля) посредством создания электрического поля; используется в гигиенической практике.

ЭЛЕКТРОПУНКТУ́РА (*электро-* + лат. punctura укол, прокол; син. гальванопунктура) — 1) метод рефлексотерапии, основанный на воздействии электрическим током на биологически активные точки с помощью тонкого электрода; 2) метод электрокоагуляции небольшой гемангиомы кожи или слизистой оболочки с помощью тонкого острого электрода.

ЭЛЕКТРОРЕЗЕ́КЦИЯ (*электро-* + *резекция*) — резекция, выполняемая с помощью электроножа.

ЭЛЕКТРОРЕЗЕ́КЦИЯ ТРАНСУРЕТРА́ЛЬНАЯ (*электро-* + *резекция*)— хирургическая операция: удаление части предстательной железы или опухоли мочевого пузыря с помощью резектоскопа-цистоскопа.

ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРА́ММА (*электро-* + *рентгенограмма*; син.: ксерорентгенограмма, ксерорадиограмма) — рентгенограмма на обычной бумаге, полученная методом электрорентгенографии.

ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНО́ГРАФ (*электро-* + *рентгенография*; син.: аппарат электрорентгенографический, установка электрорентгенографическая) — установка для получения рентгеновского изображения на заряженной селеновой пластинке с переносом его на обычную бумагу.

ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРАФИ́Я (*электро-* + *рентгенография*; син.: ксерорадиография, ксерорентгенография) — метод рентгенографии, при к-ром рентгеновское изображение получают на заряженной полупроводниковой (обычно селеновой) пластинке, а затем переносят на обычную бумагу.

ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОСКАНИ́РОВАНИЕ (*электро-* + *рентген* + *сканирование*) — метод комбинированного рентгеновского и радиоизотопного исследования, заключающийся в нанесе-

нии сканограммы органа на электрорентгенограмму того же органа.

ЭЛЕКТРОРЕОГРА́ММА (*электро-* + *реограмма*) — см. *Реограмма.*

ЭЛЕКТРОРЕО́ГРАФ (*электро-* + *реограф*) — см. *Реограф.*

ЭЛЕКТРОРЕОГРАФИ́Я (*электро-* + *реография*) — см. *Реография.*

ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРА́ММА (*электро-* + ретинограмма) — кривая, отображающая изменение биопотенциалов сетчатки, полученная методом электроретинографии.

ЭЛЕКТРОРЕТИНО́ГРАФ (*электро-* + ретинография) — прибор для регистрации изменений биопотенциалов сетчатки глаза при световом раздражении.

ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИ́Я (*электро-* + ретинография) — метод изучения функционального состояния сетчатки, основанный на регистрации биопотенциалов, возникающих в ней при световом раздражении.

ЭЛЕКТРОСО́Н — 1) сон, вызываемый воздействием на головной мозг слабым импульсным электрическим током низкой частоты; применяется при лечении нек-рых функциональных расстройств ц. н. с. и внутренних болезней; 2) метод электротерапии, при к-ром используют импульсные электрические токи, вызывающие у пациента сон.

«ЭЛЕКТРОСО́Н» — аппарат для лечения сном, представляющий собой генератор электрических импульсов определенной силы, частоты и длительности, снабженный электродами, укрепляемыми на голове больного.

ЭЛЕКТРОСПАЦИОГРАФИ́Я — см. *Спациокардиография.*

ЭЛЕКТРОСПИРО́ГРАФ (*электро-* + *спирограф*) — прибор для измерения и графической регистрации объемной скорости вдоха или выдоха (спирограф), основанный на электрических методах измерения указанных величин.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯ́ТОР (*электро-* + стимулятор) — общее название аппаратов для раздражения органов и тканей одиночными или периодическими импульсами электрического тока.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯ́ЦИЯ (*электро-* + *стимуляция*) — раздражение органа или ткани импульсами электрического тока с диагностической, лечебной или исследовательской целью.

Э. ДЫХА́НИЯ — Э. диафрагмальных нервов или дыхательных мышц с целью увеличения минутного объема легочной вентиляции при недостаточном внешнем дыхании.

Э. МЫШЦ — см. *Электрогимнастика.*

Э. СЕ́РДЦА — см. *Стимуляция сердца электрическая.*

ЭЛЕКТРОСУБКОРТИКОГРА́ММА (*электро-* + лат. sub- под + анат. cortex cerebri кора большого мозга + греч. gramma запись) — кривая, отражающая изменения биопотенциалов подкорковых структур головного мозга.

ЭЛЕКТРОСУБКОРТИКОГРАФИ́Я (*электро-* + лат. sub- под + анат. cortex cerebri кора большого мозга + греч. graphō писать, изображать) — метод исследования подкорковых структур головного мозга, основанный на регистрации их биоэлектрической активности с помощью введенных в них электродов.

ЭЛЕКТРОСФИГМОГРА́ММА (*электро-* + *сфигмограмма*) — сфигмограмма, полученная с помощью электросфигмографа.

ЭЛЕКТРОСФИГМО́ГРАФ (*электро-* + *сфигмограф*) — прибор для графической регистрации пульсовых колебаний артериальной стенки путем их преобразования в электрические сигналы и записи осциллограммы последних.

ЭЛЕКТРОСФИГМОГРАФИ́Я (*электро-* + *сфигмография*) — сфигмография, производимая с помощью электросфигмографа.

ЭЛЕКТРОСФИГМОМАНО́МЕТР (*электро-* + *сфигмоманометр*) — прибор для определения артериального давления непрямым методом (по Короткову), основанный на электрических методах измерения давления в манжетке сфигмоманометра.

ЭЛЕКТРОТЕЛЕКАРДИОГРАФИ́Я (*электро-* + *телекардиография*) — см. *Телеэлектрокардиография.*

ЭЛЕКТРОТЕРАПИ́Я (*электро-* + *терапия*) — см. *Электролечение.*

ЭЛЕКТРОТЕРМОБУ́Ж (*электро-* + греч. thermē теплота + *буж*) — буж, имеющий внутри нагревательный элемент, питающийся от внешнего источника электрического тока; применяется при лечении стриктур мочеиспускательного канала.

ЭЛЕКТРОТЕРМО́МЕТР МЕДИЦИ́НСКИЙ (*электро-* + *термометр*) — прибор для быстрого измерения температуры тела, отдельных органов и тканей, в котором в качестве датчика используются миниатюрные металлические или полупроводниковые термосопротивления.

ЭЛЕКТРОТИТРА́ТОР (*электро-* + англ. titrate титровать) — прибор для титрования, указывающий на доведение активной реакции раствора до изоэлектрической точки; применяется в лабораторной практике.

ЭЛЕКТРОТО́Н (*электро-* + греч. tonos напряжение) в физиологии — изменение возбудимости тканей и органов при прохождении через них постоянного электрического тока; различают анэлектротон, катэлектротон и катодическую депрессию.

ЭЛЕКТРОТОНИЗА́ТОР МА́ТКИ (*электро-* + греч. tonos напряжение) — аппарат для электростимуляции родовой деятельности матки.

ЭЛЕКТРОТОНО́ГРАФ (*электро-* + *тонограф*; син. тонограф) — электромеханический прибор для графической регистрации изменений внутриглазного давления.

ЭЛЕКТРОТОНОГРАФИ́Я (*электро-* + *тонография*) — разновидность тонографии, при к-рой производится непрерывная регистрация изменений внутриглазного давления с помощью электротонографа.

ЭЛЕКТРОТОНО́МЕТР (*электро-* + *тонометр*) — см. *Фотоофтальмотонометр.*

ЭЛЕКТРОТРА́ВМА (electrotrauma; *электро-* + *травма*) — травма, вызванная воздействием на органы и ткани электрического тока большой силы или напряжения (в т. ч. молнии); характеризуется поражением нервной системы (судороги, потеря сознания), нарушениями кровообращения и (или) дыхания, глубокими ожогами.

ЭЛЕКТРОТРАНСТЕРМИ́Я (устар.; *электро-* + лат. trans сквозь, через + греч. thermē теплота, жар) — см. *Диатермия.*

ЭЛЕКТРОТРЕПА́Н (*электро-* + *трепан*) — хирургический инструмент, представляющий собой трепан, снабженный электроприводом, вращающим фрезу.

ЭЛЕКТРОУТЕРО́ГРАФ (*электро-* + лат. uterus матка + греч. graphō писать, изображать) — см. *Гистерограф фотометрический.*

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛО́ГИЯ (*электро-* + *физиология*) — раздел физиологии, изучающий электрические явления в организме (гл. обр. биопотенциалы).

ЭЛЕКТРОФОКУСИ́РОВАНИЕ (син. изоэлектрическое фокусирование) — метод разделения белков, основанный на перемещении их молекул под действием постоянного напряжения в область с величиной pH, соответствующей изоэлектрической точке данного белка; применяется в бисхимических исследованиях.

ЭЛЕКТРОФОНОКАРДИО́ГРАФ (*электро-* + *фонокардиограф*) — см. *Фоноэлектрокардиограф.*

ЭЛЕКТРОФОРЕ́З (*электро-* + греч. phorēsis несение, перенос) — перемещение электрически заряженных частиц дисперсной фазы в дисперсионной среде под действием внешнего электрического поля; явление Э. используется, напр., в физиотерапии, в нек-рых методах лабораторных биохимических исследований.

ЭЛЕКТРОФОРЕ́З ЛЕКА́РСТВЕННЫЙ (син.: гальваноионотерапия — устар., ионогальванизация — устар., ионотерапия — устар., ионофорез — устар., ионтофорез — устар.) — метод электролечения, заключающийся в сочетанном воздействии на организм больного постоянным гальваническим или импульсным электрическим током и лекарственным веществом, вводимым с его помощью через неповрежденные кожу или слизистые оболочки.

ЭЛЕКТРОФОРЕ́З - ДИАТЕРМИ́Я — см. *Диатермоэлектрофорез.*

ЭЛЕКТРОФОРЕЗИНДУКТОТЕРМИ́Я (*электрофорез* + *индуктотермия*; син. индуктотермофорез) — метод электролечения, заключающийся в сочетанном применении лекарственного электрофореза и индуктотермии.

ЭЛЕКТРОФОРЕТИ́ЧЕСКАЯ КО́ЖНАЯ ПРО́БА — 1) метод исследования сосудистых реакций, основанный на электрофорезе нек-рых физиологически активных веществ (напр., адреналина, ацетилхолина, гистамина) с последующей оценкой местных изменений кожи; 2) метод оценки чувствительности организма к определенным лекарственным средствам, основанный на электрофорезе раствора этого средства с последующей оценкой местных изменений кожи.

ЭЛЕКТРОХИРУРГИ́Я (*электро-* + *хирургия*) — раздел хирургии, разрабатывающий и использующий методы разделения или разрушения тканей, основанные на применении электрического тока высокой частоты.

ЭЛЕКТРОШО́К (*электро-* + *шок*) — см. *Терапия электросудорожная.*

ЭЛЕКТРОЭКСЦИ́ЗИЯ (electroexcisio; *электро-* + *эксцизия*) — иссечение тканей или органов с помощью электроножа.

ЭЛЕКТРОЭЛИМИНА́ЦИЯ (*электро-* + *элиминация*) — метод электролечения, заключающийся в воздействии

на организм больного гальваническим током с целью выведения из него ионов каких-либо веществ.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРА́ММА (*электро-* + *энцефалограмма*; ЭЭГ) — кривая, отражающая изменение биопотенциалов головного мозга, полученная методом электроэнцефалографии.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛО́ГРАФ (*электро-* + *энцефалограф*) — прибор для регистрации изменений разности потенциалов электрического поля (биопотенциалов) головного мозга.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРА́ФИЯ (*электро-* + *энцефалография*) — метод функционального исследования головного мозга, основанный на графической регистрации его биопотенциалов.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОПА́ТИЯ (electroencephalopathia; *электро-* + *энцефалопатия*) — энцефалопатия, обусловленная электротравмой.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФА́ЛОСКО́П (*электро-* + греч. enkephalos головной мозг + skopeō смотреть, наблюдать) — прибор для многоточечной регистрации пространственного распределения биопотенциалов головного мозга с отображением на экране электронно-лучевой трубки.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОСКОПИ́Я (*электро-* + греч. enkephalos головной мозг + skopeō смотреть, наблюдать) — метод функционального исследования головного мозга, основанный на регистрации биопотенциалов множества его участков с отображением на экране электронно-лучевой трубки (осциллоскопа) в виде мозаики точек, непрерывно меняющих свою яркость и величину.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОФОНИ́Я (*электро-* + греч. enkephalos головной мозг + phōnē звук) — метод оценки результатов электроэнцефалографии, основанный на преобразовании инфразвуковых колебаний биопотенциалов в колебания звуковой частоты и их прослушивании.

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯ́ЦИЯ (*электро-* + *эпиляция*) — удаление волос путем воздействия на кожу переменным электрическим током высокой частоты и большой силы или током ультравысокой частоты.

ЭЛЕМЕНТА́РНОЕ ВИ́РУСНОЕ ТЕ́ЛЬЦЕ — устаревшее название вирионов крупных вирусов, выявлявшихся после специальной окраски при световой микроскопии.

ЭЛЕМЕ́НТ КО́ЖНОЙ СЫ́ПИ ВТОРИ́ЧНЫЙ — общее название элементов сыпи, формирующихся в результате эволюции первичных элементов кожной сыпи; к Э. к. с. в. относят чешуйки, корки, рубцы, лихенизацию, трещины, экскориации и др.

ЭЛЕМЕ́НТ КО́ЖНОЙ СЫ́ПИ ПЕРВИ́ЧНЫЙ — общее название элементов сыпи, появляющихся на неизмененной коже; к Э. к. с. п. относят пятно, папулу, бугорок, пустулу, волдырь, везикулу, пузырь и узел.

ЭЛЕ́РА ПРИБО́Р (Oehler) — приспособление для определения направления и величины деформации позвоночника, представляющее собой сетку, накладываемую на фотографическое или рентгенографическое изображение спины исследуемого.

ЭЛЕ́РА СИМПТО́М (J. Oehler, род. в 1879 г., нем. врач) — бледность и похолодание стопы; наблюдается, напр., при эндоартериите или атеросклерозе артерий нижней конечности.

ЭЛЕ́РСА — ДАНЛО́СА СИНДРО́М (E. Ehlers, 1863—1937, датский дерматолог; H. A. Danlos, 1844—1912, франц. врач) — см. *Десмогенез несовершенный*.

ЭЛЕФАНТИА́З (elephantiasis; греч. elephas, elephantos слон + *-иаз*) — см. *Слоновость*.

ЭЛИМИНА́ТОР Я́ДА (лат. elimino, eliminatum выносить за порог, удалять) — противоядие, действие которого основано на ускорении выведения яда из организма.

ЭЛИМИНА́ЦИЯ ХРОМОСО́МЫ (лат. elimino, eliminatum выносить за порог, удалять) — утрата клеткой хромосомы во время митоза или мейоза.

ЭЛЛИО́ТА ТРЕПА́Н (R. H. Elliot, 1864—1936, англ. офтальмолог) — инструмент для трепанации оболочек глаза, представляющий собой миниатюрный цилиндрический стальной нож с цилиндрической рукояткой, имеющей на поверхности перекрестную накатку для удерживания и вращения инструмента пальцами.

ЭЛЛИО́ТА ТРЕПАНА́ЦИЯ СКЛЕ́РЫ (R. H. Elliot) — хирургическая операция при глаукоме, заключающаяся в трепанации склеры в области лимба.

ЭЛЛИПТИ́ЧЕСКИЙ КАРМА́Н (recessus ellipticus) — см. *Эллиптическое углубление*.

ЭЛЛИПТИ́ЧЕСКИЙ МЕШО́ЧЕК (utriculus, PNA, BNA, JNA; син. маточка) — часть перепончатого лабиринта внутреннего уха, расположенная в преддверии костного лабиринта и соединенная с перепончатыми полукружными каналами и сферическим мешочком.

ЭЛЛИПТИ́ЧЕСКОЕ УГЛУБЛЕ́НИЕ (recessus ellipticus, PNA, BNA; recessus utriculi, JNA; син.: углубление маточки, углубление эллиптического мешочка, эллиптический карман) — углубление медиальной стенки преддверия костного лабиринта внутреннего уха, соединяющееся с полукружными каналами; место расположения эллиптического мешочка.

ЭЛЛИПТОЦИТО́З (elliptocytosis) — см. *Овалоцитоз*.

ЭЛЛИ́СА ЗАЖИ́М (O. H. Allis, 1836—1921, амер. хирург) — хирургический зажим для захватывания слизистой оболочки желудка или кишки; рабочие губки зажима имеют по нескольку острых зубчиков.

ЭЛЛИ́СА КО́СТНЫЙ ШОВ (O. H. Allis) — остеосинтез с помощью металлических винтов, вводимых в кость перпендикулярно линии перелома.

ЭЛЛИ́СА СИМПТО́М (O. H. Allis) — необычное углубление, пальпируемое над большим вертелом; признак перелома шейки бедренной кости или тазовой кости в области вертлужной впадины с укорочением ноги, обусловленный расслаблением мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра, и средней ягодичной мышцы.

ЭЛЛИ́СА — ВАН-КРЕ́ВЕЛЬДА СИНДРО́М (R. W. B. Ellis, 1902—1966, англ. педиатр; S. van Creveld, род. в 1894 г., голл. педиатр; син.: дисплазия хондроэктодермальная, синдром дряблой кожи, хондродисплазия эктодермальная) — аномалия развития, характеризующаяся диспропорцией туловища, укорочением конечностей за счет предплечья и голеней, полидактилией и синдактилией, гипоплазией ногтей, множественными экзостозами, аномалией развития зубов вплоть до их отсутствия, снижением интеллекта и инфантилизмом.

ЭЛЛИ́СА — ДАМУАЗО́ — СОКОЛО́ВА ЛИ́НИЯ (C. Ellis, 1826—1883, амер. врач; L. H. C. Damoiseau, 1815—1891, франц. врач; Д. К. Соколов, отеч. врач конца 19 — начала 20 в.; син. Дамуазо линия) — перкуторно определяемая верхняя граница экссудата в плевральной полости при экссудативном плеврите, проходящая от позвоночника латерально и вверх до задней подмышечной линии, затем вниз и кпереди до среднеключичной линии.

ЭЛСБЕ́РГА — ДА́ЙКА СИМПТО́М (C. A. Elsberg, 1871—1948, амер. хирург; S. C. Dyke, совр. англ. патолог) — рентгенологически определяемая деформация ножек дуг позвонков и увеличение расстояния между ножками дуг; признак опухоли спинного мозга.

ЭЛЬПЕНО́РА СИНДРО́М (по имени спутника Одиссея) — см. *Синдром Эльпенора*.

ЭЛЬЦГО́ЛЬЦА ТЕЛЬЦА́ (A. Elzholz, 1863—1925, австрийский психиатр) — черные шарообразные включения в цитоплазме лейкоцитов (шванновских клеток), выявляемые при импрегнации гистологических препаратов осмиевой кислотой и представляющие собой скопления продуктов распада миелина.

ЭЛЬШНИГА ЖЕМЧУ́ЖИНЫ (A. Elschnig, 1863—1939, нем. офтальмолог) — см. *Адамюка — Эльшнига шары*.

ЭЛЬШНИГА ИГЛА́ (A. Elschnig) — полая игла для отсасывания стекловидного тела, снабженная утолщением, предохраняющим ее от погружения более чем на 15 *мм*.

ЭЛЬШНИГА НОЖ (A. Elschnig) — инструмент для расширения разреза, производимого при экстракции катаракты; представляет собой обоюдоострый нож, выполненный в виде шпателя с закругленным концом.

ЭЛЬШНИГА ПИНЦЕ́Т (A. Elschnig) — инструмент для фиксирования глазного яблока во время оперативного вмешательства; представляет собой пинцет, на рабочих губках к-рого имеется по три острых зубца, обращенных несколько кзади, что дает возможность захватывать вместе с конъюнктивой сухожилие прямой мышцы.

ЭЛЬШНИГА ПЯ́ТНА (A. Elschnig) — изолированные яркие желтые или красные пятна в сетчатке, наблюдаемые при офтальмоскопии; признак далеко зашедшей гипертонической ретинопатии.

ЭЛЬШНИГА УЗДЕ́ЧКОВЫЙ ШОВ (A. Elschnig) — временный шов, накладываемый в ходе хирургической операции на сухожилие верхней прямой мышцы глаза с целью фиксации глазного яблока.

ЭЛЬШНИГА ЦИКЛОШПА́ТЕЛЬ (A. Elschnig) — см. *Эльшнига шпатель*.

ЭЛЬШНИГА ШПА́ТЕЛЬ (A. Elschnig; син. Эльшнига циклошпатель) — инструмент, применяемый при циклодиализе, представляющий собой узкий шпатель, изгиб к-рого соответствует изгибу внутренней части склеры.

ЭЛЮИ́РОВАНИЕ ВИ́РУСА (лат. eluo вымывать, удалять) — см. *Элюция вирусов*.

ЭЛЮ́ЦИЯ ВИ́РУСА (лат. eluo, elutum вымывать, удалять; син. элюирование вируса) — освобождение вируса, при-

крепившегося к поверхности клетки или какой-либо частицы, осуществляемое, напр., путем изменения температуры или повышения молярности раствора.

ЭМ- — см. *Эн-*.

ЭМА́ЛЕВАЯ ПЛАСТИ́НКА (lamella enameli, LNH) — слой органического вещества, проходящий через всю толщу эмали зуба; обнаруживается на поперечном шлифе зуба.

ЭМА́ЛЕВАЯ ПРИ́ЗМА (prisma enameli, LNH) — длинное, S-образно изогнутое образование, состоящее из кристаллов гидроксиапатита, проходящее через всю толщу эмали зуба; производное энамелобластов.

ЭМА́ЛЕВОЕ ВЕРЕТЕНО́ (fusus enameli, LNH) — колбообразное утолщение конца дентинного канальца, проникшее в эмаль.

ЭМА́ЛЕВЫЕ КА́ПЛИ — см. *Адамантома*.

ЭМА́ЛЕВЫЕ ПОЛО́СКИ (striae enameli; син. Гунтера — Шрегера полосы — устар.) — светлые и темные радиально расположенные полоски эмали, обнаруживаемые в отраженном свете на продольном шлифе зуба; обусловлены различным (продольным или поперечным) направлением S-образно изогнутых эмалевых призм на срезе.

ЭМАЛО́ИД (франц. émail эмаль + греч. -eidēs подобный) — см. *Адамантома*.

ЭМА́ЛЬ ЗУБНА́Я (enamelum, LNH; франц. émail эмаль) — твердая ткань зуба, покрывающая дентин коронки зуба и состоящая на 96—97% из неорганических веществ, гл. обр. кристаллов гидроксиапатита.

ЭМА́Н (устар.) — единица удельной активности радиоактивных изотопов в жидкостях или газах, соответствующая 10^{-10} *кюри/л*, или 3700 распадам за 1 сек. в 1 $м^3$, или 3700 *Бк/м*^{3}.

ЭМАНА́ЦИЯ РА́ДИЯ (позднелат. emanatio истечение) — см. *Радон*.

ЭМАНА́ЦИЯ ТО́РИЯ — см. *Торон*.

ЭМАНУЭ́ЛЯ РЕА́КЦИЯ (G. Emanuel, род. в 1879 г., нем. врач) — см. *Мастичная реакция*.

ЭМАСКУЛЯ́ЦИЯ (emasculatio; э- + лат. masculinus мужской пол, мужской) — хирургическая операция: полное удаление полового члена вместе с мошонкой и ее органами, напр. по поводу рака, фагеденического шанкра.

ЭМБО́Л (embolus; греч. embolos и embolon клин, затычка) — циркулирующий в крови субстрат, не встречающийся в нормальных условиях и способный вызвать закупорку кровеносного сосуда.

ЭМБО́Л РЕЧЕВО́Й — слово, часть слова или короткое словосочетание, многократно повторяемое больным при попытке говорить; признак моторной афазии.

ЭМБОЛИ́Я (embolia; греч. embolē вбрасывание, вторжение) — закупорка кровеносного сосуда эмболом.

Э. БАКТЕРИА́ЛЬНАЯ (e. bacterialis; син. Э. микотическая) — Э. частицами тромба, содержащими жизнеспособные микроорганизмы.

Э. ВОЗДУ́ШНАЯ (aëroembolia; син. аэроэмболия) — Э. пузырьками воздуха, попадающими в кровоток при ранении вен (напр., шеи, матки), а также при неправильном выполнении внутривенной инъекции или инфузии.

Э. ГА́ЗОВАЯ (e. gaseosa) — Э. пузырьками газа (азот, кислород), возникающими при десатурации крови в связи с быстрым переходом к условиям более низкого давления окружающей среды (декомпрессией).

Э. ЖИРОВА́Я (e. adiposa) — Э. мелких сосудов внутренних органов каплями жира, попадающими в вены при обширных травмах подкожной клетчатки и костей скелета, реже — при ожирении печени.

Э. КЛЕ́ТОЧНАЯ (e. cellularis; син. эмболия тканевая) — Э. клетками или тканями организма, чаще опухолевыми.

Э. МИКОТИ́ЧЕСКАЯ (e. mycotica) — см. *Эмболия бактериальная*.

Э. ПАРАДОКСА́ЛЬНАЯ (e. paradoxalis) — артериальная Э. сосудов большого круга кровообращения эмболами из сосудов малого круга; наблюдается при незаращении овального окна между предсердиями или дефекте межжелудочковой перегородки сердца.

Э. РЕТРОГРА́ДНАЯ (e. retrograda) — Э., при к-рой эмбол перемещается против тока крови под действием силы тяжести.

Э. ТКАНЕВА́Я (e. textualis) — см. *Эмболия клеточная*.

ЭМБОЛИ́Я АМНИОТИ́ЧЕСКАЯ (embolia amniotica) — патологическое состояние, обусловленное попаданием околоплодных вод в кровеносное русло роженицы, характеризующееся развитием шока и острой гипофибриногенемии с массивными кровотечениями; возникает, напр., при глубоких разрывах матки или как осложнение кесарева сечения.

ЭМБОЛОЛАЛИ́Я (embololalia; греч. embolos и embolon клин, затычка + lalia речь, болтовня; син. эмболофразия) — частое, привычное употребление в речи одних и тех же бессмысленных слов и оборотов.

ЭМБОЛОФРАЗИ́Я (embolophrasia; греч. embolos и embolon клин, затычка + греч. phrasis речь, оборот речи) — см. *Эмбололалия*.

ЭМБОЛЭКТОМИ́Я (embolectomia; *эмбол* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление эмбола из кровеносного сосуда.

ЭМБРИОБЛА́СТ (embryoblastus; *эмбрион* + греч. blastos росток, зародыш; син.: архибласт, клеточная масса внутренняя) — совокупность клеток, находящихся внутри от трофобласта, у зародышей млекопитающих и человека на стадиях морулы и ранней бластоцисты.

ЭМБРИОГЕНЕ́З (embryogenesis; *эмбрион* + греч. genesis происхождение, развитие) — см. *Эмбриональное развитие*.

ЭМБРИОДИ́Я — см. *Дауна болезнь*.

ЭМБРИОКАРДИ́Я (embryocardia; *эмбрион* + греч. kardia сердце) — см. *Ритм сердца маятникообразный*.

ЭМБРИОЛО́ГИЯ (*эмбрион* + греч. logos учение, наука) — наука, изучающая закономерности образования зародыша и его развития.

Э. СРАВНИ́ТЕЛЬНАЯ — направление в Э., изучающее развитие зародышей путем сопоставления развития представителей различных типов и классов животного мира.

Э. ЭВОЛЮЦИО́ННАЯ — направление в Э., изучающее закономерности эволюционного изменения онтогенеза животных в ходе их филогенеза.

Э. ЭКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНАЯ (син.: физиология развития — устар.) — направление в Э., использующее методы искусственного перемещения и изменения материала эмбриональных зачатков в процессе развития организма.

ЭМБРИО́Н (embryon; греч. «утробный плод, зародыш») — см. *Зародыш*.

ЭМБРИОНА́ЛЬНОЕ РАЗВИ́ТИЕ (син.: зародышевое развитие, эмбриогенез) — 1) в эмбриологии — развитие организма от оплодотворения до рождения (или выхода из яйца); 2) в акушерстве — период внутриутробного развития (первые 8 недель), в течение к-рого преобладают процессы формирования основ организации и закладки органов.

ЭМБРИОНА́ЛЬНЫЙ ДИСК — см. *Зародышевый диск*.

ЭМБРИОПАТИ́Я (embryopathia; *эмбрион* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название аномалий развития, возникающих в период эмбрионального развития.

Э. АНОКСЕМИ́ЧЕСКАЯ ВРОЖДЁННАЯ ЛИ́ТТЛА — см. *Литтла болезнь*.

Э. ВИ́РУСНАЯ (e. viralis) — Э., обусловленная вирусным заболеванием матери в первые месяцы беременности.

Э. ДИАБЕТИ́ЧЕСКАЯ (e. diabetica) — Э., обусловленная заболеванием матери сахарным диабетом.

Э. КРАСНУ́ШНАЯ (e. rubeolaris) — Э., обусловленная внутриутробным заражением плода краснухой от матери, болевшей в первые три месяца беременности.

Э. ЛУЧЕВА́Я (e. radialis) — Э., обусловленная воздействием ионизирующего излучения на зародыш или плод в критические периоды его развития.

ЭМБРИОТОКСИ́ЧНОСТЬ (*эмбрион* + *токсичность*) — свойство вещества при попадании в организм матери вызывать гибель или патологические изменения зародыша (плода).

ЭМБРИОТОКСО́Н (embryotoxon; *эмбрион* + греч. toxon лук, дуга) — врожденное помутнение периферических отделов роговицы в форме замкнутого или разорванного кольца, отделенного от лимба узкой полоской прозрачной ткани.

Э. ЗА́ДНИЙ (e. posterius) — Э., расположенный в глубоких слоях роговицы и захватывающий заднюю пограничную пластинку.

Э. ПЕРЕ́ДНИЙ (e. anterius) — Э., расположенный в поверхностных и средних слоях роговицы.

ЭМБРИОТОМИ́Я (embryotomia; *эмбрион* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Операция плодоразрушающая*.

ЭМБРИОТРО́ПНОСТЬ (*эмбрион* + греч. tropos поворот, направление) — свойство вещества оказывать воздействие на эмбрион при попадании в организм матери.

ЭМБРИОЦИТО́МА (embryocytoma; *эмбрион* + гист. cytus клетка + *-ома*) — см. *Тератома*.

ЭМГ — см. *Электромиограмма*.

ЭМИРЯ́ЧЕНИЕ — см. *Мерячение*.

ЭМИ-СКАНИ́РОВАНИЕ — см. *Томография компьютерная*.

ЭМИССА́РИЙ (emissarium; лат. «отводной канал», «отток») — 1) непостоянные небольшие отверстия в костях свода черепа, через к-рые проходят эмиссарные вены; 2) см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1068*.

ЭМИССА́РИЙ МЫЩЕЛКОВЫЙ ПЕРЕ́ДНИЙ (emissarium condyloideum anterius) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1069*.

ЭМИССА́РИЙ ОВА́ЛЬНОГО ОТВЕ́РСТИЯ (emissarium foraminis ovalis) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1071*.

ЭМИССА́РИЙ РВА́НОГО ОТВЕ́РСТИЯ (emissarium foraminis laceri) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1070*.

ЭМИССА́РИЙ САНТОРИ́НИЕВ (emissarium Santorini) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1067*.

ЭММЕТА ИГЛА́ (Th. A. Emmet, 1828—1919, амер. гинеколог) — острая лигатурная игла, предназначенная для проведения лигатуры под кровеносные сосуды сквозь окружающие их ткани.

ЭММЕТА ОПЕРА́ЦИЯ (Th. A. Emmet) — хирургическая операция по поводу рубцов после глубокого разрыва шейки матки, заключающаяся в клиновидном иссечении рубцов с последующим восстановлением нормальной формы шейки и отверстия матки.

ЭММЕТРОПИ́Я (emmetropia; греч. emmetros отмеренный, соразмерный + ōps, ōpos глаз) — см. *Рефракция глаза эмметропическая*.

EMMÓNSIA — род микроорганизмов сем. Moniliaceae (класс несовершенных грибов), характеризующийся образованием цепочек шаровидных конидий; некоторые виды (E. crescens, E. parva и др.) являются возбудителями адиаспиромикоза у человека.

ЭМО́ЦИЯ(-И) (франц. émotion; от лат. emoveo, emotum возбуждать, волновать) — реакция в виде субъективно окрашенного переживания индивида, отражающая значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия (удовлетворение или неудовлетворение).

Э. БИОЛОГИ́ЧЕСКИЕ — Э., связанные с удовлетворением или неудовлетворением физиологических потребностей (голод, жажда, половое влечение и др.).

Э. ВЫСШИЕ — Э., связанные с удовлетворением или неудовлетворением духовных (социальных, нравственных, познавательных, эстетических) потребностей.

Э. ЗАДЕ́РЖАННАЯ — Э., внешние проявления к-рой индивид вынужден подавлять в силу тех или иных причин (обычно социальных); И. П. Павлов считал, что Э. з. могут создавать очаг патологического застойного возбуждения.

Э. ОТРИЦА́ТЕЛЬНАЯ — Э. в виде неприятного переживания неудовлетворения каких-либо потребностей.

Э. ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНАЯ — Э. в виде приятного переживания удовлетворения каких-либо потребностей.

ЭМОЦИОНА́ЛЬНАЯ ПРО́БА в кардиологии — общее название методов оценки реакции сердечно-сосудистой системы на эмоциональное напряжение.

ЭМОЦИОНА́ЛЬНАЯ ТУ́ПОСТЬ — см. *Аффективная тупость*.

ЭМОЦИОНА́ЛЬНОЕ НАПРЯЖЕ́НИЕ (син. нервно-психическое напряжение) в физиологии труда — состояние чрезмерной мобилизации физиологических функций организма (в первую очередь, нервной системы), возникающее в условиях решения трудной задачи или в опасной ситуации.

ЭМПАТИ́Я (empathia; *эм-* + греч. pathos чувство, переживание) — ощущение понимания и сопереживания психологического состояния другого человека.

ЭМПЕРИПОЛЕ́З (emperipolesis; *эм-* + греч. приставка peri- вокруг, снаружи + греч. poleomai бродить, блуждать; син.: миграция лейкоцитов внутриклеточная, эмпериполезис) — активное внедрение одной клетки в другую без повреждения последней, напр. внедрение полиморфно-ядерных лейкоцитов в макрофаги, наблюдаемое в культуре ткани.

ЭМПЕРИПОЛЕ́ЗИС (emperipolesis) — см. *Эмпериполез*.

ЭМПИЕ́МА (empyema; греч. empyēma гнойник, от *эм-* + pyon гной) — значительное скопление гноя в какой-либо полости тела или в полом органе.

ЭМПИЕ́МА АППЕ́НДИКСА (empyema appendicis) — острый гнойный аппендицит со скоплением гноя в значительно расширенной полости червеобразного отростка при непроходимости его отверстия.

ЭМПИЕ́МА ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (empyema vesicae felleae) — острый гнойный холецистит, сопровождающийся скоплением значительного количества гноя в полости желчного пузыря.

ЭМПИЕ́МА МОЧЕТО́ЧНИКА (empyema ureteris) — см. *Гидропиоуретер*.

ЭМПИЕ́МА ПЛЕ́ВРЫ (empyema pleurae) — скопление гнойного экссудата в полости плевры при плеврите.

Э. ПЛЕ́ВРЫ МЕТАПНЕВМОНИ́ЧЕСКАЯ (e. pleurae metapneumonicum; син. Э. плевры постпневмоническая) — Э. п., развившаяся в исходе пневмонии.

Э. ПЛЕ́ВРЫ ОГРАНИ́ЧЕННАЯ (e. pleurae circumscriptum; син. Э. плевры осумкованная) — Э. п., локализованная в какой-либо части плевральной полости, окруженной плевральными сращениями.

Э. ПЛЕ́ВРЫ О́СТРАЯ (e. pleurae acutum) — Э. п., возникшая при остром гнойном плеврите.

Э. ПЛЕ́ВРЫ ОСУМКО́ВАННАЯ — см. *Эмпиема плевры ограниченная*.

Э. ПЛЕ́ВРЫ ПАРАПНЕВМОНИ́ЧЕСКАЯ (e. pleurae parapneumonicum; син. Э. плевры синпневмоническая) — Э. п., возникшая одновременно с развитием пневмонии.

Э. ПЛЕ́ВРЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИО́ННАЯ (e. pleurae postoperativum) — Э. п., возникшая как осложнение хирургической операции на органах грудной полости или верхнего отдела брюшной полости.

Э. ПЛЕ́ВРЫ ПОСТПНЕВМОНИ́ЧЕСКАЯ (e. pleurae postpneumonicum) — см. *Эмпиема плевры метапневмоническая*.

Э. ПЛЕ́ВРЫ СИНПНЕВМОНИ́ЧЕСКАЯ (e. pleurae synpneumonicum) — см. *Эмпиема плевры парапневмоническая*.

Э. ПЛЕ́ВРЫ ТОТА́ЛЬНАЯ (e. pleurae totale) — Э. п., при к-рой гнойный экссудат заполняет всю плевральную полость.

Э. ПЛЕ́ВРЫ ХРОНИ́ЧЕСКАЯ (e. pleurae chronicum) — длительно существующая, чаще ограниченная, Э. п.

ЭМПИЕМЭКТОМИ́Я — см. *Плеврэктомия*.

ЭМПИРИ́ЗМ (греч. empeiria опыт) в медицине — направление, представители к-рого пренебрегали теорией и придерживались неизменных предписаний, основанных на преданиях и собственных наблюдениях за больными; возникло в Греции в III в. до н. э.

ЭМПРОСТОТО́НУС (emprosthotonus; греч. emprosthotonos натянутый вперед) — вынужденное положение тела с согнутым вперед туловищем, обусловленное тетаническим сокращением сгибателей, напр. при тетании или истерии.

ЭМУ́ЛЬСИЯ в фармации (emulsio; лат. emulgeo, emulsum выдаивать) — жидкая лекарственная форма, представляющая собой дисперсную систему из не смешивающихся друг с другом жидкостей.

ЭМФИЗЕ́МА (греч. emphysēma вздутие, от emphysaō вдувать, надувать) — растяжение (вздутие) органа или ткани воздухом, попавшим извне, или газом, образовавшимся в тканях.

Э. МЕДИАСТИНА́ЛЬНАЯ (e. mediastinale) — см. *Пневмомедиастинум*.

Э. ПОДКО́ЖНАЯ (e. subcutaneum) — Э. подкожной клетчатки.

Э. ПОДКО́ЖНАЯ СЕПТИ́ЧЕСКАЯ (e. subcutaneum septicum) — Э. п. пузырьками газа, образовавшимися в результате жизнедеятельности возбудителей анаэробной или гнилостной инфекции.

Э. ПОДКО́ЖНАЯ ТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ (e. subcutaneum traumaticum) — Э. п. при повреждении стенок воздухоносных органов, обусловленная проникновением из них воздуха в окружающую клетчатку.

Э. ПОДКО́ЖНАЯ УНИВЕРСА́ЛЬНАЯ (e. subcutaneum universale; син. Э. тканевая универсальная) — травматическая Э. п., развивающаяся в результате поступления воздуха в клетчатку из поврежденного легкого и распространяющаяся по всей поверхности тела.

Э. СРЕДОСТЕ́НИЯ (e. mediastinale) — см. *Пневмомедиастинум*.

Э. ТКАНЕВА́Я ВЫСО́ТНАЯ — Э. пузырьками азота, углекислого газа, кислорода и водяных паров, образующимися в тканях при атмосферном давлении ниже 47 *мм* рт. ст., т. е. на больших высотах, в результате спонтанного перехода жидких сред организма в газообразное состояние.

Э. ТКАНЕВА́Я УНИВЕРСА́ЛЬНАЯ — см. *Эмфизема подкожная универсальная*.

Э. ТРУ́ПНАЯ (e. cadaverosum) — Э. ткани или органа, возникающая при гнилостном разложении трупа.

ЭМФИЗЕ́МА ЛЁГКИХ (emphysema pulmonum) — патологическое состояние легких, характеризующееся увеличенным содержанием в них воздуха; термин Э. л. часто употребляют также для обозначения патологических состояний легких, характеризующихся расширением воздушных пространств лишь дистальнее конечных бронхиол и сопровождающихся деструктивными изменениями стенок альвеол.

Э. ЛЁГКИХ АЛЬВЕОЛЯ́РНАЯ (e. pulmonum alveolare; син. Э. легких везикулярная) — Э. л., характеризующаяся расширением просвета альвеол.

Э. ЛЁГКИХ АТРОФИ́ЧЕСКАЯ (e. pulmonum atrophicum) — см. *Эмфизема легких старческая.*

Э. ЛЁГКИХ БУЛЛЁЗНАЯ (e. pulmonum bullosum) — морфологический вариант Э. л. с образованием крупных воздушных пузырей в краевых отделах легких.

Э. ЛЁГКИХ ВЕЗИКУЛЯ́РНАЯ (e. pulmonum vesiculare) — см. *Эмфизема легких альвеолярная.*

Э. ЛЁГКИХ ВИКА́РНАЯ (e. pulmonum vicarium; син. Э. легких компенсаторная) — Э. л., развивающаяся при значительном уменьшении объема функционирующей легочной ткани, напр. после удаления одного легкого или массивного поражения легкого каким-либо патологическим процессом.

Э. ЛЁГКИХ ВРОЖДЁННАЯ ДОЛЕВА́Я (e. pulmonum congenitum lobare) — Э. л. в виде расширения одной из долей, обусловленная аномалией развития приводящего бронха и его разветвлений; часто сопровождается сдавлением соседних участков легкого.

Э. ЛЁГКИХ ВРОЖДЁННАЯ ОДНОСТОРО́ННЯЯ (e. pulmonum congenitum uniloculare) — Э. л. в виде повышенной воздушности одного легкого, обусловленной аномалией развития легочной ткани.

Э. ЛЁГКИХ ВТОРИ́ЧНАЯ (e. pulmonum secundarium) — Э. л., возникающая как осложнение хронического бронхита, бронхоэктатической болезни, пневмосклероза и других болезней легких.

Э. ЛЁГКИХ ВТОРИ́ЧНАЯ ДИФФУ́ЗНАЯ (e. pulmonum secundarium diffusum) — Э. л. в. при хроническом бронхите, обусловленная обструкцией мелких ветвей бронхов в обоих легких.

Э. ЛЁГКИХ ВЫСО́ТНАЯ — повышенное содержание воздуха в легочной ткани у альпинистов и жителей высокогорных местностей, развивающееся в результате адаптации к низкому содержанию кислорода во вдыхаемом воздухе.

Э. ЛЁГКИХ ГЕНУИ́ННАЯ (e. pulmonum genuinum) — см. *Эмфизема легких первичная диффузная.*

Э. ЛЁГКИХ ДИФФУ́ЗНАЯ (e. pulmonum diffusum) — Э. л., при которой поражены все отделы легких.

Э. ЛЁГКИХ ИДИОПАТИ́ЧЕСКАЯ (e. pulmonum idiopathicum) — см. *Эмфизема легких первичная диффузная.*

Э. ЛЁГКИХ ИНТЕРСТИЦИА́ЛЬНАЯ (e. pulmonum interstitiale) — см. *Эмфизема легких межуточная.*

Э. ЛЁГКИХ ИРРЕГУЛЯ́РНАЯ (e. pulmonum irregulare)— см. *Эмфизема легких очаговая.*

Э. ЛЁГКИХ КОМПЕНСАТО́РНАЯ (e. pulmonum compensatorium) —см. *Эмфизема легких викарная.*

Э. ЛЁГКИХ ЛОКАЛИЗО́ВАННАЯ (e. pulmonum localisatum) — см. *Эмфизема легких очаговая.*

Э. ЛЁГКИХ МЕЖУ́ТОЧНАЯ (e. pulmonum interstitiale; син. Э. легких интерстициальная) — Э. л., возникающая в результате поступления воздуха в интерстициальную ткань легкого через разрывы стенок альвеол, напр. при сильных кашлевых толчках.

Э. ЛЁГКИХ ОБСТРУКЦИО́ННАЯ (e. pulmonum obstructivum) — вторичная Э. л., обусловленная пониженной проходимостью воздухоносных путей, особенно на выдохе, напр. при обструктивном бронхите (бронхиолите).

Э. ЛЁГКИХ ОКОЛОРУБЦО́ВАЯ (e. pulmonum pericicatricale) — см. *Эмфизема легких очаговая.*

Э. ЛЁГКИХ ОСТРОВКО́ВАЯ (e. pulmonum insulare) — см. *Эмфизема легких очаговая.*

Э. ЛЁГКИХ ОЧАГО́ВАЯ (e. pulmonum focale; син.: Э. легких иррегулярная, Э. легких локализованная, Э. легких околорубцовая, Э. легких островковая, Э. легких перифокальная) — Э. л., при к-рой поражены лишь отдельные участки легочной ткани; обусловлена деструкцией и растяжением стенок альвеол по соседству с участками ателектазов, очагами воспаления или рубцами.

Э. ЛЁГКИХ ПАНАЦИНО́ЗНАЯ (e. pulmonum panacinosum; син. Э. легких панлобулярная) — морфологический вариант Э. л., при к-ром патологические изменения охватывают все отделы ацинусов или долек.

Э. ЛЁГКИХ ПАНЛОБУЛЯ́РНАЯ (e. pulmonum panlobulare) — см. *Эмфизема легких панацинозная.*

Э. ЛЁГКИХ ПАРАСЕПТА́ЛЬНАЯ (e. pulmonum paraseptale; син. Э. легких периацинарная) — морфологический вариант Э. л., при к-ром патологические изменения возникают только в дистальных альвеолах ацинуса, расположенных вблизи от междольковых перегородок или около плевры.

Э. ЛЁГКИХ ПЕРВИ́ЧНАЯ ДИФФУ́ЗНАЯ (e. pulmonum primarium diffusum; син.: Э. легких генуинная, Э. легких идиопатическая, Э. легких эссенциальная) — хроническая неспецифическая болезнь легких неясной этиологии, характеризующаяся развитием диффузной Э. л.; встречается чаще в США и других странах Америки.

Э. ЛЁГКИХ ПЕРИАЦИНА́РНАЯ (e. pulmonum periacinale) — см. *Эмфизема легких парасептальная.*

Э. ЛЁГКИХ ПЕРИФОКА́ЛЬНАЯ (e. pulmonum perifocale) — см. *Эмфизема легких очаговая.*

Э. ЛЁГКИХ СТА́РЧЕСКАЯ (e. pulmonum senile; син. Э. легких атрофическая) — Э. л., возникающая в результате возрастной инволюции легочной ткани.

Э. ЛЁГКИХ ТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ (e. pulmonum traumaticum) — межуточная Э. л., возникшая в результате травмы легкого, напр. баротравмы.

Э. ЛЁГКИХ ЦЕНТРИАЦИНО́ЗНАЯ (e. pulmonum centriacinosum; син. Э. легких центрилобулярная) — морфологический вариант Э. л., при к-ром патологические изменения возникают только в проксимальных отделах ацинуса — в респираторных бронхиолах и прилежащих к ним альвеолах.

Э. ЛЁГКИХ ЦЕНТРИЛОБУЛЯ́РНАЯ (e. pulmonum centrilobulare) — см. *Эмфизема легких центриацинозная.*

Э. ЛЁГКИХ ЭССЕНЦИА́ЛЬНАЯ (e. pulmonum essentiale) — см. *Эмфизема легких первичная диффузная.*

ЭН- (эм-; греч. en-) — приставка, означающая «находящийся внутри, в пределах чего-либо».

ЭНАМЕЛОБЛА́СТ (enameloblastus; анат. enamelum эмаль + греч. blastos росток, зародыш; син.: адамантобласт, амелобласт) — эпителиальная клетка внутреннего слоя зубного органа зародыша; принимает участие в образовании зубной эмали.

ЭНАНТЕ́МА (enanthema; *эн-* + греч. anthēma высыпание, сыпь, от antheō цвести, расцветать) — общее название сыпей на слизистых оболочках.

Э. КОРЕВА́Я (e. morbillicum; син. Форхгеймера признак — нрк) — красная Э. на мягком небе; симптом кори.

ЭНГ — см. *Электронистагмография.*

ЭНГЕЛЬГА́РДТА — СМИРНО́ВОЙ МЕ́ТОД (В. А. Энгельгардт, род. в 1894 г., сов. биохимик) — метод определения содержания холестерина в крови, основанный на его способности (после экстракции хлороформом) давать при реакции с уксусным ангидридом и серной кислотой зеленое окрашивание, интенсивность к-рого оценивают колориметрически.

ЭНГЕЛЬМАННА БОЛЕ́ЗНЬ (G. Engelmann, род. в 1876 г., нем. хирург и ортопед) — см. *Камурати — Энгельманна болезнь.*

ЭНГЕЛЯ ОККУ́ЛЬТНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ (устар.; D. Engel, совр. нем. врач) — см. *Интоксикация туберкулезная хроническая.*

ЭНГЕЛЯ — РЕКЛИНГХА́УЗЕНА БОЛЕ́ЗНЬ (G. Engel, нем. врач 19 в.; F. D. Recklinghausen, 1833—1910, нем. патолог) — см. *Остеодистрофия паратиреоидная.*

ЭНГЛА АППАРА́Т (E. H. Angle, 1855—1930, амер. стоматолог) — см. *Ортодонтическая дуга.*

ЭНГЛА ДУГА́ (E. H. Angle) — см. *Ортодонтическая дуга.*

ЭНГМЕНА — КО́УЛА ВРОЖДЁННЫЙ ДИСКЕРАТО́З (M. F. Engman, 1869—1953, амер. дерматолог; H. N. Cole, совр. амер. дерматолог) — см. *Дискератоз врожденный.*

ЭНГРА́ММА (*эн-* + греч. gramma запись) — общее название структурных и функциональных изменений, возникающих в ц. н. с. при воздействии на организм (гл. обр. на органы чувств) каких-либо раздражителей и сохраняющихся длительное время; рассматривается как материальная основа памяти.

ЭНГХИЛЛА КО́СТНЫЙ ШОВ (Anghill) — остеосинтез с помощью металлических скоб трехгранного сечения.

ЭНД- (эндо-; греч. endō и endon внутри) — составная часть сложных слов, означающая «внутри», «внутренний».

ЭНДАОРТИ́Т (endaortitis; *энд-* + *аорта* + *-ит*) — воспаление внутренней оболочки аорты.

ЭНДАОРТИ́Т ПОДО́СТРЫЙ СЕПТИ́ЧЕСКИЙ (endaortitis subacuta septica) — форма сепсиса, характеризующаяся развитием эндаортита с изъязвлением внутренней оболочки аорты; клинически сходен с подострым септическим эндокардитом, отличаясь от него отсутствием признаков поражения клапанов сердца.

ЭНДАРТЕРИ́ИТ (endarteriitis, *энд-* + *артерия* + *-ит*) — воспаление внутренней оболочки артерии, проявляющееся ее разрастанием и сужением просвета артерии, тромбозом и нарушениями кровоснабжения соответствующих органов или частей тела.

ЭНДАРТЕРИ́ИТ ГЕ́ЙБНЕРОВСКИЙ — см. *Гейбнеровский эндартериит.*

ЭНДАРТЕРИ́ИТ ОБЛИТЕРИ́РУЮЩИЙ (endarteriitis obliterans; син.: артериоз надпочечниковый, Винивартера болезнь, гангрена спонтанная, гангрена ювенильная — устар., тромбангиоз облитерирующий, Фридлендера болезнь)— болезнь, характеризующаяся эндартериитом (чаще на нижних конечностях); проявляется нарушениями периферического кровообращения вплоть до развития ишемического некроза соответствующих участков тела.

ЭНДАРТЕРИ́ИТ ОБЛИТЕРИ́РУЮЩИЙ СИФИЛИТИ́ЧЕСКИЙ (endarteriitis obliterans syphilitica) — проявление висцерального сифилиса в виде эндартериита с преимущественной локализацией в артериях головного мозга.

ЭНДАРТЕРЭКТО́МИЯ (*энд-* + *артерия* + *эктомия*; син. интимэктомия) — хирургическая операция: удаление пораженной атеросклерозом внутренней оболочки артерии для восстановления ее проходимости.

Э. ГА́ЗОВАЯ (e. gaseosa) — Э., при к-рой нагнетают газ между пораженной внутренней оболочкой артерии и неизмененными остальными слоями ее стенки.

ЭНДДИАСТОЛИ́ЧЕСКИЙ ОБЪЁМ (нрк) — см. *Конечно-диастолический объем.*

ЭНДДИАСТОЛИ́ЧЕСКОЕ ДАВЛЕ́НИЕ (нрк) — см. *Конечно-диастолическое давление.*

ЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ (endemicus; *эн-* + греч. dēmos область, страна, народ) — характерный для определенной местности, встречающийся в определенной местности (о заболевании), относящийся к эндемии.

ЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ ОЧА́Г — территория, в пределах к-рой в течение длительного времени отмечаются заболевания людей определенной болезнью, что обусловлено наличием в окружающей среде соответствующих условий.

Э. О. АНТРОПОУРГИ́ЧЕСКИЙ (греч. anthropurgia человеческая деятельность) — Э. о., формирование и существование к-рого связано с деятельностью человека, вызывающей и поддерживающей состояние устойчивости популяций хозяев и переносчиков возбудителей данной болезни.

ЭНДЕМИ́ЧНОСТЬ (греч. endēmos местный, от *эн-* + dēmos область, страна, народ) — свойство отдельных болезней или их групп постоянно существовать в данной местности вследствие наличия определенных социальных и природных условий.

ЭНДЕ́МИЯ (endemia; греч. endēmos местный, от *эн-* + dēmos область, страна, народ) — постоянное наличие в данной местности заболеваемости людей определенной болезнью, обусловленное соответствующими социальными и природными условиями.

Э. ГЕОХИМИ́ЧЕСКАЯ — Э., обусловленная недостатком или избытком некоторых микроэлементов в почве и воде.

ЭНДО СРЕДА́ (S. Endo, 1869—1937, японский бактериолог) — плотная дифференциально-диагностическая питательная среда для выделения патогенных энтеробактерий, содержащая мясопептонный агар, лактозу и насыщенный основной фуксин, обесцвеченный сульфитом натрия.

ЭНДО- — см. *Энд-.*

ЭНДОАЛЛЕРГЕ́Н (*эндо-* + *аллерген*) — см. *Аутоаллерген.*

ЭНДОАЛЛЕРГИ́Я (endoallergia; *эндо-* + *аллергия*) — см. *Аутоаллергия.*

ЭНДОАНЕВРИЗМОРАФИ́Я (endoaneurysmorrhaphia; *эндо-* + *аневризма* + греч. rhaphē шов; син. Матаса операция) — хирургическая операция: ушивание дефекта сосудистой стенки при травматической аневризме, производимое из полости аневризматического мешка.

ЭНДОБОТАЛЛИ́Т (endobotallitis; *эндо-* + *боталлит*) — воспаление стенок аномально функционирующего артериального протока.

ЭНДОБОТАЛЛИ́Т ПОДО́СТРЫЙ СЕПТИ́ЧЕСКИЙ (endobotallitis subacuta septica; син. боталлит подострый септический) — форма сепсиса, характеризующаяся эндоботаллитом с язвенным поражением эндотелия и более глубоких слоев сосудистой стенки; клинически сходен с подострым септическим эндокардитом.

ЭНДОБРОНХИ́Т (*эндо-* + *бронхит*) — см. *Бронхит поверхностный.*

ЭНДОВАСКУЛИ́Т (endovasculitis; *эндо-* + анат. vasculum сосудик + *-ит*) — воспаление внутренней оболочки кровеносного сосуда.

Э. БОРОДА́ВЧАТЫЙ (e. verrucosa)— Э., характеризующийся появлением на внутренней оболочке сосуда мелких образований, состоящих из фибрина с примесью распавшихся эндотелиоцитов.

ЭНДОГЕНЕ́З (endogenesis; *эндо-* + греч. genesis происхождение, развитие) в психиатрии — возникновение психических болезней и динамика их клинических проявлений, обусловленные генетической детерминированностью.

ЭНДОГЕНИ́Я (*эндо-* + греч. genea порождение)— обусловленность процесса в организме (в т. ч. патологического процесса, болезни) внутренними причинами.

ЭНДОГЕ́ННАЯ ВОДА́ — см. *Метаболическая вода.*

ЭНДОГЕ́ННЫЕ ОПИА́ТЫ — группа обнаруженных в ткани мозга пептидов, обладающих аналгезирующим действием и способных конкурировать с морфином и другими опиатами за связывание соответствующих рецепторов; участвуют в патогенезе эндогенных психозов.

ЭНДОГЕ́ННЫЙ (endogenus; греч. endogenēs; *эндо-* + -genēs порождаемый, возникающий) — возникающий, развивающийся в организме вследствие внутренних причин.

ЭНДОГЕНО́ТА (*эндо-* + греч. genos род, происхождение) — фрагмент хромосомы реципиента, гомологичный экзогеноте.

ЭНДОДИОГЕНИ́Я (*эндо-* + греч. dyo два + genea порождение; син. почкование внутреннее) — способ деления у простейших (напр., у токсоплазм), заключающийся в формировании двух дочерних организмов под оболочкой материнской особи.

ЭНДОДОНТИ́Я (endodontia; *энд-* + греч. odus, odontos зуб) — раздел стоматологии, изучающий методы механического и лекарственного воздействия на каналы корней зубов, в т. ч. их пломбирование.

ЭНДОКАПИЛЛЯРИ́Т (endocapillaritis; *эндо-* + *капилляр* + *-ит*) — воспаление эндотелия капилляров, характеризующееся его деструкцией и пролиферацией.

ЭНДОКА́РД (endocardium PNA, BNA, JNA; *эндо-* + греч. kardia сердце) — внутренняя оболочка сердца, выстилающая его полости и образующая створки клапанов.

ЭНДОКАРДИА́ЛЬНАЯ ПОДУ́ШКА (tuber endocardiale atrioventriculare, LNE) — выпячивание эндокарда в атриовентрикулярном канале сердца зародыша; различают дорсальную и вентральную Э. п., при срастании к-рых образуются левое и правое предсердно-желудочковые (атриовентрикулярные) отверстия.

ЭНДОКАРДИ́Т (endocarditis; *эндокард* + *-ит*) — воспаление эндокарда, чаще с поражением клапанов, приводящим к развитию пороков сердца.

Э. АБАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ (e. abacterialis) — общее название Э. небактериальной природы.

Э. БОРОДА́ВЧАТО-Я́ЗВЕННЫЙ (e. verrucoulcerosa; син.: Э. полипозно-язвенный, Э. септический язвенный) — Э., характеризующийся изъязвлением эндокарда клапанов сердца и образованием на них тромботических наложений; наблюдается при сепсисе вследствие внедрения возбудителя инфекции в створку клапана сердца.

Э. БОРОДА́ВЧАТЫЙ (e. verrucosa; син. Э. полипозный) — Э. с образованием на створках клапана сердца мелких наложений фибрина и тромботических масс; наблюдается при ревматизме, нек-рых инфекционных болезнях, интоксикациях, раковой кахексии.

Э. ВАЛЬВУЛЯ́РНЫЙ (e. valvularis) — см. *Эндокардит клапанный.*

Э. ВОЗВРА́ТНО-БОРОДА́ВЧАТЫЙ (e. verrucosa recurrens) — бородавчатый Э., возникающий при обострении ревматизма на фоне рубцового утолщения и сращения створок клапанов сердца.

Э. ВОЛЧА́НОЧНЫЙ (e. luposa; син.: Капоши—Либмана—Сакса синдром, Либмана болезнь, Либмана—Сакса эндокардит) — острый абактериальный бородавчатый Э. при системной красной волчанке.

Э. ВРОЖДЁННЫЙ (e. congenita; син. Э. фетальный) — абактериальный бородавчатый Э., развивающийся во внутриутробном периоде в связи с инфекционным заболеванием матери или токсикозом беременности.

Э. ДИФФУ́ЗНЫЙ (e. diffusa; син.: вальвулит диффузный, Талалаева вальвулит, Э. простой) — Э., характеризующийся диффузным мукоидным набуханием, фибриноидными изменениями соединительной ткани створок клапана сердца и образованием гранулем без повреждения эндотелия и тромботических наложений; наблюдается в начальных стадиях ревматизма.

Э. ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННЫЙ (e. maligna) — см. *Эндокардит язвенный.*

Э. КЛА́ПАННЫЙ (e. valvularis; син. Э. вальвулярный)— Э. с преимущественным поражением клапанов сердца.

ЭНДОКАРДИ́Т ЛЕ́ФФЛЕРА — см. *Кардиомиопатия облитерирующая.*

ЭНДОКАРДИ́Т ЛИ́БМАНА — САКСА — см. *Эндокардит волчаночный.*

Э. НЕКРОТИ́ЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ (e. necrotica ulcerosa) — см. *Эндокардит язвенный.*

Э. ПАРИЕТА́ЛЬНЫЙ (e. parietalis) — см. *Эндокардит пристеночный.*

Э. ПОЛИПО́ЗНО-ЯЗВЕННЫЙ (e. polypoulcerosa) — см. *Эндокардит бородавчато-язвенный.*

Э. ПОЛИПО́ЗНЫЙ (e. polyposa) — см. *Эндокардит бородавчатый.*

Э. ПРИСТЕ́НОЧНЫЙ (e. parietalis; син. Э. париетальный) — Э. с преимущественным поражением эндокарда, выстилающего стенки полостей сердца.

Э. ПРИСТЕ́НОЧНЫЙ АБАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ (e. abacterialis parietalis) — см. *Тромбоэндокардит пристеночный абактериальный.*

Э. ПРОСТО́Й (e. simplex) — см. *Эндокардит диффузный.*

Э. РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ (e. rheumatica) — Э. при ревматизме, характеризующийся распространением воспалительного процесса на соединительную ткань клапанов, что часто приводит к формированию пороков сердца.

Э. СЕПТИ́ЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ (e. septica ulcerosa) — см. *Эндокардит бородавчато-язвенный.*

Э. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (e. traumatica) — Э., возникающий после механического повреждения клапана сердца, напр. при травме грудной клетки и сердца.

Э. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ ХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ (e. traumatica chirurgica) — Э. т., как правило, в виде тромбоэндокардита, возникающий после митральной комиссуротомии; может привести к рестенозу отверстия.

Э. ФЕТА́ЛЬНЫЙ (e. fetalis) — см. *Эндокардит врожденный.*

Э. ФИБРО́ЗНЫЙ (e. fibrosa) — см. *Кардиомиопатия облитерирующая.*

Э. ФИБРОПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (e. fibroplastica) — см. *Кардиомиопатия облитерирующая.*

Э. ХОРДА́ЛЬНЫЙ (e. chordalis) — Э. с поражением сухожильных нитей предсердно-желудочковых клапанов; наблюдается в сочетании с другими формами Э. при ревматизме или сепсисе.

Э. Я́ЗВЕННЫЙ (e. ulcerosa; син.: Э. злокачественный, Э. некротический язвенный) — Э., характеризующийся изъязвлением эндокарда клапанов сердца.

ЭНДОКАРДИ́Т БАКТЕРИА́ЛЬНЫЙ ПОДО́СТРЫЙ (endocarditis bacterialis subacuta) — см. *Эндокардит септический подострый.*

ЭНДОКАРДИ́Т СЕПТИ́ЧЕСКИЙ ЗАТЯЖНО́Й (endocarditis septica lenta) — см. *Эндокардит септический подострый.*

ЭНДОКАРДИ́Т СЕПТИ́ЧЕСКИЙ ПОДО́СТРЫЙ (endocarditis septica subacuta; син.: sepsis lenta, Черногубова болезнь — устар., эндокардит бактериальный подострый, эндокардит септический затяжной) — форма сепсиса, вызываемая зеленящим стрептококком, реже гемолитическим стрептококком или пневмококком; характеризуется развитием бородавчато-язвенного эндокардита, гл. обр. клапана аорты, затяжным тяжелым течением с возникновением эмболий и инфарктов различных органов, очагового гломерулонефрита, спленомегалии, прогрессирующей анемии.

ЭНДОКОЛЬПИ́Т (endocolpitis; *эндо-* + *кольпит*) — см. *Кольпит,*

ЭНДОКРА́Н (*эндо-* + греч. kranion череп) — слепок внутренней поверхности костей черепа.

ЭНДОКРИНО́ЛОГ — врач-специалист, получивший подготовку по вопросам диагностики, профилактики и лечения болезней эндокринной системы.

ЭНДОКРИНОЛО́ГИЯ (*эндо-* + греч. krinō отделять, выделять + logos учение, наука) — область клинической медицины, изучающая строение и функцию органов эндокринной системы и вырабатываемых ею гормонов, а также болезни человека, вызванные нарушением их функций, и разрабатывающая методы диагностики, лечения и профилактики этих болезней.

Э. РАДИАЦИО́ННАЯ — раздел Э., изучающий действие ионизирующего излучения на эндокринную систему и использующий радионуклиды и меченые соединения для ее исследования.

Э. СРАВНИ́ТЕЛЬНАЯ — раздел Э., изучающий морфологические и функциональные особенности эндокринной системы у различных видов животных и человека.

ЭНДОКРИНОПАТИ́Я (устар.; endocrinopathia; *эндо-* + греч. krinō отделять, выделять + pathos страдание, болезнь) — общее название нарушений функции желез внутренней секреции.

ENDOLÍMAX NÁNA — вид простейших сем. Endamoebidae кл. саркодовых; амебы с овальными двух- и четырехядерными цистами, обитающие в просвете кишечника человека, но непатогенные для него.

ЭНДОЛИ́МФА (endolympha; *эндо-* + *лимфа*) — прозрачная, бедная белками жидкость, заключенная внутри перепончатого лабиринта внутреннего уха.

ЭНДОЛИМФАТИ́ЧЕСКИЙ МЕШО́К (saccus endolymphaticus, PNA, BNA; saccus endolymphaceus, JNA) — расширение конца эндолимфатического протока перепончатого лабиринта внутреннего уха, расположенное под твердой мозговой оболочкой на задней поверхности пирамиды височной кости.

ЭНДОЛИМФАТИ́ЧЕСКИЙ ПРОТО́К (ductus endolymphaticus, PNA, BNA; ductus endolymphaceus, JNA) — канал, проходящий от перепончатого лабиринта на заднюю поверхность пирамиды височной кости и образующий там эндолимфатический мешок.

ЭНДОЛИМФАТИ́ЧЕСКОЕ ПРОСТРА́НСТВО (spatium endolymphaticum) — полость перепончатого лабиринта; содержит эндолимфу.

ЭНДОМЕ́ТРИЙ (endometrium, PNA, JNA; tunica mucosa, BNA; *эндо-*+ греч. mētra матка)— слизистая оболочка матки, выстилающая ее полость.

ЭНДОМЕТРИО́З (endometriosis; *эндометрий* + *-оз*; син. гетеротопия эндометриоидная) — появление в различных органах участков ткани, сходных по строению со слизистой оболочкой матки и подвергающихся циклическим изменениям соответственно менструальному циклу (как правило, без десквамации).

Э. ГЕНИТА́ЛЬНЫЙ (e. genitalis) — Э. с поражением только половых органов.

Э. ГЕНИТА́ЛЬНЫЙ ВНУ́ТРЕННИЙ (e. genitalis interna) — см. *Аденомиоз.*

Э. ГЕНИТА́ЛЬНЫЙ НАРУ́ЖНЫЙ (e. genitalis externa) — Э. с поражением маточных труб и (или) яичников, но не тела матки.

Э. СТРОМА́ЛЬНЫЙ (e. stromalis; син. аденомиома) — см. *Саркома эндометриальная.*

Э. ЭКСТРАГЕНИТА́ЛЬНЫЙ (e. extragenitalis) — Э. с поражением различных органов, кроме половых.

ЭНДОМЕТРИ́Т (endometritis; *эндометрий* + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки матки.

Э. АТРОФИ́ЧЕСКИЙ (e. atrophica) — хронический Э., характеризующийся атрофией слизистой оболочки и выраженным гиалинозом кровеносных сосудов; обычно сопровождается гипофункцией яичников.

Э. КАЗЕО́ЗНЫЙ (e. caseosa) — туберкулезный Э. в стадии творожистого распада бугорков, нередко с образованием язв.

Э. О́СТРЫЙ (e. acuta) — Э., характеризующийся повышением температуры тела, недомоганием, болями внизу живота, гнойно-кровянистыми выделениями из матки.

Э. ПОСЛЕРОДОВО́Й (e. puerperalis) — острый Э., возникающий у родильниц как проявление гнойной инфекции через 2—3 дня после родов с осложненным течением.

Э. ПОСТАБО́РТНЫЙ (e. postabortiva) — острый Э., развивающийся после аборта как проявление гнойной инфекции.

Э. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (e. chronica) — Э., характеризующийся нарушением менструального цикла по типу гипоолигоменореи, маточным кровотечением, образованием спаек в полости матки, бесплодием.

ЭНДОМИ́ЗИЙ (endomysium, LNH; *эндо-* + греч. mys мышца) — рыхлая неоформленная соединительная ткань, расположенная в скелетных мышцах в виде прослойки между мышечными волокнами.

ЭНДОМИОКАРДИОСКЛЕРО́З СЕМЕ́ЙНЫЙ (endomyocardiosclerosis familiaris; *эндо-* + *миокардиосклероз*) — см. *Фиброэластоз субэндокардиальный.*

ЭНДОМИОКАРДИ́Т БРУЦЕЛЛЁЗНЫЙ (endomyocarditis brucellosa; *эндо-* + *миокардит*) — сочетание бородавчато-язвенного эндокардита с образованием специфических гранулем в миокарде; развивается при тяжелых формах бруцеллеза.

ЭНДОМИТО́З (*эндо-* + *митоз*) — увеличение числа хромосом при отсутствии деления ядра или клетки.

ЭНДОНЕ́ВРИЙ (endoneurium, LNH; *эндо-* + греч. neuron нерв) — рыхлая неоформленная соединительная ткань в составе нервного ствола, расположенная в виде прослоек между нервными волокнами.

ЭНДОНЕВРО́ЛИЗ (endoneurolysis; *эндо-* + греч. neuron нерв + lysis развязывание, освобождение) — хирургическая операция: иссечение рубца из толщи ствола нерва.

ЭНДОНУКЛЕА́ЗЫ — ферменты класса гидролаз, катализирующие процесс гидролитического расщепления дезоксирибонуклеиновых или рибонуклеиновых кислот в любом участке полинуклеотидной цепи; используются при биохимическом анализе нуклеотидной последовательности и в генной инженерии.

ЭНДОНУКЛЕА́ЗЫ РЕСТРИКЦИО́ННЫЕ — ферменты бактериальной клетки, катализирующие разрывы чужеродной молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты в специфичных для данной Э. р. участках (сайтах); различные Э. р. применяются в генной инженерии для получения фрагментов дезоксирибонуклеиновой кислоты из разных геномов.

ЭНДОПАРАЗИ́Т (*эндо-* + *паразит*; син. паразит внутренний) — паразит, обитающий в полости тела, в ткани или в клетке своего хозяина.

ЭНДОПЕПТИДА́ЗЫ — ферменты, расщепляющие пептидную связь в любой точке пептидной цепи.

ЭНДОПЕРИПНЕВМОЦИСТОГРАФИ́Я (*эндо-* + греч. peri вокруг + pneuma воздух + *цистография*) — рентгенологическое исследование мочевого пузыря после введения газа в его полость и в предпузырное пространство.

ЭНДОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКАЯ СЕТЬ [*эндо-* + (цито) плазма; син.; цитоплазматическая сеть, эндоплазматический ретикулум] — органоид, представляющий собой расположенную в цитоплазме систему канальцев, вакуолей и цистерн, отграниченных мембранами; обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме.

Э. с. АГРАНУЛЯ́РНАЯ (син. Э. с. незернистая) — Э. с., на мембранах к-рой отсутствуют рибосомы; представлена гл. обр. в клетках, синтезирующих липиды и углеводы.

Э. с. ГРАНУЛЯ́РНАЯ (син. Э. с. зернистая) — Э. с., на мембранах к-рой расположены рибосомы; представлена в клетках, синтезирующих белки.

Э. с. ЗЕРНИ́СТАЯ — см. *Эндоплазматическая сеть гранулярная.*

Э. с. НЕЗЕРНИ́СТАЯ — см. *Эндоплазматическая сеть агранулярная.*

ЭНДОПЛАЗМАТИ́ЧЕСКИЙ РЕТИКУЛУМ [*эндо-* + (цито)плазма] — см. *Эндоплазматическая сеть.*

ЭНДОПРОТЕ́З (*эндо-* + *протез*) — протез какого-либо органа, расположенного в глубине тела (напр., сустава), или его отдельных элементов.

Э. БИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ЧЕРВЕНЯ́НСКОГО — см. *Червенянского биологический эндопротез.*

ЭНДОПРОТЕ́З СИВАША́ — см. *Сиваша эндопротез.*

ЭНДОРАДИОЗО́НД (*эндо-* + *радиозонд*) — установка для телеметрического исследования деятельности органов пищеварительного тракта путем регистрации радиоприемным устройством физиологических, физических и химических явлений, воспринимаемых и передаваемых миниатюрным радиопередатчиком (радиокапсулой) при его продвижении по пищеварительному тракту.

ЭНДОРАДИОЗОНДИ́РОВАНИЕ — метод исследования деятельности пищеварительного тракта с помощью эндорадиозонда.

ЭНДОРЕДУПЛИКА́ЦИЯ (*эндо-* + *редупликация*; син. полиплоидия внутриядерная) — форма эндомитоза, при к-рой редупликация хромосом происходит в интерфазе, и митоз не наступает; обнаруживается в том случае, когда после этих явлений наступает нормальный митоз и хромосомы в метафазе имеют вид дипло- или квадрихромосом.

ЭНДОРФИ́НЫ — синтезируемые в организме (гл. обр. в гипофизе) физиологически активные пептиды, способные взаимодействовать с опиатными рецепторами аналогично энкефалинам, отличающиеся от них значительно большим размером молекул; вместе с энкефалинами образуют группу эндогенных опиатов.

ЭНДОСАЛЬПИНГИ́Т (endosalpingitis; *эндо-* + *сальпингит*) — воспаление слизистой оболочки маточной трубы; обычно быстро переходит в сальпингит.

Э. КАТАРА́ЛЬНЫЙ (e. catarrhalis) — Э., характеризующийся гиперсекрецией слизи и слущиванием эпителиальных клеток.

Э. СЕРО́ЗНЫЙ (e. serosa) — Э., характеризующийся скоплением экссудата, содержащего белок (3—8%) и небольшое количество лейкоцитов.

ЭНДОСКО́П (*эндо-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — общее название трубчатых оптических приборов с осветительным устройством, предназначенных для визуального исследования полостей и каналов тела, в к-рые Э. вводят через естественные или искусственные отверстия.

Э. ВОЛОКО́ННЫЙ (син.: зонд волокнистый — устар., фиброскоп, фиброэндоскоп, эндофиброскоп) — гибкий Э., в к-ром для освещения и передачи изображения использован пучок тонких световодов из стекловолокна.

ЭНДОСКОПИ́Я (endoscopia; *эндо-* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — метод визуального исследования полостей и каналов тела при помощи оптических приборов, снабженных осветительным устройством (эндоскопов).

ЭНДОСКОПИ́Я ТЕЛЕВИЗИО́ННАЯ — см. *Телеэндоскопия.*

ЭНДО́СТ (endosteum, LNH; *энд-* + греч. osteon кость) — тонкая соединительнотканная оболочка, выстилающая костномозговую полость.

ЭНДОСТА́ЛЬНЫЕ РАЗРАСТА́НИЯ — множественные очаги остеогенеза в костномозговой полости длинной трубчатой кости; возникают при хроническом остеомиелите в результате метаплазии грануляционной ткани в остеоидную.

ЭНДОСТА́Т (*эндо-* + греч. statos стоящий, установленный) — наконечник гамма-аппарата, вводимый в полость организма, после чего внутрь Э. подается источник излучения.

ЭНДОСТЕТОСКО́П (*эндо-* + *стетоскоп*) — трубка, вводимая в пищевод для аускультации органов грудной клетки.

ЭНДОТЕЛИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧКА (gemma endothelialis, LNH) — зачаток нового сосуда, вырастающий из эндотелия уже существующего сосуда.

ЭНДОТЕЛИА́ЛЬНЫЙ (endothelialis) — относящийся к эндотелию.

ЭНДОТЕ́ЛИЙ (endothelium, LNH; *эндо-* + греч. thēlē сосок) — слой клеток мезодермального происхождения, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца.

ЭНДОТЕЛИО́З (истор.; endotheliosis; *эндотелий* + *-оз*) — совокупность изменений эндотелия кровеносных сосудов при гиперергических реакциях организма в виде набухания, пролиферации, разрыхления и слущивания.

ЭНДОТЕЛИО́МА (endothelioma; *эндотелий* + *-ома*) — злокачественная опухоль, источником к-рой является эндотелий кровеносных или лимфатических сосудов.

ЭНДОТЕЛИО́МА КОСТЕ́Й ДИФФУ́ЗНАЯ (endothelioma ossium diffusum) — см. *Юинга опухоль.*

ЭНДОТЕЛИО́МА САРКОМАТО́ЗНАЯ (endothelioma sarcomatosum) — см. *Мезотелиома злокачественная.*

ЭНДОТЕЛИО́МА СИНОВИА́ЛЬНАЯ (endothelioma synoviale) — см. *Синовиома.*

ЭНДОТЕЛИОЦИ́Т (endotheliocytus, LNH; *эндотелий* + гист. cytus клетка; син. клетка эндотелиальная) — плоская полигональной формы клетка мезенхимного происхождения; Э. сплошным слоем выстилают полости сердца, кровеносные и лимфатические сосуды.

Э. ОКО́НЧАТЫЙ (e. fenestratus, LNH) — Э. капилляров сосудистого клубочка почки, пронизанный многочисленными отверстиями.

ЭНДОТЕНДИ́НИЙ (endotendineum; *эндо-* + анат. tendo, tendinis сухожилие; син. эндотеноний) — рыхлая волокнистая соединительная ткань в составе сухожилий, разделяющая в виде тонких прослоек сухожильные пучки второго порядка.

ЭНДОТЕНО́НИЙ (endotenonium; *эндо-* + греч. tenōn сухожилие) — см. *Эндотендиний.*

ЭНДОТЕРМИ́Я (устар.; *эндо-* + греч. thermē теплота, жар) — см. *Диатермия.*

ЭНДОТОКСИ́НЫ БАКТЕРИА́ЛЬНЫЕ (*эндо-* + *токсин*) — токсические вещества, прочно связанные с клеточными структурами бактерий, освобождающиеся при распаде клеток или их разрушении в результате воздействия физических или химических факторов.

ЭНДОТРОМБОФЛЕБИ́Т (endothrombophlebitis; *эндо-* + *тромб* + греч. phleps, phlebos вена + *-ит*) — воспаление внутренней оболочки вены, сопровождающееся тромбозом.

ЭНДОФИБРОСКО́П — см. *Эндоскоп волоконный.*

ЭНДОФИЛИ́Я (*эндо-* + греч. philia любовь, влечение, склонность) — предпочтение нек-рыми видами кровососущих насекомых пребывания в постройках человека, где у самок происходит переваривание крови и развитие яиц; имеет эпидемиологическое значение.

ЭНДОФЛЕБИ́Т (endophlebitis; *эндо-* + греч. phleps, phlebos вена + *-ит*) — воспаление внутренней оболочки вены.

ЭНДОФЛЕБИ́Т ОБЛИТЕРИ́РУЮЩИЙ ПЕ́ЧЕНИ (endophlebitis obliterans hepatis) — см. *Болезнь веноокклюзионная.*

ЭНДОФЛЕБИ́Т ОБЛИТЕРИ́РУЮЩИЙ ПЕЧЁНОЧНЫХ ВЕН (endophlebitis obliterans venarum hepaticarum) — см. *Киари болезнь.*

ЭНДОФТАЛЬМИ́Т (endophthalmitis; *энд-* + греч. ophthalmos глаз + *-ит*) — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока, при к-ром гной пропитывает стекловидное тело.

ЭНДОФТАЛЬМИ́Т МЕТАСТАТИ́ЧЕСКИЙ (endophthalmitis metastatica; син. офтальмия метастатическая — устар.) — эндофтальмит, вызванный гематогенным заносом возбудителя инфекции из какого-либо очага воспаления в ткани глаза.

ЭНДОЦЕЛО́М (*эндо-* + *целом*) — см. *Целом внутризародышевый.*

ЭНДОЦЕРВИЦИ́Т (endocervicitis; *эндо-* + *цервицит*) — воспаление слизистой оболочки канала шейки матки.

ЭНДОЦИТОБИО́З (*эндо-* + гист. cytus клетка + греч. bios жизнь + *-оз*) — см. *Фагоцитоз незавершенный.*

ЭНДРЮСА ОПЕРА́ЦИЯ (E. Andreus, 1856—1927, амер. хирург) — хирургическая операция при водянке яичка, заключающаяся в выворачивании оболочек яичка без их сшивания.

ЭНДРЮСА ПУСТУЛЁЗНЫЙ БАКТЕРИ́Д (G. C. Andrews, род. в 1891 г., амер. дерматолог) — см. *Бактерид пустулезный.*

ЭНДРЮСА СИНДРО́М (G. C. Andrews, род. в 1891 г., амер. дерматолог)— см. *Бактерид пустулезный.*

ЭНЕРГЕТИ́ЧЕСКАЯ ЦЕ́ННОСТЬ — 1) п и щ е в о г о в е щ е с т в а — количество энергии (в калориях или джоулях), освобождающееся при окислении в организме 1 *г* определенного вида пищевых веществ; 2) п и щ е в о г о п р о д у к т а — количество энергии (в калориях или джоулях), освобождающееся при окислении в организме пищевых веществ, содержащихся в 100 *г* данного пищевого продукта, с учетом их усвояемости; 3) п и щ е в о г о р а ц и о н а — суммарное количество энергии (в калориях или джоулях), освобождающееся при окислении в организме пищевых веществ, входящих в состав определенного пищевого рациона, с учетом их усвояемости.

ЭНЕРГЕТИ́ЧЕСКИЙ БАЛА́НС — соотношение количеств энергии, поступившей в организм (гл. обр. с пищей) и израсходованной организмом (гл. обр. в виде выделения тепла).

ЭНЕ́РГИЯ ИЗЛУЧЕ́НИЯ (греч. energeia деятельность) — энергия частиц или фотонов, входящих в состав данного излучения.

ЭНЕРГО́МЕТР (энергия + греч. metreō измерять, определять) — прибор для измерения суммарного расхода энергии организмом человека или животного по величине его газообмена.

ЭНЕРГО́МЕТР АВТОМАТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Диафферометр.*

ЭНЕРГО́МЕТР СЕРДЕ́ЧНЫЙ (истор; син. Христена энергометр) — манометрический прибор для измерения энергии пульсовых колебаний на определенном участке артерии.

ЭНЕРГОМЕТРИ́Я (энергия + греч. metreō измерять, определять) — совокупность методов определения общего расхода энергии организмом с целью изучения его энергетического обмена.

ЭНЕРГОМЕТРИ́Я СЕ́РДЦА (энергия + греч. metreō измерять, определять) — метод исследования сердечной деятельности путем измерения энергии пульсовых колебаний на определенном участке артерии.

ЭНЕРГОТРА́ТЫ — расход энергии организмом за определенный период времени или на выполнение определенного объема работы; выражаются в калориях или джоулях.

ЭНЗИ́М (*эн-* + греч. zymē дрожжи, закваска) — см. *Фермент.*

ЭНЗИМОЛО́ГИЯ (*энзим* + греч. logos учение, наука) — раздел биохимии, изучающий строение, каталитические свойства ферментов и механизм их действия.

ЭНЗИ́МОПАТИ́Я (enzymopathia; *энзим* + греч. pathos страдание, болезнь; син. ферментопатия) — общее название болезней или патологических состояний, развивающихся вследствие отсутствия или нарушения активности каких-либо ферментов.

Э. АЛИМЕНТА́РНАЯ (e. alimentaria) — Э., развивающаяся при хроническом расстройстве питания, чаще при белковом голодании.

Э. НАСЛЕ́ДСТВЕННАЯ (e. hereditaria) — Э., в основе к-рой лежит генетически обусловленная недостаточность или отсутствие одного или нескольких ферментов.

ЭНЗИМОТЕРАПИ́Я (enzymotherapia; *энзим-* + *терапия*; син. ферментотерапия) — применение ферментов с лечебной целью.

ЭНЗООТИ́ЧЕСКИЙ ОЧА́Г — территория, в пределах к-рой в течение длительного периода выявляются заболевания животных определенной инфекционной болезнью.

ЭНЗООТИ́Я (enzootia; *эн-* + греч. zōon животное) — постоянное наличие в данной местности заболеваний животных определенной инфекционной болезнью.

ЭНКЕФАЛИ́НЫ — синтезируемые в организме физиологически активные пептиды, состоящие из пяти аминокислот и взаимодействующие с опиатными рецепторами ц. н. с., вызывая морфиноподобный эффект; вместе с эндорфинами образуют группу эндогенных опиатов.

ЭНКОПРЕ́З (encopresis; *эн-* + греч. kopros кал + *-оз*; син. недержание кала) — непроизвольное выделение кала.

ЭННЕБЕ́РА СИМПТО́М (C. Hennebert, 1867—1954, бельг. отоларинголог) — появление нистагма при изменении давления в наружном слуховом проходе или при надавливании на козелок; признак врожденного сифилиса, обусловленный повышенной подвижностью стремени в связи со специфическим периститом.

ЭНОКРАСИ́ТЕЛИ — красящие пигменты, получаемые из винограда и применяемые как пищевые добавки при производстве кондитерских изделий и напитков.

ЭНОСТО́З (enostosis; *эн-* + греч. osteon кость + *-оз*) — заращение костномозговой полости костной тканью.

ЭНОФТА́ЛЬМ (enophthalmus; *эн-* + греч. ophthalmos глаз) — более глубокое, чем в норме, расположение глазного яблока в глазнице, напр. при атрофии ее мягких тканей.

ЭНРОТА СИМПТО́М (E. Enroth, род. в 1879 г., финский офтальмолог; син.: Зенгера симптом, Зенгера — Энрота симптом) — припухлость верхних век в виде подушечек, наблюдаемая при диффузном токсическом зобе.

ЭНТ- (энто-; греч. entos внутри) — составная часть сложных слов, означающая «внутри», «внутренний».

ENTAMOÉBA HÁRTMANI — вид амеб сем. Endamoebidae с четырехядерными цистами, обитающих в просвете кишечника человека и непатогенных для него.

ENTAMOÉBA GINGIVÁLIS — вид амеб сем. Endamoebidae, не образующих цист, обитающих в ротовой полости человека и непатогенных для него.

ENTAMOÉBA HISTOLÝTICA (син. амеба дизентерийная) — вид амеб сем. Endamoebidae, паразитирующих в кишечнике человека в вегетативной и предцистной формах, а инвазируют его в форме четырехядерной цисты; распространен повсеместно, чаще в странах с жарким климатом; встречается у собак, крыс, обезьян; возбудитель амебиаза человека.

ENTAMOÉBA CÓLI — вид амеб сем. Endamoebidae с восьмиядерными цистами, обитающих в просвете кишечника человека и непатогенных для него.

ЭНТЕЛЕ́ХИЯ (греч. entelecheia действительность в полном объеме, от entelēs полный + echō держать, содержать) — активное, целесообразно действующее и самоорганизующееся высшее начало, по представлениям виталистов, присущее живым организмам и определяющее их жизнедеятельность; термин заимствован из учения Аристотеля, где он обозначал более широкое философское понятие.

ЭНТЕР- (энтеро-; греч. entera кишки, кишечник, внутренности) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к кишкам, к кишечнику, к внутренностям».

ЭНТЕРАМИ́Н — см. *Серотонин.*

ЭНТЕРАЛГИ́Я (enteralgia; *энтер-* + греч. algos боль) — боли в области живота.

ЭНТЕРИ́Т (enteritis; *энтер-* + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки тонкой кишки.

Э. БРОДИ́ЛЬНЫЙ (e. fermentativa) — Э., обусловленный развитием в тонкой кишке процессов брожения в связи с чрезмерным, преимущественно углеводным питанием при недостаточности белковых продуктов.

Э. ИЗОЛИ́РОВАННЫЙ (e. isolata) — Э., не сопровождающийся гастритом или колитом.

Э. ИНФЕКЦИО́ННЫЙ (e. infectiosa) — общее название Э., вызываемых бактериями, вирусами, паразитическими грибками или простейшими.

Э. КАТАРА́ЛЬНО-ДЕСКВАМАТИ́ВНЫЙ (e. catarrhalis desquamativa) — Э., характеризующийся поверхностным поражением слизистой оболочки по типу катарального воспаления с десквамацией эпителия.

Э. О́СТРЫЙ (e. acuta) — бурно развивающийся Э., проявляющийся болями в животе (преимущественно вокруг пупка), поносами, недомоганием.

Э. СТАФИЛОКО́ККОВЫЙ (e. staphylococcica) — Э., вызываемый стафилококками, чаще золотистым или белым, характеризующийся тяжелым течением с явлениями общей интоксикации.

Э. ТОКСИ́ЧЕСКИЙ (e. toxica) — Э., вызванный воздействием на стенку тонкой кишки токсических веществ экзогенного или эндогенного происхождения.

Э. ХОЛЕ́РНЫЙ (e. choleraica) — Э. при холере, обусловленный воздействием токсина возбудителя холе-

ры на стенку тонкой кишки, характеризующийся частой дефекацией и обильными испражнениями, в тяжелых случаях теряющими каловый характер; приводит к нарушению водно-солевого обмена и является основным клинико-патогенетическим синдромом болезни.

Э. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (e. chronica) — Э., характеризующийся длительным течением и проявляющийся болями и вздутием живота, поносами, явлениями мальабсорбции.

Э. ЯЗВЕННО-НЕКРОТИ́ЧЕСКИЙ (e. ulcerosa necrotica) — Э., характеризующийся глубоким поражением слизистой оболочки с возникновением некроза ее участков и образованием язв.

ЭНТЕРИ́Т НЕКРОТИ́ЧЕСКИЙ КЛОСТРИДИА́ЛЬНЫЙ (enteritis necrotica clostridialis) — инфекционная болезнь из группы клостридиозов, вызываемая Clostridium perfringens типа C и F, характеризующаяся острым некрозом кишечника и проявляющаяся кровавым поносом с развитием колланса.

ЭНТЕРИ́Т РЕГИОНА́РНЫЙ (enteritis regionalis) — разновидность болезни Крона, при к-рой патологический процесс локализуется в тонкой кишке.

ЭНТЕРО- — см. *Энтер-*.

ЭНТЕРОАНАСТОМО́З (enteroanastomosis; *энтеро-* + *анастомоз*) — соустье какого-либо полого органа с тонкой кишкой.

ЭНТЕРОБИО́З (enterobiosis; син. оксиуроз) — гельминтоз из группы кишечных нематодозов, вызываемый острицей (Enterobius vermicularis); проявляется перианальным зудом и диспептическими явлениями; встречается повсеместно.

ЭНТЕРОБИОПСИ́Я (*энтеро-* + *биопсия*) — биопсия стенки тонкой кишки.

ENTERÓBIUS VERMICULÁRIS (острица) — вид паразитических нематод сем. Oxyuridae, отр. Rhabditida, паразитирующий в кишечнике человека; самка откладывает яйца на кожу перианальной области; возбудитель энтеробиоза.

ЭНТЕРОВИ́РУСЫ (Enterovirus; *энтеро-* + *вирусы*; син. вирусы кишечные) — род вирусов сем. пикорнавирусов, вирионы к-рых не имеют наружной оболочки, геном представлен одноцепочечной линейной нефрагментированной молекулой рибонуклеиновой кислоты; многие представители Э. патогенны для человека.

ЭНТЕРОГАСТРИ́Н (*энтеро-* + греч. gastēr, gastros желудок) — гормон, образующийся в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки и возбуждающий секреторную и моторную деятельность желудка.

ЭНТЕРОГАСТРО́Н (*энтеро-* + греч. gastēr, gastros желудок) — гормон, образующийся в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки при воздействии на нее жирными кислотами и их солями, жирами и нек-рыми другими веществами; тормозит секреторную и моторную деятельность желудка.

ЭНТЕРОГЕПАТИ́ЧЕСКИЙ КРУГОВОРО́Т (*энтеро-* + греч. hēpar, hēpatos печень) — всасывание веществ, выделяемых с желчью (напр., желчных кислот), в кишечнике и поступление их в печень с последующим повторным выделением с желчью и всасыванием в кишечнике.

ЭНТЕРОДУОДЕНОСТОМИ́Я (enteroduodenostomia; *энтеро-* + анат. duodenum двенадцатиперстная кишка + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между двенадцатиперстной и тонкой кишкой.

ЭНТЕРОКИСТО́МА (enterocystoma; *энтеро-* + *кистома*; син.: киста желточного протока, энтероцистома) — киста в брюшной полости, чаще в области илеоцекального угла, образующаяся из эмбрионального желточного протока и характеризующаяся наличием элементов кишечной стенки.

ЭНТЕРОКО́КК (*энтеро-* + *кокки*) — см. *Стрептококк фекальный*.

ЭНТЕРОКОЛИ́Т (enterocolitis; *энтерит* + *колит*) — воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой кишки.

Э. ГНОЙНЫЙ (e. purulenta) — Э., характеризующийся тяжелым течением с гнойной инфильтрацией кишечной стенки и проявляющийся поносом с выделением слизи и гноя.

Э. ГРАНУЛЯ́РНЫЙ (e. granulosa) — Э., характеризующийся образованием гранулем в кишечной стенке.

Э. ИНФЕКЦИО́ННЫЙ (e. infectiosa) — общее название Э., обусловленных воздействием на слизистую оболочку возбудителей инфекционных болезней или их токсинов.

Э. О́СТРЫЙ (e. acuta) — бурно развивающийся Э., проявляющийся болями в животе, поносом, иногда повышением температуры тела.

Э. ПАРАЗИТА́РНЫЙ (e. parasitaria) — общее название Э. при паразитарных болезнях, характеризующихся, как правило, затяжным течением.

Э. ПСЕВДОМЕМБРАНО́ЗНЫЙ (e. pseudomembranosa) — Э., характеризующийся выделением с калом пленчатых образований, состоящих гл. обр. из слизи и фибрина.

Э. СТАФИЛОКО́ККОВЫЙ (e. staphylococcica) — острый Э., развивающийся при стафилококковой пищевой токсикоинфекции и характеризующийся явлениями интоксикации.

Э. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (e. tuberculosa) — Э., вызываемый микобактериями туберкулеза, характеризующийся возникновением инфильтратов и язв (преимущественно с поражением лимфатических фолликулов) или опухолевидных образований в илеоцекальной области; проявляется признаками интоксикации и аллергической реакции.

Э. ФЛЕГМОНО́ЗНЫЙ (e. phlegmonosa) — острый диффузный гнойный Э., проявляющийся симптомами острого живота и высокой лихорадкой.

Э. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (e. chronica) — Э., характеризующийся длительным течением, спастическими болями в животе, поносами, признаками белковой недостаточности и гиповитаминозов.

ЭНТЕРОЛИ́Т (enterolithus; *энтеро-* + греч. lithos камень) — см. *Конкремент кишечный*.

ЭНТЕРОЛО́ГИЯ (enterologia; *энтеро-* + греч. logos учение, наука) — раздел гастроэнтерологии, посвященный болезням кишечника.

ЭНТЕРОПАТИ́Я (enteropathia; *энтеро-* + греч. pathos страдание, болезнь) — общее название болезней кишечника.

ЭНТЕРОПАТИ́Я ГЛЮТЕ́НОВАЯ (enteropathia glutenica) — см. *Болезнь глютеновая*.

ЭНТЕРОПАТИ́Я ЭКССУДАТИ́ВНАЯ (enteropathia exsudativa) — сочетание диспептических расстройств с гипопротеинемией, онкотическими отеками, общим истощением; синдром наблюдается при болезнях и состояниях (в т. ч. наследственных), характеризующихся потерей белков плазмы крови через кишечную стенку.

ЭНТЕРОПЛИКА́ЦИЯ (истор.; enteroplicatio; *энтеро-* + лат. plica складка) — хирургическая операция: наложение гофрирующих швов на брыжейку тонкой кишки с целью уменьшения ее подвижности.

ЭНТЕРОПРОКТОСТОМИ́Я (enteroproctostomia; *энтеро-* + греч. proktos задний проход + stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между тонкой и прямой кишкой.

ЭНТЕРОРАФИ́Я (enterorrhaphia; *энтеро-* + греч. rhaphē шов) — ушивание раны кишки.

ЭНТЕРОСКО́П (истор.; *энтеро-* + греч. skopeō рассматривать) — приспособление в виде круглого или овального зеркала для осмотра тонкой кишки при хирургической операции.

ЭНТЕРОСКОПИ́Я (*энтеро-* + греч. skopeō рассматривать) — см. *Интестиноскопия*.

ЭНТЕРОСПА́ЗМ (enterospasmus; *энтеро-* + греч. spasmos спазм) — спастическое сокращение тонкой кишки; разновидность дискинезии кишечника.

ЭНТЕРОСТОМИ́Я (enterostomia; *энтеро-* + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение наружного свища на тощую или подвздошную кишку.

Э. ПО А́ЛЬБЕРТУ — см. *Альберта энтеростомия*.

Э. ПОДВЕСНА́Я — Э. путем подшивания к кишке введенного в ее просвет дренажа, наружный конец к-рого удерживается на поверхности кожи резиновой манжеткой.

Э. ПО РИЧАРДСОНУ — см. *Ричардсона энтеростомия*.

Э. ПО РО́БСОНУ — см. *Мейо-Робсона операция*.

ЭНТЕРОТОКСИ́Н (*энтеро-* + *токсин*) — общее название экзотоксинов, продуцируемых нек-рыми видами бактерий (стафилококков, клостридий, эшерихий, шигелл) при их паразитировании в кишечнике.

ЭНТЕРОТОКСИ́Н ХОЛЕ́РНЫЙ — см. *Холероген*.

ЭНТЕРОТО́М (*энтеро-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургический инструмент для наложения кишечного анастомоза по типу «бок в бок» с вскрытием просвета кишки лишь после наложения швов; представляет собой комбинацию зажима и ножа.

ЭНТЕРОТОМИ́Я (enterotomia; *энтеро-* + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие просвета тонкой кишки.

ЭНТЕРОТРИ́Б (*энтеро-* + греч. tribō тереть, давить; син.: жом раздавливающий, экразер) — хирургический зажим для передавливания полого органа пищеварительного тракта.

ЭНТЕРОХРОМАФФИНО́МА (enterochromaffinoma; *энтеро-* + греч. chrōma цвет, окраска + лат. affinis

сродный, свойственный + *-ома*) — см. *Карциноид.*

ЭНТЕРОХРОМАФФИНОЦИ́ТЫ (*энтеро-* + *хромаффиноцит*) — см. *Аргентаффиноциты кишечные.*

ЭНТЕРОЦИ́НЫ [*энтеро-* + *(бактерио)цины*] — бактериоцины, продуцируемые кишечными бактериями, способные убивать родственные бактерии, не выделяющие аналогичных Э.

ЭНТЕРОЦИСТО́МА (*энтеро-* + *цистома*) — см. *Энтерокистома.*

ЭНТЕРОЦИ́Т (enterocytus; *энтеро-* + гист. cytus клетка; син. клетка кишечная) — общее название нек-рых видов клеток эпителия кишечника; обычно служит терминоэлементом составных номенклатурных терминов.

ЭНТЕРОЦИ́Т АЦИДОФИ́ЛЬНЫЙ — см. *Энтероцит с ацидофильными гранулами.*

ЭНТЕРОЦИ́Т С АЦИДОФИ́ЛЬНЫМИ ГРА́НУЛАМИ (enterocytus cum granulis acidophilicis, LNH; син.: клетка апикально-зернистая, Панета клетка, энтероцит ацидофильный) — клетка эпителия кишечных крипт, в апикальной части цитоплазмы к-рой имеются ацидофильные гранулы, содержащие ферменты кишечного сока.

ЭНТЕРОЦИ́Т БЕСКАЁМЧАТЫЙ (enterocytus alimbatus, LNH; син. клетка бескаемчатая) — малодифференцированная клетка эпителия кишечных крипт (гл. обр. у их основания), лишенная каемки и обладающая высокой митотической активностью.

ЭНТЕРОЦИ́Т БОКАЛОВИ́ДНЫЙ (enterocytus caliciformis, LNH) — бокаловидная клетка эпителия кишки.

ЭНТЕРОЦИ́Т КАЁМЧАТЫЙ (enterocytus limbatus) — см. *Эпителиоцит кишечный с исчерченной каемкой.*

ЭНТЕРОЭНТЕРОАНАСТОМО́З (*энтеро-* + *энтеро-* + *анастомоз*) — анастомоз между петлями тонкой кишки.

ЭНТЕРОЭНТЕРОСТОМИ́Я (enteroenterostomia; *энтеро-* + *энтеро-* + греч. stoma отверстие) — хирургическая операция: наложение анастомоза между петлями тонкой кишки.

ЭНТО- — см. *Энт-.*

ЭНТОБЛА́СТ (entoblastus; *энто-* + греч. blastos росток, зародыш) — см. *Энтодерма.*

ЭНТОДЕ́РМА (entoderma; *энто-* + греч. derma кожа; син. энтобласт) — внутренний листок трехслойного зародыша, дающий начало эпителиальной выстилке первичной кишки и ее железистым производным (печени, поджелудочной железе).

Э. ВНЕЗАРО́ДЫШЕВАЯ — см. *Энтодерма желточная.*

Э. ЖЕЛТО́ЧНАЯ (e. extraembryonicum, LNE; син.: гипобласт внезародышевый, Э. внезародышевая) — часть Э., выстилающая полость желточного мешка; у зародыша человека отсутствует.

ЭНТОДЕ́РМА ПЕРВИ́ЧНАЯ (hypoblastus, LNE; син. гипобласт) — внутренний зародышевый листок двухслойного зародыша; у высших позвоночных полностью превращается в собственно энтодерму.

ЭНТОЙКИ́Я (*энт-* + греч. oikos место обитания) — форма симбиоза, при к-рой один организм обитает во внутренней полости тела другого, не причиняя ему вреда, напр. наличие нормальной микрофлоры в кишечнике человека.

ЭНТОКОНИ́Д (entoconidum; *энто-* + греч. kōnos конус + -eidēs подобный) — основной бугорок на язычной части коронки нижних коренных зубов человека.

ЭНТОМЕЗЕНХИ́МА (*энто-* + *мезенхима*) — мезенхима, возникающая из мезодермы за счет разрыхления дерматомов, склеротомов, париетального и висцерального листков спланхнотомов; у позвоночных Э. составляет основную часть мезенхимы.

ЭНТОМО́З (греч. entomon насекомое + *-оз*) — см. *Миаз.*

ЭНТОМОЛО́ГИЯ (греч. entomon насекомое + logos учение, наука) — раздел зоологии, изучающий насекомых.

ЭНТОМОЛО́ГИЯ МЕДИЦИ́НСКАЯ — раздел медицинской паразитологии, изучающий членистоногих, являющихся переносчиками инфекционных паразитарных болезней человека или возбудителями нек-рых болезней (миазов, чесотки и др.).

ЭНТОМОЛО́ГИЯ СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКАЯ — раздел судебной медицины, изучающий особенности развития насекомых на трупе и характер вызываемых ими повреждений.

ЭНТОПТИ́ЧЕСКИЙ ФЕНО́МЕН (*энт-* + греч. optikos относящийся к зрению) — зрительное восприятие фиксированных или перемещающихся светлых или темных пятен (фигур), обусловленное наличием непрозрачных или полупрозрачных объектов в оптических средах глаза, напр. мелких помутнений стекловидного тела или роговицы.

ЭНТОРИНА́ЛЬНАЯ О́БЛАСТЬ (regio entorhinalis; *энто-* + греч. rhis, rhinos нос) — участок промежуточной старой коры, выделяемый в соответствии с цитоархитектоникой коры большого мозга; занимает бо́льшую часть парагиппокампальной извилины.

ЭНТРО́ПИОН (entropium; греч. entrepō вращать внутрь, заворачивать; *эн-* + tropos поворот, направление) — см. *Заворот века.*

ЭНУКЛЕА́ЦИЯ (enucleatio; лат. enucleo, enucleatum извлекать ядро, вылущивать; син. вылущение) — 1) хирургическая операция: полное удаление анатомического или патологического образования, имеющего капсулу; 2) удаление клеточного ядра из клетки.

ЭНУКЛЕА́ЦИЯ ГЛА́ЗА (enucleatio oculi) — хирургическая операция: удаление глазного яблока с пересечением наружных мышц глаза и зрительного нерва, причем конъюнктиву сохраняют для последующего протезирования.

ЭНУРЕ́З (enuresis; греч. enureō мочиться) — см. *Недержание мочи ночное.*

ЭНУРЕ́З ЭПИЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ (enuresis epileptica) — см. *Припадок эпилептический энуретический.*

ЭНХОНДРО́З (enchondrosis; *эн-* + греч. chondros хрящ + *-оз*) — образование островков гиалинового хряща внутри костной ткани, в норме не содержащей хряща.

ЭНХОНДРО́МА (enchondroma; *эн-* + *хондрома*) — хондрома, расположенная в костномозговой полости.

ЭНЦЕФАЛ- (энцефало-; греч. enkephalos головной мозг) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к головному мозгу».

ЭНЦЕФАЛАСТЕНИ́Я (encephalasthenia; *энцефал-* + *астения*) — см. *Церебрастения.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т (encephalitis; *энцефал-* + *-ит*) — воспаление головного мозга.

Э. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ (e. allergica) — Э., развивающийся как аллергическая, часто аутоаллергическая реакция.

Э. ВТОРИ́ЧНЫЙ (e. secundaria) — Э., возникающий как осложнение какой-либо инфекционной болезни.

Э. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (e. haemorrhagica) — Э., характеризующийся множественными кровоизлияниями и очагами размягчения в ткани мозга.

Э. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ САЛЬВАРСА́НОВЫЙ — см. *Апоплексия мозга серозная.*

Э. ГЕРПЕТИ́ЧЕСКИЙ (e. herpetica) — Э., возникающий как осложнение герпетической инфекции с поражением ганглиев тройничного, языкоглоточного и блуждающего нервов.

Э. ГРИППО́ЗНЫЙ (e. gripposa) — Э. чаще геморрагический, возникающий как осложнение тяжело протекающего гриппа.

Э. ДИЗЕНТЕРИ́ЙНЫЙ (e. dysenterica) — Э., возникающий как осложнение дизентерии, чаще у детей.

Э. МАЛЯРИ́ЙНЫЙ (e. malarica) — тяжелый Э., развивающийся как осложнение малярии, иногда при первых ее приступах.

Э. ПОДО́СТРЫЙ (e. subacuta) — Э., характеризующийся постепенным нарастанием симптомов и нерезко выраженной температурной реакцией; развивается гл. обр. при ревматизме, туберкулезе или сифилисе.

Э. ПОСТВАКЦИНА́ЛЬНЫЙ (e. postvaccinalis; син.: энцефаломиелит поствакцинальный, энцефалопатия поствакцинальная) — аллергический Э., иногда возникающий после вакцинации против бешенства, клещевого энцефалита (раньше — против оспы).

Э. РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ (e. rheumatica) — подострый Э. при ревматизме, сопровождающийся характерными изменениями в стенках сосудов мозга; проявляется чаще малой хореей.

Э. СЫВОРОТО́ЧНЫЙ (e. serosa) — аллергический Э., развившийся после введения сыворотки.

Э. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (e. traumatica) — Э., развивающийся при проникающем ранении черепа, сопровождающемся повреждением вещества мозга.

ЭНЦЕФАЛИ́Т АВСТРАЛИ́ЙСКИЙ (encephalitis australiensis) — см. *Энцефалит долины Муррея.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т АМЕРИКА́НСКИЙ (encephalitis americana) — см. *Энцефалит Сент-Луис.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ВИЛЮ́ЙСКИЙ (encephalitis viluiensis; син. энцефаломиелит вилюйский) — болезнь неясной этиологии, характеризующаяся склонностью к хроническому течению и проявляющаяся лихорадкой с ознобом, головной болью, болью в суставах и мышцах, развитием парезов, параличей, расстройств координации движений и нарушений психики; встречается в Якутской АССР по долине р. Вилюй.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ВИ́РУСНЫЙ КЛЕЩЕВО́Й (encephalitis viralis acarinarum) — общее название природно-очаговых инфекционных болезней, вызываемых нейротропными вирусами из

группы арбовирусов, основным переносчиком и хранителем к-рых являются иксодовые клещи.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ВИ́РУСНЫЙ КОМАРИ́НЫЙ (encephalitis culicum viralis) — общее название природно-очаговых инфекционных болезней, вызываемых нейротропными вирусами, переносимых кровососущими комарами сем. Culicidae.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ВИ́РУСНЫЙ ЛА́НГАТ — инфекционная болезнь из группы вирусных энцефалитов, вызываемая одноименным арбовирусом группы В; по клинической картине напоминает двухволновый весенне-летний менингоэнцефалит; встречается в Малайзии.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ВИ́РУСНЫЙ НЕГИ́ШИ — острая инфекционная болезнь из группы клещевых вирусных энцефалитов, вызываемая одноименным арбовирусом группы В; по клинической картине напоминает двухволновый весенне-летний менингоэнцефалит; встречается в Японии.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ВРОЖДЁННЫЙ ИНТЕРСТИЦИА́ЛЬНЫЙ (encephalitis congenita interstitialis; син.: Вирхова болезнь, Вирхова энцефалит новорожденных) — врожденная энцефалопатия, обусловленная заболеванием матери в первой половине беременности нек-рыми инфекционными болезнями, напр. гриппом, краснухой, эпидемическим паротитом.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ДАЛЬНЕВОСТО́ЧНЫЙ — см. *Энцефалит клещевой весенне-летний.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ДЖАЛАНГА́РСКИЙ — см. *Триходесмотоксикоз.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ДОЛИ́НЫ МУРРЕ́Я (англ. Murray Valley encephalitis; син.: энцефалит австралийский, Х-болезнь австралийская) — острая инфекционная болезнь из группы комариных вирусных лихорадок, вызываемая одноименным арбовирусом группы В; протекает крайне тяжело, характеризуется гипертермией, глубоким помрачением сознания, менингеальными явлениями и эпилептиформными припадками; встречается в Австралии.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ДО́СОНА — см. *Досона энцефалит.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЗА́ПАДНОГО НИ́ЛА — см. *Лихорадка Западного Нила.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т КАЛИФОРНИ́ЙСКИЙ — острая инфекционная болезнь из группы комариных вирусных энцефалитов, вызываемая одноименным арбовирусом супергруппы Буньямвера, переносимая комарами родов Culex и Aedes; встречается в США, гл. обр. у детей до 16 лет.

ЭНЦЕФАЛИ́Т КЛЕЩЕВО́Й ВЕСЕ́ННЕ-ЛЕ́ТНИЙ (encephalitis acarinarum orientalis; син.: энцефалит дальневосточный, энцефалит русский весенне-летний, энцефалит таежный, энцефалит эндемический весенний) — острая вирусная природно-очаговая инфекционная болезнь с трансмиссивным (через иксодовых клещей) или алиментарным (через козье молоко) путем передачи; встречается преимущественно в лесной местности в весенне-летний период; характеризуется вирусемией, лихорадкой и тяжелыми поражениями ц. н. с.

ЭНЦЕФАЛИ́Т КЛЕЩЕВО́Й ПОВАССА́Н (encephalitis acarinarum Powassan) — инфекционная болезнь из группы клещевых вирусных энцефалитов, вызываемая одноименным арбовирусом группы В; по клинической картине сходна с клещевым весенне-летним энцефалитом; встречается в Канаде и США.

ЭНЦЕФАЛИ́Т КЛЕЩЕВО́Й ШОТЛА́НДСКИЙ (син.: вертячка овец вирусная, энцефалит овец шотландский, энцефаломиелит овец шотландский) — инфекционная болезнь из группы клещевых вирусных энцефалитов, вызываемая арбовирусом группы В; характеризуется у человека двухволновой лихорадкой с мозжечковым синдромом в первой фазе болезни и с проявлениями менингоэнцефалита во второй фазе; встречается гл. обр. в Великобритании.

ЭНЦЕФАЛИ́Т КО́ЛЬСКИЙ — малоизученная инфекционная болезнь, характеризующаяся непродолжительной лихорадкой с последующим развитием поражений экстрапирамидной системы и (или) гипоталамического синдрома и, особенно, резких глазодвигательных нарушений; встречается на Кольском полуострове.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЛЕТАРГИ́ЧЕСКИЙ (encephalitis lethargica) — см. *Экономо эпидемический летаргический энцефалит.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЛЕТАРГИ́ЧЕСКИЙ ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ (encephalitis lethargica epidemica) — см. *Экономо эпидемический летаргический энцефалит.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЛОШАДИ́НЫЙ ВЕНЕСУЭ́ЛЬСКИЙ — см. *Энцефаломиелит лошадиный венесуэльский.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЛОШАДИ́НЫЙ ВОСТО́ЧНЫЙ — см. *Энцефаломиелит лошадиный восточный.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЛОШАДИ́НЫЙ ЗА́ПАДНЫЙ — см. *Энцефаломиелит лошадиный западный.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т МЕ́НГО — см. *Менингит Менго.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т МЕ́СТНЫЙ — см. *Триходесмотоксикоз.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т НОВОРОЖДЁННЫХ ВИ́РХОВА — см. *Энцефалит врожденный интерстициальный.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ОВЕ́Ц ШОТЛА́НДСКИЙ — см. *Энцефалит клещевой шотландский.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т О́СТРЫЙ ПЕРВИ́ЧНЫЙ ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКИЙ (encephalitis haemorrhagica primaria acuta) — см. *Менингоэнцефалит геморрагический.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т О́СТРЫЙ ПЕРВИ́ЧНЫЙ ИНФЕКЦИО́ННЫЙ (устар.; encephalitis infectiosa primaria acuta) — см. *Энцефаломиелит острый рассеянный.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ПЕРИАКСИА́ЛЬНЫЙ (encephalitis periaxialis) — см. *Шильдера болезнь.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ПЕРИАКСИА́ЛЬНЫЙ ДИФФУ́ЗНЫЙ (encephalitis periaxialis diffusa) — см. *Шильдера болезнь.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ПЕРИАКСИА́ЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ (encephalitis periaxialis concentrica) — см. *Бало болезнь.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ПЕ́ТТЕ — ДЕ́РИНГА — см. *Петте — Деринга энцефалит.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т РЕ́ДЛИХА — см. *Редлиха — Флатау болезнь.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т РУ́ССКИЙ ВЕСЕ́ННЕ-ЛЕ́ТНИЙ — см. *Энцефалит клещевой весенне-летний.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т СЕНТ-ЛУ́ИС (англ. encephalitis St. Louis; син. энцефалит американский) — острая инфекционная болезнь из группы комариных вирусных энцефалитов, вызываемая арбовирусом антигенной группы В, клинически сходная с японским энцефалитом; встречается в США, Бразилии и на острове Ямайка.

ЭНЦЕФАЛИ́Т СО́ННЫЙ — см. *Экономо эпидемический летаргический энцефалит.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ТАЁЖНЫЙ — см. *Энцефалит клещевой весенне-летний.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ШТРЮ́МПЕЛЛЯ — ЛЕЙХТЕНШТЕ́РНА — см. *Менингоэнцефалит геморрагический.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЭНДЕМИ́ЧЕСКИЙ ВЕСЕ́ННИЙ (encephalitis endemica vernalis) — см. *Энцефалит клещевой весенне-летний.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ (encephalitis epidemica) — см. *Экономо эпидемический летаргический энцефалит.*

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЯПО́НСКИЙ (encephalitis japonica; син. энцефалит японский комариный) — острая инфекционная болезнь из группы комариных вирусных энцефалитов, вызываемая арбовирусом антигенной группы А; характеризуется высокой лихорадкой, интоксикацией, помрачением сознания, психическими расстройствами, признаками поражения среднего мозга, моста и продолговатого мозга; встречается в Восточной Азии и на островах Тихого океана.

ЭНЦЕФАЛИ́Т ЯПО́НСКИЙ КОМАРИ́НЫЙ — см. *Энцефалит японский.*

ЭНЦЕФАЛО- — см. *Энцефал-.*

ЭНЦЕФАЛОГРАФИ́Я (*энцефало-* + греч. graphō писать, изображать) — метод рентгенологического исследования путей циркуляции цереброспинальной жидкости в головном мозге, основанный на их контрастировании введением газа в подпаутинное пространство.

ЭНЦЕФАЛО́З (encephalosis; *энцефал-* + *-оз*) — см. *Энцефалопатия.*

ЭНЦЕФАЛОМАЛЯ́ЦИЯ (encephalomalacia; *энцефало-* + греч. malakia мягкость; син. размягчение мозга) — влажный некроз ткани мозга; наблюдается, напр., при инфаркте мозга, черепно-мозговой травме, нек-рых отравлениях.

ЭНЦЕФАЛОМЕНИНГОЦЕ́ЛЕ (encephalomeningocele; *энцефало-* + анат. meninges мозговые оболочки + греч. kēlē грыжа; син. гидроэнцефаломенингоцеле — прк) — врожденная грыжа головного мозга и его оболочек, содержащая цереброспинальную жидкость; образуется при экзенцефалии.

ЭНЦЕФАЛОМЕТРИ́Я (*энцефало-* + греч. metreō измерять) — совокупность методов измерения количественных параметров головного мозга и его отдельных частей при морфологическом исследовании или при энцефалографии.

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т (encephalomyelitis; *энцефалит* + *миелит*) — сочетанное воспаление головного и спинного мозга.

Э. АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНЫЙ (e. allergica experimentalis) — Э., вызываемый у экспериментальных животных введением под кожу смеси гомогената ткани спинного мозга или выделенного из него основного протеина с полным адъювантом Фрейнда; служит

моделью аллергической реакции замедленного типа, используемой для изучения механизмов демиелинизирующих процессов у человека.

Э. ДЕМИЕЛИНИЗИ́РУЮЩИЙ (e. demyelinisans) — острый Э., в основе к-рого лежит демиелинизирующий процесс; возникает как проявление аутоаллергии, а также как осложнение инфекционной болезни или вакцинации.

Э. ПОСТВАКЦИНА́ЛЬНЫЙ (e. postvaccinalis) — см. *Энцефалит поствакцинальный.*

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т ВИЛЮ́ЙСКИЙ (encephalomyelitis vilujensis) — см. *Энцефалит вилюйский.*

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т ДИССЕМИНИ́РОВАННЫЙ АБОРТИ́ВНЫЙ (encephalomyelitis abortiva disseminata) — см. *Редлиха — Флатау болезнь.*

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т ЛОШАДИ́НЫЙ ВЕНЕСУЭ́ЛЬСКИЙ (син.: лихорадка лошадиная венесуэльская, энцефалит лошадиный венесуэльский) — острая инфекционная болезнь из группы комариных вирусных лихорадок, вызываемая арбовирусом антигенной группы А; у человека обычно протекает с кратковременной лихорадкой, менингеальными явлениями и легким помрачением сознания, иногда в форме тяжелого энцефаломиелита; встречается в экваториальной части Латинской Америки.

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т ЛОШАДИ́НЫЙ ВОСТО́ЧНЫЙ (син. энцефалит лошадиный восточный)— острая инфекционная болезнь из группы комариных вирусных энцефалитов, вызываемая арбовирусом антигенной группы А; характеризуется тяжелым течением с резко выраженными признаками энцефаломиелита и менингеальными явлениями; встречается гл. обр. в США и Канаде.

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т ЛОШАДИ́НЫЙ ЗА́ПАДНЫЙ (син. энцефалит лошадиный западный) — острая инфекционная болезнь из группы комариных вирусных энцефалитов, вызываемая арбовирусом антигенной группы А; у человека протекает с лихорадкой и явлениями менингоэнцефалита, часто бессимптомно; встречается в США и Канаде.

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т ОВЕ́Ц ШОТЛА́НДСКИЙ — см. *Энцефалит клещевой шотландский.*

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИ́Т О́СТРЫЙ РАССЕ́ЯННЫЙ (encephalomyelitis disseminata acuta; син. энцефалит острый первичный инфекционный — устар.) — болезнь инфекционно-аллергической природы, характеризующаяся остро развивающимся диссеминированным поражением головного и спинного мозга.

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛОПАТИ́Я НЕКРОТИЗИ́РУЮЩАЯ ПОДО́СТРАЯ — см. *Ли болезнь.*

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛОПОЛИРАДИКУЛОНЕВРИ́Т (encephalomyelopolyradiculoneuritis; *энцефалит* + *миелит* + *полирадикулоневрит*)—поражение всех отделов нервной системы инфекционной или токсической природы, характеризующееся двигательными и чувствительными нарушениями смешанного (центрального и периферического) характера.

ЭНЦЕ́ФАЛОМИОКАРДИ́Т НОВОРОЖДЁННЫХ (encephalomyocarditis neonatorum; *энцефалит* + *миокардит*) — форма инфекции Коксаки у новорожденных, характеризующаяся бурным развитием симптомов энцефалита или менингоэнцефалита и нарастающими явлениями сердечной недостаточности.

ЭНЦЕФАЛОПАТИ́Я (encephalopathia; *энцефало-* + греч. pathos страдание, болезнь; син.: псевдоэнцефалит, церебропатия, энцефалоз) — общее название болезней головного мозга, характеризующихся его дистрофическими изменениями.

Э. АЗОТЕМИ́ЧЕСКАЯ ПСИХОТИ́ЧЕСКАЯ О́СТРАЯ (e. azotaemica psychotica acuta) — см. *Delirium acutum.*

Э. АНОКСИ́ЧЕСКАЯ (e. anoxica; син. Э. гипоксическая) — Э., возникающая на почве гипоксии, обусловленной расстройствами легочной вентиляции, кровообращения, тканевого обмена, напр., в результате продолжительной артериальной гипотонии при хирургических операциях на сердце и крупных сосудах.

Э. АРТЕРИОСКЛЕРОТИ́ЧЕСКАЯ (e. arteriosclerotica) — дисциркуляторная Э. при диффузном атеросклерозе головного мозга, проявляющаяся очаговыми неврологическими расстройствами и снижением уровня психической деятельности.

Э. БИЛИРУБИ́НОВАЯ (e. bilirubinica) — Э. при тяжелых желтухах, обусловленная токсическим действием желчных пигментов и кислот на клетки базальных ядер головного мозга.

Э. ВЕНО́ЗНАЯ (e. venosa) — дисциркуляторная Э. у лиц пожилого возраста, особенно при явлениях сердечно-легочной недостаточности, обусловленная нарушением венозного оттока от головного мозга.

Э. ВРОЖДЁННАЯ (e. congenita) — общее название Э., обусловленных аномалиями развития головного мозга.

Э. ГИПЕРТОНИ́ЧЕСКАЯ (e. hypertonica)— дисциркуляторная Э. при гипертонической болезни, особенно в злокачественной форме, проявляющаяся пульсирующей головной болью, очаговыми, преимущественно псевдобульбарными, симптомами.

Э. ГИПОГЛИКЕМИ́ЧЕСКАЯ (e. hypoglycaemica) — Э., обусловленная хронической гипогликемией при поражениях поджелудочной железы, гипофиза или надпочечников.

Э. ГИПОКСИ́ЧЕСКАЯ (e. hypoxica) — см. *Энцефалопатия аноксическая.*

Э. ДИАБЕТИ́ЧЕСКАЯ (e. diabetica) — Э. при сахарном диабете, проявляющаяся мигренеподобными головными болями, астеническим синдромом, нередко очаговыми неврологическими симптомами, снижением зрения.

Э. ДИСЦИРКУЛЯТО́РНАЯ (e. dyscirculatoria; син. Э. сосудистая) — Э., обусловленная хроническим нарушением кровоснабжения головного мозга, напр. при атеросклерозе, гипертонической болезни; характеризуется сочетанием общемозговых и очаговых симптомов.

Э. ЛУЧЕВА́Я (e. radialis) — Э., обусловленная воздействием на организм ионизирующего излучения; характеризуется астеническими расстройствами, а при более тяжелом поражении — различными по глубине проявлениями органического психосиндрома.

Э. ПЕЧЁНОЧНАЯ (e. hepatica) — см. *Гепатаргия.*

Э. ПОРТОСИСТЕ́МНАЯ (e. portosystemica) — см. *Гепатаргия.*

Э. ПОСТАНОКСИ́ЧЕСКАЯ (e. postanoxica) — см. *Энцефалопатия реанимационно-обусловленная.*

Э. ПОСТТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ (e. posttraumatica) — см. *Энцефалопатия травматическая.*

Э. РЕАНИМАЦИО́ННО-ОБУСЛО́ВЛЕННАЯ (син. Э. постаноксическая) — аноксическая Э., развившаяся после реанимации; характер и степень поражения головного мозга обусловлены длительностью периода клинической смерти.

Э. СОСУ́ДИСТАЯ (e. vascularis) — см. *Энцефалопатия дисциркуляторная.*

Э. ТОКСИ́ЧЕСКАЯ (e. toxica) — Э., развивающаяся при систематическом воздействии нейротропных веществ.

Э. ТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ (e. traumatica; син. Э. посттравматическая) — Э., развивающаяся как позднее или отдаленное осложнение черепно-мозговой травмы; проявляется гл. обр. астеновегетативным или гипертензивным синдромом, эпилептическими припадками.

Э. ТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ БОКСЁРОВ (син.: деменция боксеров, Мартланда синдром) — Э. т., возникающая у боксеров после многократных черепно-мозговых травм (нокаутов); проявляется органическим психосиндромом в сочетании с неврологическими расстройствами по типу паркинсонизма.

ЭНЦЕФАЛОПАТИ́Я АЛКОГО́ЛЬНАЯ (encephalopathia alcoholica) — общее название болезней из группы метаалкогольных психозов, характеризующихся сочетанием психических расстройств (тяжелый делирий, состояние оглушения, различные проявления органического психосиндрома) с системными нарушениями деятельности внутренних органов и неврологическими расстройствами, нередко доминирующими в клинической картине.

ЭНЦЕФАЛОПАТИ́Я ВЕ́РНИКЕ — см. *Полиоэнцефалит геморрагический.*

ЭНЦЕФАЛОПАТИ́Я ПОСТВАКЦИНА́ЛЬНАЯ (encephalopathia postvaccinalis) — см. *Энцефалит поствакцинальный.*

ЭНЦЕФАЛОСКАНИ́РОВАНИЕ (*энцефало-* + *сканирование;* син. энцефалосканография) — радиоизотопное сканирование головного мозга.

ЭНЦЕФАЛОСКАНОГРАФИ́Я (*энцефало-* + *сканирование* + греч. graphō писать, изображать) — см. *Энцефалосканирование.*

ЭНЦЕФАЛОСЦИНТИГРАФИ́Я (*энцефало-* + *сцинтиграфия*) — см. *Гамма-энцефалография.*

ЭНЦЕФАЛО́ЦЕ́ЛЕ (encephalocele; *энцефало-* + греч. kēlē выбухание, грыжа; син.: гидроцефалоцеле — нрк, гидроэнцефалоцеле — нрк) — черепно-мозговая грыжа, содержащая оболочки и вещество головного мозга, но не включающая его желудочки.

ЭНЦЕФАЛОЦИСТОЦЕ́ЛЕ (encephalocystocele; *энцефало-* + греч. kystis

пузырь, мешок + kēlē выбухание, грыжа; син. гидроэнцефалоцистоцеле — нрк) — черепно-мозговая грыжа, содержащая оболочки и вещество головного мозга, а также часть его расширенного желудочка.

ЭОГ — см. *Электроокулография.*

ЭОЗИ́Н (eosinum; греч. ēōs утренняя заря) — общее название группы соединений трифенилметана, имеющих яркорозовый цвет; используется в качестве красителей, напр., в гистологии и микробиологии.

ЭОЗИНОПЕНИ́Я [eosinopenia; *эозино-(фил)* + греч. penia бедность, недостаток] — пониженное содержание ацидофильных гранулоцитов (эозинофилов) в крови.

ЭОЗИНОФИ́Л (cosinophilus; *эозин* + греч. philos любящий) — см. *Гранулоцит ацидофильный.*

ЭОЗИНОФИЛИ́Я (eosinophilia; *эозин* + греч. philia любовь, склонность) — см. *Лейкоцитоз эозинофильный.*

ЭОЗИНОФИЛИ́Я ЛЁГОЧНАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ (eosinophilia pulmonalis subtropica) — см. *Вайнгартена синдром.*

ЭОЗИНОФИЛИ́Я ЛЕКА́РСТВЕННАЯ (eosinophilia medicamentosa) — эозинофильный лейкоцитоз, развивающийся при применении лекарственных средств белковой природы, напр. антибиотиков, препаратов печени, противостолбнячной сыворотки.

ЭОЗИНОФИЛИ́Я МОНОЦИТА́РНАЯ (eosinophilia monocytica) — см. *Лихорадка моноцитарная эозинофильная.*

ЭОЗИНОФИЛИ́Я ТРОПИ́ЧЕСКАЯ (eosinophilia tropica) — см. *Вайнгартена синдром.*

ЭОЗИНОФИ́ЛЬНЫЕ ТЕЛЬЦА́ — см. *Каунсилмена тельца.*

ЭОЗИНОФИ́ЛЬНЫЙ И́НДЕКС — показатель созревания ацидофильных гранулоцитов (эозинофилов) в костном мозге, представляющий собой отношение числа молодых клеток к числу зрелых.

ЭОЗИНОФИ́ЛЬНЫЙ ТЕСТ С АДРЕНАЛИ́НОМ — метод ориентировочного исследования функционального состояния аденогипофиза и коркового вещества надпочечников, основанный на том, что при нормальном их состоянии содержание ацидофильных гранулоцитов (эозинофилов) в крови через 4 часа после инъекции адреналина уменьшается вдвое.

ЭОЗИНОФИ́ЛЬНЫЙ ТЕСТ МЕ́СТНЫЙ — см. *Тест «кожное окно».*

ЭОНИ́ЗМ [по имени шевалье д'Эона (1728—1810), имевшего обыкновение переодеваться в женскую одежду] — см. *Трансвестизм.*

ЭОП — см. *Электронно-оптический преобразователь.*

ЭП- (эпи-; греч. epi-) — приставка, означающая «расположение над чем-либо, поверх чего-либо, возле или внутри чего-либо», «следование за чем-либо, после чего-либо».

ЭПАНАЛЕПСИ́Я СРЕДИЗЕМНОМО́РСКАЯ (греч. epanalēpsis возвращение, повторение) — см. *Болезнь периодическая.*

ЭПЕ́НДИМА (ependyma, LNH; греч. «верхняя одежда»; от *эп-* + endyma одежда; син.: эпендимный слой, эпителий эпендимальный, эпителий эпендимный) — совокупность клеток нейроглии, выстилающих центральный канал спинного мозга и желудочки мозга.

ЭПЕНДИМАТИ́Т [ependymatitis; *эпендима* (основа ependymat-) + *-ит*; син. эпендимит] — воспаление внутренней оболочки (эпендимы) желудочков головного мозга.

Э. ГНОЙНЫЙ (e. purulenta) — Э., протекающий со скоплением в желудочках головного мозга гнойного экссудата, слущиванием эпендимы и лейкоцитарной инфильтрацией подлежащей ткани мозга.

Э. ГРАНУЛЕМАТО́ЗНЫЙ (e. granulomatosa; син.: Э. гранулярный, Э. зернистый) — продуктивный Э., при к-ром пролиферация клеток эпендимы происходит с образованием гранулем.

Э. ГРАНУЛЯ́РНЫЙ (e. granularis) — см. *Эпендиматит гранулематозный.*

Э. ЗЕРНИ́СТЫЙ (e. granularis) — см. *Эпендиматит гранулематозный.*

Э. МЕНИНГОКО́ККОВЫЙ (e. meningococcica) — острый гнойный Э., возникающий как осложнение менингококкового менингита.

Э. ПРОДУКТИ́ВНЫЙ (e. productiva) — хронический Э., характеризующийся преобладанием пролиферации клеток эпендимы с образованием сращений стенок желудочков мозга и развитием гидроцефалии.

Э. СЕРО́ЗНЫЙ (e. serosa) — острый Э., характеризующийся скоплением в желудочках головного мозга серозного экссудата, трудно отличимого от цереброспинальной жидкости.

Э. ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ (e. tuberculosa) — продуктивный Э., возникающий как осложнение хронического туберкулезного менингита и характеризующийся образованием туберкулезных бугорков.

Э. ФИБРИНО́ЗНЫЙ (e. fibrinosa) — острый Э., характеризующийся обильными отложениями фибрина на некротизированных поверхностях эпендимы.

Э. ЭКССУДАТИ́ВНЫЙ (e. exsudativa) — острый Э., протекающий со скоплением экссудата в желудочках мозга.

ЭПЕНДИМИ́Т (ependymitis; *эпендима* + *-ит*) — см. *Эпендиматит.*

ЭПЕНДИ́МНЫЙ СЛОЙ — см. *Эпендима.*

ЭПЕНДИМОБЛА́СТ (ependymoblastus; *эпендима* + греч. blastos росток, зародыш) — малодифференцированная клетка нейроглии, образующаяся из спонгиобласта и превращающаяся в эпендимоцит.

ЭПЕНДИМОБЛАСТО́МА (ependymoblastoma; *эпендимобласт* + *-ома*; син.: эпендимома атипическая, эпендимома дедифференцированная, эпендимома злокачественная) — злокачественный вариант эпендимомы.

ЭПЕНДИМОГЛИО́МА (ependymoglioma; *эпендима* + *глиома*) — см. *Эпендимома.*

ЭПЕНДИМО́МА (ependymoma; *эпендима* + *-ома*; син.: глиома эпендимальная, нейроэпителиома — устар., эпендимоглиома) — нейроэктодермальная опухоль, развивающаяся из клеток эпендимы; локализуется преимущественно в желудочках головного мозга и в ткани спинного мозга.

ЭПЕНДИМО́МА АТИПИ́ЧЕСКАЯ (ependymoma atypicum) — см. *Эпендимобластома.*

ЭПЕНДИМО́МА ДЕДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННАЯ (ependymoma dedifferentiatum) — см. *Эпендимобластома.*

ЭПЕНДИМО́МА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (ependymoma malignum) — см. *Эпендимобластома.*

ЭПЕНДИМОЦИ́Т (ependymocytus; *эпендима* + гист. cytus клетка; син. клетка эпендимная) — общее название эпителиобразных клеток нейроглии, из к-рых образована эпендима.

ЭПИ- — см. *Эп-.*

ЭПИБЛА́СТ (epiblastus; *эпи-* + греч. blastos росток, зародыш) — см. *Эктодерма первичная.*

ЭПИБОЛИ́Я (греч. epibolē забрасывание или возложение на что-либо) — тип гаструляции, характеризующийся нарастанием материала анимальной части бластулы на вегетативную часть с одновременным погружением последней внутрь гаструлы; наблюдается, напр., у земноводных.

ЭПИГАСТРАЛГИ́Я (epigastralgia; анат. regio epigastrica надчревье + греч. algos боль) — см. *Гастралгия.*

ЭПИГАСТРА́ЛЬНАЯ О́БЛАСТЬ (regio epigastrica) — см. *Надчревье.*

ЭПИГА́СТРИЙ (epigastrium; *эпи-* + греч. gastēr, gastros живот, чрево, желудок) — см. *Надчревье.*

ЭПИГЕНЕ́З (истор.; *эпи-* + греч. genesis происхождение, развитие) — учение, согласно к-рому в процессе зародышевого развития происходит постепенное и последовательное образование органов и частей зародыша из вещества оплодотворенного яйца; противоположен преформизму.

ЭПИГЛОТТИ́Т (epiglottitis; анат. epiglottis надгортанник + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки надгортанника.

ЭПИГНАТИ́Я (epignathia; *эпи-* + греч. gnathos челюсть) — аномалия развития: удвоенная нижняя челюсть.

ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ГЕОГРА́ФИЯ (син.: эпидемиология географическая, эпидемиология ландшафтная) — раздел эпидемиологии, изучающий особенности эпидемического процесса в различных географических условиях.

ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ КА́РТА — топографическая карта местности с нанесенными на нее сведениями о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории, инфекционной заболеваемости, лечебно-профилактических и противоэпидемических учреждениях; предназначена для оценки эпидемической обстановки с целью планирования профилактических мероприятий и разработки конкретных мер борьбы с эпидемическими болезнями.

ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ РАЗВЕ́ДКА (нрк) — см. *Санитарно-эпидемиологическая разведка.*

ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИ́ВНОСТЬ ВАКЦИНА́ЦИИ — количественный показатель, выражаемый отношением величин заболеваемости определенной инфекционной болезнью до и после массовой профилактической иммунизации.

ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ КОНЪЮНКТУ́РНЫЙ ОБЗО́Р — отчетный документ санитарно-эпидемиологической службы, содержащий анализ конкретных материалов, характеризующих заболеваемость населения инфекционными болезнями, а также факторы, влияющие на нее.

ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕ́НИЕ — непрерывное изучение эпидемического состояния населения на определенной территории.

ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ОБСЛЕ́ДОВАНИЕ — комплексный метод изучения эпидемического очага, направленный на установление источника инфекции, факторов и путей ее распространения, а также границ эпидемического очага с целью определения характера и объема мероприятий по его ликвидации.

ЭПИДЕМИОЛО́ГИЯ[1] (*эпидемия* + греч. logos учение, наука) — медицинская наука, изучающая закономерности эпидемического процесса и разрабатывающая методы борьбы с инфекционными болезнями человека.

Э. ВОЕ́ННАЯ — раздел военной медицины и Э., разрабатывающий теорию и практику противоэпидемического обеспечения войск в мирное и военное время.

Э. ГЕОГРАФИ́ЧЕСКАЯ — см. *Эпидемиологическая география.*

Э. ЛАНДША́ФТНАЯ — см. *Эпидемиологическая география.*

ЭПИДЕМИОЛО́ГИЯ[2] — метод изучения закономерностей распространения неинфекционных болезней среди населения, основанный на применении статистических показателей.

ЭПИДЕМИ́ЧЕСКАЯ ВСПЫ́ШКА — категория интенсивности эпидемического процесса, характеризующаяся одновременным возникновением у людей на определенной территории (в определенном коллективе) инфекционных заболеваний, связанных общим источником инфекции или путями ее передачи.

ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ (epidemicus) — относящийся к эпидемии, носящий характер эпидемии (об инфекционной болезни).

ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ ОЧА́Г (син. очаг инфекционной болезни) — место пребывания источника инфекции (больного) и окружающая его территория, в пределах к-рой возможно распространение возбудителей болезни, обусловленное соответствующими механизмами передачи.

ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ ПРОЦЕ́СС — процесс распространения инфекционной болезни в человеческом обществе, заключающийся в формировании цепи эпидемических очагов, последовательно возникающих один из другого.

ЭПИДЕ́МИЯ (epidemia; греч. epidēmia повальная болезнь, от *эпи-* + dēmos область, страна, народ) — категория интенсивности эпидемического процесса, характеризующаяся уровнем заболеваемости определенной инфекционной болезнью, значительно превышающим обычно регистрируемый на данной территории за аналогичный период.

Э. БЫТОВА́Я — см. *Эпидемия контактная.*

Э. ВО́ДНАЯ — Э., при которой распространение возбудителей инфекции происходит через воду.

Э. КОНТА́КТНАЯ (син. Э. бытовая) — Э., при которой распространение возбудителей инфекции осуществляется посредством контактно-бытового пути передачи.

Э. МОЛО́ЧНАЯ — пищевая Э., при к-рой основным фактором распространения возбудителей инфекции является молоко.

Э. ПИЩЕВА́Я — Э., при которой распространение возбудителей инфекции происходит через пищу.

Э. ПРОМЫСЛО́ВАЯ — Э. зооноза, возникающая среди промысловиков (охотников) в границах природных очагов болезни.

ЭПИДЕ́МИЯ ПСИХИ́ЧЕСКАЯ (epidemia psychica) — см. *Психоз коллективный.*

ЭПИДЕ́РМИС (epidermis, LNH; *эпи-* + греч. derma кожа) — поверхностный слой кожи, состоящий из многослойного плоского ороговевающего эпителия.

ЭПИДЕРМОДЕРМИ́Т (epidermodermitis; *эпидермис* + *дерма* + *-ит*) — воспалительный процесс, захватывающий одновременно дерму и эпидермис.

ЭПИДЕРМОДИСПЛАЗИ́Я БОРОДА́ВЧАТАЯ (epidermodysplasia verrucosa; *эпидермис* + *дисплазия*) — см. *Дисплазия эпидермиса бородавчатая.*

ЭПИДЕРМОДИСПЛАЗИ́Я ВЕРРУЦИФО́РМНАЯ (epidermodysplasia verruciformis; *эпидермис* + *дисплазия*) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся появлением на разгибательных поверхностях кистей и стоп, реже на лице множественных сливающихся элементов сыпи, напоминающих плоские бородавки; наблюдается у детей.

ЭПИДЕРМО́ИД (epidermoidum; *эпидермис* + греч. -eidēs подобный) — киста кожи, выстланная многослойным плоским эпителием и заполненная роговыми массами без примеси жира.

ЭПИДЕРМО́ЛИЗ БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ (epidermolysis bullosa congenita; *эпидермис* + греч. lysis распад, разложение; син.: Гольдшейдера болезнь, Кебнера болезнь, пузырчатка врожденная, пузырчатка травматическая) — наследственный дерматоз, характеризующийся образованием на коже пузырей при любой, даже незначительной, травме.

Э. БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ БЕЛОПАПУЛО́ИДНЫЙ (e. bullosa congenita albopapuloidea; син. Пазини белопапулоидный врожденный буллезный эпидермолиз) — форма дистрофического Э. б. в., при к-рой кроме пузырей на коже появляются белесоватые плотные папулы, обусловленные фиброзной гиперплазией соединительной ткани и изменениями эластических волокон.

Э. БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ ДИСТРОФИ́ЧЕСКИЙ (e. bullosa congenita dystrophica) — Э. б. в., при к-ром на месте высыпаний образуются рубцы; сопровождается дистрофическими изменениями внутренних органов.

Э. БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ ГИПЕРПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (e. bullosa congenita hyperplastica) — форма дистрофического Э. б. в., при к-рой на месте пузырей образуются келоидные рубцы с эпидермальными кистами.

Э. БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ ЛЕТА́ЛЬНЫЙ (e. bullosa congenita letalis; син. Херлитца злокачественный врожденный буллезный эпидермолиз) — Э. б. в., при к-ром у новорожденного появляются обширные участки отслойки эпидермиса, а также пузыри на слизистых оболочках; заканчивается гибелью ребенка в первые часы жизни.

Э. БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ ЛЕ́ТНИЙ (e. bullosa congenita aestivalis; син. Вебера — Коккейна синдром) — Э. б. в., при к-ром пузыри образуются на коже кистей и стоп в жаркую погоду.

Э. БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ ПОЛИДИСПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (e. bullosa congenita polydysplastica) — форма дистрофического Э. б. в., характеризующаяся множеством крупных рубцующихся пузырей с геморрагическим содержимым, положительным симптомом Никольского, поражением слизистых оболочек, дистрофией ногтей, волос, зубов, гипергидрозом и эндокринными нарушениями.

Э. БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ ПРОСТО́Й (e. bullosa congenita simplex) — Э. б. в., при к-ром на участках кожи, подвергающихся сдавлению или трению (чаще на конечностях), образуются вялые пузыри, исчезающие бесследно или временно оставляющие после себя очаги гиперпигментации.

Э. БУЛЛЁЗНЫЙ ВРОЖДЁННЫЙ ПЯТНИ́СТЫЙ (e. bullosa congenita maculosa) — Э. б. в., характеризующийся появлением белых пятен на цианотических участках кожи; обычно сочетается с алопецией, микроцефалией и другими аномалиями развития.

ЭПИДЕРМО́ЛИЗ БУЛЛЁЗНЫЙ ПОРФИРИ́ЧЕСКИЙ (epidermolysis bullosa porphyrica) — см. *Порфирия кожи поздняя.*

ЭПИДЕРМО́ЛИЗ НОВОРОЖДЁННЫХ О́СТРЫЙ (epidermolysis neonatorum acuta) — см. *Дерматит эксфолиативный новорожденных.*

ЭПИДЕРМОМИКО́ЗЫ (истор.; epidermomycoses; *эпидермис* + *микоз*) — микозы, при к-рых, как предполагали, возбудители паразитируют только в эпидермисе; к Э. относили эпидермофитии, руброфитию, кандидамикоз кожи и слизистых оболочек, нек-рые плесневые микозы.

ЭПИДЕРМОФИТИ́Д (epidermophytidum; эпидермофития + греч. -eidēs подобный) — элемент аллергической сыпи на коже больного эпидермофитией, не содержащий возбудителя.

ЭПИДЕРМОФИТИ́Я (epidermophytia) — общее название дерматомикозов, вызываемых нек-рыми нитчатыми паразитическими грибками родов Epidermophyton и Trichophyton.

ЭПИДЕРМОФИТИ́Я НОГТЕ́Й (epidermophytia unguium; син. онихомикоз эпидермофитный) — дерматомикоз с поражением ногтевых пластинок, вызываемый паразитическим грибком Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale.

ЭПИДЕРМОФИТИ́Я ПА́ХОВАЯ (epidermophytia inguinalis; син. экзема окаймленная) — дерматомикоз в области пахово-бедренных складок, вызываемый паразитическим грибком Epidermophyton inguinali и характеризующийся острым развитием воспалительных высыпаний неправильных очертаний без периферического валика.

ЭПИДЕРМОФИТИ́Я СТОП (epidermophytia pedum; син. эпидермофитоз) — дерматомикоз, локализующийся на стопах и вызываемый, как правило, паразитическим грибком Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale.

Э. СТОП ДИСГИДРОТИ́ЧЕСКАЯ (e. pedum dyshidrotica) — Э. с., при к-рой возникают преимущественно везикулы, пузыри и эрозии.

Э. СТОП ИНТЕРТРИГИНО́ЗНАЯ (e. pedum intertriginosa) — Э. с., при к-рой наблюдается мацерация кожи, возникновение мелких везикул, трещин и мокнутие в межпальцевых складках.

Э. СТОП О́СТРАЯ (e. pedum acuta) — дисгидротическая или интертригинозная Э. с., протекающая с выраженными явлениями острого воспаления, сопровождающимися аллергическими высыпаниями, повышением температуры тела и недомоганием.

Э. СТОП СКВАМО́ЗНАЯ (e. pedum squamosa)—см. *Эпидермофития стоп сквамозно-гиперкератотическая.*

Э. СТОП СКВАМО́ЗНО-ГИПЕРКЕРАТОТИ́ЧЕСКАЯ (e. pedum squamosa hyperkeratotica; син. Э. стоп сквамозная) — Э. с., при к-рой появляются очаги нерезко выраженного гиперкератоза и шелушения кожи, преимущественно на сводах стоп.

ЭПИДЕРМОФИТО́З (epidermophytosis) — см. *Эпидермофития стоп.*

ЭПИДЕРМОФИ́ТОН (Epidermophyton floccosum) — микроорганизм рода Epidermophyton кл. несовершенных грибов, характеризующийся септированным мицелием и образованием в культуре пучков тупоконечных макроконидий («связки бананов»); возбудитель эпидермофитии, гл. обр. паховой.

ЭПИДЕРМОЦИ́Т БАЗА́ЛЬНЫЙ (epidermocytus basalis, LNH; *эпидермис* + гист. cytus клетка; син. клетка базальная) — малодифференцированная эпителиальная клетка базального слоя эпидермиса, за счет деления к-рой осуществляется его обновление.

ЭПИДЕРМОЦИ́Т БЕ́ЛЫЙ ОТРО́СТЧАТЫЙ (epidermocytus surculatus albus, LNH; син. Лангерганса клетка) — отростчатая клетка базального слоя эпидермиса, снабженная отростками и по форме похожая на меланоцит; предположительно является дегенерирующей формой шиповатого эпидермоцита.

ЭПИДЕРМОЦИ́Т ШИПОВА́ТЫЙ (epidermocytus spinosus, LNH; син.: клетка крылатая, клетка шиповатая) — клетка шиповатого слоя эпидермиса, снабженная протоплазматическими отростками, имеющими вид коротких шипов.

ЭПИДИДИМ- (эпидидимо-; анат. epididymis придаток яичка, от *эпи-* + греч. didymoi яички) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к придатку яичка».

ЭПИДИ́ДИМИС (epididymis; *эпи-* + греч. didymoi яички) — см. *Придаток яичка.*

ЭПИДИДИМИ́Т (epididymitis; *эпидидим-* + *-ит*) — воспаление придатка яичка.

ЭПИДИДИМИ́Т СИМПАТИ́ЧЕСКИЙ (epididymitis sympathica; син. эпидидимит эротический) — набухание придатка яичка, сопровождающееся болью, внезапно наступающее после сильного сексуального возбуждения, не завершившегося половым актом или эякуляцией.

ЭПИДИДИМИ́Т ЭРОТИ́ЧЕСКИЙ (epididymitis erotica) — см. *Эпидидимит симпатический.*

ЭПИДИДИМО- — см. *Эпидидим-.*

ЭПИДИДИМОГРАФИ́Я (*эпидидимо-* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенологическое исследование придатка яичка после введения контрастного вещества в семявыносящий проток посредством его пункции.

Э. КОМБИНИ́РОВАННАЯ — Э., проводимая одновременно с пневмографией мошонки.

ЭПИДИДИМЭКТОМИ́Я (epididymectomia; *эпидидим-* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление придатка яичка.

ЭПИДУРА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО (cavum epidurale, PNA, BNA; cavum extradurale, JNA; *эпи-* + анат. dura mater твердая мозговая оболочка) — пространство между твердой оболочкой спинного мозга и надкостницей позвонков, содержащее соединительную ткань и венозные сплетения.

ЭПИДУРИ́Т (epiduritis; *эпидуральное пространство* + *-ит*; син. пахименингит наружный) — воспаление клетчатки эпидурального пространства; обычно сочетается со спинальным пахименингитом.

Э. ГИПЕРПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ (e. hyperplastica) — хронический Э., характеризующийся образованием массивных рубцов в клетчатке эпидурального пространства и в твердой мозговой оболочке.

Э. ГНО́ЙНЫЙ (e. purulenta) — быстро развивающийся Э. с образованием гнойного экссудата, проявляющийся резкими корешковыми болями в зоне иннервации соответствующих корешков спинномозговых нервов и менингеальными симптомами на фоне высокой лихорадки; иногда возникают признаки сдавления спинного мозга (параличи или парезы конечностей, нарушения функций тазовых органов).

Э. НЕГНО́ЙНЫЙ (e. non purulenta) — Э. с образованием серозного экссудата, протекающий бессимптомно или с преходящими болями в зоне иннервации соответствующих корешков спинномозговых нервов.

Э. ХРОНИ́ЧЕСКИЙ (e. chronica) — медленно текущий Э., проявляющийся болями в позвоночнике и в зоне иннервации соответствующих корешков спинномозговых нервов; наблюдается при туберкулезном менингите и нек-рых других болезнях.

ЭПИДУРОГРАФИ́Я (*эпидуральное пространство* + греч. graphō писать, изображать; син. перидурография) — рентгенологическое исследование эпидурального пространства после введения в него водорастворимого контрастного вещества путем пункции.

ЭПИЗИО- (греч. epision, episeion наружные женские половые органы, лобковая область) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к наружным женским половым органам».

ЭПИЗИОКЛЕ́ЙЗИС НЕПО́ЛНЫЙ (episiocleisis incompleta; *эпизио-* + греч. kleisis закрытие, запирание) — см. *Лабгардта операция.*

ЭПИЗИОРАФИ́Я (episiorrhaphia; *эпизио-* + греч. rhaphē шов) — хирургическая операция: сшивание рассеченной промежности (после эпизиотомии).

ЭПИЗИОТОМИ́Я (episiotomia; *эпизио-* + греч. tomē разрез, рассечение) — акушерская операция: рассечение промежности на 2—3 *см* слева и справа от срединной линии во избежание разрыва во время родов.

ЭПИЗООТИ́ЧЕСКИЙ ПРОЦЕ́СС — процесс распространения инфекционной болезни среди животных, заключающийся в формировании цепи эпизоотических очагов, последовательно возникающих один из другого.

ЭПИЗООТИ́Я (epizootia; *эпи-* + греч. zōon животное) — заболеваемость животных инфекционной болезнью, значительно превышающая обычный уровень заболеваемости ею на данной территории.

ЭПИЗООТОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ОБСЛЕ́ДОВАНИЕ — комплексный метод изучения эпизоотического очага с целью установления источников инфекции, факторов и путей ее передачи, границ очага, а также оценки возможности возникновения связанных с ним заболеваний людей.

ЭПИЗООТОЛО́ГИЯ (*эпизоотия* + греч. logos учение, наука) — область ветеринарии, изучающая закономерности эпизоотического процесса и разрабатывающая меры борьбы с эпизоотиями и профилактики инфекционных болезней животных.

ЭПИКА́НТУС (epicanthus; *эпи-* + греч. kanthos угол глазной щели) — вертикальная кожная складка, прикрывающая медиальный угол глазной щели; имеется у плода, сохраняется у представителей монголоидной и нек-рых групп австралонегроидной расы; сохранение Э. у представителей других рас наследуется по аутосомно-доминантному типу, иногда в сочетании с другими аномалиями развития.

ЭПИКА́РД [lamina visceralis (epicardium), PNA; epicardium, BNA, JNA; *эпи-* + греч. kardia сердце] — наружная серозная оболочка сердца, представляющая собой висцеральную пластинку перикарда.

ЭПИКОНДДИСПЛАЗИ́Я (epicondysplasia; анат. epicondylus надмыщелок + *дисплазия*) — см. *Локоть теннисный.*

ЭПИКОНДИЛИ́Т (epicondylitis; анат. epicondylus надмыщелок + *-ит*) — остит надмыщелка плечевой кости.

Э. ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ (e. traumatica) — см. *Локоть теннисный.*

ЭПИКОНДИЛЯ́РНЫЙ (epicondylaris) — 1) (анат. epicondylus надмыщелок) — относящийся к надмыщелку; 2) (*эпи-* + анат. condylus мыщелок) — расположенный над мыщелком.

ЭПИКРИ́З (epicrisis; греч. epikrisis суждение, решение) — суждение о диагнозе, причинах, патогенезе заболевания и результатах его лечения, производимое после окончания лечения или его определенного этапа и фиксируемое в медицинских учетных документах.

Э. ЭТА́ПНЫЙ — Э., составляемый с целью обеспечения преемственности лечения при переводе больного в другое лечебно-профилактическое учреждение.

ЭПИЛЕПСИ́Я (epilepsia; греч. epilēpsia схватывание, эпилептический припадок, эпилепсия; син. болезнь падучая — устар.) — хроническая болезнь, обусловленная поражением головного мозга, проявляющаяся повторными судорожными или другими припадками и сопровождающаяся разнообразными изменениями личности.

Э. АБДОМИНА́ЛЬНАЯ (e. abdominalis; син. Мура синдром — устар.) —

Э., проявляющаяся преимущественно абдоминальными эпилептическими припадками.
Э. АДВЕРСИ́ВНАЯ (e. adversiva; лат. adversus обращенный куда-либо лицом, передней стороной) — Э., проявляющаяся исключительно или преимущественно адверсивными эпилептическими припадками.
Э. АКУСТИКОГЕ́ННАЯ (e. acusticogena; греч. akustikos слуховой + -genēs порождаемый, возникающий; син.: Э. акустическая, Э. аудиогенная, Э. аудиосенсорная, Э. рефлекторная слуховая) — рефлекторная Э., при к-рой все или бо́льшая часть припадков возникают при воздействии каких-либо звуков, гл. обр. возникающих внезапно.
Э. АКУСТИ́ЧЕСКАЯ (e. acustica) — см. *Эпилепсия акустикогенная.*
Э. АЛКОГО́ЛЬНАЯ (e. alcoholica) — симптоматическая Э., проявляющаяся возникновением больших эпилептических припадков в период похмельного синдрома или алкогольного делирия.
Э. АМИГДАЛО́ИДНАЯ (e. amygdaloidea; анат. corpus amygdaloideum миндалевидное тело) — фокальная Э. при локализации патологического очага в области миндалевидного тела, проявляющаяся гл. обр. мастикаторными эпилептическими припадками.
Э. АУДИОГЕ́ННАЯ (e. audiogena; лат. audio слышать + греч. -genēs порождаемый, возникающий) — см. *Эпилепсия акустикогенная.*
Э. АУДИОСЕНСО́РНАЯ (e. audiosensoria; лат. audio слышать + sensus чувство) — см. *Эпилепсия акустикогенная.*
Э. АУРИКУЛЯ́РНАЯ (истор.; e. auricularis; анат. auricula ушная раковина) — Э., при к-рой возникновение припадков связывали с поражением наружного слухового прохода или попаданием в него инородного тела; ныне не выделяется.
Э. БЕРЕ́МЕННЫХ (истор.; e. gravidarum) — Э., при к-рой возникновение эпилептических припадков связывали с наличием беременности; ныне не выделяется.
Э. БЕССУ́ДОРОЖНАЯ — см. *Эпилепсия психическая.*
Э. БОЛЬША́Я (e. major) — Э., при к-рой возникают только большие эпилептические припадки.
Э. ВЕГЕТАТИ́ВНАЯ (e. vegetativa) — см. *Эпилепсия диэнцефальная.*
Э. ВЗДРА́ГИВАНИЯ — рефлекторная Э., при к-рой припадки возникают после воздействия внезапного сильного и кратковременного раздражителя, вызывающего вздрагивание.
Э. ВИСО́ЧНАЯ (e. temporalis) — фокальная Э. при локализации патологического очага в области крючка парагиппокампальной извилины с одной или с обеих сторон, протекающая в виде различных форм аур, дереализации и деперсонализации, микропсий, макропсий и метаморфопсий, приступов длительного сна, часто в сопровождении вегетативных расстройств и оральных автоматизмов.
Э. ВТОРИ́ЧНАЯ (e. secundaria) — см. *Эпилепсия резидуальная.*
Э. ГЕМИПЛЕГИ́ЧЕСКАЯ (e. hemiplegica) — см. *Гасто синдром.*
Э. ГЕНУИ́ННАЯ (e. genuina; син.: Э. идиопатическая, Э. криптогенная, Э. эссенциальная) — общее название Э. неустановленной этиологии, не связанных с явным органическим поражением головного мозга или выявленным нарушением обмена.
Э. ДЕ́ТСКАЯ (e. infantilis; син. Э. инфантильная) — Э., при к-рой возникают только миоклоноатонические или акинетические эпилептические припадки, часто односторонние; первые припадки наблюдаются у детей в возрасте 2—5 лет; в более старшем возрасте припадки нередко исчезают.
Э. ДЖЕ́КСОНОВСКАЯ — см. *Джексоновская эпилепсия.*
Э. ДИЭНЦЕФА́ЛЬНАЯ (e. diencephalica; син. Э. вегетативная) — Э., проявляющаяся преимущественно или исключительно диэнцефальными эпилептическими припадками.
Э. ДНЕВНА́Я (e. diurna) — Э. с возникновением припадков исключительно в дневное время.
Э. ЗАТЫЛО́ЧНАЯ (e. occipitalis; син. Э. окципитальная) — фокальная Э. при локализации патологического очага в затылочной доле коры большого мозга, проявляющаяся гл. обр. зрительными иллюзорными и галлюцинаторными эпилептическими припадками.
Э. ИДИОПАТИ́ЧЕСКАЯ (e. idiopathica) — см. *Эпилепсия генуинная.*
Э. ИНСУЛЯ́РНАЯ (e. insularis; анат. insula островок) — фокальная Э. при локализации патологического очага в области островка, проявляющаяся гл. обр. абдоминальными, эпигастральными и вкусовыми эпилептическими припадками.
Э. ИНФАНТИ́ЛЬНАЯ (e. infantilis) — см. *Эпилепсия детская.*
Э. КОЖЕ́ВНИКОВСКАЯ — см. *Кожевниковская эпилепсия.*
Э. КОКАИ́НОВАЯ (e. cocainica) — симптоматическая Э. при интоксикации кокаином, проявляющаяся большими эпилептическими припадками.
Э. КОНТИНУА́ЛЬНАЯ (e. continualis; лат. continuus непрерывный, продолжающийся) — см. *Кожевниковская эпилепсия.*
Э. КО́РКОВАЯ — см. *Кожевниковская эпилепсия.*
Э. КРИПТОГЕ́ННАЯ (e. cryptogena; греч. kryptos скрытый, тайный + -genēs порождаемый, возникающий) — см. *Эпилепсия генуинная.*
Э. ЛАРВИ́РОВАННАЯ (e. larvata; лат. larva маска) — см. *Эпилепсия психическая.*
Э. ЛО́БНАЯ (e. frontalis; син. Э. фронтальная) — фокальная Э. при локализации патологического очага в коре премоторной области лобной доли, проявляющаяся адверсивными эпилептическими припадками, клоническими и тоническими судорогами какого-либо участка одной половины тела, сопровождающимися амнезией.
Э. ЛОКА́ЛЬНАЯ (e. localis) — см. *Эпилепсия фокальная.*
Э. МА́ЛАЯ (e. minor) — Э., проявления к-рой исчерпываются возникновением малых эпилептических припадков.
Э. МЕНСТРУА́ЛЬНАЯ (e. menstrualis) — Э., при к-рой эпилептические припадки, преимущественно диэнцефальные, возникают в определенную фазу менструального цикла.
Э. МЕТАБОЛИ́ЧЕСКАЯ (e. metabolica) — Э., обусловленная нарушениями обмена веществ в организме.
Э. МИГРЕНО́ЗНАЯ — Э., при к-рой эпилептические припадки чередуются с приступами мигрени или сочетаются с ними; встречается редко.
Э. МУЗЫКОГЕ́ННАЯ (e. musicogena; музыка + греч. -genēs порождаемый, возникающий; син.: Кричли синдром, музыколепсия) — рефлекторная Э., проявляющаяся преимущественно или исключительно музыкогенными эпилептическими припадками.
Э. МЯ́ГКАЯ (e. mitis) — Э., при к-рой припадки возникают редко, а изменения личности незначительны.
Э. НОЧНА́Я (e. nocturna) — Э., при к-рой большие судорожные припадки возникают преимущественно или исключительно во время ночного сна.
Э. ОВАРИА́ЛЬНАЯ (истор.; e. ovarialis) — Э., при к-рой возникновение припадков связывали с дисфункцией яичников; ныне не выделяется.
Э. ОКЦИПИТА́ЛЬНАЯ (e. occipitalis) — см. *Эпилепсия затылочная.*
Э. ОПЕРКУЛЯ́РНАЯ (e. opercularis; анат. operculum insulae cerebri покрышка островка большого мозга) — фокальная Э. при локализации патологического очага в стенках латеральной борозды полушарий большого мозга и в перииинсулярной области, проявляющаяся эпилептическими припадками слюнотечения, мастикаторными или вкусовыми эпилептическими припадками.
Э. ОРГАНИ́ЧЕСКАЯ (e. organica) — см. *Эпилепсия резидуальная.*
Э. О́СТРАЯ (e. acuta) — симптоматическая Э. в виде больших эпилептических припадков на высоте тяжелой интоксикации, заболевания энцефалитом или менингитом.
Э. ОЧАГО́ВАЯ (e. focalis) — см. *Эпилепсия фокальная.*
Э. ПАРИЕТА́ЛЬНАЯ (e. parietalis; син. Э. теменная) — фокальная Э. при локализации патологического очага в коре теменной доли большого мозга, при к-рой возникают субклинические эпилептические припадки, расстройства схемы тела, тонические или клонические судороги, то локализованные, то переходящие в джексоновский припадок, а также адверсивные и афатические эпилептические припадки.
Э. ПЕРЕДНЕВИСО́ЧНАЯ (e. anteriotemporalis) — височная Э. при локализации патологического очага в передней части височной доли большого мозга, проявляющаяся аффективными эпилептическими припадками и (или) эпилептическими припадками автоматизма в виде жевания или глотания.
Э. ПЕРЕМЕЖА́ЮЩАЯСЯ (e. intermittens) — Э. у новорожденных или грудных детей, проявляющаяся перемежающимися эпилептическими припадками.
Э. ПОДКО́РКОВАЯ (e. subcorticalis; син. Ворсаба — Иценко эпилепсия) — общее название Э., обусловленных поражением базальных ядер головного мозга.
Э. ПО́ЗДНЯЯ (e. tarda) — Э., при к-рой первые припадки возникают

в зрелом возрасте; обычно обусловлена прогрессирующим органическим заболеванием головного мозга.
Э. ПОЛОВО́ГО СОЗРЕВА́НИЯ (e. pubertatis) — Э., при к-рой первые эпилептические припадки возникают в периоде полового созревания.
Э. ПОСТРОЛА́НДОВАЯ (син. Э. постцентральная) — фокальная Э. при локализации патологического очага в постцентральной области коры полушарий большого мозга; проявляется в основном соматосенсорными эпилептическими припадками, обычно сменяющимися генерализованным джексоновским припадком.
Э. ПОСТТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ (e. posttraumatica) — см. *Эпилепсия травматическая.*
Э. ПОСТЦЕНТРА́ЛЬНАЯ (e. postcentralis) — см. *Эпилепсия построландовая.*
Э. ПРЕРОЛА́НДОВАЯ (син. Э. прецентральная) — фокальная Э. при локализации патологического очага в прецентральной области коры полушарий большого мозга, проявляющаяся судорогами одной половины тела, иногда переходящими в генерализованный припадок.
Э. ПРЕЦЕНТРА́ЛЬНАЯ (e. praecentralis) — см. *Эпилепсия прероландовая.*
Э. ПРОБУЖДЕ́НИЯ — Э., при к-рой эпилептические припадки, чаще большие, возникают только вскоре после пробуждения.
Э. ПСИХИ́ЧЕСКАЯ (e. psychica; син.: психоэпилепсия, Э. бессудорожная, Э. ларвированная, Э. скрытая) — Э., проявляющаяся эпилептическим психозом и (или) какими-либо психическими эпилептическими эквивалентами при отсутствии судорожных припадков.
Э. ПСИХОМОТО́РНАЯ (e. psychomotoria) — форма височной Э., проявляющаяся исключительно адверсивными или афатическими эпилептическими припадками.
Э. ПСИХОСЕНСО́РНАЯ (e. psychosensoria) — Э., при к-рой возникают преимущественно или исключительно психосенсорные эпилептические припадки.
Э. РЕЗИДУА́ЛЬНАЯ (e. residualis; син.: Э. вторичная, Э. органическая) — симптоматическая Э., обусловленная поражениями головного мозга, остановившимися в своем развитии преимущественно в раннем детском возрасте, определяющими характер эпилептических припадков, сопутствующих неврологических симптомов и психопатологических расстройств.
Э. РЕФЛЕКТО́РНАЯ (e. reflectoria; син. Э. сенсорная) — общее название форм Э., при к-рых возникают преимущественно рефлекторные эпилептические припадки.
Э. РЕФЛЕКТО́РНАЯ ЗРИ́ТЕЛЬНАЯ (e. reflectoria visualis) — рефлекторная Э., при к-рой все или бо́льшая часть припадков (больших судорожных и абсансов) провоцируются раздражением зрительного анализатора.
Э. РЕФЛЕКТО́РНАЯ СЛУХОВА́Я (e. reflectoria acustica) — см. *Эпилепсия акустикогенная.*
Э. СЕМЕ́ЙНАЯ (e. familiaris) — Э., наблюдающаяся у нескольких членов одной семьи, что обусловлено конституциональным предрасположением к болезни, способствующим развитию соответствующих нарушений обмена веществ или приобретенных поражений головного мозга.
Э. СЕНИ́ЛЬНАЯ (e. senilis) — см. *Эпилепсия старческая.*
Э. СЕНСО́РНАЯ (e. sensoria) — см. *Эпилепсия рефлекторная.*
Э. СИМПТОМАТИ́ЧЕСКАЯ (e. symptomatica) — Э., при к-рой припадки обусловлены инфекционными, токсическими, травматическими или другими органическими поражениями головного мозга.
Э. СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ (e. syphilitica) — симптоматическая Э. при эндартериите мелких сосудов головного мозга или менингоэнцефалите сифилитического происхождения, проявляющаяся большими эпилептическими припадками, иногда до развития status epilepticus, сопровождающимися дисфорией и сумеречным помрачением сознания.
Э. СКРЫ́ТАЯ (e. latens) — см. *Эпилепсия психическая.*
Э. СОСУ́ДИСТАЯ (e. vascularis) — симптоматическая Э. при сосудистых поражениях головного мозга, обусловленных, напр., гипертонической болезнью, тромбангиитом, проявляющаяся большими эпилептическими припадками, обмороками и судорогами.
Э. СТА́РЧЕСКАЯ (e. senilis; син. Э. сенильная) — 1) генуинная Э., возникшая в старческом возрасте; 2) симптоматическая Э. при болезни Альцгеймера или старческом слабоумии.
Э. ТЕЛЕВИЗИО́ННАЯ — рефлекторная Э. с систематическим возникновением эпилептических припадков при просмотре телевизионных передач с близкого расстояния при очень слабом освещении в помещении.
Э. ТЕМЕННА́Я (e. parietalis) — см. *Эпилепсия париетальная.*
Э. ТОКСОПЛАЗМОТИ́ЧЕСКАЯ (e. toxoplasmotica) — симптоматическая Э. при токсоплазмозе; клинические проявления Э. т. определяются локализацией патологических очагов в головном мозге.
Э. ТРАВМАТИ́ЧЕСКАЯ (e. traumatica; син. Э. посттравматическая) — симптоматическая Э., возникающая в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы и проявляющаяся преимущественно фокальными, значительно реже большими эпилептическими припадками.
Э. ТЯЖЕ́ЛАЯ (e. gravis) — Э. с частыми большими эпилептическими припадками (возникающими сериями, иногда переходящими в status epilepticus), эпизодами сумеречного помрачения сознания и быстро развивающимся слабоумием.
Э. У́ТРЕННЯЯ (e. matutiana) — Э., при к-рой эпилептические припадки (преимущественно большие) возникают гл. обр. или исключительно по утрам.
Э. ФОКА́ЛЬНАЯ (e. focalis; син.: Э. локальная, Э. очаговая) — Э., обусловленная наличием патологического очага в некотором ограниченном участке головного мозга, определяющего характер возникающих эпилептических припадков.
Э. ФОТОГЕ́ННАЯ (e. photogena; греч. phōs, phōtos свет + -genēs порождаемый, возникающий) — зрительная рефлекторная Э., при к-рой миоклонические или большие эпилептические припадки возникают под воздействием мелькающего света.
Э. ФРОНТА́ЛЬНАЯ (e. frontalis) — см. *Эпилепсия лобная.*
Э. ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ (e. functionalis) — Э., обусловленная нарушениями функций головного мозга в связи с конституциональными расстройствами обмена веществ, а не с органическим поражением мозга.
Э. ЭССЕНЦИА́ЛЬНАЯ (e. essentialis) — см. *Эпилепсия генуинная.*
Э. Ю́НОШЕСКАЯ (устар.; e. juvenilis) — Э., при к-рой первые эпилептические припадки возникают в возрасте 13—17 лет; ныне не выделяется.

ЭПИЛЕПСИ́Я АЛЛЕРГИ́ЧЕСКАЯ (epilepsia allergica) — эпилептиформный припадок, сопровождающий аллергическую реакцию.

ЭПИЛЕПСИ́Я БРЮШНА́Я (устар.; epilepsia abdominalis) — кишечная колика при стертой форме непроходимости кишечника.

ЭПИЛЕПСИ́Я БУЛЬБА́РНАЯ (истор.; epilepsia bulbaris) — судорожные припадки у экспериментальных животных, вызывавшиеся раздражением продолговатого мозга.

ЭПИЛЕПСИ́Я КАРДИА́ЛЬНАЯ (устар.; epilepsia cardialis) — возникновение больших судорожных припадков при нек-рых болезнях сердца, напр. при синдроме Морганьи — Адамса — Стокса; форма вторичного церебрального криза.

ЭПИЛЕПСИ́Я КАШЛЕВА́Я (нрк) — см. *Беттолепсия.*

ЭПИЛЕПСИ́Я МИОКЛОНИ́ЧЕСКАЯ — см. *Миоклонус-эпилепсия.*

ЭПИЛЕПСИ́Я СПИНА́ЛЬНАЯ (устар.; epilepsia spinalis) — возникновение судорог при поражении спинного мозга.

ЭПИЛЕПСИ́Я ФЕБРИ́ЛЬНАЯ (устар.; epilepsia febrilis) — эпилептиформные припадки у детей, не страдающих Э., возникающие при значительно повышенной температуре тела.

EPILÉPSIA PROCÚRSIVA (лат. procurro, procursum выбегать вперед, спешить) — эпилепсия, проявляющаяся исключительно прокурсивными эпилептическими припадками.

EPILÉPSIA ROTATÓRIA (лат. rotatorius вращательный) — эпилептический припадок с аурой, проявляющейся вращением больного на одном месте.

ЭПИЛЕПТИФО́РМНЫЙ (epileptiformis; *эпилепсия* + лат. -formis подобный, похожий) — сходный с эпилептическим припадком; клинически напоминающий эпилепсию.

ЭПИЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ (epilepticus) — относящийся к эпилепсии.

ЭПИЛЕПТИ́ЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕ́НТ — см. *Психический эпилептический эквивалент.*

ЭПИЛО́ЙЯ (epiloia) — см. *Склероз туберозный.*

ЭПИЛЯ́ЦИЯ (epilatio; э- + лат. pilus волос) — удаление волос вместе с волосяной луковицей (в результате чего они не вырастают вновь), производимое с лечебной или косметической целью; термин употребляют также при обозначении нек-рых методов уда-

ления волос по типу депиляции, напр. Э. препаратами таллия или эпилином, рентгеновская Э.

ЭПИМА́СТ — см. *Эпимастигота.*

ЭПИМАСТИГО́ТА (син.: критидиальная стадия, эпимаст) — стадия жизненного цикла простейших сем. Trypanosomatidae, характеризующаяся наличием короткой ундулирующей мембраны, проходящей вдоль передней половины тела; Э. трипаносом, патогенных для человека, обитают в кишечнике переносчика, а эпимастиготы Trypanosoma cruzi — и в организме больного.

ЭПИМЕЗОФАРИ́НГИТ (epimesopharyngitis; *эпи-* + анат. mesopharynx мезофаринкс + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки (часто и лимфоидной ткани) носовой и ротовой частей глотки.

ЭПИМИ́ЗИЙ (epimysium; *эпи-* + греч. mys мышца) — см. *Перимизий наружный.*

ЭПИМИОКА́РД (primordium epimyocardiale; *эпи-* + *миокард*) — участок внутренностной мезодермы, из к-рого развиваются миокард и эпикард.

ЭПИНЕ́ВРИЙ (epineurium, LNH; *эпи-* + греч. neuron нерв) — наружная оболочка нерва, состоящая из волокнистой соединительной ткани.

ЭПИНЕФРИ́Н (epinephrinum; анат. устар. epinephros надпочечник) — см. *Адреналин.*

ЭПИНЕФРЭКТОМИ́Я (epinephrectomia; анат. устар. epinephros надпочечник + *эктомия*) — см. *Адреналэктомия.*

ЭПИСКЛЕ́РА (lamina episcleralis, LNH; episclera; *эпи-* + *склера*) — наружный рыхлый слой склеры, в к-ром проходят кровеносные сосуды.

ЭПИСКЛЕРА́ЛЬНОЕ ПРОСТРА́НСТВО [spatium episclerale, PNA; spatium interfasciale (Tenoni), BNA; spatium circumbulbare, JNA; син.: надвлагалищное пространство, надсклеральное пространство, теноново пространство] — щель между склерой и фасциальным влагалищем глазного яблока, заполненная жидкостью.

ЭПИСКЛЕРА́ЛЬНЫЕ ВЕ́ТОЧКИ (ramuli episclerales) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *263.*

ЭПИСКЛЕРИ́Т (episcleritis; *эписклера* + *-ит*) — воспаление поверхностных слоев склеры.

Э. МИГРИРУЮЩИЙ (e. migrans) — аллергический очаговый Э., последовательно поражающий соседние участки склеры около лимба.

Э. УЗЕЛКО́ВЫЙ (e. nodosa) — Э., при к-ром вблизи лимба развивается одиночный инфильтрат с интенсивной глубокой инъекцией сосудов склеры.

ЭПИСО́МА [*эпи-* + (*хромо*)*сома*] — генетическая структура бактерии, представляющая собой молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты, способную к самостоятельному существованию (и редупликации) в цитоплазме, а также к обратимому включению в состав хромосомы бактерии.

ЭПИСПАДИ́Я (epispadia; *эпи-* + греч. spadōn отверстие, расщелина, разрыв; син.: незаращение мочеиспускательного канала верхнее, расщелина мочеиспускательного канала верхняя) — аномалия развития: полное или частичное незаращение передней стенки мочеиспускательного канала.

Э. ПО́ЛНАЯ (e. totalis; син. Э. тотальная) — форма Э., при к-рой передняя стенка мочеиспускательного канала отсутствует на всем его протяжении, наружное отверстие мочевого пузыря расположено в лобковой области, а мышечные слои передней стенки мочевого пузыря и его шейки отсутствуют или недоразвиты.

Э. СТВОЛОВА́Я (e. truncalis) — форма Э., при которой наружное отверстие мочеиспускательного канала открывается в области спинки полового члена.

Э. ТОТА́ЛЬНАЯ (e. totalis) — см. *Эписпадия полная.*

ЭПИСТА́З (*эпи-* + греч. stasis стояние, положение) — 1) взаимодействие неаллельных генов, при котором доминантный аллель одной из пар подавляет проявление доминантного аллеля другой пары; 2) любое взаимодействие неаллельных генов, независимо от их доминантности.

EPISTÁXIS (греч. от epistazō выпускать по каплям, капать) — см. *Кровотечение носовое.*

ЭПИСТЕ́РНУМ (episternum; *эпи-* + анат. sternum грудина) — кость грудной конечности рептилий, рудиментами к-рой у человека являются диск грудиноключичного сустава и непостоянные надгрудинные кости.

ЭПИСТО́МА (epistoma; греч. epistomoō затыкать, закупоривать; син. бронхиома) — опухоль, развивающаяся вблизи корня легкого из эпителия желез бронхов.

ЭПИСТРОФЕ́Й (epistropheus, BNA, JNA; греч. epistrephō поворачивать, вращать) — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *7.*

ЭПИТАЛА́МУС (epithalamus PNA, BNA; *эпи-* + *таламус*; син.: надбугорье, надталамическая область) — часть таламического мозга, включающая шишковидное тело, заднюю спайку, поводки, спайку и треугольники поводков.

ЭПИТА́РЗУС (epitarsus; *эпи-* + анат. tarsus palpebrae хрящ века) — дупликатура конъюнктивы глазного яблока между ее переходной складкой и хрящом верхнего века.

ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЕ ГНЁЗДА БРУ́НА — см. *Брунна эпителиальные гнезда.*

ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЕ ЖЕМЧУ́ЖИНЫ — 1) см. *Бона узелки*; 2) см. *Тельца вилочковой железы.*

ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЕ ОСТРОВКИ́ МАЛАССЕ́ — см. *Малассе эпителиальные островки.*

ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЕ ТЕЛЬЦА́ — см. *Железы паращитовидные.*

ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЙ (epithelialis) — относящийся к эпителию; состоящий из эпителия.

ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЙ КО́ПЧИКОВЫЙ ХОД (син.: киста волосяная, киста пилонидальная, кожный синус врожденный, пилонидальный синус, пупок задний, фистула дермоидная, эктодермальный крестцово-копчиковый синус) — аномалия развития: канал, выстланный многослойным плоским эпителием, открывающийся в межъягодичной складке у копчика.

ЭПИТЕЛИЗА́ЦИЯ (epithelisatio) — образование эпителия в месте повреждения кожи или слизистой оболочки, приводящее к восполнению дефекта.

ЭПИТЕЛИ́ИТ ЛУЧЕВО́Й (*эпителий* + *-ит*) — см. *Радиоэпителиит.*

ЭПИТЕ́ЛИЙ (epithelium, LNH; *эпи-* + греч. thēlē сосок молочной железы; син. ткань эпителиальная) — ткань, выстилающая поверхность и полости тела, образующая эпидермис, покрывающая слизистые оболочки пищеварительного тракта, воздухоносных, мочевых и половых путей, серозные оболочки, а также образующая большинство желез организма; выполняет защитную, секреторную и нек-рые другие функции.

Э. ВАЛЬДЕ́ЙЕРОВ — см. *Эпителий поверхностный (яичника).*

ЭПИТЕ́ЛИЙ ГЕ́НЛЕ — см. *Эпителий переходный.*

Э. ГЕРМИНАТИ́ВНЫЙ (e. germinativum) — см. *Эпителий поверхностный (яичника).*

Э. ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ (e. glandulare, LNH) — Э., входящий в состав желез и состоящий из клеток, способных вырабатывать специфические продукты — секреты.

Э. ЗАРО́ДЫШЕВЫЙ — см. *Эпителий поверхностный (яичника).*

Э. ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЦЕЛОМИ́ЧЕСКИЙ — см. *Эпителий поверхностный (яичника).*

Э. ЗАЧА́ТКОВЫЙ — см. *Эпителий поверхностный (яичника).*

Э. КАЁМЧАТЫЙ (e. limbatum, LNH) — однослойный цилиндрический Э., на наружной поверхности клеток к-рого имеется каемка, образованная микроворсинками, обеспечивающими всасывание питательных веществ.

Э. МЕЗОДЕРМА́ЛЬНЫЙ (e. mesodermaticum, LNH; син.: Э. целодермальный, Э. целонефродермальный) — Э. мезодермального происхождения (напр., мезотелий, сперматогенный и фолликулярный Э.).

Э. МЕРЦА́ТЕЛЬНЫЙ — см. *Эпителий реснитчатый.*

Э. МНОГОРЯ́ДНЫЙ — см. *Эпителий псевдомногослойный.*

Э. МНОГОСЛО́ЙНЫЙ (e. multistratificatum, LNH) — Э., состоящий из многих слоев клеток; выполняет защитную функцию.

Э. МНОГОСЛО́ЙНЫЙ ПЛО́СКИЙ (e. multistratificatum planum, LNH) — Э. м., клетки наружного слоя к-рого имеют плоскую форму.

Э. ОБОНЯ́ТЕЛЬНЫЙ (e. olfactorium) — Э. слизистой оболочки верхней части полости носа, содержащий обонятельные клетки.

Э. ОДНОСЛО́ЙНЫЙ (e. unistratificatum, LNH) — Э., состоящий из одного слоя клеток.

Э. ПЕРЕХО́ДНЫЙ (e. transitorium, LNH; син. Генле эпителий) — двухслойный Э., выстилающий мочевыводящие пути.

Э. ПИГМЕ́НТНЫЙ (e. pigmentosum, LNH) — Э., клетки к-рого содержат большое количество пигментных включений (напр., в сетчатке глаза).

Э. ПЛО́СКИЙ (e. planum, LNH) — Э., клетки к-рого имеют плоскую форму.

Э. ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ яичника (e. superficiale, LNH; син.: вальдейеров эпителий, Э. герминативный, Э. зачатковый, Э. зародышевый, Э. зародышевый целомический) — однослойный цилиндрический Э., покрывающий поверхность яичника.

Э. ПРИЗМАТИ́ЧЕСКИЙ — см. *Эпителий цилиндрический.*

Э. ПСЕВДОМНОГОСЛО́ЙНЫЙ (e. pseudomultistratificatum, LNH; син. Э. многорядный) — однослойный Э., состоящий из клеток, ядра к-рых расположены на разных уровнях от базальной мембраны, напр. Э. дыхательных путей.

Э. РЕСНИ́ТЧАТЫЙ (e. ciliatum, LNH; син. Э. мерцательный) — псевдомногослойный Э., на наружной поверхности клеток к-рого имеются постоянно колеблющиеся волосковидные образования (реснички), напр. Э. дыхательных путей.

Э. РЕСПИРАТО́РНЫЙ (e. respiratorium) — Э., выстилающий альвеолы легких; обеспечивает газообмен между кровью и альвеолярным воздухом.

Э. СПЕРМАТОГЕ́ННЫЙ (e. spermatogenum) — Э., образующий стенку извитых семенных канальцев; в клетках Э. с. происходит развитие сперматозоидов.

Э. ФОЛЛИКУЛЯ́РНЫЙ (e. folliculare) — Э. яичника, состоящий из кубических клеток, окружающих одним или многими слоями развивающиеся яйцеклетки.

Э. ЦЕЛОДЕРМА́ЛЬНЫЙ — см. *Эпителий мезодермальный.*

Э. ЦЕЛОНЕФРОДЕРМА́ЛЬНЫЙ — см. *Эпителий мезодермальный.*

Э. ЦИЛИНДРИ́ЧЕСКИЙ (e. cylindricum, LNH; син. Э. призматический) — Э. ряда внутренних органов, клетки к-рого имеют цилиндрическую или призматическую форму.

Э. ЭПЕНДИМА́ЛЬНЫЙ — см. *Эпендима.*

Э. ЭПЕНДИ́МНЫЙ — см. *Эпендима.*

ЭПИТЕЛИО́МА (epithelioma; *эпителий* + *-ома*) — общее название опухолей, развивающихся из эпителия.

ЭПИТЕЛИО́МА АДЕНО́ИДНАЯ КИСТО́ЗНАЯ (epithelioma adenoides cysticum; син.: Бальзера — Менетрие аденома сальных желез симметричная, Брука железисто-кистозная эпителиома, эпителиома множественная доброкачественная железисто-кистозная) — невус, возникающий в результате пролиферации недоразвитых или порочно развитых сальных желез и волосяных фолликулов.

ЭПИТЕЛИО́МА БАЗА́ЛЬНО-КЛЕ́ТОЧНАЯ (epithelioma basocellulare) — см. *Базалиома.*

ЭПИТЕЛИО́МА БАЗА́ЛЬНО-КЛЕ́ТОЧНАЯ КЕРАТОТИ́ЧЕСКАЯ (epithelioma basocellulare keratoticum) — см. *Базалиома ороговевающая.*

ЭПИТЕЛИО́МА БАРХАТИ́СТАЯ — см. *Кейра эритроплазия.*

ЭПИТЕЛИО́МА С ДВОЙНО́Й МЕТАПЛАЗИ́ЕЙ — см. *Опухоль мукоэпидермоидная.*

ЭПИТЕЛИО́МА ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (epithelioma malignum) — см. *Рак.*

ЭПИТЕЛИО́МА ИНТРАЭПИДЕРМА́ЛЬНАЯ БО́РСТА — ЯДАССОНА — см. *Ядассона эпителиома кожи туловища.*

ЭПИТЕЛИО́МА КИСТО́ЗНАЯ АПА́ТЕНКО — см. *Апатенко кистозная эпителиома.*

ЭПИТЕЛИО́МА КО́ЖИ МАЛЕ́РБА — см. *Малерба эпителиома кожи.*

ЭПИТЕЛИО́МА КО́ЖИ СВЕТЛОКЛЕ́ТОЧНАЯ (epithelioma cutis clarocellulare) — доброкачественная опухоль придатков кожи, структурным элементом к-рой являются крупные светлые гликогенсодержащие клетки.

ЭПИТЕЛИО́МА МНО́ЖЕСТВЕННАЯ ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННАЯ ЖЕЛЕ́ЗИСТО-КИСТО́ЗНАЯ (epithelioma multiplex benignum glandulosum cysticum) — см. *Эпителиома аденоидная кистозная.*

ЭПИТЕЛИО́МА МНО́ЖЕСТВЕННАЯ ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННАЯ КИСТО́ЗНАЯ (epithelioma multiplex benignum cysticum) — см. *Трихоэпителиома.*

ЭПИТЕЛИО́МА МНО́ЖЕСТВЕННАЯ ПОВЕ́РХНОСТНАЯ (epithelioma multiplex superficiale) — см. *Базалиома мультицентрическая.*

ЭПИТЕЛИО́МА НЕКРОТИЗИ́РУЮЩАЯСЯ (epithelioma necrotisans) — см. *Малерба эпителиома кожи.*

ЭПИТЕЛИО́МА ОБЫЗВЕСТВЛЁННАЯ (epithelioma calcificatum) — см. *Малерба эпителиома кожи.*

ЭПИТЕЛИО́МА ПЕДЖЕТО́ИДНАЯ — см. *Базалиома кожи плоская поверхностная неизъязвляющаяся.*

ЭПИТЕЛИО́МА ПЕ́ЧЕНИ (epithelioma hepatis) — см. *Рак печеночно-клеточный.*

ЭПИТЕЛИО́МА РЕЦИДИВИ́РУЮЩАЯ (epithelioma recidivum) — см. *Опухоль смешанная.*

ЭПИТЕЛИО́МА СИФИЛОПОДО́БНАЯ ДОБРОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (epithelioma syphiloideum benignum) — см. *Кейра эритроплазия.*

ЭПИТЕЛИО́МА СЛИЗЕОБРАЗУ́ЮЩАЯ — см. *Опухоль мукоэпидермоидная.*

ЭПИТЕЛИО́МА ТУ́ЛОВИЩА ПЛО́СКАЯ — см. *Базалиома кожи плоская поверхностная неизъязвляющаяся.*

ЭПИТЕЛИО́МА ЭНТЕРО́ИДНАЯ ЯИ́ЧНИКА (epithelioma ovarii enteroideum) — см. *Кистома яичника псевдомуцинозная малигнизированная.*

ЭПИТЕЛИО́МА ЭРИТЕМАТО́ЗНАЯ МНО́ЖЕСТВЕННАЯ ЛИ́ТТЛА — см. *Базалиома кожи плоская поверхностная неизъязвляющаяся.*

ЭПИТЕЛИОЦИ́Т (epitheliocytus; *эпителий* + гист. cytus клетка) — см. *Клетка эпителиальная.*

ЭПИТЕЛИОЦИ́Т БАЗА́ЛЬНЫЙ (epitheliocytus basalis, LNH) — клетка псевдомногослойного эпителия, прилегающая к базальной мембране.

ЭПИТЕЛИОЦИ́Т ВСТА́ВОЧНЫЙ (epitheliocytus intercalatus, LNH) — клетка псевдомногослойного эпителия, занимающая промежуточное положение между базальным и поверхностным эпителиоцитом.

ЭПИТЕЛИОЦИ́Т КИШЕ́ЧНЫЙ С ИСЧЕ́РЧЕННОЙ КАЁМКОЙ (epitheliocytus intestinalis cum limbo striato, LNH; син.: клетка каемчатая, энтероцит каемчатый) — призматическая эпителиальная клетка слизистой оболочки тонкой кишки, имеющая на апикальной поверхности каемку, образованную системой микроворсинок.

ЭПИТЕЛИОЦИ́Т ПОВЕ́РХНОСТНЫЙ (epitheliocytus superficialis, LNH) — клетка псевдомногослойного эпителия, ядро к-рой расположено ближе к поверхности.

ЭПИТЕЛИОЦИ́Т ЦЕНТРОАЦИНО́ЗНЫЙ (epitheliocytus centroacinosus, LNH; син. клетка центроацинозная) — эпителиальная клетка кубической формы; этими клетками выстланы ацинусы поджелудочной железы.

ЭПИТЕЛИОЦИ́Т ШИПОВА́ТЫЙ (epitheliocytus spinosus, LNH; син. клетка шиповатая) — эпителиальная клетка с протоплазматическими отростками в форме шипов, образующих межклеточные мостики; из Э. ш. состоит шиповатый слой многослойного неороговевающего эпителия.

ЭПИТИМПАНИ́Т (epitympanitis; *эпитимпанум* + *-ит*) — хронический отит с поражением височной кости; характеризуется образованием краевой перфорации барабанной перепонки, грануляциями, ушными полипами.

Э. ХОЛЕСТЕАТО́МНЫЙ (e. cholesteatomica) — Э., характеризующийся врастанием эпидермиса кожи наружного слухового прохода в барабанную полость через краевую перфорацию барабанной перепонки и образованием холестеатомы.

ЭПИТИ́МПАНУМ (epitympanum; *эпи-* + греч. tympanon барабан) — см. *Надбарабанное углубление.*

ЭПИТИФЛИ́Т (epityphlitis; *эпи-* + греч. typhlon слепая кишка + *-ит*) — см. *Аппендицит.*

ЭПИФАРИНГИ́Т (epipharyngitis; *эпифаринкс* + *-ит*) — см. *Назофарингит.*

ЭПИФАРИНГОГРАФИ́Я (*эпифаринкс* + греч. graphō писать, изображать) — рентгенологическое исследование носоглотки после введения в нее контрастного вещества.

ЭПИФАРИНГОСКОПИ́Я (*эпифаринкс* + греч. skopeō рассматривать, исследовать) — см. *Риноскопия задняя.*

ЭПИФА́РИНКС (epipharynx; *эпи-* + греч. pharynx глотка) — см. *Носовая часть глотки.*

ЭПИ́ФИЗ (epiphysis; греч. «нарост», «шишка» от epiphyomai вырастать, расти на чем-либо) — 1) (PNA, BNA, JNA) расширенный конец трубчатой кости; обычно развивается из отдельной точки окостенения; 2) см. *Шишковидное тело.*

ЭПИФИЗА́РНАЯ ЛИ́НИЯ (linea epiphysialis, PNA) — граница между губчатым веществом эпифиза и эпифизарным хрящом трубчатой кости.

ЭПИФИЗА́РНАЯ ПЛАСТИ́НКА (lamina epiphysialis) — см. *Хрящ эпифизарный.*

ЭПИФИЗЕОДЕ́З (epiphyseodesis; *эпифиз* + греч. desis связывание, скрепление) — хирургическая операция: создание синостоза между эпифизом и метафизом.

ЭПИФИЗЕО́ЛИЗ (epiphyseolysis; *эпифиз* + греч. lysis распад, разрушение) — разрушение росткового эпифизарного хряща, напр. при переломе кости со смещением эпифиза.

ЭПИФИЗЕОНЕКРО́З (epiphyseonecrosis; *эпифиз* + *некроз*) — некроз эпифиза трубчатой кости, чаще бедренной; встречается при атеросклерозе, тромбозе концевых артерий кости и других нарушениях кровообращения.

ЭПИФИЗИ́Т (epiphysitis; *эпифиз* + *-ит*; син. остеомиелит эпифизарный) — воспаление эпифиза с вовлечением в процесс эпифизарного хряща; приводит к синостозу эпифиза с метафизом.

ЭПИФИЗЭКТОМИ́Я (epiphysectomia; *эпифиз* + *эктомия*) — хирургическая операция: удаление шишковидного тела.

ЭПИФИЛАКСИ́Я (epiphylaxia; *эпи-* + греч. phylaxis защита) — метод активации иммунитета при нек-рых вяло

текущих инфекционных болезнях, заключающийся во введении в организм соответствующей вакцины.

ЭПИ́ФОРА (epiphora; греч. «натиск, наплыв, поток слез») в офтальмологии — см. *Слезотечение ретенционное.*

ЭПИЦИСТОСТОМИ́Я (epicystostomia; *эпи-* + *цистостомия*) — хирургическая операция: наложение надлобкового мочепузырного свища.

ЭПИЦИСТОТОМИ́Я (epicystotomia; *эпи-* + *цистотомия*) — см. *Цистотомия высокая.*

ЭПИЦИ́Т (epicytus; *эпи-* + гист. cytus клетка; син. подоцит) — эпителиальная клетка внутреннего листка капсулы клубочка почечного тельца (почечного клубочка), имеющая отростки, плотно прилежащие к поверхности капилляров клубочка; принимает участие в процессах почечной фильтрации.

ЭПОНИ́ХИЙ (eponychium; *эп-* + греч. onyx, onychos ноготь) — см. *Надногтевая пластинка.*

ЭПСТА́ЙНА — БА́РРА ВИ́РУС (M. A. Epstein; J. M. Barr; син. вирус инфекционного мононуклеоза) — вирус из сем. герпесвирусов, являющийся возбудителем инфекционного мононуклеоза человека; существует предположение об этиологической связи Э.— Б. в. с лимфомой Беркитта.

ЭПУЛИ́Д (*эп-* + греч. ulon десна) — см. *Эпулис.*

ЭПУЛИ́С (epulis; греч. «нарост на десне»; от *эп-* + ulon десна; син. эпулид) — очаг разрастания соединительной ткани на десне или в толще челюсти.

Э. АНГИОМАТО́ЗНЫЙ (e. angiomatosa) — Э. на десне, характеризующийся наличием в нем большого количества мелких вен.

Э. ВНУТРИКО́СТНЫЙ (e. intraossea) — Э. в челюсти, морфологическим субстратом к-рого являются остеобласты и остеокласты.

Э. ГИГАНТОКЛЕ́ТОЧНЫЙ (e. gigantocellularis; син. остеобластокластома челюсти периферическая)— Э. на десне, морфологическим субстратом к-рого являются гигантские многоядерные клетки типа остеокластов.

Э. ГРАНУЛЕМАТО́ЗНЫЙ (e. granulomatosa) — Э. в виде обильных разрастаний грануляционной ткани в зоне изъязвления десны.

Э. ФИБРО́ЗНЫЙ (e. fibrosa) — Э. десны, состоящий из зрелой соединительной ткани.

ЭПШТЕ́ЙНА МЕТО́ДИКА (Г. В. Эпштейн, 1889—1935, сов. паразитолог и протозоолог) — метод выявления специфической зернистости гранулоцитов, основанный на пероксидазной реакции.

ЭРБА БОЛЕ́ЗНЬ (W. H. Erb, 1840—1921, нем. невропатолог) — 1) см. *Миопатия юношеская*; 2) см. *Паралич спастический спинальный.*

ЭРБА РЕФЛЕ́КС (W. H. Erb) — см. *Рефлекс коленный.*

ЭРБА СИМПТО́М (W. H. Erb) — повышенная возбудимость нервов при раздражении электрическим током; наблюдается при тетании.

ЭРБА СПИНА́ЛЬНЫЙ ПАРАЛИ́Ч (W. H. Erb) — см. *Паралич спастический спинальный.*

ЭРБА ТО́ЧКА (W. H. Erb) — см. *Боткина — Эрба точка.*

ЭРБА ЮВЕНИ́ЛЬНАЯ ФО́РМА МИОПАТИ́И (W. H. Erb) — см. *Миопатия юношеская.*

ЭРБА — ГОЛЬДФЛА́МА БОЛЕ́ЗНЬ (W. H. Erb, 1840—1921, нем. невропатолог; S. V. Goldflam, 1852—1932, польский невропатолог) — см. *Миастения.*

ЭРБА — РО́ТА МИОДИСТРОФИ́Я (W. H. Erb, 1840—1921, нем. невропатолог; B. K. Рот, 1848—1916, отеч. невропатолог) — см. *Миопатия юношеская.*

ЭРБА—РО́ТА МИОПАТИ́Я (W.H.Erb, B. K. Рот) — см. *Миопатия юношеская.*

ЭРБА — ФЕ́РСТЕРА — БАРРЕ́ — ЛЕВЕНШТЕ́ЙНА РЕФЛЕ́КС (W. H. Erb, 1840—1921, нем. невропатолог; O. Foerster, 1873—1941, нем. невропатолог; J. A. Barré, 1880—1967, франц. невропатолог; O. Loevenstein, род. в 1889 г., нем. невропатолог) — см. *Рефлекс двуглавой мышцы бедра.*

ЭРБА — ШАРКО́ — ШТРЮМПЕЛЛЯ БОЛЕ́ЗНЬ (W. H. Erb, 1840—1921, нем. невропатолог; J. M.Charcot, 1825—1893, франц. невропатолог; E. A. G. G. Strümpell, 1853—1925, нем. невропатолог) — см. *Штрюмпелля спастическая параплегия.*

ЭРБАНА — ХО́ЛДИНА МАСТЭКТОМИ́Я (J. A. Urban; C. A. Холдин, 1896—1974, сов. хирург-онколог; син. Урбана — Холдина мастэктомия — нрк) — хирургическая операция: удаление молочной железы вместе с парастернальными лимфатическими узлами; применяется при наличии метастазов рака в парастернальных лимфатических узлах.

ЭРБЕНА ФЕНО́МЕН (S. Erben, род. в 1863 г., австрийский невропатолог) — временное урежение пульса при наклоне туловища вперед или при переходе больного из вертикального положения в сидячее; иногда наблюдается при нейроциркуляторной дистонии, что связано с повышением тонуса блуждающего нерва.

ЭРГАЗИ́Я (греч. ergasia работа, действие, деятельность) — единство координированной и целенаправленной деятельности всех соматических и психических функций, из нарушений к-рого нек-рые зарубежные психиатры выводят различные психопатологические расстройства.

ЭРГАЗИОФОБИ́Я (ergasiophobia; греч. ergasia работа, действие, деятельность + *фобия*) — навязчивый страх— боязнь совершения какого-либо движения или действия.

ЭРГО- (греч. ergon работа, дело, действие, деятельность) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к работе, к действию, к деятельности».

ЭРГОГРА́ММА (*эрго-* + греч. gramma запись) — кривая, отражающая мышечную деятельность человека, полученная при помощи эргографа.

ЭРГО́ГРАФ (*эрго-*+греч. graphō писать, изображать) — прибор для регистрации работы мышц человека путем записи осциллограммы ритмичных движений органа, выполняющего работу.

ЭРГОГРАФИ́Я (*эрго-* + греч. graphō записывать) — метод изучения процессов утомления и других аспектов мышечной деятельности, основанный на графической регистрации частоты и амплитуды движений пальца или сгибания руки в локтевом суставе при подъеме груза на определенную высоту.

ЭРГОКАЛЬЦИФЕРО́Л (ergocalciferolum; син. витамин D_2) — высокоактивный антирахитический витаминный препарат, получаемый путем ультрафиолетового облучения эргостерина.

ЭРГО́МЕТР (*эрго-* + греч. metreō измерять, определять) — прибор для измерения или дозирования механической работы человека при выполнении определенных движений с нагрузкой; применяется в физиологии труда и спортивной медицине.

Э. ВЕЛОСИПЕ́ДНЫЙ — см. *Велоэргометр.*

Э. ГРАВИТАЦИО́ННЫЙ — Э., с помощью к-рого измеряют или дозируют работу, затраченную на преодоление тяжести поднимаемого груза.

Э. ИНЕРЦИО́ННЫЙ — Э., с помощью к-рого измеряют или дозируют работу, затраченную на вращение тела определенной массы.

ЭРГОМЕТРИ́Я (*эрго-* + греч. metreō измерять, определять) — метод измерения физической работы, выполняемой человеком, основанный на использовании специальных механических устройств (эргометров).

ЭРГОНО́МИКА (*эрго-* + греч. nomos закон) — научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью оптимизации орудий и условий труда для повышения его производительности и качества; по многим аспектам тесно соприкасается с физиологией и гигиеной труда.

ЭРГОСПИРОМЕТРИ́Я (*эрго-* + лат. spiro дышать + греч. metreō измерять, определять) — метод исследования внешнего дыхания по результатам определения минутного объема легочной вентиляции и потребления кислорода в условиях дозированной физической нагрузки.

ЭРГОСТЕРИ́Н (син. эргостерол) — полициклический спирт, содержащийся в нек-рых водорослях и грибах; используется для производства эргокальциферола.

ЭРГОСТЕРО́Л — см. *Эргостерин.*

ЭРГОТЕРАПИ́Я (ergotherapia; *эрго-*+ *терапия*) — см. *Терапия трудовая.*

ЭРГОТИ́ЗМ (ergotismus; франц. ergot спорынья) — пищевое отравление, возникающее при употреблении пищевых продуктов из зерна, содержащего примесь склероций гриба Claviceps purpurea (рожков спорыньи).

ЭРДГЕ́ЙМА ОПУХО́ЛЬ (J. Erdheim, 1874—1937, австрийский патолог)— см. *Краниофарингиома.*

ЭРДГЕ́ МА — ШТУ́ММЕ МЕ́ТОД (J. Erdheim, 1874—1937, австрийский патолог; Stumme) — метод окраски базофильных клеток гипофиза резорцин-фуксином после прокраски квасцовым кармином.

ЭРЕЙТОПАТИ́Я (ereuthopathia; греч. ereuthos краснота, покраснение + pathos страдание, болезнь) — легко возникающее покраснение кожи, обусловленное лабильностью тонуса кровеносных сосудов, напр. при невропатии или вегетативном неврозе.

ЭРЕЙТОФОБИ́Я (ereuthophobia; греч. ereuthos краснота, покраснение + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь покраснеть перед публикой или собеседником.

ЭРЕКТИ́ЛЬНАЯ ФА́ЗА ШО́КА (лат. erigo, erectum выпрямлять, поднимать) — начальная фаза травматического шока, характеризующаяся разлитым возбуждением ц. н. с., интенсификацией обмена, усилением деятельности нек-рых желез внутренней

секреции; проявляется речевым и двигательным возбуждением при сохранении сознания, отсутствием критического отношения к своему состоянию и к окружающей обстановке, учащением пульса, повышением артериального давления, учащением дыхания.

ЭРЕ́КТОР (лат. erigo, erectum выпрямлять, поднимать) — приспособление, обеспечивающее возможность введения полового члена во влагалище для совершения полового акта при отсутствии или недостаточности эрекции.

ЭРЕ́КЦИЯ (лат. erigo, erectum выпрямлять, поднимать) — увеличение полового члена в объеме с резким повышением его упругости, обусловленное растяжением и наполнением кровью пещеристых тел при половом возбуждении и обеспечивающее возможность выполнения полового акта.

ЭРЕМОФОБИ́Я (eremophobia; греч. erēmos пустынный + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь безлюдных мест или одиночества.

ЭРЕНКЁ МЕ́ТОД (Eränkö) — метод выявления норадреналина в аргентаффинных клетках с помощью люминесцентной микроскопии.

ЭРЕНФРИДА БОЛЕ́ЗНЬ — см. *Экзостозы костно-хрящевые множественные.*

ЭРЕТИ́ЗМ (erethismus; греч. erethismos раздражение, возбуждение) — повышенная раздражительность больного.

Э. МЕРКУРИА́ЛЬНЫЙ (e. mercurialis; лат. mercurius ртуть) — см. *Эретизм ртутный.*

Э. РТУ́ТНЫЙ (e. mercurialis; син. Э. меркуриальный) — Э. при меркуриализме, сочетающийся с боязливостью, внушаемостью, бессонницей или кошмарными сновидениями, часто сопровождающийся тремором пальцев рук и век.

ЭРЗА́Ц-ПРОДУ́КТЫ (нем. Ersatz) — см. *Пищевые суррогаты.*

ЭРИЗИПЕЛО́ИД (erysipeloidum; греч. erysipelas рожа + eidos вид; син.: рожа свиней, эритема ползучая) — инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, вызываемая Erysipelothrix rhusiopathiae, проникающим в организм человека через поврежденную кожу (чаще кистей); характеризуется возникновением в месте внедрения возбудителя интенсивно расширяющейся эритемы с побледнением в центре, припухлостью и болезненностью, а иногда — при генерализации инфекции — развитием артритов; заболевают преимущественно лица, занятые убоем и обработкой туш скота и птицы, а также переработкой рыбы.

ERYSIPELÓTHRIX RHUSIOPÁTHIAE — вид бактерий рода Erysipelothrix; мелкие грамположительные палочки, хорошо растущие на сахарном бульоне, а также на сыром мясе и рыбе; вызывает дерматозы и (или) септицемию у свиней и других домашних животных, а также у мышей и нек-рых других грызунов; возбудитель эризипелоида у человека.

ЭРИЗИФА́К (греч. erysis вытягивание, извлечение + phakos чечевица, линза) — инструмент для интракапсулярной экстракции катаракты; представляет собой миниатюрную металлическую чашечку, соединенную с источником вакуума, накладываемую на переднюю поверхность хрусталика и присасывающуюся к ней.

ЭРИКСЕНА СИМПТО́М (L. Erichsen, 1818—1896, англ. хирург) — появление болей в области пораженного участка при сдавлении руками крыльев подвздошных костей у больного туберкулезом крестцового отдела позвоночника, крестцово-подвздошного сочленения или костей таза.

ЭРИСМА́НА И́НДЕКС (Ф. Ф. Эрисман, 1842—1915, отеч. гигиенист) — антропометрический индекс физического развития, представляющий собой разность между длиной окружности груди и половиной высоты тела (роста).

ЭРИТЕ́МА (erythema; греч. erythēma краснота) — ограниченная гиперемия кожи.

ЭРИТЕ́МА АТРОФИ́ЧЕСКАЯ (erythema atrophicum) — см. *Волчанка красная дискоидная.*

ЭРИТЕ́МА АУТОТОКСИ́ЧЕСКАЯ (erythema autotoxicum) — эритема, обычно множественная, развивающаяся при аутоинтоксикации.

ЭРИТЕ́МА БРУЦЕЛЛЁЗНАЯ (erythema brucellosum) — крупная зудящая эритема, возникающая при бруцеллезе и быстро исчезающая; разновидность бруцеллидов.

ЭРИТЕ́МА ВОЗВЫ́ШЕННАЯ СТО́ЙКАЯ (erythema elevatum diutinum) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся множественными сгруппированными округлыми папулами эластической консистенции, локализующимися на разгибательных поверхностях конечностей в области крупных суставов.

ЭРИТЕ́МА ГА́ММЕЛА — см. *Гаммела эритема.*

ЭРИТЕ́МА ДЕВЯ́ТОГО ДНЯ (erythema diei nonae) — эритема, появляющаяся у больных сифилисом на девятый день от начала лечения препаратами мышьяка и являющаяся проявлением лекарственной аллергии.

ЭРИТЕ́МА ИНДУРАТИ́ВНАЯ (erythema induratum) — см. *Туберкулез кожи индуративный.*

ЭРИТЕ́МА ИНДУРАТИ́ВНАЯ ГИПОСТАТИ́ЧЕСКАЯ (erythema induratum hypostaticum) — см. *Эритроцианоз кожи симметричный.*

ЭРИТЕ́МА ИНФЕКЦИО́ННАЯ (erythema infectiosum; син. болезнь пятая) — острая инфекционная болезнь неясной этиологии с воздушно-капельным путем передачи; характеризуется лихорадкой и высыпанием сливающихся пятен; типична эритема на щеках и спинке носа в виде крыльев бабочки.

ЭРИТЕ́МА ИНФРАКРА́СНАЯ — эритема, возникающая под воздействием инфракрасного (теплового) излучения.

ЭРИТЕ́МА КА́ПЕЛЬНАЯ РУБЦУ́ЮЩАЯСЯ ФАРФОРОПОДО́БНАЯ — см. *Дегоса синдром.*

ЭРИТЕ́МА КОЛЬЦЕВИ́ДНАЯ ЦЕНТРОБЕ́ЖНАЯ (erythema anulare centrifugum; син. Дарье центробежная кольцевидная эритема) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся множественными кольцевидными эритемами в виде возвышающегося розового валика, растущего и постоянно изменяющего свою форму.

ЭРИТЕ́МА ЛАДО́НЕЙ И ПОДО́ШВ НАСЛЕ́ДСТВЕННАЯ (erythema palmare et plantare hereditarium) — см. *Лейна болезнь.*

ЭРИТЕ́МА ЛУЧЕВА́Я (erythema radiale) — местная лучевая реакция кожи, характеризующаяся возникновением эритемы, небольшой отечностью и выпадением волос, позже — мелким шелушением и пигментацией кожи.

ЭРИТЕ́МА МИГРИ́РУЮЩАЯ ЛИ́ПШЮТЦА — см. *Эритема мигрирующая хроническая.*

ЭРИТЕ́МА МИГРИ́РУЮЩАЯ УЗЛОВА́ТАЯ (erythema migrans nodosum) — см. *Панникулит мигрирующий узловатый.*

ЭРИТЕ́МА МИГРИ́РУЮЩАЯ ХРОНИ́ЧЕСКАЯ (erythema migrans chronicum; син.: Афцелиуса — Липшютца хроническая мигрирующая эритема, Липшютца мигрирующая эритема) — инфекционный дерматоз неясной этиологии, характеризующийся возникновением на месте укуса клещом Ixodes ricinus кольцевидной эритемы, быстро увеличивающейся в диаметре и бледнеющей в центральной части.

ЭРИТЕ́МА МИЛИА́НА — см. *Милиана эритема.*

ЭРИТЕ́МА НОДО́ЗНАЯ (erythema nodosum) — см. *Эритема узловатая.*

ЭРИТЕ́МА ОКАЙМЛЁННАЯ — см. *Токсидермия сывороточная.*

ЭРИТЕ́МА ОСЕ́ННЯЯ (erythema autumnale) — см. *Тромбидиаз.*

ЭРИТЕ́МА ПЕРСИСТИ́РУЮЩАЯ ЭРИТРОМЕЛАЛГИ́ЧЕСКАЯ (erythema persistens erythromelalgicum) — см. *Эритроцианоз кожи симметричный.*

ЭРИТЕ́МА ПОЛЗУ́ЧАЯ — см. *Эризипелоид.*

ЭРИТЕ́МА ПРЕВИТИЛИГИНО́ЗНАЯ (erythema praevitiliginosum) — см. *Витилиго розовое.*

ЭРИТЕ́МА РЕВМАТИ́ЧЕСКАЯ (erythema anulare rheumaticum; син. Лендорффа — Лейнера болезнь) — округлые или дугообразные эритемы на туловище и конечностях, наблюдаемые иногда при ревматической атаке.

ЭРИТЕ́МА РЕНТГЕ́НОВСКАЯ (erythema roentgenicum) — эритема, возникающая на участке кожи, подвергшемся рентгеновскому облучению.

ЭРИТЕ́МА РУБЦО́ВАЯ СИКОЗИФО́РМНАЯ (erythema cicatricale sycosiforme) — см. *Сикоз люпоидный.*

ЭРИТЕ́МА РУБЦУ́ЮЩАЯСЯ (erythema cicatricale) — см. *Ulerythema.*

ЭРИТЕ́МА РУБЦУ́ЮЩАЯСЯ УГРЕВА́Я — см. *Атрофодермия червеобразная.*

ЭРИТЕ́МА СКАРЛАТИНОПОДО́БНАЯ РЕЦИДИВИ́РУЮЩАЯ (erythema scarlatiniforme desquamativum recidivans; син. Фереоля — Бенье эритродермия) — рецидивирующая кожная сыпь с отрубевидным шелушением, напоминающая сыпь при скарлатине и имеющая тенденцию к переходу в эритродермию; этиология Э. с. р. не выяснена.

ЭРИТЕ́МА СО́ЛНЕЧНАЯ (erythema solare) — эритема, возникающая на участках кожи, подвергшихся инсоляции.

ЭРИТЕ́МА СТО́ЙКАЯ ФИГУ́РНАЯ (erythema perstans figuratum) — дерматоз неизвестной этиологии, характеризующийся развитием эритемы кольцевидной формы с небольшим шелушением и пигментацией, сохраняющейся годами без существенных изменений.

ЭРИТЕ́МА СУСТАВНА́Я ЭПИДЕМИ́ЧЕСКАЯ (erythema articulare epidermicum) — см. *Лихорадка хейверхилльская.*

ЭРИТЕ́МА ТЕЛЕАНГИЭКТАТИ́ЧЕСКАЯ ВРОЖДЁННАЯ СТО́ЙКАЯ (erythema teleangiectaticum congenitum

diutinum) — эритема с множественными телеангиэктазиями, локализующаяся на лице; составная часть синдрома Блума.

ЭРИТЕ́МА ТОКСИ́ЧЕСКАЯ (erythema toxicum) — эритема, являющаяся проявлением токсикодермии.

ЭРИТЕ́МА ТРЕТИ́ЧНАЯ (erythema tertiarium) — см. *Розеола сифилитическая третичная.*

ЭРИТЕ́МА УЗЛОВА́ТАЯ (erythema nodosum; син. эритема нодозная) — дерматоз неясной (предположительно, инфекционной или аллергической) этиологии, характеризующийся поражением сосудов кожи; проявляется возникновением в дерме или подкожной жировой клетчатке на голенях и бедрах плотных болезненных узлов, кожа над к-рыми постепенно меняет цвет от ярко-красного до фиолетово-желтого.

ЭРИТЕ́МА УЗЛОВА́ТАЯ ХРОНИ́ЧЕСКАЯ (erythema nodosum chronicum) — см. *Васкулит узловатый.*

ЭРИТЕ́МА УЛЬТРАФИОЛЕ́ТОВАЯ — эритема, возникающая на участках кожи, подвергшихся воздействию ультрафиолетового излучения.

ЭРИТЕ́МА ЦЕНТРОБЕ́ЖНАЯ БИЕ́ТТА — см. *Волчанка красная поверхностная.*

ЭРИТЕ́МА ЭКССУДАТИ́ВНАЯ ЗЛОКА́ЧЕСТВЕННАЯ (erythema exsudativum malignum) — см. *Стивенса — Джонсона синдром.*

ЭРИТЕ́МА ЭКССУДАТИ́ВНАЯ МНОГОФО́РМНАЯ (erythema exsudativum multiforme) — дерматоз, характеризующийся рецидивирующим (обычно весной и осенью) появлением на разгибательных поверхностях конечностей и слизистых оболочках полиморфной сетки в виде эритемы (энантемы), папул, иногда везикул и пузырей, расположенных кольцами; обострения сопровождаются лихорадкой и артралгией.

ЭРИТЕМАТО́З [erythematosis; *эритема* (основа erythemat-) + *-оз*] — см. *Волчанка красная дискоидная.*

ЭРИТЕ́МНАЯ ЛА́МПА (син. увиолевая лампа — устар.) — источник длинноволнового ультрафиолетового излучения; представляет собой трубчатую ртутную лампу низкого давления в колбе из увиолевого стекла, на внутреннюю поверхность к-рой нанесен люминофор; применяется в физиотерапии с лечебной и профилактической целью.

ЭРИТЕМОТЕРАПИ́Я (*эритема* + *терапия*) — способ светолечения, заключающийся в ультрафиолетовом облучении отдельных участков тела больного в дозах, вызывающих эритему.

ЭРИТР- (эритро-; греч. erythros красный) — составная часть сложных слов, означающая: 1) «красный», «краснота»; 2) «относящийся к эритроцитам».

ЭРИТРА́ЗМА (erythrasma; греч. erythrainō окрашивать в красный цвет) — псевдомикоз, вызываемый бактерией Corynebacterium minutissimum, проявляющийся ограниченными очагами желтовато-коричневого или розового цвета с четкими контурами и мелким отрубевидным шелушением на поверхности; локализуется почти исключительно на прилегающих к мошонке участках внутренней поверхности бедер.

ЭРИТРЕМИ́Я (erythraemia; *эритр-* + греч. haima кровь) — см. *Полицитемия истинная.*

ЭРИТРЕМИ́Я О́СТРАЯ (erythraemia acuta) — см. *Эритромиелоз.*

ЭРИТРО- — см. *Эритр-.*

ЭРИТРОБЛА́СТ (erythroblastus, LNH; *эритро-* + греч. blastos росток, зародыш; син. нормобласт) — общее название малодифференцированных клеток эритроидного ряда.

ЭРИТРОБЛА́СТ ПЕРВИ́ЧНЫЙ (erythroblastus primarius)— см. *Макроэритробласт.*

ЭРИТРОБЛАСТИ́ЧЕСКАЯ РЕА́КЦИЯ — временное увеличение количества ядросодержащих клеток эритроидного ростка костного мозга без изменения их качественного состава; наблюдается, напр., при нек-рых гемолитических анемиях, при кровопотере.

ЭРИТРОБЛАСТОГРА́ММА (*эритробласт* + греч. gramma запись) — результаты определения содержания (в процентах) различных ядросодержащих клеток эритроидного ростка костного мозга.

ЭРИТРОБЛАСТО́З (erythroblastosis; *эритробласт* + *-оз*) — увеличенное содержание (гл. обр. в костном мозге) клеток эритроидного ряда разной степени зрелости; наблюдается при лейкозах и эритробластических реакциях.

ЭРИТРОБЛАСТО́З НОВОРОЖДЁННЫХ (erythroblastosis neonatorum) — см. *Болезнь гемолитическая новорожденных.*

ЭРИТРОБЛАСТО́З ПЛОДА́ (erythroblastosis fetus) — см. *Болезнь гемолитическая новорожденных.*

ЭРИТРОБЛАСТО́МА (erythroblastoma; *эритробласт* + *-ома*) — злокачественная опухоль, исходящая из эритробластов и расположенная вне костного мозга.

ЭРИТРОБЛАСТОМАТО́З [erythroblastomatosis; *эритробластома* (основа erythroblastomat-) + *-оз*] — см. *Эритромиелоз.*

ЭРИТРОВЗВЕ́СЬ — кровезамещающая жидкость в виде взвеси эритроцитов в плазмозаменяющем растворе.

ЭРИТРОГЕМО́МЕТР (*эритро-* + *гемометр*; син. гемоскоп) — прибор для определения количества гемоглобина и эритроцитов в крови методом фотоэлектроколориметрии.

ЭРИТРОГРА́ММА (*эритро-* + греч. gramma запись) — кривая, отображающая зависимость интенсивности гемолиза, вызванного действием определенного вещества (обычно соляной кислоты), от продолжительности его воздействия; характеризует возрастной состав эритроцитов.

ЭРИТРОДЕРМИ́Я (erythrodermia; *эритро-* + греч. derma кожа) — диффузное покраснение всей или почти всей кожи.

ЭРИТРОДЕРМИ́Я ВИ́ЛЬСОНА — БРО́КА — см. *Вильсона — Брока эритродермия.*

ЭРИТРОДЕРМИ́Я ДЕСКВАМАТИ́ВНАЯ НОВОРОЖДЁННЫХ (erythrodermia desquamativa neonatorum; син. Лейнера — Муссу болезнь) — дерматоз у грудных детей, характеризующийся эритродермией с крупнопластинчатым шелушением.

ЭРИТРОДЕРМИ́Я ИХТИОЗИФО́РМНАЯ ВРОЖДЁННАЯ (erythrodermia congenita ichthyosiformis; син.: Брока врожденная ихтиозиформная эритродермия, Брока ихтиозиформный дерматоз, гиперкератоз ихтиозиформный генерализованный) — врожденный ихтиоз, развившийся на фоне эритродермии.

Э. ИХТИОЗИФО́РМНАЯ ВРОЖДЁННАЯ БУЛЛЁЗНАЯ (e. congenita ichthyosiformis bullosa; сиц.: гиперкератоз эпидермолитический, ихтиоз эпидермолитический) — вариант Э. и. в., протекающий с образованием пузырей и наличием симптома Никольского; наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Э. ИХТИОЗИФО́РМНАЯ ВРОЖДЁННАЯ НЕБУЛЛЁЗНАЯ (e. congenita ichthyosiformis non bullosa; син. ихтиоз ламеллярный) — вариант Э. и. в., характеризующийся образованием стойких крупных чешуек (особенно в области кожных складок), ускоренным ростом ногтей и волос, гипергидрозом ладоней и подошв; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

ЭРИТРОДЕРМИ́Я ЛИМФАДЕНОПАТИ́ЧЕСКАЯ (erythrodermia lymphadenopathica) — эритродермия, сопровождающаяся полиаденитом; возможный симптом гемодермии.

ЭРИТРОДЕРМИ́Я ПОЛИНЕЙРОПАТИ́ЧЕСКАЯ (erythrodermia polyneuropathica) — см. *Акродиния.*

ЭРИТРОДЕРМИ́Я ПСОРИАТИ́ЧЕСКАЯ (erythrodermia psoriatica; син. псориаз универсальный) — тяжелая форма псориаза, характеризующаяся поражением всей кожи, а также ногтей и сопровождающаяся лихорадкой, полиаденитом, артралгиями.

ЭРИТРОДЕРМИ́Я РЕТИКУЛЯ́РНАЯ (erythrodermia reticularis) — см. *Сезари синдром.*

ЭРИТРОДИАПЕДЕ́З (erythrodiapedesis; *эритро-* + *диапедез*; син. эритропедез) — выхождение эритроцитов из кровяного русла через стенки капилляров; характерен для геморрагических синдромов, в т. ч. при ряде инфекционных болезней и интоксикаций.

ЭРИТРОДИЕРЕ́З (erythrodiaeresis; *эритро-* + греч. diairesis разделение, разъятие) — физиологический процесс разрушения эритроцитов.

ЭРИТРО́З ПИГМЕ́НТНЫЙ ОКОЛОРОТОВО́Й (erythrosis pigmentata peribuccalis; *эритр-* + *-оз*; син. хлоазма околоротовая девичья) — дерматоз неясной этиологии, характеризующийся появлением вокруг рта слегка шелушащейся эритемы с последующей гиперпигментацией пораженного участка.

ЭРИТРО́ЗА — моносахарид, углеродная цепь к-рого состоит из четырех атомов; фосфорилированный стереоизомер Э.— D-эритроза является важным промежуточным продуктом углеводного обмена.

ЭРИТРОКЕРАТОДЕРМИ́Я (erythrokeratodermia; *эритро-* + *кератоз* + греч. derma кожа) — сочетание эритродермии с участками кератоза.

Э. ВАРИАБЕЛЬНАЯ (e. variabilis) — см. *Эритрокератодермия изменчивая фигурная.*

Э. ИЗМЕ́НЧИВАЯ ФИГУ́РНАЯ (син.: кератоз фигурный красный, Косты вариабельная эритрокератодермия, эритрокератодермия вариабельная) — наследственная врожденная Э., характеризующаяся наличием многообразных по форме (дугообразных, линейных, кольцевидных и др.) очагов кератоза на туловище и конечностях.

Э. ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ СИММЕТРИ́ЧНАЯ (e. symmetrica pro-

gressiva) — наследственная Э., характеризующаяся рассеянными эритематозно-гиперкератотическими бляшками на туловище и конечностях, растущими по периферии и постепенно захватывающими всю кожу.

ЭРИТРОКИНЕ́ТИКА (*эритро-* + греч. kinētikos относящийся к движению) — раздел гематологии, изучающий закономерности процесса созревания и разрушения эритроцитов.

ЭРИТРОЛЕЙКЕМИ́Я (erythroleukaemia; *эритро-* + *лейкемия*) — см. *Эритромиелоз.*

ЭРИТРОЛЕЙКО́З (erythroleucosis; *эритро-* + *лейкоз*) — см. *Эритромиелоз.*

ЭРИТРОМЕЛАЛГИ́Я (erythromelalgia; *эритро-* + греч. melos часть тела, конечность + algos боль; син.: Митчелла болезнь, отек кожи ограниченный болезненный) — ангиотрофоневроз с приступообразным расширением артериол, проявляющийся возникновением жгучих болей, гипералгезии и отека в дистальных отделах конечностей (чаще нижних); позже развиваются трофические изменения тканей.

ЭРИТРОМЕЛИ́Я (erythromelia; *эритро-* + греч. melos часть тела, конечность) — см. *Акродерматит атрофический хронический.*

ЭРИТРОМИЕЛО́З (erythromyelosis; *эритро-* + греч. myelos костный мозг + *-оз*; син.: Ди Гульельмо болезнь, миелоз эритремический острый, эритремия острая, эритробластоматоз, эритролейкемия, эритролейкоз) — форма острого лейкоза, на раннем этапе к-рого в костном мозге преобладают эритро- и нормобласты, а позднее — миелобласты; сопровождается явлениями нормо- и гиперхромной анемии, нарастающей лейкопенией и тромбоцитопенией.

ЭРИТРОМИЦИ́Н (erythromycinum)— антибиотик, продуцируемый Streptomyces erythraeus, активный в отношении кокков, грамположительных бактерий и риккетсий.

ЭРИТРО́Н (erythronum; греч. erythros красный) — совокупность всех зрелых и незрелых клеток эритроидного ряда, как циркулирующих, так и находящихся в костном мозге.

ЭРИТРОПЕДЕ́З [erythropedesis; *эритро-* + (*диа*)*педез*] — см. *Эритродиапедез.*

ЭРИТРОПЛАЗИ́Я (erythroplasia; *эритро-* + греч. plasis формирование, образование) — см. *Кейра эритроплазия.*

ЭРИТРОПЛАЗИ́Я БА́РХАТНАЯ — см. *Кейра эритроплазия.*

ЭРИТРОПЛАКИ́Я ШЕ́ЙКИ МА́ТКИ (erythroplakia cervicis uteri; *эритро-* + греч. plax, plakos плоскость, поверхность) — атрофия слизистой оболочки шейки матки с наличием участков темно-красного цвета, через к-рые просвечивают кровеносные сосуды.

ЭРИТРОПОЭ́З (erythropoësis; *эритро-* + греч. poiēsis выработка, образование; син. эритроцитопоэз) — процесс образования эритроцитов в организме.

ЭРИТРОПОЭТИ́НЫ (erythropoëtina; *эритро-* + греч. poiēsis выработка, образование) — стимуляторы эритропоэза, обнаруживаемые в крови и других жидких средах организма при гипоксии; в крови Э. в небольшом количестве содержатся и в норме.

ЭРИТРОПСИ́Я (erythropsia; *эритр-* + греч. opsis зрение) — нарушение зрительного восприятия, при к-ром все видимое представляется окрашенным в красноватый цвет.

ЭРИТРОРЕ́КСИС (erythrorrhexis; *эритро-* + греч. rhēxis ломка, разрушение) — процесс разрушения эритроцитов, при к-ром они распадаются на отдельные фрагменты.

ЭРИТРОФА́ГИ (*эритро-* + греч. phagos пожирающий) — см. *Гематофаги.*

ЭРИТРОФАГОЦИТО́З (erythrophagocytosis; *эритро-* + *фагоцитоз*) — процесс поглощения и разрушения эритроцитов клетками системы макрофагов с образованием зерен гемосидерина.

ЭРИТРОФОБИ́Я (erythrophobia; *эритро-* + *фобия*) — навязчивый страх — боязнь красного цвета.

ЭРИТРОЦИАНО́З КО́ЖИ СИММЕТРИ́ЧНЫЙ (erythrocyanosis cutis symmetrica; син.: эритема индуративная гипостатическая, эритема персистирующая эритромелалгическая) — дерматоз неясной этиологии, наблюдающийся у молодых женщин; проявляется припуханием кожи и понижением ее температуры в области лодыжек (кожа приобретает синюшно-красный цвет), а также местным фолликулярным кератозом.

ЭРИТРОЦИ́Т (erythrocytus; *эритро-* + гист. cytus клетка; син. красное кровяное тельце — устар.) — безъядерный форменный элемент крови, содержащий гемоглобин.

Э. МИШЕНЕВИ́ДНЫЙ — плоский бледный Э. с небольшим количеством гемоглобина, расположенного лишь в центре клетки; Э. м. встречаются при талассемии, изредка при других анемиях.

Э. ПЕРВИ́ЧНЫЙ (e. primarius) — красная кровяная клетка, образующаяся из макроэритробласта при эмбриональном кроветворении.

Э. ПОЛИХРОМАТОФИ́ЛЬНЫЙ (e. polychromatophilicus; син. полихроматофил) — незрелый Э., цитоплазма к-рого вследствие неполного насыщения ее гемоглобином окрашивается одновременно как кислыми, так и основными красителями, приобретая серо-фиолетовый цвет.

ЭРИТРОЦИТА́РНАЯ МА́ССА — взвесь эритроцитов, получаемая из цельной крови путем удаления плазмы.

ЭРИТРОЦИТО́З (erythrocytosis; *эритроцит* + *-оз*; син. полицитемия) — повышенное содержание эритроцитов в единице объема периферической крови.

Э. АБСОЛЮ́ТНЫЙ (e. absoluta; син. Э. истинный) — Э., при к-ром объем циркулирующей плазмы не уменьшен.

Э. ИСТИННЫЙ (e. vera) — см. *Эритроцитоз абсолютный.*

Э. КОМПЕНСАТО́РНЫЙ (e. compensatoria) — абсолютный Э., возникающий при гипоксии, напр. при пребывании на высотах, при нек-рых болезнях органов дыхания.

Э. ЛО́ЖНЫЙ (e. spuria) — см. *Эритроцитоз относительный.*

Э. ОТНОСИ́ТЕЛЬНЫЙ (e. relativa; син. Э. ложный) — Э., наблюдаемый вследствие уменьшения объема циркулирующей плазмы, а не увеличения количества эритроцитов.

ЭРИТРОЦИТО́ЛИЗ (erythrocytolysis; *эритроцит* + греч. lysis распад, разрушение) — см. *Гемолиз.*

ЭРИТРОЦИТОМЕ́ТРИЯ (*эритроцит* + греч. metreō измерять) — совокупность методов измерения размеров эритроцита.

ЭРИТРОЦИТОПЕ́НИЯ (erythrocytopenia; *эритроцит* + греч. penia бедность, недостаток) — пониженное содержание эритроцитов в единице объема крови.

ЭРИТРОЦИТОПОЭ́З (erythrocytopoësis; *эритроцит* + греч. poiēsis выработка, образование) — см. *Эритропоэз.*

ЭРЛА ЖИ́ДКОСТЬ (W. R. Earle, амер. онколог 20 века) — солевой раствор, входящий в состав питательных сред для культивирования тканей теплокровных животных.

ЭРЛА́НГЕРА МЕ́ТОД (B. F. Erlanger) — метод определения активности трипсина в сыворотке крови и дуоденальном содержимом, основанный на способности трипсина расщеплять синтетическое бесцветное соединение бензоиларгинин-р-нитроанилид с образованием окрашенного р-нитроанилина, концентрацию к-рого определяют колориметрически.

ЭРЛА́НГЕРА ФО́РМУЛА (J. Erlanger, 1874—1965, амер. физиолог) — закономерность, согласно к-рой скорость проведения импульса возбуждения в нервном волокне прямо пропорциональна квадрату диаметра его осевого цилиндра.

ЭРЛА́НГЕРА — БЛЕ́КМЕНА ФЕНО́МЕН (J. Erlanger, 1874—1965, амер. физиолог; Blackman) — электрокардиографический феномен, иногда наблюдаемый при полной атриовентрикулярной блокаде и заключающийся в укорочении интервала $P — P$, если внутри него расположен комплекс *QRS*.

ЭРЛА́ХЕРА МЫ́ШЕЧНАЯ НЕВРОТИЗА́ЦИЯ (P. J. Erlacher, род. в 1886 г., австрийский ортопед) — трансплантация мышечного лоскута на ножке из здоровой мышцы на парализованную соседнюю с целью восстановления функции последней за счет образования нервных анастомозов.

ЭРЛИ́ФТ (англ. air-lift) — техническое устройство для получения воды из глубоких водоносных горизонтов через скважину путем нагнетания в нее сжатого воздуха.

ЭРЛИХА ГЕМАТОКСИЛИ́Н (P. Ehrlich, 1854—1915, нем. врач., микробиолог и биохимик; син. Эрлиха квасцовый гематоксилин) — кислый краситель, представляющий собой смесь спиртового раствора гематоксилина с водным раствором калийных квасцов, глицерином и ледяной уксусной кислотой; применяется в лабораторной практике.

ЭРЛИХА ДИАЗОРЕАКТИ́В (P. Ehrlich) — водный раствор диазофенилсульфоновой кислоты, при взаимодействии к-рого с билирубином образуется карминово-красное окрашивание, а при взаимодействии с белками, содержащими тирозин, триптофан и (или) гистидин,— оранжево-красное окрашивание; применяется при биохимических и гистохимических исследованиях.

ЭРЛИХА ДИАЗОРЕА́КЦИЯ (P. Ehrlich) — см. *Диазореакция.*

ЭРЛИХА КВАСЦО́ВЫЙ ГЕМАТОКСИЛИ́Н (P. Ehrlich) — см. *Эрлиха гематоксилин.*

Э́РЛИХА КЛЕ́ТКА (P. Ehrlich) — см. *Лаброцит.*

Э́РЛИХА РЕЦЕ́ПТОРЫ (P. Ehrlich)— постулированные Эрлихом клеточные рецепторы, способные специфически распознавать антигены и связывать их; существование антигенсвязывающих рецепторов на поверхности иммунокомпетентных клеток было позже экспериментально доказано.

Э́РЛИХА ТЕЛЬЦА́ (P. Ehrlich) — см. *Гейнца — Эрлиха тельца.*

Э́РЛИХА ТЕО́РИЯ ИММУНИТЕ́ТА (P. Ehrlich; син. теория боковых цепей) — одна из первых теорий антителообразования, согласно к-рой у клеток имеются антигенспецифические рецепторы, высвобождающиеся в качестве антител под действием антигена.

Э́РЛИХА ТЕТРА́ДА (P. Ehrlich) — обнаружение в мокроте одновременно четырех патологических элементов: обызвествленных эластических волокон, микобактерий туберкулеза, кристаллов холестерина и аморфной извести; признак прорыва в бронх содержимого старого туберкулезного очага.

Э́РЛИХА — БИО́НДИ ОКРА́СКА (P. Ehrlich, 1854—1915, нем. врач, микробиолог и биохимик; A. Biondi, 1846—1917, итал. патолог.; син. Бионди — Гейденгайна окраска) — окраска гистологических препаратов триацидной смесью Бионди — Эрлиха — Гейденгайна; используется, напр., при изучении ядер клеток околоушной и поджелудочной желез, соединительной ткани.

Э́РЛИХА — ТЮ́РКА КА́ПЕЛЬНАЯ ЛИ́ПИЯ (P. Ehrlich, 1854—1915, нем. врач, микробиолог и биохимик; S. Türk, швейц. офтальмолог 19—20 вв.) — см. *Тюрка линия.*

Э́РМАННА ПРО́БНЫЙ ЗА́ВТРАК (P. Ehrmann, род. в 1879 г., нем. врач) — пробный завтрак, представляющий собой 300 *мл* 5% раствора этилового спирта.

Э́РМАННА СКЛЕРОЗИ́РУЮЩИЙ ФОЛЛИКУЛИ́Т ЗАТЫ́ЛКА (устар.; S. Ehrmann, 1854—1926, австрийский дерматолог) — см. *Acne keloidea.*

ЭРМЕ́ТР (истор.; *эритема* + греч. metreō измерять) — прибор для оценки интенсивности солнечного излучения, вызывающего эритемную кожную реакцию; действие Э. основано на свечении люминофора, прикрытого специальными светофильтрами.

Э́РНИ ФЕНО́МЕН (H. Erni, 1859—1937, шведский врач) — появление кашля, мокроты и аускультативных симптомов после поколачивания по грудной клетке; признак наличия в этой области крупной полости в легком, содержащей жидкость и газ (воздух).

ЭРОГЕ́ННАЯ ЗО́НА (греч. erōs любовь, страсть + -genēs порождающий, вызывающий) — участок кожи или слизистой оболочки (напр., в области половых органов, молочных желез, губ, полости рта), раздражение к-рого вызывает половое возбуждение или оргазм.

ЭРО́ЗИЯ (erosio; лат. «разъедание») — поверхностный дефект слизистой оболочки или эпидермиса.

Э. ВОСПАЛИ́ТЕЛЬНАЯ (e. inflammatoria; син. Э. истинная) — Э., обусловленная воспалением кожи или слизистой оболочки.

Э. ГЕМОРРАГИ́ЧЕСКАЯ (e. haemorrhagica) — Э., обусловленная ограниченным кровоизлиянием в слизистую оболочку.

Э. ИСТИННАЯ (e. vera) — см. *Эрозия воспалительная.*

ЭРО́ЗИЯ ХРОМОСО́МЫ — множественное нарушение структурной целости хромосомы, не приводящее к ее распаду.

ЭРО́ЗИЯ ШЕ́ЙКИ МА́ТКИ (erosio cervicis uteri) — дефект эпителия слизистой оболочки влагалищной части шейки матки.

ЭРО́ЗИЯ ШЕ́ЙКИ МА́ТКИ ЛО́ЖНАЯ (erosio cervicis uteri spuria) — см. *Псевдоэрозия шейки матки.*

ЭРОТ- (эрото-; греч. erōs, erōtos любовь, желание, страсть) — составная часть сложных слов, означающая «любовь», «страсть», «половое влечение».

ЭРОТИ́ЗМ (erotismus; греч. erōs, erōtos любовь, желание, страсть; син. афродизия) — общее название различных проявлений полового влечения.

ЭРОТО- — см. *Эрот-.*

ЭРОТОГРАФОМАНИ́Я (erotographomania; *эрото-* + *графомания*) — непрерывное составление психически больным любовных писем.

ЭРОТОДРОМОМАНИ́Я (erotodromomania; *эрото-* + *дромомания*) — импульсивное влечение к бродяжничеству, сопряженному с сексуальными эксцессами.

ЭРОТОМАНИ́Я (erotomania; *эрото-* + *мания*; син. гиперафродизия) — патологически повышенное половое влечение; часто сопровождается половыми извращениями.

ЭРОТОМАНИ́Я КЛЕРАМБО́ — см. *Клерамбо эротомания.*

ЭРОТОФОБИ́Я (erotophobia; *эрото-* + *фобия*) — 1) навязчивый страх — боязнь полового акта; 2) отвращение к половому акту.

ЭРУПТИ́ВНЫЙ (eruptivus; лат. eruptio внезапное появление, высыпание) — характеризующийся появлением сыпи; относящийся к сыпи.

ЭСБА́ХА АЛЬБУМИНО́МЕТР (истор.; G. H. Esbach, 1843—1890, франц. врач; син. альбуминометр) — прибор в виде стеклянной пробирки, градуированной особым образом, предназначавшийся для количественного определения белка в моче по толщине слоя свернувшегося белка через 24 часа после смешивания пробы исследуемой мочи с водным раствором пикриновой (1%) и лимонной (2%) кислот.

ЭСКУ́ХЕНА СУБОКЦИПИТА́ЛЬНАЯ ПУ́НКЦИЯ (K. Eskuchen, австрийский невропатолог) — способ пункции мозжечково-мозговой цистерны, при к-ром иглу вводят на середине расстояния между затылочным бугром и остистым отростком второго шейного позвонка и направляют несколько кверху до упора в затылочную кость, после чего по ней направляют конец иглы вниз к заднему краю большого затылочного отверстия, где прокалывают заднюю атлантозатылочную мембрану и твердую мозговую оболочку.

Э́СМАРХА БИНТ (F. A. Esmarch, 1823—1908, нем. хирург) — см. *Бинт резиновый.*

Э́СМАРХА ЖГУТ (F. A. Esmarch; син. Эсмарха турникет) — кровоостанавливающий жгут в виде толстой резиновой трубки длиной около полутора метров с крючком на одном конце и цепочкой на другом.

Э́СМАРХА НОЖ (F. A. Esmarch)— нож для разрезания гипсовых повязок с прочным коротким лезвием и массивной заостренной на конце рукояткой.

Э́СМАРХА НО́ЖНИЦЫ (F. A. Esmarch) — ножницы для разрезания повязок: лезвия изогнуты под углом, а обушок одного из лезвий утолщен и расплющен на конце, что позволяет проводить лезвие между повязкой и кожей, не травмируя последнюю.

Э́СМАРХА ОБЕСКРО́ВЛИВАНИЕ (F. A. Esmarch) — метод уменьшения кровопотери при хирургических операциях на конечностях; заключается в тугом бинтовании поднятой конечности резиновым бинтом по направлению от периферии к центру с последующим наложением кровоостанавливающего жгута на проксимальную часть бедра или плеча и снятии резинового бинта.

Э́СМАРХА ОПЕРА́ЦИЯ (F. A. Esmarch) — экзартикуляция плеча, при к-рой операцию начинают с высокой ампутации плеча, после чего рассекают мягкие ткани надплечья по его наружной поверхности, вскрывают плечевой сустав, скелетируют остаток кости и вылущивают его из сустава.

Э́СМАРХА ТУРНИКЕ́Т (F. A. Esmarch) — см. *Эсмарха жгут.*

Э́СМАРХА ШИ́НА (истор.; F. A. Esmarch) — транспортная шина для иммобилизации конечности, представлявшая собой проволочный каркас корытообразной формы.

Э́СМАРХА — ЛА́НГЕНБЕКА ЖГУТ (F. A. Esmarch, 1823—1908, нем. хирург; B. K. Langenbeck, 1810—1887, нем. хирург) — кровоостанавливающий жгут в виде резиновой ленты.

ЭСПА́НДЕР (лат. expando растягивать) — спортивный снаряд для тренировки мышц рук и плечевого пояса, представляющий собой набор резиновых жгутов, укрепленных между двумя ручками; применяется также в лечебной физкультуре.

ЭСПА́НДЕР ЧЕЛЮСТНО́Й — пружинное устройство для тренировки мимических и жевательных мышц.

ЭСПУ́НДИЯ (espundia) — см. *Лейшманиоз кожно-слизистый бразильский.*

ЭССЕРА — МОРА́КСА МЕ́ТОД (истор.; J. F. S. Esser, 1878—1946, голландский хирург; V. Morax, 1866—1935, франц. офтальмолог) — метод блефаропластики с использованием кожного лоскута на ножке, представлявшей собой отпрепарированный сосудисто-нервный пучок.

ЭСТАФЕ́ТНЫЙ СПО́СОБ ВЫ́НОСА РА́НЕНЫХ (син. эвакуация медицинская по подставам) — способ организации выноса пораженных, при к-ром путь эвакуации расчленяют на несколько участков, обслуживаемых разными носилочными звеньями, последовательно передающими пораженного на носилках друг другу; позволяет интенсифицировать вынос пораженных.

ЭСТЕЗИО- (греч. aisthēsis чувство, ощущение) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к ощущению, к чувствительности».

ЭСТЕЗИОБЛАСТО́МА (aesthesioblastoma; *эстезио-* + *бластома*) — см. *Эстезионейробластома.*

ЭСТЕЗИОЛО́ГИЯ (истор.; *эстезио-* + греч. logos учение, наука)— наука, изучающая строение и функции органов чувств.

ЭСТЕЗИО́МЕТР (*эстезио-* + греч. metreō измерять, определять) — общее название приборов для определения порогов чувствительности (тактильной, болевой, температурной и др.).

ЭСТЕЗИОМЕТРИ́Я (*эстезио-* + греч. metreō измерять, определять) — совокупность методов измерения чувствительности рецепторов.

ЭСТЕЗИОНЕЙРОБЛАСТО́МА (aesthesioneuroblastoma; *эстезио-* + *нейробластома*; син.: эстезиобластома, эстезионейроцитома, эстезионейроэпителиома обонятельная, эстезиоэпителиома) — злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток обонятельного нейроэпителия; локализуется в стенках полости носа, носовой части глотки и в решетчатом лабиринте.

ЭСТЕЗИОНЕЙРОЦИТО́МА (aesthesioneurocytoma; *эстезио-* + *нейроцитома*) — см. *Эстезионейробластома.*

ЭСТЕЗИОНЕЙРОЭПИТЕЛИО́МА ОБОНЯ́ТЕЛЬНАЯ (aesthesioneuroepithelioma olfactorium) — см. *Эстезионейробластома.*

ЭСТЕЗИОЭПИТЕЛИО́МА [aesthesioepithelioma; *эстезио-* + (*нейро*)*эпителиома*] — см. *Эстезионейробластома.*

ЭСТИОМАНИ́Я (устар.; esthiomania; греч. esthiō есть + *мания*) — см. *Ситомания.*

ЭСТЛА́НДЕРА ТОРАКОПЛА́СТИКА (J. A. Estländer, 1831—1881, финский хирург) — интраплевральная торакопластика, производимая над всей остаточной полостью при хронической эмпиеме плевры.

ЭСТРАДИО́Л — стероидный гормон из группы эстрогенов, обладающий наибольшей биологической активностью среди эстрогенов.

ЭСТРЕНА — ДАМЕ́ШЕКА АНЕМИ́Я (S. Estren, род. в 1918 г., амер. педиатр; W. Dameshek, род. в 1900 г., амер. педиатр) — наследственная гипопластическая анемия у детей с неэффективностью всех трех ростков кроветворения в костном мозге; отличается от анемии Фанкони отсутствием других аномалий развития.

ЭСТРИО́Л — женский половой гормон, представляющий собой продукт метаболизма эстрадиола, обладающий много меньшей, чем он, активностью; выделяется с мочой.

ЭСТРОГЕ́ННЫЕ СРЕ́ДСТВА (remedia oestrogena; греч. oistros неистовое желание, страсть + -genēs порождающий, вызывающий; син. эстрогены) — лекарственные средства, содержащие природные женские половые гормоны или их синтетические аналоги (напр., эстрон, эстрадиола бензоат, синэстрол, диэтилстильбэстрол).

ЭСТРОГЕ́НЫ (oestrogena; греч. oistros неистовое желание, страсть + -genēs порождающий, вызывающий) — 1) (син. гормоны эстрогенные) — гормоны яичников, коркового вещества надпочечников и плаценты (напр., эстрадиол, эстрон, эстриол), участвующие в развитии женских половых органов и вторичных половых признаков, а также способствующие пролиферации эндо- и миометрия; к женским половым гормонам, кроме Э., относят прогестерон; 2) см. *Эстрогенные средства.*

ЭСТРО́Н — женский половой гормон, являющийся продуктом метаболизма эстрадиола, обладающий меньшей, чем он, активностью; выделяется с мочой.

ЭТАЛО́Н РА́ДИЯ — точечный источник ионизирующего излучения, представляющий собой 1 *мг* радия, находящегося в равновесии с продуктами распада; заключен в платиновую ампулу толщиной 0,5 *мм.*

ЭТАНА́ЛЬ — см. *Уксусный альдегид.*

ЭТА́НОВАЯ КИСЛОТА́ — см. *Уксусная кислота.*

ЭТАНОЛАМИ́Н — см. *Коламин.*

ЭТА́П МЕДИЦИ́НСКОЙ ЭВАКУА́ЦИИ в военной медицине — медицинские пункты и лечебные учреждения, развернутые на путях эвакуации с задачей приема, медицинской сортировки пораженных и больных, оказания им медицинской помощи, лечения и подготовки их к дальнейшей эвакуации.

ЭТА́П МЕДИЦИ́НСКОЙ ЭВАКУА́ЦИИ в Гражданской обороне — определение Э. м. э. тоже, что и в военной медицине. Однако в системе медицинской службы Гражданской обороны предусматривается, как правило, развертывание только двух этапов; первый — отряды первой медицинской помощи, второй — больничная база.

ЭТЕРОМАНИ́Я (греч. aithēr эфир + *мания*) — см. *Эфиромания.*

ЭТИЛИ́ЗМ — см. *Алкоголизм хронический.*

ЭТИ́ЛОВЫЙ ЭФИ́Р (aether aethylicus; син.: диэтиловый эфир, серный эфир) — производное этилового спирта, в молекуле к-рого водород гидроксила замещен на этил; входит в состав нек-рых лекарственных средств и газовых смесей, используемых в анестезиологии; применяется в лабораторной практике как растворитель жиров и нек-рых других органических веществ.

ЭТИО- (греч. aitia причина) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к причине болезни».

ЭТИОЛО́ГИЯ (*этио-* + греч. logos учение, наука) — 1) учение о причинах и условиях возникновения болезней; 2) причина возникновения болезни или патологического состояния.

ЭТИОПАТОГЕНЕ́З (нрк; aetiopathogenesis; *этио-* + *патогенез*) — совокупность знаний о причинах возникновения и механизмах развития болезни; термин несостоятелен, поскольку его использование способствует смешению понятий причины и следствия в патологии.

ЭТИОТРО́ПНЫЙ (*этио-* + греч. tropos поворот, направление) — направленный против причины заболевания, устраняющий или ослабляющий действие фактора, вызвавшего заболевание (о методе лечения).

ЭТМОИДА́ЛЬНЫЙ (ethmoidalis; анат. os ethmoidale решетчатая кость) — относящийся к решетчатой кости, к ее пазухе.

ЭТМОИДИ́Т (ethmoiditis; *анат.* cellulae ethmoidales решетчатые ячейки + *-ит*) — воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатой кости.

ЭТОЛО́ГИЯ (ethologia; греч. ēthos обычай, привычка + logos учение, наука) — биологическая наука, изучающая поведение животных в естественных условиях, уделяющая внимание преимущественно анализу генетически обусловленных компонентов поведения; ряд выводов Э. может быть использован при изучении эволюционно-генетических предпосылок поведения человека, однако в этом вопросе недопустима чрезмерная биологизация, к-рая встречается в работах нек-рых зарубежных ученых.

Э́ТУОТЕРА ФА́КТОРЫ (истор.; W. O. Atwater, 1844—1907, амер. физиолог) — общее название показателей усвояемости пищевых веществ с учетом потерь энергии, затрачиваемой организмом на процессы пищеварения и выделения азота с мочой.

ЭУ- (эв-, эй-; греч. eu хорошо, вполне, совершенно, правильно) — составная часть сложных слов, означающая «хороший», «подлинный», «правильный».

ЭУГЕТЕРО́ЗИС (*эу-* + *гетерозис*) — гетерозис в естественных популяциях за счет значительной степени гетерозиготности родителей.

ЭУКАРИО́ТЫ [Eucariota; *эу-* + греч. karyon ядро (ореха)] — организмы, клетки к-рых обладают ядрами, отграниченными от цитоплазмы оболочкой; к Э. относятся все животные и большинство растений.

ЭУПАРЕУНИ́Я (*эу-* + греч. pareunos сожитель) — одновременное наступление оргазма у мужчины и женщины.

ЭУПАРИФИО́ЗЫ (euparyphioses) — гельминтозы из группы трематодозов, вызываемые паразитирующими в кишечнике представителями рода Euparyphium; протекают с явлениями энтерита.

EUPARÝPHIUM — род трематод сем. Echinostomatidae, паразитирующих в кишечнике птиц и млекопитающих, в т. ч. домашних и синантропных; промежуточные хозяева — моллюски, дополнительные хозяева — моллюски и лягушки; нек-рые виды являются возбудителями эупарифиозов у человека (E. ilocanum — на Филиппинских островах, E. jassyense — в Румынии, E. malayanum — в Юго-Восточной Азии).

ЭУПРОТЕИНЕМИ́Я (euproteinaemia; *эу-* + *протеинемия*) — нормальное соотношение основных групп белков в плазме крови.

EURYTRÉMA PANCREÁTICUM — вид трематод сем. Dicrocoliidae, широко распространенный в Азии и Южной Америке; окончательные хозяева — сельскохозяйственные животные, иногда человек, промежуточные хозяева — моллюски; возбудитель эуритрематоза у людей в Южном Китае.

ЭУРИТРЕМАТО́З (eurytrematosis) — гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый Eurytrema pancreaticum, протекающий с явлениями панкреатита.

ЭУФИЛЛИ́НОВАЯ ПРО́БА — метод определения степени гипертензии малого круга кровообращения, основанный на свойстве эуфиллина снижать повышенное давление в легочном стволе и уменьшать перегрузку правой половины сердца.

ЭУХРОМАТИ́Н (*эу-* + хроматин) — совокупность участков хромосом, максимально деспирализованных и не обладающих гетероцикнозом; участки Э. состоят из уникальных последовательностей азотистых оснований и наиболее активны как носители наследственной информации.

ЭУХРОМАТИНИЗА́ЦИЯ — деспирализация участков хромосом в интерфазном ядре, сопровождающаяся их генетической активацией.

ЭУХРОМОСО́МА (устар.; *эу-* + *хромосома*) — см. *Аутосома.*

Э́ФАПС (греч. ephapsis прикосновение, от *эп-* + hapsis касание, контакт) — участок плотного соприкосновения двух нейронов, в к-ром возможна передача возбуждения с одной клетки на другую без участия медиаторов.

ЭФАПТИ́ЧЕСКАЯ ПЕ́РЕДАЧА — процесс проведения возбуждения с одного нейрона на другой через эфапс.

ЭФЕБОФИЛИ́Я (ephebophilia; греч. ephēbos юноша + philia любовь, влечение) — разновидность мужского гомосексуализма, при к-рой объектами влечения являются подростки и юноши.

ЭФЕНДИ́ЕВА МЕ́ТОД (Ф. А. Эфендиев, 1909—1963, сов. хирург) — метод лечения ожогов нанесением на поверхность обожженных тканей смеси растворов новокаина, фурацилина и пиоктанина, образующей через 16—18 часов герметичную пленку.

ЭФИРОГЛЮКУРО́НОВЫЕ КИСЛО́ТЫ — парные глюкуроновые кислоты, состоящие из остатков глюкуроновой кислоты, связанных глюкозидной связью с остатками гидроксилсодержащих веществ; образуются в печени, участвуют в выведении из организма с мочой токсичных продуктов распада белков и ряда лекарственных средств, напр. камфоры, хлоралгидрата, морфина.

ЭФИРОМАНИ́Я (aetheromania; эфир + *мания*; син.: наркомания эфирная, этеромания) — форма наркомании, при к-рой объектом пристрастия является этиловый эфир.

ЭФИРОСЕ́РНЫЕ КИСЛО́ТЫ ПА́РНЫЕ — см. *Серные кислоты парные.*

ЭФФЕ́КТ ОСНОВА́ТЕЛЯ — см. *Эффект родоначальника.*

ЭФФЕ́КТ ПОЛОЖЕ́НИЯ ГЕ́НА — зависимость фенотипического проявления гена от его локализации в хромосоме.

ЭФФЕ́КТ РОДОНАЧА́ЛЬНИКА (син. эффект основателя) — отклонение генных частот изолированной популяции от средних частот вида или расы, обусловленное происхождением рассматриваемой популяции от небольшого числа предков (родоначальников).

ЭФФЕ́КТОР (лат. effector совершающий действие) — 1) в физиологии — орган, деятельность (функциональное состояние) к-рого изменяется в результате управляющего воздействия ц. н. с., ее определенного отдела или определенного рефлекса; 2) в генетике — молекула, изменяющая активность репрессора и тем самым регулирующая трансляцию; 3) в биохимии — вещество, изменяющее скорость ферментативной реакции, взаимодействуя с ферментом.

ЭФФЕ́КТОРНЫЕ ЦЕ́НТРЫ ИММУНОГЛОБУЛИ́НА — звенья участка молекулы иммуноглобулина, ответственные за цитофильные, комплементсвязывающие функции этих белков, а также их способность активировать метаболические процессы в клетках-мишенях.

ЭФФЕРЕ́НТНОЕ ЗВЕНО́ — компонент рефлекторной дуги, осуществляющий передачу возбуждения из ц. н. с. к исполнительным органам или тканям.

ЭФФЕРЕ́НТНЫЙ (efferens, efferentis; лат. effero выносить) — направленный от чего-то (органа, нервного центра).

ЭФФЛОРЕСЦЕ́НЦИЯ (efflorescentia; лат. effloresco расцветать) — см. *Сыпь.*

ЭХИНОКО́КК (греч. echinos еж + kokkos зерно) — 1) личинка цестод отряда Cyclophyllida в виде обширного пузыря, содержащего дочерние и внучатые пузыри с многочисленными сколексами; 2) (Echinococcus granulosus) — вид цестод сем. Taeniidae, отр. Cyclophyllida, распространенный повсеместно; мелкие половозрелые формы паразитируют в тонком кишечнике хищных животных, более крупные личиночные формы — в тканях внутренних органов многих млекопитающих, в том числе человека, вызывая эхинококкоз.

ЭХИНОКО́КК МНОГОКА́МЕРНЫЙ — см. *Alveococcus multilocularis.*

ЭХИНОКОККО́З (echinococcosis; син.: эхинококкоз гидатидный, эхинококкоз однокамерный) — гельминтоз из группы цестодозов, вызываемый личинкой Echinococcus granulosus, характеризующийся развитием эхинококковых кист в различных органах.

ЭХИНОКОККО́З АЛЬВЕОЛЯ́РНЫЙ (echinococcosis alveolaris) — см. *Альвеококкоз.*

ЭХИНОКОККО́З ГИДАТИ́ДНЫЙ (echinococcosis hydatidis) — см. *Эхинококкоз.*

ЭХИНОКОККО́З МНОГОКА́МЕРНЫЙ (echinococcosis multilocularis) — см. *Альвеококкоз.*

ЭХИНОКОККО́З ОДНОКА́МЕРНЫЙ (echinococcosis monolocularis) — см. *Эхинококкоз.*

ЭХИНОКОККОТОМИ́Я (устар.; echinococcotomia; *эхинококк* + греч. tomē разрез, рассечение) — см. *Эхинококкэктомия.*

ЭХИНОКОККЭКТОМИ́Я (echinococcectomia; *эхинококк* + *эктомия*; син.: хитинэктомия, эхинококкотомия — устар.) — хирургическая операция: вскрытие фиброзной капсулы, окружающей эхинококк, и удаление его хитинового пузыря со всем содержимым.

Э. ДВУХМОМЕ́НТНАЯ (истор.; син. Фолькманна эхинококкэктомия) — Э., при к-рой на первом этапе лишь вскрывали брюшную полость над эхинококковой кистой и оставляли рану незашитой, ожидая сращения пораженного органа с пристеночной брюшиной, а на втором этапе — через 10 дней — производили собственно Э.

Э. ЗАКРЫ́ТАЯ (e. obturata; син.: Торнтона эхинококкэктомия, Торнтона — Боброва — Посадаса эхинококкэктомия) — Э., производимая с ушиванием фиброзной капсулы эхинококка наглухо.

Э. ОТКРЫ́ТАЯ (e. aperta; син. Зенгера — Линдеманна эхинококкэктомия) — Э., при к-рой края фиброзной капсулы эхинококка подшивают к краям операционной раны, тампонируют и дренируют образовавшуюся полость.

Э. РАДИКА́ЛЬНАЯ (e. radicalis) — Э., при к-рой полностью удаляют фиброзную капсулу, окружающую эхинококк вместе с ее содержимым.

ЭХИНОПАРИФИО́З (echinoparyphiosis) — гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый Echinoparyphium koizumii, протекающий с явлениями энтерита; человек заражается при употреблении в пищу лягушек или моллюсков.

ECHINOPARÝPHIUM KOIZÚMII — вид гельминтов сем. Echinostomatidae кл. трематод; окончательные хозяева — птицы, у к-рых паразитирует в слепой кишке; промежуточные хозяева — моллюски родов Corbicula, Planorbis и др.; распространен в Японии и Китае; возбудитель эхинопарифиоза человека.

ECHINOSTÓMA — род трематод сем. Echinostomatidae, паразитирующих у птиц, гл. обр. водоплавающих, в т. ч. домашних, а также у нек-рых млекопитающих, напр. ондатры, тюленей, крыс; промежуточные и дополнительные хозяева — различные виды моллюсков; представители нек-рых видов изредка встречаются у человека в качестве возбудителей эхиностомозов.

ЭХИНОСТОМО́ЗЫ (echinostomoses) — гельминтозы из группы трематодозов, вызываемые представителями рода Echinostoma, протекающие с явлениями энтерита; человек заражается при употреблении в пищу моллюсков; встречаются в странах Дальнего Востока.

ЭХИНОХАЗМО́З (echinochasmosis) — гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый Echinochasmus perfoliatus, протекающий с явлениями энтерита; человек заражается при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной рыбы; встречается в Японии.

ECHINOCHÁSMUS PERFOLIÁTUS — вид гельминтов сем. Echinostomatidae кл. трематод; окончательные хозяева — собака, кошка, свинья, изредка человек, у к-рых паразитирует в тонкой кишке; промежуточные хозяева — моллюски рода Parafossalurus, дополнительные хозяева — рыбы, напр. язь, лещ; возбудитель эхинохазмоза у людей в Японии.

ЭХО- (греч. ēchō эхо, отголосок) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к эху, к отраженным волнам».

М-ЭХО (син. срединное эхо) — ультразвуковой сигнал, отраженный от срединно расположенных структур головного мозга, при проведении эхоэнцефалографии; имеет важное диагностическое значение.

ЭХОГРАФИ́Я УЛЬТРАЗВУКОВА́Я (*эхо-* + греч., graphō писать, изображать) — метод исследования, основанный на посылке в глубину обследуемого участка тела ультразвуковых импульсов, к-рые, последовательно отразившись от различных структур (органов тканей), формируют изображение их плотности на экране электронно-лучевой трубки; применяется, напр., в кардиологии, акушерстве, офтальмологии.

Э. УЛЬТРАЗВУКОВА́Я ДВУХМЕ́РНАЯ (син. сканирование ультразвуковое) — Э. у., при к-рой непрерывное изменение направления ультразвукового излучения обеспечивает исследование объекта не только в глубину, но и в поперечном направлении.

ЭХОКАРДИОГРА́ММА (*эхо-* + *кардиограмма*) — кривая, отображаю-

щая колебания интенсивности ультразвуковых импульсов, отраженных от сердца, окружающих его тканей и внутриполостных образований.

ЭХОКАРДИО́ГРАФ (*эхо-* + *кардиограф*; син.: кардиограф ультразвуковой, эхокардиолокатор, эхотахокардиограф) — прибор для исследования сердечной деятельности путем регистрации перемещений сердца или его клапанов методом ультразвуковой эхографии.

ЭХОКАРДИОГРА́ФИЯ (*эхо-* + *кардиография*; син. кардиография ультразвуковая) — исследование сердца методом ультразвуковой эхографии; применяется для изучения структуры самого сердца и окружающих его тканей, выявления жидкости в перикардиальной полости и внутриполостных тромбов, а также для исследования функционального состояния сердца.

ЭХОКАРДИОЛОКА́ТОР (*эхо-* + греч. kardia сердце + лат. loco, locatum помещать, располагать) — см. *Эхокардиограф.*

ЭХОКИНЕЗИ́Я (echokinesia; *эхо-* + греч. kinēsis движение) — см. *Эхопраксия.*

ЭХОЛАЛИ́Я (echolalia; *эхо-* + греч. lalia речь, болтовня; син. эхофразия) — непроизвольное повторение психически больным слов и фраз, услышанных от окружающих; симптом кататонии.

ЭХОМИМИ́Я (echomimia; *эхо-* + греч. mimia подражание) — непроизвольное повторение психически больным мимических движений окружающих его лиц; симптом кататонии.

ЭХООСТЕОСКО́П (*эхо-* + греч. osteon кость + skopeō смотреть, наблюдать) — прибор для выявления переломов и трещин костей методом ультразвуковой эхографии.

ЭХООФТА́ЛЬМО́ГРАФ (*эхо-* + *офтальмограф*; син.: офтальмологический ультразвуковой локатор, офтальмограф ультразвуковой) — прибор для измерения линейных размеров глаза и обнаружения в нем новообразований или инородных тел методом ультразвуковой эхографии.

ЭХОПАЛИЛАЛИ́Я (echopalilalia; *эхо-* + *палилалия*) — *Речь зеркальная.*

ЭХОПАТИ́Я (*эхо-* + греч. pathos страдание, болезнь) — непроизвольное повторение психически больным мимики, жестов, поз, слов или выражений беседующего с ним лица; симптом кататонии.

ЭХОПРАКСИ́Я (echopraxia; *эхо-* + греч. praxis действие, син. эхокинезия) — непроизвольное повторение психически больным движений (жестов и действий) окружающих его лиц; симптом кататонии.

ЭХО-РИТМ — см. *Ритм сердца реципрокный.*

ЭХО-СИМПТО́МЫ — общее название психопатологических явлений в виде непроизвольного повторения больным слов, фраз, движений, мимики окружающих.

ЭХОТАХОКАРДИО́ГРАФ (*эхо-* + греч. tachos скорость + *кардиограф*) — см. *Эхокардиограф.*

ЭХОТИМИ́Я (echothymia; *эхо-* + греч. thymos чувство, настроение) — см. *Реакция имитации патологическая.*

ЭХОФРАЗИ́Я (echophrasia; *эхо-* + греч. phrasis речь, оборот речи) — см. *Эхолалия.*

ЭХОЭНЦЕФАЛО́ГРАФ (*эхо-* + *энцефалограф*) — прибор для морфологического исследования головного мозга методом ультразвуковой эхографии.

ЭХОЭНЦЕФАЛОГРАФИ́Я (*эхо-* + *энцефалография*) — исследование головного мозга методом ультразвуковой эхографии; применяется для обнаружения и топической диагностики опухолей, гематом, инородных тел и др.

ЭША́РА (eschara; греч. «очаг», «струп») — 1) гангрена кожи (чаще ягодиц), возникающая в результате тромбоза поверхностных артерий масляной взвесью лекарственных средств; 2) (устар.) — см. *Струп.*

ЭША́РА ВИ́СМУТОВАЯ (eschara bismuthica) — см. *Гангрена кожи висмутовая).*

Э́ШБИ МЕ́ТОД (W. Ashby) — метод определения продолжительности жизни эритроцитов донора у реципиента при помощи реакций агглютинации эритроцитов с агглютиногенами А и В, а также М и N.

ЭШЕРИ́ХИИ — см. *Escherichia.*

ESCHERÍCHIA (Ber; эшерихии) — род микроорганизмов сем. Enterobacteriaceae, объединяющий условно-патогенные грамотрицательные подвижные палочки, ферментирующие глюкозу и лактозу с выделением кислоты и газа.

E. CÓLI (Ber) — см. *Палочка кишечная.*

ЭШЕРИХИО́З (escherichiosis; 'Escherichia coli кишечная палочка) — см. *Коли-инфекция.*

ЭЭГ — см. *Электроэнцефалограмма.*

ЭЭТ — см. *Температура эквивалентно-эффективная.*

ЭЯКУЛЯ́Т (ejaculatum; лат. ejaculor, ejaculatus sum выбрасывать, извергать) — семенная жидкость, выделенная при эякуляции.

ЭЯКУЛЯ́ЦИЯ (ejaculatio; лат. «выбрасывание, извержение»; син. семяизвержение) — выделение семенной жидкости из мочеиспускательного канала при коитусе или заменяющих его формах половой активности (мастурбация и др.).

ЭЯКУЛЯ́ЦИЯ ЗАДЕ́РЖАННАЯ — см. *Эякуляция затрудненная.*

ЭЯКУЛЯ́ЦИЯ ЗАПА́ЗДЫВАЮЩАЯ — см. *Эякуляция затрудненная.*

ЭЯКУЛЯ́ЦИЯ ЗАТРУДНЁННАЯ (ejaculatio tarda; син.: эякуляция задержанная, эякуляция запаздывающая) — половое расстройство у мужчин, при к-ром половой акт носит затяжной, изнурительный характер и часто не завершается эякуляцией.

ЭЯКУЛЯ́ЦИЯ УСКО́РЕННАЯ (ejaculatio praecox) — половое расстройство у мужчин, при к-ром эякуляция наступает в начале полового акта, иногда до введения полового члена во влагалище.

Ю

ЮАРТА СИМПТО́М (нрк; W. Ewert, 1848—1929, англ. врач) — см. *Юэрта симптом.*

ЮВА́РЫ КО́СТНЫЙ ШОВ (E. Juvara, 1870—1933, румынский хирург) — остеосинтез с помощью серебряных коротких полос, к-рыми охватывают костные отломки; полосы имеют на одном конце два отверстия, а на другом два язычка, к-рые вдевают в отверстия и отгибают.

ЮВЕНИ́ЛЬНЫЙ (juvenilis; лат. «юношеский») — относящийся к детскому, юношескому возрасту; не достигший половой зрелости.

ЮВЕНО́ИДЫ (juvenoida) — синтетические аналоги гормонов насекомых, вызывающие нарушения в метаболизме последних и препятствующие нормальной линьке личинок; используются в борьбе с насекомыми.

ЮГУЛЯ́РНЫЙ (jugularis; лат. jugulum горло) — относящийся к передней части шеи.

ЮДИНА РАСШИРИ́ТЕЛЬ (С. С. Юдин, 1891—1954, сов. хирург) — хирургический инструмент для образования подкожного канала при пластике пищевода, имеющий рабочую часть листовидной формы, укрепленную на длинной рукоятке.

ЮДИНА СПО́СОБ УЛИ́ТКИ (С. С. Юдин) — способ закрытия культи двенадцатиперстной кишки при резекции желудка на выключение; заключается в том, что двенадцатиперстную кишку вскрывают у края язвенного кратера и создают языкообразный выступ на противолежащей стенке, кишку ушивают непрерывным двухрядным швом и образовавшийся конус сворачивают в рулон тремя витками, укладывая в кратер язвы, фиксируя в капсуле поджелудочной железы несколькими швами; применяется при обширных язвах двенадцатиперстной кишки, пенетрирующих в поджелудочную железу.

ЮЗЕФО́ВИЧА ОПЕРА́ЦИЯ (М. А. Юзефович, отеч. хирург) — костно-пластическая ампутация стопы, при к-рой сохраняют дистальный отдел голени с «вилкой» голеностопного сустава, куда помещают отсеченный бугор пяточной кости.

ЮИНГА БОЛЕ́ЗНЬ (J. Ewing, 1866—1943, амер. патолог) — см. *Юинга опухоль.*

ЮИНГА ДИФФУ́ЗНАЯ ЭНДОТЕЛИО́МА КОСТЕЙ (J. Ewing, 1866—1943, амер. патолог) — см. *Юинга опухоль.*

ЮИНГА О́ПУХОЛЬ (J. Ewing, 1866 — 1943, амер. патолог; син.: омобластома, эндотелиома костей диффузная, Юинга болезнь, Юинга диффузная эндотелиома костей, Юинга саркома) — злокачественная опухоль кости, состоящая из мелких клеток с овальным или круглым ядром и узким ободком цитоплазмы; поражает любую кость скелета (преимущественно диафизы длинных

трубчатых костей), метастазирует чаще в кости черепа, позвоночник и легкие.

ЮИНГА САРКО́МА (J. Ewing, 1866—1943, амер. патолог) — см. *Юинга опухоль*.

ЮИНГА СИМПТО́М (A. E. Ewing, 1855—1929, амер. офтальмолог) — мягкая припухлость в верхнемедиальной части глазницы; признак нарушения оттока содержимого из соответствующей лобной пазухи.

ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯ́РНЫЙ И́НДЕКС (лат. juxta вблизи + анат. glomerulus клубочек) — показатель активности юкстагломерулярного комплекса почек, равный среднему числу юкстагломерулярных клеток, вырабатывающих ренин, на 100 клеток комплекса.

ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯ́РНЫЙ КО́МПЛЕКС (complexus juxtaglomerularis, LNH) — совокупность клеток в области входа в почечный клубочек приносящей артериолы и выхода выносящей артериолы, способных продуцировать ренин; включает юкстагломерулярные и юкставаскулярные клетки, а также клетки плотного пятна.

ЮЛЕ́ПЫ (устар.; julepia) — лекарственные формы, представляющие собой растворы лекарственных веществ в ароматных водах с добавлением сахара.

ЮМОР АЛКОГО́ЛИКОВ — плоские или циничные остроты, часто направленные на самого себя; симптом хронического алкоголизма.

ЮНГА АРХЕТИ́ПЫ (истор.; C. G. Jung, 1875—1961, швейц. психолог и психиатр; син. архетипы) — типовые мысли, представления, образы (напр., повторяющиеся в мифах, сказках, сновидениях), возникающие у субъекта якобы под влиянием наследуемого коллективного подсознательного; термин используется в идеалистической глубинной психологии.

ЮНГА — ГЕЛЬМГО́ЛЬЦА ТЕО́РИЯ ЦВЕТООЩУЩЕ́НИЯ (T. Young, 1773—1829, англ. физик и врач; H. L. F. Helmholtz, 1821—1894, нем. физиолог и естествоиспытатель) — см. *Гельмгольца теория цветоощущения*.

ЮНГЛИНГА ПУ́НКЦИЯ (O. Jüngling, 1884—1944, нем. хирург) — пункция переднего рога бокового желудочка головного мозга через отверстие, высверливаемое фрезой в точке, расположенной на 2,5 *см* кпереди от венечного шва и на 2 *см* кнаружи от срединной линии.

ЮНГОВА МЫ́ШЦА [musculus pyramidalis auriculae (Jungi), BNA; K. G. Jung, 1794—1864, нем. анатом] — см. т. 2, Перечень анат. терминов, *708*.

ЮНОШЕСКАЯ ДУГА́ — см. *Arcus (corneae) juvenilis*.

ЮРГЕНСА СИНДРО́М (R. Jurgens, 1898—1961, нем. гематолог) — см. *Ангиогемофилия*.

ЮСТА СУХОЖИ́ЛЬНЫЙ ШОВ (E. Just, совр. нем. хирург) — способ наложения сухожильного шва, при к-ром конец каждой нити внутриствольно проводят из одного отрезка сухожилия в другой, возвращают в первый по поверхности сухожилия и снова внутриствольно с перекрестом нити выводят на поверхность другого, где и завязывают.

ЮСУ́ПОВА — ВОРОНО́ВИЧА КО́СТНЫЙ ШОВ — остеосинтез при косых, винтообразных и оскольчатых переломах с помощью спиц, имеющих на одном из концов площадку для упора; другой конец спицы фиксируют в натягивающей дуге.

ЮТИНЕ́ЛЯ БОЛЕ́ЗНЬ (V. H. Hutinel, 1849—1933, франц. педиатр) — см. *Ютинеля синдром*.

ЮТИНЕ́ЛЯ СИНДРО́М (V. H. Hutinel; син. Ютинеля болезнь) — сочетание туберкулезного перикардита у детей с циррозом печени, обусловленным застоем крови в венах большого круга кровообращения и хронической туберкулезной интоксикацией.

ЮША́РА СИМПТО́М (H. Huchard, 1844—1910, франц. врач) — 1) коробочный перкуторный звук над легкими при острой левожелудочковой недостаточности, обусловленный развитием острой эмфиземы легких; 2) (устар.)— отсутствие урежения пульса при переходе больного из вертикального положения в горизонтальное; признак артериальной гипертензии.

ЮЭРТА СИМПТО́М (W. Ewart, 1848—1929, англ. врач; син.: Эварта симптом — нрк, Юарта симптом — нрк) — 1) наличие участка притупления перкуторного звука в области позвоночника на уровне II—V грудных позвонков; признак экссудативного перикардита; 2) наличие участка притупления перкуторного звука в области угла левой лопатки; признак экссудативного перикардита; 3) выпячивание первого ребра слева от грудины; непостоянный признак экссудативного перикардита.

ЮЭРТА — ТЕССЬЕ́ СИМПТО́М (W. Ewart, 1848—1929, англ. врач; P. Teissier, франц. врач) — наличие участка притупления перкуторного звука у правого края позвоночника на уровне II—V грудных позвонков; признак экссудативного перикардита.

Я

Я́БЛОЧНАЯ КИСЛОТА́ — природная оксидикарбоновая кислота ациклического ряда, являющаяся промежуточным продуктом обмена веществ в организме человека (участвует в цикле трикарбоновых кислот); применяется в синтезе некоторых лекарственных средств.

ЯВАНТРО́ПЫ (Homo soloensis; Ява + + греч. anthrōpos человек) — ископаемые люди, относящиеся к палеоантропам; древность — 30—45 тыс. лет.

ЯВО́РСКОГО КЛЕ́ТКИ (В. Яворский, отеч. врач начала 20 в.) — слущенные спиралевидные клетки слизистой оболочки желудка, обнаруживаемые в содержимом желудка при гастрите с повышенной секрецией.

ЯВО́РСКОГО СИМПТО́М (В. Яворский) — болезненность при пальпации илеоцекальной области, усиливающаяся при поднимании правой ноги; возможный признак хронического аппендицита.

Я́ГЕРА — КИ́НГА СИМПТО́М (Jager; King) — дрожание рук небольшой амплитуды при манипуляциях с мелкими предметами; наблюдается при эссенциальном (наследственном) дрожании.

Я́ГИЧА СПО́СОБ (N. Jagič, 1875—1956, австрийский врач) — способ перкуссии верхушек легких, при к-ром ее производят в пределах равнобедренного треугольника, основанием к-рого служит горизонтальная линия, проводимая на спине между I и II грудными позвонками на 3—5 *см* в обе стороны от позвоночника, а вершиной — точка пересечения задней границы волосистой части головы со срединной линией.

ЯГОДИ́ЦЫ (nates, clunes, BNA, JNA)— выпуклости в нижней части задней поверхности туловища, состоящие из мягких тканей (гл. обр., мышц), прикрывающие таз и тазобедренный сустав и отделенные от бедра ягодичными бороздами.

ЯГОДИ́ЧНАЯ БОРОЗДА́ (sulcus gluteus, PNA; sulcus glutaeus, BNA, JNA) — парное линейное углубление на коже, разделяющее ягодицу и заднюю область бедра.

ЯГОДИ́ЧНАЯ ЛИ́НИЯ (linea glutea, PNA; linea glutaea, BNA, JNA) — линейная шероховатость на наружной поверхности крыла подвздошной кости, ограничивающая место начала ягодичных мышц; различают переднюю, заднюю и нижнюю Я. л.

ЯГОДИ́ЧНАЯ О́БЛАСТЬ (regio glutea, PNA; regio glutaea, BNA, JNA; син. седалищная область) — область нижней конечности, ограниченная сверху проекцией на кожу подвздошного гребня, снизу — ягодичной бороздой, медиально — срединной линией тела, латерально — линией, соединяющей переднюю верхнюю подвздошную ость с большим вертелом.

ЯД(-Ы) (venenum, venena) — вещество, вызывающее отравление или смерть при попадании в организм в малом количестве.

Я. ГЕМАГГЛЮТИНИ́РУЮЩИЙ — Я., вызывающий агглютинацию эритроцитов.

Я. ГЕМОГЛОБИНОТРО́ПНЫЙ — Я., переводящий гемоглобин в метгемоглобин или карбоксигемоглобин.

Я. ГЕМОДИНАМИ́ЧЕСКИЙ — Я., вызывающий нарушения кровообращения.

Я. ГЕМОЛИТИ́ЧЕСКИЙ — Я., вызывающий гемолиз.

Я. ГЕМОПОЭТИ́ЧЕСКИЙ — Я., вызывающий нарушение кроветворения.

Я. ГЕПАТОТРО́ПНЫЙ (греч. hēpar, hēpatos печень + tropos поворот, направление; син. Я. печеночный) — Я., оказывающий повреждающее действие на ткань печени.

Я. ДЕСТРУКТИ́ВНЫЙ — Я., нарушающий структуру клеток, тканей и органов.

Я. Е́ДКИЙ — Я., обладающий резко выраженным местным деструктивным действием (напр., кислоты, щелочи).

Я. КРОВЯНО́Й — общее название Я., вызывающих изменение состава и свойств крови.

Я. ПЕЧЁНОЧНЫЙ — см. *Я. гепатотропный.*

Я. ПРОМЫ́ШЛЕННЫЙ — Я., являющийся исходным, промежуточным, побочным или конечным продуктом производства, способным при определенных условиях (напр., при концентрации выше предельно допустимой для воздуха рабочей зоны) вызывать отравления персонала предприятия.

Я. СИНАПТИ́ЧЕСКИЙ — общее название Я., вызывающих изменения (усиление или ослабление) проведения нервных импульсов в синапсах.

Я. ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ — Я., отравление к-рым протекает без видимого повреждения морфологических структур организма.

ЯД КАТАЛИТИ́ЧЕСКИЙ — вещество, подавляющее активность катализатора, напр. какого-либо фермента.

ЯД МИТОТИ́ЧЕСКИЙ (син. ингибитор митотический) — вещество, подавляющее процесс митоза; Я. м. используются, напр., в цитологических исследованиях.

ЯД СТАТОКИНЕТИ́ЧЕСКИЙ (син. к-митотический агент) — митотический яд, вызывающий остановку митоза в прометафазе.

ЯД ТРУ́ПНЫЙ (истор.) — гипотетическое вещество, действию к-рого приписывали смертельные заболевания лиц, имевших дело с трупами; по современным представлениям, эти заболевания были обусловлены заражением патогенными микроорганизмами.

ЯДАССОНА АТРОФИ́ЧЕСКАЯ АНЕТОДЕРМИ́Я (J. Jadassohn, 1863—1936, нем. дерматолог) — см. *Анетодермия эритематозная.*

ЯДАССОНА КО́ЖНАЯ ПРО́БА (J. Jadassohn, 1863—1936, нем. дерматолог; син. йодный феномен) — метод диагностики болезни Дюринга, основанный на повышенной чувствительности больных к препаратам йода; заключается в наложении на кожу компресса с мазью, содержащей йодистый калий, на месте к-рого у больного появляется эритематозно-везикулезная сыпь.

ЯДАССОНА ПРО́БА (син. трехстаканная проба) — исследование мочи в трех порциях: I — промывная жидкость из передней уретры, II — моча из задней части уретры, III — моча из мочевого пузыря с содержимым выводных протоков предстательной железы и семенного бугорка; применяется при топической диагностике уретритов.

ЯДАССОНА ЭПИТЕЛИО́МА КО́ЖИ ТУ́ЛОВИЩА (J. Jadassohn, 1863—1936, нем. дерматолог; син. Борста — Ядассона интраэпидермальная эпителиома) — разновидность базалиомы, располагающаяся гл. обр. на коже туловища.

ЯДАССОНА — ЛЕВАНДО́ВСКОГО СИНДРО́М (J. Jadassohn, 1863—1936, нем. дерматолог; F. Levandowsky, 1879—1921, нем. дерматолог; син.: пахионихия врожденная, Сименса многоформный кератоз) — наследственная болезнь, характеризующаяся кератодермией с гипергидрозом, пахионихией, рассеянным фолликулярным кератозом на коленях и локтях, лейкокератозом на слизистых оболочках гл. обр. полости рта, нередко катарактой, дистрофией волос, зубов, дефектами интеллекта; наследуется по доминантному типу.

ЯДЕРНАЯ МЕМБРА́НА (nucleomembrana) — см. *Кариолемма.*

ЯДЕРНАЯ ОБОЛО́ЧКА — см. *Кариолемма.*

ЯДЕРНОЕ ОРУ́ЖИЕ (син. атомное оружие — нрк) — оружие массового поражения, уничтожения и разрушения, действие которого основано на выделении при ядерном взрыве большого количества энергии в форме ударной волны, светового и ионизирующего излучений, а также на образовании радиоактивных продуктов ядерного взрыва.

ЯДОВИ́ТОСТЬ — см. *Токсичность.*

ЯДОЗУ́БЫ (Helodermatidae) — семейство пресмыкающихся подотряда ящериц (Sauria), имеющих на нижней челюсти железы, секретирующие яд; распространены в США и Мексике.

ЯДРО(-А)[1] ц. н. с. (nucleus, PNA) — скопление серого вещества в определенном участке ц. н. с., обеспечивающее выполнение определенных функций.

Я. БАЗА́ЛЬНЫЕ (n. basales, PNA; син.: ганглии базальные — устар., Я. подкорковые) — Я., расположенные в основании полушарий большого мозга; к Я. б. относят хвостатое и чечевицеобразное Я., ограду и миндалевидное тело.

ЯДРО́ БЕ́ХТЕРЕВА — см. *Ядро преддверное верхнее.*

Я. БЛУЖДА́ЮЩЕГО НЕ́РВА ЗА́ДНЕЕ — (n. dorsalis nervi vagi, PNA)— Я., расположенное в продолговатом мозге, проецирующееся на дно ромбовидной ямки в области треугольника блуждающего нерва; содержит мультиполярные нейроны, аксоны к-рых образуют эфферентные парасимпатические волокна блуждающего нерва.

ЯДРО́ БУ́РДАХА — см. *Ядро клиновидного пучка.*

ЯДРО́ ВЕСТФА́ЛЯ — Э́ДИНГЕРА— см. *Ядро глазодвигательного нерва добавочное.*

Я. ВНУТРИПЛАСТИ́НЧАТЫЕ (n. intralaminares, PNA) — группа Я. таламуса, расположенных по ходу внутренней мозговой пластинки и являющихся местом окончания восходящих путей ретикулярной формации; включают центральные (медиальное, латеральное и срединное), парацентральное и парафасцикулярное Я.

Я. ВОРО́НКИ (n. infundibularis, PNA; n. ventromedialis parvocellularis) — Я., расположенное в гипоталамусе в месте соединения воронки и серого бугра под эпендимой III желудочка; состоит из мелких нейронов.

Я. ВСТА́ВОЧНОЕ (n. intercalatus, PNA; син. Стадерини ядро) — Я., расположенное в продолговатом мозге латерально от ядра подъязычного нерва; участвует в регуляции движений языка.

Я. ГЛАЗОДВИ́ГАТЕЛЬНОГО НЕ́РВА (n. nervi oculomotorii, PNA, BNA) — совокупность нескольких Я., расположенных в покрышке среднего мозга в составе центрального серого вещества и содержащих нейроны, аксоны к-рых образуют глазодвигательный нерв.

Я. ГЛАЗОДВИ́ГАТЕЛЬНОГО НЕ́РВА ДОБА́ВОЧНОЕ (n. oculomotorius accessorius, PNA; син.: Вестфаля — Эдингера ядро, Якубовича ядро) — Я., содержащее нейроны, аксоны к-рых образуют парасимпатические волокна, иннервирующие сфинктер зрачка и ресничную мышцу; входит в состав Я. глазодвигательного нерва.

Я. ГЛАЗОДВИ́ГАТЕЛЬНОГО НЕ́РВА ЦЕНТРА́ЛЬНОЕ ЗА́ДНЕЕ (n. posterior centralis; син. Перлиа ядро) — непарное Я., расположенное по средней линии между парными двигательными Я. глазодвигательных нервов; содержит мелкие вегетативные нейроны.

ЯДРО́ ГО́ЛЛЯ — см. *Ядро тонкого пучка.*

Я. ГРУДНО́Е (n. thoracicus, PNA; n. dorsalis, BNA, JNA; син.: Кларка ядро, Кларка — Штиллинга ядро) — Я., расположенное в основании заднего столба спинного мозга на протяжении от VIII шейного до II—III поясничных сегментов; содержит вторые нейроны заднего спинно-мозжечкового пути.

ЯДРО́ ДАРКШЕ́ВИЧА — см. *Даркшевича ядро.*

Я. ДВОЙНО́Е (n. ambiguus, PNA, BNA, JNA) — Я., расположенное в продолговатом мозге в составе ретикулярной формации; содержит нейроны, аксоны к-рых образуют двигательные волокна языкоглоточного, блуждающего и добавочного нервов.

ЯДРО́ ДЕ́ЙТЕРСА — см. *Ядро преддверное латеральное.*

Я. ДИАФРАГМА́ЛЬНОГО НЕ́РВА [n. nervi phrenici (n. phrenicus), PNA] — Я., расположенное в передних столбах спинного мозга на уровне III—V шейных сегментов; дает начало двигательным волокнам диафрагмального нерва.

Я. ДОБА́ВОЧНОГО НЕ́РВА (n. nervi accessorii, PNA) — Я., расположенное в переднем роге спинного мозга на уровне I—V шейных сегментов; дает начало спинномозговым корешкам добавочного нерва.

Я. ДОРСА́ЛЬНОЕ ЛАТЕРА́ЛЬНОЕ (n. lateralis dorsalis, PNA) — одно из вентролатеральных Я. таламуса, расположенное между его передними и задними ядрами; в Я. д. л. происходит переключение афферентных путей, идущих к коре теменной доли большого мозга.

Я. ДОРСА́ЛЬНОЕ МЕДИА́ЛЬНОЕ (n. medialis dorsalis, PNA; син. ядро дорсомедиальное) — Я. из группы медиальных Я. таламуса, граничащее спереди с околожелудочковым серым веществом, сзади — с внутрипластинчатыми ядрами; в Я. д. м. происходит переключение афферентных путей, идущих к коре глазничных извилин лобной доли большого мозга.

Я. ДОРСОЛАТЕРА́ЛЬНОЕ (n. dorsolateralis, PNA) — Я., расположенное в заднелатеральной части переднего рога спинного мозга на уровне его шейных и поясничных сегментов; дает начало нервным волокнам, иннервирующим мышцы плеча и бедра.

Я. ДОРСОМЕДИА́ЛЬНОЕ — 1) (n. dorsomedialis, PNA) — Я., расположенное в медиальной части переднего рога спинного мозга у его основания; дает начало нервным волокнам, иннервирующим мышцы шеи и туловища; 2) (n. dorsomedialis) таламуса — см. *Ядро дорсальное медиальное.*

Я. ДУГООБРА́ЗНОЕ (n. arcuatus, PNA; n. periventricularis arcuatus, n. periventricularis posterior ventralis) — Я., расположенное в средней части гипоталамуса вокруг нижнего

края III желудочка, дугообразно охватывая воронку; клетки Я. д. секретируют рилизинг-гормоны.

Я. ЗУБЧАТОЕ (n. dentatus, PNA, BNA, JNA; син. олива мозжечка) — самое крупное из Я. мозжечка, расположенное в переднемедиальной части белого вещества полушария; дает начало мозжечково-красноядерному и мозжечково-таламическому путям.

Я. ИНТЕРПЕДУНКУЛЯРНОЕ (n. interpeduncularis) — см. *Ядро межножковое.*

Я. ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЕ (n. interstitialis) — см. *Ядро промежуточное.*

ЯДРО КАХАЛЯ — см. *Ядро промежуточное.*

ЯДРО КЕЛЛИКЕРА — см. *Ядро шатра.*

ЯДРО КЛАРКА — см. *Ядро грудное.*

ЯДРО КЛАРКА — ШТИЛЛИНГА — см. *Ядро грудное.*

Я. КЛИНОВИДНОГО ПУЧКА (n. cuneatus, PNA; n. funiculi cuneati, BNA; n. partis lateralis fasciculi dorsalis, JNA; син. Бурдаха ядро) — Я., образующее бугорок на дорсальной поверхности продолговатого мозга; место окончания клиновидного пучка.

Я. КРАСНОЕ (n. ruber, PNA, BNA, JNA) — крупное Я. красновато-желтого цвета, расположенное в переднем отделе покрышки среднего мозга; относится к экстрапирамидной системе.

Я. КРОВЕЛЬНОЕ — см. *Ядро шатра.*

Я. МЕЖНОЖКОВОЕ (n. interpeduncularis, PNA; ganglion interpedunculare, BNA; ganglion intercrurale, JNA; син.: ганглий межножковый — устар., Я. интерпедункулярное) — Я., расположенное в среднем мозге между ножками большого мозга; место окончания изогнутого кзади пучка; у человека развито слабо.

Я. МИНДАЛЕВИДНОЕ (устар.) — см. *Миндалевидное тело.*

Я. МОСТА (n. pontis, PNA, BNA, JNA) — общее название Я., расположенных в вентральной части моста и входящих в состав путей, связывающих кору большого мозга с корой полушарий мозжечка.

Я. НАДЗРИТЕЛЬНОЕ (n. supraopticus, PNA) — Я., расположенное в передней части гипоталамуса над зрительным перекрестком; дает начало надзрительно-гипофизарному пути.

Я. ОДИНОЧНОГО ПУТИ (n. tractus solitarii, PNA, BNA, JNA) — расположенное в продолговатом мозге Я., на нейронах к-рого заканчиваются волокна одиночного пути (волокна лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов, проводящие вкусовую чувствительность).

Я. ОКОЛОЖЕЛУДОЧКОВЫЕ (n. paraventriculares) — см. *Ядра паравентрикулярные.*

Я. ОЛИВНОЕ (n. olivaris, PNA; n. olivaris inferior, BNA; n. olivae, JNA) — Я., расположенное в оливе продолговатого мозга; относится к экстрапирамидной системе.

Я. ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНЫЕ (n. paraventriculares, PNA; син. Я. околожелудочковые) — Я., расположенные в передней части гипоталамуса; примыкают к стенке III желудочка, дают начало надзрительно-гипофизарному пути.

Я. ПАРАМЕДИАННОЕ ДОРСАЛЬНОЕ [n. paramedianus dorsalis (posterior), PNA; син. Я. парамедианное заднее, Якобсона ядро] — Я., расположенное в продолговатом мозге близ средней линии; примыкает к ядру подъязычного нерва, участвует в регуляции двигательной функции языка.

Я. ПАРАМЕДИАННОЕ ЗАДНЕЕ (n. paramedianus posterior) — см. *Ядро парамедианное дорсальное.*

Я. ПАРАФАСЦИКУЛЯРНОЕ (n. parafascicularis, PNA) — внутрипластинчатое Я., через заднюю часть к-рого проходит отогнутый пучок.

Я. ПАРАЦЕНТРАЛЬНОЕ (n. paracentralis, PNA) — внутрипластинчатое Я., расположенное в передненижней части внутренней мозговой пластинки таламуса.

Я. ПЕРЕДНЕЛАТЕРАЛЬНОЕ (n. ventrolateralis, PNA) — Я., расположенное в переднелатеральной части переднего рога спинного мозга в области шейного и поясничного утолщений; содержит нейроны, иннервирующие мышцы конечностей.

Я. ПЕРЕДНЕМЕДИАЛЬНОЕ (n. ventromedialis, PNA) — Я., расположенное в медиальной части переднего рога спинного мозга; содержит нейроны, иннервирующие мышцы шеи и туловища.

Я. ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ — Я., в к-рых происходит передача нервных импульсов с афферентных на эфферентные проводящие пути.

Я. ПОВОДКА (n. habenulae medialis et lateralis, PNA; син. ганглии поводка — устар.) — Я., расположенные в поводке эпиталамуса; содержат нейроны, аксоны к-рых образуют отогнутый пучок.

Я. ПОДБУГОРНОЕ (n. subthalamicus, PNA; n. hypothalamicus, BNA, JNA; син. Люисово тело) — Я., расположенное в заднем отделе гипоталамуса; относится к экстрапирамидной системе.

Я. ПОДКОРКОВЫЕ — см. *Ядра базальные.*

Я. ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА (n. nervi hypoglossi, PNA, BNA; n. originis nervi hypoglossi, JNA) — Я., расположенное в продолговатом мозге, проецирующееся на дно ромбовидной ямки в области треугольника подъязычного нерва; аксоны мотонейронов Я. п. н. образуют подъязычный нерв.

Я. ПРЕДДВЕРНОЕ ВЕРХНЕЕ (n. vestibularis superior, PNA; n. terminalis dorsalis, JNA; син.: Бехтерева ядро, Я. угловое) — Я., расположенное в латеральном углу ромбовидной ямки над латеральным преддверным Я. и содержащее нейроны, на к-рых заканчиваются волокна преддверной части улитково-преддверного нерва.

Я. ПРЕДДВЕРНОЕ ЛАТЕРАЛЬНОЕ (n. vestibularis lateralis, PNA; terminalis lateralis, JNA; син. Дейтерса ядро) — Я., расположенное в латеральной части преддверного поля ромбовидной ямки и содержащее нейроны, на к-рых заканчиваются волокна преддверной части улитково-преддверного нерва.

Я. ПРЕДДВЕРНОЕ МЕДИАЛЬНОЕ (n. vestibularis medialis, PNA; n. terminalis medialis, JNA; син.: Швальбе ядро, Я. треугольное) — Я., расположенное в медиальной части преддверного поля ромбовидной ямки и содержащее нейроны, на к-рых заканчиваются волокна преддверной части преддверно-улиткового нерва.

Я. ПРОБКОВИДНОЕ (n. emboliformis, PNA, BNA, JNA) — Я., расположенное медиально от зубчатого Я. мозжечка; нервные волокна от Я. п. идут к внутрипластинчатым ядрам таламуса.

Я. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ (n. interstitialis; син.: Кахаля ядро, Я. интерстициальное) — Я., расположенное в покрышке среднего мозга у переднего конца водопровода мозга; дает начало медиальному продольному пучку.

Я. РЕТРОДОРСОЛАТЕРАЛЬНОЕ (n. retrodorsolateralis, PNA) — Я., расположенное в переднем роге спинного мозга кзади от дорсолатерального ядра на уровне VIII шейного — I грудного и I—III крестцовых сегментов; нейроны, входящие в Я. р., иннервируют мышцы, осуществляющие движения пальцев кисти и стопы.

ЯДРО РОЛЛЕРА — см. *Роллера ядро.*

Я. РОМБОВИДНОЕ (n. rhomboidalis, PNA; area paramediana intermedia) — Я. из группы срединных Я. таламуса, представляющее собой участок серого вещества, примыкающий к медиальным Я. таламуса.

Я. СЛЕЗНОЕ (n. lacrimalis, PNA) — часть верхнего слюноотделительного Я., нейроны к-рой посылают преганглионарные волокна в составе промежуточного нерва к крылонебному узлу, иннервируя слезную железу, носовые и небные железы.

Я. СЛЮНООТДЕЛИТЕЛЬНОЕ ВЕРХНЕЕ (n. salivatorius superior, PNA) — Я., расположенное в верхнем отделе ромбовидной ямки; нейроны, входящие в Я. с. в., посылают преганглионарные волокна в составе промежуточного нерва к крылонебному и поднижнечелюстному узлам, иннервируя слезную, носовые, небные, поднижнечелюстную и подъязычную слюнные железы.

Я. СЛЮНООТДЕЛИТЕЛЬНОЕ НИЖНЕЕ (n. salivatorius inferior, PNA) — Я., расположенное в нижнем отделе ромбовидной ямки; нейроны, входящие в Я. с. н., посылают преганглионарные волокна в составе языкоглоточного нерва к ушному ганглию, иннервируя околоушную железу.

Я. СОЕДИНЯЮЩЕЕ (n. reuniens, PNA) — Я. из группы центральных Я. таламуса, своей медиальной частью заходящее в спайку, соединяющую левый и правый таламус (межталамическое сращение); латерально граничит с внутрипластинчатыми Я.

Я. СПАЕЧНОЕ (n. commissuralis, PNA) — непарное Я., расположенное в нижнем отделе продолговатого мозга между правым и левым Я. одиночного пути; место окончания части волокон этого пути.

Я. СПИННОМОЗГОВОГО ПУТИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА (n. tractus spinalis nervi trigemini, PNA, BNA; n. terminalis tractus spinalis nervi

trigemini, JNA) — Я., расположенное в верхних шейных сегментах спинного мозга, продолговатом мозге и в нижней части покрышки моста; на нейронах его заканчиваются афферентные волокна, идущие от ганглия тройничного нерва (гассерова узла).

ЯДРО́ СТАДЕРИ́НИ — см. *Ядро вставочное.*

Я. ТАЛА́МУСА ВЕНТРОЛАТЕРА́ЛЬНЫЕ [n. ventrolaterales (thalami), PNA — группа ядер в нижнелатеральной части таламуса, являющихся местом переключения афферентных нервных путей, идущих в кору теменной доли.

Я. ТАЛА́МУСА ЗА́ДНИЕ [n. n. posteriores (thalami), PNA] — группа Я., расположенных в коленчатых телах и подушке таламуса и образующих подкорковые центры зрения и слуха.

Я. ТАЛА́МУСА МЕДИА́ЛЬНЫЕ [n. mediales (thalami), PNA] — группа Я., расположенных в медиальной части таламуса, посылающих нервные импульсы в кору лобной доли большого мозга.

Я. ТАЛА́МУСА ПЕРЕ́ДНИЕ (n. anteriores thalami, PNA, BNA; n. rostralis, JNA) — группа Я., расположенных в передней части таламуса, передающих обонятельные импульсы в кору лобной доли большого мозга.

Я. ТАЛА́МУСА СРЕДИ́ННЫЕ [n. mediani (thalami), PNA] — группа Я. таламуса, примыкающих к стенке III желудочка; включает паравентрикулярные, ромбовидное и соединяющее ядра.

Я. ТО́НКОГО ПУЧКА́ (n. gracilis, PNA; n. funiculi gracilis, BNA; n. partis medialis funiculi dorsalis, JNA; син. Голля ядро) — Я., расположенное на дорсальной поверхности продолговатого мозга; место окончания тонкого пучка.

Я. ТРАПЕЦИЕВИ́ДНОГО ТЕ́ЛА (n. corporis trapezoidei ventralis et dorsalis, PNA) — группа Я., расположенных среди пучков трапециевидного тела; в Я. т. т. оканчиваются нервные волокна, идущие из ядер улитковой части преддверно-улиткового нерва, и начинаются нервные волокна, входящие в состав латеральной петли.

Я. ТРИАНГУЛЯ́РНОЕ (n. triangularis) — см. *Ядро преддверное медиальное.*

Я. УГЛОВО́Е (n. angularis) — см. *Ядро преддверное верхнее.*

Я. ХВОСТА́ТОЕ (n. caudatus, PNA, BNA, JNA) — одно из базальных Я., примыкающее к боковому желудочку, отделенное внутренней капсулой от чечевицеобразного Я. и таламуса; вместе со скорлупой чечевицеобразного Я. составляет неостриатум.

Я. ЦЕНТРА́ЛЬНОЕ (n. centralis, PNA) — Я., расположенное в средней части переднего рога спинного мозга; содержит нейроны, иннервирующие мышцы верхних и нижних конечностей.

Я. ЧЕ́РЕПНО-МОЗГОВЫ́Х НЕ́РВОВ — см. *Ядра черепных нервов.*

Я. ЧЕРЕПНЫ́Х НЕ́РВОВ (n. nervorum cranialium, PNA; n. nervorum cerebralium, BNA; n. nervorum capitalium, JNA; син. Я. черепно-мозговых нервов) — Я., расположенные в среднем мозге, мосту, продолговатом мозге и шейных сегментах спинного мозга, отдающие или принимающие нервные волокна, к-рые входят в состав III—XII пар черепных нервов.

Я. ЧЕРЕПНЫ́Х НЕ́РВОВ КОНЦЕВЫ́Е (n. terminationis, PNA; n. terminales, BNA, JNA) — Я. ч. н., в к-рых заканчиваются чувствительные волокна.

Я. ЧЕРЕПНЫ́Х НЕ́РВОВ НАЧА́ЛЬНЫЕ (n. originis, PNA, BNA, JNA) — Я. ч. н., в к-рых берут начало эфферентные волокна.

Я. ЧЕЧЕВИЦЕОБРА́ЗНОЕ (n. lentiformis, PNA, BNA, JNA) — одно из базальных Я., отделенное внутренней капсулой от хвостатого ядра и таламуса, а наружной капсулой — от ограды; делится прослойками белого вещества на скорлупу и бледный шар.

Я. ЧЕЧЕВИЦЕОБРА́ЗНОЙ ПЕ́ТЛИ (n. ansae lenticularis, PNA) — Я., расположенное в дорсальной части гипоталамуса по ходу чечевицеобразной петли.

Я. ШАРОВИ́ДНОЕ (n. globosus, PNA, BNA; n. globiformis, JNA) — Я., расположенное в медиальной части белого вещества мозжечка.

Я. ШАТРА́ (n. fastigii, PNA, BNA, JNA; син.: Келликера ядро, Я. кровельное, Я. шатра мозжечка) — Я., расположенное в черве мозжечка над крышей IV желудочка и связанное с преддверными Я.

Я. ШАТРА́ МОЗЖЕЧКА́ — см. *Ядро шатра.*

Я. ШВА (n. raphes, PNA) — Я., расположенные по средней линии продолговатого мозга.

ЯДРО́ ШВА́ЛЬВЕ — см. *Ядро преддверное медиальное.*

ЯДРО́ ЯКОВСО́НА — см. *Ядро парамедианное дорсальное.*

ЯДРО́ ЯКУБО́ВИЧА — см. *Ядро глазодвигательного нерва добавочное.*

ЯДРО́[2] клетки [nucleus (caryon), LNH] — часть клетки у эукариотов, в к-рой сосредоточена основная масса дезоксирибонуклеиновой кислоты, являющейся носителем генетической информации; Я. отграничено от цитоплазмы кариолеммой.

ЯДРО́ БЕКЛА́РА — см. *Беклара ядро.*

ЯДРО́ ЖЕЛТО́ЧНОЕ — органоид ооцита (или яйцеклетки), содержащий белки и нуклеопротеиды, богатый рибонуклеиновой кислотой; является центром образования желтка, на поздних стадиях оогенеза распадается на гранулы и рассеивается в цитоплазме.

ЯДРО́ ОКОСТЕНЕ́НИЯ — см. *Точка окостенения.*

ЯДРО́ СТУДЕНИ́СТОЕ (nucleus pulposus, PNA, BNA, JNA) — центральная часть межпозвоночного диска, состоящая из упругой студенистой хрящевой ткани; через Я. с. проходят оси движения позвоночного столба.

ЯДРО́ ХРУСТА́ЛИКА (nucleus lentis, PNA, BNA, JNA) — внутренняя, наиболее плотная часть хрусталика.

Я. ХРУСТА́ЛИКА ВЗРОСЛОЕ — см. *Ядро хрусталика зрелое.*

Я. ХРУСТА́ЛИКА ЗРЕ́ЛОЕ (син.: Я. хрусталика взрослое, Я. хрусталика старческое) — часть Я. хрусталика, окружающая эмбриональное Я. хрусталика и представляющая собой уплотнение волокон хрусталика, развивающееся к 20 годам и в последующем постепенно увеличивающееся.

Я. ХРУСТА́ЛИКА СТА́РЧЕСКОЕ — см. *Ядро хрусталика зрелое.*

Я. ХРУСТА́ЛИКА ЭМБРИОНА́ЛЬНОЕ — центральная часть Я. хрусталика, представляющая собой два рядом расположенных овальных уплотнения волокон хрусталика; развивается в ходе внутриутробного развития.

ЯДРЫ́ШКО (nucleolus, LNH) — плотный компонент ядра клетки, состоящий в основном из рибонуклеопротеидов; участвует в образовании рибосом.

ЯЗВА (ulcus) — дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей, процессы заживления к-рого (развитие грануляций, эпителизация) нарушены или существенно замедлены.

Я. АТЕРОСКЛЕРОТИ́ЧЕСКАЯ (u. atheroscleroticum) — циркуляторная Я. желудка или двенадцатиперстной кишки, развивающаяся в пожилом возрасте при атеросклерозе мезентериальных сосудов, характеризующаяся большими размерами и отсутствием выраженных болей.

Я. БЕССИМПТО́МНАЯ (u. asymptomicum; син. Я. немая) — Я. желудка или двенадцатиперстной кишки, не проявляющаяся какими-либо симптомами; обнаруживается при рентгенологическом, гастроскопическом исследовании или при внезапной перфорации.

Я. БРЮШНОТИФО́ЗНАЯ (u. abdominotyphosum) — Я. подвздошной кишки, образующаяся при брюшном тифе в результате воспаления лимфатических фолликулов; отличается глубиной, опасностью пенетрации и перфорации.

Я. ВУЛЬБА́РНАЯ (u. bulbare) — Я. двенадцатиперстной кишки, локализующаяся в ее луковице.

Я. ВАКЦИНА́ЛЬНАЯ (истор.; u. vaccinale) — глубокая болезненная Я. кратерообразной формы, возникавшая как осложнение вакцинации против оспы, чаще при преждевременном или случайном насильственном отторжении корочки на месте пустулы; сопровождалась лихорадкой.

Я. ВАРИКО́ЗНАЯ (u. varicosum; син. Я. циркуляторная варикозная) — трофическая Я. на коже нижних конечностей, обусловленная нарушением венозного оттока при варикозном расширении вен.

Я. ГАНГРЕНО́ЗНАЯ (u. gangraenosum) — 1) Я., возникшая на месте участка гангрены кожи; 2) Я., характеризующаяся внезапно наступившим некрозом ее дна и стенок.

Я. ДВОЙНА́Я (u. duplex) — две Я., одновременно наличествующие в одном отделе пищеварительного тракта; наблюдается при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Я. КАЛЛЕ́ЗНАЯ (u. callosum) — хроническая Я. желудка, кишки или пищевода с плотными краями и дном вследствие интенсивного развития рубцовой ткани.

ЯЗВА КУ́ШИНГА — см. *Кушинга язва.*

Я. ЛУЧЕВА́Я (u. radiale) — Я., возникшая в результате воздействия ионизирующего излучения.

Я. МАЛИГНИЗИ́РОВАННАЯ (u. malignisatum; син.: язва озлокачествленная, язва-рак) — Я., в краях

к-рой появились комплексы атипичных клеток, склонные к пролиферации.

Я. НЕЙРОТРОФИ́ЧЕСКАЯ (u. neurotrophicum) — трофическая Я., обусловленная поражением какого-либо отдела нервной системы.

Я. НЕМА́Я (u. mutum) — см. *Язва бессимптомная.*

Я. ОЗЛОКА́ЧЕСТВЛЕННАЯ (u. malignisatum) — см. *Язва малигнизированная.*

Я. ОКОЛОПРИВРА́ТНИКОВАЯ (u. parapyloricum) — Я. желудка, локализующаяся в области его привратника.

Я. ОСЛОЖНЁННАЯ (u. complicatum) — Я., в стенках и (или) дне к-рой произошла малигнизация или образование плотных рубцов, или Я., распространившаяся в глубину настолько, что это привело к повреждению кровеносных сосудов и (или) соседних органов.

Я. О́СТРАЯ (u. acutum) — Я. желудка, кишки или пищевода, характеризующаяся преобладанием процессов экссудаций и некроза, зона к-рых нечетко отграничена от здоровых тканей; обычно имеет неправильную форму.

Я. ПЕНЕТРИ́РУЮЩАЯ (u. penetrans) — Я. желудка, кишки или пищевода, характеризующаяся разрушением всех слоев стенки пораженного органа и повреждением соседнего органа с образованием полости (канала), не сообщающейся с полостями тела (брюшинной, плевральной).

Я. ПЕПТИ́ЧЕСКАЯ (u. pepticum) — Я. желудка, кишки или пищевода, развившаяся вследствие разрушающего действия желудочного сока на слизистую оболочку.

Я. ПЕРФОРИ́РУЮЩАЯ (u. perforans) — см. *Язва перфоративная.*

Я. ПЕРФОРАТИ́ВНАЯ (u. perforativum; син. Я. перфорирующая) — Я. слизистой оболочки какого-либо органа, характеризующаяся разрушением его стенки на всю толщу с образованием канала, сообщающего полость или просвет пораженного органа с соседней полостью.

Я. ПИЩЕВО́ДА БЭ́РРЕТА — см. *Бэррета язва пищевода.*

Я. ПИЩЕВО́ДА ДЕКУБИТА́ЛЬНАЯ (u. oesophagi decubitale; син. язва-пролежень пищевода) — Я. пищевода, развивающаяся вследствие длительного механического воздействия зонда на его стенку, напр. при питании через зонд, при аспирации содержимого желудка.

Я. ПОЛЗУ́ЧАЯ (u. serpens; син. Я. серпигинозная) — Я., постепенно распространяющаяся в сторону одного из краев, в то время как с противоположного края происходит ее заживление.

Я. ПОСТБУЛЬБА́РНАЯ (u. postbulbare) — Я. двенадцатиперстной кишки, локализующаяся дистальнее ее луковицы.

Я. ПРОГРЕССИ́РУЮЩАЯ (u. progrediens) — см. *Язва фагеденическая.*

Я. ПУТРИ́ДНАЯ (u. putridum) — Я. с зловонным гнилостным отделяемым.

Я. САПНА́Я (u. malleosum) — поверхностная или кратерообразная вяло гранулирующая Я., образующаяся при сапе и характеризующаяся неровными краями, желтоватым дном и значительным гнойным отделяемым.

Я. СЕРПИГИНО́ЗНАЯ (u. serpiginosum; лат. serpens змея) — см. *Язва ползучая.*

Я. СТЕРО́ИДНАЯ (u. steroideum) — большая поверхностная Я. слизистой оболочки какого-либо органа пищеварительного тракта, чаще желудка, обусловленная длительным применением стероидных гормонов; нередко при Я. с. возникают массивные желудочно-кишечные кровотечения.

Я. СТРЕ́ССОВАЯ — большая поверхностная Я. желудка, быстро развивающаяся в результате стресса.

Я. ТРОФИ́ЧЕСКАЯ (u. trophicum) — общее название Я., вызванных и поддерживаемых нарушением кровоснабжения тканей или их иннервации.

Я. ТРОФИ́ЧЕСКАЯ О́СТРАЯ КУ́РЛИНГА — см. *Курлинга острая трофическая язва.*

Я. ФАГЕДЕНИ́ЧЕСКАЯ (u. phagedaenicum; греч. phagedainikos разъедающий; син. Я. прогрессирующая) — Я., при к-рой скорость распада тканей резко преобладает над скоростью их регенерации, вследствие чего размеры Я. непрерывно увеличиваются.

Я. ФУНГО́ЗНАЯ (u. fungosum; лат. fungus гриб) — Я., при к-рой разрастание грануляций происходит в виде гриба, выступающего над поверхностью кожи.

Я. ХИМИ́ЧЕСКАЯ (u. chemicum) — Я., возникшая на участке кожи или слизистой оболочки, длительно или повторно контактирующем с нек-рыми химическими веществами.

Я. ХРОНИ́ЧЕСКАЯ (u. chronicum) — Я., характеризующаяся преобладанием продуктивных процессов, разрастанием в ее краях и дне грануляционной и соединительной ткани, четко разграничивающей пораженные и здоровые ткани.

Я. ЦИРКУЛЯТО́РНАЯ (u. circulatorium) — трофическая Я., возникшая вследствие местного расстройства кровообращения.

Я. ЦИРКУЛЯТО́РНАЯ ВАРИКО́ЗНАЯ (u. circulatorium varicosum) — см. *Язва варикозная.*

Я. ЦИРКУЛЯТО́РНАЯ ИШЕМИ́ЧЕСКАЯ (u. circulatorium ischaemicum) — трофическая Я., обусловленная недостаточным притоком артериальной крови, напр. в центре обширного кожного рубца или при облитерирующем артериите.

Я. ЧУМНА́Я (u. pestilens) — резко болезненная Я., возникающая при кожной форме чумы в месте внедрения возбудителя, характеризующаяся плотным инфильтрированным дном желтоватого цвета, позже покрывающаяся черным струпом, окруженным багровым валиком.

ЯЗВА АТЕРОМАТО́ЗНАЯ (ulcus atheromatosum) — дефект внутренней оболочки аорты и крупной артерии, образовавшийся при распаде атеросклеротической бляшки.

ЯЗВА АШХАБА́ДСКАЯ (устар.) — см. *Лейшманиоз кожный Старого Света.*

ЯЗВА БУРУ́ЛИ (ulcus buruli) — инфекционная болезнь, эндемичная для ряда стран Центральной и Восточной Африки, вызываемая Mycobacterium ulcerans; характеризуется некрозом участков кожи с подкожной клетчаткой и последующим образованием, гл. обр. на нижних конечностях, обширных глубоких безболезненных язв при отсутствии изменений в лимфатических сосудах и узлах.

ЯЗВА ВЕНЕРИ́ЧЕСКАЯ (ulcus venericum) — см. *Шанкр мягкий.*

ЯЗВА ВУ́ЛЬВЫ О́СТРАЯ (ulcus vulvae acutum) — см. *Чапина — Липшютца острая язва вульвы.*

ЯЗВА ГУ́ННЕРОВСКАЯ — см. *Гуннеровская язва.*

ЯЗВА ДЖУ́НГЛЕВАЯ — см. *Язва тропическая.*

ЯЗВА ПЕНДИ́НСКАЯ (ulcus Penden) — см. *Лейшманиоз кожный Старого Света.*

ЯЗВА ПИЩЕВО́ДА ВАРИКО́ЗНАЯ (ulcus oesophagi varicosum) — повреждение пищевода вследствие разрыва его варикозно расширенной вены при портальной гипертензии (гл. обр., при циррозе печени); сопровождается кровотечением.

ЯЗВА ПСЕВДОВЕНЕРИ́ЧЕСКАЯ (ulcus pseudovenericum) — см. *Чапина — Липшютца острая язва вульвы.*

ЯЗВА РАЗЪЕДА́ЮЩАЯ МО́РЕНА — см. *Язва роговицы разъедающая.*

ЯЗВА РОГОВИ́ЦЫ (ulcus corneae; син. кератит язвенный) — воспаление роговицы, сопровождающееся некрозом ее ткани с образованием дефекта; может являться причиной возникновения бельма.

Я. РОГОВИ́ЦЫ ДИПЛОБАЦИЛЛЯ́РНАЯ (u. corneae diplobacillare; син. Моракса — Аксенфельда язва роговицы) — Я. р., вызванная палочкой Моракса — Аксенфельда; протекает обычно на фоне ангулярного конъюнктивита.

Я. РОГОВИ́ЦЫ КРАЕВА́Я (u. corneae marginale) — Я. р., возникающая у лимба в виде небольшого поверхностного дефекта полулунной формы; встречается гл. обр. у пожилых людей.

Я. РОГОВИ́ЦЫ ПОЛЗУ́ЧАЯ (u. corneae serpens; син. гипопион-кератит) — Я. р., распространяющаяся в сторону одного из ее краев, в то время как с противоположного края происходит эпителизация; в процесс быстро вовлекаются глубокие слои роговицы и радужки с образованием гипопиона; возникает после инфицированных (чаще пневмококком) микротравм роговицы.

Я. РОГОВИ́ЦЫ РАЗЪЕДА́ЮЩАЯ (u. corneae rodens; син. Морена разъедающая язва) — болезнь неизвестной этиологии, характеризующаяся образованием вначале неглубоких сливающихся Я. р., расположенных по периферии в виде полулуния, медленно распространяющихся по всей поверхности роговицы и замещающихся рубцом.

Я. РОГОВИ́ЦЫ ТРАХОМАТО́ЗНАЯ (u. corneae trachomatosum) — Я. р. при трахоме, возникающая в прозрачной части роговицы на границе паннуса.

ЯЗВА СИБИ́РСКАЯ (anthrax; син. карбункул злокачественный — устар.) — острая инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, вызываемая Bacillus anthracis и протекающая в кожной (с образованием

карбункула и язвы) или генерализованной форме в зависимости от места внедрения возбудителя, обусловленного путем передачи инфекции.

Я́ЗВА СИФИЛИТИ́ЧЕСКАЯ (ulcus syphiliticum) — см. *Шанкр твердый.*

Я́ЗВА ТРОПИ́ЧЕСКАЯ (ulcus tropicum; син. язва джунглевая) — дерматоз неясной этиологии в виде быстро развивающейся глубокой язвы, чаще на голени, приводящей к разрушению костей.

Я́ЗВА ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ ВТОРИ́ЧНАЯ (ulcus tuberculosum secundarium) — см. *Туберкулез кожи и слизистых оболочек милиарный язвенный.*

Я́ЗВА ЧИКЛЕ́РОВ — клинико-этиологический вариант кожного лейшманиоза Нового Света, вызываемый Leishmania mexicana, эндемичный для влажных низменных лесов Центральной Америки; характеризуется единичными, быстро заживающими язвами, а при локализации процесса на ушной раковине — деструкцией ее хряща.

Я́ЗВА-ПРО́ЛЕЖЕНЬ ПИЩЕВО́ДА — см. *Язва пищевода декубитальная.*

Я́ЗВА-РАК — см. *Язва малигнизированная.*

Я́ЗВЫ КРЫЛОВИ́ДНЫЕ (ulcera pterygoidea) — см. *Афты новорожденных.*

Я́ЗЫК (lingua, PNA, BNA, JNA) — мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, расположенный в полости рта; участвует в жевании, артикуляции, содержит вкусовые рецепторы; при нек-рых патологических процессах возникают характерные изменения Я.

Я. ЛАКИРОВАННЫЙ — Я. с ярко-красной гладкой блестящей поверхностью, обусловленный атрофией сосочков Я.; признак рака желудка, хронических колитов, пеллагры, спру, арибофлавиноза.

Я. ОБЛО́ЖЕННЫЙ (l. saburralis) — Я. с бледновато-серой поверхностью; наблюдается при многих болезнях органов пищеварительного аппарата, при лихорадочных состояниях.

Я. СКЛА́ДЧАТЫЙ (l. plicata) — Я. с выраженными складками поверхности; признак синдрома Мелькерсона — Розенталя, может наблюдаться и при акромегалии.

Я. «ТИГРО́ВЫЙ» — сухой обложенный Я. с продольными и поперечными темными полосами; признак белой горячки.

Я. ТИФО́ЗНЫЙ (l. typhosa) — утолщенный Я. с серовато-белым налетом и яркой гиперемией свободных от налета кончика и краев, на к-рых видны отпечатки зубов; ранний дифференциально-диагностический признак брюшного тифа.

Я. ФУЛИГИНО́ЗНЫЙ (l. fuliginosa; fuligo, fuliginis сажа) — сухой Я. с темно-коричневым или черным налетом; наблюдается при тяжелых лихорадочных состояниях.

Я́ЗЫК «ГЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ» (lingua geographica) — см. *Глоссит десквамативный.*

Я́ЗЫК ГУ́НТЕРОВСКИЙ (W. Hunter, 1861—1937, англ. врач) — см. *Гунтеровский глоссит.*

Я́ЗЫК ДВОЙНО́Й (lingua bifida) — аномалия развития: расщепление языка по средней линии.

Я́ЗЫК ИСКУ́ССТВЕННЫЙ в психиатрии — патологическое «средство общения» больных шизофренией: речь, состоящая из непонятных или искаженных слов с особым синтаксисом.

Я́ЗЫК МАЛИ́НОВЫЙ — см. *Гунтеровский глоссит.*

Я́ЗЫК ПРОГРАММИ́РОВАНИЯ — см. *Алгоритмический язык.*

ЯЗЫКОДЕРЖА́ТЕЛЬ — инструмент для захватывания, вытягивания и удерживания языка при хирургических операциях, представляющий собой зажим с кремальерой и губками различной формы.

ЯЗЫКОЗАЩИ́ТНИК — инструмент лопаткообразной формы, предназначенный для защиты языка и щеки при препаровке нижних моляров и премоляров под коронки.

Я́ЗЫЧКОВАЯ ВЕТВЬ (ramus lingularis, PNA) — 1) см. т. 1, Перечень анат. терминов, *411*; 2) см. т. 1, Перечень анат. терминов, *1195*.

Я́ЗЫЧКОВАЯ ВЕТВЬ ВЕ́РХНЯЯ (ramus lingularis superior, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *412*.

Я́ЗЫЧКОВАЯ ВЕТВЬ НИ́ЖНЯЯ (ramus lingularis inferior, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *410*.

Я́ЗЫЧНО-ЛИЦЕВО́Й СТВОЛ (truncus linguofacialis, PNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *413*.

Я́ЗЫЧОК мозжечка (lingula, PNA; lingula cerebelli, BNA, JNA) — долька червя мозжечка, входящая в состав передней доли мозжечка.

Я́ЗЫЧОК МОЧЕВО́ГО ПУЗЫРЯ́ (uvula vesicae, PNA, BNA, JNA) — выпячивание слизистой оболочки мочевого пузыря позади внутреннего отверстия мочеиспускательного канала, обусловленное прилеганием средней доли предстательной железы.

Я́ЗЫЧОК НЁБНЫЙ (uvula palatina, PNA, BNA, JNA) — срединный выступ заднего края мягкого неба, образованный дубликатурой слизистой оболочки, внутри к-рой заключены фиброзная пластинка и мышца язычка.

Я́ЙЧКО (testis, PNA, BNA, JNA) — парная мужская половая железа, расположенная в мошонке; место развития сперматозоидов и выработки андрогенов.

Я́ЙЧКО ДОБА́ВОЧНОЕ (testis accessorius) — третье Я., представляющее собой аномалию развития; может иметь или отдельный, или общий с нормальным яичком, или недоразвитый семявыносящий проток.

Я́ЙЧКО МИГРИ́РУЮЩЕЕ — см. *Крипторхизм ложный.*

Я́ЙЧНИК (ovarium, PNA, BNA, JNA) — парная женская половая железа, расположенная на боковой стенке малого таза; место образования и созревания яйцеклеток и выработки эстрогенов и прогестерона.

Я́ЙЧНИКОВАЯ БАХРО́МКА (fimbria ovarica, PNA, BNA, JNA) — самый крупный отросток края воронки маточной трубы, достигающий поверхности яичника.

Я́ЙЧНИКОВАЯ ВЕТВЬ (ramus ovaricus, PNA, JNA) — см. т. 1, Перечень анат. терминов, *510*.

Я́ЙЧНИКОВАЯ ЯМКА (fossa ovarica, PNA) — углубление париетальной брюшины на боковой стенке малого таза позади широкой маточной связки, в к-ром расположен яичник.

Я́ЙЧНИКОВЫЙ ЦИ́КЛ (син. овариальный цикл) — последовательный ряд физиологических процессов созревания яйцеклетки и фолликула, его разрыва с выхождением из него яйцеклетки и образования на месте лопнувшего фолликула желтого тела, длящаяся 21—28 дней и циклически повторяющаяся у половозрелой женщины.

Я́ЙЦЕВО́Д (oviductus) — 1) трубчатый, обычно парный орган у самок животных, по к-рому перемещается зрелая яйцеклетка; у нек-рых групп животных (пресмыкающихся, птиц) в Я. происходит также образование оболочек яйца; 2) см. *Маточная труба.*

Я́ЙЦЕВО́Й БУГОРО́К (син. бугорок оплодотворения) — цитоплазматический вырост яйцеклетки в направлении проникающего в нее сперматозоида.

Я́ЙЦЕВЫ́Е ТРУ́БКИ (син.: Пфлюгера мешки, яйценосные тяжи) — тяжи, состоящие из овогоний и клеток поверхностного эпителия, покрывающего яичник, внедряющиеся в мезенхимную основу яичника в ходе его внутриутробного развития.

Я́ЙЦЕВЫ́Е ШАРЫ́ — шарообразные клеточные комплексы, образующиеся в яичнике зародыша у млекопитающих и человека, состоящие из нескольких овогоний и множества клеток фолликулярного эпителия.

Я́ЙЦЕКЛЕ́ТКА (ovum, LNH; син.: оотида, яйцо) — женская половая клетка, к-рая в результате оплодотворения ее сперматозоидом или реже путем партеногенеза (без оплодотворения) дает начало зародышу; содержит гаплоидный набор хромосом.

Я. АЛЕЦИТА́ЛЬНАЯ (o. alecithale; греч. отрицательная приставка *а-* + lekithos яичный желток) — Я., не содержащая дейтероплазмы; свойственна паразитическим плоским червям, зародыши к-рых используют питательный материал желточных клеток, окружающих яйцеклетку.

Я. ГОЛОБЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (o. holoblasticum; греч. holos весь, целый + blastos росток, зародыш) — Я., целиком дробящаяся на бластомеры, из к-рых строится тело зародыша; свойственна, напр., почти всем млекопитающим.

Я. ГОМОЛЕЦИТА́ЛЬНАЯ (o. homolecithale; греч. homos тот же самый, одинаковый + lekithos яичный желток) — см. *Яйцеклетка изолецитальная.*

Я. ИЗОЛЕЦИТА́ЛЬНАЯ (o. isolecithale; греч. isos равный + lekithos яичный желток; син.: Я. гомолецитальная, Я. олиголецитальная) — Я. микроскопических размеров, содержащая малое количество дейтероплазмы, к-рая почти равномерно распределена по цитоплазме; свойственна иглокожим, ланцетнику, живородящим млекопитающим.

Я. МЕЗОЛЕЦИТА́ЛЬНАЯ (o. mesolecithale; греч. mesos средний + lekithos яичный желток) — Я. микроскопических размеров, содержащая дейтероплазму, неравномерно распределенную в цитоплазме, в связи с чем Я. м. претерпевает хотя и полное, но неравномерное дробление (напр., икринки миноги, лягушки, осетровых рыб).

Я. МЕРОБЛАСТИ́ЧЕСКАЯ (o. meroblasticum; греч. meros часть + blastos росток, зародыш) — Я., претерпевающая частичное дробление, при к-ром на образование бластоме-

ров и построение зародыша расходуется лишь незначительная часть цитоплазмы, относительно свободной от дейтероплазмы, а большая часть Я. остается в виде нераздробившейся массы, к-рая расходуется на питание зародыша; свойственна многим членистоногим, большинству рыб, пресмыкающимся и птицам.

Я. ОЛИГОЛЕЦИТА́ЛЬНАЯ (o. oligolecithale; греч. oligos малый, незначительный + lekithos яичный желток) — см. *Яйцеклетка изолецитальная.*

Я. ТЕЛОЛЕЦИТА́ЛЬНАЯ (o. telolecithale; греч. telos конец + lekithos яичный желток) — крупная Я., очень богатая дейтероплазмой, распределенной в ней резко неравномерно со смещением в сторону вегетативного полюса, в связи с чем Я. т. претерпевает частичное дискоидальное дробление; свойственна акуловым и костистым рыбам, пресмыкающимся и птицам.

Я. ЦЕНТРОЛЕЦИТА́ЛЬНАЯ (o. centrolecithale; центр + греч. lekithos яичный желток) — Я., в к-рой дейтероплазма расположена в центральной части, в связи с чем Я. ц. претерпевает поверхностное дробление; свойственна насекомым и ско-рым другим членистоногим.

ЯЙЦЕНО́СНЫЕ ТЯЖИ́ — см. *Яйцевые трубки.*

ЯЙЦЕНО́СНЫЙ БУГОРО́К — *Яйценосный холмик.*

ЯЙЦЕНО́СНЫЙ ХО́ЛМИК (cumulus oophorus, LNH; син. яйценосный бугорок) — участок многослойного эпителия в стенке везикулярного яичникового фолликула, содержащий овоцит.

ЯЙЦО́ (ovum) — 1) в эмбриологии — см. *Яйцеклетка*; 2) в акушерстве — см. *Яйцо плодное.*

ЯЙЦО́ ПЛО́ДНОЕ (син. яйцо) — зародыш (вместе с зародышевыми оболочками) на ранних стадиях развития.

ЯКИ́МОВА МЕ́ТОД (В. Л. Якимов, 1870—1940, сов. микробиолог) — метод выявления спирохет возвратного тифа в мазках крови, отпечатках или срезах органов, заключающийся в дегемоглобинизации и протраве препарата смесью нагретых растворов уксусной и карболовой кислот, формалина, танина и этилового спирта с последующей обработкой раствором нитрата серебра.

ЯКО́БА СИМПТО́М (A. Jakob, 1884—1931, нем. невропатолог) — см. *Паракинез.*

ЯКО́БА СИНЦИТИА́ЛЬНЫЕ МИЕЛОФА́ГИ (A. Jakob) — пролиферирующие глиальные макрофаги, не утратившие синцитиальных связей с нейроглией.

ЯКО́БА — КРЕ́ЙТЦФЕЛЬДТА БО́ЛЕЗНЬ (A. Jakob, 1884—1931, нем. невропатолог; H. G. Creutzfeldt, 1885—1964, нем. невропатолог и психиатр) — см. *Дегенерация кортикостриоспинальная.*

ЯКОБЕУСА ОПЕРА́ЦИЯ (H. Ch. Jakobaeus, 1879—1937, шведский хирург) — торакокаустика, производимая под контролем торакоскопии.

ЯКО́БИ ИГЛА́ (Jacobi) — лигатурная игла для наложения швов при дакриоцисториностомии, отличающаяся малыми размерами и крутым изгибом, что позволяет вводить инструмент в глубокую и узкую рану.

ЯКО́БИ АТРОФИ́ЧЕСКАЯ СОСУ́ДИСТАЯ ПОЙКИЛОДЕРМИ́Я (E. Jacobi, 1862—1915, австрийский дерматолог) — см. *Пойкилодермия сосудистая атрофическая.*

ЯКОБО́ВИЧИ МЕ́ТОД (Jacobovici, амер. хирург; син. Якубовичи метод — нрк) — способ закрытия культи двенадцатиперстной кишки при резекции желудка на выключение, заключающийся в том, что переднюю стенку двенадцатиперстной кишки рассекают на 6—7 *см*, слизистую оболочку этой части кишки удаляют на всем протяжении, а затем края раны скручивают внутрь и сшивают.

ЯКО́БСОНА СИМПТО́М (P. Jakobsohn, нем. врач) — появление или усиление локальной боли при поколачивании по головке пястной кости согнутой в кулак кисти; признак перелома пястной кости.

ЯКО́БСОНА СОШНИКО́ВО-НОСО́ВОЙ ХРЯЩ (L. L. Jacobson, 1783—1843, датский анатом) — см. *Хрящ сошниково-носовой.*

ЯКО́БСОНА ЯДРО́ (L. L. Jacobson, 1783—1843, датский анатом) — см. *Ядро парамедианное дорсальное.*

ЯКО́БСОНА — ЛА́СКА РЕФЛЕ́КС (L. Jacobsohn, совр. нем. невролог; Lask; син. Бехтерева — Якобсона рефлекс) — сочетанное сгибание предплечья и пальцев кисти при перкуссии шиловидного отростка лучевой кости; признак поражения пирамидных путей.

ЯКО́БСОНОВ О́РГАН (L. L. Jacobson, 1783—1843, датский анатом) — см. *Орган сошниково-носовой.*

ЯКО́БСТАЛЯ — КА́ФКИ РЕА́КЦИЯ (E. Jacobsthal, нем. врач; V. Kafka, род. в 1881 г., нем. врач) — см. *Мастичная реакция.*

ЯКТА́ЦИЯ (jactatio; лат. «разбрасывание во все стороны, качание, жестикуляция») — однообразное, некоординированное, беспорядочное двигательное возбуждение у больного, лежащего в постели; симптом аменции или тяжело протекающего делирия.

ЯКТА́ЦИЯ ГОЛОВЫ́ — быстрые ритмичные движения головой (наклоны, вращения); наблюдается у детей младшего возраста при неврозах, чаще перед засыпанием.

ЯКТА́ЦИЯ НАВЯ́ЗЧИВАЯ — навязчивое действие в виде ритмичного раскачивания или резких движений (наклонов в сторону, поворотов) головы и туловища; наблюдается чаще у детей.

ЯКУБО́ВИЧА ЯДРО́ — см. *Ядро глазодвигательного нерва добавочное.*

ЯКУБО́ВИЧИ МЕ́ТОД (Jacobovici, амер. хирург) — см. *Якобовичи метод.*

ЯКША — ГАЙЕ́МА АНЕМИ́Я (R. R. Jaksch, 1855—1947, чешский врач; G. Hayem, 1841—1933, франц. врач) — алиментарная анемия при недостаточном поступлении веществ, необходимых для синтеза гемоглобина; характеризуется резкой бледностью кожи, истощением, геморрагиями, увеличением цветного показателя крови и появлением в крови большого количества эритробластов и нормобластов.

ЯМКА БОЛЬШО́ГО МО́ЗГА ЛАТЕРА́ЛЬНАЯ [fossa lateralis cerebri, PNA; fossa cerebri lateralis (Sylvii), BNA; син. Сильвиева ямка] — углубление между лобной и височной долями большого мозга, в области дна к-рого расположен островок.

ЯМКА ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ́ (fossa vesicae felleae, PNA, BNA, JNA) — овальное углубление на висцеральной поверхности печени, в к-ром расположен желчный пузырь.

ЯМО́ЧКИ ГРАНУЛЯ́ЦИЙ (foveolae granulares, PNA, BNA, JNA; син. Пахионовы ямки) — округлые углубления различной величины, расположенные на внутренней пластинке костей свода черепа по обеим сторонам от сагиттальной борозды, сообщающиеся с диплоическими каналами; содержат арахноидальные грануляции.

ЯНГА НЕФРОПЕКСИ́Я (H. Young, 1870—1945, амер. уролог) — нефропексия, при к-рой капсулу почки по ее задней поверхности рассекают, отсепаровывают и в виде валика подшивают к поясничным мышцам с целью образования сращений между ними и почкой.

ЯНИШЕ́ВСКОГО РЕФЛЕ́КС (А. Е. Янишевский, род. в 1873 г., сов. невропатолог и психиатр) — см. *Янишевского — Бехтерева хватательный рефлекс.*

ЯНИШЕ́ВСКОГО СИМПТО́М (А. Е. Янишевский; син. рефлекс бульдожий) — рефлекс орального автоматизма: тоническое сжатие челюстей при раздражении шпателем твердого неба.

ЯНИШЕ́ВСКОГО — БЕ́ХТЕРЕВА ХВАТА́ТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЕ́КС (А. Е. Янишевский, род. в 1873 г., сов. невропатолог и психиатр; В. М. Бехтерев, 1857—1927, сов. психоневролог и физиолог; син.: рефлекс хватательный, Янишевского рефлекс) — непроизвольное захватывание и удержание предмета, к-рым производят штриховое раздражение кожи у основания пальцев кисти; наблюдается при поражении премоторной области коры полушарий большого мозга, чаще на противоположной стороне.

ЯНО́ВИЧА-ЧАЙНСКОГО — ДЕ́ЙВИСА БЛЕФАРОПЛА́СТИКА (М. С. Янович-Чаинский, отеч. офтальмолог 19 в.; J. S. Davis, 1872—1946, амер. хирург) — блефаропластика с использованием мелких свободных кожных лоскутов; обладает преимуществом хорошего приживления.

ЯНО́ВСКОГО ПРИ́ЗНАК (Ф. Г. Яновский, 1860—1928, сов. терапевт) — 1) усиление бронхофонии; ранний симптом пневмонии; 2) шум трения брюшины над желчным пузырем; признак перихолецистита или угрожающей перфорации желчного пузыря.

ЯНО́ВСКОГО СПО́СОБ ПЕРКУ́ССИИ (Ф. Г. Яновский) — способ перкуссии, при к-ром постукивание указательным или средним пальцем производят непосредственно по поверхности тела, а не по пальцу другой руки или плессиметру.

ЯНСЕНА ОПЕРА́ЦИЯ (A. Jansen, 1859—1933, нем. оториноларинголог) — 1) хирургическая операция при сочетанном хроническом воспалении решетчатого лабиринта и верхнечелюстной пазухи, заключающаяся во вскрытии верхнечелюстной пазухи через ее переднюю стенку, резекции ее медиальной стенки с последующим вскрытием решетчатого лабиринта через образованное отверстие; 2) хирургическая операция по поводу хронического фронтита, заключающаяся во вскрытии лобной пазухи через нижнюю стенку и удалении патологически измененных тканей,

после чего резецируют часть глазничной пластинки решетчатой кости, носовой косточки и лобного отростка верхней челюсти, формируя соустье с полостью носа; 3) хирургическая операция при гнойном лабиринтите, заключающаяся в том, что после радикальной операции на ухе вскрывают ушной лабиринт, начиная с дуги латерального полукружного канала, раскрывают улитку, а затем и преддверие; 4) хирургическая операция при гнойном лабиринтите, осложненном менингитом, абсцессом мозжечка или эпидуральным абсцессом, заключающаяся в том, что после радикальной операции на ухе удаляют крышу сосцевидной пещеры, заднюю стенку сосцевидного отростка и задневерхний край пирамиды, вскрывают задний полукружный канал, задние отделы латерального полукружного канала и широко раскрывают преддверие, а при наличии показаний — и улитку.

ЯНСКОГО — БИЛЬШО́ВСКОГО ФО́РМА АМАВРОТИ́ЧЕСКОЙ ИДИОТИ́И (J. Jansky, 1873—1921, чешский врач; B. Bielschowsky, 1869—1940, нем. невропатолог) — см. *Идиотия амавротическая детская поздняя.*

ЯНТА́РНАЯ КИСЛОТА́ — природная дикарбоновая кислота ациклического ряда, участвующая в цикле трикарбоновых кислот; применяется при изготовлении красителей, инсектицидов и нек-рых лекарственных средств.

ЯНУС ЗЕЛЁНЫЙ (Janusgrün) — краситель из группы сафранинов, применяемый в гистологической технике для витальной окраски митохондрий, пластинчатого комплекса, секреторных гранул.

ЯРЕ́МНАЯ ВЫ́РЕЗКА (incisura jugularis, PNA, BNA, JNA) — 1) углубление латерального края боковой части затылочной кости, участвующее в образовании яремного отверстия; 2) углубление заднего края пирамиды височной кости, участвующее в образовании яремного отверстия; 3) углубление верхнего края рукоятки грудины.

ЯРЕ́МНАЯ Я́МКА (fossa jugularis, BNA, JNA; син. надгрудинная ямка) — углубление в нижней части передней поверхности шеи над яремной вырезкой грудины, ограниченное с боков грудино-ключично-сосцевидными мышцами.

ЯРЕ́МНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (foramen jugulare, PNA, BNA, JNA) — отверстие на основании черепа, образованное яремными вырезками височной и затылочной костей, через к-рое проходят внутренняя яремная вена, языкоглоточный, блуждающий и добавочный нервы.

ЯРЕ́МНЫЙ БУГОРО́К (tuberculum jugulare, PNA, BNA, JNA) — выступ в переднем отделе латеральной части затылочной кости на границе с базилярной частью; место прикрепления задней атлантозатылочной мембраны.

ЯРЕ́МНЫЙ ОТРО́СТОК (processus jugularis, PNA, BNA, JNA) — небольшой отросток затылочной кости, расположенный на нижней поверхности ее латеральной части кнаружи от затылочного мыщелка; гомолог поперечных отростков позвонков.

ЯРИША МНО́ЖЕСТВЕННАЯ ПАПУЛЁЗНАЯ ТРИХОЭПИТЕЛИО́МА (A. Jarisch, 1850—1902, австрийский дерматолог) — доброкачественная опухоль в виде плотных узелков розового цвета (иногда с желтоватым оттенком), с телеангиэктазиями на их поверхности, развивающаяся из волосяных фолликулов и локализующаяся преимущественно на лице.

ЯРИША — КИА́РИ ФО́РМА ТУБЕРКУЛЁЗА (A. Jarisch, 1850—1902, австрийский дерматолог; H. Chiari, 1851—1916, нем. патолог) — форма туберкулеза кожи, характеризующаяся образованием язв в местах перехода кожи в слизистую оболочку у естественных отверстий тела.

ЯРКОСТЬ — величина, характеризующая интенсивность свечения источника света или отражающей поверхности, представляющая собой отношение силы света в данном направлении к площади проекции светящейся поверхности на перпендикулярную к этому направлению плоскость; выражается в канделах на квадратный метр (*кд/м²*).

Я. ПОРО́ГОВАЯ — минимальная Я., воспринимаемая глазом.

Я. СЛЕПЯ́ЩАЯ — Я. источника света, способная вызвать временное ослепление человека (животного) при данном уровне зрительной адаптации.

ЯСЛИ (син. детские ясли) — учреждение здравоохранения, предназначенное для воспитания и медицинского обслуживания детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Я. ЛОГОПЕДИ́ЧЕСКИЕ — специализированные Я. для детей, страдающих дефектами разговорной речи, в к-рых дети получают логопедическую помощь.

Я. СЕЗО́ННЫЕ — Я., организуемые в колхозах и совхозах на определенный период с целью высвобождения женщин-матерей для выполнения сезонных работ.

ЯСЛИ-ДЕ́ТСКИЙ САД (син. ясли-сад) — единое детское учреждение для общественного воспитания и медицинского обслуживания детей ясельного и дошкольного возраста (до 7 лет).

ЯСЛИ-САД — см. *Ясли-детский сад.*

ЯСПЕРСА ПСИХИ́ЧЕСКИЙ ПРОЦЕ́СС (K. Jaspers, 1883—1969, нем. философ и психиатр) — общее название психопатологических расстройств, не выводимых из личности больного и ее развития, а представляющих собой нечто качественно новое, в корне видоизменяющее психический склад больного (напр., шизофрения).

ЯСПЕРСА СОЗНА́НИЕ СО́БСТВЕННОГО ЧУ́ВСТВОВАНИЯ (K. Jaspers) — см. *Витальность «Я».*

ЯСПЕРСА ФЕНОМЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ МЕ́ТОД (K. Jaspers) в психиатрии — метод изучения психопатологических феноменов, основанный на их непосредственном описании, разграничении, определении и систематизации на статическом понимании психопатологических явлений в том виде, как их переживает больной.

ЯТРЕ́ЙЯ (истор.; греч. iatreion) — небольшая частная лечебница на дому у врача в Древней Греции.

ЯТРО- (йатро-; греч. iatros врач) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к лечению, к деятельности врача», «врачебный».

ЯТРОГЕ́НИЯ (*ятро-* + греч. -genēs порождаемый, возникающий) — см. *Заболевание ятрогенное.*

ЯТРОМЕХА́НИКА (*ятро-* + механика) — направление в медицине 16—18 вв., представители к-рого пытались объяснить физиологические и патологические явления на основе механики; сыграло положительную роль в борьбе со схоластикой и мистикой.

ЯТРОХИ́МИЯ (*ятро-* + химия) — направление в медицине 15—18 вв., представители которого рассматривали процессы, происходящие в организме, как чисто химические явления, а болезни как результат нарушения химического равновесия; сыграло положительную роль в борьбе со схоластикой.

ЯФФЕ РЕА́КЦИЯ (M. Jaffé, 1841—1911, нем. врач) — 1) метод определения креатинина в моче и сыворотке крови, основанный на красновато-желтой окраске продуктов взаимодействия креатинина с пикриновой кислотой в щелочной среде; 2) метод определения индикана в моче, основанный на синей окраске продуктов его взаимодействия с хлороформом.

ЯФФЕ — ЛИХТЕНСТАЙНА ДИСПЛАЗИ́Я (H. L. Jaffé, род. в 1896 г., амер. врач; L. Lichtenstein, совр. амер. врач) — см. *Остеодисплазия фиброзная.*

ЯЦЕ́НКО — ВО́ЛЬФА — КРА́УЗЕ БЛЕФАРОПЛА́СТИКА (А. С. Яценко, отеч. хирург 19 в.; J. R. Wolfe, 1824—1904, шотл. офтальмолог; F. Krause, 1857—1937, нем. хирург) — блефаропластика с использованием толстого (во всю толщу кожи) свободного кожного лоскута.

ЯЦЕ́НКО — ГА́ККЕРА БУЖИ́РОВАНИЕ (А. С. Яценко, отеч. хирург 19 в.; V. R. Hacker, 1852—1933, австрийский хирург) — способ лечения резко выраженных стенозов пищевода, заключающийся в наложении постоянной гастростомы, проведении через пищевод и желудок в гастростому шелковой нити с дробинкой и привязывании к концу нити дренажной трубки; с помощью последней бужирование пищевода производят со стороны желудка.

ЯЧМЕ́НЬ (hordeolum) — острое гнойное воспаление железы хряща века (мейбомиевой железы) или сальной железы века (железа Цейсса).

ЯЩУР (aphthae epizooticae; син.: болезнь рыльно-копытная — устар., лихорадка афтозная) — острая инфекционная болезнь из группы вирусных зоонозов, иногда передающаяся человеку при контакте с больными животными; характеризуется лихорадкой, интоксикацией, слюнотечением, появлением болезненных пузырьков и язв на слизистой оболочке рта и на коже пальцев рук.

ПЕРЕЧЕНЬ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

b. — bursa (ед. число)
bb. — bursae (мн. число)
f. — fascia
ff. — fasciae (мн. число)
lig. — ligamentum (ед. число)
ligg. — ligamenta (мн. число)
vag. — vagina (ед. число)
vagg. — vaginae (мн. число)

СВЯЗКИ (LIGAMENTA)

1. **Accessoria (auxiliaria),** добавочные связки — общее название нек-рых внесуставных связок.

2. **Accessoria costarum,** добавочные связки ребер — непостоянные связки, укрепляющие реберно-поперечные суставы.

3. **Accessoria (Henle),** добавочные связки (Генле) — общее название lig. collaterale radiale и lig. collaterale ulnare.

4. **Accessoria plantaria** (BNA, JNA), добавочные подошвенные связки — см. *Plantaria.*

5. **Accessoria volaria** (BNA, JNA), добавочные ладонные связки — см. *Palmaria.*

6. **Accessorium cubiti,** добавочная связка локтя — часть передних пучков фиброзного слоя капсулы локтевого сустава.

7. **Accessorium humeri,** добавочная связка плеча — см. *Coracohumerale.*

8. **Accessorium laterale genu,** латеральная добавочная связка колена — см. *Collaterale fibulare.*

9. **Accessorium mediale genu,** медиальная добавочная связка колена — см. *Collaterale tibiale.*

10. **Accessorium radiale (Henle),** лучевая добавочная связка (Генле) — см. *Collaterale radiale.*

11. **Accessorium ulnare (Henle),** локтевая добавочная связка (Генле) — см. *Collaterale ulnare.*

12. **Acromioclaviculare** (PNA, BNA, JNA; capsulare claviculare externum), акромиально-ключичная связка — утолщенная часть фиброзного слоя капсулы акромиально-ключичного сустава, натянутая между акромионом и акромиальным концом ключицы; укрепляет сустав.

13. **Acromiocoracoideum,** акромиально-клювовидная связка — см. *Coracoacromiale.*

14. **Alare dentis,** крыловидная связка зуба — см. *Alaria.*

15. **Alare major,** большая крыловидная связка — см. *Alaria.*

16. **Alaria** (PNA, BNA, JNA; alare dentis, alare major, odontoideum), крыловидные связки — две связки, натянутые между зубом осевого позвонка и медиальными поверхностями соответственно правого и левого мыщелков затылочной кости; укрепляют атлантозатылочный сустав.

17. **Anguli iridocornealis spongium** (JNA), сеть радужно-роговичного угла (трабекулярная сеть) — см. *Pectinatum anguli iridocornealis.*

18. **Annulare anterius tarsi,** передняя кольцевая связка предплюсны — см. *Retinaculum musculorum extensorum inferius.*

19. **Annulare baseos stapedis** (BNA), кольцевая связка основания стремени — см. *Anulare stapedis.*

20. **Annulare carpi anterius,** передняя кольцевая связка запястья — см. *Carpi volare.*

21. **Annulare carpi posterius,** задняя кольцевая связка запястья — см. *Retinaculum extensorum.*

22. **Annulare femoris,** кольцевая связка бедра — см. *Zona orbicularis.*

23. **Annulare pubis,** кольцевая связка лобка — фиброзное кольцо, расположенное в области симфиза; укрепляет межлобковый диск.

24. **Annulare radii** (BNA), кольцевая связка лучевой кости — см. *Anulare radii.*

25. **Annularia** (BNA; anularia digitorum pedis, JNA), кольцевые связки — утолщенные кольцевидные участки фиброзных влагалищ пальцев стопы; удерживают сухожилия сгибателей пальцев стопы.

26. **Annularia digitorum manus** (BNA; anularia digitorum manus, JNA), кольцевые связки пальцев кисти — утолщенные кольцевидные участки фиброзных влагалищ пальцев кисти; удерживают сухожилия сгибателей пальцев кисти.

27. **Annularia (trachealia)** (BNA), кольцевые связки (трахеальные) — см. *Anularia (trachealia).*

28. **Anococcygeum** (PNA, BNA; septum anococcygicum, INA), заднепроходно-копчиковая связка — фиброзно-мышечный тяж, соединяющий наружный сфинктер заднего прохода с верхушкой копчика.

29. **Anococcygicum septum** (JNA), заднепроходно-копчиковая перегородка — см. *Anococcygeum.*

30. **Anteriora durae matris,** передние связки твердой мозговой оболочки — фиброзные пучки, соединяющие переднюю часть твердой оболочки спинного мозга с lig. longitudinale posterius и lig. sacrococcygeum posterius profundum.

31. **Anulare baseos stapedis** (JNA), круговая связка основания стремени — см. *Anulare stapedis.*

32. **Anulare radii** (PNA, JNA; annulare radii, BNA), кольцевая связка лучевой кости — связка, охватывающая головку лучевой кости; прикрепляется на переднем и заднем краях лучевой вырезки локтевой кости; укрепляет проксимальный луче-локтевой сустав.

33. **Anulare stapedis** (PNA; annulare baseos stapedis, BNA; anulare baseos stapedis, JNA), кольцевая связка стремени — круговая связка основания стремени, заполняющая промежуток между основанием стремени и краем окна преддверия на лабиринтной стенке барабанной полости.

34. **Anularia digitorum manus** (JNA), кольцевые связки пальцев кисти — см. *Annularia digitorum manus.*

35. **Anularia digitorum pedis** (JNA), кольцевые связки пальцев стопы — см. *Annularia.*

36. **Anularia (trachealia)** [PNA; annularia (trachealia), BNA; interannularia], кольцевые связки (трахеальные)— соединительная ткань, заполняющая промежутки между хрящевыми кольцами трахеи и скрепляющая их друг с другом.

37. **Apicis coccygis,** связка верхушки копчика — см. *Retinaculum caudale.*

38. **Apicis dentis** (PNA, BNA, JNA), связка верхушки зуба — фиброзные пучки, соединяющие верхушку зуба осевого позвонка с передним краем большого затылочного отверстия.

39. **Apicum,** верхушечная связка — см. *Supraspinalia.*

40. **Apparatus suspensorius lentis** (JNA), подвешивающий аппарат хрусталика — см. *Zonula ciliaris.*

41. **Arantii,** аранциева связка — см. *Venosum.*

42. **Arcuatum carpi dorsale** (JNA), тыльная дугообразная связка запястья — связка, дугообразно соединяющая с тыльной стороны ладьевидную и трехгранную кости и отдающая пучки волокон к костям дистального ряда запястья.

43. **Arcuatum externum diaphragmatis (Halleri),** наружная дугообразная связка диафрагмы (Галлера) — см. *Arcuatum laterale.*

44. **Arcuatum genu,** дугообразная связка колена — см. *Popliteum arcuatum.*

45. **Arcuatum inferius,** нижняя дугообразная связка — см. *Arcuatum pubis.*

46. **Arcuatum internum diaphragmatis,** внутренняя дугообразная связка диафрагмы — см. *Arcuatum mediale.*

47. **Arcuatum laterale** [PNA; arcus lumbocostalis lateralis (Halleri), BNA; arcus lumbocostalis lateralis, JNA; arcuatum externum diaphragmatis (Halleri)], латеральная дугообразная связка — дугообразный соединительнотканный тяж, расположенный между поперечным отростком I или II поясничного позвонка и концом XII ребра, перекидываясь через квадратную мышцу поясницы; является местом начала поясничной части диафрагмы.

48. **Arcuatum mediale** [PNA; lumbocostalis medialis arcus (Halleri), BNA; lumbocostalis medialis arcus, JNA; arcuatum, internum diaphragmatis], медиальная дугообразная связка — дугообразный соединительнотканный тяж, расположенный между боковой поверхностью тела и концом поперечного отростка II поясничного позвонка, перекидываясь через большую поясничную мышцу; является местом начала поясничной части диафрагмы.

49. **Arcuatum medianum** (PNA), срединная дугообразная связка — сухожильные пучки, дугообразно расположенные по краю аортального отверстия диафрагмы.

50. **Arcuatum pubis** [PNA, BNA, JNA; arcuatum inferius, pubis inferius (Cruveilhier)], дугообразная связка лобка — фиброзный пучок, идущий по нижнему краю лобкового симфиза и соединяющий нижние ветви правой и левой лобковых костей; укрепляет лобковый симфиз.

51. **Arcuatum superius pubis,** верхняя дугообразная связка лобка — см. *Pubicum superius.*

52. **Arcuum,** связки дуг — см. *Flava.*

53. **Arteriosum** (PNA, BNA; chorda ductus arteriosi, JNA; Botalli), артериальная связка — соединительнотканный тяж, соединяющий легочный ствол у места его деления на легочные артерии с вогнутой поверхностью дуги аорты; остаток облитерированного артериального протока.

54. **Articuli cricothyreoidei** (JNA), связки перстнещитовидного сустава — общее название lig. ceratocricoideum anterius, ligg. ceratocricoidea lateralia и ligg. ceratocricoidea posteriora.

55. **Astragalocalcaneum interosseum,** межкостная таранно-пяточная связка — см. *Talocalcaneum interosseum.*

56. **Astragalocalcaneum posterius** (Meckel), задняя таранно-пяточная связка (Меккеля) — см. *Talocalcaneum posterius.*

57. **Atlantoaxiale mediale** (collaterale atlantoaxiale mediale), медиальная атлантоосевая связка — парная связка, соединяющая тело осевого позвонка с боковой массой атланта; укрепляет боковой атлантоосевой сустав.

58. **Auriculare anterius** (PNA, BNA), передняя связка ушной раковины — короткий фиброзный тяж, соединяющий скуловой отросток височной кости с хрящом ушной раковины.

59. **Auriculare posterius** (PNA, BNA), задняя связка ушной раковины — короткий фиброзный тяж, соединяющий сосцевидный отросток височной кости с хрящом ушной раковины.

60. **Auriculare superius** (PNA, BNA), верхняя связка ушной раковины — короткий фиброзный тяж, соединяющий верхний край наружного слухового отверстия с хрящом ушной раковины.

61. **Auricularia** [PNA, JNA; auricularia (Valsalvae), BNA], связки ушной раковины — общее название связок, соединяющих височную кость с хрящом ушной раковины.

62. **Auricularia (Valsalvae)** (BNA), связки ушной раковины (Вальсальвы) — см. *Auricularia.*

63. **Auxiliaria,** вспомогательные связки — см. *Accessoria.*

64. **Basium (ossium metacarpalium) dorsalia** (BNA), тыльные связки оснований (пястных костей) — см. *Metacarpea dorsalia.*

65. **Basium (ossium metacarpalium) interossea** (BNA), межкостные связки оснований (пястных костей) — см. *Metacarpea interossea.*

66. **Basium (ossium metacarpalium) volaria** (BNA), ладонные связки оснований (пястных костей) — см. *Metacarpea palmaria.*

67. **Basium ossium metacarpi dorsalia** (JNA), тыльные связки оснований пястных костей — см. *Metacarpea dorsalia.*

68. **Basium ossium metacarpi interossea** (JNA), межкостные связки оснований пястных костей — см. *Metacarpea interossea.*

69. **Basium ossium metacarpi volaria** (JNA), ладонные связки оснований пястных костей — см. *Metacarpea palmaria.*

70. **Basium (ossium metatarsalium) dorsalia** (BNA), тыльные связки оснований (плюсневых костей) — см. *Metatarsea dorsalia.*

71. **Basium (ossium metatarsalium) interossea** (BNA), межкостные связки оснований (плюсневых костей) — см. *Metatarsea interossea.*

72. **Basium (ossium metatarsalium) plantaria** (BNA), подошвенные связки оснований (плюсневых костей) — см. *Metatarsea plantaria.*

73. **Basium ossium metatarsi dorsalia** (JNA), тыльные связки оснований плюсневых костей — см. *Metatarsea dorsalia.*

74. **Basium ossium metatarsi interossea** (JNA), межкостные связки оснований плюсневых костей — см. *Metatarsea interossea.*

75. **Basium ossium metatarsi plantaria** (JNA), подошвенные связки оснований плюсневых костей — см. *Metatarsea plantaria.*

76. **Bertini,** бертенова связка — см. *Iliofemorale.*

77. **Bifurcatum** (PNA, BNA; bipartitum, JNA), раздвоенная связка — совокупность lig. calcaneocuboideum и lig. calcaneonaviculare; укрепляет поперечный сустав предплюсны.

78. **Bigelowi,** Бигелоу связка — передняя часть lig. iliofemorale.

79. **Bipartitum** (JNA), двойная связка — см. *Bifurcatum.*

80. **Botalli,** боталлова связка — см. *Arteriosum.*

81. **Brevia digitorum manus (Marshall),** короткие связки пальцев кисти (Маршалла) — фиброзные пластинки, соединяющие сухожилия сгибателей пальцев кисти с фалангами.

82. **Calcaneocuboidea pars** (lig. bifurcati) (BNA, JNA), пяточно-кубовидная часть (раздвоенной связки) — см. *Calcaneocuboideum.*

83. **Calcaneocuboidea plantaria** (JNA), подошвенная пяточно кубовидная связка — см. *Calcaneocuboideum plantare.*

84. **Calcaneocuboideum** [PNA; pars calcaneocuboidea lig. bifurcati, BNA, JNA)], пяточно-кубовидная связка — связка, соединяющая передневерхний край пяточной кости с тыльной поверхностью кубовидной кости; укрепляет поперечный сустав предплюсны, являясь частью lig. bifurcatum.

85. **Calcaneocuboideum dorsale** [JNA; calcaneocuboideum superius (Meckeli)], тыльная пяточно-кубовидная связка — фиброзный пучок, соединяющий тыльные поверхности пяточной и кубовидной костей латеральнее lig. bifurcatum; укрепляет пяточно-кубовидный сустав.

86. **Calcaneocuboideum plantare** (PNA, BNA; calcaneocuboidea plantaria, JNA), подошвенная пяточно-кубовидная связка — веерообразно расходящаяся связка на подошвенной поверхности пяточно-кубовидного сустава; участвует в укреплении («затяжке») сводов стопы.

87. **Calcaneocuboideum plantare obliquum** (JNA), косая подошвенная пяточно-кубовидная связка — косо идущие волокна lig. calcaneocuboideum plantare.

88. **Calcaneocuboideum plantare transversum** (JNA), поперечная подошвенная пяточно-кубовидная связка — поперечно идущие волокна lig. calcaneocuboideum plantare.

89. **Calcaneocuboideum superius (Meckeli),** верхняя пяточно-кубовидная связка (Меккеля) — см. *Calcaneocuboideum dorsale.*

90. **Calcaneofibulare** (PNA, BNA; fibuloclecaneare, JNA), пяточно-малоберцовая связка — связка, соединяющая передний край латеральной лодыжки латеральной поверхности пяточной кости; укрепляет голеностопный сустав.

91. **Calcaneonaviculare** (JNA), пяточно-ладьевидная связка — см. *Calcaneonaviculare plantare.*

92. **Calcaneonaviculare** (PNA; pars calcaneonavicularis, BNA, JNA; calcaneonaviculare interosseum), пяточно-ладьевидная связка — связка, соединяющая передневерхний край кубовидной кости с ладьевидной костью; укрепляет поперечный сустав предплюсны, являясь частью lig. bifurcatum.

93. **Calcaneonaviculare dorsale** [BNA; calcaneoscaphoideum dorsale (externum) (Barkow), calcaneoscaphoideum superius (Meckeli)], тыльная пяточно-ладьевидная связка — связка, соединяющая верхнюю поверхность пяточной кости с тыльной поверхностью ладьевидной кости; укрепляет таранно-пяточно-ладьевидный сустав.

94. **Calcaneonaviculare interosseum,** межкостная пяточно-ладьевидная связка — см. *Calcaneonaviculare.*

95. **Calcaneonaviculare plantare** [PNA, BNA; calcaneonaviculare, JNA; calcaneoscaphoideum inferius (Meckel); calcaneoscaphoideum internum (medium) (Barkow], подошвенная пяточно-ладьевидная связка — связка, расположенная между нижнемедиальной поверхностью ладьевидной кости, опорой таранной кости и переднемедиальной частью пяточной кости; содержит хрящ; укрепляет продольный свод стопы.

96. **Calcaneonavicularis pars** (BNA, JNA), пяточно-ладьевидная часть — см. *Calcaneonaviculare.*

97. **Calcaneoscaphoideum dorsale (externum) (Barkow),** тыльная (наружная) пяточно-ладьевидная связка (Баркова) — см. *Calcaneonaviculare dorsale.*

98. **Calcaneoscaphoideum inferius (Meckel),** нижняя пяточно-ладьевидная связка (Меккеля) — см. *Calcaneonaviculare plantare.*

99. **Calcaneoscaphoideum internum (medium) (Barkow),** внутренняя (средняя) пяточно-ладьевидная связка (Баркова) — см. *Calcaneonaviculare plantare.*

100. **Calcaneoscaphoideum superius (Meckel),** верхняя пяточно-ладьевидная связка (Меккеля) — см. *Calcaneonaviculare dorsale.*

101. **Calcaneotibiale** (BNA), пяточно-большеберцовая связка — см. *Tibiocalcanea pars.*

102. **Canaliculorum labyrinthi (Rüdinger),** связка канальцев лабиринта (Рюдингера) — совокупность соединительнотканных тяжей, фиксирующих полукружные протоки перепончатого лабиринта в костных полукружных каналах.

103. **Capitis costae intraarticulare** [PNA; capituli costae interarticulare, BNA, JNA; costovertebrale interosseum (Cruveilhier)], внутрисуставная связка головки ребра — волокнисто-хрящевая связка, расположенная в полости сустава головки ребра (II—X), соединяющая гребешок головки ребра с межпозвоночным диском; укрепляет сустав.

104. **Capitis costae radiatum** (PNA; capituli costae radiatum, BNA, JNA; costovertebrale anterius), лучистая связка головки ребра — связка, расположенная на передней поверхности сустава головки ребра, соединяющая головку ребра с латеральной поверхностью тел соответствующих позвонков и межпозвоночным диском; укрепляет сустав.

105. **Capitis epididymidis plica** (JNA), складка головки придатка яичка — см. *Epididymidis superius.*

106. **Capitis femoris** (PNA, JNA; teres femoris, BNA; rotundum acetabuli, teres acetabuli), связка головки бедренной кости — внутрисуставная связка тазобедренного сустава, соединяющая ямку и lig. transversum acetabuli с ямкой головки бедренной кости; увеличивает конгруэнтность суставных поверхностей, амортизирует толчки в тазобедренном суставе.

107. **Capitis fibulae anterius** (PNA; capituli fibulae anterius), передняя связка головки малоберцовой кости — фиброзные пучки, соединяющие латеральный мыщелок большеберцовой кости с передней поверхностью головки малоберцовой кости; укрепляет межберцовый сустав.

108. **Capitis fibulae posterius** (PNA; capituli fibulae posterius), задняя связка головки малоберцовой кости — фиброзные пучки, соединяющие латеральный мыщелок большеберцовой кости с задней поверхностью головки малоберцовой кости; укрепляет межберцовый сустав.

109. **Capituli costae interarticulare** (BNA, JNA), межсуставная связка головки ребра — см. *Capitis costae intraarticulare.*

110. **Capituli costae radiatum** (BNA, JNA), лучистая связка головки ребра — см. *Capitis costae radiatum.*

111. **Capituli fibulae** (BNA, JNA), связки головки малоберцовой кости — общее название lig.capitis fibulae anterius и lig. capitis fibulae posterius.

112. **Capituli fibulae anterius,** передняя связка головки малоберцовой кости — см. *Capitis fibulae anterius.*

113. **Capituli fibulae posterius,** задняя связка головки малоберцовой кости — см. *Capitis fibulae posterius.*

114. **Capituli mallei superius** (JNA), верхняя связка головки молоточка — см. *Mallei superius.*

115. **Capitulorum (ossium metacarpalium) transversa** (BNA), поперечные связки головок (пястных костей) — см. *Metacarpeum transversum profundum.*

116. **Capitulorum ossium metacarpi transversa** (JNA), поперечные связки головок пястных костей — см. *Metacarpeum transversum profundum.*

117. **Capitulorum (ossium metatarsalium) transversa** (BNA), поперечные связки головок (плюсневых костей) — см. *Metatarseum transversum profundum.*

118. **Capitulorum ossium metatarsi dorsalia,** тыльные связки головок плюсневых костей — короткие связки тыла стопы, соединяющие головки плюсневых костей.

119. **Capitulorum ossium metatarsi transversa** (JNA), поперечные связки головок плюсневых костей — см. *Metatarseum transversum profundum.*

120. **Capsulare claviculare externum,** наружная капсулярная ключичная связка — см. *Acromioclaviculare.*

121. **Cardinalia uteri (Kocks)** (tunica vasorum uteri), главные (кардинальные) связки матки (Кокса) — пучки соединительнотканных волокон, идущие от боковых отделов тела матки в толще нижней части широких маточных связок к боковым стенкам малого таза.

122. **Carpi commune profundum (Arnoldi),** глубокая общая связка запястья (Арнольда) — см. *Collaterale carpi radiale.*

123. **Carpi dorsale** (BNA, JNA), тыльная связка запястья — см. *Retinaculum extensorum.*

124. **Carpi dorsale commune,** общая тыльная связка запястья — см. *Retinaculum extensorum.*

125. **Carpi interossea,** межкостные связки запястья — см. *Intercarpea interossea.*

126. **Carpi radiatum** (BNA, PNA; carpi volare radiatum, JNA), лучистая связка запястья — совокупность межзапястных связок, идущих лучеобразно от головчатой кости к рядом расположенным костям запястья.

127. **Carpi transversum** (BNA, JNA), поперечная связка запястья — см. *Retinaculum flexorum.*

128. **Carpi volare** (BNA; annulare carpi anterius), ладонная связка запястья — уплотненный участок фасции предплечья, расположенный на передней поверхности его дистального отдела.

129. **Carpi volare proprium** (Henle), собственная ладонная связка запястья (Генле) — см. *Retinaculum flexorum.*

130. **Carpi volare radiatum** (JNA), лучистая ладонная связка запястья — см. *Carpi radiatum.*

131. **Carpometacarpea dorsalia** (BNA, PNA; carpometacarpica dorsalia, JNA), тыльные запястно-пястные связки — связки, соединяющие тыльные поверхности костей дистального ряда запястья с II — V пястными костями; укрепляют запястно-пястные суставы.

132. **Carpometacarpea palmaria** (PNA; carpometacarpica volaria, BNA; carpometacarpica volaria, JNA), ладонные запястно-пястные связки — связки, соединяющие ладонные поверхности костей дистального ряда запястья с II — V пястными костями; укрепляют запястно-пястные суставы.

133. **Carpometacarpea volaria** (BNA), ладонные запястно-пястные связки — см. *Carpometacarpea palmaria.*

134. **Carpometacarpica dorsalia** (JNA), тыльные запястно-пястные связки — см. *Carpometacarpea dorsalia.*

135. **Carpometacarpica volaria** (JNA), ладонные запястно-пястные связки — см. *Carpometacarpea palmaria.*

136. **Caudae epididymidis plica** (JNA), складка хвоста придатка яичка — см. *Epididymidis inferius.*

137. **Caudale** (BNA), каудальная связка — см. *Retinaculum caudale.*

138. **Caudale cutis retinaculum** (JNA), каудальный удерживатель кожи — см. *Caudale retinaculum.*

139. **Caudale retinaculum** (PNA; caudale BNA; caudale cutis retinaculum, JNA, apicis coccygis), каудальный удерживатель — фиброзные пучки, идущие от верхушки копчика к коже.

140. **Ceratocricoidea lateralia** (BNA; cricothyreoidea lateralia), латеральные рожконерстневидные связки — короткие связки, идущие косо от нижних рожков щитовидного хряща к перстневидному хрящу; укрепляют перстнещитовидный сустав.

141. **Ceratocricoidea posteriora** (BNA; cricothyreoidea posteriora), задние рожконерстневидные связки — короткие связки, идущие косо внутрь от перстневидного хряща к щитовидному; укрепляют перстнещитовидный сустав.

142. **Ceratocricoideum anterius** (BNA; cricothyreoideum anterius), передняя рожко-перстневидная связка — короткая связка, укрепляющая переднюю стенку капсулы перстнещитовидного сустава.

143. **Cervicale durae matris,** шейная связка твердой мозговой оболочки — соединительнотканные тяжи между твердой оболочкой спинного мозга и надкостницей тел шейных позвонков.

144. **Cervicobasilare,** шейно-базилярная связка — см. *Tectoria membrana.*

145. **Chorda arteriae umbilicalis** (JNA), струна пупочной артерии — см. *Umbilicale laterale.*

146. **Chorda ductus arteriosi** (JNA), струна артериального протока — см. *Arteriosum.*

147. **Chorda ductus venosi** (JNA), струна венозного протока — см. *Venosum.*

148. **Chorda urachi** (JNA), струна мочевого протока — см. *Umbilicale medianum.*

149. **Chorda uteroinguinalis** (teres) (JNA), маточно-паховая струна — см. *Teres uteri.*

150. **Chorda uteroovarica** (JNA), маточно-яичниковая струна — см. *Ovarii proprium.*

151. **Chorda venae umbilicalis** (JNA), струна пупочной вены — см. *Teres hepatis.*

152. **Collaterale atlantoaxiale mediale,** медиальная коллатеральная атлан-

тоосевая связка — см. *Atlantoaxiale mediale.*

153. **Collaterale carpi radiale** [PNA, BNA; carpi commune profundum (Arnold)], лучевая коллатеральная связка запястья — связка, соединяющая шиловидный отросток лучевой кости с ладьевидной костью; укрепляет лучезапястный сустав, ограничивает приведение кисти.

154. **Collaterale carpi ulnare** [PNA, BNA)], локтевая коллатеральная связка запястья — связка, соединяющая шиловидный отросток локтевой кости с трехгранной и гороховидной костями; укрепляет лучезапястный сустав, ограничивает отведение кисти.

155. **Collaterale fibulare** (PNA, BNA, JNA; accessorium laterale genu), малоберцовая коллатеральная связка — связка, соединяющая латеральный надмыщелок бедренной кости с головкой малоберцовой кости; укрепляет коленный сустав, ограничивает разгибание голени.

156. **Collaterale radiale** [PNA, BNA, JNA; accessorium radiale (Henle)], лучевая коллатеральная связка — связка, идущая от латерального надмыщелка плечевой кости, разделяющаяся на два пучка, охватывающих спереди и сзади головку лучевой кости и прикрепляющихся к лучевой вырезке локтевой кости; срастается с lig. anulare radii; укрепляет проксимальный лучелоктевой сустав.

157. **Collaterale tibiale** (PNA, BNA, JNA; accessorium mediale genu), большеберцовая коллатеральная связка — связка, соединяющая медиальный надмыщелок бедренной кости с медиальным краем большеберцовой кости; укрепляет коленный сустав, ограничивает разгибание голени.

158. **Collaterale ulnare** [PNA, BNA, JNA; accessorium ulnare (Henle)], локтевая коллатеральная связка — связка, волокна к-рой идут от медиального надмыщелка плечевой кости, веерообразно расходятся и прикрепляются к медиальному краю блоковой вырезки локтевой кости.

159. **Collateralia** (PNA, BNA, JNA; collateralia articulationis metacarpophalangeae), коллатеральные связки (пястно-фаланговых суставов) — парные связки, расположенные на боковых поверхностях пястно-фаланговых суставов, соединяющие пястные кости с проксимальными фалангами пальцев кисти; укрепляют пястно-фаланговые суставы.

160. **Collateralia** (PNA, BNA, JNA; collateralia articulationis metatarsophalangeae), коллатеральные связки (плюснефаланговых суставов) — парные связки, расположенные на боковых поверхностях плюснефаланговых суставов, соединяющие плюсневые кости с проксимальными фалангами пальцев стопы; укрепляют плюснефаланговые суставы.

161. **Collateralia** (PNA, BNA, JNA; collateralia digitorum manus), коллатеральные связки (межфаланговых суставов кисти) — парные связки, идущие от тыльной и боковых поверхностей головки одной фаланги пальцев кисти к ладонной поверхности основания смежной фаланги; препятствует боковым движениям в межфаланговых суставах кисти.

162. **Collateralia** (PNA, BNA, JNA; collateralia digitorum pedis), коллатеральные связки (межфаланговых суставов стопы) — парные связки, идущие от тыльной и боковых поверхностей одной фаланги пальцев стопы к подошвенной поверхности основания смежной фаланги; препятствуют боковым движениям в межфаланговых суставах стопы.

163. **Collateralia articulationis metacarpophalangeae,** коллатеральные связки пястно-фалангового сустава — см. *Collateralia.*

164. **Collateralia articulationis metatarsophalangeae,** коллатеральные связки плюснефалангового сустава — см. *Collateralia.*

165. **Collateralia digitorum manus,** коллатеральные связки пальцев кисти — см. *Collateralia.*

166. **Collateralia digitorum pedis,** коллатеральные связки пальцев стопы — см. *Collateralia.*

167. **Collesi,** связка Коллиса — см. *Reflexum.*

168. **Colli costae** (BNA, JNA), связка шейки ребра — см. *Costotransversarium.*

169. **Colli costae anterius,** передняя связка шейки ребра — см. *Costotransversarium superius.*

170. **Colli costae posterius,** задняя связка шейки ребра — см. *Costotransversarium laterale.*

171. **Commune vertebrarum anterius,** передняя общая связка позвонка — см. *Longitudinale anterius.*

172. **Commune vertebrarum posterius,** задняя общая связка позвонков — см. *Longitudinale posterius.*

173. **Conicum,** коническая связка — см. *Conoideum.*

174. **Conicum,** коническая связка — см. *Cricothyroideum.*

175. **Conoides,** коническая связка — см. *Conoideum.*

176. **Conoides laryngis,** коническая связка гортани — см. *Cricothyroideum.*

177. **Conoides pars** (lig. coracoclavicularis) (JNA), коническая часть (клювo-ключичной связки) — см. *Conoideum.*

178. **Conoideum** [PNA, BNA; pars conoides (lig. coracoclavicularis), JNA; conoides, conicum, coracoclaviculare internum], коническая связка — связка треугольной формы, представляющая собой заднемедиальную часть lig. coracoclaviculare, соединяющая конусовидный бугорок ключицы с клювовидным отростком лопатки; укрепляет акромиально-ключичный сустав, ограничивает движения ключицы.

179. **Coracoacromiale** (PNA, BNA, JNA; acromiocoracoideum), клювовидно-акромиальная связка — широкая связка, соединяющая передний край акромиона с клювовидным отростком лопатки; ограничивает отведение руки выше горизонтальной плоскости.

180. **Coracobrachiale,** клювовидно-плечевая связка — см. *Coracohumerale.*

181. **Coracoclaviculare** (PNA, BNA, JNA), клювовидно-ключичная связка — связка, соединяющая ключицу с клювовидным отростком лопатки; представляет собой совокупность lig. trapezoideum u lig. conoideum; укрепляет акромиально-ключичный сустав, ограничивает движения ключицы.

182. **Coracoclaviculare externum,** наружная клювовидно-ключичная связка — см. *Trapezoideum.*

183. **Coracoclaviculare internum,** внутренняя клювовидно-ключичная связка — см. *Conoideum.*

184. **Coracohumerale** (PNA, BNA, JNA; accessorium humeri coracobrachiale), клювовидно-плечевая связка — уплотненный пучок волокон в фиброзном слое капсулы плечевого сустава, соединяющий основание и латеральный край клювовидного отростка лопатки с большим бугорком плечевой кости.

185. **Corniculopharyngeum** (BNA; corniculopharyngicum, JNA), рожковидно-глоточная связка — тонкая связка, идущая от верхушки рожковидного хряща гортани назад и к средней линии; вместе с такой же связкой противоположной стороны образует lig. jugale.

186. **Corniculopharyngicum** (JNA), рожковидно-глоточная связка — см. *Corniculopharyngeum.*

187. **Coronarium hepatis** (PNA, BNA), венечная связка печени — связка, образованная брюшиной в месте ее перехода с диафрагмы на диафрагмальную поверхность печени; соединяет задний край печени и нижнюю поверхность диафрагмы; справа и слева продолжается соответственно в lig. triangulare dextrum и lig. triangulare sinistrum.

188. **Costoclaviculare** (PNA, BNA, JNA; rhomboides claviculare), реберно-ключичная связка — связка, соединяющая ключицу с хрящом I ребра; укрепляет грудино-ключичный сустав, ограничивает движения ключицы вверх, вперед и назад.

189. **Costoensiformia** (JNA), реберно-мечевидные связки — см. *Costoxiphoidea.*

190. **Costosternalia,** реберно-грудинные связки — см. *Sternocostalia radiata.*

191. **Costotransversarium** (PNA, colli costae, BNA, JNA), реберно-поперечная связка — связка, соединяющая шейку ребра с поперечным отростком соответствующего позвонка; укрепляет реберно-поперечный сустав.

192. **Costotransversarium anterius** (BNA), передняя реберно-поперечная связка — см. *Costotransversarium superius.*

193. **Costotransversarium externum** (JNA), наружная реберно-поперечная связка — см. *Costotransversarium laterale.*

194. **Costotransversarium internum** (JNA), внутренняя реберно-поперечная связка — см. *Costotransversarium superius.*

195. **Costotransversarium laterale** (PNA; costotransversarium posterius, BNA; costotransversarium externum, JNA; colli costae posterius), латеральная реберно-поперечная связка — связка, соединяющая заднюю поверхность шейки ребра с корнем поперечного отростка вышележащего позвонка (у XI и XII ребер отсутствует); укрепляет реберно-поперечный сустав.

196. **Costotransversarium posterius** (BNA), задняя реберно-поперечная связка — см. *Costotransversarium laterale.*

197. **Costotransversarium superius** [PNA; costotransversarium anterius, BNA; costotransversarium internum, JNA; transversocostale (Cruveilhier); colli costae anterius], верхняя реберно-поперечная связка — связка, соединяющая верхний край шейки ребра с нижним краем поперечного отростка выше-

лежащего позвонка (у XI и XII ребер отсутствует); укрепляет реберно-поперечный сустав.

198. **Costovertebrale anterius,** передняя реберно-позвоночная связка — см. *Capitis costae radiatum.*

199. **Costovertebrale interosseum** (Cruveilhier), межкостная реберно-позвоночная связка (Крювелье) — см. *Capitis costae intraarticulare.*

200. **Costoxiphoidea** (PNA, BNA; costoensiformia, JNA), реберно-мечевидные связки — плоские связки, соединяющие хрящи VI и VII ребер с нижним концом тела грудины и мечевидным отростком.

201. **Cotyloideofibrocartilagineum acetabuli,** волокнисто-хрящевая связка вертлужной впадины — устаревшее название вертлужной губы тазобедренного сустава.

202. **Craniale durae matris,** краниальная связка твердой мозговой оболочки — соединительнотканные тяжи, соединяющие твердую мозговую оболочку с надкостницей в области атлантозатылочного и атлантоосевого суставов.

203. **Cranii** (PNA, BNA, JNA), связки черепа — общее название lig. stylohyoideum и lig. pterygospinale.

204. **Cricoarytaenoideum dorsale** (JNA), дорсальная перстнечерпаловидная связка — см. *Cricoarytenoideum posterius.*

205. **Cricoarytaenoideum posterius** (BNA), задняя перстнечерпаловидная связка — см. *Cricoarytenoideum posterius.*

206. **Cricoarytenoideum posterius** [PNA; cricoarytaenoideum posterius, BNA; cricoarytaenoideum dorsale, JNA; triquetrum (Tourtual)], задняя перстнечерпаловидная связка — связка, соединяющая верхний край пластинки перстневидного хряща с основанием черпаловидного хряща; укрепляет перстнечерпаловидный сустав.

207. **Cricopharyngeum** (PNA, BNA; cricopharyngicum, JNA; Santorini), перстневидно-глоточная связка — непарный соединительнотканный пучок, соединяющий пластинку перстневидного хряща с передней стенкой глотки.

208. **Cricopharyngicum** (JNA), перстневидно-глоточная связка — см. *Cricopharyngeum.*

209. **Cricothyreoidea lateralia,** латеральные перстнещитовидные связки — см. *Ceratocricoidea lateralia.*

210. **Cricothyreoidea posteriora,** задние перстнещитовидные связки — см. *Ceratocricoidea posteriora.*

211. **Cricothyreoideum** (JNA), перстнещитовидная связка — см. *Cricothyroideum.*

212. **Cricothyreoideum anterius,** передняя перстнещитовидная связка — см. *Ceratocricoideum anterius.*

213. **Cricothyreoideum** (medium) (BNA), средняя перстнещитовидная связка — см. *Cricothyroideum.*

214. **Cricothyroideum** [PNA; cricothyreoideum, JNA; cricothyreoideum (medium), BNA; conicum, conoides laryngis], перстнещитовидная связка — связка, соединяющая по средней линии перстневидный и щитовидный хрящи и образующая переднюю часть эластического конуса.

215. **Cricotracheale** [PNA, BNA, JNA; cricotracheale (anterius et posterius)], перстнетрахеальная связка — связка, соединяющая нижний край перстневидного хряща с верхним краем I хряща трахеи.

216. **Cricotracheale (anterius et posterius),** перстнетрахеальная (передняя и задняя) связка — см. *Cricotracheale.*

217. **Cruciata digitorum manus** (BNA; cruciformia digitorum manus, JNA), крестообразные связки пальцев кисти — крестообразно расположенные пучки волокон фиброзного влагалища пальцев кисти.

218. **Cruciata digitorum pedis** (BNA; cruciformia digitorum pedis, JNA), крестообразные связки пальцев стопы — крестообразно расположенные пучки волокон фиброзного влагалища пальцев стопы.

219. **Cruciata genu** (BNA), крестообразные связки колена — см. *Cruciata genus.*

220. **Cruciata genus** (PNA; cruciata genu, BNA; decussata genus, JNA), крестообразные связки колена — общее название lig. cruciatum anterius и lig. cruciatum posterius.

221. **Cruciatum anterius** (PNA, BNA; decussatum anterius, JNA; cruciatum genu anterius), передняя крестообразная связка — внутрисуставная связка коленного сустава, соединяющая внутреннюю поверхность латерального мыщелка бедренной кости с передним межмыщелковым полем большеберцовой кости; ограничивает поворот голени внутрь, ограничивает сгибание в коленном суставе, препятствует смещению большеберцовой кости вперед по отношению к мыщелкам бедренной кости.

222. **Cruciatum atlantis** (BNA), крестообразная связка атланта — см. *Cruciforme atlantis.*

223. **Cruciatum cruris** (BNA), крестообразная связка голени — см. *Retinaculum musculorum extensorum inferius.*

224. **Cruciatum genu anterius,** передняя крестообразная связка колена — см. *Cruciatum anterius.*

225. **Cruciatum genu posterius,** задняя крестообразная связка колена — см. *Cruciatum posterius.*

226. **Cruciatum posterius** (PNA, BNA; decussatum posterius, JNA; cruciatum genu posterius), задняя крестообразная связка — внутрисуставная связка коленного сустава, соединяющая внутреннюю поверхность медиального мыщелка бедренной кости с задним межмыщелковым полем большеберцовой кости; ограничивает поворот голени внутрь, ограничивает сгибание в коленном суставе, препятствует смещению большеберцовой кости назад по отношению к мыщелкам бедренной кости.

227. **Cruciforme** (JNA), крестообразная связка — см. *Retinaculum musculorum extensorum inferius.*

228. **Cruciforme atlantis** (PNA, JNA; cruciatum atlantis, BNA) — крестообразная связка атланта — связка, состоящая из поперечно расположенных волокон, натянутых позади зуба осевого позвонка между внутренними поверхностями боковых масс атланта (lig. transversum atlantis) и продольно расположенных волокон, соединяющих lig. transversum atlantis с передним краем большого затылочного отверстия (верхний пучок) и телом осевого позвонка (нижний пучок); укрепляет атлантозатылочный и атлантоосевые суставы.

229. **Cruciformia digitorum manus** (JNA), крестообразные связки пальцев кисти — см. *Cruciata degitorum manus.*

230. **Cruciformia digitorum pedis** (JNA), крестообразные связки пальцев стопы — см. *Criciata digitorum pedis.*

231. **Cubocuneiforme dorsale,** тыльная кубовидно-клиновидная связка — см. *Cuneocuboideum dorsale.*

232. **Cuboideonaviculare dorsale** [PNA, BNA; scaphocuboideum dorsale (Meckel)], тыльная кубовидно-ладьевидная связка — связка, соединяющая тыльные поверхности кубовидной и ладьевидной костей предплюсны; укрепляет поперечный сустав стопы.

233. **Cuboideonaviculare interosseum,** межкостная кубовидно-ладьевидная связка — короткая внутрисуставная связка, соединяющая кубовидную и ладьевидную кости предплюсны; относится к ligg. tarsi interossea.

234. **Cuboideonaviculare plantare** [PNA, BNA; cubonaviculare obliquum, JNA; massa ligamentosa navicularicuboidea (Weber)], подошвенная кубовидно-ладьевидная связка — связка, соединяющая в поперечном направлении подошвенные поверхности кубовидной и ладьевидной костей предплюсны; относится к ligg. tarsi plantaria.

235. **Cubonaviculare obliquum** (JNA), косая кубовидно-ладьевидная связка — см. *Cuboideonaviculare plantare.*

236. **Cuneocuboideum dorsale** (PNA, BNA; cubocuneiforme dorsale), тыльная клинокубовидная связка — связка, соединяющая тыльные поверхности латеральной клиновидной и кубовидной костей предплюсны; относится к ligg. tarsi dorsalia.

237. **Cuneocuboideum interosseum** (PNA, BNA), межкостная клинокубовидная связка — короткая внутрисуставная связка, соединяющая обращенные друг к другу поверхности латеральной клиновидной и кубовидной костей предплюсны; относится к ligg. tarsi interossea.

238. **Cuneocuboideum plantare** (PNA, BNA), подошвенная клинокубовидная связка — связка, соединяющая в поперечном направлении подошвенные поверхности латеральной клиновидной и кубовидной костей предплюсны; относится к ligg. tarsi plantaria.

239. **Cuneometatarsea interossea** (PNA, BNA; tarsometatarsea interossea, BNA), межкостные клиноплюсневые связки — связки, соединяющие обращенные друг к другу поверхности клиновидных костей стопы и I — III плюсневых костей; укрепляют предплюсне-плюсневые суставы.

240. **Cuneonavicularia dorsalia** [PNA, navicularicuneiformia dorsalia, BNA; scaphoideocuneiformia dorsalia (Barkow)], тыльные клиноладьевидные связки — связки, соединяющие тыльные поверхности ладьевидной и трех клиновидных костей предплюсны; относятся к ligg. tarsi dorsalia.

241. **Cuneonavicularia plantaria** [PNA; navicularicuneiformia plantaria, BNA; scaphoideocuneiformia externum, internum, et medium (Barkow)], подошвенные клиноладьевидные связки — связки, соединяющие подошвенные поверхности ладьевидной и трех клиновидных костей предплюсны.

242. **Decussata genus** (JNA), перекрещенные связки колена — см. *Cruciata genus.*

243. **Decussatum anterius** (JNA), передняя перекрещенная связка — см. *Cruciatum anterius.*

244. **Decussatum posterius** (JNA), задняя перекрещенная связка — см. *Cruciatum posterius.*

245. **Deltoides** (JNA), дельтовидная связка — см. *Mediale (deltoideum).*

246. **Deltoideum** (BNA), дельтовидная связка — см. *Mediale (deltoideum).*

247. **Deltoideum pedis,** дельтовидная связка стопы — см. *Mediale (deltoideum).*

248. **Denticulatum** (PNA, BNA, JNA; laciniatum medullae spinalis serratum medullae spinalis), зубчатая связка — совокупность треугольных отростков твердой оболочки спинного мозга (20—25), расположенных во фронтальной плоскости и прикрепляющихся между передними и задними корешками к мягкой оболочке (основания треугольников) и к твердой оболочке спинного мозга (вершины треугольников).

249. **Dorsalia carpi,** тыльные связки запястья — см. *Intercarpea dorsalia.*

250. **Dorsolateralia durae matris,** дорсо-латеральные связки твердой мозговой оболочки — соединительнотканные пучки, протянутые от боковых поверхностей твердой оболочки спинного мозга к дугам позвонков.

251. **Ductus arteriosi chorda,** струна артериального протока — см. *Arteriosum.*

252. **Dustus venosi,** связка венозного протока — см. *Venosum.*

253. **Ductus venosi chorda,** струна венозного протока — см. *Venosum.*

254. **Ductuum semicircularium membranaceorum,** связки перепончатых полукружных протоков — соединительнотканные тяжи, фиксирующие полукружные протоки в костных полукружных каналах.

255. **Duodenohepaticum,** дуоденально-печеночная связка — см. *Hepatoduodenale.*

256. **Duodenorenale** (BNA), дуоденально-почечная связка — связка, образованная брюшиной в месте ее перехода с двенадцатиперстной кишки на правую почку.

257. **Elastica,** эластические связки — общее название связок, образованных эластическими волокнами.

258. **Epididymidis inferius** (PNA, BNA, caudae epididymidis plica, JNA), нижняя связка придатка яичка — складка влагалищной оболочки яичка в месте ее перехода с яичка на хвост придатка яичка.

259. **Epididymidis superius** (PNA, BNA; plica capitis epididymidis, JNA), верхняя связка придатка яичка — складка влагалищной оболочки яичка в месте ее перехода с яичка на головку придатка яичка.

260. **Epistrophicoatlanticum anticum superficiale,** поверхностная передняя атлантоосевая часть lig. longitudinale anterius, соединяющая атлант с осевым позвонком.

261. **Extracapsularia** (PNA), внекапсульные связки — общее название связок, расположенных вблизи суставов, но не включенных в фиброзный слой суставной капсулы.

262. **Falciforme hepatis** (PNA, BNA; mesohepaticum ventrale, JNA; suspensorium hepatis), серповидная связка печени — дупликатура брюшины в виде сагиттально расположенной пластины, соединяющей нижнюю поверхность диафрагмы с диафрагмальной поверхностью печени.

263. **Fallopii,** фаллопиева связка — см. *Inguinale.*

264. **Fibrosum anticum,** передняя фиброзная связка — см. *Pubicum anterius.*

265. **Fibrosum posticum,** задняя фиброзная связка — см. *Pubicum posterius.*

266. **Fibulocalcaneare** (BNA, JNA), малоберцово-пяточная связка — см. *Calcaneofibulare.*

267. **Fibulotalare anterius,** передняя малоберцово-таранная связка — см. *Talofibulare anterius.*

268. **Fibulotalare posterius,** задняя малоберцово-таранная связка — см. *Talofibulare posterius.*

269. **Flava** (PNA, BNA; interarcualia, JNA; arcuum), желтые связки — эластические связки, соединяющие дуги позвонков (кроме промежутка между атлантом и осевым позвонком).

270. **Fundiforme (dorsi pedis)** (JNA; fundiforme pedis), пращевидная связка (тыла стопы) — связка, охватывающая в виде петли сухожилия длинного разгибателя пальцев; является латеральной частью retinaculum musculorum extensorum inferius.

271. **Fundiforme clitoridis,** пращевидная связка клитора — эластическая связка, охватывающая сверху и с боков клитор.

272. **Fundiforme pedis,** пращевидная связка стопы — см. *Fundiforme (dorsi pedis).*

273. **Fundiforme penis** (PNA, BNA, JNA), пращевидная связка полового члена — эластическая связка, охватывающая сверху и с боков пещеристые тела полового члена.

274. **Gastrocolicum** [PNA, BNA; pars gastromesocolica (mesogastrii dorsalis), JNA], желудочно-ободочная связка — дупликатура брюшины, соединяющая большую кривизну желудка с поперечной ободочной кишкой.

275. **Gastrohepaticum,** желудочно-печеночная связка — см. *Hepatogastricum.*

276. **Gastrolienale** [PNA, BNA; pars gastrolienalis (mesogastrii dorsalis), JNA; splenicogastricum], желудочно-селезеночная связка — дупликатура брюшины, соединяющая дно желудка с воротами селезенки.

277. **Gastrolienalis pars (mesogastrii dorsalis)** (JNA), желудочно-селезеночная часть (дорсального мезогастрия) — см. *Gastrolienale.*

278. **Gastromesocolica pars (mesogastrii dorsalis)** (JNA), желудочно-ободочная часть (дорсального мезогастрия) — см. *Gastrocolicum.*

279. **Gastropancreaticae plicae** (PNA), гастропанкреатические складки — складки париетальной брюшины, выстилающей заднюю стенку сальниковой сумки, в толще к-рых проходят общая печеночная и левая желудочная артерии.

280. **Gastrophrenicum (dextrum)** (pars phrenicogastrica omenti minoris, JNA; phrenicogastricum dextrum), желудочно-диафрагмальная связка (правая) — складка брюшины в месте ее перехода с диафрагмы на начало малой кривизны желудка у места впадения пищевода.

281. **Gastrophrenicum (sinistrum)** [PNA; phrenicogastricum sinistrum, pars phrenicogastrica (mesogastrii dorsalis), JNA], желудочно-диафрагмальная связка (левая) — треугольная складка брюшины, соединяющая диафрагму с левой стороной кардиальной части желудка; часть большого сальника.

282. **Genitoinguinale** [PNA; scrotale testis (Waldeyer)], пахово-половая связка — соединительнотканная пластинка, соединяющая нижний конец яичка с мошонкой; остаток направляющей связки яичка.

283. **Glandulae thyreoideae (medium et lateralia),** связки щитовидной железы (средняя и боковые) — связки, соединяющие капсулу щитовидной железы с хрящами гортани и трахеи.

284. **Glenohumerale (superius, medium et inferius) (Revnier),** верхняя средняя и нижняя суставно-плечевые связки (Рейнье) — см. *Glenohumeralia.*

285. **Glenohumeralia** [PNA; labiohumeralia, JNA; glenohumerale (superius, medium et inferius) (Reynier)], суставно-плечевые связки — уплотненные участки фиброзного слоя капсулы плечевого сустава, соединяющие анатомическую шейку плеча с суставной губой; различают верхнюю, среднюю и нижнюю связки.

286. **Glottidis spurium,** ложная голосовая связка — см. *Vestibulare.*

287. **Glottidis verum,** истинная голосовая связка — см. *Vocale.*

288. **Hamatometacarpeum,** крючковидно-пястная связка — связка, соединяющая крючок крючковидной кости с основанием V пястной кости; относится к ligg. carpometacarpea palmaria.

289. **Hepatocavoduodenale (Klaatsch),** печеночно-кавально-дуоденальная связка — связка образованная брюшиной в месте ее перехода с нижней полой вены на печень и двенадцатиперстную кишку.

290. **Hepatocolicum** (PNA, BNA), печеночно-ободочная связка — продолжение lig. hepatoduodenale к поперечной ободочной кишке.

291. **Hepatocystocolicum,** печеночно-пузырно-ободочная связка — часть малого сальника, соединенная с lig. hepatorenale, вместе с к-рой ограничивает сальниковое отверстие.

292. **Hepatoduodenale** [PNA, BNA; pars hepatoduodenalis (omenti minoris), JNA, duodenohepaticum], печеночно-дуоденальная связка — дупликатура брюшины, соединяющая ворота печени с двенадцатиперстной кишкой; между ее листками лежат воротная вена, общая печеночная артерия, общий желчный проток, нервы, а также лимфатические сосуды и узлы.

293. **Hepatoduodenalis pars (omenti minoris)** (JNA), печеночно-двенадцатиперстная часть (малого сальника) — см. *Hepatoduodenale.*

294. **Hepatogastrica pars (omenti minoris)** (JNA), печеночно-желудочная часть (малого сальника) — см. *Hepatogastricum.*

295. **Hepatogastricum** [PNA, BNA; pars hepatogastrica (omenti minoris), JNA; gastrohepaticum], печеночно-желудочная связка — дупликатура брюшины, соединяющая ворота печени с малой кривизной желудка.

296. **Hepatorenale** (PNA, BNA), печеночно-почечная связка — связка, образованная брюшиной в месте ее перехода с правой доли печени на правую почку.

297. **Hepatoumbilicale**, печеночно-пупочная связка — см. *Teres hepatis.*

298. **Hyoepiglottica membrana (Luschka)**, подъязычно-надгортанная перепонка (Лушки) — см. *Hyoepiglotticum.*

299. **Hyoepiglotticum** [PNA, BNA; membrana hyoepiglottica (Luschka)], подъязычно-надгортанная связка — связка, соединяющая переднюю поверхность надгортанника с верхним краем подъязычной кости.

300. **Hyothyreoideum laterale** (BNA, JNA), латеральная подъязычно-щитовидная связка — см. *Thyrohyoideum laterale.*

301. **Hyothyreoideum medium** (BNA, JNA), средняя подъязычно-щитовидная связка — см. *Thyrohyoideum medianum.*

302. **Iliocostale**, подвздошно-реберная связка — см. *Lumbocostale.*

303. **Iliofemorale** [PNA, BNA, JNA; Bertini, suspensorium femoris, suspensorium pelvis (Fick)], подвздошно-бедренная связка — связка, соединяющая нижнюю переднюю подвздошную ость с большим вертелом и межвертельной линией бедренной кости; укрепляет тазобедренный сустав, ограничивает разгибание бедра (препятствует запрокидыванию туловища назад при стоянии), его вращение наружу и приведение.

304. **Iliolumbale** (PNA, BNA, JNA; iliolumbale superius et inferius), подвздошно-поясничная связка — связка, соединяющая поперечные отростки IV и V поясничных позвонков с задней частью подвздошного гребня и крестцом; укрепляет крестцово-подвздошный сустав.

305. **Iliolumbale superius et inferius**, верхняя и нижняя подвздошно-поясничные связки — см. *Iliolumbale.*

306. **Iliopectineum** (BNA), подвздошно-гребешковая связка — см. *Iliopectineus arcus.*

307. **Iliopectineus arcus** (PNA; iliopectineum, BNA; pars interlacunaris fasciae ilicae, JNA), подвздошно-гребешковая дуга — фасциальная пластинка, идущая от lig. inguinale к подвздошно-лобковому возвышению на тазовой кости; образуется при переходе подвздошной фасции с подвздошно-поясничной мышцы в фасцию, покрывающую гребешковую мышцу; разделяет пространство под lig. inguinale на сосудистую и мышечную лакуны.

308. **Iliopubicum**, подвздошно-лобковая связка — см. *Inguinale.*

309. **Incudis posterius** (PNA, BNA, JNA; processus brevis incudis), задняя связка наковальни — связка, соединяющая короткую ножку наковальни с ямкой наковальни на сосцевидной стенке барабанной полости.

310. **Incudis superius** (PNA, BNA, JNA), верхняя связка наковальни — связка, соединяющая тело наковальни с крышей барабанной полости.

311. **Infundibulopelvicum**, воронко-тазовая связка — см. *Suspensorium ovarii.*

312. **Inguinale** [PNA, JNA; inguinale (Pouparti), BNA; iliopubicum Fallopii], паховая связка — свободный край апоневроза наружной косой мышцы живота между передней верхней подвздошной остью и лобковым бугорком; образует нижнюю стенку пахового канала.

313. **Inguinale (Cooperi)**, паховая связка (Куперова) — см. *Lacunae.*

314. **Inguinale (Pouparti)** (BNA), паховая связка (пупартова) — см. *Inguinale.*

315. **Inguinale reflexum** (JNA), загнутая паховая связка — см. *Reflexum.*

316. **Inhibentia**, задерживающие связки — общее название связок, ограничивающих объем движений в суставе.

317. **Interannularia**, межкольцевые связки — см. *Anularia* (*trachealia*).

318. **Interarcualia** (JNA), междужковые связки — см. *Flava.*

319. **Interarticulare chondrosternale (Quain)**, хрящегрудинная межсуставная связка — см. *Sternocostale intraarticulare.*

320. **Intercarpea dorsalia** (PNA, BNA; intercarpica dorsalia, JNA; dorsalia carpi), тыльные межзапястные связки — общее название связок, соединяющих тыльные поверхности костей запястья.

321. **Intercarpea interossea** (PNA, BNA; intercarpica interossea, JNA; carpi interossea; intercarpea intraarticularia), межкостные межзапястные связки — короткие крепкие связки, расположенные внутри суставов между костями дистального ряда запястья.

322. **Intercarpea intraarticularia**, межсуставные межзапястные связки — см. *Intercarpea interossea.*

323. **Intercarpea palmaria** (PNA; intercarpea volaria, BNA; intercarpica volaria, JNA; volaria carpi), ладонные межзапястные связки — общее название связок, соединяющих ладонные поверхности костей запястья.

324. **Intercarpea volaria** (BNA), ладонные межзапястные связки — см. *Intercarpea palmaria.*

325. **Intercarpica dorsalia** (JNA), тыльные межзапястные связки — см. *Intercarpea dorsalia.*

326. **Intercarpica interossea** (JNA), межкостные межзапястные связки — см. *Intercarpea interossea.*

327. **Intercarpica volaria** (JNA), ладонные межзапястные связки — см. *Intercarpea palmaria.*

328. **Intercartilaginea**, межхрящевые связки — см. *Intercostalis externa membrana.*

329. **Interclaviculare** (PNA, BNA, JNA), межключичная связка — непарная связка, расположенная поперечно между грудинными концами ключиц; укрепляет грудиноключичные суставы.

330. **Intercostalia** (BNA, JNA), межреберные связки — общее название membrana intercostalis externa и membrana intercostalis interna.

331. **Intercostalia externa** (BNA, JNA), наружные межреберные связки — см. *Intercostalis externa membrana.*

332. **Intercostalia interna** (BNA, JNA), внутренние межреберные связки — см. *Intercostalis interna membrana.*

333. **Intercostalis externa membrana** (PNA; intercostalia externa, BNA, JNA; coruscantia, intercartilaginea), наружная межреберная мембрана — совокупность блестящих фиброзных пучков, соединяющих хрящи рядом расположенных ребер и имеющих то же направление, что и волокна наружных межреберных мышц.

334. **Intercostalis interna membrana** (PNA; intercostalia interna, BNA, JNA), внутренняя межреберная мембрана — совокупность связок, соединяющих задние отделы ребер и имеющих то же направление, что и волокна внутренних межреберных мышц.

335. **Intercuneiformia dorsalia** (PNA), тыльные межклиновидные связки — связки, соединяющие тыльные поверхности клиновидных костей предплюсны.

336. **Intercuneiformia interossea** (PNA, BNA; tarsi interossea, JNA), межкостные межклиновидные связки — связки, соединяющие обращенные друг к другу поверхности клиновидных костей предплюсны.

337. **Intercuneiformia plantaria** (PNA BNA; tarsi plantaria, JNA), подошвенные межклиновидные связки — связки, соединяющие подошвенные поверхности клиновидных костей предплюсны.

338. **Interfoveolare** [PNA, JNA; interfoveolare (Hesselbachi), BNA], межъямочковая связка — сухожильные пучки поперечной и внутренней косой мышц живота, укрепляющие поперечную фасцию в паховой области; часть пучков ограничивает глубокое паховое кольцо.

339. **Interfoveolare (Hesselbachi)** (BNA), межъямочковая (Гессельбахова) связка — см. *Interfoveolare.*

340. **Interhyoidea**, межподъязычные связки — связки, соединяющие малые рожки подъязычной кости с ее телом.

341. **Interlacunaris pars fasciae ilicae** (JNA), межлакунная часть подвздошной фасции — см. *Iliopectineus arcus.*

342. **Intermetacarpalia (Guentheri)**, межпястные связки (Гунтера) — см. *Metacarpea dorsalia.*

343. **Interossea ossium metatarsalium**, межкостные связки плюсневых костей — см. *Metatarsea interossea.*

344. **Interspinalia** [PNA, BNA, JNA; membrana interspinalis (Weitbrechti)], межостистые связки — связки, соединяющие остистые отростки соседних позвонков; наиболее хорошо развиты в поясничном отделе позвоночника.

345. **Interspinalis membrana** (Weitbrechti), межостистая перепонка (Вейтбрехта) — см. *Interspinalia.*

346. **Intertransversaria** (PNA, BNA, JNA), межпоперечные связки — связки, соединяющие поперечные отростки соседних позвонков; наиболее хорошо развиты в поясничном отделе позвоночника.

347. **Intervertebrale cervicale**, шейная межпозвоночная связка — совокупность соединительнотканных тяжей, соединяющих оболочки шейных спинномозговых нервов в позвоночном канале.

348. **Intraarticularia**, внутрисуставные связки — связки, расположенные в полости сустава.

349. **Intracapsularia** (PNA), внутрикапсульные связки — пучки волокон фиброзного слоя суставной капсулы, укрепляющие сустав, ограничивающие или направляющие движения в суставе.

350. **Iridis pectinatum** (BNA), гребенчатая связка радужки — см. *Pectinatum anguli iridocornealis.*

351. **Ischiocapsulare** (BNA, JNA), седалищно-капсулярная связка — см. *Ischiofemorale.*

352. **Ischiofemorale** (PNA; ischiocapsulare, BNA, JNA), седалищно-бедренная связка — крепкая связка, соединяющая седалищную кость в области

медиального края вертлужной впадины с вертельной ямкой бедренной кости; частично вплетается в круговую зону; ограничивает вращение внутрь и разгибание бедра в тазобедренном суставе.

353. **Jugale**, соединяющая связка — см. *Transversum genus.*

354. **Jugale (Luschka),** соединяющая связка (Лушки) — непарная связка гортани, образующаяся от соединения правой и левой lig. corniculopharyngeum и прикрепляющаяся к пластинке перстневидного хряща.

355. **Labiohumeralia** (JNA), губноплечевые связки — см. *Glenohumeralia.*

356. **Laciniatum** (BNA, JNA), расщепленная связка — см. *Retinaculum musculorum flexorum.*

357. **Laciniatum externum (laterale),** наружная (латеральная) расщепленная связка — см. *Retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) superius.*

358. **Laciniatum medullae spinalis,** расщепленная связка спинного мозга — см. *Denticulatim.*

359. **Lacunare** [PNA, JNA; lacunare (Gimbernati), BNA; inguinale (Cooperi)], лакунарная связка — часть сухожильных волокон, отделяющихся от паховой связки, идущая вниз и кнаружи к гребню лобковой кости; ограничивает с медиальной стороны сосудистую лакуну.

360. **Lacunare (Gimbernati)** (BNA), лакунарная (жимбернатова) связка — см. *Lacunare.*

361. **Lata uteri plica** (JNA), широкая складка матки — см. *Latum uteri.*

362. **Laterale** (PNA; temporomandibulare, BNA, JNA; maxillare laterale), латеральная связка — связка, соединяющая скуловой отросток височной кости с шейкой нижней челюсти; укрепляет височно-нижнечелюстной сустав, ограничивает движение головки нижней челюсти назад.

363. **Laterale internum articuli pedis,** внутренняя латеральная связка сустава стопы — см. *Mediale (deltoideum).*

364. **Latum pulmonis,** широкая связка легкого — см. *Pulmonale.*

365. **Latum uteri** (PNA, BNA; plica lata uteri, JNA; uteri latum), широкая связка матки — дупликатура брюшицы, соединяющая боковые края тела матки с боковыми стенками малого таза.

366. **Lienorenale** (PNA; lienale), селезеночно-почечная связка — связка, образованная брюшиной в месте ее перехода с селезенки на левую почку.

367. **Longitudinale (Barkow),** продольная связка (Баркова) — см. *Supraspinalia.*

368. **Longitudinale anterius** (PNA, BNA; longitudinale commune ventrale, JNA; commune vertebrarum anterius), передняя продольная связка — длинная, крепкая связка, идущая вдоль передней поверхности тел позвонков от основной части затылочной кости и переднего бугорка атланта до тазовой поверхности крестца; укрепляет позвоночный столб, ограничивает его разгибание.

369. **Longitudinale commune dorsale** (JNA), дорсальная общая продольная связка — см. *Longitudinale posterius.*

370. **Longitudinale commune ventrale** (JNA), вентральная общая продольная связка — см. *Longitudinale anterius.*

371. **Longitudinale posterius** (PNA, BNA; longitudinale commune dorsale, JNA; commune vertebrarum posterius), задняя продольная связка — крепкая, длинная связка, идущая вдоль задней поверхности тел позвонков от затылочной кости до крестцового канала; укрепляет позвоночный столб, ограничивает его сгибание.

372. **Limbocostale** (PNA, BNA, JNA; iliocostale), поясничнo-реберная связка — фиброзные пучки глубокого листка поясничнo-грудной фасции, идущие от поперечных отростков I и II поясничных позвонков к XII ребру.

373. **Lumbocostalis lateralis arcus** (JNA), латеральная поясничнo-реберная дуга — см. *Arcuatum laterale.*

374. **Lumbocostalis lateralis arcus (Halleri)** (BNA), латеральная поясничнo-реберная дуга (Галлера) — см. *Arcuatum laterale.*

375. **Lumbocostalis medialis arcus** (JNA), медиальная поясничнo-реберная дуга — см. *Arcuatum mediale.*

376. **Lumbocostalis medialis arcus (Halleri)** (BNA), медиальная поясничнo-реберная дуга (Галлера) — см. *Arcuatum mediale.*

377. **Lumbosacrale durae matris,** поясничнo-крестцовая связка твердой мозговой оболочки — соединительнотканные тяжи, соединяющие твердую оболочку спинного мозга с надкостницей тел поясничных позвонков и крестца.

378. **Mallei anterius** (PNA, BNA; processus longi mallei, JNA), передняя связка молоточка — связка, идущая от шейки и переднего отростка молоточка через барабанно-каменистую щель к ости клиновидной кости.

379. **Mallei laterale** (PNA, BNA, JNA), латеральная связка молоточка — связка треугольной формы, соединяющая шейку молоточка с верхней стенкой наружного слухового прохода.

380. **Mallei superius** (PNA, BNA; capituli mallei superius, JNA; suspensorium mallei), верхняя связка молоточка — тонкая связка, соединяющая головку молоточка с крышей барабанной полости.

381. **Malleoli externi inferius (Weitbrechti),** нижняя связка наружной лодыжки (Вейтбрехта) — нижняя часть lig. tibiofibulare anterius.

382. **Malleoli externi superius,** верхняя связка наружной лодыжки — самая нижняя утолщенная часть межкостной перепонки голени.

383. **Malleoli lateralis anterius** (BNA), передняя связка латеральной лодыжки — см. *Tibiofibulare anterius.*

384. **Malleoli lateralis interosseum,** межкостная связка латеральной лодыжки — крепкие короткие фиброзные тяжи, соединяющие внутреннюю шероховатую поверхность наружной лодыжки с соответствующей вырезкой большеберцовой кости; образует межберцовый синдесмоз.

385. **Malleoli lateralis posterius** (BNA), задняя связка латеральной лодыжки — см. *Tibiofibulare posterius.*

386. **Massa ligamentosa navicularicuboidea (Weberi),** ладьевидно-кубовидная связочная масса (Вебера) — см. *Cuboideonaviculare plantare.*

387. **Maxillare laterale,** латеральная челюстная связка — см. *Laterale.*

388. **Maxillare mediale,** медиальная челюстная связка — см. *Sphenomandibulare.*

389. **Mediale (deltoideum)** (PNA; deltoideum, BNA; deltoides, JNA; laterale internum articuli pedis, deltoideum pedis), медиальная (дельтовидная) связка — крепкая веерообразная связка, расположенная на медиальной поверхности голеностопного сустава, соединяющая нижний край медиальной лодыжки с ладьевидной, таранной и пяточной костями; делится на pars tibionavicularis, pars tibiocalcanea, pars tibiotalaris anterior и pars tibiotalaris posterior; укрепляет голеностопный сустав.

390. **Mediastinopulmonalis plica** (JNA), средостенно-легочная складка — см. *Pulmonale.*

391. **Menisci fibularis** (JNA), связка малоберцового мениска — см. *Meniscofemorale posterius.*

392. **Meniscofemorale anterius** (PNA), передняя мениско-бедренная связка — пучки фиброзных волокон, соединяющие спереди латеральный мениск коленного сустава с передней крестообразной связкой.

393. **Meniscofemorale posterius** (PNA; menisci fibularis, JNA), задняя мениско-бедренная связка — часть lig. cruciatum posterius, соединяющая латеральную поверхность медиального мыщелка бедренной кости с задней частью латерального мениска.

394. **Meniscomandibulare laterale (Sebileau),** латеральная менисконижнечелюстная связка (Себило) — пучок волокон фиброзного слоя капсулы височно-нижнечелюстного сустава, соединяющий с латеральной стороны нижний край суставного диска с областью нижнего прикрепления суставной капсулы.

395. **Meniscomandibulare mediale (Sebileau),** медиальная менисконижнечелюстная связка (Себило) — пучок волокон фиброзного слоя капсулы височно-нижнечелюстного сустава, соединяющий с медиальной стороны нижний край суставного диска с областью нижнего прикрепления суставной капсулы.

396. **Meniscotemporale anterius,** передняя мениско-височная связка — пучок волокон фиброзного слоя капсулы височно-нижнечелюстного сустава, проходящий в ее переднем отделе от скуловой дуги до суставного диска.

397. **Meniscotemporale posterius,** задняя мениковисочная связка — пучок волокон фиброзного слоя капсулы височно-нижнечелюстного сустава, проходящий в ее заднем отделе от скуловой дуги до верхнего края суставного диска.

398. **Mesohepaticum laterale dextrum** (JNA), правая латеральная брыжейка печени — см. *Triangulare dextrum.*

399. **Mesohepaticum laterale sinistrum** (JNA), левая латеральная брыжейка печени — см. *Triangulare sinistrum.*

400. **Mesohepaticum ventrale** (JNA), вентральная брыжейка печени — см. *Falciforme hepatis.*

401. **Metacarpea dorsalia** [PNA; basium (ossium metacarpalium) dorsalia, BNA; basium ossium metacarpi dorsalia, JNA; intercarpalia (Guenther)], тыльные пястные связки кисти — связки, соединяющие тыльные поверхности оснований пястных костей; укрепляют межпястные суставы.

402. **Metacarpea interossea** [PNA; basium (ossium metacarpalium) interossea, BNA; basium ossium metacarpi interossea, JNA)], межкостные пястные связки — связки, соединяющие обращенные друг к другу поверхности оснований пя-

стных костей; укрепляют межпястные суставы.

403. **Metacarpea palmaria** [PNA; basium (ossium metacarpalium) volaria, BNA; basium ossium metacarpi volaria, JNA], ладонные пястные связки — связки, соединяющие ладонные поверхности оснований пястных костей; укрепляют межпястные суставы.

404. **Metacarpeum transversum profundum** [PNA; capitulorum (ossium metacarpalium) transversa, BNA; capitulorum ossium metacarpi transversa, JNA], глубокая поперечная пястная связка — совокупность фиброзных пучков, соединяющих боковые поверхности головок пястных костей; укрепляет пястно-фаланговые суставы, препятствует расхождению головок пястных костей.

405. **Metacarpeum transversum superficiale** (PNA) — поверхностная поперечная пястная связка — поперечно расположенные пучки волокон поверхностной фасции дистальной части ладони.

406. **Metatarsea dorsalia** [PNA; basium (ossium metatarsalium) dorsalia, BNA; basium ossium metatarsi dorsalia, JNA], тыльные плюсневые связки — связки, соединяющие тыльные поверхности оснований плюсневых костей; укрепляют предплюсне-плюсневые суставы.

407. **Metatarsea interossea** [PNA; basium (ossium metatarsalium) interossea, BNA; basium ossium metatarsi interossea, JNA; interossea ossium metatarsalium], межкостные плюсневые связки — связки, соединяющие обращенные друг к другу поверхности оснований плюсневых костей (II — V); укрепляют предплюсне-плюсневые суставы.

408. **Metatarsea plantaria** [PNA; basium (ossium metatarsalium) plantaria, BNA; basium ossium metatarsi plantaria, JNA], подошвенные плюсневые связки — связки, соединяющие подошвенные поверхности оснований плюсневых костей; укрепляют предплюсне-плюсневые суставы.

409. **Metatarseum transversum profundum** [PNA; capitulorum (ossium metatarsalium), transversa, BNA; capitulorum ossium metatarsi transversa, JNA], глубокая поперечная плюсневая связка — совокупность фиброзных пучков, соединяющих боковые поверхности головок плюсневых костей; укрепляет плюснефаланговые суставы, препятствует расхождению головок плюсневых костей.

410. **Metatarseum transversum superficiale** (PNA; plantae, transversum superficiale) — поверхностная поперечная плюсневая связка — поперечно расположенные пучки волокон поверхностной фасции дистального отдела подошвы.

411. **Navicularicuneiformia dorsalia** (BNA), тыльные ладьевидно-клиновидные связки — см. *Cuneonavicularia dorsalia.*

412. **Navicularicuneiformia plantaria** (BNA), подошвенные ладьевидно-клиновидные связки — см. *Cuneonavicularia plantaria.*

413. **Navicularilunatum,** ладьевидно-полулунная связка — непостоянная межкостная связка запястья, расположенная между ладьевидной и полулунной костями.

414. **Naviculocuboideum interosseum,** межкостная ладьевидно-кубовидная связка — межкостная связка предплюсны, расположенная между ладьевидной и кубовидной костями.

415. **Nuchae** (PNA, BNA; septum nuchae (JNA), выйная связка — связка, соединяющая остистые отростки шейных позвонков с наружным затылочным выступом; является продолжением ligg. supraspinalia.

416. **Nuchae septum** (JNA), выйная перегородка — см. *Nuchae.*

417. **Obliqua chorda** (PNA, JNA, BNA), косая хорда — фиброзные пучки, идущие косо сверху вниз от бугристости локтевой к бугристости лучевой кости.

418. **Obliqua digitorum manus**, косые связки пальцев кисти — косо направленные волокна, укрепляющие фиброзные влагалища пальцев в области межфаланговых суставов.

419. **Occipitoaxiale posterius**, задняя затылочно-аксиальная связка — широкая плотная пластинка, начинающаяся от переднего отдела затылочной кости и сливающаяся в области II шейного позвонка с lig. longitudinale posterius.

420. **Odontoideum**, зубовидная связка — см. *Alaria.*

421. **Ossiculorum auditus** (PNA, BNA; ossiculorum tympani, JNA), связки слуховых косточек — общее назв ие связок, фиксирующих слуховые косточки и укрепляющих соединения между ними; ligg. mallei anterius, laterale et superius, ligg. incudis posterius et superius, lig. anulare stapedis.

422. **Ossiculorum tympani** (JNA), связки барабанных косточек — см. *Ossiculorum auditus.*

423. **Ovarii proprium** (PNA, BNA; chorda utero-ovarica, JNA), собственная связка яичника — пучок соединительнотканных волокон и гладкомышечных клеток, заложенный между листками широкой связки матки между маткой и маточным концом яичника.

424. **Ovaricopelvicum**, яичниково-тазовая связка — см. *Suspensorium ovarii.*

425. **Palmaria** (PNA; accessoria volaria, BNA, JNA), ладонные связки — утолщенные участки капсул пястно-фаланговых суставов, расположенные на ладонной стороне суставов; содержат волокнистый хрящ, дополняющий суставные поверхности.

426. **Palpebrale laterale** (PNA; palpebrale temporale, JNA), латеральная связка век — связка, расположенная у латерального угла глазной щели позади круговой мышцы глаза, соединяющая скуловую кость с хрящами верхнего и нижнего века.

427. **Palpebrale mediale** (PNA, BNA; palpebrale nasale, JNA), медиальная связка век — связка, лежащая под кожей, кпереди от слезного мешка, соединяющая лобный отросток верхней челюсти с хрящами верхнего и нижнего века.

428. **Palpebrale nasale** (JNA), носовая связка век — см. *Palpebrale mediale.*

429. **Palpebrale temporale** (JNA), височная связка век — см. *Palpebrale laterale.*

430. **Patellae** [PNA, BNA, JNA; patellae proprium, patellae medium (Nuhn)], связка надколенника — крепкая связка, соединяющая верхушку надколенника с бугристостью большеберцовой кости; является продолжением сухожилия четырехглавой мышцы бедра.

431. **Patellae externum (Nuhn),** наружная (латеральная) связка надколенника (Нуна) — см. *Retinaculum patellae laterale.*

432. **Patellae internum (Nuhn),** внутренняя (медиальная) связка надколенника (Нуна) — см. *Retinaculum patellae mediale.*

433. **Patellae medium (Nuhn),** средняя с язка надколенника (Нуна) — см. *Patellae.*

434. **Patellae proprium,** собственная связка надколенника — см. *Patellae.*

435. **Pectinatum anguli iridocornealis** (PNA; pectinatum iridis, BNA; spongium anguli iridocornealis, JNA; iridis pectinatum), гребенчатая связка радужно-роговичного угла — соединительнотканное сетчатое образование, соединяющее ресничный край радужки с краем задней поверхности роговицы, через к-рое происходит фильтрация водянистой влаги из передней камеры глазного яблока в венозный синус склеры (шлеммов канал).

436. **Pectinatum iridis,** гребенчатая связка радужки — см. *Pectinatum anguli iridocornealis.*

437. **Pectineale** (PNA), гребешковая связка — связка, представляющая собой ответвление lig. lacunare, расположенная на лобковом гребне.

438. **Periodontale** (LNH; membrana periodontalis) — участок периодонта, расположенный в области шейки зуба.

439. **Petioli epiglottidis (Tourtual),** связка лепестка надгортанника (Туртюаля) — см. *Thyroepiglotticum.*

440. **Phrenicocolicum** (PNA, BNA; plica phrenicocolica, JNA), диафрагмально-ободочная связка — складка брюшины в месте ее перехода с левого изгиба ободочной кишки на реберную часть диафрагмы; замыкает снизу слепой мешок селезенки.

441. **Phrenicogastrica pars (mesogastrii dorsalis)** (JNA), диафрагмально-желудочная часть (дорсального мезогастрия) — см. *Gastrophrenicum (sinistrum).*

442. **Phrenicogastrica pars (omenti minoris)** (JNA), диафрагмально-желудочная часть (малого сальника) — см. *Gastrophrenicum (dextrum).*

443. **Phrenicogastricum dextrum,** правая диафрагмально-желудочная связка — см. *Gastrophrenicum (dextrum).*

444. **Phrenicogastricum sinistrum,** левая диафрагмально-желудочная связка — см. *Gastrophrenicum (sinistrum).*

445. **Phrenicolienale** (PNA, BNA; plicae phrenicolienales, JNA; phrenicosplenicum, suspensorium lienis), диафрагмально-селезеночная связка — складка брюшины, соединяющая диафрагму с воротами селезенки.

446. **Phrenicolienales plicae** (JNA), диафр гмально-селезеночные складки — см. *Phrenicolienale.*

447. **Phrenicosplenicum**, диафрагмально-селезеночная связка — см. *Phrenicolienale.*

448. **Pisohamatum** [PNA, BNA, JNA; volare ossis pisiformis et hamati (Barkow)], гороховидно-крючковая связка — связка, соединяющая гороховидную и крючковатую кости, являющаяся продолжением сухожилия локтевого сгибателя запястья; укрепляет сустав гороховидной кости, передает мышечную тягу на дистальный ряд костей запястья.

449. **Pisometacarpeum** (PNA, BNA; pisometacarpicum, JNA), гороховидно-пястная связка — связка, соединяющая гороховидную кость с основаниями IV и V пястных костей, являющаяся продолжением сухожилия локтевого сгибателя запястья (вместе с lig. pisohamatum); укрепляет сустав гороховидной кости, передает мышечную тягу на пястные кости.

450. **Pisometacarpicum** (JNA), гороховидно-пястная связка — см. *Pisometacarpeum.*

451. **Plantae transversum superficiale**, поверхностная поперечная связка подошвы — см. *Metatarseum transversum superficiale.*

452. **Plantare longum** (PNA, BNA, JNA), длинная подошвенная связка — связка, соединяющая подошвенную поверхность бугра пяточной кости с основаниями II — V плюсневых костей с кубовидной костью; укрепляет суставы предплюсны, участвует в укреплении («затяжке») продольных сводов стопы.

453. **Plantaria** (PNA; accessoria plantaria, BNA, JNA), подошвенные связки — пучки фиброзных волокон, укрепляющие капсулы плюснефаланговых суставов с подошвенной стороны; нередко включает в себя волокнистый хрящ или сесамовидные кости.

454. **Plica lata uteri** (JNA), широкая складка матки — см. *Latum uteri.*

455. **Popliteum arcuatum** (PNA, BNA; arcuatum genu), дугообразная подколенная связка — связка, укрепляющая капсулу коленного сустава сзади и латерально от lig. popliteum obliquum.

456. **Popliteum obliquum** (PNA, BNA, JNA), косая подколенная связка — связка, идущая от латерального надмыщелка бедренной кости, косо вниз и кнутри, вплетаясь в капсулу коленного сустава и в сухожилие полуперепончатой мышцы; укрепляет капсулу коленного сустава.

457. **Pouparti**, пупартова связка — см. *Inguinale.*

458. **Praeurethrale** (JNA), преуретральная связка — см. *Transversum perinei.*

459. **Processus brevis incudis,** связка короткого отростка наковальни — см. *Incudis posterius.*

460. **Processus longi mallei** (JNA), связка длинного отростка молоточка — см. *Mallei anterius.*

461. **Pterygospinale** (PNA, JNA; pterygospinosum, BNA), крылоостистая связка — тонкая связка, натянутая между остью и латеральной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости.

462. **Pterygospinosum** (BNA), крылоостистая связка — см. *Pterygospinale.*

463. **Pubicum** (JNA), лобковая связка — см. *Pubicum superius.*

464. **Pubicum anterius** (fibrosum anticum), передняя лобковая связка — пучки волокон на передней поверхности межлобкового диска.

465. **Pubicum Cooperi,** лобковая связка Купера — см. *Pubicum superius.*

466. **Pubicum posterius** (fibrosum posticum), задняя лобковая связка — пучки волокон на задней поверхности межлобкового диска.

467. **Pubicum superius** (PNA, BNA; pubicum, JNA; arcuatum superius pubis, transversum pubis, pubicum Cooperi), верхняя лобковая связка — связка, идущая в поперечном направлении по верхнему краю лобкового симфиза, соединяющая правый и левый лобковые бугорки; укрепляет лобковый симфиз.

468. **Pubis inferius (Cruveilhier),** нижняя связка лобка (Крювельс) — см. *Acruatum pubis.*

469. **Pubocapsulare** (BNA, JNA), лобково-капсулярная связка — см. *Pubofemorale.*

470. **Pubofemorale** [PNA; pubocapsulare, BNA, JNA; pubofemorale (Henle)], лобково-бедренная связка — связка, соединяющая подвздошно-лобковое возвышение и верхнюю ветвь лобковой кости с капсулой тазобедренного сустава и с основанием малого вертела бедренной кости; ограничивает отведение бедра.

471. **Pubofemorale (Henle),** лобково-бедренная связка (Генле) — см. *Pubofemorale.*

472. **Puboprostatica** (JNA), лобково-предстательные связки — см. *Puboprostaticum (pubovesicale).*

473. **Puboprostaticum (pubovesicale)** [PNA; puboprostaticum (pubovesicale) medium et puboprostaticum (pubovesicale) laterale, BNA; pubovesicalia et puboprostatica, JNA], лобково-предстательная (лобково-пузырная) связка — связка, идущая тремя пучками соответственно от задней поверхности лобковой кости к боковым поверхностям предстательной железы (у мужчин) или мочевого пузыря (у женщин) и от заднего края lig. arcuatum pubis к передней поверхности предстательной железы (у мужчин) или мочевого пузыря (у женщин).

474. **Puboprostaticum (pubovesicale) laterale** (BNA), латеральная лобково-предстательная (лобково-пузырная) связка — см. *Puboprostaticum (pubovesicale).*

475. **Puboprostaticum (pubovesicale) medium** (BNA), средняя лобково-предстательная (лобково-пузырная) связка — см. *Puboprostaticum (pubovesicale).*

476. **Pubovesicalia** (JNA), лобково-пузырные связки — см. *Puboprostaticum (pubovesicale).*

477. **Pulmonale** (PNA, BNA; plica mediastinopulmonalis, JNA; latum pulmonis, pulmonis), легочная связка — дупликатура плевры, являющаяся продолжением плеврального покрова корня легкого и соединяющая корень легкого с диафрагмой.

478. **Pulmonis,** легочная связка — см. *Pulmonale.*

479. **Pylori** (BNA), связка привратника — утолщение продольного слоя мышечной оболочки желудка на передней и задней стенках его пилорической части.

480. **Quadratum** (PNA), квадратная связка — связка, соединяющая дистальный край лучевой вырезки локтевой кости с шейкой лучевой кости; укрепляет проксимальный лучелоктевой сустав.

481. **Radiocarpeum dorsale** (PNA, BNA; radiocarpicum dorsale, JNA), тыльная лучезапястная связка — связка, соединяющая тыльный край запястной суставной поверхности лучевой кости с тыльной поверхностью костей проксимального ряда запястья; укрепляет лучезапястный сустав, ограничивает сгибание кисти.

482. **Radiocarpeum palmare** (PNA; radiocarpeum volare, BNA; radiocarpicum volare, JNA), ладонная лучезапястная связка — связка, соединяющая шиловидный отросток и ладонный край запястной и суставной поверхности лучевой кости с ладонной поверхностью костей запястья; укрепляет лучезапястный сустав, ограничивает разгибание кисти.

483. **Radiocarpeum volare** (BNA), ладонная лучезапястная связка — см. *Radiocarpeum palmare.*

484. **Radiocarpicum dorsale** (JNA), тыльная лучезапястная связка — см. *Radiocarpeum dorsale.*

485. **Radiocarpicum volare** (JNA), ладонная лучезапястная связка — см. *Radiocarpeum palmare.*

486. **Rectouterina** (sacrouterina, uterosacralia), прямокишечно-маточные связки — связки, расположенные по ходу одноименных мышц между маткой и нижней частью прямой кишки.

487. **Reflexum** [PNA; reflexum (Collesi), BNA; inguinale reflexum, JNA; triangulare (Krause)], загнутая связка — часть волокон lig. inguinale, соединяющая верхний край лобковой кости с передней стенкой влагалища прямой мышцы живота; ограничивает с медиальной стороны поверхностное кольцо пахового канала.

488. **Reflexum (Collesi),** загнутая связка (Коллиса) — см. *Reflexum.*

489. **Renolienale,** почечно-селезеночная связка — см. *Lienorenale.*

490. **Retinaculum caudale** (PNA; caudale, BNA; retinaculum caudale cutis, JNA; apicis coccygis), каудальный удерживатель — фиброзные пучки, идущие от верхушки копчика к коже.

491. **Retinaculum caudale cutis** (JNA), каудальный удерживатель кожи — см. *Retinaculum caudale.*

492. **Retinaculum extensorum** (PNA; carpi dorsale, BNA, JNA; annulare carpi posterius, carpi dorsale commune), удерживатель разгибателей — уплотненный участок фасции тыльной поверхности части предплечья в области лучезапястного сустава; фиксирующий проходящие под ним сухожилия мышц, разгибающих кисть и пальцы.

493. **Retinaculum flexorum** [PNA, carpi transversum, BNA, JNA; carpi volare proprium (Henle)], удерживатель сгибателей — фиброзные пучки, соединяющие лучевое и локтевое возвышения запястья, замыкая борозду запястья в канал, в к-ром проходят сухожилия сгибателей пальцев и срединный нерв.

494. **Retinaculum ligamenti arcuati** (BNA), удерживатель дугообразной связки — связка, идущая двумя пучками от lig. popliteum arcuatum к головке малоберцовой кости.

495. **Retinaculum musculorum extensorum inferius** (PNA; cruciatum cruris, BNA, cruciforme, JNA; annulare anterior tarsi), нижний удерживатель сухожилий разгибателей — У-образно расположенные пучки фиброзных волокон фасций голени и тыла стопы, проходящие над сухожилиями разгибателей пальцев и передней большеберцовой мышцы; начинаются от латеральной поверхности пяточной кости и прикрепляются к медиальной лодыжке (верхняя часть) и ладьевидной и медиальной клиновидной костям (нижняя часть).

496. **Retinaculum musculorum extensorum superius** (PNA); transversum cru-

ris, BNA, JNA; vaginale cruris), верхний удерживатель сухожилий разгибателей — поперечно расположенные пучки волокон уплотненного участка фасции голени в ее дистальном отделе, проходящие над сухожилиями разгибателей пальцев и передней большеберцовой мышцы; прикрепляются на переднем гребне большеберцовой кости и переднем гребне и латеральной поверхности малоберцовой кости.

497. **Retinaculum musculorum fibularium distale** (JNA), дистальный удерживатель малоберцовых мышц — см. *Retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) inferius.*

498. **Retinaculum musculorum fibularium proximale** (JNA), проксимальный удерживатель малоберцовых мышц — см. *Retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) superius.*

499. **Retinaculum musculorum flexorum** (PNA; laciniatum, BNA, JNA), удерживатель сухожилий мышц-сгибателей — пучки волокон, укрепляющие фасцию голени в области медиальной поверхности голеностопного сустава, проходящие над сухожилиями сгибателей пальцев и задней большеберцовой мышцы; начинаются от медиальной лодыжки и прикрепляются к пяточной и ладьевидной костям.

500. **Retinaculum musculorum peroneorum inferius** (BNA), нижний удерживатель малоберцовых мышц — см. *Retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) inferius.*

501. **Retinaculum musculorum peroneorum superius** (BNA), верхний удерживатель малоберцовых мышц — см. *Retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) superius.*

502. **Retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) inferius** [PNA; retinaculum mm. peroneorum inferius, BNA; retinaculum musculorum fibularium distale, JNA], нижний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц — пучки волокон, укрепляющие фасцию у латерального края стопы, проходящие над сухожилиями малоберцовых мышц; прикрепляются к пяточной кости.

503. **Retinaculum musculorum peroneorum (fibularium) superius** [PNA; retinaculum musculorum peroneorum superius, BNA; retinaculum musculorum fibularium proximale, JNA; laciniatum externum (laterale)], верхний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц — пучки волокон, укрепляющие фасцию в области латеральной поверхности голеностопного сустава, проходящие над сухожилиями малоберцовых мышц; прикрепляются к латеральной лодыжке и пяточной кости.

504. **Retinaculum patellae fibulare** (JNA), малоберцовая поддерживающая связка надколенника — см. *Retinaculum patellae laterale.*

505. **Retinaculum patellae laterale** [PNA, BNA; retinaculum patellae fibulare, JNA; patellae externum (Nuhn)], латеральная поддерживающая связка надколенника — связка, представляющая собой продолжение сухожилия четырехглавой мышцы бедра, идущая с латеральной стороны надколенника и прикрепляющаяся на переднем крае латерального мыщелка большеберцовой кости; укрепляет коленный сустав.

506. **Retinaculum patellae mediale** [PNA, BNA; retinaculum patellae tibiale, JNA; patellae internum (Nuhn)], медиальная поддерживающая связка надколенника — связка, представляющая собой продолжение сухожилия четырехглавой мышцы бедра, идущая с медиальной стороны от надколенника и прикрепляющаяся на переднем крае медиального мыщелка большеберцовой кости; укрепляет коленный сустав.

507. **Retinaculum patellae tibiale** (JNA), большеберцовая поддерживающая связка надколенника — см. *Retinaculum patellae mediale.*

508. **Rhomboides claviculae,** ромбовидная связка ключицы — см. *Costoclaviculare.*

509. **Rotundum acetabuli,** круглая связка вертлужной впадины — см. *Capitis femoris.*

510. **Rotundum uteri,** круглая связка матки — см. *Teres uteri.*

511. **Sacrococcygeum anterius** (BNA), передняя крестцово-копчиковая связка — см. *Sacrococcygeum ventrale.*

512. **Sacrococcygeum dorsale profundum** (PNA; sacrococcygeum posterius profundum, BNA; sacrococcygicum dorsale profundum, JNA), глубокая дорсальная крестцово-копчиковая связка — связка, соединяющая заднюю поверхность крестца в области нижнего конца крестцового канала с задней поверхностью двух первых копчиковых позвонков; ограничивает подвижность копчика, укрепляет крестцово-копчиковый синхондроз.

513. **Sacrococcygeum dorsale superficiale** (PNA; sacrococcygeum posterius superficiale, BNA; sacrococcigicum dorsale superficiale, JNA), поверхностная дорсальная крестцово-копчиковая связка — связка, соединяющая срединный крестцовый гребень и правый и левый крестцовый рог с правым и левым копчиковым рогом; укрепляет крестцово-копчиковый синхондроз.

514. **Sacrococcygeum laterale** (PNA, BNA; sacrococcygicum laterale, JNA), латеральная крестцово-копчиковая связка — связка, соединяющая боковой крестцовый гребень с поперечным отростком I копчикового позвонка.

515. **Sacrococcygeum posterius profundum** (BNA), задняя глубокая крестцово-копчиковая связка — см. *Sacrococcygeum dorsale profundum.*

516. **Sacrococcygeum posterius superficiale** (BNA), задняя поверхностная крестцово-копчиковая связка — см. *Sacrococcygeum dorsale superficiale.*

517. **Sacrococcygeum ventrale** (PNA); sacrococcygeum anterius, BNA; sacrococcygicum ventrale, JNA), вентральная крестцово-копчиковая связка — связка, соединяющая тазовую поверхность крестца с передней поверхностью копчика; ограничивает подвижность копчика, укрепляет крестцово-копчиковый синхондроз.

518. **Sacrococcygicum dorsale profundum** (JNA), глубокая дорсальная крестцово-копчиковая связка — см. Sacrococcygeum dorsale profundum.

519. **Sacrococcygicum dorsale superficiale** (JNA), поверхностная дорсальная крестцово-копчиковая связка — см. *Sacrococcygeum dorsale superficiale.*

520. **Sacrococcygicum laterale** (JNA), латеральная крестцово-копчиковая связка — см. *Sacrococcygeum laterale.*

521. **Sacrococcygicum ventrale** (JNA), вентральная крестцово-копчиковая связка — см. *Sacrococcygeum ventrale.*

522. **Sacroiliaca anteriora** (BNA), передние крестцово-подвздошные связки — см. *Sacroiliaca ventralia.*

523. **Sacroiliaca dorsalia** (PNA; sacroiliacum posterius breve et sacroiliacum posterius longum, BNA; sacroilicum dorsale breve et sacroilicum dorsale longum, JNA), дорсальные крестцово-подвздошные связки — связки, соединяющие латеральный крестцовый гребень с нижней задней подвздошной остью (короткие пучки) и задние поверхности III — IV крестцовых позвонков с задней верхней подвздошной остью (длинные пучки); препятствуют опусканию крестца и раздвиганию тазового кольца, укрепляют крестцово-подвздошный сустав.

524. **Sacroiliaca interossea** (PNA, BNA; sacroilica interossea, JNA), межкостные крестцово-подвздошные связки — связки, соединяющие в поперечном и косом направлениях крестцовую и подвздошную бугристости, целиком заполняющие пространство между ними; препятствуют опусканию крестца, укрепляют крестцово-подвздошный сустав.

525. **Sacroiliaca ventralia** (PNA; sacroiliaca anteriora, BNA; sacroilica ventralia, JNA), вентральные крестцово-подвздошные связки — связки, соединяющие тазовые поверхности крестца и подвздошной кости; укрепляют капсулу сустава, препятствуют раздвиганию тазового кольца и опусканию крестца.

526. **Sacroiliacum posterius breve** (BNA), короткая задняя крестцово-подвздошная связка — см. *Sacroilica dorsalia.*

527. **Sacroiliacum posterius longum** (BNA), длинная задняя крестцово-подвздошная связка — см. *Sacroiliaca dorsalia.*

528. **Sacroilica interossea** (JNA), межкостная крестцово-подвздошная связка — см. *Sacroiliaca interossea.*

529. **Sacroilica ventralia** (JNA), вентральная крестцово-подвздошная связка — см. *Sacroiliaca ventralia.*

530. **Sacroilicum dorsale breve** (JNA), короткая дорсальная крестцово-подвздошная связка — см. *Sacroiliaca dorsalia.*

531. **Sacroilicum dorsale longum** (JNA), длинная дорсальная крестцово-подвздошная связка — см. *Sacroiliaca dorsalia.*

532. **Sacroischiadicum internum (minus),** внутренняя (малая) крестцово-седалищная связка — см. *Sacrospinale.*

533. **Sacroischiadicum majus,** большая крестцово-седалищная связка — см. *Sacrotuberale.*

534. **Sacrospinale** [PNA, JNA; sacrospinosum, BNA; sacroischiadicum internum (minus)], крестцово-остистая связка — связка, соединяющая боковой край последнего крестцового позвонка и копчика с седалищной остью; разделяет большое и малое седалищные отверстия.

537. **Sacrospinosum** (BNA), крестцово-остистая связка — см. *Sacrospinale.*

538. **Sacrotuberale** (PNA, JNA; sacrotuberosum, BNA; sacroischiadicum majus), крестцово-бугорная связка — связка, соединяющая боковой край крестца и копчика с медиальной поверхностью седалищного бугра; ограничивает снизу малое седалищное отверстие.

539. **Sacrotuberosum** (BNA), крестцово-бугорная связка — см. *Sacrotuberale.*

540. **Sacrouterina,** крестцово-маточная связка — см. *Rectouterina.*

541. **Santorini,** связка Санторини — см. *Cricopharyngeum.*

542. **Scaphocuboideum dorsale (Meckel),** тыльная ладьевидно-кубовидная связка (Меккеля) — см. *Cuboideonaviculare dorsale.*

543. **Scaphoideocuneiformia dorsalia (Barkow),** тыльные ладьевидно-клиновидные связки (Варкова) — см. *Cuneonavicularia dorsalia.*

544. **Scaphoideocuneiforme externum,** наружная ладьевидно-клиновидная связка — см. *Cuneonavicularia plantaria.*

545. **Scaphoideocuneiforme internum,** внутренняя ладьевидно-клиновидная связка — см. *Cuneonavicularia plantaria.*

546. **Scaphoideocuneiforme medium,** средняя ладьевидно-клиновидная связка — см. *Cuneonavicularia plantaria.*

547. **Scrotale testis (Waldeyeri),** мошоночная связка яичка (Вальдейера) — см. *Genitoinguinale.*

548. **Serratum medullae spinalis,** зубчатая связка спинного мозга — см. *Denticulatum.*

549. **Sphenomandibulare** (PNA, BNA, JNA; sphenomaxillare, maxillare mediale), клиновидно-нижнечелюстная связка — связка, идущая от ости клиновидной кости тремя пучками к шейке мыщелкового отростка, к язычку и к внутренней поверхности ветви нижней челюсти; укрепляет височно-нижнечелюстной сустав.

550. **Sphenomaxillare,** клиновидно-челюстная связка — см. *Sphenomandibulare.*

551. **Spirale cochleae** (PNA, BNA, JNA; membranae basilaris), спиральная связка улитки — утолщение надкостницы спирального канала улитки на стороне, противоположной костной спиральной пластинке.

552. **Splenicogastricum,** селезеночно-желудочная связка — см. *Gastrolienale.*

553. **Sternocardiacum inferius,** нижняя грудиносердечная связка (Лушки) — см. *Sternopericardiaca.*

554. **Sternocardiacum superius,** верхняя грудиносердечная связка (Лушки) — см. *Sternopericardiaca.*

555. **Sternoclaviculare** (BNA, JNA), грудиноключичная связка — совокупность lig. sternoclaviculare anterius и lig. sternoclaviculare posterius.

556. **Sternoclaviculare anterius** (PNA), передняя грудиноключичная связка — связка, соединяющая переднюю поверхность рукоятки грудины с грудинным концом ключицы; укрепляет грудиноключичный сустав, препятствует опусканию ключицы.

557. **Sternoclaviculare posterius** (PNA), задняя грудиноключичная связка — связка, соединяющая заднюю поверхность рукоятки грудины с грудинным концом ключицы; укрепляет грудиноключичный сустав, препятствует опусканию ключицы.

558. **Sternocostale interarticulare** (BNA), межсуставная грудинореберная связка — см. *Sternocostale intraarticulare.*

559. **Sternocostale intraarticulare** (PNA, JNA; interarticulare chondrosternale (Quain); sternocostale interarticulare, BNA], внутрисуставная грудинореберная связка — внутрисуставная связка грудинореберного сустава II ребра, соединяющая хрящ II ребра с вырезкой грудины (на месте соединения рукоятки и тела грудины).

560. **Sternocostalia radiata** (PNA, BNA, JNA; costosternalia), лучистые грудинореберные связки — связки, соединяющие надхрящницу реберных хрящей с надкостницей грудины; укрепляют грудинореберные суставы.

561. **Sternopericardiaca** [PNA, BNA; chordae sterno-pericardiacae, JNA; sternocardiaca (inferius et superius) (Luschka)], грудиноперикардиальные связки — соединительнотканные тяжи, соединяющие фиброзный перикард с задней поверхностью грудины.

562. **Sternopericardiacae chordae** (JNA), грудиноперикардиальные хорды — см. *Sternopericardiaca.*

563. **Stylohyoideum** (PNA, BNA, JNA), шилоподъязычная связка — связка, соединяющая шиловидный отросток височной кости с малым рожком подъязычной кости.

564. **Stylomandibulare** (PNA, BNA, JNA; stylomaxillare), шилонижнечелюстная связка — связка, соединяющая шиловидный отросток височной кости с задним краем ветви нижней челюсти в области угла нижней челюсти.

565. **Stylomaxillare,** шиловерхнечелюстная связка — см. *Stylomandibulare.*

566. **Subcruentum,** багровая связка — пучки фиброзного слоя капсулы лучезапястного сустава, прикрепляющиеся к шиловидному отростку локтевой кости.

567. **Superius diaphragmatis,** верхняя связка диафрагмы — соединительнотканные тяжи, соединяющие позвонки с сухожильным центром диафрагмы.

568. **Supraspinalia** [PNA, BNA, JNA; apicum; longitudinale (Barkow)], надостистые связки — связки, соединяющие верхушки остистых отростков всех грудных и поясничных позвонков; на шее переходят в lig. nuchae.

569. **Suspensoria mammaria** (PNA), связки, поддерживающие молочную железу — ответвления грудной фасции, фиксирующие доли молочной железы к фасции, покрывающей большую грудную мышцу.

570. **Suspensoria ovarii plica** (JNA), складка, подвешивающая яичник — см. *Suspensorium ovarii.*

571. **Suspensorium clitoridis** (PNA, BNA, JNA), связка, подвешивающая клитор — соединительнотканные тяжи, идущие от белой линии живота и лобкового симфиза к спинке клитора.

572. **Suspensorium femoris,** связка, поддерживающая бедро — см. *Iliofemorale.*

573. **Suspensorium glandulae lacrimalis (Soemmerringi),** связка, подвешивающая слезную железу (Земмеринга) — соединительнотканные тяжи, фиксирующие слезную железу к надкостнице верхней стенки глазницы.

574. **Suspensorium heratis,** связка, подвешивающая печень — см. *Falciforme hepatis.*

575. **Suspensorium lienis,** связка, подвешивающая селезенку — см. *Phrenicolienale.*

576. **Suspensorium mallei,** связка, подвешивающая молоточек — см. *Mallei superius.*

577. **Suspensorium ovarii** (PNA, BNA; plica suspensoria ovarii, JNA; ovariopelvicum; infundibulopelvicum), связка, подвешивающая яичник — складка брюшины между яичником и боковой стенкой таза, в толще к-рой проходят кровеносные и лимфатические сосуды яичника.

578. **Suspensorium pelvis (Fick),** связка, поддерживающая таз — см. *Iliofemorale.*

579. **Suspensorium penis** (PNA, BNA, JNA; suspensorium penis superficiale), связка, подвешивающая половой член — треугольная соединительнотканная пластинка, соединяющая нижний конец белой линии живота и лобковый симфиз со спинкой полового члена.

580. **Suspensorium penis profundum,** глубокая связка, подвешивающая половой член — сухожильные волокна, соединяющие место прикрепления прямой мышцы живота с половым членом.

581. **Suspensorium penis superficiale,** поверхностная связка, подвешивающая половой член — см. *Suspensorium penis.*

582. **Suspensorium vesicae urinariae,** связка, подвешивающая мочевой пузырь — см. *Umbilicale medianum.*

583. **Talocalcaneare fibulare** (JNA), малоберцовая таранно-пяточная связка — см. *Talocalcaneum laterale.*

584. **Talocalcaneare interosseum** (JNA), межкостная таранно-пяточная связка — см. *Talocalcaneum interosseum.*

585. **Talocalcaneare tibiale** (JNA), большеберцовая таранно-пяточная связка — см. *Talocalcaneum mediale.*

586. **Talocalcaneum anterius** (BNA), передняя таранно-пяточная связка — связка, расположенная в пазухе предплюсны на передней поверхности подтаранного сустава, соединяющая таранную и пяточную кости; укрепляет подтаранный сустав.

587. **Talocalcaneum interosseum** (PNA, BNA; talocalcaneare interosseum, JNA; astragalocalcaneum interosseum), межкостная таранно-пяточная связка — связка, расположенная в пазухе предплюсны, соединяющая борозды таранной и пяточной костей; укрепляет подтаранный сустав, ограничивает пронацию и супинацию стопы.

588. **Talocalcaneum laterale** (PNA, BNA; talocalcaneare fibulare, JNA), латеральная таранно-пяточная связка — связка, соединяющая латеральные поверхности таранной и пяточной костей; укрепляет подтаранный сустав.

589. **Talocalcaneum mediale** (PNA, BNA; talocalcaneare tibiale, JNA), медиальная таранно-пяточная связка — связка, соединяющая задний отросток таранной кости с опорой таранной кости; укрепляет подтаранный сустав.

590. **Talocalcaneum posterius** [BNA; astragalocalcaneum posterius (Meckel)], задняя таранно-пяточная связка — связка, соединяющая задний отросток таранной кости с верхней поверхностью пяточной кости позади от задней таранной суставной поверхности; укрепляет подтаранный сустав.

591. **Talofibulare anterius** (PNA, BNA; fibulotalare anterius, JNA), передняя таранно-малоберцовая связка — связка, соединяющая переднюю поверхность латеральной лодыжки с

латеральной поверхностью шейки таранной кости; укрепляет голеностопный сустав.

592. **Talofibulare posterius** (PNA, BNA; fibulotalare posterius, JNA), задняя таранно-малоберцовая связка — связка, соединяющая ямку латеральной лодыжки с задним отростком таранной кости; укрепляет голеностопный сустав.

593. **Talonaviculare** [PNA, JNA; talonaviculare (dorsale), BNA], таранно-ладьевидная связка — связка, соединяющая шейку таранной кости с тыльной поверхностью ладьевидной кости; относится к ligg. tarsi dorsalia; укрепляет таранно-пяточно-ладьевидный сустав.

594. **Talonaviculare (dorsale)** (BNA), тыльная таранно-ладьевидная связка — см. *Talonaviculare.*

595. **Talotibiale anterius** (BNA), передняя таранно-большеберцовая связка — см. *Tibiotalaris anterior pars.*

596. **Talotibiale posterius** (BNA), задняя таранно-большеберцовая связка — см. *Tibiotalaris posterius pars.*

597. **Tarseum transversum (mediale et laterale) (Henle),** поперечная связка предплюсны (медиальная и латеральная) (Генле) — связка, соединяющая подошвенные поверхности основания V плюсневой кости, промежуточной и латеральной клиновидных костей; относится к ligg. plantaria; укрепляет поперечный свод стопы.

598. **Tarsi dorsalia** (PNA, BNA, JNA), тыльные связки предплюсны — общее название связок, соединяющих тыльные поверхности костей предплюсны.

599. **Tarsi interossea** (PNA, BNA, JNA), межкостные связки предплюсны — общее название связок, соединяющих обращенные друг к другу поверхности костей предплюсны.

600. **Tarsi plantaria** (PNA, BNA, JNA), подошвенные связки предплюсны — общее название связок, соединяющих подошвенные поверхности костей предплюсны.

601. **Tarsi profunda** (BNA), глубокие связки предплюсны — связки, относящиеся к ligg. tarsi plantaria, расположенные глубже lig. plantare longum.

602. **Tarsi superioris et inferioris,** связки хряща верхнего и нижнего века — связки, соединяющие край хряща соответственно верхнего и нижнего века с краем глазницы.

603. **Tarsometatarsea dorsalia** (PNA, BNA, JNA), тыльные предплюснеплюсневые связки — связки, соединяющие тыльные поверхности кубовидной и клиновидных костей с основаниями плюсневых костей; укрепляют предплюсне-плюсневые суставы.

604. **Tarsometatarsea interossea**(BNA), межкостные предплюсне-плюсневые связки — см. *Cuneometatarsea interossea.*

605. **Tarsometatarsea plantaria** (PNA, BNA, JNA), подошвенные предплюснеплюсневые связки — связки, соединяющие подошвенные поверхности кубовидной и клиновидных костей с основаниями плюсневых костей; укрепляют предплюсне-плюсневые суставы.

606. **Tectoria membrana** (PNA, BNA, JNA; cervicobasilare; tectorium), покровная мембрана — соединительнотканная пластинка, являющаяся продолжением lig. longitudinale posterius в области шеи; приклепляется у переднего края большого затылочного отверстия.

607. **Tectorium,** покровная связка — см. *Tectoria membrana.*

608. **Temporomandibulare** (BNA, JNA), височно-нижнечелюстная связка — см. *Laterale.*

609. **Teres acetabuli,** круглая связка вертлужной впадины — см. *Capitis femoris.*

610. **Teres femoris** (BNA), круглая связка бедра — см. *Capitis femoris.*

611. **Teres hepatis** (PNA, BNA; chorda venae umbilicalis, JNA; hepatoumbilicale), круглая связка печени — свободный утолщенный край серповидной связки печени, соединяющий пупок с вырезкой круглой связки на нижнем крае печени; заключает в себе облитерированную пупочную вену.

612. **Teres uteri** (PNA, BNA; chorda uteroinguinalis (teres), JNA; rotundum uteri), круглая связка матки — тяж, содержащий соединительнотканные волокна и гладкомышечные клетки, отходящий от верхней части тела матки, проходящий через паховый канал и вплетающийся в жировую клетчатку лобка.

613. **Thyreoepiglotticum** (BNA, JNA), щитонадгортанная связка— см. *Thyroepiglotticum.*

614. **Thyreoideum laterale,** латеральная щитовидная связка — см. *Thyrohyoideum laterale.*

615. **Thyroepiglotticum** (PNA; thyreoepiglotticum, BNA, JNA; petioli epiglotidis (Tourtual), щитонадгортанная связка — эластическая связка, соединяющая стебелек надгортанника с внутренней поверхностью щитовидного хряща ниже верхней щитовидной вырезки.

616. **Thyrohyoideum laterale** (PNA; hyothyreoideum laterale, BNA, JNA; thyreoideum laterale), латеральная щитоподъязычная связка — связка, соединяющая верхний рог щитовидного хряща с большим рогом подъязычной кости.

617. **Thyrohyoideum medianum** (PNA; hyothyreoideum medium, BNA, JNA; thyreoideum), срединная щитоподъязычная связка — непарная связка, соединяющая верхнюю щитовидную вырезку с задней поверхностью и верхним краем тела подъязычной кости.

618. **Tibiocalcanea pars** [PNA; calcaneotibiale, BNA; pars tibiocalcanearia (lig. deltoidis), JNA], большеберцово-пяточная часть — часть lig. mediale (deltoideum), прикрепляющаяся к пяточной кости в области опоры таранной кости.

619. **Tibiocalcanearis pars** (lig. deltoidis) (JNA), большеберцово-пяточная часть (дельтовидной связки) — см. *Tibiocalcanea pars.*

620. **Tibiofibulare anterius** (PNA, JNA; malleoli lateralis anterius, BNA), передняя межберцовая связка — связка, идущая от края малоберцовой вырезки большеберцовой кости по передней поверхности малоберцовой кости к латеральной лодыжке; укрепляет межберцовый синдесмоз и голеностопный сустав.

621. **Tibiofibulare posterius** (PNA, JNA; malleoli lateralis posterica, BNA), задняя межберцовая связка — связка, идущая от края малоберцовой вырезки большеберцовой кости по задней поверхности малоберцовой кости к латеральной лодыжке; укрепляет межберцовый синдесмоз и голеностопный сустав.

622. **Tibiofibulare transversum,** поперечная межберцовая связка — верхняя часть lig. tibiofibulare posterius, образованная волокнами горизонтального направления.

623. **Tibionaviculare** (BNA), большеберцово-ладьевидная связка — см. *Tibionavicularis pars.*

624. **Tibionavicularis pars (lig. deltoidis)** (JNA), большеберцово-ладьевидная часть (дельтовидной связки) — см. *Tibionavicularis pars.*

625. **Tibionavicularis pars** [PNA; tibionaviculare, BNA; pars tibionavicularis (lig. deltoides), JNA], большеберцово-ладьевидная часть — часть lig. mediale (deltoideum), прикрепляющаяся к тыльной поверхности ладьевидной кости.

626. **Tibiotalaris anterior pars** [PNA; talotibiale anterius, BNA], передняя большеберцово-таранная часть — часть lig. mediale (deltoideum), прикрепляющаяся спереди к медиальной поверхности таранной кости.

627. **Tibiotalaris pars** (lig. deltoidis) (JNA), большеберцово-таранная часть (дельтовидной связки) — совокупность pars tibiotalaris anterior и pars tibiotalaris posterior.

628. **Tibiotalaris posterior pars** [PNA; talotibiale posterius, BNA], задняя большеберцово-таранная часть — часть lig. mediale (deltoideum), прикрепляющаяся к заднему отростку и заднему краю медиальной части блока таранной кости.

629. **Transversocostale (Cruveilhier),** поперечно-реберная связка (Крювелье) — см. *Costotransversarium superius.*

630. **Transversum acetabuli** (PNA, BNA, JNA), поперечная связка вертлужной впадины — фиброзные пучки, соединяющие края вырезки вертлужной впадины тазовой кости и дополняющие вертлужную губу тазобедренного сустава.

631. **Transversum atlantis** (PNA, BNA, JNA), поперечная связка атланта — поперечная наиболее крепкая часть lig. cruciforme atlantis, натянутая позади зуба осевого позвонка между внутренними поверхностями боковых масс атланта.

632. **Transversum cruris** (BNA, JNA), поперечная связка голени — см. *Retinaculum musculorum extensorum superius.*

633. **Transversum genu** (BNA), поперечная связка колена — см. *Transversum genus.*

634. **Transversum genus** (PNA, JNA; transversum genu, BNA; jugale), поперечная связка колена — внутрисуставная связка коленного сустава, соединяющая передние концы медиального и латерального менисков.

635. **Transversum pelvis** (BNA), поперечная связка таза — см. *Transversum perinei.*

636. **Transversum perinei** (PNA; transversum pelvis, BNA; praeurethrale, JNA), поперечная связка промежности — поперечно идущие волокна верхней и нижней фасции мочеполовой диафрагмы, фиксированные к лобковым костям под лобковым симфизом.

637. **Transversum pubis,** поперечная связка лобка — см. *Pubicum superius.*

638. **Transversum scapulae** (JNA), поперечная связка лопатки — см. *Transversum scapulae superius.*

639. **Transversum scapulae inferius** (PNA, BNA), нижняя поперечная связка лопатки — связка, соединяющая задний край суставной впадины лопатки с латеральным краем ости лопатки.

640. **Transversum scapulae superius** (PNA, BNA; transversum scapulae, JNA), верхняя поперечная связка лопатки — фиброзные пучки, замыкающие вырезку лопатки в отверстие (иногда окостеневает).

641. **Trapezoides,** трапециевидная связка — см. *Trapezoideum.*

642. **Trapezoides pars** (lig. coracoclav.) (JNA), трапециевидная часть (клювовидно-ключичной связки) — см. *Trapezoideum.*

643. **Trapezoideum** [PNA, BNA; pars trapezoides (lig. coracoclaviculare), JNA; trapezoides, coracoclaviculare externum], трапециевидная связка — связка, представляющая собой переднелатеральную часть lig. coracoclaviculare, соединяющая клювовидный отросток лопатки с трапециевидной линией ключицы; укрепляет акромиально-ключичный сустав, ограничивает движения ключицы.

644. **Triangulare (Krause),** треугольная связка (Краузе) — см. *Reflexum.*

645. **Triangulare dextrum** (PNA, BNA; mesohepaticum laterale dextrum, JNA), правая треугольная связка — свободный истонченный правый край lig. coronarium hepatis.

646. **Triangulare lineae albae,** треугольная связка белой линии — треугольная укрепляющая связка на лобковом симфизе, переходящая в белую линию.

647. **Triangulare sinistrum** (PNA, BNA; mesohepaticum laterale sinistrum, JNA), левая треугольная связка — истонченный левый край lig. coronarium hepatis.

648. **Triquetrum (Tourtual),** трехгранная связка — см. *Cricoarytenoideum posterius.*

649. **Tuberculi costae** [BNA, JNA; tuberculi costae (inferius et superius)], связка бугорка ребра — связка, соединяющая верхушку поперечного отростка позвонка с задневерхней поверхностью бугорка ребра; укрепляет реберно-поперечный сустав.

650. **Tuberculi costae (inferius et superius),** верхняя и нижняя связка бугорка ребра — см. *Tuberculi costae.*

651. **Ulnocarpeum palmare** (PNA; ulnocarpicum volare, JNA; ulnocarpeum volare), ладонная локтезапястная связка — ладонная, укрепляющая лучезапястный сустав связка начинается от ладонного края суставного диска и шиловидного отростка локтевого края кости и прикрепляется к ладонной поверхности полулунной, трехгранной и головчатой костей запястья; тормозит разгибание кисти.

652. **Ulnocarpeum volare,** ладонная локтезапястная связка — см. *Ulnocarpeum palmare.*

653. **Ulnocarpicum volare** (JNA), ладонная локтезапястная связка — см. *Ulnocarpeum palmare.*

654. **Umbilicale laterale** (PNA, BNA; chorda a. umbilicalis, JNA; vesicale laterale), латеральная пупочная связка — парные соединительнотканные тяжи, идущие от внутренней подвздошной артерии к боковым стенкам мочевого пузыря и далее поднимающиеся под брюшиной передней стенки живота к пупку; представляют собой облитерированные пупочные артерии.

655. **Umbilicale medianum** (PNA; umbilicale medium, BNA; chorda urachi, JNA; suspensorium vesicae urinariae; vesicale medium), срединная пупочная связка — соединительнотканный тяж, идущий от верхушки мочевого пузыря к пупку; является остатком мочевого протока.

656. **Umbilicale medium** (BNA), медиальная пупочная связка — см. *Umbilicale medianum.*

657. **Uteri latum,** широкая связка матки — см. *Latum uteri.*

658. **Uterosacralia,** маточно-крестцовые связки — см. *Rectouterina.*

659. **Vaginale** (BNA), влагалищная связка — фиброзные пучки в составе семенного канатика, образующие тяж; рудимент влагалищного отростка брюшины.

660. **Vaginale cruris,** влагалищная связка голени — см. *Retinaculum mm. extensorum superius.*

661. **Valsalvae,** связка Вальсальвы — см. *Auricularia.*

662. **Vasorum uteri tunica,** сосудистая оболочка матки — см. *Cardinalia uteri.*

663. **Venae cavae cranialis plica** (JNA), складка краниальной полой вены — см. *Venae cavae sinistrae plica.*

664. **Venae cavae sinistrae** (BNA), связка левой полой вены — см. *Venae cavae sinistrae plica.*

665. **Venae cavae sinistrae plica** (PNA; venae cavae sinistrae, BNA; venae cavae cranialis plica, JNA), складка левой полой вены — соединительнотканный тяж, идущий от самой верхней межреберной вены к косой вене левого предсердия; остаток эмбриональной v. cava superior sin.

666. **Venosum** [PNA; venosum (Arantii), BNA; chorda ductus venosi, JNA; ductus venosi], венозная связка — соединительнотканный тяж, лежащий в ямке венозного протока висцеральной поверхности печени; является облитерированным венозным протоком плода.

667. **Venosum (Arantii)** (BNA), венозная связка (Аранциева) — см. *Venosum.*

668. **Ventriculare** (BNA), желудочковая связка — см. *Vestibulare.*

669. **Vesicale laterale,** латеральная пузырная связка — см. *Umbilicale laterale.*

670. **Vesicale medium,** срединяя пузырная связка — см. *Umbilicale medianum.*

671. **Vesicouterina,** пузырно-маточные связки — соединительнотканные тяжи между передней поверхностью шейки матки и мочевым пузырем.

672. **Vestibulare** (PNA; ventriculare, BNA; vocale spurium glottidis spurium), связка преддверия—пучок соединительнотканных волокон, натянутый между внутренней поверхностью угла щитовидного хряща и бугорком верхней части черпаловидного хряща; является нижним краем четырехугольной мембраны.

673. **Vocale** [PNA, BNA, JNA; vocale verum, glottidis verum, chorda vocalis (Ferreini)], голосовая связка — пучок эластических волокон, натянутый между внутренней поверхностью угла щитовидного хряща и голосовым отростком черпаловидного хряща, является верхним краем эластического конуса; вместе с одноименной мышцей образует голосовую складку.

674. **Vocale spurium,** ложная голосовая связка — см. *Vestibulare.*

675. **Vocale verum,** истинная голосовая связка — см. *Vocale.*

676. **Vocalis chorda (Ferreini),** голосовая струна (Феррейна) — см. *Vocale.*

677. **Volare ossis pisiformis et hamati (Barkow),** ладонная связка гороховидной и головчатой кости (Баркова) — см. *Pisohamatum.*

678. **Volaria carpi,** ладонные запястные связки — см. *Intercarpea palmaria.*

679. **Zinni,** циннова связка — см. *Zonula ciliaris.*

680. **Zona orbicularis** (PNA, BNA, JNA; zonale femoris, annulare femoris), круговая зона — внутрикапсулярная круговая связка тазобедренного сустава, охватывающая среднюю часть шейки бедренной кости.

681. **Zonale femoris,** зональная связка бедра — см. *Zona orbicularis.*

682. **Zonula ciliaris** [PNA; zonula ciliaris (Zinni), BNA; apparatus suspensorius lentis, JNA, (Zinni)], ресничный поясок — система прозрачных волокон, идущих от ресничных отростков к капсуле хрусталика и прикрепляющихся в области его экватора; натяжение Z. c. при сокращении ресничной мышцы приводит к уменьшению кривизны хрусталика.

683. **Zonula ciliaris (Zinni)** (BNA), ресничный поясок — см. *Zonula ciliaris.*

СИНОВИАЛЬНЫЕ ВЛАГАЛИЩА (VAGINAE SYNOVIALES)

684. **Vag. mucosa intertubercularis** (BNA), межбугорковое слизистое влагалище — см. *Vag. synovialis intertubercularis.*

685. **Vagg. synoviales digitorum manus** (PNA; vagg. tendinum digitales, BNA; vagg. tendinum digitorum, JNA), синовиальные влагалища пальцев кисти — три раздельных синовиальных влагалища, окружающие сухожилия сгибателей для II, III и IV пальцев; начинаются на уровне соответствующих пястно-фаланговых суставов, заканчиваются у основания дистальных фаланг.

686. **Vag. synovialis communis mm. flexorum (digitorum manus)** (PNA; vag. tendinum mm. flexorum communis, BNA;

vag. tendinum mm. flexorum digitorum communis, JNA), общее синовиальное влагалище сгибателей (пальцев кисти)— расположено в канале запястья и срединном фасциальном ложе ладони; проксимально достигает квадратного пронатора, дистально своей медиальной частью образует синовиальное влагалище сухожилий сгибателей мизинца, заканчивается на уровне основания дистальной фаланги.

687. **Vag. synovialis intertubercularis** (PNA, JNA; vag. mucosa intertubercularis, BNA), синовиальное межбугорковое влагалище — часть синовиальной оболочки плечевого сустава, окружающая сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча в межбугорковой борозде плечевой кости.

688. **Vag. synovialis mm. peroneorum (fibularium) communis** (PNA; vag. tendinum mm. peronaeorum communis, BNA; vag. tendinum mm. fibularium communis, JNA), общее синовиальное влагалище малоберцовых мышц — расположено позади и ниже латеральной лодыжки в фиброзном канале под верхним и нижним удерживателями сухожилий малоберцовых мышц; начинается на уровне основания лодыжки, заканчивается на уровне пяточно-кубовидного сустава; в дистальном отделе разделяется на два влагалища для сухожилий длинной и короткой малоберцовой мышц.

689. **Vag. synovialis tendinis m. flexoris carpi radialis** (PNA; bursa m. flexoris carpi radialis, BNA; vag. tendinis m. flexoris carpi radialis, JNA), синовиальное влагалище сухожилия лучевого сгибателя запястья — С. в., окружающее конечный отдел сухожилия лучевого сгибателя запястья в пределах передней области запястья под удерживателем сгибателей и в борозде трапециевидной кости.

690. **Vag. synovialis tendinis m. flexoris hallucis longi** (PNA; vag. tendinis m. flexoris hallucis longi, BNA, JNA), синовиальное влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы— расположено на медиальной поверхности таранной кости, в фиброзном канале под удерживателем сухожилий-сгибателей; начинается на уровне нижнего края медиальной лодыжки, заканчивается на подошве, на уровне головки I плюсневой кости.

691. **Vag. synovialis m. obliqui superioris** (PNA; vag. synovialis trochleae, JNA; bursa m. trochlearis, BNA; bursa synovialis trochlearis), синовиальное влагалище верхней косой мышцы — окружает промежуточное сухожилие верхней косой мышцы (глазного яблока) при прохождении его через блок у блоковой ямки глазницы.

692. **Vag. synovialis tendinis m. tibialis posterioris** (PNA; vag. tendinis m. tibialis posterioris, BNA, JNA), синовиальное влагалище сухожилия задней большеберцовой мышцы — расположено позади медиальной лодыжки большеберцовой кости в переднем фиброзном канале под удерживателем сухожилий сгибателей; начинается у основания лодыжки, заканчивается на уровне головки таранной кости.

693. **Vag. synovialis trochleae** (JNA), синовиальное влагалище блока — см. *Vag. synovialis m. obliqui superioris.*

694. **Vag. tendinis m. extensoris carpi ulnaris** (PNA, BNA, JNA), влагалище сухожилия локтевого разгибателя запястья — расположено в задней области запястья, в шестом фиброзном канале под удерживателем разгибателей, на задневнутренней поверхности локтевой кости; начинается на уровне верхнего края удерживателя разгибателей, заканчивается на уровне гороховидной кости.

695. **Vag. tendinis m. extensoris digiti minimi** (PNA, BNA; vag. tendinis m. extensoris digiti quinti, JNA), влагалище сухожилия разгибателя мизинца — расположено в задней области запястья в пятом фиброзном канале под удерживателем разгибателей, вдоль наружного края дистального лучелоктевого сустава; начинается несколько выше удерживателя разгибателей, заканчивается на уровне средней трети V пястной кости.

696. **Vag. tendinis m. extensoris digiti quinti** (JNA), влагалище сухожилия разгибателя мизинца — см. *Vag. tendinis m. extensoris digiti minimi.*

697. **Vag. tendinis m. extensoris hallucis longi** (PNA, BNA, JNA), влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца стопы — расположено в передней области голеностопного сустава и на тыле стопы, в фиброзном канале под удерживателями сухожилий разгибателей; начинается на уровне верхней кожки нижнего удерживателя сухожилий разгибателей, заканчивается несколько ниже фиброзного укрепляющего пучка тыльной фасции стопы.

698. **Vag. tendinis m. extensoris pollicis longi** (PNA, BNA, JNA), влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти — расположено в задней области запястья, в фиброзном канале под удерживателем разгибателей, на задней поверхности лучевой кости; начинается несколько выше удерживателя разгибателей, заканчивается на уровне основания I пястной кости.

699. **Vag. tendinis m. fibularis longi plantaris** (JNA), подошвенное влагалище сухожилия длинной малоберцовой мышцы — см. *Vag. tendinis m. peronei (fibularis) longi plantaris.*

700. **Vag. tendinis m. flexoris carpi radialis** (JNA), влагалище сухожилия лучевого сгибателя запястья — см. *Vag. synovialis tendinis m. flexoris carpi radialis.*

701. **Vag. tendinis m. flexoris hallucis longi** (BNA, JNA), влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы — см. *Vag. synovialis tendinis m. flexorishallucislongi.*

702. **Vag. tendinis m. flexoris pollicis longi** (PNA, BNA, JNA), влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти — расположено в канале запястья, наружном фасциальном ложе ладони и на большом пальце; начинается от квадратного пронатора, заканчивается на уровне основания дистальной фаланги большого пальца; иногда сообщается в канале запястья с vag. synovialis communis mm. flexorum (digitorum manus).

703. **Vag. tendinis m. peronaei longi plantaris** (BNA), подошвенное влагалище длинной малоберцовой мышцы— см. *Vag. tendinis m. peronei (fibularis) longi plantaris.*

704. **Vag. tendinis m. peronei (fibularis) longi plantaris** (PNA; vag. tendinis m. peronaei longi plantaris, BNA; vag. tendinis m. fibularis longi plantaris, JNA), подошвенное влагалище сухожилия длинной малоберцовой мышцы — расположено на подошве в костно-фиброзном канале, образованном бороздой кубовидной кости, бороздой латеральной клиновидной кости и головкой II плюсневой кости — с одной стороны и длинной подошвенной связкой — с другой.

705. **Vag. tendinis m. tibialis anterioris** (PNA, BNA, JNA), влагалище сухожилия передней большеберцовой мышцы — расположено в передней области голеностопного сустава и на тыле стопы, в фиброзном канале; начинается несколько выше верхнего удерживателя сухожилий разгибателей, заканчивается у верхнего края нижней кожки удерживателя сухожилий разгибателей.

706. **Vag. tendinis m. tibialis posterioris** (BNA, JNA), влагалище сухожилия задней большеберцовой мышцы — см. *Vag. synovialis tendinis m. tibialis posterioris.*

707. **Vagg. tendinum digitales** (BNA), влагалища сухожилий пальцев — см. *Vagg. synovialis digitorum manis.*

708. **Vagg. tendinum digitales pedis** (BNA), влагалища сухожилий пальцев стопы — см. *Vagg. tendinum digitorum pedis.*

709. **Vagg. tendinum digitorum** (JNA), влагалища сухожилий пальцев — см. *Vagg. synoviales digitorum manus.*

710. **Vagg. tendinum digitorum pedis** (PNA; vagg. tendinum digitales pedis, BNA; vagg. tendinum mm. flexorum digitorum pedis, JNA), влагалища сухожилий пальцев стопы — расположены в фиброзных каналах I—V пальцев на их подошвенной поверхности; начинаются на уровне головок плюсневых костей (у I пальца проксимальнее на 2—2,5 *см*), заканчиваются у оснований дистальных фаланг пальцев.

711. **Vag. tendinum mm. abductoris longi et extensoris brevis pollicis** (PNA, BNA; vag. tendinum m. abductoris longi et m. extensoris brevis pollicis, JNA), влагалище сухожилий длинной отводящей мышцы и короткого разгибателя большого пальца кисти — расположено в задней области запястья, в первом фиброзном канале под удерживателем разгибателей, на наружной поверхности лучевой кости; начинается на уровне верхнего края удерживателя разгибателей, заканчивается на уровне первого запястно-пястного сустава; может разделяться на два влагалища для сухожилия каждой мышцы.

712. **Vag. tendinum m. abductoris longi et m. extensoris brevis pollicis** (JNA), влагалище сухожилий длинной отводящей мышцы и короткого разгибателя большого пальца кисти — см. *Vag. tendinum mm. abductoris longi et extensoris brevis pollicis.*

713. **Vag. tendinum mm. extensoris digitorum communis et extensoris indicis** (BNA), влагалище сухожилий общего разгибателя пальцев и разгибателя указательного пальца — см. *Vag. tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis.*

714. **Vag. tendinum m. extensoris digitorum communis et m. extensoris indicis proprii** (JNA), влагалище сухожилия общего разгибателя пальцев и

собственного разгибателя указательного пальца — см. *Vag. tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis*.

715. **Vag. tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis** (PNA; vag. tendinum mm. extensoris digitorum communis et extensoris indicis, BNA; vag. tendinum m. extensoris digitorum communis et m. extensoris indicis proprii, JNA), влагалище сухожилий разгибателей пальцев и указательного пальца — расположено в задней области запястья, в четвертом фиброзном канале под удерживателем разгибателей, вдоль внутреннего края лучевой кости и дистального лучелоктевого сустава; начинается у верхнего края удерживателя разгибателей, заканчивается на уровне верхней трети II—IV пястных костей.

716. **Vag. tendinum m. extensoris digitorum longi** (JNA), влагалище сухожилия длинного разгибателя пальцев — см. *Vag. tendinum m. extensoris digitorum pedis longi*.

717. **Vag. tendinum m. extensoris digitorum pedis longi** (PNA, BNA; vag. tendinum m. extensoris digitorum longi, JNA), влагалище сухожилий длинного разгибателя пальцев стопы — расположено в передней области голеностопного сустава и на тыле стопы, в фиброзном канале; начинается у нижнего края верхнего удерживателя сухожилий разгибателей, заканчивается на уровне фиброзного укрепляющего пучка тыльной фасции стопы.

718. **Vag. tendinum mm. extensorum carpi radialium** (PNA, BNA, JNA), влагалище сухожилий лучевых разгибателей запястья — расположено в задней области запястья, во втором фиброзном канале под удерживателем разгибателей, на задней поверхности лучевой кости; начинается на уровне верхнего края удерживателя разгибателей, заканчивается на уровне II и III запястно-пястных суставов; содержит сухожилия длинного и короткого лучевых разгибателей запястья.

719. **Vag. tendinum mm. fibularium communis** (JNA), общее влагалище сухожилий малоберцовых мышц — см. *Vag. synovialis mm. peroneorum (fibularium) communis*.

720. **Vag. tendinum m. flexoris digitorum longi** (JNA), влагалище сухожилий длинного сгибателя пальцев — см. *Vag. tendinum m. flexoris digitorum pedis longi*.

721. **Vag. tendinum m. flexoris digitorum pedis longi** (PNA, BNA; vag. tendinum m. flexoris digitorum longi, JNA), влагалище сухожилий длинного сгибателя пальцев стопы — расположено позади медиальной лодыжки в среднем фиброзном канале под удерживателем сухожилий сгибателей; начинается на уровне середины лодыжки, заканчивается на подошве, на уровне медиальной клиновидной кости.

722. **Vag. tendinum mm. flexorum communium** (BNA), влагалище сухожилий общих сгибателей кисти — см. *Vag. synovialis communis mm. flexorum (digitorum manus)*.

723. **Vag. tendinum mm. flexorum digitorum communis** (JNA), общее влагалище сухожилий сгибателей кисти — см. *Vag. synovialis communis mm. flexorum (digitorum manus)*.

724. **Vagg. tendinum mm. flexorum digitorum pedis** (JNA), влагалища сухожилий сгибателей пальцев стопы — см. *Vagg. tendinum digitorum pedis*.

725. **Vag. tendinum mm. peroneorum communis** (BNA), общее влагалище сухожилий малоберцовых мышц — см. *Vag. synovialis mm. peroneorum (fibularium) communis*.

СИНОВИАЛЬНЫЕ СУМКИ (BURSAE SYNOVIALES)

726. **B. anconea,** локтевая сумка — см. *B. intratendinea olecrani*.

727. **B. anserina** (PNA, BNA, JNA), сумка гусиной лапки — расположена под сухожилиями тонкой, портняжной и полусухожильной мышц на поверхности медиального мыщелка большеберцовой кости у места прикрепления к нему большеберцовой коллатеральной связки.

728. **B. bicipitogastrocnemialis** (BNA, JNA), двуглаво-икроножная сумка — расположена между сухожилием двуглавой мышцы бедра и латеральной головкой икроножной мышцы; встречается редко.

729. **B. bicipitoradialis** (PNA, BNA, JNA), двуглаво-лучевая сумка — расположена между сухожилием двуглавой мышцы плеча и бугристостью лучевой кости.

730. **B. capitistibialis m. gastrocnemii** (JNA), сумка большеберцовой головки икроножной мышцы — см. *B. subtendinea m. gastrocnemii medialis*.

731. **B. coccygea** (BNA; b. coccygica, JNA), копчиковая сумка — непостоянная сумка незначительной величины в области копчика.

732. **B. coccygica,** копчиковая сумка — см. *B. coccygea*.

733. **B. cubitalis interossea** (PNA, BNA; b. cubiti interossea, JNA), межкостная локтевая сумка — расположена между сухожилием двуглавой мышцы плеча снаружи, локтевой костью и косой хордой изнутри и супинатором сзади; встречается непостоянно.

734. **B. cubiti interossea** (JNA), межкостная локтевая сумка — см. *B. cubitalis interossea*.

735. **Gastrocnemii lateralis** (BNA), латеральная икроножная сумка — см. *Subtendinea m. gastrocnemii lateralis*.

736. **Gastrocnemii medialis** (BNA), медиальная икроножная сумка — см. *Subtendinea m. gastrocnemii medialis*.

737. **Bb. gluteofemoralis,** ягодично-бедренная сумка — см. *Bb. intermusculares mm. gluteorum*.

738. **B. iliaca subtendinea** (BNA, JNA), подсухожильная подвздошная сумка — см. *B. subtendinea iliaca*.

739. **B. ilica subtendinea** (JNA), подвздошная подсухожильная сумка — см. *B. subtendinea iliaca*.

740. **B. iliopectinea** (PNA, BNA, JNA; b. m. psoatis majoris), подвздошно-гребенчатая сумка — расположена под сухожилием большой поясничной мышцы на тазовой кости между нижней передней подвздошной остью и подвздошно-гребенчатым возвышением; встречается непостоянно, иногда сообщается с полостью тазобедренного сустава.

741. **B. infrahyoidea** (PNA), подподъязычная сумка — расположена у места прикрепления грудино-подъязычной мышцы к подъязычной кости.

742. **B. infrapatellaris profunda** (PNA, BNA, JNA), глубокая поднадколенниковая сумка — расположена позади сухожилия четырехглавой мышцы бедра у места ее прикрепления к бугристости большеберцовой кости.

743. **B. infrapatellaris subcutanea** (BNA, JNA), подкожная поднадколенниковая сумка — см. *B. subcutanea infrapatellaris*.

744. **B. infrapatellaris superficialis,** поверхностная поднадколенниковая сумка — см. *B. subcutanea infrapatellaris*.

745. **Bb. intermetatarsophalangeae** (BNA; bb. intermetatarsophalangicae, JNA), межплюснефаланговые сумки — мелкие выпячивания капсул плюснефаланговых суставов, расположенные между головками плюсневых костей.

746. **Bb. intermetatarsophalangicae** (JNA), межплюснефаланговые сумки — см. *B. intermetatarsophalangeae*.

747. **Bb. intermusculares mm. gluteorum** (PNA; bb. gluteofemorales, BNA, JNA), межмышечные сумки ягодичных мышц — расположены между большой и средней ягодичными мышцами, иногда между большой ягодичной и приводящими мышцами бедра ниже уровня большого вертела; встречается непостоянно.

748. **B. intratendinea olecrani** (PNA, BNA, JNA; b. anconeus), локтевая внутрисухожильная сумка — расположена между сухожилиями трехглавой мышцы плеча и локтевой мышцы; встречается непостоянно.

749. **B. ischiadica m. glutaei maximi** (BNA, JNA), седалищная сумка большой ягодичной мышцы — см. *B. ischiadica m. glutei maximi*.

750. **B. ischiadica m. glutei maximi** (PNA; b. ischiadica m. glutaei maximi, BNA, JNA), седалищная сумка большой ягодичной мышцы — расположена между седалищными бугром и нижней частью большой ягодичной мышцы.

751. **B. ischiadica m. obturatorii interni** (PNA; b. m. obturatorii interni, BNA; b. m. obturatoris interni, JNA), седалищная сумка внутренней запирательной мышцы — расположена между внутренней запирательной мышцей и костным краем малого седалищного отверстия, через к-рый мышца перегибается при выходе из полости малого таза.

752. **B. lig. coracoclavicularis,** сумка клювовидно-ключичной связки — рас-

положена между трапециевидной и конической частями клювовидно-ключичной связки; встречается непостоянно.

753. **B. m. bicipitis femoris distalis** (JNA), дистальная сумка двуглавой мышцы бедра — см. *B. subtendinea m. bicipitis femoris inferior.*

754. **B. m. bicipitis femoris inferior** (BNA), нижняя сумка двуглавой мышцы бедра — см. *B. subtendinea m. bicipitis femoris inferior.*

755. **B. m. bicipitis femoris proximalis** (JNA), проксимальная сумка двуглавой мышцы бедра — см. *B. m. bicipitis femoris superior.*

756. **B. m. bicipitis femoris superior** (PNA, BNA; b. m. bicipitis femoris proximalis, JNA), верхняя сумка двуглавой мышцы бедра — расположена у седалищного бугра между сухожилием длинной головки двуглавой мышцы бедра и сухожилием полуперепончатой мышцы; встречается непостоянно.

757. **B. m. coracobrachialis** (PNA, BNA, JNA), сумка клювовидно-плечевой мышцы — расположена позади начала сухожилия клювовидно-плечевой мышцы, между ним, клювовидным отростком лопатки и передней поверхностью сухожилия подлопаточной мышцы.

758. **B. m. extensoris carpi radialis brevis** (PNA, BNA, JNA), сумка короткого лучевого разгибателя запястья — расположена у места прикрепления мышцы между ее сухожилиями и основанием третьей пястной кости.

759. **B. m. flexoris carpi ulnaris** (BNA), сумка локтевого сгибателя запястья — расположена под сухожилием локтевого сгибателя запястья у места его прикрепления к гороховидной кости.

760. **B. m. gastrocnemii lateralis** (BNA), латеральная сумка икроножной мышцы — см. *B. subtendinea m. gastrocnemii lateralis.*

761. **B. m. gastrocnemii medialis** (BNA), медиальная сумка икроножной мышцы — см. *B. subtendinea m. gastrocnemii medialis.*

762. **B. m. infra spinam** (JNA), сумка подостной мышцы — см. *B. subtendinea m. infraspinati.*

763. **B. m. infraspinati** (BNA), сумка подостной мышцы — см. *B. subtendinea m. infraspinati.*

764. **B. m. latissimi dorsi** (BNA, JNA), сумка широчайшей мышцы спины — см. *B. subtendinea m. latissimi dorsi.*

765. **Bb. mm. lumbricalium pedis** (BNA, JNA), сумки червеобразных мышц стопы — расположены на подошвенной поверхности стопы у мест прикрепления червеобразных мышц; встречаются непостоянно.

766. **B. m. obturatorii interni** (BNA), сумка внутренней запирательной мышцы — см. *B. ischiadica m. obturatorii interni.*

767. **B. m. obturatoris interni** (JNA), сумка внутренней запирательной мышцы — см. *B. ischiadica m. obturatorii interni.*

768. **B. m. pectinei** (BNA, JNA), сумка гребенчатой мышцы — расположена у места прикрепления гребенчатой мышцы к гребенчатой линии под малым вертелом бедренной кости.

769. **B. m. pectoralis majoris,** сумка большой грудной мышцы — расположена между конечным отделом сухожилия большой грудной мышцы и передней поверхностью длинной головки двуглавой мышцы плеча; встречается непостоянно.

770. **B. m. piriformis** (PNA, BNA, JNA), сумка грушевидной мышцы — расположена у места прикрепления грушевидной мышцы к верхушке большого вертела между ее сухожилием, большим вертелом и верхней близнецовой мышцей.

771. **B. m. poplitei** (BNA, JNA), сумка подколенной мышцы — выпячивание капсулы колепного сустава назад и вниз под сухожильное начало подколенной мышцы.

772. **B. m. psoatis majoris,** сумка большой поясничной мышцы — см. *B. iliopectinea.*

773. **B. m. quadricipitis,** сумка четырехглавой мышцы — см. *B. suprapatellaris.*

774. **B. m. recti femoris** (BNA, JNA), сумка прямой мышцы бедра — расположена под сухожилием прямой мышцы бедра у ее начала от передней нижней подвздошной ости.

775. **B. m. sartorii propria** (BNA, JNA), собственная сумка портняжной мышцы — см. *Bb. subtendineae m. sartorii.*

776. **B. m. semimembranacei fibularis** (JNA), малоберцовая сумка полуперепончатой мышцы — см. *B. m. semimembranosi.*

777. **B. m. semimembranosi** (PNA, BNA; b. m. semimembranacei fibularis, JNA), сумка полуперепончатой мышцы — расположена под пучком сухожилия полуперепончатой мышцы, огибающим медиальный мыщелок бедренной кости; часто сообщается с полостью коленного сустава.

778. **B. m. sternohyoidei** (BNA, JNA), сумка грудиноподъязычной мышцы — см. *B. retrohyoidea.*

779. **B. m. subscapularis,** сумка подлопаточной мышцы — см. *B. subtendinea m. subscapularis.*

780. **B. m. tensoris veli palatini** (PNA, BNA; b. synovialis tendinis m. tensoris veli palatini, JNA), сумка мышцы, напрягающей небную занавеску — расположена между сухожилием мышцы и крыловидным крючком клиновидной кости.

781. **B. m. teretis majoris** (BNA, JNA), сумка большой круглой мышцы — см. *B. subtendinea m. teretis majoris.*

782. **B. m. thyreohyoidei** (BNA, JNA), сумка щитовидно-подъязычной мышцы — непостоянная сумка, расположенная позади щитовидно-подъязычной мышцы.

783. **B. m. trochlearis** (BNA), сумка блоковидной мышцы — см. *Vag. synovialis m. obliqui superioris.*

784. **B. praepatellaris subaponeurotica** (JNA), подапоневротическая преднадколенниковая сумка — см. *B. subtendinea prepatellaris.*

785. **B. praepatellaris subcutanea** (BNA, JNA), подкожная преднадколенниковая сумка — см. *B. subcutanea prepatellaris.*

786. **B. praepatellaris subfascialis** (BNA, JNA), подфасциальная преднадколенниковая сумка — см. *B. subfascialis prepatellaris.*

787. **B. praepatellaris subtendinea** (BNA), подсухожильная преднадколенниковая сумка — см. *B. subtendinea prepatellaris.*

788. **B. retrohyoidea** (PNA; b. m. sternohyoidei, BNA, JNA), позадиподъязычная сумка — расположена между телом подъязычной кости и щитоподъязычной мембраной.

789. **B. sinus tarsi** (BNA, JNA), сумка пазухи предплюсны — расположена на тыльной поверхности стопы между связками и сухожилиями у пазухи предплюсны; встречается непостоянно.

790. **B. subacromialis** (PNA, BNA, JNA), подакромиальная сумка — расположена между акромионом и клювовидно-акромиальной связкой сверху, капсулой плечевого сустава и надостной мышцей снизу; часто сообщается с поддельтовидной сумкой.

791. **B. subcutanea acromialis** (PNA, BNA, JNA), акромиальная подкожная сумка — расположена под кожей на верхней поверхности акромиона; встречается непостоянно.

792. **B. subcutanea calcanea** (PNA, BNA; b. subcutanea calcanearis, JNA), пяточная подкожная сумка — расположена между кожей и конечной частью пяточного сухожилия позади бугра пяточной кости.

793. **B. subcutanea calcanearis** (JNA), пяточная подкожная сумка — см. *B. subcutanea calcanea.*

794. **B. subcutanea epicondyli humeri radialis** (JNA), подкожная сумка лучевого надмыщелка плечевой кости — см. *B. Subcutanea epicondyli lateralis.*

795. **B. subcutanea epicondyli humeri ulnaris** (JNA), подкожная сумка локтевого надмыщелка плечевой кости — см. *B. subcutanea epicondyli medialis.*

796. **B. subcutanea epicondyli lateralis** (BNA; b. subcutanea epicondyli humeri radialis, JNA), подкожная сумка латерального надмыщелка — расположена под кожей на поверхности латерального надмыщелка плечевой кости; встречается непостоянно, только у взрослых.

797. **B. subcutanea epicondyli medialis** (BNA; b. subcutanea epicondyli humeri ulnaris, JNA), подкожная сумка медиального надмыщелка — расположена под кожей на поверхности медиального надмыщелка плечевой кости; встречается непостоянно, только у взрослых.

798. **B. subcutanea infrapatellaris** (PNA; b. infrapatellaris subcutanea, BNA, JNA; b. infrapatellaris superficialis), подкожная поднадколенниковая сумка — расположена ниже надколенника, между кожей и связкой надколенника; не сообщается с полостью коленного сустава.

799. **B. subcutanea malleoli fibulae** (JNA), подкожная сумка малоберцовой лодыжки — см. *B. subcutanea malleoli lateralis.*

800. **B. subcutanea malleoli lateralis** (PNA, BNA; b. subcutanea malleoli fibulae, JNA), подкожная сумка латеральной лодыжки — расположена под кожей на поверхности латеральной лодыжки.

801. **B. subcutanea malleoli medialis** (PNA, BNA; b. subcutanea malleoli tibiae, JNA), подкожная сумка медиальной лодыжки — расположена под кожей на поверхности медиальной лодыжки.

802. **B. subcutanea malleoli tibiae** (JNA), подкожная сумка большеберцо-

вой лодыжки — см. *B. subcutanea malleoli medialis.*

803. **B. subcutanea olecrani** (PNA, BNA, JNA), локтевая подкожная сумка — расположена под кожей на свободной поверхности локтевого отростка; может смещаться в сторону медиального или латерального мыщелка плечевой кости; иногда разделена на камеры.

804. **B. subcutanea prepatellaris** (PNA; b. praepatellaris subcutanea, BNA, JNA), подкожная преднадколенниковая сумка — расположена под кожей впереди надколенника; отличается иногда крупными размерами.

805. **B. subcutanea prominentiae laryngeae** (PNA, BNA; b. subcutanea prominentiae laryngicae, JNA), подкожная сумка выступа гортани — окружает наиболее выпуклую часть угла щитовидного хряща, лучше выражена у мужчин.

806. **B. subcutanea prominentiae laryngicae** (JNA), подкожная сумка гортанного возвышения — см. *B. subcutanea prominentiae laryngeae.*

807. **B. subcutanea sacralis** (BNA, JNA), крестцовая подкожная сумка — общее название нескольких непостоянных мелких синовиальных сумок в подкожной клетчатке между крестцом и кожей.

808. **B. subcutanea trochanterica** (PNA; b. trochanterica subcutanea, BNA, JNA), подкожная вертельная сумка — расположена под кожей у большого вертела бедренной кости.

809. **B. subcutanea tuberositatis tibiae** (PNA, BNA, JNA), подкожная сумка бугристости большеберцовой кости — расположена под кожей в области бугристости большеберцовой кости.

810. **Bb. subcutaneae digitorum dorsales** (BNA, JNA), тыльные подкожные сумки пальцев (кисти) — расположены под кожей кисти на тыльной поверхности межфаланговых суставов.

811. **Bb. subcutaneae metacarpophalangeae dorsales** (BNA; bb. subcutaneae metacarpophalangicae dorsales, JNA), тыльные пястно-фаланговые подкожные сумки — расположены под кожей тыла кисти над головками пястных костей, выступающими во время сгибания пальцев.

812. **Bb. subcutaneae metacarpophalangicae dorsales** (JNA), тыльные пястно-фаланговые подкожные сумки — см. *Bb. subcutaneae metacarpophalangeae dorsales.*

813. **B. subdeltoidea** (PNA, BNA, JNA), поддельтовидная сумка — расположена между дельтовидной мышцей и большим бугорком плечевой кости; соединяясь с подакромиальной сумкой, может достигать значительной величины; иногда разделяется на несколько мелких камер.

814. **B. subfascialis prepatellaris** (PNA; b. praepatellaris subfascialis, BNA, JNA), подфасциальная преднадколенниковая сумка — расположена между надколенником и сухожилием четырехглавой мышцы бедра сзади и широкой фасцией бедра, переходящей на переднюю область колена, спереди; встречается непостоянно.

815. **B. subtendinea iliaca** (PNA; b. iliaca subtendinea, BNA; b. ilica subtendinea, JNA), подсухожильная подвздошная сумка — расположена между сухожилием подвздошно-поясничной мышцы и малым вертелом бедренной кости.

816. **B. subtendinea m. bicipitis femoris inferior** (PNA; b. m. bicipitis femoris inferior, BNA; b. m. bicipitis femoris distalis, JNA), нижняя подсухожильная сумка двуглавой мышцы бедра — расположена между сухожилием двуглавой мышцы бедра и малоберцовой коллатеральной связкой на головке малоберцовой кости.

817. **B. subtendinea m. gastrocnemii lateralis** (PNA; b. m. gastrocnemii lateralis, BNA), латеральная подсухожильная сумка икроножной мышцы — расположена между началом латеральной головки икроножной мышцы и латеральным мыщелком бедренной кости; иногда сообщается с полостью коленного сустава.

818. **B. subtendinea m. gastrocnemii medialis** (PNA, b. m. gastrocnemii medialis, BNA; b. capitis tibialis m. gastrocnemii, JNA), медиальная подсухожильная сумка икроножной мышцы — расположена между медиальной головкой икроножной мышцы и латеральным мыщелком бедренной кости; иногда сообщается с полостью коленного сустава.

819. **B. subtendinea m. infraspinati** (PNA; b. m. infraspinati, BNA; b. m. infra spinam, JNA), подсухожильная сумка подостной мышцы — расположена у места прикрепления подостной мышцы к большому бугорку плечевой кости между сухожилием мышцы и капсулой плечевого сустава.

820. **B. subtendinea m. latissimi dorsi** (PNA; b. m. latissimi dorsi, BNA, JNA), подсухожильная сумка широчайшей мышцы спины — расположена у места прикрепления мышцы к гребню малого бугорка плечевой кости между сухожилиями широчайшей мышцы спины и большой круглой мышцы.

821. **B. subtendinea m. obturatorii interni** (PNA), подсухожильная сумка внутренней запирательной мышцы — расположена у места прикрепления внутренней запирательной мышцы к вертельной ямке бедренной кости.

822. **B. subtendinea m. subscapularis** (PNA; b. m. subscapularis, BNA; b. tendinis musculi subscapularis, JNA), подсухожильная сумка подлопаточной мышцы — расположена между шейкой лопатки и подлопаточной мышцей; сообщается с полостью плечевого сустава через отверстие в передней части капсулы, увеличивает полость сустава; является местом переднемедиальных вывихов головки плечевой кости.

823. **B. subtendinea m. teretis majoris** (PNA; b. m. teretis majoris, BNA, JNA), подсухожильная сумка большой круглой мышцы — расположена у места прикрепления большой круглой мышцы к гребню малого бугорка плечевой кости между сухожилием мышцы и костью.

824. **B. subtendinea m. tibialis anterioris** (PNA, BNA, JNA), подсухожильная сумка передней большеберцовой мышцы — расположена на тыльной поверхности стопы между медиальной клиновидной, первой плюсневой костями и сухожилием передней большеберцовой мышцы.

825. **B. subtendinea m. tibialis posterioris** (BNA, JNA), подсухожильная сумка задней большеберцовой мышцы — расположена на подошвенной поверхности стопы между ладьевидной, промежуточной клиновидной костями и сухожилием задней большеберцовой мышцы; встречается непостоянно.

826. **B. subtendinea m. trapezii** (PNA), подсухожильная сумка трапециевидной мышцы — расположена у места прикрепления трапециевидной мышцы к ости лопатки, между сухожилием мышцы и костью.

827. **B. subtendinea m. tricipitis brachii** (PNA; b. subtendinea olecrani, BNA, JNA), подсухожильная сумка трехглавой мышцы плеча — расположена у места прикрепления трехглавой мышцы плеча между сухожилием мышцы и локтевым отростком.

828. **B. subtendinea olecrani** (BNA, JNA), локтевая подсухожильная сумка — см. *B. subtendinea m. tricipitis brachii.*

829. **B. subtendinea prepatellaris** (PNA; b. praepatellaris subtendinea, BNA; b. praepatellaris subaponeurotica, JNA), подсухожильная преднадколенниковая сумка — расположена между надкостницей надколенника и покрывающим его сухожилием; встречается непостоянно.

830. **Bb. subtendineae m. sartorii** (PNA; b. m. sartorii propria, BNA, JNA), подсухожильные сумки портняжной мышцы — расположены между сухожилием портняжной мышцы и сухожильными прикреплениями тонкой и полусухожильной мышц; нередко сообщаются с b. anserina.

831. **B. suprapatellaris** (PNA, BNA, JNA; син. b. m. quadricipitis), надколенниковая сумка — расположена выше надколенника позади сухожилия четырехглавой мышцы бедра; сообщается с полостью коленного сустава, увеличивая размеры его верхнего заворота.

832. **B. synovialis tendinis m. tensoris veli palatini** (JNA), синовиальная сумка сухожилия мышцы, напрягающей небную занавеску — см. *B. m. tensoris veli palatini.*

833. **B. synovialis trochlearis,** блоковая синовиальная сумка — см. *Vag. synovialis m. obliqui superioris.*

834. **B. tendinis calcanei (Achillis)** (PNA, BNA; b. tendinis m. tricipitis surae, JNA), сумка пяточного (ахиллова) сухожилия — расположена между пяточными сухожилием и бугром пяточной кости.

835. **B. tendinis m. subscapularis** (JNA), сумка сухожилия подлопаточной мышцы — см. *B. subtendinea m. subscapularis.*

836. **B. tendinis m. tricipitis surae** (JNA), сумка сухожилия трехглавой мышцы голени — см. *B. tendinis calcanei (Achillis).*

837. **B. trochanterica m. glutaei maximi** (BNA), вертельная сумка большой ягодичной мышцы — см. *B. trochanterica m. glutei maximi.*

838. **B. trochanterica m. glutaei minimi** (BNA, JNA), вертельная сумка малой ягодичной мышцы — см. *B. trochanterica m. glutei minimi.*

839. **B. trochanterica m. glutei maximi** (PNA; b. trochanterica m. glutaei maximi, BNA; b. trochanterica subfascialis, JNA), вертельная сумка большой ягодичной мышцы — расположена на поверхности большого вертела бедренной кости под большой ягодичной мышцей.

840. **B. trochanterica m. glutei minimi** (PNA; b. trochanterica m. glutaei minimi, BNA, JNA), вертельная сумка малой ягодичной мышцы — расположена у места прикрепления малой ягодичной мышцы между ее сухожилием и передним краем большого вертела бедренной кости.

841. **B. trochanterica subcutanea** (BNA, JNA), подкожная вертельная сумка — см. *B. subcutanea trochanterica.*

842. **B. trochanterica subfascialis** (JNA), подфасциальная вертельная сумка — см. *B. trochanterica m. glutei maximi.*

843. **Bb. trochantericae m. glutaei medii anterior et posterior** (BNA), передняя и задняя вертельные сумки средней ягодичной мышцы — см. *Bb. trochantericae m. glutei medii.*

844. **Bb. trochantericae m. glutaei medii superficialis et profunda** (JNA), поверхностная и глубокая вертельные сумки средней ягодичной мышцы — см. *Bb. trochantericae m. glutei medii.*

845. **Bb. trochantericae m. glutei medii** (PNA; bb. trochantericae m. glutei medii anterior et posterior, BNA; bb. trochantericae m. glutaei medii superficialis et profunda, JNA), вертельные сумки средней ягодичной мышцы — две сумки; передняя (глубокая) и задняя (поверхностная) — расположены по верхнему краю большого вертела бедренной кости у места прикрепления средней ягодичной мышцы.

846. **B. m. thyreohyoidei** (BNA, JNA), сумка щитоподъязычной мышцы — расположена у места прикрепления щитоподъязычной мышцы к большому рогу подъязычной кости.

ФАСЦИИ (FASCIAE)

847. **F. abdominis interna profunda,** глубокая внутренняя фасция живота — см. F. *transversalis.*

848. **F. abdominis superficialis,** поверхностная фасция живота — расположена между подкожным жировым слоем и собственной фасцией, покрывающей влагалища прямых мышц живота и наружные косые мышцы живота; ниже пупка делится на поверхностную и глубокую пластинки.

849. **F. antebrachii** (PNA, JNA; f. antibrachii, BNA), фасция предплечья — покрывает мышцы предплечья, образуя для них фасциальные футляры.

850. **F. antibrachii** (BNA), фасция предплечья — см. *F. antebrachii.*

851. **Aponeurosis Denonvilliers,** апоневроз Денонвиллье — см. *F. peritoneoperinealis.*

852. **Aponeurosis femoralis,** бедренный апоневроз — см. *F. lata.*

853. **Aponeurosis ischiorectalis,** седалищно-прямокишечный апоневроз — см. *F. diaphragmatis urogenitalis inferior.*

854. **Aponeurosis lumbodorsalis,** поясничноспинной апоневроз — см. *F. thoracolumbalis.*

855. **Aponeurosis musculi bicipitis brachii** (PNA; lacertus fibrosus, BNA, JNA; fascia Pirogovi), апоневроз двуглавой мышцы плеча — фиброзные пучки сухожилия двуглавой мышцы плеча, перекидывающиеся через локтевую ямку и переходящие в фасцию предплечья.

856. **Aponeurosis omoclavicularis** (Richet), лопаточно-ключичный апоневроз (Ришс) — см. *Lamina pretrachealis.*

857. **Aponeurosis orbitoorbicularis,** глазнично-круговой апоневроз — см. *Vagina bulbi.*

858. **Aponeurosis palmaris** (PNA, BNA, JNA), ладонный апоневроз — расположен в средней углубленной части ладони; образован пучками волокон, идущими от сухожилия длинной ладонной мышцы и удерживателя сгибателей веерообразно по направлению к II—V пальцам, и более глубокими поперечными пучками.

859. **Aponeurosis peritoneoperinealis,** брюшинно-промежностный апоневроз — см. *F. peritoneoperinealis.*

860. **Aponeurosis pharyngis,** глоточный апоневроз — см. *F. pharyngobasilaris.*

861. **Aponeurosis pharyngobasilaris,** глоточно базилярный апоневроз — см. *F. pharyngobasilaris.*

862. **Aponeurosis plantaris** (PNA, BNA, JNA), подошвенный апоневроз — начинается от пяточного бугра и соединяется с брюшком короткого сгибателя пальцев, распадаясь на пять пучков соответственно пальцам; наряду с продольными включает поперечные и косые волокна.

863. **Aponeurosis puborectalis,** лобково-прямокишечный апоневроз — см. *F. diaphragmatis urogenitalis superior.*

864. **Aponeurosis temporalis,** височный апоневроз — см. *F. temporalis.*

865. **F. axillaris** (PNA, BNA, JNA), подмышечная фасция — покрывает основание подмышечной впадины, переходя по его краям в фасции соседних областей.

866. **F. brachii** (PNA, BNA, JNA), фасция плеча — покрывает мышцы плеча, образуя переднее и заднее мышечные ложа, влагалища сосудистонервных пучков.

867. **F. buccalis,** щечная фасция — передний отдел f. buccopharyngea.

868. **F. buccopharyngea** (PNA, BNA; f. pharyngobuccinatoria, JNA), щечноглоточная фасция — покрывает наружную поверхность щечной мышцы и верхний сжиматель глотки.

869. **F. bulbi (Tenoni)** (BNA), фасция глазного яблока (тенонова) — см. *Vagina bulbi.*

870. **Capsula Amussat,** капсула Амюсса — см. *F. propria recti.*

871. **Capsula bulbi** (JNA), капсула глазного яблока — см. *Vagina bulbi.*

872. **Capsula pelvioprostatica,** тазово-предстательная капсула — см. *F. prostatae.*

873. **Capsula prostatae** (JNA), капсула предстательной железы — см. *F. prostatae.*

874. **Capsula Retzii,** капсула Ретциуса — см. *F. prostatae.*

875. **F. cervicales,** фасции шеи — см. *F. cervicalis.*

876. **F. cervicalis** (PNA; f. colli, BNA, JNA), шейная фасция — образует межфасциальные влагалища мышц, кровеносных сосудов и органов шеи.

877. **F. clavipectoralis** (PNA; f. coracoclavicularis, BNA; f. coracocleidopectoralis, JNA; f. coracopectoralis, f. pectoralis profunda), ключично-грудная фасция — образует влагалище малой грудной и подключичной мышц; прикрепляется к ключице, клювовидному отростку лопатки, верхним ребрам.

878. **F. clitoridis** (PNA, BNA, JNA), фасция клитора — располагается на клиторе под кожей.

879. **F. colli** (BNA, JNA), фасция шеи — см. *F. cervicalis.*

880. **F. colli media** (JNA), средняя фасция шеи — см. *Lamina trachealis.*

881. **F. colli profunda** (praevertebralis) (JNA), глубокая (предпозвоночная) фасция шеи — см. *Lamina prevertebralis.*

882. **F. colli subcutanea,** подкожная фасция шеи — см. *F. superficialis (cervicis).*

883. **F. colli superficialis** (JNA), поверхностная фасция шеи — см. *Lamina superficialis.*

884. **F. coracoclavicularis** (BNA), клювовидно-ключичная фасция — см. *F. clavipectoralis.*

885. **F. coracocleidopectoralis** (JNA), клювовидно-ключично-грудная фасция — см. *F. clavipectoralis.*

886. **F. coracopectoralis,** клювовидно-грудная фасция — см. *F. clavipectoralis.*

887. **F. cremasterica** [PNA, JNA; f. cremasterica (Cooperi), BNA], фасция мышцы, поднимающей яичко — продолжение f. propria abdominis, идущее от поверхностного кольца пахового канала и покрывающее одноименную мышцу, а вместе с ней семенной канатик и яичко.

888. **F. cremasterica** (Cooperi) (BNA), фасция мышцы, поднимающей яичко (Купера) — см. *F. cremasterica.*

889. **F. cribrosa** (PNA, BNA; lamina cribriformis fossae ovalis, JNA), решетчатая фасция — разрыхленный участок поверхностной пластинки f. lata, расположенный в верхней медиальной части передней области бедра под паховой связкой; закрывает подкожное отверстие бедренного канала.

890. **F. cruris** (PNA, BNA, JNA), фасция голени — покрывает все мышцы голени, образуя для них три мышечных ложа: переднее, заднее и наружное; прикрепляется проксимально к бугристости большеберцовой и головке малоберцовой костей, дистально к лодыжкам.

891. **F. deltoidea,** дельтовидная фасция — покрывает наружную поверхность дельтовидной мышцы.

892. **F. diaphragmatica,** диафрагмальная фасция — часть f. endoabdomi-

nalis, покрывающая нижнюю поверхность диафрагмы.

893. **F. diaphragmatis pelvis externa** (JNA), наружная фасция диафрагмы таза — см. *F. diaphragmatis pelvis inferior*.

894. **F. diaphragmatis pelvis inferior** (PNA, BNA; f. diaphragmatis pelvis externa, JNA), нижняя фасция диафрагмы таза — покрывает нижнюю поверхность мышцы, поднимающей задний проход.

895. **F. diaphragmatis pelvis interna,** внутренняя фасция диафрагмы таза — см. *F. diaphragmatis pelvis superior*.

896. **F. diaphragmatis pelvis superior** (PNA, BNA; син. f. diaphragmatis pelvis interna, JNA), верхняя фасция диафрагмы таза — часть f. pelvis parietalis, покрывающая верхнюю поверхность мышцы, поднимающей задний проход.

897. **F. diaphragmatis urogenitalis externa** (JNA), наружная фасция мочеполовой диафрагмы — см. *F. diaphragmatis urogenitalis inferior*.

898. **F. diaphragmatis urogenitalis inferior** (PNA, BNA; membrana perinei, PNA; f. diaphragmatis urogenitalis externa, JNA; aponeurosis ischiorectalis, f. ischiorectalis, f. perinealis), нижняя фасция мочеполовой диафрагмы — покрывает нижнюю поверхность глубокой поперечной мышцы промежности и наружного сфинктера мочеиспускательного канала; прикрепляется к нижним ветвям лобковой и седалищной костей.

899. **F. diaphragmatis urogenitalis interna** (JNA), внутренняя фасция мочеполовой диафрагмы — см. *F. diaphragmatis urogenitalis superior*.

900. **F. diaphragmatis urogenitalis superior** (PNA, BNA; f. diaphragmatis urogenitalis interna, JNA; aponeurosis puborectalis, f. perinei profunda propria, f. subpubica), верхняя фасция мочеполовой диафрагмы — покрывает верхнюю поверхность глубокой поперечной мышцы промежности и наружного сжимателя мочеиспускательного канала.

901. **F. dorsalis manus** (PNA, BNA, JNA), тыльная фасция кисти — покрывает на кисти сухожилия разгибателя пальцев.

902. **F. dorsalis manus profunda,** глубокая тыльная фасция кисти — см. *F. interossea dorsalis (manus)*.

903. **F. dorsalis pedis** (PNA, BNA, JNA), тыльная фасция стопы — покрывает короткие мышцы и сухожилия тыла стопы, образует фасциальное ложе для коротких разгибателей и сухожилий длинных разгибателей большого пальца и пальцев стопы; является продолжением f. cruris.

904. **F. endoabdominalis,** внутрибрюшная фасция — выстилает изнутри брюшную полость, переходя внизу в f. pelvis.

905. **F. endocervicalis,** внутришейная фасция — образует фасциальный футляр для органов шеи, состоит из пристеночного и висцерального листков.

906. **F. endogastrica,** внутрибрюшная фасция — см. *F. transversalis*.

907. **F. endopelvina** (BNA; f. intrapelvina, JNA), внутритазовая фасция — париетальный листок тазовой фасции.

908. **F. endothoracica** (PNA, BNA, JNA), внутригрудная фасция — выстилает изнутри грудную стенку и верхнюю поверхность диафрагмы.

909. **F. Gerdy,** фасция Жерди — укрепленный передний край подмышечной фасции.

910. **F. Gerotae,** фасция Героты — см. *F. renalis*.

911. **F. glutea,** ягодичная фасция — покрывает и образует влагалище большой ягодичной мышцы, образует в ее толще соединительнотканные перегородки, покрывает верхнюю часть средней ягодичной мышцы, прикрепляется к крестцу и наружной губе подвздошного гребня.

912. **F. hypogastrica,** подчревная фасция — см. *F. pelvis*.

913. **F. iliaca** (PNA, BNA; f. ilica, JNA), подвздошная фасция — часть f. endoabdominalis, покрывающая подвздошную мышцу в одноименной яме; прикрепляется к боковой поверхности тел поясничных позвонков, внутренней губе подвздошного гребня и дугообразной линии.

914. **F. ilica** (JNA), подвздошная фасция — см. *F. iliaca*.

915. **F. iliopectinea** (BNA), подвздошно-гребенчатая фасция — глубокая пластинка f. lata, покрывающая подвздошно-поясничную и гребенчатую мышцы.

916. **F. infra spinam** (JNA), подостная фасция — см. *F. infraspinata*.

917. **F. infraspinata** (BNA; f. infra spinam, JNA), подостная фасция — покрывает подостную мышцу; образует для нее костно-фиброзное влагалище, прикрепляясь к краям подостной ямки лопатки.

918. **F. interossea dorsalis manus** (f. dorsalis manus profunda), тыльная межкостная фасция кисти — покрывает тыльные межкостные мышцы, срастается с надкостницей пястных костей.

919. **F. interossea dorsalis pedis,** тыльная межкостная фасция стопы — покрывает тыльные межкостные мышцы, срастается с надкостницей плюсневых костей.

920. **F. interossea plantaris,** подошвенная межкостная фасция — покрывает подошвенные межкостные мышцы, срастается с надкостницей плюсневых костей.

921. **F. interossea volaris,** ладонная межкостная фасция — покрывает ладонные межкостные мышцы, срастается с надкостницей пястных костей.

922. **F. intrapelvina** (JNA), внутритазовая фасция — см. *F. endopelvina*.

923. **F. ischiorectalis,** седалищно-прямокишечная фасция — см. *F. diaphragmatis urogenitalis interior*.

924. **Lacertus fibrosus** (BNA, JNA), фиброзная пластинка — см. *Aponeurosis m. bicipitis brachii*.

925. **Lamina cribriformis fossae ovalis** (JNA), продырявленная пластинка овальной ямки — см. *F. cribrosa*.

926. **Lamina pharyngobasilaris** (JNA), глоточно-базилярная пластинка — см. *F. pharyngobasilaris*.

927. **Lamina pretrachealis** [PNA; f. colli media, JNA; f. omoclavicularis, lamina profunda f. colli propriae, aponeurosis omoclavicularis (Richet)], предтрахеальная пластинка — листок шейной фасции, расположенный ниже подъязычной кости, образующий влагалища для грудино-подъязычной, грудино-щитовидной, щито-подъязычной и лопаточно-подъязычной мышц.

928. **Lamina prevertebralis** [PNA; f. praevertebralis, BNA; f. colli profunda (praevertebralis), JNA], предпозвоночная пластинка — листок шейной фасции, покрывающий спереди шейный отдел позвоночника, длинные мышцы шеи и головы; образует влагалища лестничных мышц и сосудисто-нервного пучка латеральной области шеи.

929. **Lamina profunda colli propriae,** глубокая пластинка собственной фасции шеи — см. *Lamina pretrachealis*.

930. **Lamina superificialis** (PNA; f. colli superficialis, JNA; lamina superficialis fasciae colli propriae), поверхностная пластинка — листок шейной фасции, идущий вокруг шеи, образуя влагалища грудино-ключично-сосковой и трапециевидной мышц и капсулу подчелюстной железы, внизу прикрепляется к передней поверхности ключиц и грудины, вверху — к краю нижней челюсти.

931. **Lamina superficialis fasciae colli propriae,** поверхностная пластинка собственной фасции — см. *Lamina superficialis*.

932. **Lamina Tyrrelli,** пластинка Тирелли — см. *F. peritoneoperinealis*.

933. **F. lata** (PNA, BNA, JNA; f. lata femoris, aponeurosis femoralis), широкая фасция — покрывает мышцы бедра, образуя для них три мышечных ложа: переднее, заднее и медиальное, начинается от паховой связки и подвздошного гребешка, внизу переходит в f. cruris и f. poplitea, частично прикрепляясь к костным выступам в области коленного сустава и к латеральной губе шероховатой линии бедренной кости.

934. **F. lata femoris,** широкая фасция бедра — см. *F. lata*.

935. **F. linguae,** фасция языка — расположена под слизистой оболочкой языка, плотно сращена с ней и с глубже расположенными мышцами.

936. **F. lumbodorsalis** (BNA, JNA), поясничо-спинная фасция — см. *F. thoracolumbalis*.

937. **F. masseterica** (PNA), жевательная фасция — покрывает наружную поверхность жевательной мышцы, сзади переходит в f. parotidea.

938. **Membrana perinei** (PNA), мембрана промежности — см. *F. diaphragmatis urogenitalis inferior*.

939. **Membrana pharyngobasilaris,** глоточно-базилярная мембрана — см. *F. pharyngobasilaris*.

940. **F. metatarsalis,** плюсневая фасция — расположена между отводящей мышцей большого пальца стопы и сухожилиями длинного сгибателя пальцев с червеобразными мышцами; участвует в образовании фасциальных футляров головок мышцы, приводящей большой палец стопы.

941. **Ff. musculares** (PNA, BNA, JNA), мышечные фасции — окружают мышцы глазного яблока.

942. **F. musculi obturatoris interni** (JNA), фасция внутренней запирательной мышцы — см. *F. obturatoria*.

943. **F. musculi transversi,** фасция поперечной мышцы — см. *F. transversalis*.

944. **F. nuchae** (PNA, BNA, JNA), выйная фасция — расположена на задней поверхности шеи, покрывая трапециевидную и ромбовидную мышцы; является продолжением lamina superficialis (f. cervicalis).

945. **F. obturatoria** (PNA, BNA; f. musculi obturatoris interni, JNA), за-

пирательная фасция — латеральный листок f. pelvis parietalis, покрывающий на боковой стенке таза внутреннюю запирательную мышцу.

946. **F. omoclavicularis,** лопаточно-ключичная фасция — см. *Lamina pretrachealis.*

947. **F. parotidea** (PNA), фасция околоушной железы — образует капсулу околоушной железы; прикрепляется к скуловой дуге, углу и нижнему краю нижней челюсти; спереди переходит в f. masseterica.

948. **F. parotideomasseterica** (BNA), околоушно-жевательная фасция — совокупность f. parotidea и f. masseterica.

949. **F. pectinea** (BNA, JNA), гребенчатая фасция — часть глубокой пластинки f. lata, покрывающая гребенчатую мышцу; составляет задневнутреннюю стенку бедренного канала.

950. **F. pectoralis** (PNA, BNA; f. pectoralis superficialis, JNA), грудная фасция — покрывает переднюю поверхность грудины, большую грудную и переднюю зубчатую мышцы, начальную часть наружной мышцы живота.

951. **F. pectoralis profunda,** глубокая грудная фасция — см. *F. clavipectoralis.*

952. **F. pectoralis superficialis** (JNA), поверхностная грудная фасция — см. *F. pectoralis.*

953. **F. pelvis** (PNA, BNA, JNA; f. hypogastrica), фасция таза — покрывает стенки и органы таза, прикрепляется у симфиза и на передней поверхности крестца.

954. **F. pelvis parietalis** (PNA), париетальная фасция таза — часть f. pelvis, выстилающая стенки и дно таза.

955. **F. pelvis visceralis** (PNA), висцеральная фасция таза — часть f. pelvis, покрывающая органы малого таза и образующая вокруг них фасциальные футляры.

956. **F. penis** (BNA, JNA), фасция мужского полового члена — см. *F. penis profunda et superficialis.*

957. **F. penis profunda et superficialis** (PNA; f. penis, BNA, JNA), глубокая и поверхностная фасция полового члена — окружает пещеристые тела и кровеносные сосуды полового члена, заканчиваясь у крайней плоти.

958. **F. perinealis,** промежностная фасция — см. *F. diaphragmatis urogenitalis inferior.*

959. **F. perinei propria.** собственная фасция промежности — покрывает седалищно-пещеристую, луковично-пещеристую мышцы и поверхностную поперечную мышцу промежности.

960. **F. perinei profunda propria,** собственная глубокая фасция промежности — см. *F. diaphragmatis urogenitalis superior.*

961. **F. perirenalis,** вокругпочечная фасция — см. *F. renalis.*

962. **F. peritoneoperinealis** (aponeurosis peritoneoperinealis, aponeurosis Denonvilliers, f. Tyrrelli, lamina Tyrrelly), брюшинно-промежностная фасция — фасциальная перегородка в малом тазу, расположенная фронтально между прямой кишкой сзади и половыми органами и мочевым пузырем спереди (у мужчин — f. rectovesicalis, у женщин — f. rectovaginalis).

963. **F. pharyngobasilaris** (PNA, BNA; lamina pharyngobasilaris, JNA; aponeurosis pharyngis, aponeurosis pharyngobasilaris, membrana pharyngobasilaris, tunica pharyngobasilaris), глоточно-базилярная фасция — верхний утолщенный отдел фиброзной оболочки глотки; начинается от наружного основания черепа.

964. **F. pharyngobuccinatoria** (JNA), глоточно-щечная фасция — см. *F. buccopharyngea.*

965. **F. phrenicopleuralis** (PNA), диафрагмоплевральная фасция — часть f. endothoracica, покрывающая верхнюю поверхность диафрагмы под диафрагмальной плеврой.

966. **F. piriformis,** грушевидная фасция — часть f. pelvis parietalis, покрывающая грушевидную мышцу в полости малого таза.

967. **F. poplitea,** подколенная фасция — покрывает заднюю область колена; образует влагалище для подколенных сосудов и нервов, сухожильной части двуглавой мышцы бедра, полусухожильной и полуперепончатой мышц; является продолжением f. lata и книзу переходит в f. cruris.

968. **F. praevertebralis** (BNA), предпозвоночная фасция — см. *Lamina prevertebralis.*

969. **F. prerenalis,** предпочечная фасция — листок f. subperitonealis, расположенный впереди почки и участвующий в формировании ее фасциальной капсулы.

970. **F. preureterica,** предмочеточниковая фасция — является продолжением на мочеточник f. prerenalis, участвует в образовании вокруг него фасциального футляра.

971. **F. prevesicalis,** предпузырная фасция — расположена впереди мочевого пузыря на протяжении от нижней полуокружности пупка до дна таза; не достигая боковых стенок таза, заканчивается на боковых стенках мочевого пузыря.

972. **F. profunda,** глубокая фасция — общее название глубоких листков различных областей тела, образующих фасциальные влагалища для мышц или групп мышц.

973. **F. profunda plantae,** глубокая фасция подошвы — покрывает сухожилия длинного сгибателя пальцев вместе с квадратной мышцей подошвы и червеобразными мышцами, расположена в среднем фасциальном ложе между коротким и длинным сгибателем пальцев.

974. **F. propria abdominis,** собственная фасция живота — покрывает переднюю стенку влагалищ прямых мышц живота, образует фасциальные футляры для поперечной, а также наружной и внутренней косых мышц живота.

975. **F. propria recti (capsula Amussat),** собственная фасция прямой кишки — фасциальный футляр прямой кишки, являющийся частью f. pelvis visceralis; вверху прикрепляется к брюшине, внизу — к диафрагме таза.

976. **F. propria Velpeau,** собственная фасция (Вельпо) — см. *F. subperitonealis.*

977. **F. prostatae** (PNA, BNA; capsula prostatae, JNA; capsula Retzii, lig. pelvioprostaticum capsulare, capsula pelvioprostatica), предстательная фасция — часть f. pelvis visceralis, образующая капсулу предстательной железы.

978. **F. psoatica,** поясничная фасция — см. *F. psoica.*

979. **F. psoica** (JNA; psoatica), поясничная фасция — часть f. endoabdominalis, покрывающая большую поясничную мышцу.

980. **Fascia Pirogovi,** фасция Пирогова — см. *Aponeurosis m. bicipitis brachii.*

981. **F. quadrata,** квадратная фасция — часть f. endoabdominalis, покрывающая квадратную мышцу поясницы.

982. **F. rectovaginalis** (septum rectovaginale) — прямокишечно-влагалищная фасция (перегородка) — расположена в малом тазу у женщин между прямой кишкой сзади и влагалищем спереди.

983. **F. rectovesicalis** (septum rectovesicale), прямокишечно-пузырная фасция (перегородка) — расположена в малом тазу у мужчин между прямой кишкой сзади и мочевым пузырем, предстательной железой и семенными пузырьками спереди.

984. **F. renalis** (f. perirenalis, f. Gerotae), почечная фасция — часть f. subperitonealis, окружающая почку и образующая вокруг нее и жировой капсулы фасциальную, или наружную, капсулу; состоит из f. prerenalis и f. retrorenalis.

985. **Ff. retrocolicae,** позадиободочные фасции — расположены позади задней внебрюшинной стенки восходящей и нисходящей ободочной кишки.

986. **F. retropancreatica (fascia Treitzi),** позадиподжелудочная фасция — покрывает заднюю внебрюшинную поверхность поджелудочной железы.

987. **F. retroperitonealis,** забрюшинная фасция — см. *F. subperitonealis.*

988. **F. retrorenalis,** позадипочечная фасция — листок f. subperitonealis, расположенный позади почки и участвующий в формировании ее фасциальной капсулы.

989. **F. retroureterica,** позадимочеточниковая фасция — является продолжением на мочеточник f. retrorenalis, участвует в образовании вокруг него фасциального футляра.

990. **F. retrovesicalis,** позадипузырная фасция — расположена позади мочевого пузыря под брюшиной, отделяя от стенки пузыря позадипузырное клетчаточное пространство.

991. **F. serrata,** зубчатая фасция — расположена между трапециевидной, ромбовидной и широчайшей мышцей спины сзади и мышцей, выпрямляющей туловище, спереди.

992. **F. spermatica externa** (PNA), наружная семенная фасция — одна из наружных оболочек яичка и семенного канатика; является продолжением f. abdominis superficialis.

993. **F. spermatica interna** [PNA; tunica vaginalis communis (testis et funiculi spermatici), BNA; tunica vaginalis testis et funiculi spermatici, JNA], внутренняя семенная фасция — покрывает семенной канатик, яичко и придаток, является продолжением f. transversalis.

994. **F. subcutanea,** подкожная фасция — см. *F. superficialis.*

995. **F. subperitonealis** (PNA; f. propria Velpeau, f. retroperitonealis), подбрюшинная фасция — расположена в забрюшинном пространстве, начинаясь в месте перехода брюшины с боковой на заднюю стенку живота; образует фасциальную капсулу почки.

996. **F. subpubica,** подлобковая фасция — см. *F. diaphragmatis urogenitalis superior.*

997. **F. subscapularis** (BNA, JNA), подлопаточная фасция — покрывает подлопаточную мышцу, образует для нее костно-фиброзное влагалище, прикрепляясь к краям лопатки.

998. **F. superficialis** (BNA; f. subcutanea), поверхностная фасция — слой рыхлой волокнистой соединительной ткани, расположенный под кожей и подкожной жировой клетчаткой во всех областях тела.

999. **F. superficialis (cervicis)** (f. colli subcutanea), поверхностная фасция (шеи) — часть f. superficialis, расположенная в области шеи; образует влагалище для подкожной мышцы шеи.

1000. **F. superficialis perinei** (PNA, BNA), поверхностная фасция промежности — часть f. superficialis, расположенная в области промежности.

1001. **F. supra spinam** (JNA), надостная фасция — см. *F. supraspinata.*

1002. **F. supraspinata** (BNA; f. supra spinam, JNA), надостная фасция — покрывает надостную мышцу; образует для нее костно-фиброзное влагалище, прикрепляясь к краям надостной ямки лопатки.

1003. **F. temporalis** (PNA, BNA, JNA; aponeurosis temporalis), височная фасция — покрывает височную мышцу, начинаясь от верхней височной линии и прикрепляясь поверхностной и глубокой пластинками к скуловой дуге.

1004. **F. thoracica** (PNA), грудная фасция — покрывает наружные межреберные мышцы и наружную поверхность ребер.

1005. **F. thoracolumbalis** (PNA; f. lumbodorsalis, BNA, JNA; aponeurosis lumbodorsalis), пояснично-грудная фасция — состоит из двух листков: поверхностного и глубокого, образующих влагалище мышцы, выпрямляющей туловище.

1006. **F. transversa,** поперечная фасция — см. *F. transversalis.*

1007. **F. transversalis** (PNA, BNA, JNA; f. abdominis interna profunda, f. endogastrica, f. musculi transversi, f. transversa), поперечная фасция — часть f. endoabdominalis, выстилающая внутреннюю поверхность поперечной мышцы живота.

1008. **Fascia Treitzi,** фасция Трейтца — см. *F. retropancreatica.*

1009. **Tunica vaginalis communis (testis et funiculi spermatici),** общая влагалищная оболочка (яичка и семенного канатика) — см. *F. spermatica interna.*

1010. **Tunica vaginalis testis et funiculi spermatici** (JNA), влагалищная оболочка яичка и семенного канатика — см. *F. spermatica interna.*

1011. **Tunica pharyngobasilaris,** глоточно-базилярная оболочка — см. *F. pharyngobasilaris.*

1012. **F. Tyrrelli,** фасция Тиррелла — см. *F. peritoneoperinealis.*

1013. **F. umbilicalis,** пупочная фасция — участок f. transversalis, расположенный в области пупка.

1014. **Vagina bulbi** [PNA; f. bulbi (Tenoni), BNA; capsula bulbi, NLA; aponeurosis orbitoorbicularis, tenia vaginalis bulbi], влагалище глазного яблока (теноновa капсула) — плотная фиброзная пластинка, отделяющая жировое тело глазницы от глазного яблока.

1015. **F. vesicae,** пузырная фасция — часть f. pelvis visceralis, окружающая мочевой пузырь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Указатель эпонимических терминов 375
Международная система единиц (СИ) 401
Краткий очерк истории и проблем упорядочения медицинской терминологии (*М. Н. Черняевский*) 410
Словарь греко-латинских терминоэлементов (этимологический справочник) 426
Перечень лекарственных средств и лекарственного сырья . . 442

УКАЗАТЕЛЬ ЭПОНИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

1. Указатель предназначен для облегчения поиска эпонимических терминов, т. е. таких терминов, в состав которых входят фамилии конкретных лиц, напр. врача, описавшего болезнь.

2. Часть I Указателя позволяет найти в Энциклопедическом словаре медицинских терминов (ЭСМТ) любой термин, содержащий несколько фамилий, по одной из них, не стоящей на первом месте; напр., найти термин *Вагнера — Вольфа трепанация черепа* по фамилии Вольф. Все такие фамилии (в русской транскрипции) расположены в порядке русского алфавита и снабжены ссылками на эпонимические части заглавий соответствующих статей Энциклопедического словаря, напр.: **Вольф** — см. Вагнера—Вольфа...; **Феликс** — см. Вейля — Феликса..., Крейги — Иена — Феликса...

3. Часть II Указателя позволяет найти в ЭСМТ любой термин, содержащий иностранные фамилии по оригинальному написанию каждой фамилии, входящей в термин (японские и арабские фамилии переданы системой латиницы); напр., найти термин *Райта синдром* по фамилии Wright. Фамилии расположены в порядке латинского алфавита и снабжены ссылками на эпонимические части заглавий соответствующих статей ЭСМТ, напр.: **Wright** — см. Райта...; **Walker** — см. Уокера..., Денди — Уокера...

ЧАСТЬ I

Абби — см. Ферстера — Абби...
Авцын — см. Киари — Авцына...
Адамс — см. Александера — Адамса..., Гана — Адамса — Кунса...
Адамсон — см. Кроккера — Адамсона...
Адсон — см. Генри — Адсона..., Спиллера — Фрейжера — Адсона...
Айви — см. Шефера — Эмерсона — Айви...
Айгер — см. Беквина — Айгера...
Айзельсберг — см. Витцеля — Айзельсберга...
Аксенфельд — см. Моракса — Аксенфельда...
Алажуанин — см. Венсана — Алажуанина... Гийена — Алажуанина — Матье..., Фуа — Алажуанина...
Алимова — см. Доозе — Алимовой...
Аллен — см. Корнера — Аллена...
Альберс — см. Таусиг — Снеллена — Альберса...
Альтенбургер — см. Ферстера-Альтенбургера...
Альтманн — см. Шридде — Альтманна...
Альцгеймер — см. Ниссля — Альцгеймера...
Ано — см. Жильбера — Ано..., Труазье — Ано — Шоффара...
Ангелери — см. Парадизо — Грива — Ангелери — Бенедетти...
Антелава — см. Коффи — Антелавы...
Антонов — см. Каплана — Антонова...
Апельт — см. Нонне — Апельта...
Апер — см. Крука — Апера — Галле...
Ара — см. Таката — Ара...
Армстронг — см. Кинга — Армстронга...
Асеведо — см. Пуэнте — Асеведо...
Ашер — см. Сенира — Ашера...
Ашофф — см. Рокитанского — Ашоффа...
Ауэрбах — см. Гельда — Ауэрбаха...
Афанасьев — см. Пфейффера — Афанасьева...
Бабинский — см. Антона — Бабинского..., Пехкранца — Бабинского — Фрелиха...
Базен — см. Алибера — Базена...
Байер — см. Кирмиссона — Лоренца—Байера...
Бакальчук — см. Герцфельда — Бакальчука...
Бакулев — см. Бурденко — Бакулева...
Бакычаров — см. Каплана — Бакычарова...
Бальди — см. Вебстера — Бальди — Дартига...
Бальзер — см. Бенье — Бальзера...
Бальфур — см. Уиллс — Бальфура — Мак-Суини...
Бамбергер — см. Мари — Бамбергера...
Бансод — см. Лонуа — Бансода...
Барани — см. Ломбара — Барани...
Барбер — см. Бланта — Эрлахера — Биезиня — Барбера...
Бард — см. Кеннона — Барда...
Баркер — см. Монтгомери — О'Лири — Баркера...
Барр — см. Эпстайна — Барр...
Барре — см. Гийена — Барре..., Гийена — Барре — Штраля..., Эрба — Ферстера — Барре — Левенштейна...
Баррон — см. Фаллиса — Баррона...
Баррьер — см. Бюро — Баррьера...
Бассини — см. Бильрота — Бассини...
Баттен — см. Куршманна — Баттена — Штейнерта..., Шпильмейера — Фогта — Баттена..., Штейнерта — Баттена...
Баттлер — см. Олбрайта — Баттлера...
Баумгартен — см. Крювелье — Баумгартена...
Бейли — см. Кона — Бейли...
Бек — см. Бенье — Бека — Шауманна..., Кашина — Бека...
Белер — см. Фельтин — Белера...
Беллвью — см. Векслера — Беллвью...
Белт — см. Гудвина — Белта — Соррентино...
Бельский — см. Коплика — Бельского — Филатова...
Бенедетти — см. Парадизо — Грива — Ангелери — Бенедетти...
Бенедикт — см. Гарриса — Бенедикта...
Бенеке — см. Краббе — Бенеке...
Беркович — см. Грина — Берковича...
Бернгардт — см. Вюльпиана — Бернгардта..., Рота — Бернгардта...
Бенье — см. Фереоля-Бенье...
Бернет — см. Деррика — Бернета...
Бернс — см. Чапмена — Бернса...
Бертран — см. Канавана — Ван-Богарта — Бертрана...
Берцелиус — см. Марша — Либиха — Берцелиуса...
Бессей — см. Берча — Бессея — Лаури...
Беттмен — см. Никольского — Золотарева — Беттмена...
Бехтерев — см. Янишевского — Бехтерева...
Беюл — см. Простякова — Беюл...

Биезинь — см. Бланта — Эрлахера — Биезиня — Барбера...
Бильрот — см. Лангенбека — Бильрота...
Бильшовский — см. Шольца — Бильшовского..., Янского — Бильшовского...
Бинг — см. Таусси г — Бинга..., Тойнби — Бинга...
Биньями — см. Маркиафавы — Биньями...
Бир — см. Бейе — Бира...
Бирмер — см. Аддисона — Бирмера...
Бито — см. Искерского — Бито...
Блазиус — см. Дзаммитти — Блазиуса..., Дюпюитрена — Блазиуса...
Блекмен — см. Эрлангера — Блекмена...
Блекфен — см. Даймонда — Блекфена...
Блелок — см. Ханлона — Блелока...
Блер — см. Вильсона — Блера...
Блоди — см. Риза — Блоди...
Блох — см. Негели — Блоха — Ядассона..., Сименса — Блоха...
Блюм — см. Гужеро — Блюма...
Блюмберг — см. Щеткина — Блюмберга...
Блюмбергер — см. Мюллера — Блюмбергера...
Бовери — см. Мари — Бовери...
Бойд — см. Гласса — Бойда...
Боманн — см. Вальтера — Боманна...
Бонне — см. Блоха — Бонне...
Бонневи — см. Шерешевского — Тернера — Бонневи — Уллриха...
Бор — см. Вериго — Бора...
Боумен — см. Шумлянского — Боумена...
Брайцев — см. Лихтенстайна — Брайцева...
Браманн — см. Антона — Браманна...
Браун — см. Блера — Брауна..., Гаккера — Брауна..., Нигарда — Брауна..., Хайнеса — Брауна..., Хортона — Магата — Брауна...
Браунвальд — см. Глисона — Браунвальда...
Брей — см. Уэвера — Брея...
Брейер — см. Геринга — Брейера...
Бриггс — см. Белла — Дойзи — Бриггса...
Брилл — см. Ледерера — Брилла...
Бриссо — см. Шарко — Бриссо...
Брок — см. Бенье — Брока..., Вильсона — Брока...
Брокенборо — см. Браунвальда — Брокенборо...
Броун — см. Куллена — Броуна...
Брук — см. Морроу — Брука...
Брун — см. Грейвса — Бруна...
Брусин — см. Риккенберга — Брусина...
Брюгге — см. Фишера — Брюгге...
Брюкке — см. Бецольда — Брюкке...
Буйо — см. Сокольского — Буйо...
Буннелль — см. Пауля — Буннелля.., Ханганущу — Дайхера — Пауля — Буннелля...
Бурденко — см. Брюнинга — Бурденко...
Буриан — см. Аллена — Буриана...
Бурхард — см. Либермана — Бурхарда...
Буцци — см. Швеннингера — Буцци...
Буш — см. Марки — Буша...
Бушке — см. Буссе — Бушке...
Бьерк — см. Марри — Сендергарда — Бьерка...
Бьюси — см. Адсона — Бьюси...
Бюрнье — см. Гужеро — Бюрнье...
Бюшельбергер — см. Молла — Бюшельбергера...

Вайнтрауб — см. Рапопорт — Вайнтрауба...
Вакез (Ваке) — см. Бабинского — Вакеза...
Валленберг — см. Климова — Валленберга..., Эдингера — Валленберга...
Вальдейер — см. Пирогова — Вальдейера..., Фарра — Вальдейера...
Вальдони — см. Квиероло — Вальдони — Клатуорти...
Вальтер — см. Гийена — Сеза — Де Блондена — Вальтера...
Ван-Богарт — см. Канавана — Ван-Богарта — Бертрана..., Ферраро — Ван-Богарта — Ниссена..., Шольца — Ван-Богарта...
Ван-Кревельд — см. Гирке — Ван-Кревельда..., Эллиса — Ван-Кревельда...
Варденбург — см. Клейна — Варденбурга...
Вардроп — см. Браздора — Вардропа...
Варнье — см. Фарабефа — Варнье...
Василиу — см. Маринеску — Драгането — Василиу...
Вахтель — см. Катца — Вахтеля...
Вашакидзе — см. Чачава — Вашакидзе...
Вебер — см. Бугера — Вебера..., Пфейфера — Вебера — Крисчена..., Рандю — Вебера — Ослера..., Стерджа — Вебера..., Стерджа — Вебера — Краббе...
Вегелин — см. Фромана — Вегелина...
Вейлль — см. Лери — Вейлля...
Вейль — см. Бабинского — Вейля..., Васильева — Вейля..., Клиппеля — Вейля...
Вейнберг — см. Харди — Вейнберга...
Вейон — см. Виньяля — Вейона...
Вейсс — см. Маллори — Вейсса...
Вейссенбах — см. Тибьержа — Вейссенбаха...
Вексберг — см. Нейссера — Вексберга...
Веландер — см. Кугельберга — Веландера...
Велла — см. Тири — Веллы...
Вельти — см. Лиана — Сигье — Вельти...
Венгловский — см. Кюттнера — Венгловского..., Ламбера — Венгловского...
Венкебах — см. Ахелиса — Венкебаха...
Венсан — см. Плаута — Венсана...
Верней — см. Кюммелля — Вернея...
Вернер — см. Вертера — Вернера — Дюмлинга...
Вернике — см. Гайе — Вернике..., Пика — Вернике..., Посады — Вернике...
Вертгейм — см. Александрова — Шауты — Вертгейма...
Вестфаль — см. Лейдена — Вестфаля..., Эдингера — Вестфаля...
Ветцель — см. Кункеля — Ветцеля...
Вианна — см. Арагана — Вианны...
Видаль — см. Гайема — Видаля...
Вилл — см. Греппи — Вилла...
Вильмс — см. Спасокукоцкого — Вильмса...
Вильсон — см. Вестфаля — Вильсона — Коновалова...
Винар — см. Лермитта — Монье — Винара — Тсокапакиса...
Виноградов — см. Ларденуа — Виноградова...
Виноградова — см. Гремберга — Виноградовой...
Винокуров — см. Розенберга — Винокурова — Лендорффа...
Винсон — см. Пламмера — Винсона...
Вирхов — см. Гирке — Вирхова...

Вите — см. Урбаха — Вите...
Витебский — см. Закса — Витебского...
Виттек — см. Брунна — Виттека...
Вишневский — см. Дольотти — Вишневского..., Подреза — Вишневского...
Волкович — см. Мак-Бернея — Волковича — Дьяконова..., Фриша — Волковича...
Вольнер — см. Ловрика — Вольнера...
Вольф — см. Вагнера — Вольфа..., Яценко — Вольфа — Краузе...
Вольфф — см. Ферворта — Вольффа..
Вольфф-Эйснер — см. Кальметта — Вольфф-Эйснера...
Воренже — см. Потрие — Воренже...
Воронович — см. Юсупова — Вороновича...
Вреден — см. Венда — Вредена..., Оллье — Мерфи — Лексера — Вредена..., Пирогова — Вредена...
Вуд — см. Нормана — Вуда...
Вудлонган — см. Масса — Вудлонгана...
Вульпиус — см. Приоло — Вульпиуса...
Вундерли — см. Вурманна — Вундерли...
Вюльпиан — см. Шарко — Вюльпиана...
Габерманн — см. Гоффманна — Габерманна..., Мухи — Габерманна...
Гайем — см. Якша — Гайема...
Гаккер — см. Бека — Хаккера..., Яценко — Гаккера...
Галасси — см. Гиффорда — Галасси...
Галл — см. Аддисона — Галла...
Галле — см. Апера — Галле..., Крука — Апера — Галле...
Гальперн — см. Жиану — Гальперна...
Гамна — см. Ганди — Гамны...
Гарбе — см. Сульцбергера — Гарбе...
Гарленд — см. Бланда — Уайта — Гарленда..., Маринеску — Шегрена — Гарленда...
Гартманн — см. Геркгеймера — Гартманна...
Гаусс — см. Губарева — Гаусса..., Иванова — Гаусса..., Уиллетта — Иванова — Гаусса...
Гауэр — см. Генри — Гауэра...
Гейбнер — см. Ги — Гертера — Гейбнера...
Гейденгайн — см. Бионди — Гейденгайна..., Бионди — Эрлиха — Гейденгайна..., Вюльпиана — Гейденгайна...
Гейер — см. Гаккебуша — Гейера — Геймановича...
Геймановч — см. Гаккебуша — Гейера — Геймановича...
Геккель — см. Мюллера — Геккеля...
Геллер — см. Деле — Геллера...
Геллерстедт — см. Целена — Геллерстедта...
Генле — см. Микулича — Генле...
Геннеберг — см. Левенфельда — Геннеберга...
Генох — см. Шенлейна — Геноха...
Генцлер — см. Куссмауля — Генцлера...
Георги — см. Закса — Георги...
Герен — см. Кальметта — Герена...
Геринг — см. Траубе — Геринга...
Герман — см. Ашнера — Германа...
Германн — см. Холстеда — Германна...
Герме — см. Бамбергера — Герме..
Гертель — см. Брауна — Гертеля..., Шмидена — Гертеля...
Гертер — см. Гейбнер-гертеровская..., Ги — Гертера — Гейбнера...
Герцен — см. Китли — Торека — Герцена..., Торека — Герцена...
Гефтер — см. Васильковой — Гефтер...

Гзелль — см. Буше — Гзелля...
Гиббон — см. Лендиса — Гиббона...
Гийен — см. Мари — Гийена...
Гинецинский — см. Орбели — Гинецинского...
Гис — см. Вернера — Гиса...
Гиссельбрехт — см. Турена — Гиссельбрехта...
Глезер — см. Шлапоберского — Глезера...
Глинский — см. Симмондса — Глинского...
Годелье — см. Говорова — Годелье...
Гой — см. Вейнберга — Гоя...
Голе — см. Турена — Соланта — Голе...
Гольдфлам — см. Вестфаля — Гольдфлама..., Эрба — Гольдфлама...
Гопкинс — см. Адамкевича — Гопкинса — Коля...
Горнер — см. Бернара — Горнера...
Горчаков — см. Арди — Горчакова...
Госсель — см. Грассе — Госселя — Гувера...
Гоффманн — см. Верднига — Гоффманна..., Шарко — Мари — Тута Гоффманна...
Гохт — см. Фелпса — Гохта...
Гочеридзе — см. Ищенко — Гочеридзе...
Грацианский — см. Лендорффа — Грацианского...
Грегуар — см. Шевассю — Грегуара...
Греппи — см. Риетти — Греппи — Микели...
Грефе — см. Вальдау — Грефе...
Грефф — см. Гаскелла — Греффа...
Грива — см. Парадизо — Грива — Ангелери — Бенедетти...
Гринфельт — см. Лесгафта — Гринфельта...
Гринфилд — см. Шольца — Гринфилда...
Гринчак — см. Харриса — Гринчака...
Грос — см. Бильшовского — Грос..., Бильшовского — Грос — Лаврентьева...
Гросс — см. Фульда — Гросса — Михаэлиса...
Гроф — см. Ендрашика — Клегхорна — Грофа...
Груздев — см. Габасту — Мойона — Груздева...
Грютц — см. Бюргера — Грютца...
Губарев — см. Клаудиуса — Губарева — Соловова...
Гужеро — см. Каравена — Гужеро...
Гумпрехт — см. Боткина — Гумпрехта...
Гунн — см. Рельмана — Гунна — Салюса..., Салюса — Гунна...
Гунтер — см. Гурлер — Пфаундлера — Гунтера...
Гупта — см. Чопры — Гупты...
Гурлер — см. Пфаундлера — Гурлер..., Пфаундлера — Гурлер — Эллиса...
Гюблер — см. Вебера — Гюблера — Жандрена...
Гюйон — см. Альбаррана — Гюйона...
Давыдовский — см. Попова — Давыдовского...
Дайк — см. Элсберга — Дайка...
Дайхер — см. Ханганциу — Дайхера — Пауля — Буннелля...
Дамешек — см. Эстрена — Дамешека...
Данлос — см. Элерса — Данлоса...
Данс — см. Шиманса — Данса...
Дартиг — см. Вебстера — Бальди — Дартига...
Дарье — см. Аллопо — Лередда — Дарье...
Даунер — см. Апта — Даунера...
Де Блонден — см. Гийена — Сеза — Де Блондена — Вальтера...
Де Верд — см. Калпа — Де Верда...
Дедрик — см. Берри — Дедрика...
Дежерин — см. Ландузи — Дежерина...
Дезуалль — см. Вилларе — Дезуалля...
Дей — см. Райли — Дея...
Дейвис — см. Яновича-Чаинского — Дейвиса...
Дейкин — см. Карреля — Дейкина...
Дейл — см. Шультца — Дейла...
Де ла Камп — см. Кораньи — де ла Кампа...
Делор — см. Дегоса — Делора — Трико...
Делорм — см. Рена — Делорма...
Дельбе — см. Олби — Дельбе...
Дель Кастильо — см. Аргонса — дель Кастильо...
Денди — см. Гильдебранда — Денди...
Деникер — см. Делея — Деникера...
Деньи — см. Лемоса — Торреса — Деньи...
Депери — см. Баумапна — Депери...
Депон — см. Портманна — Депона...
Деринг — см. Петте — Деринга...
Джакобини — см. Паолуччи — Джакобини...
Джанелидзе — см. Остен-Сакена — Джанелидзе...
Джанотти — см. Кросги — Джанотти...
Джексон — см. Браве — Джексона..., Вурфбайна — Джексона..., Моулема — Джексона...
Джонс — см. Киселя — Джонса — Нестерова..., Коппена — Джонса...
Джонсон — см. Дубина — Джонсона..., Стивенса — Джонсона...
Дзунин — см. Дуранда — Дзунина...
Дивансо — см. Дельбанко — Дивансо...

Диври — см. Ван-Богарта — Диври...
Димитри — см. Вебера — Димитри...
Дитрих — см. Смита — Дитриха...
Дойзи — см. Белла — Дойзи — Бригса...
Долери — см. Джильяма — Долери...
Долинин — см. Алесковского — Долинина...
Дольотти — см. Лонгмайера — Дольотти...
Донецкий — см. Вишневского — Донецкого...
Донован — см. Лейшмана — Донована...

Драганеску — см. Маринеску — Драганеску — Василиу...
Драммонд — см. Тальмы — Драммонда...
Дрейджер — см. Шая — Дрейджера...
Дроке — см. Перона — Дроке — Кулона...
Дуглас — см. Биггс — Дугласа — Макфарлена...
Дьюкс — см. Филатова — Дьюкса...
Дьяконов — см. Мак-Бернея — Волковича — Дьяконова..., Старкова — Дьяконова...
Дюбо — см. Миддлбрука — Дюбо...
Дюбоск — см. Буэна — Дюбоска — Бразиля...
Дюбрей — см. Брока-Дюбрея...
Дюкрей — см. Петерсена — Дюкрея...
Дюмлинг — см. Вертера — Вернера — Дюмлинга...
Дюперра — см. Гужеро — Дюперра...
Дюрант — см. Порака — Дюранта...
Дюре — см. Козинса — Дюре...
Дюшенн — см. Арана — Дюшенна...
Егерс — см. Пейтца — Егерса..., Пейтца — Турена — Егерса...
Ефуни — см. Петровского — Ефуни...
Жабуле — см. Бриана — Жабуле...
Жаке — см. Севестра — Жаке...
Жангу — см. Борде — Жангу...
Жаннель — см. Нелатона — Жанпеля — Рокицкого...
Жирар — см. Готтштейна — Жирара...
Жиро — см. Пейана — Жиро...
Жоров — см. Герша — Жорова...
Жюманти — см. Тома — Жюманти...
Жюне — см. Труэлля — Жюне...
Зак — см. Златкиса — Зака...
Заттлер — см. Нидена — Заттлера...
Зауэрбрух — см. Крюкова — Зауэрбруха...
Захарченко — см. Валленберга — Захарченко...
Зацепин — см. Гудушаури — Зацепина...
Зданский — см. Шерфа — Зданского...
Здродовский — см. Маккиавелло — Здродовского...
Зеленовский — см. Беллярминова — Зеленовского...
Зибер — см. Ненцкого — Зибера...
Зигемундин — см. Смелли — Зигемундин...
Зик — см. Жирара — Зика...
Зикерт — см. Милликена — Зикерта...
Зильбер — см. Карра — Зильбера...
Золле — см. Фольгера — Золле...
Золотарев — см. Никольского — Золотарева — Беттмена...
Зубкова — см. Баха — Зубковой...
Зульцер — см. Брока — Зульцера...
Ибрагим — см. Бека — Ибрагима...
Игнатовская — см. Карлсона — Игнатовской...
Игуменакис — см. Авситидийского — Игуменакиса...
Иен — см. Крейги — Иена — Феликса...
Излен — см. Беста — Излена...
Израэль — см. Бергманна — Израэля...
Иллеман — см. Фуа — Иллемана..., Фуа — Шавани — Иллемана...
Иосида — см. Мурахаси — Иосиды...
Ирганг — см. Капоши — Ирганга...
Исаченко — см. Даниша — Исаченко...
Иценко — см. Ворсаба — Иценко...
Йенсен — см. Левенштейна — Йенсена..., Хагедорна — Йенсена...
Йорес — см. Пика — Йореса...
Казанский — см. Кондорелли — Казанского...
Каккьоне — см. Де Санктиса — Каккьоне...

Калер — см. Рустицкого — Калера...
Кальве — см. Легга — Кальве — Пертеса...
Кальк — см. Кача — Калька...
Кальфа — см. Филатова — Кальфы...
Канада — см. Кронкхайта — Канада...
Каньядель — см. Вилановы — Каньяделя...
Капетанакис — см. Дукаса — Капетанакиса...
Каплан — см. Гибсона — Каплана...
Капоши — см. Гебры — Капоши...
Каппс — см. Вотчала — Каппса...
Караваев — см. Пирогова — Караваева...
Кардарелли — см. Оливера — Кардарелли...
Кардос — см. Паппенгейма — Кардоса...

Каррер — см. Гассера — Каррера...
Карто — см. Гужеро — Карто...
Каст — см. Оллье — Каста...

Каттан — см. Сигаля — Каттана — Маму...
Кауфманн — см. Абдергальдена — Кауфманна — Линьяка...
Кафка — см. Якобсталя — Кафки...
Кей — см. Брукса — Хадсона — Кея...
Келли — см. Патерсона — Келли...
Кемпбелл — см. Лобитца — Кемпбелла..., Олдрича — Стайнберга — Кемпбелла...
Кениг — см. Лангенбека — Кенига...
Керби — см. Джонсона — Керби...
Киари — см. Арнольда — Киари..., Бадда — Киари..., Яриша — Киари...
Кизер — см. Тернера — Кизера...
Кинг — см. Ягера — Кинга...
Китахара — см. Масуды — Китахары...
Клатуортн — см. Квиероло — Вальдони — Клатуортн...
Клегхорн — см. Ендрашика — Клегхорна...
Клежа — см. Петжа — Клежа...
Клейн — см. Магнуса — Клейна...
Клейншмидт — см. Черни — Клейншмидта...
Клерамбо — см. Кандинского — Клерамбо...
Клерк — см. Вейля — Клерка...
Клосс — см. Дамбольта — Клосса...
Кнапп — см. Пассова — Кнаппа...
Кнолль — см. Грэма — Кнолля...
Коккейн — см. Вебера — Коккейна...
Колен — см. Рославцева — Колен...
Колле — см. Верне — Сикара — Колле...

Коллен — см. Мейо — Симпсона — Коллена...
Колли — см. Уолтерса — Мерина — Мак-Киннома — Колли...
Коль — см. Адамкевича — Гопкинса — Коля...
Колюбакин — см. Венгловского — Колюбакина...
Комая — см. Дохи — Комая..., Мацумото — Комая — Тоямы...
Конн — см. Фаянса — Конна...
Коннорс — см. Вишневского — Коннорса...
Коновалов — см. Вильсона — Коновалова...
Конрад — см. Берса — Конрада...
Конради — см. Дригальского — Конради...
Копецкий — см. Альмура — Копецкого...

Корзун — см. Вегнера — Корзуна...
Кори — см. Полинга — Кори...
Корнет — см. Коха — Корнета...
Корнцвейг — см. Бессена — Корнцвейга...
Коскинас — см. Экономо — Коскинаса...
Коуз — см. Прасада — Коуза...
Коул — см. Цинссера — Коула — Энгмена..., Энгмена — Коула...
Кохер — см. Вебера — Кохера...
Кочергин — см. Спасокукоцкого — Кочергина...
Коянаги — см. Фогта — Коянаги..., Фогта — Коянаги — Харады...
Крайл — см. Сомма — Крайла...
Крамер — см. Бурденко — Крамера..., Зелигмана — Крамера...
Краузе — см. Хартли — Краузе..., Яценко — Вольфа — Краузе...
Крейсиг (Крайзиг) — см. Хейма — Крейсига...
Крепи — см. Рауля — Крепи...
Крестовский — см. Богораза — Крестовского...
Крик — см. Уотсона — Крика...
Кристеско — см. Клерка — Леви — Кристеско...
Крисчен — см. Вебера — Крисчена..., Пфейфера — Вебера — Крисчена...
Крон — см. Монрада — Крона...
Кроуфорд — см. Стайлса — Кроуфорда...
Крузон — см. Ашара — Фуа — Крузона...
Кудо — см. Нисимото — Такеути — Кудо...
Куковеров — см. Сиротинина — Куковерова...
Кулон — см. Перона — Дроке — Кулона...
Кунс — см. Гана — Адамса — Кунса...
Купфер — см. Бровича — Купфера...
Куртис — см. Крапфа — Куртиса...
Курцин — см. Быкова — Курцина...
Куссмауль — см. Гризингера — Куссмауля...
Кушинг — см. Нейрата — Кушинга...
Кюммель — см. Зеренина — Кюммеля..., Микулича — Кюммеля...
Кюртий — см. Бара — Кюртия...
Кюстнер — см. Прауснитца — Кюстнера...
Лаврентьев — см. Бильшовского — Грос — Лаврентьева...
Лайон — см. Мельтцера — Лайона..., Соколова — Лайона...
Лами — см. Во — Лами..., Марото — Лами...
Ланге — см. Джеймса — Ланге...
Лангенбек — см. Эсмарха — Лангенбека...
Ланге-Нилсен — см. Джеруэлла — Ланге-Нилсена...
Ландштейнер — см. Доната — Ландштейнера...
Лантерманн — см. Шмидта — Лантерманна...
Лара — см. Барракер-Бордаса — Руиса — Лара...
Ларссон — см. Шегрена — Ларссона...
Ласк — см. Якобсона — Ласка...
Ласков — см. Паутова — Ласкова...
Лассюэр — см. Литтла — Лассюэра..., Пиккарди — Лассюэра — Литтла...
Лаури — см. Берча — Бессея — Лаури...
Левандовский — см. Ядассона — Левандовского...
Левен — см. Бюдингера — Лудлоффа — Левена...
Левенберг — см. Абеля — Левенберга...
Левенталь — см. Штейна — Левенталя...
Левенштейн — см. Эрба — Ферстера — Барре — Левенштейна...
Леви — см. Клерка — Леви — Кристеско..., Лорена — Леви...
Левин — см. Клейне — Левина...
Левинсон — см. Франка — Левинсона...
Левре — см. Морисо — Левре...
Лееде — см. Кончаловского — Румпеля — Лееде..., Румпеля — Лееде...
Лейден — см. Вестфаля — Лейдена..., Шарко — Лейдена...
Лейдлер — см. Хофбауэра — Лейдлера...
Лейнер — см. Лендорффа — Лейнера...
Лейхтенштерн — см. Штрюмпелля — Лейхтенштерна...
Лексер — см. Боброва — Лексера..., Кохера — Лексера..., Мерфи — Лексера..., Оллье — Мерфи — Лексера — Вредена...
Леманн — см. Берьесона — Форссмана — Леманна...
Лен — см. Оберста — Лена — Хаусса...
Лендорфф — см. Розенберга — Винокурова — Лендорффа...
Леневич — см. Гаккера — Леневича...
Леонарди — см. Маграсси — Леонарди...

Лербулле — см. Жильбера — Лербулле...
Леред — см. Аллоно — Леред — Дарье...
Лери — см. Мари — Лери..., Роша — Лери...
Лериш — см. Рейно — Лериша..., Шоффара — Лериша...
Лермитт — см. Лежонна — Лермитта..., Матцдорфа — Лермитта..., Русси — Лермитта — Шельвена...
Либер — см. Гийена — Либера...
Либих — см. Марша — Либиха — Берцелиуса...
Либман — см. Капоши — Либмана — Сакса..., Лукина — Либмана...
Лидбеттер — см. Политано — Лидбеттера...
Линберг — см. Тихова — Линберга..., Тихова — Линберга — Махсона...
Линдау — см. Гиппеля — Линдау...
Линдеманн — см. Зенгера — Линдеманна...
Линднер — см. Гвиста — Линднера...
Линьяк — см. Абдергальдена — Кауфманна — Линьяка...
Липшютц — см. Афцелиуса — Липшютца..., Чапина — Липшютца...
Листер — см. Пирогова — Пастера — Листера...
Лихтгейм — см. Дежерина — Лихтгейма...
Лихтенберг — см. Герцена — Лихтенберга...
Лихтенстайн — см. Яффе — Лихтенстайна...
Локк — см. Рингера — Локка...
Ломбар — см. Тато — Ломбара...
Лоранд — см. Лаки — Лоранда...
Лорд — см. Блейкмора — Лорда...
Лоренц — см. Гоффы — Лоренца..., Кирмиссона — Лоренца — Байера..., Пачи — Лоренца...
Лорт-Жакоб — см. Дегоса — Лорта-Жакоба...
Лортиуар — см. Оппеля — Лортиуара...
Лудлофф — см. Бюдингера — Лудлоффа — Левена...
Лукашевич — см. Геркгеймера — Яриша — Лукашевича...
Лукомский — см. Рассказова — Лукомского — Пальтауфа...
Лысенков — см. Шало — Лысенкова...
Льеу — см. Барре — Льеу...
Люк — см. Колдуэлла — Люка...
Люри — см. Левенталя — Люри...
Лютц — см. Альмейды — Лютца — Сплендоре..., Жансельма — Лютца..., Левандовского — Лютца...
Магат — см. Манна — Магата..., Хортона — Магата — Брауна...
Маделунг — см. Бабкока — Маделунга..., Шинцингера — Маделунга...
Мадленер — см. Келлинга — Мадленера...
Мадсен — см. Арренниуса — Мадсена...

Мажанди — см. Белла — Мажанди..., Гертвига — Мажанди...
Мажито — см. Байяра — Мажито..., Робена — Мажито...
Майер — см. Бизальского — Майера...
Макаи — см. Ротманна — Макаи...
Макаров — см. Панова — Макарова...

Мак-Карти — см. Членова — Мак-Карти...
Мак-Кинном — см. Уолтерса — Мерша — Мак-Киннома — Колли...
Мак-Кьюн — см. Олбрайта — Мак-Кьюна — Штернберга...
Максимов — см. Нохта — Максимова...
Мак-Суини — см. Уиллс — Бальфура — Мак-Суини...
Мак-Уортер — см. Буяльского — Мак-Уортера...
Макфарлен — см. Биггс — Дугласа — Макфарлена...
Мальбин — см. Штернгеймера — Мальбина...
Маляревская — см. Кульберга — Маляревской...
Маму — см. Сигаля — Каттана — Маму...
Манн — см. Вернике — Манна..., Гуревича — Манна...
Мари — см. Бамбергера — Мари..., Бехтерева — Мари — Фуа..., Бехтерева — Штрюмпелля — Мари..., Бриссо — Мари..., Парро — Мари..., Шарко — Мари..., Шарко — Мари — Тута..., Шарко — Мари — Тута — Гоффманна..., Шейтхауэра — Мари — Сентона...
Марион — см. Хоходки — Марион...
Маркелов — см. Вермеля — Маркелова...
Маркиафава — см. Штрюбинга — Маркиафавы...
Мартынов — см. Жирара — Мартынова..., Микулича — Мартынова...
Марцинковский — см. Филатова — Марцинковского...
Марчетти — см. Маршалла — Марчетти...
Массон — см. Барре — Массона...
Массуми — см. Принцметала — Массуми...
Матье — см. Гийена — Алажуанина — Матье...
Мау — см. Шейерманна — Мау...
Махсон — см. Зацепина — Махсона..., Тихова — Линберга — Махсона...
Медин — см. Гейне — Медина...
Мейер — см. Вейгерта — Мейера..., Куссмауля — Мейера..., Нелсона — Мейера...
Мейо — см. Вредена — Мейо..., Коффи — Мейо...
Мейссль — см. Рейхерта — Мейссля...
Менетрие — см. Бальзера — Менетрие...
Меррит — см. Казабаха — Меррит...
Мерфи — см. Оллье — Мерфи — Лексера — Вредена...
Мерцбахера — см. Пелицеуса — Мерцбахера...
Мерш — см. Уолтерса — Мерша — Мак-Киннома — Колли...
Мещерский — см. Бенье — Мещерского...
Мёбиус — см. Лейдена — Мёбиуса...
Микели — см. Маркиафавы — Микели..., Риетти — Греппи — Микели...
Микити — см. Вильсона — Микити...
Микулич — см. Бира — Микулича..., Владимирова — Микулича..., Дифенбаха — Микулича...
Милославский — см. Дректера — Милославского...
Миль — см. Ван-Богарта — Миля...
Миньон — см. Делорма — Миньона...
Мироненко — см. Гейнрихсдорфа — Мироненко...
Митчелл — см. Пирогова — Митчелла...
Михаэлис — см. Фульда — Гросса — Михаэлиса...
Мишер — см. Лютца — Мишера...
Модельский — см. Михаловского — Модельского...
Мозенталь — см. Джейнуэя — Мозенталя...
Мойон — см. Габасту — Мойона — Груздева...
Молен де Тейсье — см. Лери — Молен де Тейсье...
Монье — см. Лермитта — Монье — Винара — Тсоканакиса...
Моракс — см. Эссера — Моракса...
Морель — см. Грембера — Мореля..., Морганьи — Стюарта — Мореля...
Морестен — см. Барденгейера — Морестена...
Мори — см. Харады — Мори...
Мориак — см. Сезари — Мориака...
Мортон — см. Моргана — Мортона — Паркера...
Мохов — см. Шинкаренко — Мохова...
Муи — см. Лоренса — Муна — Барде — Бидля...
Муссу — см. Лейпера — Муссу...
Мыш — см. Рейна — Мыша...
Мьюэр — см. Беккера — Мьюэра...
Мюллер — см. Виса — Мюллера..., Гофмейера — Мюллера..., Кенига — Мюллера..., Ренандера — Мюллера...
Мюре — см. Кеню — Мюре...
Мюссе — см. Дальзаса — Неттера — Мюссе...
Мюсси — см. Георгиевского — Мюсси...
Нажотт — см. Бабинского — Нажотта...
Найлен — см. Розе — Найлена...
Найхан — см. Леша — Найхана...
Найяр — см. Криглера — Найяра...
Накамура — см. Мидзуо — Накамуры...
Негели — см. Гланцманна — Негели...
Негри — см. Жако — Негри...
Нейгебауэр — см. Лефора — Нейгебауэра...
Нейманн — см. Биццоцеро — Нейманна..., Видманна — Нейманна..., Руже — нейманновская (ое)...
Нельсен — см. Циля — Нельсена...
Нестеров — см. Киселя — Джонса — Нестерова...
Нетгер — см. Дальзаса — Неттера — Мюссе...
Николадони — см. Микулича — Николадони...
Ниссен — см. Ферраро — Ван-Богарта — Ниссена...
Новгородская — см. Бойда — Новгородской...
Нонне — см. Фруэна — Нонне...
Оберст — см. Лукашевича — Оберста...
Обино — см. Лепобля — Обино...
Овертон — см. Мейера — Овертона...
Оганесян — см. Волкова — Оганесяна...
Огден — см. Цюльцера — Огдена...
Огнев — см. Лейфера — Огнева...
Озе — см. Ван-Богарта — Озе...
О'Кейн — см. Медилла — О'Кейна...
О'Коннор — см. Гуммельсгейма — О'Коннора...
Олбрайт — см. Клайнфелтера — Рейфенштейна — Олбрайта..., Лайтвуда — Олбрайта..., Мартина — Олбрайта..., Форбса — Олбрайта...
Олива — см. Макарини — Оливы...
О'Лири — см. Монтгомери — О'Лири — Баркера...
Оллендорфф — см. Бушке — Оллендорфф...
Оллье — см. Бильрота — Оллье — Старкова..., Ревердена — Яновича-Чаинского — Оллье...
Ольмер — см. Кардуччи — Ольмера...
Ольсен — см. Альстрема — Ольсена...
Ольшевский — см. Стила — Ричардсона — Ольшевского...
Оппенгейм — см. Урбаха — Оппенгейма...
Опплер — см. Боаса — Опплера...
Орам — см. Холта — Орама...
Оратор — см. Неймюллера — Оратора...
Ослер — см. Вакеза — Ослера...
Пайр — см. Кондолеона — Пайра...
Паль — см. Вейгерта — Паля...
Пальтауф — см. Рассказова — Лукомского — Пальтауфа..., Риля — Пальтауфа...
Панас — см. Мальгеня — Панаса...
Папакостас... — см. Гате — Папакостаса...
Папп — см. Паркинсона — Паппа...
Паппенгейм — см. Унны — Паппенгейма...
Парам — см. Путти — Парама...
Паркер — см. Моргана — Мортона — Паркера...
Паркинсон — см. Вольффа — Паркинсона — Уайта...
Пастер — см. Пирогова — Пастера — Листера...
Пасто — см. Гюйона — Пасто...
Патнем — см. Гринфилда — Патнема...
Патон — см. Говерса — Патона — Кеннеди...
Патч — см. Дельбе — Патча...
Пачини — см. Фатера — Пачини...
Пауэр — см. Кеплера — Пауэра — Робинсона...
Пенский — см. Кузнецова — Пенского...
Пенфилд — см. Коупа — Пенфилда...
Пертес — см. Дельбе — Пертеса...
Петерсен — см. Гаккера — Петерсена...
Пецци — см. Лобри — Пецци...
Пивоваров — см. Абалихина — Пивоварова...
Пик — см. Любарша — Пика..., Нимanна — Пика...
Пикколи — см. Кюстнера — Пикколи...
Пинго — см. Аллена — Хейуэрда — Пинто...
Пиньоль Агваде — см. Вилановы — Пиньоля Агваде...
Пирке — см. Шмелева — Пирке...
Пирогов — см. Гейне — Пирогова...
Пирс — см. Брауна — Пирс...
Пирсон — см. Кункеля — Пирсона — Швейгерта..., Мак-Ардла — Шмида — Пирсона...
Питтс — см. Мак-Каллока — Питтса...
Плато — см. Тальбота — Плато...
Плаут — см. Симановского — Плаута — Венсана...
Покровский — см. Лагранжа — Покровского...
Поленов — см. Тихоновича — Поленова...
Полиа — см. Рейхеля — Полиа...
Поликарпов — см. Оппеля — Поликарпова...
Поллак — см. Нейссера — Поллака...
Полланд — см. Матценауэра — Полланда...
Поллитцер — см. Унны — Санти — Поллитцера...
Порро — см. Рейна — Порро...
Портер — см. Силбера — Портера...
Посадас — см. Торитона — Боброва — Посадаса...

Потемкина — см. Паолуччи — Потемкиной...
Потрие — см. Брока — Потрие...
Приер — см. Сабуро — Приера — Тренеля...
Прингл — см. Бурневилля — Прингла...
Проскауэр — см. Фогеса — Проскауэра...
Псом — см. Папийон — Леаж — Псома...
Пугачев — см. Долецкого — Пугачева...
Путти — см. Саутера — Путти...
Пфаундлер — см. Гурлер — Пфаундлера — Гунтера..., Лушки — Пфаундлера...
Пфейффер — см. Исаева — Пфейффера...
Пытель — см. Квика — Пытеля...
Пьерини — см. Пазини — Пьерини...
Равинский — см. Маркелова — Равинского...
Радович — см. Маринеску — Радовича...
Раздольский — см. Денди — Раздольского...
Ракушо — см. Фавра — Ракушо...
Рамштедт — см. Фреде — Рамштедта...
Ранке — см. Бремзера — Ранке...
Рапопорт — см. Говарда — Рапопорта..., Григорьева — Рапопорта...
Раппорт — см. Готтфрида — Раппорта...
Раухфус — см. Грокко — Раухфуса...
Рачинский — см. Губарева — Рачинского...
Регала — см. Странского — Регалы...
Редекер — см. Ассманна — Редекера...
Рей — см. Вейлля — Рея — Эйди...
Рейман — см. Адлера — Реймана...
Рейн — см. Уаза — Рейна...
Рейсбек — см. Томпсона — Рейсбека...
Рейтер — см. Беккера — Рейтера...
Рейфенштейн — см. Клайнфелтера — Рейфенштейна — Олбрайта...
Реклингхаузен — см. Энгеля — Реклингхаузена...
Рельман — см. Адамюка — Рельмана — Гвиста...
Рембез — см. Николаева — Рембеза...
Ремленже — см. Годелье — Ремленже...
Рендл — см. Ричарда — Рендла...
Риве — см. Шоффара — Риве...
Ригель — см. Лейбе — Ригеля...
Риддох — см. Геда — Риддоха...
Ридер — см. Лотейссена — Ридера...
Риз — см. Краузе — Риза...
Риккетс — см. Сенна — Риккетса...
Риникер — см. Гланцманна — Риникера...
Рич — см. Хаммена — Рича...
Ричардсон — см. Стила — Ричардсона — Ольшевского...
Роббинс — см. Картер — Роббинса...
Робен — см. Вирхова — Робена...
Робертс — см. Брандберга — Робертса — Стольникова...
Робино — см. Вейзенбурга — Сикара — Робино..., Сикара — Робино...
Робинсон — см. Кеплера — Пауэра — Робинсона...
Ровсинг — см. Мартынова — Ровсинга...
Рогозин — см. Минкевича — Рогозина...
Роже — см. Ширея — Роже...
Розенмюллер — см. Пирогова — Розенмюллера...
Розенталь — см. Мелькерссона — Розенталя...
Рокицкий — см. Нелатона — Жаннеля — Рокицкого...
Ромберг — см. Гаушипа — Ромберга..., Парри — Ромберга...
Росс — см. Гаска — Росса...
Рот — см. Эрба — Рота...
Роу — см. Кейва — Роу...
Роуз — см. Волера — Роуза...
Ру — см. Гуаффона — Ру..., Пеана — Ру..., Тома — Ру...
Рудо — см. Пастера — Рудо...
Руис — см. Барракер-Бордаса — Руиса — Лара...
Рунге — см. Баллентайна — Рунге...
Русси — см. Дарье — Русси..., Дежерина Русси...
Рысс — см. Петровой — Рысса...
Саббароу — см. Рейна — Саббароу..., Фиска — Саббароу...
Сабурова — см. Гудушаури — Сабуровой...
Сакс — см. Капоши — Либмана — Сакса..., Либмана — Сакса..., Тея — Сакса...
Сальковский — см. Гупперта — Сальковского...
Саммерсон — см. Баркера — Саммерсона...
Самойлов — см. Бьеррума — Самойлова..., Дашевского — Самойлова...
Сансон — см. Пуркинье — Сансона...
Санти — см. Унны — Санти — Поллитцера...
Саттон — см. Фордайса — Саттона...
Сафар — см. Веве — Сафара...
Свифт — см. Зельтера — Свифта — Феера...
Сегура — см. Гирша — Сегуры...
Сез — см. Гийена — Сеза — Де Блондена — Вальтера...
Сейделл — см. Дальтона — Сейделла...
Селиванов — см. Школьникова — Селиванова — Цодыкса...
Сен-Жирон — см. Ашара — Сен-Жирона...
Сенн — см. Штамма — Сенна — Кадера...
Сентон — см. Шейтхауэра — Мари — Сентона...
Сера — см. Вейля — Сера...
Сестан — см. Раймона — Сестана...
Сёндергард — см. Марри — Сёндергарда — Бьерка...
Сиве — см. Абта — Леттерера — Сиве..., Леттерера — Сиве...
Сигье — см. Лиана — Сигье — Вельти...
Сикар — см. Бриссо — Сикара..., Верне — Сикара — Колле..., Дежерина — Сука — Сикара...
Силвермен — см. Каффи — Силвермена...
Симмерс — см. Брилла — Симмерса..., Мошкович — Сингера — Симмерса...
Симон — см. Бине — Симона...
Симонс — см. Барракера — Симонса..., Холлендера — Симонса...
Симпсон — см. Мейо — Симпсона — Коллена...
Симс — см. Шуварского — Симса — Хунера...
Сингер — см. Мошкович — Сингера — Симмерса...
Синицын — см. Гюйона — Синицына...
Скарфф — см. Стукея — Скарффа...
Смэлли — см. Файга — Смелли...
Смирнова — см. Энгельгардта — Смирновой...
Снеллен — см. Тауссиг — Снеллена — Альберса...
Соджерс — см. Гарсии — Соджерса...
Солант — см. Турена — Соланта — Голе...
Соловов — см. Клаудиуса — Губарева — Соловова...
Соррентино — см. Гудвина — Белта — Соррентино...
Сотта — см. Дежерина — Сотта...
Сплендоре — см. Альмейды — Лютца — Сплендоре...
Стайнберг — см. Олдрича — Стайнберга — Кемпбелла...
Старков — см. Бильрота — Оллье — Старкова...
Старлинг — см. Бейлисса — Старлинга...
Стерлинг — см. Йоза — Стерлинга...
Стокс — см. Гритти — Стокса..., Чейна — Стокса...
Стольников — см. Брандберга — Робертса — Стольникова...
Стражеско — см. Образцова — Стражеско...
Страндберг — см. Гребблад — Страндберга...
Стюарт — см. Морганьи — Стюарта — Мореля...
Сук — см. Дежерина — Сука — Сикара...
Сулиньяк — см. Турена — Сулиньяка...
Сулье — см. Бернара — Сулье..., Лобри — Сулье...
Сульцбергер — см. Блоха — Сульцбергера...
Тавара — см. Ашоффа — Тавары...
Такеути — см. Нисимото — Такеути — Кудо...
Талалаев — см. Ашоффа — Талалаева...
Талышинский — см. Коржа — Талышинского...
Тандлер — см. Гальбана — Тандлера...
Танич — см. Гребенюка — Танич...
Таон — см. Гийена — Таона...
Тареев — см. Реберга — Тареева...
Тарнов — см. Куленкампффа — Тарнова...
Татаринов — см. Абелева — Татаринова..., Заблудовского — Татаринова...
Таун — см. Наффцигера — Тауна...
Тауссиг — см. Блелока — Тауссиг...
Тевенар — см. Фуа — Тевенара...
Тевене — см. Бальма — Тевене...
Тей — см. Гетчинсона — Тея...
Тейби — см. Рубинстайна — Тейби...
Тейсье — см. Лери — Молен Де Тейсье...
Теннессон — см. Бенье — Теннессона...
Тенцер — см. Унны — Тенцера...
Терновский — см. Михельсона — Терновского...
Террье — см. Курвуазье — Террье...
Терсби-Пелхем — см. Биккеля — Терсби-Пелхема...
Тессье — см. Юэрта — Тессье...
Тесье — см. Хилла — Тесье...
Тешендорф — см. Баршоня — Тешендорфа...
Тиканадзе — см. Генкеля — Тиканадзе...
Тисдалл — см. Крамера — Тисдалла...
Тиффно — см. Вотчала — Тиффно...
Тиханов — см. Тейхманна — Тиханова...
Тобиас — см. Панкоста — Тобиаса...
Толан — см. Уотсона — Толана...
Тома — см. Дежерина — Тома...

Торек — см. Добромыслова — Торека..., Китли — Торека — Герцена...
Торрес — см. Лемоса — Торреса — Деньи...
Тост — см. Унны — Тоста...
Тояма — см. Мацумото — Комая — Тоямы...
Трауготт — см. Штауба — Трауготта...
Тренделенбург — см. Броди — Троянова — Тренделенбурга...
Тренель — см. Сабуро — Приера — Тренеля...
Треноне — см. Клиппеля — Треноне...
Трибондо — см. Бергонье — Трибондо...
Тривс — см. Стюарта — Тривса...
Трико — см. Дегоса — Делора — Трико...
Троянов — см. Броди — Троянова — Тренделенбурга...
Тсоканакис — см. Лермитта — Монье — Винара — Тсоканакиса...
Тулуз — см. Вюрпа — Тулуза...
Туми — см. Раушкольба — Туми...
Турен — см. Пейтца — Турена..., Пейтца — Турена — Егерса...
Тут — см. Шарко — Мари — Тута..., Шарко — Мари — Тута — Гоффманна...
Тушинский — см. Битторфа — Тушинского...
Тьер — см. Ашара — Тьера...
Тюрель — см. Алажуанина — Тюреля...
Тюрк — см. Штиллинга — Тюрка — Дуэйна...
Уайетт — см. Брашфилда — Уайетта...
Уайт — см. Бланда — Уайта — Гарленда...
Уикс — см. Коха — Уикса...
Уилкинсон — см. Израэльса — Уилкинсона..., Сneддона — Уилкинсона...
Уилсон — см. Драгстедта — Уилсона..., Ирасека — Цюльцера — Уилсона..., Киммелстила — Уилсона...
Уитмен — см. Генле — Уитмена...
Уитмор — см. Маршалла — Уитмора...
Уллрих — см. Шерешевского — Тернера — Бонневи — Уллриха...
Унна — см. Бельца — Унны..., Дюкрея — Унны...
Унтербергер — см. Шатца — Унтербергера...
Унферрихт — см. Вагнера — Унферрихта — Хеппа...
Уокер — см. Денди — Уокера...
Уотерстон — см. Кули — Уотерстона...
Урбах — см. Керля — Урбаха...
Урмахер — см. Вайнштейна — Урмахера...
Фабер — см. Гайема — Фабера...
Фаворский — см. Кахаля — Фаворского...
Фавр — см. Никола — Фавра...
Файерштайн — см. Бехтерева — Файерштайна...
Фанкони — см. Абдергальдена — Фанкони..., Аристовского — Фанкони..., Висслера — Фанкони..., Де Тони — Дебре — Фанкони..., Линьяка — Фанкони...
Феде — см. Риги — Феде...
Федеричи — см. Льюиса — Федеричи..., Политцера — Федеричи...
Феер — см. Зельтера — Свифта — Феера...
Фейль — см. Клиппеля — Фейля...
Феликс — см. Вейля — Феликса..., Крейги — Иена — Феликса...
Фендт — см. Шпиглера — Фендта...
Феноменов — см. Симпсона — Феноменова...
Фернер — см. Штейнера — Фернера...
Ферран — см. Дарье — Феррана...
Ферстер — см. Эрба — Ферстера — Барре — Левенштейна...
Фехнер — см. Вебера — Фехнера...
Фибигер — см. Дебре — Фибигера...
Фидлер — см. Абрамова — Фидлера...
Филатов — см. Лагранжа — Хольта — Филатова...
Филипп — см. Гомбо — Филиппа...
Финкельдей — см. Уортина — Финкельдея...
Финней — Элеккера — Финнея...
Финстерер — см. Гофмейстера — Финстерера...
Фишер — см. Бушке — Фишера..., Водака — Фишера..., Смита — Фишера..., Тальхаймера — Фишера..., Экономо — Фишера...
Фищенко — см. Казьмина — Фищенко...
Флатау — см. Редлиха — Флатау...
Флейшер — см. Кайзера — Флейшера...
Флек — см. Киса — Флека..., Хилла — Флека...
Фогт — см. Шпильмейера — Фогта..., Шпильмейера — Фогта — Баттена...
Фой — см. Гавриловой — Фоя...
Фоннезю — см. Гринспана — Фоннезю...
Фордайс — см. Фокса — Фордайса...
Форссман — см. Берьесона — Форсмана — Леманна...
Франгенгейм — см. Гебелля — Франгенгейма — Штеккеля...
Франсуа — см. Халлерманна — Штрайффа — Франсуа...
Фрейдин — см. Егорова — Фрейдина...
Фрейжер — см. Спиллера — Фрейжера — Адсона...
Фрейзер — см. Денди — Фрейзера...
Фрелих — см. Пехкранца — Бабинского — Фрелиха...
Френкель — см. Бордье — Френкеля..., Заблоцкого — Десятовского — Френкеля..., Райтмана — Френкеля...
Фридериксен — см. Уотерхауса — Фридериксена...
Фроман — см. Бабинского — Фромана...
Фроммель — см. Киари — Фроммеля...
Фуа — см. Ашара — Фуа — Крузона..., Бехтерева — Мари — Фуа..., Мари — Фуа..., Мари — Фуа — Алажуанина...
Фукс — см. Далена — Фукса...
Фурнье — см. Робинсона — Фурнье...
Фуше — см. Гаррисона — Фуше...
Хаас — см. Йоллеса — Хааса...
Хадсон — см. Брукса — Хадсона — Кея...
Хайнс — см. Андерсона — Хайнса...
Хакамори — см. Хатсушимы — Хакамори...
Хаккер — см. Бека — Хаккера...
Хакстхаусен — см. Блегвада — Хакстхаусена...
Хальберштедтер — см. Провацека — Хальберштедтера...
Хамилтон — см. Стюарта — Хамилтона...
Хантер — см. Ройла — Хантера...
Харада — см. Фогта — Коянаги — Харады...
Харрис — см. Ванга — Харриса...
Хартмен — см. Гринблатта — Хартмена...
Хаусс — см. Оберста — Лена — Хаусса...
Хахутов — см. Олби — Хахутова...
Хевельс — см. Петерс — Хевельса...
Хейбл — см. Шегрена — Хейбла...
Хейли — см. Гужеро — Хейли — Хейли...
Хейуэрд — см. Аллена — Хейуэрда — Пинто...
Хеншен — см. Морганьи — Хеншена...
Хиатт — см. Свенсона — Хиатта...
Хигаси — см. Чедиака — Хигаси...
Хилов — см. Штенгера — Хилова...
Холдейн — см. Дугласа — Холдейна...
Холдин — см. Эрбана — Холдина...
Холмс — см. Стюарта — Холмса..., Эйди — Холмса...
Холтер — см. Шпитца — Холтера...
Хольт — см. Лагранжа — Хольта — Филатова...
Хольцов — см. Мариона — Хольцова...
Хук — см. Фергюсона — Хука...
Хундадзе — см. Петрова — Хундадзе...
Хунер — см. Шуварского — Симса — Хунера...
Хюбинетте — см. Эдена — Хюбинетте...
Хэбб — см. Милнера — Хэбба...
Хюнерманн — см. Конради — Хюнерманна...
Хюэт — см. Пельгера — Хюэта...
Цвален — см. Франческетти — Цвалена...
Цемах — см. Фрешельса — Цемаха...
Циннсер — см. Брилла — Циннсера...
Ципоркин — см. Фридланда — Ципоркина...
Цодыкс — см. Школьникова — Селиванова — Цодыкса...
Цондек — см. Ашгейма — Цондека...
Цюльцер — см. Ирасека — Цюльцера — Уилсона...
Чаклин — см. Путти — Чаклина...
Чапин — см. Мак-Коя — Чапина...
Чарлтон — см. Шультца — Чарлтона...
Чевидалли — см. Барберио — Чевидалли...
Черников — см. Лисона — Черникова...
Чокалтеу — см. Фолина — Чокалтеу...
Чукалов — см. Кюстнера — Чукалова...
Шаак — см. Корнева — Шаака...
Шавани — см. Фуа — Шавани — Иллемана...
Шарко — см. Вигуру — Шарко..., Эрба — Шарко — Штрюмпелля...
Шауманн — см. Бенье — Бека — Шауманна...
Шаута — см. Александрова — Шауты — Бертгейма...
Шварц — см. Мансона — Шварца...
Швейгерт — см. Кункеля — Пирсона — Швейгерта...
Ше — см. Фавра — Ше...
Шегрен — см. Грефе — Шегрена..., Маринеску — Шегрена..., Маринеску — Шегрена — Гарленда..., Предтеченского — Гужеро — Шегрена...
Шеде — см. Люкке — Шеде..., Пертеса — Шеде...
Шельвен — см. Русси — Лермитта — Шельвена...
Шене — см. Сестана — Шене...
Шеррен — см. Геда — Шеррена...
Шеррингтон — см. Лиделла — Шеррингтона...
Шига — см. Григорьева — Шиги...
Шильдер — см. Хоффа — Шильдера...
Шимановский — см. Гритти — Шимановского..., Кунта — Шимановского...
Шинц — см. Хаглунда — Шинца...
Шипачев — см. Березнеговского — Шипачева...

Школьников — см. Осна — Школьникова...
Шлезингер — см. Фанкони — Шлезингера...
Шлоссманн — см. Краупы — Познера — Шлоссманна..., Познера — Шлоссмана...
Шлютер — см. Мейера — Шлютера...
Шмид — см. Мак-Ардла — Шмида — Пирсона...
Шмиден — см. Антона — Шмидена...
Шмидт — см. Кети — Шмидта...
Шмитц — см. Штуцера — Шмитца...
Шоффар — см. Минковского — Шоффара..., Стилла — Шоффара..., Труазье — Ано — Шоффара....
Шпатц — см. Галлервордена — Шпатца...
Шраер — см. Полянцева — Шраера...
Шрамм — см. Алексеева — Шрамма...
Шрегер — см. Гунтера — Шрегера...
Шрейер — см. Галена — Шрейера...
Шреттер — см. Педжета — Шреттера...
Штейн — см. Курдиновского — Штейна...
Штейнерт — см. Куршманна — Баттена — Штейнерта...
Штенгль — см. Шильдера — Штенгля...
Штернберг — см. Олбрайта — Мак-Кьюна — Штернберга..., Пальтауфа — Штернберга..., Рид — Штернберга...
Штида — см. Пеллегрини — Штиды...
Штилле — см. Лоренца — Штилле...
Штиллинг — см. Кларка — Штиллинга...
Шторк — см. Мишера — Шторка...
Штрайфф — см. Халлерманна — Штрайффа — Франсуа...
Штризовер — см. Шеллонга — Штризовера...
Штроль — см. Гийена — Барре — Штроля...
Штрюмпелль — см. Бехтерева — Штрюмпелля — Мари..., Вестфаля — Штрюмпелля...
Штумме — см. Эрдгейма — Штумме...
Шуб — см. Шарпа — Шуба...
Шюллер — см. Крисчена — Шюллера..., Хенда — Шюллера — Крисчена...
Эбнер — см. Оуэна — Эбнера...
Эбштейн — см. Арманни — Эбштейна..., Пеля — Эбштейна...
Эвальд — см. Боаса — Эвальда...
Эванс — см. Ллойда — Эванса...
Эдельман — см. Вейсса — Эдельмана...
Эдингер — см. Вестфаля — Эдингера...
Эйзельсберг — см. Витцеля — Айзельсберга...
Экман — см. Лобштейна — Экмана...
Эллис — см. Гурлер — Эллиса..., Пфаундлера — Гурлер — Эллиса...
Эллисон — см. Золлингера — Эллисона...
Эльвейем — см. Поттера — Эльвейема...
Эльшниг — см. Егера — Эльшнига...
Эмерсон — см. Шефера — Эмерсона — Айви...
Энгмен — см. Цинссера — Коула — Энгмена...
Эндер — см. Розенштрауха — Эндера...
Эрб — см. Дюшенна — Эрба...
Эрлахер — см. Бланта — Эрлахера — Биезиня — Барбера...
Эрлих — см. Бионди — Эрлиха — Гейденгайна...
Эрнст — см. Бабеша — Эрнста...
Юлиусберг — см. Капоши — Юлиусберга...
Юнглинг — см. Морозова — Юнглинга...
Юниус — см. Кунта — Юниуса...
Юргенс — см. Виллебранда — Юргенса...
Юревич — см. Чистовича — Юревича...
Юханссон — см. Ларсена — Юханссона...
Ядассон — см. Негели — Блоха — Ядассона..., Франческетти — Ядассона...
Якоб — см. Крейтцфельдта — Якоба...
Якоби — см. Петжа — Якоби...
Якобсон — см. Гольцкнехта — Якобсона...
Яковлева — см. Мишкутина — Яковлевой...
Янг — см. Дайка — Янга...
Янович-Чаинский — см. Ревердена — Яновича-Чаинского — Оллье...
Яновский — см. Цыпляева — Яновского...
Янсен — см. Риттера — Янсена...
Яриш — см. Герксгеймера — Яриша — Лукашевича...
Яснов — см. Петрова — Яснова...
Ястровиц — см. Брунса — Ястровица...

ЧАСТЬ II

Aaron — см. Аарона...
Abadie — см. Абади...
Abbe — см. Абби..., Ферстера — Аббе...
Abbott — см. Эбботта...
Abderhalden — см. Абдергальдена — Кауфманна — Линьяка..., Абдергальдена — Фанкони...
Abel — см. Абеля — Левенберга...
Abell — см. Абелля...
Abercrombie — см. Аберкромби...
Abrami — см. Абрами..., Видаля — Абрами...
Abt — см. Абта — Леттерера — Сиве...
Aburel — см. Абурела...
Acevedo — см. Пуэнте — Асеведо...
Achard — см. Ашара — Сен-Жирона..., Ашара — Тьера..., Ашара — Фуа — Крузона...
Achelis — см. Ахелиса — Венкебаха...
Achenbach — см. Ахенбаха...
Adair Dighton — см. Эдера Дайтона...
Adamkiewicz — см. Адамкевича..., Адамкевича — Гопкинса — Коля...
Adams — см. Адамса..., Александера — Адамса..., Гана — Адамса — Кунса..., Морганьи — Адамса — Стокса...
Adamson — см. Адамсона..., Крокке-ра — Адамсона...
Addis — см. Аддиса..., Каковского — Аддиса...
Addison — см. Аддисона..., Аддисона — Бирмера..., Аддисона — Галла...
Adie — см. Эйди..., Вейлля — Рея — Эйди..., Эйди — Холмса...
Adler — см. Адлера..., Адлера — Реймана...
Adson — см. Адсона..., Адсона — Бьюси..., Генри — Адсона...
Afzelius — см. Афцелиуса — Липшютца...
Ahlfeld — см. Альфельда...
Alajouanine — см. Алажуанина — Тюреля..., Венсана — Алажуанина..., Гийена — Алажуанина — Матье..., Мари — Фуа — Алажуанина..., Фуа — Алажуанина...
Albarran y Dominguez — см. Альбаррана..., Альбаррана — Гюйона...
Albee — см. Олби..., Олби — Дельбе..., Олби — Хахутова...
Albers — см. Таусснг — Снеллена — Альберса...
Albers-Schönberg — см. Альберс-Шенберга...
Albert — см. Альберта...
Albini — см. Альбиниевы...
Albrecht — см. Альбрехта...
Albright — см. Олбрайта..., Олбрайта — Баттлера..., Олбрайта — Мак-Кьюна — Штернберга..., Клайнфелтера — Рейфенштейна — Олбрайта..., Лайтвуда — Олбрайта..., Мартина — Олбрайта..., Форбса — Олбрайта...
Alcock — см. Олкока...
Aldrich — см. Олдрича..., Олдрича — Стайнберга — Кемпбелла..., Вискотта — Олдрича..., Мак-Клюра — Олдрича...
Alexander — см. Александера..., Александера — Адамса...
Alibert — см. Алибера..., Алибера — Базена...
Allan — см. Аллана...
Allemann — см. Аллеманна...
Allen — см. Аллена..., Аллена — Буриана..., Аллена — Хейуэрда — Пинто..., Корнера — Аллена...
Allis — см. Эллиса...
Almeida — см. Альмейды — Лютца — Сплендоре...
Almour — см. Альмура — Копецкого...
Alpers — см. Альперса...
Alport — см. Альпорта...
Alström — см. Альстрема..., Альстрема — Ольсена...
Altmann — см. Шридде — Альтманна...
Alzheimer — см. Альцгеймера..., Нисля — Альцгеймера...
Amato — см. Амато...
Ambard — см. Амбара...
Amoils — см. Амоилса...
Amoss — см. Амосса...
Amsler — см. Амслера...
Amussat — см. Амюсса...
Ancell — см. Анселля...
Andersen — см. Андерсен...
Anderson — см. Андерсона..., Андерсона — Хайнса...
Andogsky — см. Андогского...
Andrade — см. Андраде...
Andrews — см. Эндрюса...
Anel — см. Анеля...
Anghelescu — см. Ангелеску
Anghill — Энгхилла...
Angle — см. Энгла...
Anson — см. Ансона — Черникова...
Anton — см. Антона — Бабинского..., Антона — Браманна..., Антона — Шмидена...
Antoni — см. Антони...
Antyllus — см. Антиллуса...
Apgar — см. Апгар...
Apelt — см. Нонне — Апельта...
Apert — см. Апера..., Апера — Галле..., Крука — Апера — Галле...
Appelman — см. Аппельмана...
Apt — см. Апта — Даунера...
Ara — см. Таката — Ара...
Aragão — см. Арагана..., Арагана — Вианны...
Aran — см. Арана — Дюшенна...
Aranzi — см. Аранциев...
Argonz — см. Аргонса — дель Кастильо
Argyll Robertson — см. Аргайлла Робертсона...

Arias — см. Ариаса...
Arias-Stella — см. Ариас-Стеллы...
Arlt — см. Арльта...
Armanni — см. Арманни — Эбштейна...
Armstrong — см. Армстронга..., Кинга — Армстронга...
Arning — см. Арнинга...
Arnold — см. Арнольда..., Арнольда — Киари...
Aronson — см. Аронсона...
Arreger — см. Аррегера...
Arrhenius — см. Аррениуса — Мадсена...
Arruga — см. Арруги...
Arthus — см. Артюса...
Artusio — см. Артузио...
Arzberger — см. Арцбергера...
Asboe-Hansen — см. Асбо-Хансена...
Aschaffenburg — см. Ашаффенбурга...
Ascher — см. Ашера...
Aschheim — см. Ашгейма — Цондека...
Aschner — см. Ашнера..., Ашнера — Германа..., Даньини — Ашнера...
Aschoff — см. Ашоффа — Пуля..., Ашоффа — Тавары..., Ашоффа — Талалаева..., Ашоффский (-ие)..., Рокитанского — Ашоффа...
Ascoli — см. Асколи...
Ashby — см. Эшби...
Asherman — см. Ашермана...
Askanazy — см. Аскапази...
Assmann — см. Ассманна — Редекера...
Astrup — см. Аструпа...
Athanassio — см. Атанассио...
Atwater — см. Этуотера...
Aubineau — см. Ленобля — Обино...
Auenbrugger — см. Ауэнбруггера...
Auer — см. Ауэра...
Auerbach — см. Ауэрбаховское..., Гельда — Ауэрбаха...
Aujeszky — см. Ауески...
Auspitz — см. Ауспитца...
Auvray — см. Овре...
Avellis — см. Авеллиса...
Ayer — см. Айера...
Ayres — см. Эйрса...
Ayerza — см. Айерсы...
Axenfeld — см. Аксенфельда..., Моракса — Аксенфельда...
Azua — см. Азуа...
Baader — см. Бадера...
Baastrup — см. Бострупа...
Babcock — см. Бабкока..., Бабкока — Маделунга...
Babeş — см. Бабеша..., Бабеша — Негри..., Бабеша — Эрнста...
Babinski — см. Бабинского..., Бабинского — Вакеза..., Бабинского — Вейля..., Бабинского — Жарковского..., Бабинского — Нажотта..., Бабинского — Фромана..., Антона — Бабинского..., Пехкранца — Бабинского — Фрелиха...
Baccelli — см. Бачелли...
Bachman — см. Бахмана..., Бечмена...
Badgley — см. Бадгли...
Baelz — см. Бельца..., Бельца — Унны...
Baermann — см. Берманна...
Baeyer — см. Байера...
Baffes — см. Баффеса...
Bailey — см. Бейли...
Baillarger — см. Байярже..., Фрей — Байярже...
Bailliart — см. Байяра — Мажито...
Bainbridge — см. Бейнбриджа...
Baizeau — см. Безо...
Baker — см. Бейкера...
Bakwin — см. Беквина — Айгера...
Baldwin — см. Болдвина...
Baldy — см. Вебстера — Бальди — Дартига...
Balfour — см. Бальфура..., Уиллс — Бальфура — Мак-Суини...
Balint — см. Балинта...
Ballance — см. Балленса...
Ballantyne — см. Баллентайна — Рунге...
Ballet — см. Балле...
Balmes — см. Бальма — Тевене...
Balo — см. Бало...
Balser — см. Бальзера...
Balzer — см. Бальзера..., Бальзера — Менетрие..., Бенье — Бальзера...
Bamberger — см. Бамбергера..., Бамбергера — Герме..., Бамбергера — Мари...
Bancroft — см. Банкрофта...
Bandl — см. Бандля...
Bang — см. Банга...
Bangerter — см. Бангертера...
Banti — см. Банти...
Barandun — см. Барандуна...
Bárány — см. Барани..., Ломбара — Барани...
Barbagallo — см. Барбагалло...
Barber — см. Барбера..., Бланта — Эрлахера — Биезиня — Барбера...
Barberio — см. Барберио — Чевидалли...
Barcroft — см. Баркрофта...
Bard — см. Бара — Кюртия..., Бара — Пика..., Кеннона — Барда...
Bardenheuer — см. Барденгейера..., Барденгейера — Морестена...
Bardet — см. Барде..., Лоренса — Муна — Барде — Бидля...
Barkan — см. Баркана...
Barker — см. Баркера — Саммерсона..., Монтгомери — О'Лири — Баркера
Barlow — см. Барлоу...
Barnard — см. Барнард...
Baron — см. Барона...
Barr — см. Барра...
Barraquer — см. Барракера..., Барракера — Симонса...
Barraquer-Bordas — см. Барракер - Бордаса — Руиса — Лара...
Barré — см. Барре..., Барре-Льеу..., Барре — Массона..., Гийена — Барре..., Мингаццини — Барре..., Эрба — Ферстера — Барре — Левенштейна...
Barret — см. Бэррета...
Barrière — см. Бюро — Баррьера...
Bársony — см. Баршоня — Тешендорфа...
Bartholin — см. Бартолинов(-а)...
Bartlett — см. Бартлетта...
Bartomier — см. Бартомье...
Barton — см. Бартона...
Bassen — см. Бессена — Корнцвейга...
Bassini — см. Бассини..., Бильрота — Бассини...
Bassler — см. Басслера...
Bastedo — см. Бастедо...
Bastian — см. Бастиана...
Bateman — см. Бейтмена...
Batten — см. Куршманна — Баттена — Штейнерта...
Battler — см. Олбрайта — Баттлера...
Baudouin — см. Бодуэна...
Bauer — см. Бауэра...
Bauhin — см. Баугиниева...
Baum — см. Баума...
Baumann — см. Бауманна — Депери...
Baumgarten — см. Крювелье — Баумгартена...
Baumgartner — см. Баумгартнера...
Bayer — см. Байера..., Кирмиссона — Лоренца — Байера...
Bayle — см. Бейля...
Bayliss — см. Бейлисса — Старлинга...
Bazett — см. Базетта...
Bazin — см. Базена..., Алибера — Базена...
Beck — см. Бека..., Бека — Ибрагима..., Бека — Хаккера...
Becker — см. Беккера..., Беккера — Мьюэра..., Беккера — Рейтера
Beckmann — см. Бекманна...
Béclard — см. Беклара...
Bednar — см. Беднара...
Beevor — см. Бивора...
Behçet — см. Бехчета...
Behr — см. Бера...
Behring — см. Беринга...
Békésy — см. Бекеши...
Bell — см. Белла..., Белла — Дойзи — Бриггса..., Белла — Мажанди...
Bellini — см. Беллини...
Belot-Petenil — см. Бело-Петенила...
Belt — см. Гудвина — Белта — Соррентино...
Ben Asher — см. Бен-Ашера...
Benda — см. Бенды...
Benedict — см. Бенедикта..., Гарриса — Бенедикта...
Benignetti — см. Бениньетти...
Benjamin — см. Беньямина...
Bennett — см. Беннетта...
Bennhold — см. Беннхольда...
Bence-Jones — см. Бенс-Джонса...
Bensaude — см. Лопуа — Бансода...
Berardinelli — см. Берардинелли...
Berenstein — см. Беренштейна...
Berg — см. Берга...
Berger — см. Бергера..., Берже...
Bergeron — см. Бержерона...
Bergh — см. Бергха...
Bergmann — см. Бергманна..., Бергманна — Израэля...
Bergonié — см. Бергонье..., Бергонье — Трибондо...
Berkefeld — см. Беркефельда...
Berkowitz — см. Грина — Берковича...
Berlin — см. Берлиновское...,
Bernard — см. Бернара..., Бернара — Горнера..., Бернара — Сулье...
Bernhardt — см. Вюльпиана — Бернгардта..., Рота — Бернгардта...
Bernheim — см. Бернгейма...
Bernoulli — см. Бернулли...
Bernstein — см. Бернштейна...
Bernuth — см. Бернута...
Berry — см. Берри — Дедрика...
Bers — см. Берса — Конрада...
Bertelli — см. Бертелли...
Bertin — см. Бертена..., Бертенова...
Bertrand — см. Канавана — Ван-Богарта — Бертрана...
Berzelius — см. Марша — Либиха — Берцелиуса...
Berze — см. Берце...
Besk — см. Беска...
Besnier — см. Бенье..., Бенье — Бальзера..., Бенье — Бека — Шауманна..., Бенье — Брока..., Бенье — Мещерского..., Бенье — Теннессона...
Bessel-Hagen — см. Бессель-Хагена...
Bessey — см. Берча — Бессея — Лаури...
Best — см. Беста..., Беста — Излена...
Bethe — см. Бете...
Bethea — см. Бетеи...
Beurle — см. Берля...
Beurmann — см. Берманна...
Bevan — см. Бевена...
Beyea — см. Бейе — Бира...
Beyerinck — см. Бейеринка...
Bezold — см. Бецольда..., Бецольда — Брюкке...
Bianchi — см. Бьянки...
Biber — см. Бибера...
Bichat — см. Биша...
Bickel — см. Биккеля — Терсби-Пелхема...

Bickham — см. Биккема...
Biedermann — см. Бидерманна...
Biedert — см. Бидерта...
Biedl — см. Бидля..., Лоренса — Бидля..., Лоренса — Муна — Барде — Бидля...
Bielschowsky — см. Бильшовского..., Бильшовского — Грос — Лаврентьева..., Бильшовского — Янского..., Шольца — Бильшовского...
Biemond — см. Бимонда...
Bier — см. Бира..., Бира — Микулича..., Бейе — Бира..., Склифосовского — Рена — Делорма — Бира...
Biermer — см. Бирмера..., Аддисона — Бирмера...
Biernacki — см. Бернацкого...
Biesalski — см. Бизальского..., Бизальского — Майера...
Biett — см. Биетта...
Bigelow — см. Бигелоу...
Biggs — см. Биггс—Дугласа — Макфарлена...
Bignami — см. Маркиафавы — Биньями...
Billroth — см. Бильрот..., Бильрота..., Бильрота — Бассини..., Бильрота — Оллье — Старкова...
Binda — см. Бинда...
Binet — см. Бине — Симона...
Bing — см. Бинга..., Тауссиг — Бинга..., Тойнби — Бинга...
Binkhorst — см. Бинкхорста...
Binswanger — см. Бинсвангера...
Biondi — см. Бионди..., Бионди — Эрлиха — Гейденгайна..., Эрлиха — Бионди...
Biot — см. Биота..., Биотовское...
Bircher — см. Бирхера...
Birch-Hirschfeld — см. Бирх-Гиршфельда...
Birkenfeld — см. Биркенфельда...
Birnbaum — см. Бирнбаума...
Bischoff — см. Бишоффа...
Bitot — см. Искерского — Бито...
Bittner — см. Биттнера...
Bittorf — см. Битторфа — Тушинского...
Bizzozero — см. Биццоцеро — Нейманна...
Bjerrum — см. Бьеррума..., Бьеррума — Самойлова...
Bjork — см. Бьёрка..., Марри — Сёндергарда — Бьёрка...
Blackfan — см. Даймонда — Блекфена...
Blackman — см. Эрлангера — Блекмена...
Blair — см. Блера..., Блера — Брауна..., Вильсона — Блера...
Blakemore — см. Блейкмора — Лорда...
Blalock — см. Блелока..., Блелока — Тауссиг..., Ханлона — Блелока
Blanchet — см. Бланше...
Bland — см. Бланда — Уайта — Гарленда...
Blasius — см. Дзаммитти — Блазиуса..., Дюпюитрена — Блазиуса...
Blaskovics — см. Блашковича...
Blegvad — см. Блегвада — Хакстхаусена...
Bleuler — см. Блейлера...
Bloch — см. Блоха..., Блоха — Бонне..., Блоха — Сульцбергера..., Негели — Блоха — Ядассона..., Сименса — Блоха...
Blodi — см. Риза — Блоди...
Blondin — см. Гийена — Сеза — де Блондена — Вальтера...
Bloom — см. Блума...
Bloor — см. Блура...
Blot — см. Бло...
Blount — см. Бланта..., Бланта — Эрлахера — Биезиня — Барбера...
Blümberger — см. Блюмбергера..., Мюллера — Блюмбергера...
Blum — см. Гужеро — Блюма...
Blumberg — см. Щёткина — Блюмберга...
Blumenbach — см. Блюменбахов...
Blumer — см. Блумера...
Boari — см. Боари..., Ван-Гука — Боари...
Boas — см. Боаса..., Боаса — Эвальда...
Bochdalek — см. Бохдалека...
Bockhart — см. Бокхарта...
Bodamer — см. Бодамера...
Bodansky — см. Боданского...
Bode — см. Боде...
Bodian — см. Бодиана...
Boeck — см. Бека..., Бенье — Бека — Шаумана...
Böhler — см. Белера..., Фельтина — Белера...
Boeke — см. Буке...
Böök — см. Бека...
Boerhaave — см. Бурхаве...
Börjeson — см. Берьесона — Форссмана — Леманна...
Börnstein — см. Бернштейна...
Boettcher — см. Беттхера...
Boettiger — см. Беттигера...
Bogaert — см. Ферраро — Ван-Богарта — Ниссена...
Bohmann — см. Вальтера — Боманна...
Bohn — см. Бона...
Bohne — см. Бона — Егера...
Bohr — см. Бора..., Вериго — Бора...
Boivin — см. Буавена...
Bolt — см. Больта...
Bonhoeffer — см. Бонгеффера...
Bonica — см. Боники...
Bonnaire — см. Боннера...
Bonnet — см. Бонне...
Bonnevie — см. Бонневи — Уллриха...
Bonnier — см. Боннье...
Bonnin — см. Боннина...
Bonwill — см. Бонвилла...
Borchardt — см. Борхардта...
Bordes-Valls — см. Бордес-Воллса...
Bordet — см. Борде..., Борде — Жангу...
Bordier — см. Бордье — Френкеля...
Boros — см. Бороша — Кораньи...
Borst — см. Борста — Ядассона...
Bossi — см. Босси...
Boston — см. Бостона...
Botallo — см. Боталлов...
Bottini — см. Боттини...
Bouchard — см. Бушара...
Bouchardat — см. Бушарда...
Bouchet — см. Буше — Гзелля...
Bouguer — см. Бугера — Вебера...
Bouillaud — см. Буйо...
Bouin — см. Буэна..., Буэна — Дюбоска — Бразиля...
Bourget — см. Бурже...
Bourguet — см. Бурге...
Bourguignon — см. Бургиньона...
Bourneville — см. Бурневилля — Прингла...
Bouveret — см. Бувре...
Boveri — см. Бовери..., Мари — Бовери...
Bowditch — см. Боудича...
Bowen — см. Боуэна...
Bowman — см. Боумена..., Боуменова (-ы)..., Шумлянского — Боумена...
Boyce — см. Бойса...
Boyd — см. Бойда..., Гласса — Бойда...
Boyden — см. Бойдена...
Boys — см. Бойса...
Bozzolo — см. Боццоло...
Bozzoni — см. Боццони...
Braatz — см. Браатца...
Brachet — см. Браше...
Brachmann — см. Брахманна — Де Ланге...
Bracht — см. Брахта...
Bragard — см. Брагарда...
Bragg — см. Брегга...
Braille — см. Брайля...
Bram — см. Брама...
Bramachari — см. Брамахари...
Bramann — см. Антона — Браманна...
Brancham — см. Бренхэма...
Brandes — см. Брандеса...
Brandt — см. Брандта...
Brasdor — см. Браздора — Вардропа...
Brasil — см. Бразиля — Дюбоска...
Bratz — см. Братца...
Brauer — см. Брауэра...
Braun — см. Брауна..., Брауна — Гертеля..., Гаккера — Брауна...
Braun-Falco — см. Браун-Фалько...
Braunmühl — см. Браунмюля...
Braunwald — см. Браунвальда — Брокенборо..., Глисона — Браунвальда...

Bravais — см. Браве — Джексона...
Braxton Hicks — см. Брекстона Гикса...
Bray — см. Уэнера — Брея...
Bremer — см. Бремера...
Brenner — см. Бреннера..., Бреннерома...
Breschet — см. Бреше...
Breslau — см. Бреслау...
Breuer — см. Брейера..., Геринга — Брейера...
Brian — см. Бриана — Жабуле...
Bricker — см. Бриккера...
Brickner — см. Брикнера...
Briggs — см. Белла — Дойзи — Бриггса...

Bright — см. Брайтова...
Brill — см. Брилла..., Брилла — Симмерса..., Ледерера — Брилла...
Brindeau — см. Брендо...
Brinson — см. Бринсона...
Briquet — см. Брике...
Brissaud — см. Бриссо..., Бриссо — Сикара..., Шарко — Бриссо...
Brittain — см. Бриттена...
Broadbent — см. Бродбента...
Broca — см. Брока..., Брока — Зульцера...
Brock — см. Брока...
Brockenborough — см. Браунвальда — Брокенборо...
Brocq — см. Брока..., Брока — Дюбрея..., Брока — Потрие..., Бенье — Брока..., Вильсона — Брока...
Brodie — см. Броди..., Броди — Троянова — Тренделенбурга...
Brodmann — см. Бродманна...
Broemser — см. Бремзера..., Бремзера — Ранке...
Broman — см. Бромана...
Brooke — см. Брука..., Морроу — Брука...
Brooks — см. Брукса..., Брукса — Хадсона — Кея...
Browicz — см. Бровича — Купфера...
Brown — см. Брауна..., Брауна — Пирс..., Блера — Брауна..., Куллена—Броуна..., Нигарда — Брауна..., Хайнеса — Брауна..., Хортона — Магата — Брауна...
Browne — см. Брауна...
Brown-Séquard — см. Броун-Секара...
Bruce — см. Бруцеллы..., Брюса...
Bruch — см. Бруха...
Bruck — см. Брука — де Ланге...
Brudzinski — см. Брудзинского...

Brücke — см. Брюкке..., Бецольда — Брюкке...
Brügge — см. Фишера — Брюгге...
Brüggemann — см. Брюггеманна...
Brünauer — см. Брюнауэра...
Brüning — см. Брюнинга..., Брюнинга — Бурденко...
Brugsch — см. Бругша...
Brun — см. Грейвса — Бруна...
Brunings — см. Брюнингса...
Brunn — см. Брунна..., Брунна — Виттека...
Brunner — см. Бруннера..., Бруннеровы...
Bruns — см. Брунса..., Брунса — Ястровица...
Brunsting — см. Бранстинга...
Brushfield — см. Брашфилда — Уайетта...
Bryant — см. Брайента...
Buchman — см. Бухмана...
Buckley — см. Буклея...
Bucky — см. Букки...
Bucy — см. Адсона — Бьюси...
Budd — см. Бадда — Киари...
Bücklers — см. Бюклерса...
Büdinger — см. Бюдингера..., Бюдингера — Лудлоффа — Левена...
Bûlau — см. Бюлау...
Büngner — см. Бюнгнеровы...
Buerger — см. Бюргера..., Виниварtера — Бюргера...
Bürger — см. Бюргера — Грютца...
Bürker — см. Бюркера...
Büschelberger — см. Молла — Бюшельбергера...
Buhl — см. Буля...
Bulĭr — см. Булира...
Bumke — см. Бумке...
Bumm — см. Бумма...
Bunge — см. Бунге...
Bunnell — см. Пауля — Буннелля..., Ханганциу — Дайхера — Пауля — Буннелля..., Баннелла...
Burch — см. Берча — Бессея — Лаури...
Burchard — см. Либерманна — Бурхарда...
Burdach — см. Бурдаха...
Bureau — см. Бюро — Баррьера...
Burgon — см. Бургона...
Burian — см. Аллена — Буриана...
Burkitt — см. Беркитта...
Burnand — см. Бюрнана...
Burnet — см. Бернета..., Деррика — Бернета..., Бюрне...
Burnett — см. Бернетта...
Burnier — см. Гужеро — Бюрнье...
Burow — см. Бурова...
Burri — см. Бурри...
Burrows — см. Барроуза...
Burstein — см. Бурштейна...
Busch — см. Марки — Буша...
Buschke — см. Бушке..., Бушке — Оллендорфф..., Бушке — Фишера..., Буссе — Бушке...
Busse — см. Буссе — Бушке...
Butler — см. Батлера...
Buzzi — см. Швеннингера — Буцци...
Bychowski — см. Грассе — Быховского...
Bywaters — см. Байуотерса...
Cabanes — см. Кабана...
Cabot — см. Кебота...
Cacchione — см. Де Санктиса — Каккьоне...
Caffey — см. Каффи..., Каффи — Силвермена...
Caldwell — см. Колдуэлла — Люка...
Calmette — см. Кальметта — Вольф-Эйснера..., Кальметта — Герена
Calvé — см. Кальве..., Легга — Кальве — Пертеса...
Camp — см. Кораньи — Де ла Кампа...
Campbell — см. Кемпбелла..., Лобитца — Кемпбелла...
Camper — см. Камперовская...
Campos — см. Кампоса...
Camurati — см. Камурати — Энгельманна...
Canada — см. Кронкхайта — Канада...
Cañadell — см. Вилановы — Каньяделя...
Canavan — см. Канавана..., Канавана — Ван-Богарта — Бертрана...
Canfield — см. Канфилда — Штурманна...
Cannon — см. Кеннона..., Кеннона — Барда...
Cantor — см. Кантора...
Capdepont — см. Капдепона..., Стейнтона — Капдепона...
Capgras — см. Капгра...
Caplan — см. Каплана...
Capozzi — см. Капоцци...
Capps — см. Вотчала — Каппса...
Carabelli — см. Карабелли...
Caraven — см. Каравена..., Каравена — Гужеро...
Caraway — см. Каравея...
Cardarelli — см. Кардарелли — Риги..., Оливера — Кардарелли...
Carden — см. Кардена...
Carducci — см. Кардуччи — Ольмера...
Carhart — см. Кархарта...
Carnett — см. Карнетта...
Carnoy — см. Карнуа...
Carpenter — см. Карпентера...
Carr — см. Карра — Зильбера...
Carrel — см. Карреля..., Карреля — Дейкина...
Carrion — см. Карриона...
Carteaud — см. Гужеро — Карто...
Carter — см. Картер — Роббинса...
Casal — см. Касаля...
Casoni — см. Касони...
Cassirer — см. Кассирера...
Castel — см. Кастеля...
Castellani — см. Кастеллани...
Castillo — см. Дель Кастильо...
Castle — см. Касла...
Castro — см. Де Кастро...
Castroviejo — см. Кастровьехо...
Cathelin — см. Катлена...
Cattan — см. Сигаля — Каттана — Маму...
Cattler — см. Каттлера...
Cave — см. Кейва..., Кейва — Роу...
Ceci — см. Чечи...
Cejka — см. Цейки...
Celsus — см. Цельса...
Cestan — см. Сестана — Шене..., Раймона — Сестана...
Chaddok — см. Чаддока...
Chagas — см. Шагаса...
Chaix — см. Фавра — Ше...
Chalot — см. Шало — Лысенкова...
Chamberlain — см. Чемберлена...
Chamberland — см. Шамберлана...
Champy — см. Шампи..., Шампи — Кулля...
Chapin — см. Мак-Коя — Чапина...
Chapman — см. Чапмена — Бернса...
Charcot — см. Шарко..., Шарко — Бриссо..., Шарко — Вюльпиана..., Шарко — Лейдена..., Шарко — Мари..., Шарко — Мари — Тута — Гоффманна..., Вигуру — Шарко..., Эрба — Шарко — Штрюмпелля...
Charlin — см. Чарлина...
Charlton — см. Чарлтона..., Шульца — Чарлтона...
Charpentier — см. Шарпантье...
Charriére — см. Шаррьера...
Chaslin — см. Шаслена...
Chassaignac — см. Шассеньяка...
Chauffard — см. Шоффара..., Шоффара — Лериша..., Шоффара — Риве..., Минковского — Шоффара..., Труазье — Ано — Шоффара...
Chavany — см. Шавани..., Фуа — Шавани — Иллемана...
Chavasse — см. Шавасса...
Chediak — см. Чедиака — Хигаси...
Cheever — см. Чивера...
Chenais — см. Сестана — Шене...
Chevassu — см. Шевассю...
Chevidally — см. Барберио — Чевидалли...
Cheyne — см. Чейна — Стокса...
Chiari — см. Киари..., Киари — Авцына..., Киари — Фроммеля..., Арнольда — Киари..., Яриша — Киари...
Chipault — см. Шипо...
Chochodka — см. Хоходки — Мариона...
Cole — см. Энгмена — Коула...
Chopart — см. Шопара..., Шопаров...
Chopra — см. Чопры — Гупты...
Christ — см. Криста — Сименса...
Christeller — см. Кристеллера...
Christensen — см. Кристенсена...
Christian — см. Крисчена — Шюллера..., Вебера — Крисчена..., Пфейфера — Вебера — Крисчена..., Хенда — Шюллера — Крисчена...
Christmas — см. Кристмаса...
Chrobak — см. Хробака...
Chronis — см. Хрониса...
Chvostek — см. Хвостека...
Ciaccio — см. Чаччо...
Citelli — см. Чителли...
Civatte — см. Сиватта...
Civinini — см. Чивининиев...
Clark — см. Кларка...
Clarke — см. Кларка..., Кларка — Штиллинга..., Хорсли — Кларка...
Clathworthy — см. Квиероло — Вальдони — Клатуорти...
Clauberg — см. Клауберга...
Claudius — см. Клаудиуса..., Клаудиуса — Губарева — Соловова...
Claoué — см. Клауэ...
Cleghorn — см. Ендрашика — Клегхорна — Грофа...
Clējat — см. Петжа — Клежа...
Clérambault — см. Клерамбо..., Кандинского — Клерамбо...
Clerc — см. Клерка — Леви — Кристеско...
Clifford — см. Клиффорда...
Cloquet — см. Клоке..., Клокетов(-а)...
Closs — см. Данбольта — Клосса...
Clouston — см. Клустона...
Clutton — см. Клаттона...
Co-Tui — см. Ко Туи...
Coats — см. Коутса...
Cobb — см. Кобба...
Coca — см. Коки...
Cockayne — см. Коккейна..., Вебера — Коккейна...
Codivilla — см. Кодивиллы..., Кодивиллы — Колонны...
Codman — см. Кодмана...
Coffey — см. Коффи..., Коффи — Аптелавы..., Коффи — Мейо...
Cogan — см. Когана...
Cohnheim — см. Конгейма...
Cole — см. Коула..., Адамкевича — Гопкинса — Коля...
Colles — см. Коллиса...
Collet — см. Колле..., Верне — Сикара — Колле..., Сикара — Колле...
Cooley — см. Кули...
Collin — см. Мейо — Симпсона — Коллена...
Colonna — см. Колонны...

Comberg — см. Балтина — Комберга...
Comolli — см. Комолли...
Concato — см. Конкато...
Condorelly — см. Кондорелли — Казанского...
Cone — см. Коуна — Пенфилда...
Conn — см. Фаянса — Конна...
Connors — см. Вишневского — Коннорса...
Conrad — см. Берса — Конрада...
Conradi — см. Конради..., Дригальского — Конради...
Conway — см. Конвея...
Cooley — см. Кули—Уотерстона...
Coombs — см. Кумбса...
Coons — см. Кунса..., Гана — Адамса — Кунса...
Cooper — см. Купера...
Coopernail — см. Купернейла...
Cope — см. Коупа...
Copeman — см. Коупмена...
Corey — см. Полинга — Кори...
Cori — см. Кори...
Corin — см. Корена — Стоккиса...
Coriolis — см. Кориолиса...
Corner — см. Корнера — Аллена...
Cornet — см. Корнета..., Коха — Корнета...
Corrigan — см. Корригена...
Corti — см. Корти..., Кортиев(-а, -ы)...
Corvisart — см. Корвизара...
Cossio — см. Коссио...
Costen — см. Костена...
Cosyns — см. Козинса — Дюре...
Cotard — см. Котара...
Cotugno — см. Котуньо...
Coué — см. Куэизм...
Couinaud — см. Куино...
Coulon — см. Перона — Дроке — Кулона...
Councilman — см. Каунсилмена...
Courtade — см. Куртада...
Courtois — см. Куртуа...
Courvoisier — см. Курвуазье...
Couvelaire — см. Кувелера...
Cowper — см. Купера...
Cox — см. Кокса...
Craigie — см. Крейги — Иена — Феликса...
Cramer — см. Крамера...
Credé — см. Креде..., Матвеева — Креде...
Creutzfeldt — см. Крейтцфельдта — Якоба...
Creveld — см. Гирке — Ван-Кревельда..., Эллиса — Ван-Кревельда...
Crichley — см. Кричли...
Crigler — см. Криглера — Найяра...
Crile — см. Крайла...
Cristesco — см. Клерка — Леви — Кристеско...
Crocker — см. Кроккера — Адамсона...
Crohn — см. Крона...
Cronkhite — см. Кронкхайта — Канада...
Crooke — см. Крука — Апера — Галле...
Crosti — см. Кросты — Джанотти...
Crouzon — см. Крузона..., Ашара — Фуа — Крузона...
Cruveilhier — см. Крювелье — Баумгартена...
Csillag — см. Чиллага...
Cubbins — см. Куббинса...
Cüppers — см. Кюпперса...
Cullen — см. Каллена..., Куллена — Броуна...
Culp — см. Калпа — де Верда...
Cuneo — см. Кюнео...
Curling — см. Курлинга...
Curschmann — см. Куршманна..., Куршманна — Баттена — Штейнерта...
Curtille — см. Бара — Кюртия...
Curtis — см. Крапфа — Куртиса...
Curtius — см. Курциуса...
Cusco — см. Куско...
Cushing — см. Кушинга..., Иценко — Кушинга..., Нейрата — Кушинга...
Cuvier — см. Кювьеров...
Czapek — см. Чапека...
Czermak — см. Чермака...
Czerny — см. Черни..., Черни — Клейншмидта..., Леопольда — Черни...
d'Acosta — см. Д'Акосты...
Dagnini — см. Даньини — Ашнера...
Dahlgren — см. Дальгрена...
Dakin — см. Карреля — Дейкина...
Dale — см. Дейла..., Шультца — Дейла...
Dalén — см. Далена — Фукса...
Dalrymple — см. Дальримпля...
Dalsace — см. Дальзаса — Неттера — Мюссе...
Dalton — см. Дальтона — Сейделла...
Dameshek — см. Эстрена — Дамешека...
Damoiseau — см. Дамуазо..., Эллиса — Дамуазо — Соколова...
Danbolt — см. Данбольта — Клосса...
Dance — см. Данса..., Шиманса — Данса...
Dandy — см. Денди..., Денди — Раздольского..., Денди — Уокера..., Денди — Фрейзера..., Гильдебранда — Денди...
Dane — см. Дейна...
Daniels — см. Даниэлса...
Danlos — см. Элерса — Данлоса...
Danycz — см. Даниша..., Даниша — Исаченко...
Darier — см. Дарье..., Дарье — Русси..., Дарье — Феррана..., Аллопо — Лередда — Дарье...
Darling — см. Дарлинга...
d'Arsonval — см. Д'Арсонваля..., Дарсонвализация...
Dartigues — см. Вебстера — Бальди — Дартига...
Darwin — см. Дарвинов...
Davidsohn — см. Дейвидсона...
Daviel — см. Давиэля...
Davis — см. Дейвиса..., Яновича-Чаинского — Дейвиса...
Davison — см. Досона...
Day — см. Райли — Дея...
de Almeida — см. Альмейды — Лютца — Сплендоре...
de Assis — см. Де Ассиса...
Deaver — см. Дивера...
de Blondin — см. Гийена — Сеза — де Блондена — Вальтера...
Debré — см. Дебре — Фибигера..., Де Тони — Дебре — Фанкони...
de Castro — см. Де Кастро...
de Clérambault — см. Клерамбо..., Кандинского — Клерамбо...
Dees — см. Диса...
de Gennes — см. Де Женна...
Degni — см. Лемоса — Торреса — Деньи...
Degos — см. Дегоса..., Дегоса — Делора — Трико..., Дегоса — Лорта-Жакоба..., Кельмейера — Дегоса...
de Graaf — см. Граафов...
Deicher — см. Ханганциу — Дайхера — Пауля — Буннелля...
Deiters — см. Дейтерса...
Dejan — см. Дежана...
Déjerine — см. Дежерина — Лихтгейма..., Дежерина — Русси..., Дежерина — Сотта..., Дежерина — Сука — Сикара..., Дежерина — Тома..., Ландузи — Дежерина...
Déjerine-Klumpke — см. Дежерин-Клюмпке...
de Kleyn — см. Магнуса — Клейна...
de la Camp — см. Кораньи — де ла Кампа...
Delafield — см. Делафильда...
de Lange — см. Де Ланге..., Брахмана — де Ланге..., Брука — де Ланге...
de la Peña — см. Пенья...
de la Peyronie — см. Пейрони...
Delay — см. Делея — Деникера...
Delbanco — см. Дельбанко..., Дельбанко — Дивансо...
Delbet — см. Дельбе..., Дельбе — Патча..., Дельбе — Пертеса..., Олби — Дельбе...
del Castillo — см. Дель Кастильо..., Аргонса — дель Кастильо...
Delmas — см. Делма...
Delmas-Marsalet — см. Дельма-Марсале...
Delorme — см. Делорма — Миньона..., Рена — Делорма..., Склифосовского — Рена — Делорма — Бира...
Delort — см. Дегоса — Делора — Трико...
Delpech — см. Дельпеша...
del Rio Hortega — см. Ортеги...
de Martel — см. Де Мартеля...
Demel — см. Демеля...
Demmer — см. Деммера...
Demons — см. Демона — Мейгса...
Denig — см. Денига...
Denigès — см. Дениже...
Deniker — см. Делея — Деникера...
Denker — см. Денкера...
Denonvilliers — см. Денонвилльe...
de Pezzer — см. Пеццера...
de Quervain — см. Де Кервена...
Dercum — см. Деркума...
Derrick — см. Деррика..., Деррика — Бернета...
Desault — см. Дезо...
Descemet — см. Десцеметова...
Deschamps — см. Дешана...
Desjardins — см. Дежардена...
Desmarres — см. Демарра...
Desnos — см. Дено...
Desoille — см. Вилларе — Дезуалля...
D'Esopo — см. Д'Эзопо...
D'Espine — см. Д'Эспина...
Despons — см. Портманна — Депона...
Detre — см. Детре...
Deutschländer — см. Дейчлендера...
Deventer — см. Девентеровский...
Devergie — см. Девержи...
Devic — см. Девика...
De Sanctis — см. Де Санктиса — Каккьоне...
de Toni — см. Де Тони — Дебре — Фанкони...
De Vries — см. Де Ври...
de Wecker — см. Де Веккера...
de Weerd — см. Калпа — де Верда...
Dharmendra — см. Дхармендры...
Diamond — см. Даймонда..., Даймонда — Блекфена...
Diaz — см. Диаса...
Dick — см. Дика...
Diday — см. Диде...
Didot — см. Дидо...
Dieffenbach — см. Диффенбаха..., Диффенбаха — Микулича...
Dietrich — см. Смита — Дитриха...
Dieudonné — см. Дьедонне...
Diez — см. Диеса...
Di George — см. Ди Георге...
Di Guglielmo — см. Ди Гульельмо...
Dimitry — см. Вебера — Димитри...
Dimmer — см. Диммера...
Dische — см. Дише...
Disse — см. Диссе...
Dittel — см. Диттеля...

Dittrich — см. Диттриха...
Divry — см. Ван-Богарта — Диври...
Döderlein — см. Дедерлейна...
Döhle — см. Деле — Геллера..., Князькова — Деле...
Doeperi — см. Бауманна — Депери...
Doerfler — см. Дерфлера...
Dogliotti — см. Дольотти..., Дольотти — Вишневского..., Лонгмайера — Дольотти...
Dohi — см. Дохи — Комая...
Dold — см. Дольда...
Doléris — см. Джильяма — Долери...
Doisy — см. Белла — Дойзи — Бриггса...
Dominici — см. Доминичи...
Donaggio — см. Донаджо...
Donath — см. Доната — Ландштейнера...
Donders — см. Дондерса...
Donnelly — см. Доннелли...
Donohue — см. Донохью...
Donovan — см. Донована..., Лейшмана — Донована...
Doose — см. Доозе — Алимовой...
Dopter — см. Доптера...
Dorendorf — см. Дорендорфа...
Dormia — см. Дормиа...
Douglas — см. Дугласа..., Дугласа — Холдейна..., Дугласов(-а, -о)..., Биггс — Дугласа — Макфарлена...
Doukas — см. Дукаса — Капетанакиса...
Dounce — см. Даунса...
Down — см. Дауна...
Downer — см. Апта — Даунера...
Doyen — см. Дуайена...
Doyne — см. Дойна...
Drachter — см. Драхтера...
Drâgânescu — см. Маринеску — Драганеску — Василиу...
Drager — см. Шая — Дрейджера...
Dragstedt — см. Драгстедта..., Драгстедта — Уилсона...
Drechsel — см. Дрекселя...
Drekter — см. Дректера...
Dressler — см. Дресслера...
Dreyer — см. Дрейера...
Dreyfus — см. Дрейфуса...
Drigalski — см. Дригальского..., Дригальского — Конради...
Droquet — см. Перона — Дроке — Кулона...
Drummond — см. Драммонда..., Тальмы — Драммонда...
Duane — см. Дуэйна...
Dubin — см. Дубина — Джонсона...
Dubini — см. Дубини...
Dubois — см. Дюбуа...
Dubois-Reymond — см. Дюбуа-Реймона...
Dubos — см. Мидллбрука — Дюбо...
Duboscq — см. Буэна — Дюбоска — Бразиля...
Dubost — см. Дюбо...
Dubreuilh — см. Дюбрея..., Брока — Дюбрея...
Du Castel — см. Кастеля...
Duchenne — см. Дюшенна..., Дюшенна — Эрба..., Арана — Дюшенна...
Ducrey — см. Дюкрея — Унны..., Петерсена — Дюкрея...
Ducuing — см. Дюкена...
Dührssen — см. Дюрсена...
Duemling — см. Вертера — Вернера — Дюмлинга...
Dürck — см. Дюрка...
Dufaut — см. Дюфо...
Dufourt — см. Дюфура...
Dugas — см. Дугаса...
Duguet — см. Дюге...
Duhamel — см. Дюамеля...
Duhring — см. Дюринга...
Duke — см. Дьюка...
Duncan — см. Дункана...
Dunger — см. Дунгера...
Duperrat — см. Гужеро — Дюперра...
Duplay — см. Дюплея...
Dupré — см. Дюпре...
Dupuy-Dutemps — см. Дюпюи-Дютана...
Dupuytren — см. Дюпюитрена..., Дюпюитрена — Блазиуса...
Durand — см. Дуранда — Дзунина...
Duran-Reynals — см. Дюран-Рейнальса..., Рейнальса...
Durante — см. Порака — Дюранта...
Duret — см. Дюре..., Козинса — Дюре...
Duroziez — см. Дюрозье..., Виноградова — Дюрозье...
Duval — см. Дюваля...
Duverney — см. Дювернея...
Dyke — см. Дайка — Янга..., Элсберга — Дайка...
Eagle — см. Игла...
Eales — см. Илза...
Earle — см. Эрла...
Eaton — см. Итона...
Eberth — см. Эберга...
Ebner — см. Эбнера..., Оуэна — Эбнера...
Ebstein — см. Эбштейна..., Арманни — Эбштейна..., Пеля — Эбштейна...
Ecklin — см. Эклина...
Economo — см. Экономо..., Экономо — Коскинаса..., Экономо — Фишера...
Edebohls — см. Эдебольса...
Eden — см. Эдена — Хюбинетте...
Eder — см. Эдера...
Edinger — см. Эдингера..., Эдингера — Валленберга..., Вестфаля — Эдингера...
Edwards — см. Тьюдора — Эдвардса...
Eggers — см. Эггерса...
Ehlers — см. Элерса — Данлоса...
Ehrlich — см. Эрлиха..., Эрлиха — Бионди..., Эрлиха — Тюрка..., Бионди — Эрлиха — Гейденгайна..., Гейнца — Эрлиха...
Ehrmann — см. Эрманна...
Eicken — см. Эйкена...
Eiger — см. Беквина — Айгера...
Einthoven — см. Эйнтховена...
Eiselsberg — см. Эйзельсберга..., Витцеля — Айзельсберга...
Eisenlohr — см. Эйзенлора...
Eisenmenger — см. Эйзенменгера...
Ekbom — см. Экбома...
Ekman — см. Лобштейна — Экмана...
Elliot — см. Эллиота...
Ellis — см. Эллиса — Ван-Кревельда..., Эллиса — Дамуазо — Соколова..., Гурлер — Эллиса..., Пфаундлера — Гурлер — Эллиса...
Ellison — см. Золлингера — Эллисона...
Elsberg — см. Элсберга — Дайка...
Elschnig — см. Эльшнига..., Адамюка — Эльшнига...
Elvehjem — см. Поттера — Эльвейема...
Emerson — см. Шефера — Эмерсона — Айви...
Emmet — см. Эммета...
Endo — см. Эндо...
Engel — см. Энгеля..., Энгеля — Реклингхаузена...
Engelmann — см. Камурати — Энгельманна...
Engman — см. Энгмена — Коула...
Enroth — см. Энрота, Зенгера — Энрота...
Eränkö — см. Эренке...
Erb — см. Эрба..., Эрба — Ферстера — Барре — Левенштейна..., Эрба — Шарко — Штрюмпелля..., Боткина — Эрба..., Дюшенна — Эрба...
Erben — см. Эрбена...
Erdheim — см. Эрдгейма..., Эрдгейма — Штумме...
Erichsen — см. Эриксена...
Erlacher — см. Эрлахера..., Бланта — Эрлахера — Биезиня — Барбера...
Erlanger — см. Эрлангера..., Эрлангера — Блекмена...
Erni — см. Эрни...
Ernst — см. Бабеша — Эрнста...
Esbach — см. Эсбаха...
Eskuchen — см. Эскухена...
Esmarch — см. Эсмарха..., Эсмарха — Лангенбека...
Estlander — см. Эстландера...
Estren — см. Эстрена — Дамешека...
Eulenburg — см. Эйленбурга...
Eustachio — см. Евстахиева...
Evans — см. Эванса..., Ллойда — Эванса...
Eversbusch — см. Эверсбуша...
Ewald — см. Эвальда..., Боаса — Эвальда...
Ewart — см. Эварта..., Юэрта..., Юэрта — Тессье...
Ewing — см. Юинга...
Eykman — см. Эйкмана...
Faber — см. Гайема — Фабера...
Fabre — см. Фабра...
Fabry — см. Фабри...
Faget — см. Фаже...
Fahr — см. Фара...
Fairbank — см. Фейрбанка...
Fajans — см. Фаянса — Конна...
Fajersztajn — см. Бехтерева — Файерштайна...
Fallopius — см. Фаллопиев(-а)...
Fallot — см. Фалло...
Falta — см. Фальты..., Гужеро — Фальты...
Fanconi — см. Фанкони..., Фанкони — Шлезингера..., Абдергальдена — Фанкони..., Аристовского — Фанкони..., Висслера — Фанкони..., Де Тони — Дебре — Фанкони..., Линьяка — Фанкони...
Farabeuf — см. Фарабефа...
Farnsworth — см. Фарнсуорта...
Farrant — см. Фарранта...
Farre — см. Фарра — Вальдейера...
Fauchard — см. Фошара...
Faust — см. Фауста...
Favre — см. Фавра — Ракушо..., Фавра — Ше..., Никола — Фавра...
Fechner — см. Фехнера..., Вебера — Фехнера...
Fede — см. Риги — Феде...
Federici — см. Льюиса — Федеричи..., Политцера — Федеричи...
Feer — см. Феера..., Зельтера — Свифта — Феера...
Fehr — см. Фера...
Feigenbaum — см. Фейгенбаума...
Feil — см. Клиппеля — Фейля...
Felix — см. Вейля — Феликса..., Крейги — Иена — Феликса...
Fell — см. Фелла...
Feltin — см. Фельтина — Белера...
Felty — см. Фелти...
Fenger — см. Фенгера...
Fenz — см. Фенца...
Feragut — см. Ферагута..., Ферагута — Крейнбюля...
Ferguson — см. Фергюсона — Хука...
Fergusson — см. Фергессона...
Ferrand — см. Дарье — Феррана...
Ferraro — см. Феррaро — Ван-Богарта — Ниссена...
Ferrein — см. Феррейна...

Ferreira-Marques — см. Феррейра-Маркиша...
Ferreri — см. Феррери...
Ferreti — см. Феррети...
Feulgen — см. Фейльгена...
Fevold — см. Фиволда...
Fibiger — см. Дебре — Фибигера...
Fick — см. Фика...
Fiedler — см. Фидлера..., Абрамова — Фидлера...
Fieschi — см. Фиески...
Fildes — см. Файлдса...
Filipowicz — см. Филиповича...
Finderle — см. Финдерле...
Fink — см. Финка...
Finney — см. Финнея...
Finochietto — см. Финокьетто...
Finsen — см. Финсена...
Finsterer — см. Финстерера..., Гофмейстера — Финстерера...
Fischer — см. Фишера..., Фишера — Брюгге..., Бушке — Фишера..., Водака — Фишера..., Смита — Фишера..., Тальхаймера — Фишера..., Экономо — Фишера...
Fischer-Wasels — см. Фишер-Вазельса...
Fisher — см. Фишера..., Фишера — Эванса...
Flack — см. Киса — Флека..., Хилла — Флека...
Flajani — см. Флаяни...
Flatau — см. Флатау..., Редлиха — Флатау...
Flechsig — см. Флексига...
Fleischer — см. Кайзера — Флейшера...
Fletcher — см. Флетчера...
Flexner — см. Флекснера...
Flint — см. Флинта...
Florence — см. Флоранса...
Florey — см. Флори...
Fölling — см. Феллинга...
Foerster — см. Ферстера..., Ферстера — Абби..., Эрба — Ферстера — Барре — Левенштейна...
Foix — см. Фуа..., Фуа — Алажуанина..., Фуа — Иллемана..., Фуа — Тевенара..., Фуа — Шавани — Иллемана..., Ашара — Фуа — Крузона..., Бехтерева — Мари — Фуа..., Мари — Фуа..., Мари — Фуа — Алажуанина...
Fol — см. Фоля...
Foley — см. Фолея..., Померанцева — Фолея..., Швайцера — Фолея...
Folger — см. Фольгера...
Folhard — см. Фольгарда...
Folli — см. Фоллиев...
Fonio — см. Фонио...
Fonnesu — см. Гринспана — Фоннезю...
Fontana — см. Фонтаново...
Forbes — см. Форбса..., Форбса — Олбрайта...
Forchheimer — см. Форхгеймера...
Fordyce — см. Фордайса..., Фокса — Фордайса...
Forel — см. Фореля...
Forgue — см. Форга...
Forney — см. Форни...
Forssman — см. Форссмана..., Берьесона — Форссмана — Леманна...
Fortner — см. Фортнера...
Fouchet — см. Гаррисона — Фуше...
Fournier — см. Фурнье..., Робинсона — Фурнье...
Foville — см. Фовилля...
Fowler — см. Фаулера...
Fox — см. Фокса..., Фокса — Фордайса...
Fränkel — см. Френкеля..., Заблоцкого — Десятовского — Френкеля...
Francke — см. Франке...
Franceschetti — см. Франческетти..., Франческетти — Цвалена..., Франческетти — Ядассона...
Francis — см. Франсиса...
François — см. Франсуа..., Халлермана — Штрайффа — Франсуа...
Frangenheim — см. Гебелля — Франгенгейма — Штеккеля...
Frank — см. Франка..., Франка — Левинсона...
Frankel — см. Райтмана — Френкеля...
Frankenhäuser — см. Франкенгейзера...
Frankl-Hochwart — см. Франкль-Хохварта...
Frantzel — см. Францеля...
Franz — см. Франца...
Fraser — см. Денди — Фрейзера...
Frazier — см. Спиллера — Фрейзера — Адсона...
Fredericq — см. Фредерика...
Fredet — см. Фреде — Рамштедта...
Fregoli — см. Фреголи...
Freiberg — см. Фрейберга...
Frejka — см. Фрейки...
Frenckner — см. Френкнера...
Frenkel — см. Бордье — Френкеля...
Freudenthal — см. Фрейденталя...
Freund — см. Фрейнда...
Frey — см. Фрей..., Фрей — Байярже..., Фрея...
Freyer — см. Фрейера...
Frick — см. Фрика...
Friderichsen — см. Уотерхауса — Фридериксена...
Friedländer — см. Фридлендера..., Фридлендеровская...
Friedmann — см. Фридманна...
Friedreich — см. Фридрейха...
Friedrich — см. Фридриха...
Frisch — см. Фриша..., Фриша — Волковича...
Fritsch — см. Фрича...
Fröhlich — см. Фрелиха..., Пехкранца — Бабинского — Фрелиха...
Fröschels — см. Фрешельса..., Фрешельса — Цемаха...
Froin — см. Фруэна..., Фруэна — Нонне...
Froment — см. Фромана — Вегелина..., Бабинского — Фромана...
Frommel — см. Киари — Фроммеля...
Frostberg — см. Фростберга...
Fucala — см. Фукалы...
Fuchs — см. Фукса..., Далена — Фукса...
Fülleborn — см. Фюллеборна...
Fürbringer — см. Фюрбрингера...
Fürth — см. Фюрта...
Gabastou — см. Габасту..., Габасту — Мойона...
Gabriel — см. Габриэля...
Gaenslen — см. Генслена...
Gärtner — см. Гертнера...
Gaillard — см. Гайяра...
Gaisböck — см. Гайсбека...
Galassi — см. Галасси...
Galeati — см. Галеати...
Galeazzi — см. Галеацци...
Galenus — см. Галена..., Галенова(-ы)..., Галена — Шрейера...
Galezowski — см. Галезовского — Парино...
Gallais — см. Апера — Галле..., Крука — Апера — Галле...
Gallavardin — см. Галлавардена...
Galli-Mainini — см. Галли-Майнини...
Galton — см. Гальтона...
Gammel — см. Гаммела...
Gamna — см. Ганди — Гамны...
Gamstorp — см. Гамсторп...
Gandy — см. Ганди — Гамны...
Ganser — см. Ганзера...
Gant — см. Ганта...
Garbe — см. Сульцбергера — Гарбе...
Garcia — см. Гарсии — Соджерса...
Gardner — см. Гарднера...
Garengeot — см. Гаранжо...
Garland — см. Гарленда..., Бланда — Уайта — Гарленда..., Маринеску — Шегрена — Гарленда...
Garlock — см. Гарлока...
Garré — см. Гарре...
Garsin — см. Гарсена...
Gartner — см. Гартнеров...
Gask — см. Гаска — Росса...
Gaskell — см. Гаскелла — Греффа...
Gasperini — см. Гасперини...
Gasser — см. Гассера..., Гассера — Каррера..., Гассеров...
Gastaut — см. Гасто...
Gate — см. Гате — Папакостаса...
Gaucher — см. Гоше...
Gauer — см. Генри — Гауэра...
Gauss — см. Иванова — Гаусса..., Уиллетта — Иванова — Гаусса...
Gaussel — см. Грассе — Госселя — Гувера...
Gaustad — см. Гаустада...
Gavard — см. Гаварова...
Gayet — см. Гайе..., Гайе — Вернике...
Gee — см. Ги — Гертера — Гейбнера...
Geigel — см. Гейгеля...
Gelineau — см. Желино...
Gellé — см. Желле...
Gendré — см. Жандре...
Gendrin — см. Жандрена..., Вебера — Гюблера — Жандрена...
Gengou — см. Борде — Жангу...
Gennari — см. Дженнариевы...
Gennes — см. Де Женна...
Georgi — см. Закса — Георги...
Gerbasi — см. Гербази...
Gerdy — см. Жерди...
Gerhardt — см. Герхардта...
Gerlach — см. Герлаха...
Gerlier — см. Жерлье...
Germe — см. Бамбергера — Герме...
Gerota — см. Героты...
Gerstmann — см. Герстманна...
Gersuny — см. Гершуни...
Ghon — см. Гона...
Giaccai — см. Джиаккаи...
Giacobini — см. Паолуччи — Джакобини...
Giacomini — см. Джакомини...
Giannini — см. Джаннини...
Gianotti — см. Крости — Джанотти...
Giannuzzi — см. Джаннуцци...
Gibbon — см. Лендиса — Гиббона...
Gibert — см. Жибера...
Gibson — см. Гибсона..., Гибсона — Каплана...
Gigli — см. Джильи...
Giemsa — см. Гимзы..., Романовского — Гимзы...
Gierke — см. Гирке..., Гирке — Ван-Кревельда..., Гирке — Вирхова...
Gifford — см. Гиффорда..., Гиффорда — Галасси...
Gilbert — см. Жильбера..., Жильбера — Ано..., Жильбера — Лербулле..., Жильбера — Мейленграхта...
Gilchrist — см. Гилкриста...
Gilford — см. Гилфорда..., Гетчинсона — Гилфорда...
Gilles de la Tourette — см. Жилль де ла Туретта...
Gillespie — см. Гиллеспи...
Gilliam — см. Джильяма — Долери...
Gimbernat — см. Гимбернатова...
Gins — см. Гинса...
Giovanetti — см. Джованетти...
Giraldés — см. Жиральдесов...

Girard — см. Жирара..., Жирара — Зика..., Жирара — Мартынова..., Готтштейна — Жирара...
Giraud — см. Пейана — Жиро...
Glanzmann — см. Гланцманна — Негели..., Гланцманна — Риникера...
Glasgow — см. Глазго...
Glaser — см. Глазера..., Глазерова...
Glass — см. Гласса..., Гласса — Бойда...
Gleason — см. Глисона — Браунвальда...
Glénard — см. Гленара...
Glisson — см. Глиссонова...
Gluck — см. Глюка...
Gmelin — см. Гмелина...
Gnudi — см. Гнуди...
Gocht — см. Гохта..., Фелпса — Гохта...
Godélier — см. Годелье — Ремленже..., Говорова — Годелье...
Godon — см. Годона...
Goebell — см. Гебелля — Франгенгейма — Штеккеля...
Goiffon — см. Гуаффона — Ру...
Goldberger — см. Гольдбергера...
Goldblatt — см. Гольдблатта...
Goldenhar — см. Гольденхара...
Goldflam — см. Вестфаля — Гольдфлама...
Golgi — см. Гольджи..., Гольджи — Маццони...
Goldmann — см. Гольдманна...
Goldscheider — см. Гольдшейдера...
Goldzieher — см. Гольдциера...
Goll — см. Голля...
Goltz — см. Гольтца — Горлина...
Gombault — см. Гомбо..., Гомбо — Филиппа...
Gomori — см. Гомори...
Goodell — см. Гуделла...
Goodpasture — см. Гудпасчера...
Goormaghtigh — см. Гормагтига...
Gopalan — см. Гопалана...
Gordon — см. Гордона...
Gorham — см. Горхема...
Gorlin — см. Гольтца — Горлина...
Gottfried — см. Готтфрида — Раппорта...
Gottron — см. Готтрона...
Gottstein — см. Готтштейна..., Готтштейна — Жирара...
Gougerot — см. Гужеро..., Гужеро — Блюма..., Гужеро — Бюрнье..., Гужеро — Дюперра..., Гужеро — Карто..., Гужеро — Фальты..., Гужеро — Хейли — Хейли..., Гужеро — Шегрена..., Каравена — Гужеро...
Gowers — см. Говерса..., Говерса — Веландера..., Говерса — Патона — Кеннеди...
Goy — см. Вейнберга — Гоя...
Graaf — см. Граафов...
Gradenigo — см. Градениго...
Graefe — см. Грефе..., Вальдау — Грефе..., Грефе — Шегрена...
Gräff — см. Греффа..., Гаскелла — Греффа...
Gräter — см. Гретера...
Graf — см. Графа...
Graffi — см. Граффи...
Graham — см. Грэма..., Грэма — Кнолля...
Graham Steell — см. Грэма Стилла...
Gram — см. Грама...
Grancher — см. Гранше...
Grandry — см. Грандри...
Graser — см. Гразера...
Grasset — см. Грассе..., Грассе — Быховского..., Грассе — Госселя — Гувера...
Gratia — см. Грациа...
Gratiolet — см. Грасиоле..., Грасиолетов...
Grauhan — см. Граухана...
Gray — см. Грея...
Graves — см. Грейвса..., Грейвса — Бруна...
Grawitz — см. Гравитца...
Gregersen — см. Грегерсена...
Gregg — см. Грегга...
Grégoire — см. Грегуара..., Шевассю — Грегуара...
Green — см. Грина — Берковича...
Greenblatt — см. Гринблатта — Хартмена...
Greene — см. Грина...
Greenfield — см. Гринфилда..., Гринфилда — Патнема..., Шольца — Гринфилда...
Greenspan — см. Гринспана — Фоннезю...
Greifensteiner — см. Грейфенштейнера...
Greig — см. Грега...
Grenouw — см. Греноува...
Greppi — см. Греппи — Вилла..., Риетти — Греппи — Микели...
Grigaut — см. Григо...
Griesinger — см. Гризингера..., Гризингера — Куссмауля...
Grimbert — см. Гремберa..., Гремберa — Виноградовой..., Гремберa — Мореля...
Grinstedt — см. Гринстедта...
Grisel — см. Гризеля...
Grisolle — см. Гризолля...
Gritti — см. Гритти..., Гритти — Шимановского...
Grob — см. Гроба...
Grocco — см. Грокко — Раухфуса...
Groenblad — см. Гренблад — Страндберга...
Groendahl — см. Грендаля...
Grof — см. Ендрашика — Клегхорна — Грофа...
Grollman — см. Гроллмена...
Gros — см. Бильшовского — Грос — Лаврентьева...
Grossich — см. Гроссиха...
Grossman — см. Гроссмана...
Grott — см. Гротта...
Gruber — см. Грубера...
Gruca — см. Груцы...
Grünwald — см. Грюнвальда...
Grütz — см. Бюргера — Грютца...
Grunert — см. Грунерта...
Grynfelt — см. Гринфельта — Лесгафта...
Gsell — см. Буше — Гзелля...
Guarnieri — см. Гуарниери...
Gubler — см. Гюблера..., Вебера — Гюблера — Жандрена..., Мийяра — Гюблера...
Gudden — см. Гуддена...
Guéneau de Mussy — см. Гено де Мюсси..., Георгиевского — Мюсси...
Guglielmo — см. Ди Гульельмо...
Günther — см. Гюнтера...
Güntz — см. Гюнтца...
Günzburg — см. Гюнцбурга...
Guérin — см. Герена..., Геренова..., Кальметта — Герена...
Guidi (Vidius) — см. Видиев..., Видиева...
Guillain — см. Гийена — Алажуанина — Матье..., Гийена — Барре..., Гийена — Либера..., Гийена — Сеза — де Блондена — Вальтера..., Гийена — Триумфова..., Мари — Гийена...
Guinard — см. Гинара...
Guist — см. Гвиста..., Гвиста — Линднера..., Адамюка — Рельмана — Гвиста...
Guleke — см. Гулеке...
Gull — см. Галла..., Аддисона — Галла...
Gumprecht — см. Гумпрехта..., Боткина — Гумпрехта...
Gunn — см. Гунна..., Маркуса — Гунна, Салюса — Гунна...
Gunner — см. Гуннеровская...
Gupta — см. Чопры — Гупты...
Guthrie — см. Гатри...
Gutman — см. Гутман — Гутмана...
Guttmann — см. Гуттманна...
Gutzeit — см. Гутцейта...
Gutzmann — см. Гутцманна...
Guyon — см. Гюйона..., Гюйона — Пасто..., Альбаррана — Гюйона...
Gwathmey — см. Гватмея...
Gyergyai — см. Дьёрдьяи...
Haab — см. Гааба...
Haase — см. Гаазе...
Haber — см. Габера...
Habermann — см. Гоффманна — Габерманна...
Haberer — см. Габерера...
Haberland — см. Хаберланда...
Hacker — см. Гаккера..., Гаккера — Брауна..., Гаккера — Леневича..., Гаккера — Петерсена..., Бека — Гаккера..., Яценко — Гаккера...
Haeckel — см. Геккеля..., Мюллера — Геккеля...
Haegler — см. Хеглера...
Haendly — см. Гендли...
Haenel — см. Генеля...
Härtel — см. Гертеля..., Шмидена — Гертеля...
Hässlin — см. Гесслина...
Hagedorn — см. Хагедорна...
Hageman — см. Хагемана...
Haglund — см. Хаглунда — Шинца...
Hahn — см. Гана..., Гана — Адамса — Кунса...
Haidinger — см. Гайдингера...
Hailey — см. Хейли — Хейли..., Гужеро — Хейли — Хейли...
Hajek — см. Гаека...
Hakim — см. Хакима...
Halban — см. Гальбана — Тандлера...
Haldane — см. Дугласа — Холдейна...
Hall — см. Холла...
Halle — см. Галле...
Haller — см. Галлера...
Hallermann — см. Халлерманна — Штрайффа — Франсуа...
Hallervorden — см. Галлервордена — Шпатца...
Hallopeau — см. Аллопо..., Аллопо — Лередда — Дарье...
Halsted — см. Холстеда..., Холстеда — Германна...
Ham — см. Хэма...
Hamburger — см. Амбюрже..., Гамбургера...
Hamilton — см. Хамилтона..., Стюарта — Хамилтона...
Hamman — см. Хаммена..., Хаммена — Рича...
Hammar — см. Гаммара...
Hamperl — см. Гамперля...
Hampton — см. Хемптона...
Hand — см. Хенда — Шюллера — Крисчена...
Hanganutiu — см. Ханганутиу — Дайхера — Пауля — Буннелля...
Hanhart — см. Хангарта...
Hanlon — см. Ханлона — Блелока...
Hanot — см. Ано..., Жильбера — Ано..., Труазье — Ано — Шоффара...
Hansen — см. Ганзена..., Гансена...
Hara — см. Хары...
Harada — см. Харады — Мори...
Hardy — см. Арди — Горчакова..., Харди — Вейнберга...
Hare — см. Хейра...

Hargraves — см. Харгрейвса...
Harkavy — см. Харкави...
Harken — см. Харкена...
Harley — см. Гарлея...
Harris — см. Гарриса — Бенедикта..., Харриса — Гринчака..., Ванга — Харриса...
Harrison — см. Гаррисона..., Гаррисона — Фуше..., Гаррисонова...
Hartings — см. Гартингса...
Hartley — см. Хартли — Краузе...
Hartman — см. Гриндлатта — Хартмена...
Hartmann — см. Хартманна...
Hartnup — см. Хартнупа...
Harzer — см. Харцера...
Hashimoto — см. Хасимото...
Hasner — см. Гаснера...
Hass — см. Гасса...
Hassall — см. Гассаля...
Hasselwander — см. Гассельвандера...
Hata — см. Хаты...
Haudek — см. Гаудека...
Hauffe — см. Гауффе...
Haug — см. Хауга...
Haurowitz — см. Хауровитца...
Hauss — см. Оберста — Лена — Хаусса...
Hautant — см. Отана...
Havers — см. Гаверсов..., Гаверсова(-ы)...
Haxthausen — см. Хакстхаусена..., Блегвада — Хакстхаусена...
Hay — см. Гея...
Hayem — см. Гайема..., Гайема — Видаля..., Гайема — Фабера..., Якша — Гайема...
Hayward — см. Аллена — Хейуэрда — Пинто...
Head — см. Геда..., Геда — Риддоха..., Геда — Шеррена..., Захарьина — Геда...
Heberden — см. Гебердена...
Hebra — см. Гебры..., Гебры — Капоши...
Hecht — см. Гехта...
Hedblom — см. Хедблома...
Heerfordt — см. Хеерфордта...
Heermann — см. Геермана...
Hegar — см. Хегара...
Hegglin — см. Хегглина...
Heidelberger — см. Хайдельбергера...
Heidenhain — см. Гейденгайна..., Бионди — Эрлиха — Гейденгайна..., Вюльпиана — Гейденгайна...
Heilbronner — см. Гейльброннера...
Heile — см. Гейле...
Heim — см. Хейма..., Хейма — Крейсига...
Heine — см. Гейне — Медина...
Heineke — см. Гейнеке — Микулича...
Heinsius — см. Гейнсиуса...
Heinz — см. Гейнца..., Гейнца — Эрлиха...
Heister — см. Гейстера...
Helber — см. Гельбера...
Held — см. Гельда..., Гельда — Ауэрбаха...
Heller — см. Геллера..., Деле — Геллера...
Helly — см. Гелли...
Helmholtz — см. Гельмгольца..., Ломоносова — Юнга — Гельмгольца..., Юнга — Гельмгольца...
Helweg — см. Гельвега...
Hempel — см. Гемпеля...
Henkel — см. Генкеля — Вастена...
Henle — см. Генле..., Генле — Уитмена..., Микулича — Генле...
Henneberg — см. Геннеберга..., Левенфельда — Геннеберга...
Hennebert — см. Эннебера...
Hennequin — см. Эннекена...
Henoch — см. Геноха..., Шенлейна — Геноха...
Henry — см. Генри — Адсона..., Генри — Гауэра...
Hensen — см. Гензена...
Hepp — см. Вагнера — Унферрихта — Хеппа...
Herbert — см. Герберта...
Herbst — см. Гербста...
Hering — см. Геринга..., Геринга — Брейера..., Траубе — Геринга...
Herman — см. Германа...
Hermann — см. Германна..., Холстеда — Германна...
Herophilus — см. Герофила...
Hers — см. Герса...
Herschel — см. Гершеля...
Hershberger — см. Гершбергера...
Herter — см. Ги — Гертера — Гейбнера..., Гейбнер-гертеровская...
Hertwig — см. Гертвига — Мажанди..., Гертвиговское...
Herxheimer — см. Герксгеймера...
Herzfeld — см. Герцфельда...
Heschl — см. Гешля...
Hess — см. Гесса...
Hesselbach — см. Гессельбаха...
Hessing — см. Гессинга...
Hetsch — см. Гетша...
Heubner — см. Гейбнера..., Гейбнер-гертеровская..., Гейбнеровский..., Ги — Гертера — Гейбнера...
Heuser — см. Гейзерова...
Heyrovský — Гейровского...
Hibbs — см. Гиббса...
Hicks — см. Гикса...
Higashi — см. Чедиака — Хигаси...
Highmore — см. Гайморова..., Гайморово...
Higoumenakis — см. Авситидийского — Игуменакиса...
Hildebrand — см. Гильдебранда..., Гильдебранда — Денди...
Hilgenreiner — см. Хильгенрейнера...
Hill — см. Хилла..., Хилла — Тесье..., Хилла — Флека...
Hillemand — см. Фуа — Иллемана..., Фуа — Шавани — Иллемана...
Himly — см. Гимли...
Hinsberg — см. Гинзберга...
Himswort — см. Химсворта...
Hines — см. Хайнеса — Брауна...
Hippel — см. Гиппеля..., Гиппеля — Линдау...
Hippocratés — см. Гиппократа...
Hirsch — см. Гирша..., Гирша — Сегуры...
Hirschberg — см. Гиршберга..., Мариеску — Гиршберга...
Hirschfeld — см. Гиршфельда...
Hirschsprung — см. Гиршспрунга..., Фавалли — Гиршспрунга...
Hirtz — см. Хирца...
His — см. Гиса..., Вернера — Гиса...
Hiss — см. Гисса...
Hitzenberger — см. Гитценбергера...
Hitzig — см. Гитцига...
Hochsinger — см. Гохзингера...
Hodge — см. Годжа...
Hodgkin — см. Ходжкина...
Hoeftmann — см. Гофтманна...
Höpfner — см. Гепфнера...
Hörtel — см. Брауна — Гертеля...
Hövels — см. Петерс — Хевельса...
Hofbauer — см. Хофбауэра..., Кащенко — Хофбауэра...
Hoffa — см. Гоффы..., Гоффы — Лоренца...
Hoffmann — см. Гоффманна..., Гоффманна — Габерманна..., Верднига — Гоффманна...
Hofmann-Wellenhof — см. Гофманна...
Hofmeier — см. Гофмейера — Мюллера...
Hofmeister — см. Гофмейстера..., Гофмейстера — Финстерера...
Hoigné — см. Уанье...
Holdane — см. Холдейна...
Holländer — см. Холлендера — Симонса...
Holmes — см. Холмса..., Эйди — Холмса...
Holmgren — см. Хольмгрена...
Holt — см. Холта — Орама...
Holter — см. Холтера...
Holth — см. Хольта..., Лагранжа — Хольта — Филатова...
Hollo — см. Голло...
Holtz — см. Гольтца...
Holzer — см. Хольцера...
Holzknecht — см. Гольцкнехта..., Гольцкнехта — Якобсона...
Homans — см. Гоманса...
Hook — см. Фергюсона — Хука...
Hoorweg — см. Горвега — Вейсса...
Hoover — см. Гувера..., Грассе — Госселя — Гувера...
Hope — см. Хоупа...
Hopkins — см. Гопкинса..., Адамкевича — Гопкинса — Коля...
Hoppe — Seyler — см. Гоппе — Зейлера...
Horn — см. Хорна...
Horner — см. Горнера..., Бернара — Горнера...
Horsley — см. Хорсли..., Хорсли — Кларка...
Hortega del Rio — см. Ортеги...
Horton — см. Хортона — Магата — Брауна...
Hottinger — см. Хоттингера...
Hotz — см. Готца...
Houston — см. Хаустона...
Howard — см. Говарда..., Говарда — Рапопорта...
Howat — см. Хауата...
Howell — см. Хауэлла...
Howship — см. Гаушипа...
Hozay — см. Ван-Богарта — Озе...
Hryntschak — см. Гринчака...
Huchard — см. Юшара...
Huddleson — см. Хаддлсона...
Hudovernig — см. Гудовернига...
Hudson — см. Брукса — Хадсона — Кея...
Hübscher — см. Гюбшера...
Huët — см. Пельгера — Хюэта...
Hürthle — см. Гюртле...
Hug — см. Хага...
Hughes — см. Хьюза...
Hummelsheim — см. Гуммельсгейма — О'Коннора...
Hunt — см. Ханта..., Рамзая — Ханта...
Hunter — см. Гунтера..., Гунтера — Шрегера..., Гунтеров(-а)..., Гунтеровский..., Гурлер — Пфаундлера — Гунтера..., Меллера — Гунтера..., Ройла — Хантера...
Huntington — см. Гентингтона...
Huppert — см. Гупперта — Сальковского...
Hurler — см. Гурлер..., Гурлер — Пфаундлера — Гунтера..., Гурлер — Эллиса..., Пфаундлера — Гурлер..., Пфаундлера — Гурлер — Эллиса...
Hutchinson — см. Гетчинсона..., Гетчинсона — Гилфорда..., Гетчинсона — Тея...
Hutinel — см. Ютинеля...
Hybinette — см. Эдена — Хюбинетте...
Hyde — см. Гайда...
Hynes — см. Андерсона — Хайнса...

Jaboulay — см. Жабуле..., Бриана — Жабуле...
Jaccoud — см. Жакку...
Jackson — см. Джексона..., Джексоновская(-ий)..., Вурфбайна — Джексона...
Jacobaeus — см. Якобеуса...
Jacobi — см. Якоби...
Jacobovici — см. Якобовичи...
Jacobsohn — см. Якобсона — Ласка..., Бехтерева — Якобсона...
Jacobson — см. Якобсона..., Якобсонов..., Гольцкнехта — Якобсона...
Jacod — см. Жако..., Жако — Негри...
Jadassohn — см. Ядассона..., Ядассона — Левандовского..., Борста — Ядассона..., Негели — Блоха — Ядассона..., Франческетти — Ядассона...
Jaeger — см. Егера..., Егера — Эльшнига..., Бона — Егера...
Jäker — см. Екера...
Jaffé — см. Яффе...
Jager — см. Ягера — Кинга...
Jagič — см. Ягича...
Jakob — см. Якоба..., Якоба — Крейтцфельдта...
Jaksch — см. Якша — Гайема...
James — см. Джеймса..., Джеймса — Ланге...
Janbon — см. Жанбона...
Janet — см. Жане...
Janeway — см. Джейнуэя..., Джейнуэя — Мозенталя...
Jansen — см. Янсена..., Риттера — Янсена...
Jansky — см. Бильшовского — Янского...
Jarisch — см. Яриша..., Яриша — Киари...
Jaspers — см. Ясперса...
Jeanselme — см. Жансельма — Лютца...

Jeghers — см. Пейтца — Егерса..., Пейтца — Турена — Егерса...
Jellinek — см. Еллинека...
Jendrassik — см. Ендрашика..., Ендрашика — Клегхорна — Грофа...
Jenkins — см. Дженкинса...
Jenner — см. Дженнера...
Jensen — см. Йенсена...
Jergason — см. Ергасона...
Jerne — см. Ерне...
Jerwell — см. Джеруэлла — Ланге-Нилсена...
Jianu — см. Жиану — Гальперна...
Jirásek — см. Ирасека — Цюльцера — Уилсона...
Jist — см. Джиста...
Jobert de Lamballe — см. Жобера...
Joel — см. Жоэля...
Joffroy — см. Жоффруа...
Johanson — см. Иогансона...
Johansson — см. Ларсена — Юхансона...

Johnson — см. Джонсона — Керби..., Дубина — Джонсона..., Стивенса — Джонсона...
Johnstone — см. Джонстона...
Joliot-Curie — см. Кюри-терапия...
Jolles — Йоллеса-Хааса...
Jolly — см. Жолли...
Jones — см. Киселя — Джонса — Нестерова...
Jonescu — см. Йонеску...
Jordan — см. Йордана...
Jores — см. Йореса...
Joseph — см. Йозефа...
Joshida — см. Мурахаси — Иосиды...
Josseraud — см. Жоссро...
Joyet-Lavergne — см. Жуайе-Лаверня...
Joz — см. Йоза — Стерлинга...
Jürgens — см. Виллебранда — Юргенса...
Juliusberg — см. Капоши — Юлиусберга...
Junet — см. Труэлля — Жюне...
Jung — см. Юнга..., Юнгова...
Jungling — см. Юнглинга..., Морозова — Юнглинга...
Junius — см. Кунта — Юниуса...
Just — см. Юста...
Juster — см. Жюстера...
Juvara — см. Ювары...
Ibrahim — см. Бека — Ибрагима...
Ignatowsca — см. Карлсона — Игнатовской...
Ilca — см. Ильки...
Ilosvay — см. Илошвai...
Ingraham — см. Ингрехема...
Irgang — см. Капоши — Ирганга...
Iselin — см. Излена..., Беста — Излена...
Israel — см. Бергманна — Израэля...
Israëls — см. Израэльса — Уилкинсона...
Ito — см. Ито...
Ivanissevich — см. Иванисевича...
Ivemark — см. Ивемарка...
Ivy — см. Шефера — Эмерсона — Айви...
Kabat — см. Кабата...
Kader — см. Кадера..., Штамма — Сенна — Кадера...
Kafka — см. Кафки..., Якобсталя — Кафки...
Kahlbaum — см. Кальбаума...
Kahler — см. Калера..., Рустицкого — Калера...
Kahn — см. Кана...
Kaiserling — см. Кайзерлинга...
Kalb — см. Кальба...
Kalitowski — см. Калитовского...
Kalk — см. Кача — Калька...
Kanavel — см. Канавела...
Kanner — см. Каннера...
Kapetanakis — см. Дукаса — Капетанакиса...
Kaposi — см. Капоши..., Капоши — Ирганга..., Капоши — Либмана — Сакса..., Капоши — Юлиусберга.., Гебры — Капоши...
Kappeler — см. Каппелера...
Kappis — см. Капписа...
Kardos — см. Кардоса..., Паппенгейма — Кардоса...
Karlson — см. Карлсона — Игнатовской...
Karrer — см. Гассера — Каррера...
Kartagener — см. Картагенера...
Kasabach — см. Казабаха — Мерритт...
Kast — см. Каста..., Олье — Каста...
Katoh — см. Като...
Katsch — см. Кача — Калька...
Katz — см. Катца — Вахтеля...
Katzenstein — см. Катценштейна...
Kauffmann — см. Кауффманна...
Kaufmann — см. Кауфманна..., Абдергальдена — Кауфманна — Линьяка...
Kausch — см. Кауша...
Kay — см. Кея...
Kayser — см. Кайзера — Флейшера...
Keen — см. Кина...
Keetley — см. Китли — Торека — Герцена...
Kehr — см. Кера...
Kehrer — см. Керера...
Keith — см. Киса — Флека...
Kelling — см. Келлинга — Мадленера...
Kelly — см. Келли..., Патерсона — Келли...
Kemp — см. Кемпа...
Kendrick — см. Кендрика...
Kennedy — см. Кеннеди..., Кеннеди — Уортиса..., Говерса — Патона — Кеннеди...
Kent — см. Кента...
Kepler — см. Кеплера — Пауэра — Робинсона...
Kerckring — см. Керкринга...
Kerley — см. Керли...
Kerr — см. Керра...
Kestenbaum — см. Кестенбаума...
Kettesey — см. Кеттеси...
Kety — см. Кети..., Кети — Шмидта...
Key — см. Кея..., Брукса — Хадсона — Кея...
Kjeldahl — см. Кьельдаля...
Kiefer — см. Кифера...
Kielland — см. Килланда...
Kienböck — см. Кинбека...
Kiesselbach — см. Киссельбахово...
Killian — см. Киллиана...
Kimmelstiel — см. Киммелстила — Уилсона...
King — см. Кинга..., Кинга — Армстронга..., Ягера — Кинга...
Kirby — см. Джонсона — Керби...
Kirmisson — см. Кирмиссона — Лоренца — Байера...
Kirschner — см. Киршнера...
Kitahara — см. Китахары..., Масуды — Китахары...
Kitamura — см. Китамуры...
Kitt — см. Китта — Тароцци...
Klapp — см. Клаппа...
Klarfeld — см. Кларфельда...
Klebs — см. Клебсиелла...
Kleyn — см. Маттуса — Клейна...
Klein — см. Клейна..., Клейна — Варденбурга...
Kleine — см. Клейне — Левина ...
Klinefelter — см. Клайнфелтера..., Клайнфелтера — Рейфенштейна — Олбрайта...
Kleinenberg — см. Клейненберга...
Kleinschmidt — см. Клейншмидта..., Черни — Клейншмидта...
Kleist — см. Клейста...
Klemperer — см. Клемперера...
Klippel — см. Клиппеля..., Клиппеля — Вейля..., Клиппеля — Треноне..., Клиппеля — Фейля...
Kloiber — см. Клойбера...
Knapp — см. Кнаппа..., Пассова — Кнаппа...
Knies — см. Книса...
Knoll — см. Грэма — Кнолля...
Knott — см. Кнотта...
Kober — см. Кобера...
Kobrak — см. Кобрака...
Koby — см. Коби...
Koch — см. Коха..., Коха — Корнета..., Коха — Уика..., Коховский...
Kocher — см. Кохера..., Кохера — Лексера..., Вебера — Кохера...
Kockel — см. Коккеля...
Kocks — см. Кокса...
Köbner — см. Кебнера...
Köhler — см. Келера...
Köhlmeier — см. Кельмейера — Дегоса...
Kölliker — см. Келликера...
Koenen — см. Кенена...
König — см. Кенига..., Кенига — Мюллера...
Köppe — см. Кеппе...
Körte — см. Керте...
Kogoj — см. Когоя...
Koyanagi — см. Фогта — Коянаги...
Kolmer — см. Колмера...
Komaya — см. Дохи — Комая..., Мацумото — Комая — Тоямы...
Kondoleon — см. Кондолеона — Пайра...

Kopetsky — см. Альмура — Копецкого...
Koplik — см. Коплика — Бельского — Филатова...
Koranyi — см. Кораньи — де ла Кампа..., Бороша — Кораньи...
Korff — см. Корффа...
Kornzweig — см. Бессена — Корнцвейга...
Koser — см. Козера...
Koskinas — см. Экономо — Коскинаса...
Kostečka —см. Костечки...
Kostmann — см. Костманна...
Kovács — см. Ковача...
Koza — см. Прасада — Коуза...
Krabbe — см. Краббе..., Краббе — Бенеке..., Стерджа — Вебера — Краббе...
Kraepelin — см. Крепелина...
Kralik — см. Крейлика...
Kramer — см. Крамера..., Крамера — Тисдалла..., Бурденко — Крамера..., Зелигмана — Крамера...
Krapf — см. Крапфа — Куртиса...
Kraske — см. Краске...
Kraupa — см. Краупы — Познера — Шлоссманна...
Krause — см. Краузе..., Краузе — Риза..., Хартли — Краузе..., Яценко — Вулера — Краузе...
Krebs — см. Кребса...
Kreibich — см. Крейбиха...
Kreinbüll — см. Ферагута — Крейнбюля...
Kretschmer — см. Кречмера...
Kreuzfuchs — см. Крейцфукса...
Kreysig — см. Крейсига..., Хейма — Крейсига...
Kristeller — см. Кристеллера...
Krönig — см. Кренига...
Krönlein — см. Кренлейна...
Krohn — см. Монрада — Крона...
Krogius — см. Крогиуса...
Krueger — см. Крюгера...
Krukenberg — см. Крукенберга..., Крукенберговский...
Kümmel — см. Микулича — Кюммеля...
Kümmell — см. Кюммелля..., Кюммелля — Вернея..., Зеренина — Кюммелля...
Küntscher — см. Кюнчера...
Küss — см. Кюсса...
Küster — см. Кюстера...
Küstner — см. Кюстнера..., Кюстнера — Чукалова..., Прауснитца — Кюстнера...
Küttner — см. Кюттнера..., Кюттнера — Венгловского...
Kučera — см. Кучеры...
Kufs — см. Куфса...
Kugelberg — см. Кугельберга — Веландера...
Kuhnt — см. Кунта..., Кунта — Шимановского..., Кунта — Юниуса...
Kulenkampff — см. Куленкампффа..., Куленкампффа — Тарнова...
Kull — см. Кулля...
Kundrat — см. Кундрата...
Kunitz — см. Кунитца...
Kunkel — см. Кункеля..., Кункеля — Ветцеля..., Кункеля — Пирсона...
Kupffer — см. Купфера..., Бровича — Купфера...
Kurtzahn — см. Куртцана...
Kussmaul — см. Куссмауля..., Куссмауля — Генцлера..., Куссмауля — Мейера...
Kylin — см. Килина...
Kyrle — см. Кирле...
Labhardt — см. Лабгардта...
Lacreta — см. Лакреты...
Ladd — см. Ладда...
Ladington — см. Ладингтона...
Laennec — см. Лаэннека...
Läwen — см. Левена..., Бюдингера — Лудлоффа — Левена...
Lafora — см. Лафоры...
Lagrange — см. Лагранжа..., Лагранжа — Покровского..., Лагранжа — Холта — Филатова...
Laguer — см. Лаге...
Laki — см. Лаки — Лоранда...
Lallemant — см. Труссо — Лаллемана...
Lamark — см. Ламаркизм...
Lambling — см. Ламблена...
Lambotte — см. Ламботта...
Lambret — см. Ламбре...
Lamy — см. Во — Лами..., Марото — Лами...
Lancisi — см. Ланчизи...
Landau — см. Ландау...
Landis — см. Лендиса..., Лендиса — Гиббона...
Landolfi — см. Ландольфи...
Landolt — см. Ландольта...
Landouzy — см. Ландузи — Дежерина...
Landry — см. Ландри...
Landsteiner — см. Доната — Ландштейнера...
Lane — см. Лейна...
Lang — см. Ланга...
Lange — см. Ланге..., Де Ланге..., Джеймса — Ланге...
Langenbeck — см. Лангенбека..., Лангенбека — Бильрота..., Лангенбека — Кенига..., Эсмарха — Лангенбека...
Langendorff — см. Лангендорффа...
Lange-Nielsen — см. Джеруэлла — Ланге-Нилсена...
Langer — см. Лангера...
Langerhans — см. Лангерганса...
Langhans — см. Лангханса..., Пирогова — Лангханса...
Langley — см. Ленгли...
Lannelongue — см. Ланнелонга...
Lantermann — см. Шмидта — Лантерманна...
Lanz — см. Ланца...
Lapique — см. Ланика...
Lara — см. Барракер-Бордаса — Руиса — Лара...
Larcher — см. Ларше...
Lardennois — см. Ларденуа...
Laroyenne — см. Ларуайенна...
Larrey — см. Ларрея...
Larsen — см. Ларсена — Юханссона...
Larsson — см. Шегрена — Ларссона...
Laruelle — см. Ларюэлля...
Laségue — см. Ласега...
Lashley — см. Лешли...
Lask — см. Якобсона — Ласка...
Lassueur — см. Литтла — Лассюэра..., Пиккарди — Лассюэра — Литтла...
Laubry — см. Лобри — Пецци..., Лобри — Сулля...
Lauenstein — см. Лауэнштейна...
Laugier — см. Ложье...
Launois — см. Лонуа — Бансода...
Laurence — см. Лоренса — Бидля..., Лоренса — Муна — Барде — Бидля...
Lautenschläger — см. Лаутеншлегера...
Lauth — см. Лаутов...
Leadbetter — см. Политано — Лидбеттера...
Leber — см. Лебера...
Lebsche — см. Лебше...
Lederer — см. Ледерера — Брилла...
Ledderhose — см. Леддерхозе...
Leduc — см. Ледюка...
Leede — см. Румпеля — Леede...
Legal — см. Легаля...
Legg — см. Легга — Кальве — Пертеса...
Lefèvre — см. Папийона — Лефевра...
Le Fort — см. Лефора..., Лефора — Нейгебауэра...
Lehmann — см. Берьесона — Форссмана — Леманна...
Lehndorff — см. Лендорффа..., Лендорффа — Лейнера..., Розенберга — Винокурова — Лендорффа...
Leichtenstern — см. Лейхтенштерна..., Штрюмпелля — Лейхтенштерна...
Leifson — см. Лифсона...
Leigh — см. Ли...
Leiner — см. Лейнера — Муссу..., Лендорффа — Лейнера...
Leishman — см. Лейшмана..., Лейшмана — Донована...
Lejeune — см. Лежена...
Lejonne — см. Лежонна — Лермитта...
Lembert — см. Ламбера..., Ламбера — Венгловского...
Lemos — см. Лемоса — Торреса — Деньи...
Lempert — см. Лемперта...
Lenègre — см. Ленегра...
Lenk — см. Ленка...
Lennander — см. Леннандера...
Lennox — см. Леннокса...
Lenoble — см. Ленобля — Обино...
Lenz-Bauer — см. Ленц-Бауэра...
Leonardi — см. Маграсси — Леонарди...
Leonhard — см. Леонгарда...
Leopold — см. Леопольда..., Леопольда — Черни...
Lepehne — см. Лепене...
Lereboullet — см. Жильбера — Лербулле...
Leredde — см. Аллопо — Леredда — Дарье...
Léri — см. Лери..., Лери — Вейлля..., Лери — Молен де Тейсье..., Мари — Лери..., Роша — Лери...
Leriche — см. Лериша..., Лериша — Зудека..., Рейно — Лериша..., Шоффара — Лериша...
Lermoyez — см. Лермуайе...
Lesch — см. Леша — Найхана...
Leschke — см. Лешке...
Lessage — см. Лесажа...
Letterer — см. Абта — Леттерера..., Леттерера — Сиве...
Leube — см. Лейбе — Ригеля...
Lev — см. Лева...
Levaditi — см. Левадити...
Lever — см. Левера...
Levi — см. Лорена — Леви...
Levin — см. Клейне — Левина...
Levine — см. Левина...
Levinson — см. Франка — Левинсона...
Levinthal — см. Левинталя...
Levi-Valensi — см. Леви-Валанси...
Levret — см. Морисо — Левре...
Lévy — см. Леви..., Клерка — Леви — Кристеско...
Lewandowsky — см. Левандовского..., Левандовского — Лютца..., Ядассона — Левандовского...
Lewis — см. Льюиса..., Льюиса — Федеричи...
Lexer — см. Лексера..., Боброва — Лексера..., Кохера — Лексера..., Мерфи — Лексера...
Leyden — см. Лейдена..., Лейдена — Вестфаля..., Лейдена — Мёбиуса..., Шарко — Лейдена...
Leydig — см. Лейдига...
Lhermitte — см. Лермитта..., Лермитта — Монье — Винара — Тсоканакиса..., Лежонна — Лермитта..., Матц-

дорффа — Лермитта..., Русси — Лермитта — Шельвена...
Lian — см. Лиана — Сигье — Вельти...
Libert — см. Гийена — Либера...
Libman — см. Либмана..., Либмана — Сакса..., Капоши — Либмана — Сакса..., Лукина — Либмана...
Lichtenberg — см. Лихтенберга..., Герцена — Лихтенберга...
Lichtenstein — см. Лихтенстайна — Брайцева...
Lichtenstern — см. Лихтенштерна...
Lichtheim — см. Дежерина — Лихтгейма...
Liddell — см. Лидделла — Шеррингтона...
Lieberkühn — см. Либеркюновы...
Liebermann — см. Либерманна — Бурхарда...
Liebermeister — см. Либермейстера...
Liebesny — см. Либесни...
Liebig — см. Марша — Либиха — Берцелиуса...
Liepmann — см. Липманна...
Lier — см. Лира...
Lietaud — см. Льето...
Lightwood — см. Лайтвуда..., Лайтвуда — Олбрайта...
Lignac — см. Линьяка..., Линьяка — Фанкони..., Абдергальдена — Кауфманна — Линьяка...
Liéou — см. Барре — Льеу...
Lillie — см. Лилли...
Lindau — см. Линдау..., Гиппеля — Линдау...
Lindemann — см. Зенгера — Линдеманна...
Linder — см. Линдера...
Lindner — см. Гвиста — Линднера...
Linnartz — см. Линнартца...
Linton — см. Линтона...
Lipschütz — см. Липшютца..., Афцелиуса — Липшютца..., Чапина — Липшютца...
Lisfranc — см. Лисфранка...
Lissauer — см. Лиссауэра...
Lister — см. Листера..., Пирогова — Пастера — Листера...
Listing — см. Листинга...
Liston — см. Листона...
Litten — см. Литтена...
Little — см. Литтла..., Литтла — Лассюэра...
Littré — см. Литтре...
Litzmann — см. Литцманна...
Lloyd — см. Ллойда — Эванса...
Lobitz — см. Лобитца — Кемпбелла...
Lôbo — см. Лобо...
Lobstein — см. Лобштейна..., Лобштейна — Экмана...
Locke — см. Рингера — Локка...
Lockhart-Mummery — см. Локхарт-Маммери...
Loeffler — см. Леффлера...
Löfgren — см. Лефгрена...
Loewenberg — см. Левенберга..., Абеля — Левенберга...
Loewenfeld — см. Левенфельда — Хеннеберга...
Löwenstein — см. Левенштейна..., Левенштейна — Йенсена..., Эрба — Ферстера — Барре — Левенштейна...
Loewenthal — см. Левенталя...
Löwenthal — см. Левенталя...
Loewi — см. Леви...
Logan — см. Логана...
Lombard — см. Ломбара..., Ломбара — Барани...
Longmire — см. Лонгмайера..., Лонгмайера — Дольотти...
Longo — см. Лонго...
Looser — см. Лоозера..., Лоозера — Милкмена...
Lorain — см. Лорена — Леви...
Lorand — см. Лаки — Лоранда...
Lord — см. Блейкмора — Лорда...
Lorenz — см. Лоренца..., Лоренца — Штилле..., Лоренца — Штоффеля..., Гоффы — Лоренца..., Кирмиссона — Лоренца — Байера..., Пачи — Лоренца...
Lortat-Jacob — см. Лорта-Жакоба..., Дегоса — Лорта-Жакоба...
Lorthioir — см. Оппеля-Лортиуара...
Lossen — см. Лоссена...
Lotheissen — см. Лотейссена — Ридера...
Louis-Bar — см. Луи-Бар...
Lowe — см. Лоу...
Lower — см. Лоуэра..., Ловеров...
Lowrick — см. Ловрика — Вольнера...
Lowry — см. Лаури...
Lowsley — см. Лоусли...
Lubarsch — см. Любарша — Пика...
Luc — см. Колдуэлла — Люка...
Lucae — см. Люце...
Lucas-Championniere — см. Люка Шампионньера...
Lucey — см. Люцея...
Ludloff — см. Лудлоффа..., Бюдингера — Лудлоффа — Левена...
Ludwig — см. Людвига...
Lücke — см. Люкке — Шеде...
Luer — см. Люэра...
Lüscher — см. Люшера...
Lütkens — см. Люткенса...
Lugol — см. Люголя...
Lund — см. Лунда...
Lundborg — см. Лундборга...
Luppi — см. Люппи...
Luschka — см. Лушки..., Лушки — Пфаундлера...
Lust — см. Люста...
Lutembacher — см. Лютамбаше...
Lutz — см. Лютца..., Лютца — Мишера..., Альмейды — Лютца — Сплендоре..., Жансельма — Лютца..., Левандовского — Лютца...
Luys — см. Люисово...
Lyell — см. Лайелла...
Lyon — см. Соколова — Лайона...
Lysholm — см. Лисхольма...
Maass — см. Маасса — Кенига...
MacArdle — см. Мак-Ардла..., Мак-Ардла — Шмида — Пирсона...
Macarini — см. Макарини — Оливы...
Macchiavello — см. Маккиавелло — Здродовского...
MacConkey — см. Мак-Конки...
Macewen — см. Макьюина...
Macfarlane — см. Макфарлена..., Биггс — Дугласа — Макфарлена...
Mach — см. Маха...
MacKenzie — см. Мак-Кензи...
Macnaughton — см. Макнотона...
Mac Quarrie — см. Мак-Куарри...
Maddox — см. Меддокса...
Madelung — см. Маделунга..., Бабкока — Маделунга..., Шинцингера — Маделунга...
Madlener — см. Мадленера..., Келлинга — Мадленера...
Madsen — см. Аррениуса — Мадсена...
Magath — см. Манна — Магата..., Хортона — Магата — Брауна...
Magendie — см. Мажанди..., Белла — Мажанди..., Гертвига — Мажанди...
Magitot — см. Байяра — Мажито..., Робена — Мажито...
Magnan — см. Маньяна...
Magnus — см. Магнуса..., Магнуса — Клейна...
Magrassi — см. Маграсси — Леонарди...
Magyary-Kossa — см. Коссы...
Mahler — см. Малера...
Maier — см. Майера...
Maisonneuve — см. Мезоннева...
Maissiat — см. Мессиа..., Мессиатов...
Majocchi — см. Майокки...
Makai — см. Ротманна — Макаи...
Makar — см. Макара...
Makkas — см. Маккаса...
Malassez — см. Малассе...
Malbin — см. Штерингеймера — Мальбина...
Malcz — см. Мальча...
Malécot — Малеко...
Malgaigne — см. Мальгеня..., Мальгеня — Панаса...
Malherbe — см. Малерба...
Mallory — см. Маллори..., Маллори — Вейсса...
Malmström — см. Мальмстрема...
Malpighi — см. Мальпигиев...
Malthus — см. Мальтузианство...
Mamou — см. Сигала — Каттана — Маму...
Manganotti — см. Манганотти...
Mann — см. Манна..., Манна — Магата..., Верцике — Манна..., Гуревича — Манна...
Mannkopf — см. Маннкопфа...
Manson — см. Мансона..., Мансона — Шварца...
Mantoux — см. Манту...
Marañon — см. Мараньона...
Marburg — см. Марбурга...
Marcus — см. Маркуса...
Marcuse — см. Маркузе...
Marey — см. Марея...
Marfan — см. Марфана...
Marie — см. Мари..., Мари — Бовери..., Мари — Гийена..., Мари — Лери..., Мари — Фуа..., Мари — Фуа — Алажуанина..., Бамбергера — Мари..., Бехтерева — Мари — Фуа..., Бехтерева — Штрюмпелля — Мари..., Парро — Мари..., Пьера Мари..., Шарко — Мари..., Шарко — Мари — Тута..., Шейтхауэра — Мари — Сентона..., Штрюмпелля — Бехтерева — Мари...
Marin-Amat — см. Марин-Амата...
Marinescu — см. Маринеску — Гиршберга..., Маринеску — Драганеску — Василиу..., Маринеску — Радовича..., Маринеску — Шегрена..., Маринеску — Шегрена — Гарленда...
Marion — см. Мариона..., Мариона — Хольцова..., Хоходки — Мариона...
Mariotte — см. Мариотта...
Marmo — см. Мармо...
Maroteaux — см. Марото — Лами...
Marrack — см. Маррака...
Marschall — см. Маршалла — Марчетти..., Маршалла — Уитмора...
Marchand — см. Маршана..., Маршанов (-а)...
Marchesani — см. Маркезани...
Marchetti — см. Маршалла — Марчетти...
Marchi — см. Марки..., Марки — Буша...
Marchiafava — см. Маркиафавы — Биньями..., Маркиафавы — Микели...
Marsh — см. Марша..., Марша — Либиха — Берцелиуса...
Marshall — см. Маршалла...
Martegiani — см. Мартеджани...
Martin — см. Мартина..., Мартина — Олбрайта..., Мартена...
Martinet — см. Мартине...
Martinotti — см. Мартинотти...

Martland — см. Мартланда...
Martorell — см. Мартореля...
Marwedel — см. Марведеля..., Марведеля — Венделя...
Marx — см. Маркса...
Marxer — см. Марксера...
Masse — см. Масса — Вудлонгана...
Masson — см. Массона..., Барре — Массона...
Massumi — см. Принцметала — Массуми...
Master — см. Мастера...
Masuda — см. Масуды — Китахары...
Masugi — см. Масуги...
Matas — см. Матаса...
Mathieu — см. Матье..., Гийена — Алажуанина — Матье...
Mathisen — см. Матизена...
Matsumoto — см. Мацумото — Комая — Тоямы...
Matti — см. Матти...
Matzdorff — см. Матцдорффа — Лермитта...
Matzenauer — см. Матценауэра — Полланда...
Mau — см. Шейерманна — Мау...
Maugeri — см. Мауджери...
Maurer — см. Маурера...
Mauriac — см. Мориака..., Сезари — Мориака...
Mauriceau — см. Морисо — Левре...
Mauthner — см. Маутнера...
Mauz — см. Мауца...
Maydl — см. Майдля...
Mayer — см. Майера..., Визальского — Майера..., Нельсона — Мейера...
Mayo — см. Мейо..., Мейо — Симпсона — Коллена..., Вредена — Мейо..., Коффи — Мейо...
Mayo-Robson — см. Мейо-Робсона..., Робсона...
Mazzoni — см. Гольджи — Маццони...
McBurney — см. Мак-Бернея..., Мак-Бернея — Волковича — Дьяконова...
McCarthy — см. Мак-Карти..., Членова — Мак-Карти...
McClure — см. Мак-Клюра — Олдрича...
McCoy — см. Мак-Коя — Чапина...
McCulloch — см. Мак-Каллока — Питтса...
McCune — см. Олбрайта — Мак-Кьюна — Штернберга...
McLeod — см. Мак-Лауда...
McManus — см. Мак-Мануса...
McMurray — см. Мак-Марри...
McSwiney — см. Уиллс — Бальфура — Мак-Суини...
McWhorter — см. Мак-Уортера...
Meckel — см. Меккеля..., Меккелев (-а, -о)...
Medin — см. Гейне — Медина...
Meesmann — см. Месманна...
Meibom — см. Мейбомиевы...
Meier — см. Куссмауля — Мейера...
Meige — см. Мейжа..., Нонне — Милроя — Мейжа...
Meigs — см. Мейгса..., Демона — Мейгса...
Meinicke — см. Мейнике...
Meissl — см. Рейхерта — Мейссля...
Meissner — см. Мейсснера..., Мейсснеровское...
Melkersson — см. Мелькерссона — Розенталя...
Mellinger — Меллингера...
Meltzer — см. Мельтцера..., Мельтцера — Лайона...
Ménard — см. Менара...
Mendel — см. Менделя..., Менделевская..., Менделизм..., Бехтерева — Менделя...
Mendelson — см. Мендельсона...
Ménétrier — см. Менетрие..., Бальзера — Менетрие...
Ménière — см. Меньера...
Menkes — см. Менкеса...
Menkin — см. Менкина...
Mercier — см. Мерсье...
Merkel — см. Меркеля...
Mermann — см. Мерманна...
Merritt — см. Казабаха — Мерритт...
Merzbacher — см. Пелицеуса — Мерцбахера...
Mesmer — см. Месмеризм...
Metras — см. Метра...
Meulengracht — см. Мейленграхта..., Жильбера — Мейленграхта...
Meyer — см. Майера..., Мейера — Овертона..., Мейера — Шлютера..., Вейгерта — Мейера...
Meyer-Betz — см. Мейер-Бетца...
Meyerhofer — см. Мейергофера...
Meyer-Schwickerath — см. Мейер-Швиккерата...
Meynert — см. Мейнерта...
Mibelli — см. Мибелли...
Michaelis — см. Михаэлиса...
Michalowski — см. Михаловского — Модельского...
Michel — см. Мишеля...
Micheli — см. Маркиафавы — Микели..., Риетти — Греппи — Микели...
Middlebrook — см. Миддлбрука — Дюбо...
Miescher — см. Мишера..., Мишера — Шторка..., Лютца — Мишера...
Mignon — см. Делорма — Миньона...
Mikity — см. Вильсона — Микити...
Mikulicz-Radecki — см. Микулича ..., Микулича — Генле..., Микулича — Кюммеля..., Микулича — Мартынова..., Микулича — Николадони..., Бира — Микулича..., Владимирова — Микулича..., Гейнеке — Микулича..., Диффенбаха — Микулича...
Milian — см. Милиана...
Milkman — см. Милкмена..., Лоозера — Милкмена...
Millard — см. Мийяра — Гюблера...
Miller — см. Миллера...
Millikan — см. Милликена — Зикерта...
Millin — см. Миллина..., Лидского — Миллина...
Millingen — см. Миллингена — Сапежко...
Millon — см. Миллона...
Mills — см. Миллса...
Milner — см. Милнера — Хэбба...
Milroy — см. Милроя..., Нонне — Милроя — Мейжа...
Milton — см. Милтона...
Minervini — см. Минервини...
Mingazzini — см. Мингаццини — Барре...
Minkowski — см. Минковского — Шоффара...
Mirault — см. Миро...
Mirchamp — см. Миршана...
Mitchell — см. Митчелла..., Пирогова — Митчелла...
Mitsuda — см. Мицуды...
Miyagawa — см. Миягавы...
Mizuo — см. Мидзуо — Накамуры...
Mobitz — см. Мобитца...
Modelski — см. Михаловского — Модельского...
Moebius — см. Мёбиуса..., Лейдена — Мёбиуса...
Moeller — см. Меллера — Гунтера...
Mönckeberg — см. Менкеберга...
Mojon — см. Мойона..., Габасту — Мойона...
Molin de Teyssieu — см. Лери — Молен де Тейсье...
Moll — см. Молля..., Моллевы..., Молла — Бюшельбергера...
Mollaret — см. Молларе...
Moloney — см. Молони...
Momburg — см. Момбурга...
Mommsen — см. Моммсена...
Monakow — см. Монакова...
Monaldi — см. Мональди...
Moncrieff — см. Монкриффа...
Mondonesi — см. Мондонези...
Mondor — см. Мондора...
Monier — см. Лермитта — Монье — Винара — Тсоканакиса...
Monrad — см. Монрада — Крона...
Monro — см. Монро..., Монроева(-о)...
Montandon — см. Монтандона...
Monteggia — см. Монтеджи...
Montgomery — см. Монтгомери..., Монтгомери — О'Лири — Баркера...
Moon — см. Лоренса — Муна — Барде — Бидля...
Moor — см. Мора...
Moore — см. Мура..., Мура — ЦИТО...
Mooren — см. Морена...
Mooser — см. Музера...
Morax — см. Моракса — Аксенфельда...
Morel — см. Мореля..., Грембера — Мореля..., Морганьи — Стюарта — Мореля...
Morel-Lavallée — см. Морель-Лавалле...
Morenheim — см. Моренгейма...
Morestin — см. Морестеновская..., Барденгейера — Морестена...
Morgagni — см. Морганьи..., Морганиев..., Морганьи — Адамса — Стокса..., Морганьи — Стюарта — Мореля...
Morgan — см. Моргана..., Моргана — Мортона — Паркера...
Mori — см. Харады — Мори...
Moro — см. Моро...
Morquio — см. Моркио...
Morris — см. Морриса...
Morrow — см. Морроу — Брука...
Morton — см. Мортона..., Мортоповская..., Моргана — Мортона — Паркера...
Morvan — см. Морвана...
Moschcowitz — см. Мошкович..., Мошкович — Зингера — Симмерса...
Mosenthal — см. Джейнуэя — Мозенталя...
Moser — см. Мозера...
Mosso — см. Моссо...
Moszkowicz — см. Мошковича...
Motais — см. Моте...
Mounier-Kuhn — см. Мунье-Куна...
Moure — см. Мура...
Mouret — см. Муре...
Moursou — см. Мурсу...
Moussous — см. Лейнера — Муссу...
Moutard-Martin — см. Мутар-Мартена...
Moynihan — см. Мойнихена...
Mucha — см. Мухи...
Müller — см. Мюллера..., Мюллера — Блюмбергера..., Мюллера — Геккеля..., Мюллеров..., Вейсса — Мюллера..., Виса — Мюллера..., Гофмейера — Мюллера..., Кенига — Мюллера..., Ренандера — Мюллера...
Münchmeyer — см. Мюнхмейера...
Muir — см. Беккера — Мьюэра...
Muller — см. Мюллера..., Мюллеровские...
Mulligan — см. Маллигена...
Munro — см. Манро...
Munsell — см. Манселла...

Murahashi — см. Мурахаси — Иосиды...
Muret — см. Кепю — Мюре...
Murphy — см. Мерфи..., Мерфи — Лексера..., Оллье — Мерфи — Лексера — Вредена...
Murray — см. Марри..., Марри — Сёндергарда — Бьёрка...
Musset — см. Дальзаса — Неттера — Мюссе...
Museux — см. Мюзе...
Mussy — см. Мюсси...
Mustard — см. Мастерда...
Myle — см. Ван-Богарта — Миля...
Naboth — см. Набота...
Nachlas — см. Нахласа...
Naegele — см. Негеле...
Naegeli — см. Негели..., Негели — Блоха — Ядассона..., Гланцманна — Негели...
Naffziger — см. Наффцигера..., Наффцигера — Тауна...
Nagamatsu — см. Нагамацу...
Nageotte — см. Нажотта..., Бабинского — Нажотта...
Najjar — см. Криглера — Найяра...
Nakamura — см. Мидзуо — Накамуры...
Nakayama — см. Накаямы...
Nasmyth — см. Насмитова...
Nedden — см. Неддена...
Neelsen — см. Циля — Нельсена...
Negri — см. Негри..., Бабеша — Негри..., Жако — Негри...
Negro — см. Негро...
Nehb — см. Неба...
Neisser — см. Нейссера..., Нейссера — Векселберга..., Нейссера — Поллака...
Nélaton — см. Нелатона..., Нелатона — Жаннеля — Рокицкого..., Розера — Нелатона...
Nelson — см. Нельсона..., Нельсона — Мейера...
Nemec — см. Немека...
Neri — см. Нери...
Nernst — см. Нернста...
Nesbit — см. Несбита...
Netherton — см. Нетертона...
Netter — см. Дальзаса — Неттера — Мюссе...
Neugebauer — см. Лефора — Нейгебауэра...
Neumann — см. Нейманна..., Биццоцеро — Нейманна..., Видманна — Нейманна..., Руже-нейманновская...
Neumuller — см. Неймюллера — Оратора...
Neurath — см. Нейрата — Кушинга...
Nézelof — см. Незелоф...
Nicoladoni — см. Николадони..., Микулича — Николадони...
Nicolas — см. Никола — Фавра...
Nicolau — см. Николау...
Nieden — см. Нидена — Заттлера...
Nielsen — см. Нильсена...
Niemann — см. Нимана — Пика...
Nievergelt — см. Нифергельта...
Nisbet — см. Нисбета...
Nissen — см. Ниссена...
Nissl — см. Ниссля..., Ниссля — Альцгеймера...
Nitabuch — см. Нитабуха...
Noble — см. Нобля...
Nocht — см. Нохта..., Нохта — Максимова...
Noica — см. Нойки...
Nonne — см. Нонне — Апельта..., Нонне — Милроя — Мейжа..., Фруэна — Нонне...
Norlén — см. Норлена...
Norman — см. Нормана — Вуда...
Norrie — см. Норри...
Nothnagel — см. Нотнагелевский...
Nové-Josserand — см. Нове-Жосселана...
Nuck — см. Нука...
Nuel — см. Нюэля...
Nuhn — см. Нуна...
Nygaard — см. Нигарда — Брауна...
Nyhan — см. Леша — Найхана...
Nylander — см. Ниландера...
Nylin — см. Розе — Найлена...
Nyrop — см. Ниропа...
O'Beirne — см. О'Бейрнова...
Obermeier — см. Обермейера...
Oberst — см. Лукашевича — Оберста...
Oberste — см. Оберста — Лена — Хаусса...
O'Connor — см. Гуммельсгейма — О'Коннора...
Oddi — см. Одди...
Ody — см. Оди...
Oehler — см. Элера...
Ogden — см. Цюльцера — Огдена...
Ogston — см. Огстона...
Oguchi — см. Огути...
Ohm — см. Ома...
O'Leary — см. Монтгомери — О'Лири — Баркера...
Oliva — см. Макарини — Оливы...
Olivecrona — см. Оливекроны...
Oliver — см. Оливера..., Оливера — Кардарелли...
Oljenick — см. Ольеника...
Ollendorff — см. Бушке — Оллендорффа...
Ollier — см. Оллье..., Оллье — Каста..., Оллье — Мерфи — Лексера — Вредена..., Бильрота — Оллье..., Ревердена — Яновича-Чаинского — Оллье...
Olmer — см. Кардуччи — Ольмера...
Olsen — см. Альстрема — Ольсена...
Olszewski — см. Стила — Ричардсона — Ольшевского...
Ombrédanne — см. Омбреданна...
Opalski — см. Опальского...
Oppenheim — см. Оппенгейма..., Урбаха — Оппенгейма...
Oppler — см. Боаса — Опплера...
Oppolzer — см. Оппольцера...
Oram — см. Холта — Орама...
Orator — см. Неймюллера — Оратора...
Orbach — см. Орбаха...
Ormond — см. Ормонда...
Orr — см. Орра...
Ortner — см. Ортнера...
Orzechowski — см. Ожеховского...
Oschmann — см. Ошмана...
Osgood — см. Осгуда — Шлаттера...
O'Shaughnessy — см. О'Шонесси...
Osler — см. Ослера..., Вакеза — Ослера..., Ослера — Рандю..., Рандю — Вебера — Ослера...
Ota — см. Оты...
Ouchterlonu — см. Оухтерлоню...
Overton — см. Мейера — Овертона...
Owen — см. Оуэна — Эбнера...
Owren — см. Оврена...
Paci — см. Пачи — Лоренца...
Pacini — см. Фатера — Пачини...
Padgett — см. Педжетта...
Page — см. Пейджа...
Pagenstecher — см. Пагенштехера...
Paget — см. Педжета..., Педжета — Шреттера...
Pal — см. Вейгерта — Паля...
Palade — см. Пелейда...
Palm — см. Пальма...
Paltauf — см. Пальтауфа..., Пальтауфа — Штернберга..., Рассказова — Лукомского — Пальтауфа..., Риля — Пальтауфа...
Panas — см. Мальгеня — Панаса...
Pancoast — см. Панкоста...
Pandy — см. Панди...
Paneth — см. Панета...
Panner — см. Паннера...
Pansdorf — см. Пансдорфа...
Panum — см. Панума...
Paolucci — см. Паолуччи — Джакобини..., Паолуччи — Потёмкиной...
Papacostas — см. Гате — Папакостаса...
Papanicolau — см. Папаниколау...
Papillon — см. Папийона — Лефевра...
Papillon-Leage — см. Папийон-Леаж — Псома...
Papp — см. Паркинсона — Паппа...
Pappenheim — см. Паппенгейма..., Паппенгейма — Кардоса..., Унны — Паппенгейма...
Parham — см. Путти — Парама...
Parhon — см. Пархона...
Parinaud — см. Парино..., Галезовского — Парино...
Parkes Weber — см. Паркса Вебера...
Parkinson — см. Паркинсона..., Паркинсона — Паппа..., Вольфф — Паркинсона — Уайта...
Parona — см. Пароны — Пирогова...
Parrot — см. Парро..., Парро — Мари...
Parry — см. Парри..., Парри — Ромберга...
Partsch — см. Парча...
Paschen — см. Пашена...
Pasini — см. Пазини..., Пазини — Пьерини...
Passavant — см. Пассавана...
Passow — см. Пассова..., Пассова — Кнаппа...
Pasteau — см. Гюйона — Пасто...
Pasteur — см. Пастера..., Пирогова — Пастера — Листера...
Pastia — см. Пастиа...
Pastorova — см. Пасторовой...
Patau — см. Патау...
Patch — см. Дельбе — Патча...
Patella — см. Пателлы...
Paterson — см. Патерсона — Келли...
Paton — см. Говерса — Патона — Кенеди...
Paufique — см. Пофика...
Paul — см. Пауля..., Пауля — Буннелля..., Поля..., Ханганциу — Дайхера — Пауля — Буннелля...
Pauling — см. Полинга..., Полинга — Кори...
Pautrier — см. Потрие — Воренже..., Брока — Потрие...
Payan — см. Пейана..., Пейана — Жиро...
Payr — см. Пайра..., Кондолеона — Пайра...
Péan — см. Пеана..., Пеана — Ру...
Pearce — см. Брауна — Пирс...
Pearson — см. Мак-Ардла — Шмида — Пирсона...
Pecquet — см. Пеке...
Pedroso — см. Педрозо...
Peiper — см. Пейпера...
Pel — см. Пеля — Эбштейна...
Pelger — см. Пельгера..., Пельгера — Хюэта...
Pelizaeus — см. Пелицеуса — Мерцбахера...
Pellegrini — см. Пеллегрини — Штиды...
Pellizzari — см. Пеллиццари...
Pellizzi — Пеллицци...
Peña — см. Пенья...
Pendred — см. Пендреда...
Penfield — см. Пенфилда..., Коуна — Пенфилда...

Pepper — см. Пеппера...
Perez — см. Переса...
Perlia — см. Перлиа...
Perls — см. Перльса...
Peron — см. Перона — Дроке — Кулона...
Perthes — см. Пертеса..., Пертеса — Шеде..., Дельбе — Пертеса..., Легга — Кальве — Пертеса...
Peteny — см. Петеня...
Peters — см. Петерс — Хевельса...
Petersen — см. Петерсена..., Гаккера — Петерсена...
Petges — см. Петжа — Клежа..., Петжа — Якоби...
Petit — см. Пти..., Петитов...
Petragnani — см. Петраньяни...
Petri — см. Петри...
Petruschky — см. Петрушки...
Pette — см. Петте — Деринга...
Peutz — см. Пейтца — Егерса..., Пейтца — Турена..., Пейтца — Турена — Егерса...
Peyronie — см. Пейрони...
Peyser — см. Пейзера...
Pezzer — см. Пеццера...
Pfannenstiel — см. Пфанненштиля...
Pfaundler — см. Пфаундлера — Гурлер..., Пфаундлера — Гурлер — Эллиса..., Гурлер — Пфаундлера — Гунтера..., Лушки — Пфаундлера...
Pfeifer — см. Пфейфера — Вебера — Крисчена...
Pfeiffer — см. Пфейффера..., Пфейффера — Афанасьева..., Исаева — Пфейффера...
Pflüger — см. Пфлюгера...
Pfuhl — см. Пфуля...
Phelps — см. Фелпса — Гохта...
Phemister — см. Фемистера...
Philagrius — см. Филагриуса...
Philippe — см. Гомбо — Филиппа...
Phillips — см. Филлипса...
Philippson — см. Филиппсона...
Phul — см. Пуля..., Ашоффа — Пуля...
Pic — см. Пика..., Бара — Пика...
Piccardi — см. Пиккарди — Лассюра — Литтла...
Piccoli — см. Кюстнера — Пикколи...
Pichler — см. Пихлера...
Pick — см. Пика..., Пика — Вернике..., Пика — Йореса..., Любарша — Пика..., Ниманна — Пика...
Picker — см. Пиккера...
Pickerill — см. Пиккерилла...
Pickering — см. Пиккеринга...
Pickworth — см. Пикворта...
Pieri — см. Пиери...
Pierini — см. Пазини — Пьерини...
Pignet — см. Пинье...
Piltz — см. Пильтца...
Pinel — см. Пинеля...
Pines — см. Пайнса...
Pinkus — см. Пинкуса...
Piñol Aguadé — см. Вилановы — Пиньоля Агваде...
Pins — см. Пинса...
Pinto — см. Аллена — Хейуэрда — Пинто...
Piringer-Kuchinka — см. Пирингер-Кушинки...
Pirquet — см. Пирке..., Шмелева — Пирке...
Piskaček — см. Пискачека...
Pitres — см. Питра...
Pittman — см. Питтмен...
Pitts — см. Мак-Каллока — Питтса...
Plateau — см. Тальбота — Плато...
Plaut — см. Плаута..., Плаута — Венсана..., Симановского — Плаута — Венсана...
Plesch — см. Плеша...
Plummer — см. Пламмера..., Пламмера — Винсона...
Pötzl — см. Петцля...
Polano — см. Полано...
Polenske — см. Поленске...
Politano — см. Политано — Лидбеттера...
Politzer — см. Политцера..., Политцера — Федеричи...
Pollack — см. Нейссера — Поллака...
Polland — см. Матценауэра — Полланда...
Pollitzer — см. Унны — Санти — Политцера...
Polya — см. Полиа..., Рейхеля — Полиа...
Pompe — см. Помпе...
Poncet — см. Понсе...
Pool — см. Пула..., Шлезингера — Пула...
Popper — см. Поппера...
Porak — см. Порака — Дюранта...
Porges — см. Поргеса...
Porro — см. Рейна — Порро...
Portal — см. Порталя...
Porter — см. Силбера — Портера...
Portes — см. Порта...
Portmann — см. Портманна..., Портманна — Депона...
Posada — см. Посады — Вернике...
Posner — см. Познера — Шлоссманна..., Краупы — Познера — Шлоссманна...
Pospischill — см. Поспишилла...
Potain — см. Потена...
Pott — см. Потта...
Pottenger — см. Поттенджера...
Potter — см. Поттера..., Поттера — Эльвейема...
Potts — см. Поттса...
Power — см. Кеплера — Пауэра — Робинсона...
Prader — см. Прадера — Вилли...
Prasad — см. Прасада — Коуза...
Pratt — см. Пратта...
Prausnitz — см. Прауснитца — Кюстнера...
Preiser — см. Прейсера...
Preisz — см. Прейса...
Pribram — см. Прибрама...
Price-Jones — см. Прайс-Джонса...
Prieur — см. Сабуро — Приера — Тренеля...
Prince — см. Пренса...
Pringle — см. Прингла..., Бурневилля — Прингла...
Prinzmetal — см. Принцметала..., Принцметала — Массуми...
Prioleau — см. Приоло — Вульпиуса...
Profeta — см. Профеты...
Proskauer — см. Фогеса — Проскауэра...
Prowazek — см. Провацека..., Провацека — Хальберштедтера...
Prusak — см. Прусака...
Pruvot — см. Прюво...
Psaume — см. Папийон-Леаж — Псома...
Puente — см. Пуэнте — Асеведо...
Pulfrich — см. Пульфриха...
Punnet — см. Паннета...
Purkinje — см. Пуркинье...., Пуркинье — Сансона...
Purtscher — см. Пурчера...
Putnam — см. Патнема..., Гринфилда — Патнема...
Putti — см. Путти..., Путти — Парама..., Путти — Чаклина..., Сауттера — Путти...
Pyle — см. Пайла...
Quain — см. Куэйна...
Queckenstedt — см. Квеккенштедта...
Quénu — см. Кеню..., Кеню — Мюре...
Quervain — см. Де Кервена...
Queyrat — см. Кейра...
Quick — см. Квика..., Квика — Пытеля...
Quincke — см. Квинке...
Quierolo — см. Квиероло — Вальдони — Клатуорти...
Quinquaud — см. Кенко...
Quix — см. Квикса...
Rachkind — см. Рашкинда...
Racouchot — см. Фавра — Ракушо...
Radovici — см. Маринеску — Радовича...
Raeder — см. Редера...
Ramon — см. Рамона...
Ramos e Silva — см. Рамос-и-Сильва...
Ramón y Cajal — см. Рамон-и-Кахаля...
Ramstedt — см. Фреде — Рамштедта...
Ranke — см. Бремзера — Ранке...
Ransome — см. Рансома...
Ranson — см. Рансона...
Ranvier — см. Ранвье...
Rapant — см. Рапанта...
Rapoport — см. Говарда — Рапопорта
Rapport — см. Готтфрида — Раппорта
Rasmussen — см. Расмуссена...
Rathke — см. Ратке...
Rauscher — см. Раушера...
Rauschkolb — см. Раушкольба — Туми...
Raymond — см. Раймона..., Раймона — Сестана...
Raynaud — см. Рейно..., Рейно — Лериша...
Recklinghausen — см. Реклингхаузена..., Энгеля — Реклингхаузена...
Reclus — см. Реклю...
Redeker — см. Ассманна — Редекера...
Reder — см. Редера...
Redlich — см. Редлиха..., Редлиха — Флатау...
Reed — см. Рид — Штернберга...
Rees — см. Риса...
Reese — см. Риза..., Риза — Блоди..., Краузе — Риза...
Refsum — см. Рефсума...
Regala — см. Странского — Регалы...
Regaud — см. Рего...
Régis — см. Режиса...
Rehberg — см. Реберга...
Rehn — см. Рена..., Рена — Делорма..., Склифосовского — Рена — Делорма — Бира...
Reich — см. Рейха...
Reichardt — см. Рейхардта...
Reichel — см. Рейхеля — Полиа...
Reichert — см. Рейхерта..., Рейхерта — Мейсля...
Reichmann — см. Рейхманна...
Reid — см. Рида...
Reifenstein — см. Клайнфелтера — Рейфенштейна — Олбрайта...
Reifferscheid — см. Рейффершейда...
Reil — см. Рейлева...
Reimann — см. Рейманна..., Адлера — Рейманна...
Rein — см. Рейна — Саббароу..., Уайза — Рейна...
Reindell — см. Рейнделля...
Reisseisen — см. Рейссейзена...
Reissner — см. Рейсснера...
Reiter — см. Рейтера...
Remak — см. Ремака..., Ремаковское...
Remlinger — см. Годелье — Ремленже...
Renander — см. Ренандера — Мюллера...
Rendu — см. Рандю — Вебера — Ослера..., Ослера — Рандю...
Renqvist — см. Ренквиста...
Renshaw — см. Реншо...
Réthi — см. Рети...

Retzius — см. Ретциуса...
Reuter — см. Беккера — Рейтера...
Reverdin — см. Ревердена..., Ревердена — Яновича-Чаинского — Оллье...
Revilliod — см. Ревийо...
Reys — см. Вейлля — Рея — Эйди...
Rhese — см. Резе...
Ribot — см. Рибо...
Rich — см. Рича..., Хаммена — Рича...
Richards — см. Ричардса — Рандла...
Richardson — см. Ричардсона..., Стилла — Ричардсона — Ольшевского...
Richet — см. Рише — Рубнера...
Richter — см. Рихтера...
Rickets — см. Сенна — Риккетса...
Riddoch — см. Геда — Риддоха...
Ridel — см. Риделя....
Ridley — см. Ридли...
Rieckenberg — см. Риккенберга — Брусина...
Riedel — см. Риделя...
Rieder — см. Лотейссена — Ридера...
Riegel — см. Ригеля..., Лейбе — Ригеля...
Rieger — см. Ригера...
Riehl — см. Риля..., Риля — Пальтауфа...
Riess — см. Рисса...
Rietti — см. Риетти — Греппи — Микели...
Riga — см. Риги..., Риги — Феде..., Кардарелли — Риги...
Riley — см. Райли — Дея...
Ringer — см. Рингера..., Рингера — Локка...
Riniker — см. Гланцманна — Риникера...
Rinne — см. Ринне...
Rio Branco — см. Рио Бранко...
Riolan — см. Риолана...
Ripault — см. Рипо...
Ritchie — см. Ритчи...
Ritter — см. Риттера..., Риттера — Янсена...
Riva-Rocci — см. Рива-Роччи...
Rivas — см. Риваса...
Rivero-Corvallo — см. Корвальо..., Риверо-Корвальо...
Rivers — см. Риверса...
Rivinus — см. Ривинусова...
Rivoir — см. Ривуара...
Roberts — см. Робертса..., Брандберга — Робертса — Стольникова...
Robertson — см. Робертсона...
Robin — см. Робена..., Робена — Мажито...
Robineau — см. Вейзенбурга — Сикара — Робино..., Сикара — Робино...
Robinow — см. Робинову...
Robinson — см. Робинсона..., Робинсона — Фурнье..., Кеплера — Пауэра — Робинсона...
Roch — см. Роша — Лери...
Rochet — см. Роше...
Roe — см. Роу...
Roederer — см. Редерера...
Römer — см. Ремера...
Roemheld — см. Ремхельда...
Röntgen — см. Рентгено...
Röpke — см. Репке...
Roger — см. Роже..., Толочинова — Роже...
Rogers — см. Роджерса...
Rohn — см. Роны...
Rolando — см. Роландов(-а)...
Roller — см. Роллера...
Romaña — см. Романьи...
Romano — см. Романо...
Romberg — см. Ромберга..., Гаушина — Ромберга..., Парри — Ромберга...
Romhanyi — см. Ромханьи...
Roof — см. Рофа...
Rorschach — см. Роршаха...
Rose — см. Розе..., Розе — Найлена..., Волера — Роуза...
Rosen — см. Розена...
Rosenbach — см. Розенбаха..., Розенбаха — Семона...
Rosenheim — см. Розенгейма...
Rosenmüller — см. Розенмюллера..., Розенмюллеров..., Пирогова — Розенмюллера...
Rosenstein — см. Розенштейна...
Rosenthal — см. Розенталя...
Roser — см. Розера..., Розера — Нелатона...
Roskam — см. Роскама...
Ross — см. Росса..., Гаска — Росса...
Rossbach — см. Россбаха...
Rossier — см. Россье...
Rossman — см. Россмана...
Rotch — см. Ротча...
Roth — см. Рота...
Rothberger — см. Ротбергера...
Rothmann — см. Ротманна — Макаи...
Rothmund — см. Ротмунда...
Rotor — см. Ротора...
Rouget — см. Руже-неймановская (-ое)...
Roussy — см. Русси — Лермитта — Шельвена ..., Дарье — Русси..., Дежерина — Русси...
Roux — см. Ру..., Гуаффона — Ру..., Пеана — Ру...
Rovsing — см. Ровсинга..., Мартынова — Ровсинга...
Rowe — см. Кейва — Роу...
Royle — см. Ройла — Хантера...
Rubinstein — см. Рубинстайна — Тейби...
Rubner — см. Рубнера..., Рише — Рубнера...
Rud — см. Руда...
Rümke — см. Рюмке...
Ruffini — см. Руффини...
Ruggeri — см. Руджери...
Ruggi — см. Руджи...
Ruiter — см. Руитера...
Ruiz — см. Барракер-Бордаса — Руиса — Лара...
Rulf — см. Рюльфа...
Rumpel — см. Румпеля...
Rumpf — см. Румпфа...
Runge — см. Рунге..., Баллентайна — Рунге...
Ruotte — см. Рюотта...
Russell — см. Расселла..., русселевские...
Russetzky — см. Стерлинга — Русецкого...
Ruttin — см. Руттина...
Saarma — см. Саармы...
Sabathie — см. Сабати...
Sabin — см. Сейбина...
Sabouraud — см. Сабуро..., Сабуро — Приера — Тренеля...
Sabrazès — см. Сабразе...
Sachs — см. Закса — Витебского..., Закса — Георги..., Тея — Закса...
Sacks — см. Капоши — Либмана — Сакса..., Либмана — Сакса...
Saegesser — см. Зегессера...
Saemisch — см. Земиша...
Sänger — см. Зенгера..., Зенгера — Линдеманна..., Зенгера — Энрота...
Safar — см. Веве — Сафара...
Sahli — см. Сали...
Saint — см. Сейнта...
Sainton — см. Сентона..., Шейтхауэра — Мари — Сентона...
Sakaguchi — см. Сакагути...
Sale — см. Сейля...
Saling — см. Залинга...
Salkowski — см. Гупперта — Сальковского...
Salus — см. Салюса — Гунна...
Salzmann — см. Зальцманна...
Samter — см. Замтера...
Samuel — см. Самуэля...
Samuels — см. Самюэлса...
Sanarelli — см. Санарелли — Здродовского...
Sanders — см. Сандерса...
Sanctis — см. Де Санктиса — Каккьоне...
Sanfelice — см. Санфеличе...
Sanfilippo — см. Санфилиппо...
Sansom — см. Сансома...
Sanson — см. Пуркинье — Сансона...
Santi — см. Унны — Санти — Поллитцера...
Santorini — см. Санториниев(-а, -ы)...
Sappey — см. Саппе...
Sattler — см. Заттлера..., Нидена — Заттлера...
Sauerbruch — см. Зауэрбруха..., Крюкова — Зауэрбруха...
Sauton — см. Сотона...
Sayers — см. Сейерса...
Scarff — см. Скарффа..., Стукея — Скарффа...
Scarpa — см. Скарпы...
Schade — см. Шаде...
Schäffer — см. Шеффера...
Schamberg — см. Шамберга...
Schanz — см. Шанца...
Scharpey-Schafer — см. Шефера..., Шефера — Эмерсона — Айви...
Schatz — см. Шатца...
Schaudinn — см. Шаудинна...
Schaumann — см. Шауманна..., Бенье — Бека — Шауманна...
Schauta — см. Александрова — Шауты..., Александрова — Шауты — Вертгейма...
Schea — см. Ши...
Schede — см. Шеде..., Люкке — Шеде..., Пертеса — Шеде...
Schedel — см. Шеделя...
Scheele — см. Шееле...
Scheie — см. Шейе...
Schellong — см. Шеллонга..., Шеллонга — Штризовера...
Schelven — см. Русси — Лермитта — Шельвена...
Schenck — см. Шенка...
Schenton — см. Шентона...
Scherf — см. Шерфа — Зданского...
Scherrington — см. Лидделла — Шеррингтона...
Scheuermann — см. Шейерманна..., Шейерманна — Мау...
Scheuthauer — см. Шейтхауэра — Мари — Сентона...
Schick — см. Шика...
Schickele — см. Шиккеле...
Schiff — см. Шиффа...
Schilder — см. Шильдера...
Schiller — см. Шиллера...
Schilling — см. Шиллинга...
Schimmelbusch — см. Шиммельбуша...
Schinz — см. Шинца..., Хаглунда — Шинца...
Schinzinger — см. Шинцингера — Маделунга...
Schlange — см. Шланге...
Schlatter — см. Шлаттера..., Осгуда — Шлаттера...
Schlemm — см. Шлеммов...
Schlesinger — см. Шлезингера...
Schlösser — см. Шлессера...
Schloffer — см. Шлоффера...
Schlossmann — см. Краупы — Познера — Шлоссманна..., Познера — Шлоссманна...
Schlüter — см. Мейера — Шлютера...
Schmerz — см. Шмерца...
Schmid — см. Мак-Ардла — Шмида — Пирсона...

Schmidt — см. Шмидта..., Шмидта — Лантерманна..., Кети — Шмидта...
Schmieden — см. Шмидена..., Антона — Шмидена...
Schmincke — см. Шминке...
Schmitz — см. Штуцера — Шмитца...
Schmorl — см. Шморля...
Schneider — см. Шнейдера...
Schnitzler — см. Шнитцлера...
Schnyder — см. Шнидера...
Schönborn — см. Шенборна...
Schöndube — см. Шендубе...
Schönlein — см. Шенлейна — Геноха...
Scholz — см. Шольца — Бильшовского..., Шольца — Ван-Богарта..., Шольца — Гринфилда...
Schottmüller — см. Шоттмюллера...
Schouldice — см. Шоулдайса...
Schramm — см. Алексеева — Шрамма...
Schreger — см. Гунтера — Шрегера...
Schreyer — см. Галена — Шрейера...
Schridde — см. Шридде..., Шридде — Альтманна...
Schroeder — см. Шредера...
Schröder — см. Шредера...
Schroetter — см. Шреттера..., Педжета — Шреттера...
Schuchardt — см. Шухардта...
Schüffner — см. Шюффнера...
Schüle — см. Шюле...
Schüller — см. Крисчена — Шюллера..., Хенда — Шюллера — Крисчена...
Schüssler — см. Шюсслера...
Schütz — см. Шютца...
Schulthess — см. Шультесса...
Schultz — см. Шультца — Дейла..., Шультца — Чарлтона...
Schultze — см. Шультце...
Schumacher — см. Шумахера...
Schumacker — см. Шумакера...
Schwabach — см. Швабаха...
Schwachman — см. Швахмана...
Schwalbe — см. Швальбе...
Schwann — см. Шванновская(-ий)..., Шваннома...
Schwartze — см. Швартце...
Schwartzman — см. Швартцмана...
Schwarz — см. Шварца..., Мансона — Шварца...
Schweigger — см. Швейггера...
Schweninger — см. Швенингера — Буцци...
Schwyzer — см. Швайзера..., Швайзера — Фолея...
Scott — см. Скотта...
Scribner — см. Скрибнера...
Sédan — см. Седана...
Seddon — см. Седдона...
Sédillot — см. Седийо...
Seelert — см. Зеелерта...
Seelig — см. Зелига...
Seeman — см. Зеемана...
Séglas — см. Сегла...
Segura — см. Гирша — Сегуры...
Seidel — см. Зейделя...
Seidell — см. Дальтона — Сейделла...
Seidlmayer — см. Зейдльмайера...
Seitz — см. Зейтца...
Seldinger — см. Сельдингера...
Seligman — см. Зелигмана — Крамера...
Sellers — см. Селлерса...
Sellheim — см. Зеллгейма...
Selter — см. Зельтера — Свифта — Феера...
Selye — см. Селье...
Semerau-Siemianowski — см. Семерау-Семяновского...
Semon — см. Семона..., Розенбаха — Семона...
Senear — см. Сенира — Ашера...
Senn — см. Сенна — Риккетса..., Штамма — Сенна — Кадера...
Sergent — см. Сержана...
Sertoli — см. Сертоли...
Servelle — см. Сервелла...
Sessel — см. Зесселя...
Seutin — см. Сетена...
Seyk — см. Сейка...
Sézary — см. Сезари..., Сезари — Мориака...
Séze — см. Гийена — Сеза — де Блондена — Вальтера...
Shambaugh — см. Шамбо...
Sharpey — см. Шарпеево...
Shauffard — см. Стилла — Шоффара...
Sheehan — см. Шихена...
Shelley — см. Шелли...
Sherren — см. Геда — Шеррена...
Sherrington — см. Шеррингтона...
Shiga — см. Григорьева — Шиги...
Shirodkar — см. Широлкара...
Shone — см. Шона...
Shope — см. Шоупа...
Shy — см. Шая — Дрейджера...
Sicard — см. Сикара..., Сикара — Колле..., Сикара — Робино..., Бриссо — Сикара..., Вейзенбурга — Сикара — Робино..., Верне — Сикара — Колле..., Дежерина — Сука — Сикара...
Sick — см. Жирара — Зика...
Siebold — см. Зибольда...
Siegal — см. Сигала — Каттана — Мамму...
Siegemundin — см. Смелли — Зигемундин...
Siegle — см. Зигле...
Siegrist — см. Зигриста...
Siekert — см. Милликена — Зикерта...
Siemens — см. Сименса..., Сименса — Блоха..., Криста — Сименса...
Sieur — см. Сьера...
Signorelli — см. Синьорелли...
Siguier — см. Лиана — Сигье — Вельти...
Silber — см. Силбера — Портера...
Silbert — см. Зильберта...
Silfverskjöld — см. Сильвершельда...
Silverman — см. Каффи — Силвермена...
Silvester — см. Сильвестра...
Simmonds — см. Симмондса..., Симмондса — Глинского...
Simon — см. Симона..., Бише — Симона...
Simonart — см. Симонара...
Simons — см. Симонса..., Барракера — Симонса...
Simpson — см. Симпсона — Феноменова..., Мейо — Симпсона — Коллепа...
Singer — см. Зингера..., Мошкович — Зингера — Симмерса...
Siwe — см. Леттерера — Сиве...
Sjögren — см. Шегрена..., Шегрена — Ларссона..., Грефе — Шегрена..., Гужеро — Шегрена..., Маринеску — Шегрена..., Маринеску — Шегрена — Гарленд..., Предтеченского — Гужеро — Шегрена...
Skene — см. Скина...
Skinner — см. Скиннера...
Sklowsky — см. Скловского...
Škoda — см. Шкоды...
Sluder — см. Сладера...
Smellie — см. Смелли..., Смелли — Зигемундин..., Файта — Смелли...
Smith — см. Смита..., Смита — Дитриха..., Смита — Фишера...
Smith-Petersen — см. Смит-Петерсена...
Smithwick — см. Смитвика...
Snapper — см. Снаппера...
Sneddon — см. Снеддона — Уилкинсона...
Snellen — см. Снеллена..., Тауссиг — Снеллена — Альберса...
Soave — см. Соаве...
Söderbergh — см. Сёдерберга...
Sölder — см. Зельдера...
Soemmerring — см. Земмерринга..., Земмеррингова...
Söndergaard — см. Марри — Сёндергарда — Бьёрка...
Sogers — см. Гарсии — Соджерса...
Sokolow — см. Соколова — Лайона...
Sonne — см. Зонне...
Sonnenblick — см. Зонненблика...
Sonnenkalb — см. Зонненкальба...
Sørensen — см. Серенсена...
Soresi — см. Сорези...
Sorrel — см. Сорреля...
Sotgiu — см. Сотжиу — Тумиотто...
Sottas — см. Дежерина — Сотта...
Soulié — см. Лобри — Сулье...
Soulier — см. Бернара — Сулье...
Souques — см. Сука..., Дежерина — Сука — Сикара...
Soutter — см. Сауттера — Путти...
Spatz — см. Галлервордена — Шпатца...
Spemann — см. Шпеманна...
Spencer — см. Спенсера...
Spengler — см. Шпенглера...
Spens — см. Спенса...
Spiegler — см. Шпиглера..., Шпиглера — Фендта...
Spielmeyer — см. Шпильмейера..., Шпильмейера — Фогта..., Шпильмейера — Фогта — Баттена...
Spigelius — см. Спигелиева...
Spiller — см. Шпиллера — Фрейжера — Адсона...
Spitz — см. Шпитца...
Spitzy — см. Шпитци — Холтера...
Splendore — см. Альмейды — Лютца — Сплендоре...
Sprengel — см. Шпренгеля...
Springer — см. Шпрингера...
Stacke — см. Штакке...
Staderini — см. Стадерини...
Stainton — см. Стейнтона..., Стейнтона — Капдепона...
Stamm — см. Штамма — Сенна — Кадера...
Stannius — см. Станниуса...
Stanton — см. Стентона...
Stargardt — см. Штаргардта...
Stark — см. Штарка...
Starling — см. Старлинга..., Бейлисса — Старлинга...
Staub — см. Штауба..., Штауба — Трауготта...
Steele — см. Стила — Ричардсона — Ольшевского...
Steell — см. Стилла...
Steiger — см. Штейгера...
Stein — см. Штейна...
Steinberg — см. Олдрича — Стайнберга — Кемпбелла...
Steiner — см. Штейнера — Фернера...
Steinert — см. Куршманна — Баттена — Штейнерта...
Steinmann — см. Штейнманна...
Stellwag — см. Штельвага...
Stenger — см. Штенгера..., Штенгера — Хилова...
Stenon — см. Стенонов...
Stent — см. Стента...
Steinthal — см. Штейнталя...
Stenvers — см. Стенверса...
Sterling — см. Стерлинга — Русецкого..., Йоза — Стерлинга...
Stern — см. Штерна...
Sternberg — см. Олбрайта — Мак-Кьюна — Штернберга..., Пальтауфа — Штернберга..., Рид — Штернберга...

Sternheimer — см. Штернгеймера — Мальбина...
Stevens — см. Стивенса — Джонсона...
Stewart — см. Стюарта..., Стюарта — Тривса..., Стюарта — Хамилтона..., Стюарта — Холмса..., Морганьи — Стюарта — Мореля...
Sticker — см. Штиккера...
Stieda — см. Пеллегрини — Штиды...
Stierlin — см. Штирлина...
Still — см. Стилла..., Стилла — Шоффара...
Stille — см. Лоренца — Штилле...
Stiller — см. Штиллера...
Stilling — см. Штиллинга..., Кларка — Штиллинга...
Stillman — см. Штилльмана...
Stodtmeister — см. Штодтмейстера...
Stokes — см. Стокса..., Чейна — Стокса...
Stockinger — см. Штоккингера...
Stockis — см. Стоккиса..., Корсна — Стоккиса...
Stoeckel — см. Штеккеля..., Гебелля — Франгенгейма — Штеккеля...
Stöhr — см. Штера...
Stölzner — см. Штельцнера...
Stoffel — см. Штоффеля..., Лоренца — Штоффеля...
Stokes — см. Гритти — Стокса..., Морганьи — Адамса — Стокса...
Stoll — см. Столла...
Stookey — см. Стукея..., Стукея — Скарффа...
Storck — см. Мишера — Шторка...
Strampelly — см. Стрампелли...
Strandberg — см. Гренблад — Страндберга...
Stransky — см. Странского..., Странского — Регалы...
Strassmann — см. Штрассманна...
Straus — см. Страуса...
Streiff — см. Халлерманна — Штрайффа — Франсуа...
Streit — см. Штрайта...
Strisower — см. Шеллонга — Штризовера...
Stroschein — см. Штрошейна...
Struck — см. Штрука...
Strümpell — см. Штрюмпелля..., Штрюмпелля — Лейхтенштерна..., Бехтерева — Штрюмпелля — Мари..., Вестфаля — Штрюмпелля..., Эрба — Шарко — Штрюмпелля...
Stumpf — см. Штумпфа...
Strzyzowski — см. Сгшизовского...
Stume — см. Эрдгейма — Штумме...
Sturge — см. Стерджа — Вебера..., Стерджа — Вебера — Краббе...
Sturmann — см. Канфилда — Штурманна...
Sturmdorf — см. Штурмдорфа...
Subbarow — см. Рейна — Саббароу...
Sudeck — см. Зудека..., Лериша — Зудека...
Suker — см. Сукера...
Sulkowitch — см. Сульковича...
Sulzberger — см. Сульцбергера — Гарбе..., Блоха — Сульцбергера...
Sultzer — см. Брока — Зульцера...
Summerson — см. Баркера — Саммерсона...
Sumner — см. Самнера...
Suter — см. Зутера...
Suzman — см. Сазмена...
Swift — см. Свифта..., Зельтера — Свифта — Феера...
Sydenham — см. Сиденгама...
Sylvest — см. Сильвеста...
Sylvius — см. Сильвиев(-а)...
Syme — см. Сайма...
Symmers — см. Брилла — Симмерса..., Мошкович — Зингера — Симмерса...
Szendi — см. Сценди...
Szirmai — см. Сирмаи...
Taarnhøj — см. Торнхёя...
Teissier — см. Юэрта — Тессье...
Tait — см. Тейта...
Takahara — см. Такахары...
Takata — см. Таката..., Таката — Ара...
Takats — см. Тейкетса...
Takayama — см. Такаямы...
Takayasu — см. Такаясу...
Talbot — см. Тальбота..., Тальбота — Плато...
Talma — см. Тальмы — Драммонда...
Tandler — см. Тандлера..., Гальбана — Тандлера...
Tanner — см. Таннера...
Tardieu — см. Тардье...
Tarnow — см. Куленкампффа — Тарнова...
Tarozzi — см. Китта — Тароцци...
Tarui — см. Таруи...
Taussig — см. Таусснга..., Тауссиг — Бинга..., Тауссиг — Снеллена — Альберса..., Блелока — Тауссиг...
Tavel — см. Тавеля...
Tawara — см. Ашоффа — Тавары...
Tay — см. Тея — Сакса..., Гетчинсона — Тея...
Taybi — см. Рубинстайна — Тейби...
Taylor — см. Тейлора...
Tedeschi — см. Тедеши...
Teichmann-Stawiarski — см. Тейхманна..., Тейхманна — Тиханова...
Teleky — см. Телеки...
Telemann — см. Телеманна...
Tellais — см. Телле...
Ten Horn — см. Тен-Хорна...
Tennesson — см. Бенье — Теннессона...
Tenon — см. Тенонова...
Terry — см. Терри...
Terson — см. Терсона...
Teschendorf — см. Баршоня — Тешендорфа...
Textor — см. Текстора...
Thalheimer — см. Тальхаймера — Фишера...
Thane — см. Тейна...
Thaenzer — см. Унны — Тенцера...
Thannhauser — см. Таннхаузера...
Thaon — см. Гийена — Таона...
Thebesius — см. Тебезия..., Тебезиев(-ы)..., Тебезия — Вьессана...
Theiler — см. Тейлера...
Thersil — см. Терсиля...
Thévenard — см. Тевенара..., Фуа — Тевенара...
Thevenet — см. Бальма — Тевене...
Thibierge — см. Тибьержа — Вейссенбаха...
Thiemann — см. Тиманна...
Thiers — см. Тьера..., Ашара — Тьера...
Thiersch — см. Тирша...
Thies — см. Тис...
Thiry — см. Тири..., Тири — Веллы...
Thoma — см. Томы...
Thomas — см. Тома..., Тома — Жюманти..., Тома — Ру..., Дежерина — Тома..., Томаса...
Thomayer — см. Томайера...
Thompson — см. Томпсона..., Томпсона — Рейсбека...
Thomsen — см. Томсена...
Thomson — см. Томсона...
Thormälen — см. Тормелена...
Thorn — см. Торна...
Thornton — см. Торнтона..., Торнтона — Боброва — Посадаса...
Thurel — см. Алажуанина — Тюреля...
Thursby-Pelham — см. Биккеля — Терсби-Пелхема...
Thygeson — см. Тайджесона...
Tiegel — см. Тигеля...
Tietze — см. Титце...
Tiffeneau — см. Тиффно..., Вотчала — Тиффно...
Tiling — см. Тилинга...
Tillaux — см. Тийо..., Верховского — Тийо...
Tinel — см. Тинеля...
Tisdall — см. Крамера — Тисдалла...
Tobian — см. Тобиана...
Tobler — см. Тоблера...
Todd — см. Тодда...
Tolan — см. Уотсона — Толана...
Tomes — см. Томса...
Ton That Tung — см. Тон Тхат Тунга...
Toni — см. Де Тони — Дебре — Фанкони...
Toomey — см. Раушкольба — Туми...
Tooth — см. Шарко — Мари — Тута...
Torek — см. Торека..., Торека — Герцена..., Добромыслова — Торека..., Китли — Торека — Герцена...
Torkildsen — см. Торкильдсена...
Tornwaldt — см. Торнвальдта...
Toti — см. Тоти...
Toulouse — см. Вюрпа — Тулуза...
Touraine — см. Турена..., Турена — Соланта — Голе..., Пейтца — Турена..., Пейтца — Турена — Егерса...
Tourette — см. Туретта...
Tournay — см. Турне...
Tourtual — см. Туртюаля...
Touton — см. Тутона...
Towne — см. Наффцигера — Тауна...
Toyama — см. Мацумото — Комая — Тоямы...
Toynbee — см. Тойнби..., Тойнби — Бинга...
Trantas — см. Трантаса...
Traquair — см. Треквейра...
Traube — см. Траубе..., Траубе — Геринга...
Traugott — см. Штауба — Трауготта...
Trautmann — см. Траутманна...
Treitz — см. Трейтца...
Trélat — см. Трела...
Trenaunay — см. Клиппеля — Треноне...
Trendelenburg — см. Тренделенбурга..., Броди — Троянова — Тренделенбурга...
Trénel — см. Сабуро — Приера — Трепеля...
Tresilian — см. Тресильена...
Tressder — см. Трессдера...
Treutler — см. Трейтлера...
Treves — см. Стюарта — Тривса...
Tribondeau — см. Бергонье — Трибондо...
Triboulet — см. Трибуле...
Tricot — см. Дегоса — Делора — Трико...
Tsocanakis — см. Лермитта — Монье—Вишара — Тсоканакиса...
Troell — см. Труэлля — Жюпе...
Tröltsch — см. Трельча...
Trömner — см. Тремнера...
Troisier — см. Труазье — Ано — Шоффара...
Trolard — см. Тролара...
Trotter — см. Троттера...
Trousseau — см. Труссо..., Труссо — Лаллемана...
Troxler — см. Трокслера...
Truc — см. Трюка...
Trueta — см. Труэты...
Tudor — см. Тьюдора — Эдвардса...
Turck — см. Тюрка..., Эрлиха — Тюрка...
Tuffier — см. Тюффье...
Tumiotto — см. Тумиотто..., Сотжиу — Тумиотто...
Turner — см. Грея Тернера..., Шерешев-

ского — Тернера — Бонневи — Ульриха..., Тернера...
Turyn — см. Турына...
Twort — см. Туорта...
Tyndall — см. Тиндаля...
Tyson — см. Тизоновы...
Tyzzer — см. Тиззера...
Tzanck — см. Тцанка...
Uhlenbruck — см. Уленбрука...
Uhlenhuth — см. Уленгута...
Ullrich — см. Ульриха..., Бонневи — Ульриха...
Ultzmann — см. Ультцманна...
Ungermann — см. Унгерманна...
Unna — см. Унны..., Бельца — Унны..., Дюкрея — Унны..., Унны — Паппенгейма..., Унны — Санти — Поллитцера..., Унны — Тенцера...
Unterberger — см. Унтербергера..., Шатца — Унтербергера...
Unterharnscheidt — см. Унтерхарншейдта...
Unverricht — см. Вагнера — Унферрихта — Хеппа...
Urbach — см. Урбаха..., Урбаха — Вите..., Урбаха — Оппенгейма...
Urban — см. Урбана..., Эрбана — Холдина...
Usher — см. Сенира — Ашера...
Valdoni — см. Квиероло — Вальдони — Клатуорти...
Valleix — см. Валле...
Valsalva — см. Вальсальвы...
Van Bogaert — см. Ван-Богарта..., Ван-Богарта — Диври..., Ван-Богарта — Миля..., Ван-Богарта — Озе..., Канавана — Ван-Богарта — Бертрана..., Феррарро — Ван-Богарта — Ниссена..., Шольца — Ван-Богарта...
Van Buchem — см. Ван-Бюхема...
Van Buren — см. Ван-Бурена...
Van Creveld — см. Гирке — Ван-Кревельда..., Эллиса — Ван-Кревельда...
Van de Velde — см. Ван-де-Вельде...
Van den Bergh — см. Ван-ден-Берга...
Van der Hoeve — см. Ван-дер-Хуве...
Van der Stricht — см. Ван-дер-Стрихта...
Van Gehuchten — см. Ван-Гехухтена...
Van Gieson — см. Ван-Гизона...
Van Hook — см. Ван-Гука..., Ван-Гука — Боари...
Van Loon — см. Ван-Лона..
Vanlair — см. Ванлера...
Van Neck — см. Ван-Некка...
Van Slyke — см. Ван-Слайка...
Vanzetti — см. Ванцетти...
Vaquez — см. Вакеза..., Вакеза — Ослера..., Бабинского — Вакеза...
Varolio — см. Варолиев...
Vasiliu — см. Маринеску — Драгануеску — Василиу...
Vater — см. Фатеров(-а)..., Фатера — Пачини...
Veau — см. Во..., Во — Лами...
Veit — см. Файта — Смелли...
Veith — см. Виса — Мюллера...
Vella — см. Веллы..., Тири — Веллы...
Velpeau — см. Вельпо...
Venel — см. Венеля...
Verbryke — см. Вербрайка...
Verdan — см. Вердана...
Verga — см. Верги...
Verheyen — см. Ферейена...
Verhoeff — см. Вергеффа...
Vernet — см. Верне — Сикара — Колле...
Verneuil — см. Вернея..., Кюммеля — Вернея...
Verocay — см. Верокаи...
Vervoort — см. Ферворта — Вольфа...
Vesalius — см. Везалия..., Везалиева...
Vianna — см. Арагана — Вианны...
Vicq d'Azyr — см. Вик-д'Азира...
Vidal — см. Видаля..., Видаля — Абрами...
Vieussens — см. Вьессана..., Тебезия — Вьессана...
Vignal — см. Виньяля — Вейона...
Vigouroux — см. Вигуру — Шарко...
Vilanova — см. Вилановы — Каньяделя..., Вилановы — Пиньоля Агваде...
Villard — см. Вийяра...
Villaret — см. Вилларе..., Вилларе — Дезуалля...
Vinard — см. Лермитта — Монье — Винара — Тсоканакиса...
Vincent — см. Венсана..., Венсана — Алажуанина..., Плаута — Венсана..., Симановского — Плаута — Венсана...
Vineberg — см. Вайнберга...
Vinson — см. Пламмера — Винсона...
Virchow — см. Вирхова..., Вирхова — Робена..., Гирке — Вирхова...
Vitek — см. Витека...
Voges — см. Фогеса — Проскауэра...
Vogt — см. Фогт..., Фогта..., Шпильмейера — Фогта...
Voigt — см. Фойгта...
Voillemier — см. Вуаллемье...
Volhard — см. Фольгарда...
Volkmann — см. Фолькманна..., Фолькмановский...
Voss — см. Фосса...
Vossius — см. Фоссиуса...
Vries — см. Де Ври...
Vrolik — см. Фролика...
Vulpian — см. Вюльпиана..., Вюльпиана — Бернгардта..., Вюльпиана — Гейденгайна.., Шарко — Вюльпиана...
Vulpius — см. Вульпиуса...
Vurpas — см. Вюрпа.., Вюрпа — Тулуза...
Waaler — см. Волера — Роуза...
Waardenburg — см. Клейна — Варденбурга...
Wachtel — см. Катца — Вахтеля...
Wagner — см. Вагнера..., Вагнера — Вольфа..., Вагнера — Унферрихта — Хеппа...
Wagner-Jauregg — см. Вагнер-Ярегга...
Wahlbaum — см. Вальбаума...
Walcher — см. Вальхера...
Waldenström — см. Вальденстрема...
Waldeyer — см. Вальдейера..., Пирогова — Вальдейера..., Фарра — Вальдейера...
Waldinski — см. Валиньского...
Walker — см. Уокера..., Денди — Уокера...
Wallace — см. Уоллеса...
Wallart — см. Валларта...
Wallenberg — см. Валленберга — Захарченко..., Климова — Валленберга..., Эдингера — Валленберга...
Waller — см. Валлеровское...
Wallgren — см. Валльгрена...
Walter — см. Вальтера — Боманна..., Гийена — Сеза — де Блондена — Вальтера...
Walthard — см. Вальтхарда...
Walther — см. Вальтера...
Wang — см. Ванга — Харриса...
Wanke — см. Ванке...
Wanner — см. Ваннера...
Warburg — см. Варбурга...
Wardrop — см. Браздора — Вардропа...
Warren — см. Уоррена...
Wartenberg — см. Вартенберга...
Warthin — см. Уортина...
Waser — см. Вазера...
Wassermann — см. Вассермана...
Wasting — см. Уэстинг...
Waterhouse — см. Уотерхауса — Фридериксена...
Waterston — см. Кули — Уотерстона...
Watson — см. Уотсона..., Уотсона — Толана...
Watson-Jones — см. Уотсон-Джонса...
Weber — см. Вебера..., Веберов(-а)..., Вебера — Гюблера — Жандрена..., Вебера — Димитри..., Вебера — Коккейна..., Вебера — Кохера..., Вебера — Крисчена..., Вебера — Фехнера..., Бугера — Вебера..., Пфейфера — Вебера — Крисчена..., Рандю — Вебера — Ослера..., Стерджа — Вебера..., Стерджа — Вебера — Краббе...
Webster — см. Вебстера — Бальди — Дартига...
Wechsberg — см. Нейссера — Вексберга...
Wechsler — см. Векслера — Беллвью...
Wecker — см. Веккера...
Weeks — см. Коха — Уикса...
Weerd — см. Калпа — де Верда...
Wegelin — см. Вегелина..., Фромана — Вегелина...
Wegener — см. Вегенера...
Wegner — см. Вегнера..., Вегнера — Корзуна...
Weichbrodt — см. Вейхбродта...
Weichselbaum — см. Вейксельбаума...
Weigert — см. Вейгерта..., Вейгерта — Мейера...., Вейгерта — Паля...
Weigl — см. Вейгля...
Weil — см. Вейля..., Вейля — Клерка..., Вейля — Феликса..., Бабинского — Вейля..., Клиппеля — Вейля...
Weill — см. Вейлля..., Вейлля — Рея — Эйди..., Лери — Вейлля...
Weillon — см. Виньяля — Вейона...
Weinberg — см. Вейнберга..., Харди — Вейнберга...
Weingarten — см. Вайнгартена...
Weisenburg — см. Вейзенбурга — Сикара — Робино...
Weisman — см. Вейсмана...
Weismann — см. Вейсмана...
Weiss — см. Вейсса..., Вейсса — Эдельмана..., Горвега — Вейсса..., Маллори — Вейсса...
Weissenbach — см. Тибьержа — Вейссенбаха...
Weitbrecht — см. Вайтбрехта...
Welander — см. Веландер..., Говерса — Веландера..., Кугельберга — Веландер...
Welti — см. Лиана — Сигье — Вельти...
Weltmann — см. Вельтманна...
Wendel — см. Марведеля — Венделя...
Wendt — см. Вендта — Вредена...
Wenkebach — см. Венкебаха..., Ахелиса — Венкебаха..., Самойлова — Венкебаха...
Wenner — см. Веннера...
Werdnig — см. Верднига — Гоффманна...
Werlhof — см. Верльгофа...
Werneking — см. Вернекинга...
Werner — см. Вернера..., Вернера — Гиса...
Wernicke — см. Вернике..., Вернике — Манна..., Гайе — Вернике..., Посады — Вернике..., Рика — Вернике...
Werth — см. Верта...
Wertheim — см. Вертгейма..., Александрова — Шауты — Вертгейма...
Werther — см. Вертера — Вернера — Дюмлинга...
West — см. Уэста...
Westergren — см. Вестергрена...
Westphal — см. Вестфаля..., Вестфаля — Вильсона — Коновалова..., Вест-

фаля — Гольдфлама..., Вестфаля — Штрюмпелля..., Лейдена — Вестфаля..., Эдингера — Вестфаля...
Wetzel — см. Кункеля — Ветцеля...
Weve — см. Веве — Сафара...
Wever — см. Уэвера — Брея...
Weyers — см. Вейерса...
Wharton — см. Вартонов...
Whipple — см. Уиппла...
White — см. Уайта..., Бланда — Уайта — Гарленда..., Вольффа — Паркинсона — Уайта...
Whitehead — см. Уайтхеда...
Whitman — см. Уитмена..., Генле — Уитмена...
Whitmore — см. Маршалла — Уитмора...
Wicherkiewicz — см. Вихеркевича...
Wickersheimer — см. Виккерсгеймера...
Wickham — см. Уикхема...
Widal — см. Видаля..., Гайема — Видаля...
Widmann — см. Видманна — Нейманна...
Widmark — см. Видмарка...
Widmer — см. Видмера...
Widrowitz — см. Видровитца...
Wigand — см. Виганда...
Wieck — см. Вика...
Wiener — см. Винера...
Wiethe — см. Урбаха — Вите...
Wilder — см. Уайлдера...
Wildermuth — см. Вильдермута...
Wildervanck — см. Вилдерванка...
Wilkins — см. Уилкинса...
Wilkinson — см. Израэльса — Уилкинсона...
Willebrand — см. Виллебранда..., Вилебранда — Юргенса...
Willett — см. Уиллетта — Иванова — Гаусса...
Willi — см. Прадера — Вилли...
Williams — см. Вильямса..., Уилльямса...
Willis — см. Виллизиев..., Виллизия..., Уилласа...
Wills — см. Уиллс — Бальфура — Мак-Суини...
Wilms — см. Вильмса..., Спасокукоцкого — Вильмса...
Wilson — см. Вильсона..., Вильсона — Блера..., Вильсопа — Брока..., Вильсона — Коновалова..., Вильсон — Микити..., Вестфаля — Вильсона — Коновалова..., Уилсона..., Драгстедта — Уилсона..., Ирасека — Цюльцера — Уилсона...
Wimberger — см. Вимбергера...
Wimmer — см. Виммера...
Windscheid — см. Виндшейда...
Winiwarter — см. Винивартера..., Винивартера — Бюргера...
Winkelmann — см. Винкельманна...
Winkler — см. Винклера...
Winslow — см. Винслоу...
Winter — см. Винтера...
Winterbottom — см. Уинтерботтома...
Winternitz — см. Винтернитца...
Wintrich — см. Винтриха...
Wise — см. Уайза — Рейна...
Wiskott — см. Вискотта — Олдрича...
Wissler — см. Висслера — Фанкони...
Witebsky — см. Закса — Витебского...
Wittek — см. Брунна — Виттека...
Witzel — см. Витцеля..., Витцеля — Айзельсберга...
Wodak — см. Водака..., Водака — Фишера...
Wohlfahrt — см. Вольфартова...
Wohlgemuth — см. Вольгемута...
Wolfe — см. Вагнера — Вольфа..., Яценко — Вольфа — Краузе...
Wolff — см. Вольффа..., Вольфов(-а)..., Вольффа — Паркинсона — Уайта..., Ферворта — Вольффа...
Wolff-Eisner — см. Кальметта — Вольфф-Эйснера...
Wolman — см. Вольмана...
Wood — см. Вуда..., Нормана — Вуда...
Woodlonghan — см. Масса — Вудлонгана...
Woods — см. Вудса...
Woringer — см. Потрие — Воренже...
Worm — см. Вормиевы...
Worth — см. Уорта...
Wortis — см. Кеннеди — Уортиса...
Wright — см. Райта...
Wrisberg — см. Врисберга...., Врисбергов...
Wuhrmann — см. Вурманна — Вундерли...
Wullstein — см. Вулльштейна...
Wunderlich — см. Вундерлиха...
Wunderly — см. Вурманна — Вундерли...
Wurffbain — см. Вурффбайна — Джексона...
Wynter — см. Винтера...
Wyeth — см. Уайета...
Wylie — см. Уайли...
Yen — см. Крейги — Иена — Феликса...
Yersin — см. Иерсинии...
Young — см. Янга..., Дайка — Янга..., Юнга — Гельмгольца..., Ломоносова — Юнга — Гельмгольца...
Zak — см. Златкиса — Зака...
Zammitti — см. Дзаммити — Блазиуса...
Zand — см. Зильберласт — Занд...
Zang — см. Цанга...
Zangemeister — см. Цангемейстера...
Zaufal — см. Цауфаля...
Zdansky — см. Шерфа — Зданского...
Zeek — см. Зика...
Zeis — см. Цейса...
Zeiss — см. Цейсса...
Zeissler — см. Цейсслера...
Zemnowich — см. Цемновича...
Zenker — см. Ценкера..., Ценкеровский...
Zettnow — см. Цеттнова...
Zieler — см. Цилера...
Ziehl — см. Циля..., Циля — Нельсена...
Zimmermann — см. Циммерманна...
Zinn — см. Циннова(-о)...
Zinsser — см. Цинссера — Коула — Энгмена...
Zlatkis — см. Златкиса — Зака...
Zollinger — см. Золлингера — Эллисона...
Zondek — см. Ашгейма — Цондека...
Zuelzer — см. Цюльцера — Огдена..., Ирасека — Цюльцера — Уилсона...
Zumbusch — см. Цумбуша...
Zwahlen — см. Франческетти — Цвалена...
Zylberlast — см. Зильберласт — Занд...
Zur Nedden — см. Цур Неддена...

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)
SYSTÈME INTERNATIONAL D. UNITEES (SI)

УКАЗАНИЯ К ПОЛЬЗОВАНИЮ ТАБЛИЦАМИ

1. Полужирным шрифтом обозначены единицы Международной системы единиц (СИ).

2. Звездочкой обозначены единицы измерения, не вошедшие в Международную систему единиц и подлежащие изъятию.

3. Единицы измерения, не вошедшие в Международную систему единиц, но допускаемые к применению, даются обычным прямым шрифтом.

4. Обозначения соответствующих единиц измерения вначале даются по Международной системе единиц прямым шрифтом без курсива, а рядом в скобках приводятся обозначения, применяемые ранее, напр.: с (сек.), **Вт** (*вт*), м (*м*) и т. д.

5. Понятие размерности (т. е. условного «обозначения» величин), представленное в одной из граф таблиц 1—8, отражает связь данной физической величины с основными величинами системы единиц (таблица 1) и является произведением основных величин, возведенных в соответствующие степени. Напр., размерность силы в Международной системе единиц представляет собой выражение:

$$LMT^{-2} \text{ или } \left(\frac{\text{м.кг}}{\text{с}^2}\right),$$

где L, M и T — размерности длины, массы и времени (метр, килограмм и секунда соответственно).

ТАБЛИЦА 1

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ

Величина	Наименование	Определение	Размерность	Обозначения	
				русское	международное
		Основные единицы			
Длина	**метр**	Длина, равная 1650763,73 длин волн излучения в вакууме, соответствующего переходу между уровнями $2p_{10}$ и $5d_5$ атома криптона-86	L	м (*м*)	m
Масса	**килограмм**	Представлен массой международного платиноиридиевого прототипа килограмма	M	кг (*кг*)	kg
Время	**секунда**	Отрезок времени, равный 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133	T	с (сек.)	s
Сила электрического тока	**ампер**	Величина, равная силе неизменяющегося тока, к-рый при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии одного метра один от другого в пустоте, вызвал бы между этими проводниками силу, равную $2 \cdot 10^{-7}$ Н на каждый метр длины	I	А (*а*)	A
Термодинамическая температура (температура)	**кельвин** (градус Кельвина)	Величина, составляющая 1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды	θ	К (°К)	K
Количество вещества	**моль**	Количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 *кг*	N	моль (*моль*)	mol
Сила света	**кандела** (свеча)	Сила света, испускаемого с поверхности площадью 1/600 000 $м^2$ полного излучателя в перпендикулярном направлении при температуре излучателя, равной температуре затвердевания платины при давлении 101325 Па	J	кд (*св*)	cd
		Дополнительные единицы			
Плоский угол	**радиан**	Центральный угол, соответствующий дуге, длина к-рой равна ее радиусу	—	рад (*рад*)	rad
Телесный угол	**стерадиан**	Величина телесного угла, вырезающего на сфере, описанной вокруг вершинного угла, поверхность, площадь к-рой равна квадрату радиуса сферы	—	ср (*стер*)	sr

ТАБЛИЦА 2

ВАЖНЕЙШИЕ ЕДИНИЦЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения		Содержит единиц СИ
			русское	международное	
Длина, ширина, высота, толщина	**метр**	L	м (*м*)	m	
	астрономическая единица		а. е.	—	1 а. е. = $1{,}49600 \cdot 10^{11}$ м
	парсек		пк	pc	1 пк = $3{,}0857 \cdot 10^{16}$ м
	световой год		св. год	l. y.	1 св. год = $9{,}4605 \cdot 10^{15}$ м
	ангстрем*		$\mathring{A}$	Å	$1\mathring{A} = 1 \cdot 10^{-10}$ м
	микрон*		мк	μ	1 *мк* = $1 \cdot 10^{-6}$ м
Время	**секунда**	T	с (сек.)	s	
	минута		мин.	min	1 мин. = 60 с
	час		ч (час)	h	1 ч = 3600 с
	сутки		сут.	d	1 сут. = 24 ч = 86400 с
Скорость	**метр в секунду**	LT^{-1}	м/с (*м/сек*)	m/s	
Угловая скорость	**радиан в секунду**	T^{-1}	рад/с (*рад/сек*)	rad/s	
Ускорение	**метр на секунду в квадрате**	LT^{-2}	м/$с^2$ (*м/сек*^{2})	m/s^2	
Градиент ускорения	**секунда в минус второй степени**	T^{-2}	$с^{-2}$ ($сек^{-2}$)	s^{-2}	
Угловое ускорение	**радиан на секунду в квадрате**	T^{-2}	рад/$с^2$ (*рад/сек*^{2})	rad/s^2	

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения		Содержит единиц СИ
			русское	международное	
Частота периодического события (частота)	**герц**	T^{-1}	Гц (*гц*)	Hz	
Частота событий, частота вращения, угловая частота, круговая частота	**секунда в минус первой степени**	T^{-1}	$с^{-1}$ (сек.$^{-1}$)	s^{-1}	
	оборот в секунду*		*об/сек*	—	1 *об/сек* = 1 $с^{-1}$
Плоский угол	**радиан**	I	рад	rad	
	градус		...°	...°	1° = 1,745·10^{-2} рад
	минута		...′	...′	1′ = 2,909·10^{-4} рад
	секунда		...″	...″	1″ = 4,848·10^{-6} рад
Телесный угол	**стерадиан**	I	ср (*стер*)	sr	
Масса	**килограмм**	M	кг (*кг*)	kg	
	тонна		т (*т*)	t	1 *т* = 10^3 кг
	карат*		*кар*	ct	1 *кар* = 2·10^{-4} кг = 0,2 г
	атомная единица массы		а. е. м.	u	1 а. е. м. = 1,66053·10^{-27}
Объем, вместимость	**кубический метр**	L^3	$м^3$	m^3	
	литр		л	l	
Плотность (средняя плотность, насыпная плотность)	**килограмм на кубический метр**	$L^{-3}M$	$кг/м^3$	kg/m^3	
Линейная плотность	**килограмм на метр**	$L^{-1}M$	кг/м	kg/m	
Поверхностная плотность	**килограмм на квадратный метр**	$L^{-2}M$	$кг/м^2$	kg/m^2	
Площадь	**квадратный метр**	L^2	$м^2$	m^2	
	гектар		га	ha	
Сила (сила тяжести, подъемная сила), вес	**ньютон**	LMT^{-2}	Н	N	
	дина		*дин*	dyn	1 *дин* = 10^{-5} Н
	килограмм-сила*		*кгс*	kgf	1 *кгс* = 9,81 Н
	грамм-сила*		*гс*	gf	1 *гс* = 9,81·10^{-3} Н
Удельная сила тяжести, удельный вес	**ньютон на кубический метр**	$L^{-2}MT^{-2}$	$Н/м^3$	N/m^3	
	килограмм-сила на кубический метр*		*кгс/м*^{3}	kgf/m^3	1 *кгс/м*^{3} = 9,81 $Н/м^3$
	дина на кубический сантиметр		*дин/см*^{3}	dyn/cm^3	1 *дин/см*^{3} = 9,81 $Н/м^3$
Момент силы, вращающий (крутящий) момент, момент пары сил	**ньютон-метр**	L^2MT^{-2}	Н·м	N·m	
Давление	**паскаль**	$L^{-1}MT^{-2}$	Па	Pa	
	дина на квадратный сантиметр*		*дин/см*^{2}	dyn/cm^2	1 *дин/см*^{2} = 10^{-1} $Н/м^2$
	бар*		*бар*	bar	1 *бар* = 10^5 Па
	миллиметр ртутного столба*		*мм* рт. ст.	mm Hg	1 *мм* рт. ст. = 133,322 Па
	миллиметр водяного столба*		*мм* вод. ст.	mm H_2O	1 *мм* вод. ст. = 9,807 Па
	атмосфера техническая*		*ат*	at	1 *ат* = 9,807·10^4 Па
	атмосфера физическая*		*атм*	atm	1 *атм* = 1,033 *ат* = = 1,013·10^5 Па
	тор*		*тор*	tor	1 *тор* = 1 *мм* рт. ст.
Градиент давления, градиент напряжения	**паскаль на метр**	$L^{-2}MT^{-2}$	Па/м	Pa/m	
Энергия (потенциальная, кинетическая)	**джоуль**	L^2MT^{-2}	Дж (*дж*)	J	
	тонна-сила-метр*		*тс·м*	tf·m	1 *тс·м* = 9,807·10^3 Дж
	килограмм-сила-метр*		*кгс·м*	kgf·m	1 *кгс·м* = 9,807 Дж
	грамм-сила-сантиметр*		*гс·см*	gf·cm	1 *гс·см* = 9,807·10^{-4} Дж
	лошадиная сила-час*		*л. с.·ч*	—	1 *л. с.·ч* = 2,65·10^6 Дж
	эрг		*эрг*	erg	1 *эрг* = 10^{-7} Дж
	электронвольт		эВ (*эв*)	eV	1 эВ = 1,60219·10^{-19} Дж
Удельная энергия (работа, прочность, жесткость)	**джоуль на килограмм**	L^2T^{-2}	Дж/кг	J/kg	
Мощность	**ватт**	L^2MT^{-3}	Вт (*вт*)	W	
	эрг в секунду		*эрг/сек*	erg/s	1 *эрг/сек* = 10^{-7} Вт
	лошадиная сила*		*л. с.*	—	1 *л. с.* = 735,5 Вт

ТАБЛИЦА 3

ВАЖНЕЙШИЕ ЕДИНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения		Содержит единиц СИ
			русское	международное	
Сила электрического тока (сила тока)	**ампер**	I	А	A	
Количество электричества, электрический заряд	**кулон**	TI	Кл	C	
	ампер-секунда		А·с (*а·сек.*)	A·s	1 А·с = 1 Кл
Линейная плотность электрического тока	**ампер на метр**	$L^{-1}I$	А/м	A/m	
Поверхностная плотность электрического тока, плотность электрического тока	**ампер на квадратный метр**	$L^{-2}I$	А/м²	A/m²	
Объемная плотность электрического заряда	**кулон на кубический метр**	$L^{-3}TI$	Кл/м³	c/m³	
Электрическое напряжение, электрический потенциал, электродвижущая сила (эдс)	**вольт**	$L^2MT^{-3}I^{-1}$	В (*в*)	V	
Напряженность электрического поля	**вольт на метр**	$LMT^{-3}I^{-1}$	В/м (*в/м*)	V/m	
Электрическая емкость	**фарада**	$L^{-2}M^{-1}T^4I^2$	Ф (*ф*)	F	
Абсолютная диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная	**фарада на метр**	$L^{-3}M^{-1}T^4I^2$	Ф/м	F/m	
Электрическое сопротивление (активное, реактивное, полное, комплексное)	**ом**	$L^2MT^{-3}I^{-2}$	Ом (*ом*)	Ω	
Удельное электрическое сопротивление	**ом-метр**	$L^3MT^{-3}I^{-2}$	Ом·м	Ω·m	
Электрическая проводимость	**сименс**	$L^{-2}M^{-1}T^3I^2$	См	S	
Удельная электрическая проводимость	**сименс на метр**	$L^{-3}M^{-1}T^3I^2$	См/м	S/m	
Магнитный поток	**вебер**	$L^2MT^{-2}I^{-1}$	Вб (*вб*)	Wb	
	максвелл*		*Мкс*	Mx	1 *Мкс* = $=1\cdot10^{-8}$ Вб
Магнитная индукция (плотность магнитного потока)	**тесла**	$MT^{-2}I^{-2}$	Т (*тс*)	T	
	вебер на квадратный метр		Вб/м²	Wb/m²	1 Вб/м² = 1 Т
	гаусс*		Гс (*гс*)	Gs	1 Гс = 10^{-4} Т
Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов	**ампер**	I	А	A	
	гильберт		Гб (*гб*)	Gb	1 Гб = 0,796 А
	ампер-виток*		А·в (*а·в*)	A·t	1 *а·в* = 1 А
Напряженность магнитного поля	**ампер на метр**	$L^{-1}I$	А/м	A/m	
	эрстед		Э (*э*)	Oe	1 Э = 79,58 А/м
Индуктивность, взаимная индуктивность	**генри**	$L^2MT^{-2}I^{-2}$	Г	H	
Абсолютная магнитная проницаемость	генри на метр	$LMT^{-2}I^{-2}$	Г/м	H/m	
Магнитный момент электрического поля, магнитный момент диполя	**ампер-квадратный метр**	L^2I	А·м²	A·m²	
Намагниченность	**ампер на метр**	$L^{-1}I$	А/м	A/m	
Магнитное сопротивление	**ампер на вебер**	$L^{-2}M^{-1}T^2I^2$	А/Вб	A/Wb	
	генри в минус первой степени		Г⁻¹	H⁻¹	
Мощность электрической цепи:					
активная	**ватт**	L^2MT^{-3}	Вт (*вт*)	W	
реактивная	**вар**	L^2MT^{-3}	вар	var	
полная	**вольт-ампер**	L^2MT^{-3}	В·А (*в·а*)	V·A	
Частота электрического тока	**герц**	T^{-1}	Гц (*гц*)	Hz	

ТАБЛИЦА 4

ВАЖНЕЙШИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОВЫХ ВЕЛИЧИН

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения		Содержит единиц СИ
			русское	международное	
Термодинамическая температура (температура)	**кельвин**	θ	К (°К)	K	
Температура Цельсия по практической температурной шкале	градус Цельсия	θ	°С	°C	$t°=T-T_0$, где $t°$ — температура Цельсия, T — температура Кель-

ТАБЛИЦА 4

(продолжение)

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения: русское	Обозначения: международное	Содержит единиц СИ
					вина, $T_0 = 273{,}15$ *К* (по размерам градус Цельсия равен кельвину)
Температурный коэффициент (линейного расширения, объемного расширения давления)	**кельвин в минус первой степени**	θ^{-1}	$К^{-1}$	K^{-1}	
	градус Цельсия в минус первой степени		$°C^{-1}$	$°C^{-1}$	1 $°C^{-1} = 1$ K^{-1}
Температурный градиент	**кельвин на метр**	$L^{-1}\theta$	К/м	K/m	
	градус Цельсия на метр		°С/м	°C/m	1 °С/м = 1 К/м
Количество теплоты, энтальпия, внутренняя энергия, теплота химической реакции, теплота фазового превращения (скрытая теплота)	**джоуль**	L^2MT^{-2}	Дж	J	
	калория*		*кал*	cal	1 *кал* = 4,187 Дж
	килокалория*		*ккал*	kcal	1 *ккал* = $4{,}187 \cdot 10^3$ Дж
	калория термохимическая		*кал* (термох.)	cal_{th}	1 *кал* (термох.) = 4,184 Дж
Удельное количество теплоты, удельная энтальпия, удельная внутренняя энергия, удельная внутренняя теплота химической реакции, удельная теплота фазового превращения (удельная скрытая теплота)	**джоуль на килограмм**	L^2T^{-2}	Дж/кг	J/kg	
	калория на грамм*		*кал/г*	cal/g	1 *кал/г* = $4{,}187 \cdot 10^3$ Дж/кг
	килокалория на килограмм*		*ккал/кг*	kcal/kg	1 *ккал/кг* = $4{,}187 \cdot 10^3$ Дж/кг
Теплоемкость системы; энтропия системы	**джоуль на кельвин**	$L^2MT^{-2}\theta^{-1}$	Дж/К	J/K	
	джоуль на градус Цельсия		Дж/°С	J/°C	1 Дж/°С = 1 Дж/К
	калория на градус*		*кал/град*	cal/grad	1 *кал/град* = 4,187 Дж/К
Удельная теплоемкость системы, удельная энтропия, удельная газовая постоянная	**Джоуль на килограмм-кельвин**	$L^2T^{-2}\theta^{-1}$	Дж/(кг·К)	J/(kg·K)	
	калория на грамм-градус*		*кал/(г·град)*	cal/(g·grad)	1 *кал/(г·град)* = $= 4{,}187 \cdot 10^3$ Дж/(кг·К)
Тепловой поток (мощность теплового потока)	**ватт**	L^2MT^{-3}	Вт (*вт*)	W	
	калория в секунду*		*кал/сек*	cal/s	
	килокалория в час*		*ккал/час*	kcal/h	1 *ккал/час* = 1,163 Вт
Поверхностная плотность теплового потока	**ватт на квадратный метр**	MT^{-3}	Вт/м²	W/m²	
	калория на квадратный сантиметр-секунду*		*кал/(см²·сек)*	cal/(cm²·s)	1 *кал/(см²·сек)* = $4{,}187 \cdot 10^4$ Вт/м²
	килокалория на квадратный метр-час*		*ккал/(м²·час)*	kcal/(m²·h)	1 *ккал/(м²·час)* = 1,163 Вт/м²
Объемная плотность теплового потока	**ватт на кубический метр**	$L^{-1}MT^{-3}$	Вт/м³	W3W/m³	
	калория на кубический сантиметр-секунду*		*кал/(см³·сек)*	cal/(cm³·s)	1 *кал/(см³·сек)* = $4{,}187 \cdot 10^4$ Вт/м³
	килокалория на кубический метр-час*		*ккал/(м³·час)*	kcal/(h·m³)	1 *ккал/(м³·час)* = 1,163 Вт/м³
Коэффициент теплоотдачи (теплообмена); коэффициент теплопередачи	**ватт на квадратный метр-кельвин**	$MT^{-3}\theta^{-1}$	Вт/(м²·К)	W/(m²·K)	
	калория на квадратный сантиметр-градус Цельсия*		*кал/(см²·°С)*	cal/(s·cm²·°C)	1 *кал/(см²·°С)* = $= 4{,}187 \cdot 10^2$ Вт/(м²·К)
Теплопроводность	**ватт на метр-кельвин**	$LMT^{-3}\theta^{-1}$	Вт/(м·К)	W/(m·K)	
	калория в секунду на сантиметр-градус Цельсия*		*кал/(сек·см·°С)*	cal/(s·cm·°C)	1 *кал/(сек·см·°С)* = $= 418{,}68$ Вт/(м·К)
	килокалория в час на метр-градус Цельсия*		*ккал/(час·м·°С)*	kcal/(h·m·°C)	1 *ккал/(час·м·°С)* = $= 1{,}163$ Вт/(м·К)

ТАБЛИЦА 5

ВАЖНЕЙШИЕ ЕДИНИЦЫ АКУСТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения		Содержит единиц СИ
			русское	международное	
Период, время периода	**секунда**	T	с (сек.)	s	
Частота (частота периодического события)	**герц**	T^{-1}	Гц (*гц*)	Hz	
Длина волны	**метр**	L	М (*м*)	m	
	паскаль	$L^{-1}MT^{-2}$	Па (*па*)	Pa	
Звуковое давление (мгновенное звуковое давление)	**ньютон на квадратный метр**		Н/м²	N/m²	1 Н/м²=1 Па
	дина на квадратный сантиметр (акустический бар)*		*дин/см²*	dyn/cm²	1 *дин/см²*=10^{-1} Н/м²
Скорость звука (мгновенная скорость звука), скорость продольных волн, скорость поперечных волн, групповая скорость звука	**метр в секунду**	LT^{-1}	м/с	m/s	
Звуковая энергия	**джоуль**	L^2MT^{-2}	Дж (*дж*)	J	
Звуковая мощность, поток звуковой энергии	**ватт**	L^2MT^{-3}	Вт (*вт*)	W	
Интенсивность звука (сила звука)	**ватт на квадратный метр**	MT^{-3}	Вт/м²	W/m²	
Плотность звуковой энергии	**джоуль на кубический метр**	$L^{-1}MT^{-2}$	Дж/м³	J/m³	
Акустическое сопротивление	**паскаль-секунда на кубический метр**	$L^{-4}MT^{-1}$	Па·с/м³	Pa·s/m³	
Удельное акустическое сопротивление	**паскаль-секунда на метр**	$L^{-2}MT^{-1}$	Па·с/м	Pa·s/m	
Уровень звуковой мощности, уровень звукового давления, уровень громкости	децибел		дБ	dB	
	фон*		*фон*	—	1 *фон*= 1 дБ

ТАБЛИЦА 6

ВАЖНЕЙШИЕ ЕДИНИЦЫ ЛУЧИСТЫХ И СВЕТОВЫХ ВЕЛИЧИН ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения		Содержит единиц СИ
			русское	международное	
Длина волны	**метр**	L	М	m	
Длительность периода (период)	**секунда**	T	с (сек.)	s	
Скорость распространения электромагнитных волн (скорость света)	**метр в секунду**	LT^{-1}	м/с	m/s	
Лучистая энергия (энергия излучения), интегральная доза (в ультрафиолетовой терапии и фотобиологии)	**джоуль**	L^2MT^{-2}	Дж	J	
Плотность лучистой энергии	**джоуль на кубический метр**	$L^{-1}MT^{-3}$	Дж/м³	J/m³	
Лучистый поток	**ватт**	L^2MT^{-3}	Вт	W	
Поверхностная плотность лучистого потока, облученность, дебит дозы (в ультрафиолетовой терапии и фотобиологии), излучательность, тепловая излучательность	**ватт на квадратный метр**	MT^{-2}	Вт/м²	W/m²	
Лучистая экспозиция (энергетическое количество освещенности)	**джоуль на квадратный метр**	MT^{-2}	Дж/м²	J/m²	
Сила излучения (источника в некотором направлении), энергетическая сила света	**ватт на стерадиан**	L^2MT^{-3}	Вт/ср	W/sr	
Лучистость (энергетическая яркость)	**ватт на стерадиан-квадратный метр**	MT^{-3}	Вт/(ср·м²)	W/(sr·m²)	

ТАБЛИЦА 6 (продолжение)

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения: русское	Обозначения: международное	Содержит единиц СИ
Сила света	**кандела**	J	кд	cd	
	свеча		*св*	cd	1 *св* = 1 кд
Световой поток	**люмен**	J	лм	lm	1 лм = 1 кд·ср
Световая энергия (количество света)	**люмен-секунда**	TJ	лм·сек.	lm·s	
	люмен-час		лм·час	lm·h	1 лм·час =
Освещенность	**люкс**	$L^{-2}J$	лк	lx	= 3600 лм·с
Светимость	**люмен на квадратный метр**	$L^{-2}J$	лм/м²	Lm/m²	
Яркость, эквивалентная яркость	**кандела на квадратный метр**	$L^{-2}J$	кд/м²	cd/m²	
	нит*		*нт*	nt	1 *нт* = 1 кд/м²
	стильб*		*сб*	sb	1 *сб* = 10^4 кд/м²
	апостильб*		*асб*	asb	1 *асб* =
					= 0,319 кд/м²
	ламберт*		Лб (*лб*)	L	1 *лб* =
					= 3193 кд/м²
Световая эффективность, световой эквивалент лучистого потока (потока излучения); относительная световая эффективность (относительная видность); световая отдача (источника)	**люмен на ватт**	$L^{-2}M^{-1}T^3J$	лм/Вт	Lm/W	
Двугранно-угловая плотность светового потока	**люмен на метр-радиан**	$L^{-1}J$	лм/(м·рад)	lm/(m·rad)	
Поверхностная плотность светового потока	**люмен на квадратный метр**	$L^{-2}J$	лм/м²	lm/m²	
Линейный показатель поглощения	**метр в минус первой степени**	L^{-1}	$м^{-1}$	m^{-1}	
Массовый показатель поглощения (показатель поглощения на единицу массы)	**квадратный метр на килограмм**	L^2M^{-1}	м²/кг	m²/kg	
Молярный коэффициент поглощения	**квадратный метр на моль**	L^2N^{-1}	м²/моль	m²/mol	

ТАБЛИЦА 7

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения: русское	Обозначения: международное	Содержит единиц СИ
Количество вещества	**моль**	N	моль (*моль*)	mol	
	грамм-моль*		*г·моль*	g·mol	1 *г·моль* =
					= 1 моль
	грамм-атом*		*г·атом*	g·at	1 *г·атом* =
					= 1 моль
	грамм-ион*		*г·ион*	g·ion	1 *г·ион* =
					= 1 моль
Молярная масса	**килограмм на моль**	MN^{-1}	кг/моль (*кг/моль*)	kg/mol	
Молярный объем	**кубический метр на моль**	L^3N^{-1}	$м^3$/моль ($м^3$/*моль*)	m^3/mol	
Молярная внутренняя энергия, молярная энтальпия, молярный тепловой эффект химической реакции; химическое сродство	**джоуль на моль**	$L^2MT^{-2}N^{-1}$	Дж/моль	J/mol	
Парциальное давление компонента (в газовой смеси); летучесть компонента в газовой смеси; осмотическое давление	**паскаль**	$L^{-1}MT^{-2}$	Па (*па*)	Pa	
Объемное число молекул (или частиц); молекулярная концентрация компонента	**метр в минус третьей степени**	L^{-3}	$м^{-3}$	m^{-3}	
Массовая концентрация компонента	**килограмм на кубический метр**	$L^{-3}M$	кг/$м^3$	kg/$м^3$	

ТАБЛИЦА 7 (продолжение)

Величина	Наименование	Размерность	Обозначения: русское	Обозначения: международное	Содержит единиц СИ
Концентрация (молярная) компонента, концентрация количества вещества компонента, молярность компонента	**моль на кубический метр**	$L^{-3}N$	моль/м³ (*моль/м³*)	mol/m³	
Поверхностное натяжение	**ньютон на метр**	MT^{-2}	Н/м	N/m	
Динамическая вязкость (вязкость)	**паскаль-секунда**	$L^{-1}MT^{-1}$	Па·с	Pa·s	
	пуаз		П (*пз*)	P	1 П = 10^{-1} Па·с
Кинематическая вязкость	**квадратный метр на секунду**	L^2T^{-1}	м²с	m²/s	
	стокс		Ст (*ст*)	St	1 Ст = 10^{-4} м²/с
Молярность раствора компонента	**моль на килограмм**	$M^{-1}N$	моль/кг (*моль/кг*)	mol/kg	
Коэффициент диффузии, коэффициент тепловой диффузии	**квадратный метр на секунду**	L^2T^{-1}	м²/с (*м²/сек*)	m²/s	
Ионная сила раствора	**моль на килограмм**	$M^{-1}N$	моль/кг	mol/kg	
Скорость хим. реакции	**моль в секунду на кубический метр**	$L^{-3}T^{-1}N$	моль/(с·м³)	mol/(s·m³)	
Электродный потенциал, окислительно-восстановительный потенциал	**вольт**	$L^2MT^{-3}I^{-1}$	В (*в*)	V	
Ионный эквивалент концентрации	**моль на кубический метр**	$L^{-3}N$	моль/м³ (*моль/м³*)	mol/m³	
Подвижность ионов	**квадратный метр на вольт-секунду**	$M^{-1}T^2I$	м²/(В·с) (*м²/(в·сек)*)	m²/(V·s)	

ТАБЛИЦА 8

ВАЖНЕЙШИЕ ЕДИНИЦЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Величина	Определение величины	Наименование и размерность	Обозначения: русское	Обозначения: международное	Содержит единиц СИ
Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность изотопа)	Число актов распада данного нуклида, происходящих в единицу времени в радиоактивном излучателе	**секунда в минус первой степени** (T^{-1})	$с^{-1}$	s^{-1}	
		распад в секунду	*расп/сек*	s^{-1}	1 *расп/сек* = 1 $с^{-1}$
		кюри*	*Ки (кюри)*	Ci	1 *кюри* = $3{,}7 \cdot 10^{10} с^{-1}$
Поглощенная доза излучения (доза излучения), эквивалентная доза излучения, керма	Энергия любого ионизирующего излучения, поглощенная единицей массы облученного вещества (объекта)	**джоуль на килограмм** или **грей** (L^2T^{-2})	Дж/кг или Гй (Гр)	J/kg или Gy	
		эрг на грамм	*эрг/г*	erg/g	1 *эрг/г* = 10^{-4} Дж/кг
		рад*	*рад*	rad	1 *рад* = 10^{-2} Дж/кг
		бэр*	*бэр*	rem	1 *бэр* = 10^{-2} Дж/кг
Мощность поглощенной дозы излучения (мощность дозы излучения), мощность эквивалентной дозы излучения, мощность кермы	Доза излучения, поглощенная в единицу времени	**ватт на килограмм** или **грей в секунду** (L^2T^{-3})	Вт/кг или Гй/с (Гр/с)	W/kg или Gy/s	
		эрг в секунду на грамм	эрг/(с·г)	erg/(s·g)	1 эрг/(с·г) = $=10^{-4}$ Вт/кг
		рад в секунду*	*рад/сек*	rad/s	1 *рад/сек* = $=10^{-2}$ Вт/кг = $=10^{-2}$ Дж/(с·кг)
		рад в час*	*рад/час*	rad/h	1 *рад/час* = $=2{,}78 \cdot 10^{-6}$ Вт/кг
		бэр в секунду*	*бэр/сек*	rem/s	1 *бэр/сек* = $=10^{-2}$ Вт/кг
Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения)	Количественная характеристика рентгеновского и гамма-излучений, основанная на их ионизирующем действии в сухом атмосферном воздухе и выраженная отношением суммарного электрического заряда ионов одного знака, образованного излучением, поглощенным в нек-рой массе воздуха, к этой массе	**кулон на килограмм** ($M^{-1}TI$)	Кл/кг	C/kg	
		рентген*	*Р (р)*	R	1 *Р* = $2{,}5797 \cdot$ $\cdot 10^{-4}$ Кл/кг

ТАБЛИЦА 8 (продолжение)

Величина	Определение величины	Наименование и размерность	Обозначения		Содержит единиц СИ
			русское	международное	
Поток энергии ионизирующего излучения		**ватт** (L^2MT^{-3})	Вт (*вт*)	W	
Энергия ионизирующего излучения		**джоуль** (L^2MT^{-2})	Дж	J	
Интенсивность ионизирующего излучения (интенсивность излучения)	Энергия ионизирующего излучения, падающего в единицу времени на поверхность элементарной сферы, отнесенной к единице площади поперечного сечения этой сферы	**ватт на квадратный метр** (MT^{-3})	Вт/м^2	W/m^2	

ТАБЛИЦА 9

ПРИСТАВКИ И МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Приставка	Обозначения		Множитель	Приставка	Обозначения		Множитель
	русское	международное			русское	международное	
атто-	а	a	10^{-18}	дека-	да	da	10^{1}
фемто-	ф	f	10^{-15}	гекто-	г	h	10^{2}
пико-	п	p	10^{-12}	кило-	к	k	10^{3}
нано-	н	n	10^{-9}	мега-	М	M	10^{6}
микро-	мк	μ	10^{-6}	гига-	Г	G	10^{9}
милли-	м	m	10^{-3}	тера-	Т	T	10^{12}
санти-	с	c	10^{-2}	пета-	П	P	10^{15}
деци-	д	d	10^{-1}	экза-	Э	E	10^{18}

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ И ПРОБЛЕМ УПОРЯДОЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

проф. М. Н. Чернявский[1]

«Для терминов во многих науках: в физике, в химии, в астрономии, и особливо в анатомии, в ботанике и во всей медицине греческий язык весьма надобен».

М. В. Ломоносов[2].

«Абстрактные понятия болезней... создавались человеческим умом постепенно в течение тысячелетий, менялись, исчезали, вновь создавались и т. д. Поэтому в названиях болезней отразились соответствующие периоды развития медицинских знаний».

Г. Ф. Ланг[3].

Современная русская медицинская терминология — результат многовекового развития мирового и русского врачевания, медицинской науки. В ней аккумулированы усилия врачей и ученых разных стран мира в познании природы человека, строения и функций организма, причин возникновения болезней и разработке методов их лечения. Нет, пожалуй, больше другой профессиональной деятельности, где бы интернациональный опыт столь непосредственно отразился в развитии и структуре специальной лексики; в ней увековечена преемственность научного знания, отразились как гениальные догадки, так и устойчивые заблуждения.

Медицинская и биологическая терминологии достигли наибольшей степени интернационализации по сравнению с терминологией других отраслей. Это объясняется тем всеохватывающим устойчивым влиянием, к-рое оказывали на медицинскую и биологическую терминологию в течение многих столетий и продолжают оказывать по сей день два классических языка античного мира — древнегреческий и латинский.

Из истории развития медицинской терминологии

История полупрофессионального и профессионального врачевания насчитывает несколько тысячелетий. Некрые сведения о достижениях медицины древнейших цивилизаций в распознавании и лечении болезней можно почерпнуть из вавилонских клинописных записей и из древнеиндийских вед, из египетских папирусов и китайских иероглифических рукописей. В первую очередь, вавилоно-ассирийской и египетской культурам многим обязана древнегреческая медицина, достигшая в древности наиболее высокой степени самостоятельности как область профессионального знания, обладающая известной естественнонаучной глубиной. В сочинениях древнегреческих врачей содержится свод знаний, накопленных древней медициной. Наиболее ранними из дошедших до нас источников являются несколько фрагментов медицинских текстов Алкмеона Кротонского (6 в. до н. э.). Свыше 100 медицинских сочинений той эпохи собрано в так называемом „Гиппократовом сборнике" («Corpus Hippocraticum»). Они приписываются по традиции величайшему врачу древности Гиппократу (460—377 гг. до н. э.). В „Гиппократов сборник" вошли сочинения не только Гиппократа и его учеников, но и врачей, представлявших иные направления древнегреческой медицины. С „Гиппократова сборника" фактически начинается история европейской медицины и медицинской терминологии.

Хотя связь греческой медицины с культурами Египта и Месопотамии несомненна, в сочинениях сборника нельзя найти почти никаких языковых данных, к-рые свидетельствовали бы о такой связи. Все предметы и явления, описываемые в «Corpus Hippocraticum», названы, за крайне редкими исключениями, греческими словами, без какого бы то ни было намека на иноязычные заимствования. Гиппократ и его преемники унаследовали медицинскую лексику, применяемую многими поколениями народных врачевателей; о ней в известной степени можно судить уже по «Илиаде» Гомера (9—8 вв. до н. э.). В гомеровском эпосе представлена значительная доля тех анатомических и нозологических обозначений, к-рыми пользовался Гиппократ и без к-рых не обходятся современные врачи. Из греческой народной речи гл. обр. черпались слова для названий медицинских предметов и явлений. Специальных медицинских слов, соответствующих современному понятию термина и употребляемых только врачами, в „Гиппократовом сборнике" сравнительно немного. Один и тот же предмет обозначен в нем нередко разными словами. Основное языковое богатство сборника представлено наименованиями болезней и их симптомов, а анатомическая лексика представлена слабее.

От „Гиппократова сборника", часто при посредстве последующей латинизации, научная медицина унаследовала множество наименований, напр.: *акромион, амблиопия, апофиз, бронх, герпес, диапедез, илеус, кахексия, карцинома, кифоз, кома, лихен, лохии, лордоз, нефрит, нома,* olecranon, *опистотонус, парез,* perineum, peritoneum, *полип, симфиз, тиф,* thōrax, urēthēr, *уретра, холера, экзантема, эктима, экхимоз, эмфизема, эпидемия, эритема.*

Значительный вклад в медико-биологическую лексику внес греческий философ и ученый Аристотель (384—322 гг. до н. э.). К его сочинениям восходят, напр., такие наименования, как *алопеция, аорта, глаукома, диафрагма,* canthus, colon, condylus, *мекоиий, лейкома, нистагм,* pancreas, *трахея, фаланга, экзофтальм.* Аристотель уточнил специальные значения ряда уже существовавших в медицинском лексиконе слов, напр. содержание слова mēninx, mēningos (оболочка) сузил до значения «мозговая оболочка».

С началом эпохи эллинизма (конец 4—1 в. до н. э.) центр научной медици-

[1] В некоторых положениях статьи изложены личные взгляды автора.

[2] Цитируется по кн. «Памятники культуры. Новые открытия». Ежегодник, 1974, М., 1975, стр. 177.

[3] Ланг Г. Ф. Вопросы кардиологии., Л., 1936, стр. 6—7.

ны переместился в столицу одной из эллинистических монархий — Александрию. Здесь сложилась известная во всем мире и предопределившая на многие столетия вперед развитие медицины Александрийская медицинская школа. Она прославилась деятельностью гл. обр. двух выдающихся врачей — Герофила и Эразистрата, оставивших заметный след в медицинской, особенно анатомической терминологии. Если в предшествующую эпоху медицинский лексикон обогащался в основном путем заимствования слов разговорного языка, то александрийцы смело вводят неологизмы — искусственные, специально созданные наименования. Герофилу (ок. 300—250 гг. до н. э.) приписывается авторство таких дошедших до наших дней терминов, как *простата*, *диастола* и *систола*, mēninx pacheia и mēninx leptē (твердая и мягкая мозговая оболочка; источник современных терминов *пахименингит* и *лептоменингит*). К нему восходит термин dodekadaktylon (двенадцатиперстная кишка), от dodeka (двенадцать) и daktylos (палец); а в латинской средневековой передаче — duodenum от duodecim (двенадцать). Герофил впервые обратил внимание на существование лимфатических узлов, но принял их ошибочно за железы и поэтому назвал adēn —железа. Это наименование (в лат. переводе glandula) продержалось в медицине почти до середины 20 в., когда было заменено термином nodus lymphaticus или lymphonodus (лимфатический узел). Однако заблуждение Герофила до сих пор дает о себе знать; терминоэлемент *аден-* входит в состав таких терминов, как *аденопатия*, *лимфаденит* и др.

Эразистрату (умер ок. 250 г. до н. э.) принадлежит авторство таких неологизмов, как, напр., *паренхима*, *плетора*, *булимия* (буквально «бычий голод»), *анастомоз* (точнее synanastomosis; приставку syn- позднее отбросил Гален), сохранившихся до сих пор, хотя и существенно изменивших со временем свое значение. Эразистрату современная медицина обязана также такими терминами, как neura aisthētika и neura kinētica (чувствительные и двигательные нервы), triglōchines hymenes (трехстворчатый клапан; от tri- три + glōchis, glōchinos острие, зубец), более известным в латинском переводе как valvula tricuspidalis, от tri- три + cuspis, cuspidis острие, зубец.

Александрийцы немало сделали для упорядочения и нормализации медицинского языка. Герофил был, вероятно, первым научным редактором сочинений Гиппократа, критически проанализировавшим приписываемые ему тексты, уточнившим и модернизировавшим изложение.

Весь дальнейший путь развития медицинской терминологии был в значительной мере ориентирован, как на модели, на термины, апробированные, кодифицированные, аннотированные александрийскими врачами. Именно у них медицинский язык приобрел черты стройности и научной точности, к-рые заметны даже с позиций современной науки.

Вплоть до кризиса античного мира греческий язык фактически выполнял функцию международного языка медицины, служил средством профессионального взаимопонимания для врачей разных этнических групп.

В этот период латинский язык не оказывал какого-либо влияния на развитие медико-биологической лексики, даже несмотря на установление римского господства над Грецией (146 г. до н. э.) и ее бывшими владениями. На протяжении всей своей истории латинский язык испытывал сильное влияние греческого. Имевшиеся у римлян незначительные медицинские и биологические знания не выдерживали конкуренции с греческой медициной и наукой о природе, прежде всего о природе живого. Латинский язык по гибкости уступал греческому, обладавшему удивительной способностью облекать в языковые формы новые идеи, с легкостью создавать все новые и новые наименования посредством различных способов словообразования, особенно путем сложения основ слов. Нек-рое представление об исконно латинской специальной лексике, в частности анатомической, можно составить по поэме поэта-философа Лукреция Кара (ок. 99—55 гг. до н. э.) «О природе вещей» («De rerum natura»). Он испытывал большие затруднения, излагая на латинском языке естественнонаучные воззрения греков. Описывая строение человеческого тела, Лукреций пользовался как словами литературного латинского языка, так и латинизированными заимствованиями с греческого. Нек-рые наименования, использованные в поэме, употребляются в современной Международной анатомической номенклатуре, напр. латинские слова membra (конечности), palatum (нёбо) или заимствованное brachium (плечо). Подобно греческим анатомам, обозначавшим и артерии, и вены словом phleps, phlebos в общем значении «жила», Лукреций пользовался эквивалентным лат. словом vena, а для обозначения нервов, сухожилий и связок — словом nervus, от греч. neuron жила, применявшимся для той же цели еще Гиппократом и Герофилом.

Ссылками на авторитет греческих врачей, прежде всего Гиппократа, Герофила и Эразистрата, пестрят страницы единственного сохранившегося полностью медицинского сочинения римлян «De medicina» («О медицине»). Это сочинение, представлявшее собою часть не дошедшего до нас обширного энциклопедического труда, было написано на латинском языке Авлом Корнелием Цельсом в 1 в. н. э. Оно пролежало несколько веков в пыли монастырской библиотеки, было извлечено на свет только в 1443 г. и лишь тогда стало доступным европейской медицине. Цельс широко использовал греческие наименования как самые авторитетные и точные. Весьма часто он сопровождал существующие латинские наименования греческими. Дублирование исконно латинских слов латинизированными, т. е. приспособленными к нормам латинского языка греческими заимствованиями, составляет и по сей день одну из примечательных черт медицинского лексикона.

После вторичного рождения сочинения Цельса в 15 в. его лексика (нередко с уточненными или измененными значениями слов) почти полностью вошла в словарь профессиональной медицины, стала неотъемлемой частью международных анатомических номенклатур конца 19 и середины 20 в. К Цельсу восходят такие наименования, как, напр., abdomen — живот, anus — задний проход, articulus — сустав, caecum intestinum — слепая кишка, cartilago — хрящ, cervix — шея, cubitus — локоть, digitus — палец, fauces — зев, femur — бедро, humerus — плечевая кость (у Цельса — плечо), index — указательный палец, inguen — пах, intestinum — кишка, jejunum intestinum — тощая кишка, lien — селезенка, manus — кисть руки, maxilla — верхняя челюсть (у Цельса — челюсть), medulla — мозг (у Цельса — костный мозг), occiput — затылок, oculus — глаз, omentum — сальник, patella — надколенник, pectus — грудь, pollex — I палец руки, pulmo — легкое, radius — лучевая кость, ren — почка, scrotum — мошонка, tibia — большеберцовая кость, tonsilla — миндалина, tunica — оболочка, uterus — матка, ventriculus — желудок, vertebra — позвонок, vesica — мочевой пузырь, vulva — вульва (у Цельса — матка).

В значительно меньшей степени в существующую медицинскую терминологию вошли латинские наименования болезней и их симптомов. Среди них такие как acutus morbus — острое заболевание, cancer — рак, cicatrix — рубец, delirium — бред, febris — лихорадка, fractura — перелом, hernia — грыжа, pannus — паннус, papula — папула, remissio — ремиссия, scabies — чесотка, suppuratio — нагноение, tumor — припухлость, опухоль, tussis — кашель, varix — расширение, вздутие вены, verruca — бородавка.

Нек-рый вклад в расширение медицинской лексики внес римский писатель-компилятор Плиний Старший (23 — 79 гг. н. э.) своим сочинением «Naturalis historia» («Естественная история»). Так, он ввел слово tinea (червь) в качестве наименования нек-рых кожных заболеваний, латинизировал греческие слова, напр. сохранившийся до наших дней термин *парацентез* (paracentesis от греч. parakentēsis).

Греческий и латинский — территориально и исторически взаимодействующие индоевропейские языки, поэтому недостающие обозначения заимствовались латинским языком из греческого и легко в нем ассимилировались. При этом ряд грецизмов полностью сохранял свою форму, будучи транскрибирован средствами латинского алфавита с учетом особенностей определенных греческих звуков. Так, звуки, обозначаемые греческими буквами χ (хи), φ (фи) и θ (тета), римляне передавали соответственно двухбуквенными комплексами (диграфами) ch, ph и th; напр. χοριον — chorion, φλεγμασια — phlegmasia, θωραξ — thorax. Сочетание греческих букв σχ (сигма и хи) передавалось в виде sch, что произносится как [сх][1], напр. σχῆμα — schema — схема, но в нек-рых терминах, попавших в русский язык через посредство немецкого, произносится как [ш], напр. в терминах, начинающихся элементом σχισο- — schiso- — шизо-. Начальный звук, обозначавшийся греческой буквой ῥ (ро) со знаком густого придыхания, передавался по-латыни диграфом rh, напр. ριν-ιτις — rhinitis, а в составе производных слов получал дополнительное ῥ,

[1] В квадратных скобках здесь и далее указано произношение, переданное средствами русского алфавита.

напр. αἱμορραγια — haemorrhagia. Из последнего примера видно, что знак густого придыхания над начальным гласным передавался в латинской транскрипции буквой h. Греческий дифтонг αι [ай] передавался латинским ae [э], дифтонг — οι [ой] — латинским oe [э], ει [эй] — буквой i [и] или графом ei [эй], αυ [ау] — au [ау], ευ [эу] — eu [эу], напр., γγνγραινα — gangraena, οισοφαγος — oesophagus, κλειτορις — clitoris, θεραπεια — therapia, αυρα — aura, πνευμονια — pneumonia. Различия между долгими и краткими гласными звуками, обозначаемыми буквами ω [о долгое] и ο [о краткое], а также η [е долгое] и ε [е краткое] в латинской транскрипции не отражались. Греческая буква υ (ипсилон) [и] франц. или [ü]нем. транскрибировалась по-латыни обычно буквой y [и], напр. ὑπερ- — hyper-, но иногда, напр. в средние века, и буквой u [у], напр. βυρσα — bursa. Греческая буква k [к] (каппа) транскрибировалась обычно буквой c, читавшейся в классической латыни как [к]. Однако со временем возникло двоякое чтение буквы c: [к] — перед a, o, u, перед согласными и в конце слова, [ц] — перед e, i, y, ae, oe. В словах греческого происхождения, подвергшихся латинизации или иной транскрипции в западноевропейских языках, греч. к читалась двояко. Так, от греч. κεφαλη [кефале] — голова произведены не только *кефалография*, *кефалгематома*, но и *цефалометрия*, *цефалоцеле*; от греч. κυστις [кюстис] — пузырь — *цистаденома*, *цистит*, но и *кистома*, *поликистоз*; от греч. κηλη [келе] выбухание, грыжа — *гематоцеле*; от греч. κερας, κερατος [керас, кератос] рог, роговое вещество — *кератит*, *кератопатия* и др.

Иногда латинизация затрагивала форму заимствованного слова: вместо греческих окончаний -ος, -ον подставлялись латинские окончания -us, -um, напр., πυλωρος — pylorus, οισοφαγος — oesophagus, κρανιον — cranium, βραχιων — brachium; другие греческие заимствования входили в латинский язык без каких-либо морфологических модификаций: κωμα — coma, αναλυσισ — analysis.

Среди греческих слов, латинизированных еще в римской литературе и сохранившихся до наших дней, можно указать, напр., следующие: brachium — плечо, bronchus — в первоначальном значении — дыхательная трубка, carpus — запястье, clitoris — клитор, hepar — печень, larynx — гортань, meconium — меконий, meninges — мозговые оболочки, necrosis — омертвение, oesophagus — пищевод, pancreas — поджелудочная железа, paralysis — паралич, perinaeum — промежность, pharynx — глотка, propolis — пчелиный клей, splen — селезенка, splanchna — внутренности, thorax — грудная клетка.

Заимствования укоренялись довольно быстро, чему немало способствовало то обстоятельство, что большинство практикующих в Риме врачей были греками.

Из них большой интерес к вопросам медицинской терминологии проявил Руф Эфесский (1—2 в. н. э.). Он написал для изучающих анатомию небольшое учебное пособие «О названии частей человеческого тела». Руф ввел наименование «diploë» для обозначения губчатой сердцевины костей. Другому греческому врачу Аретею Каппадокийскому (1 или 2 в. н. э.) приписывается введение в медицинский лексикон слова *диабет*. Наименования *экзема* и *трахома* впервые встречаются в сочинениях Диоскорида Киликийского (1 в. н. э.).

Медицинские и философские интересы самого выдающегося из практиковавших в Риме врачей Клавдия Галена (129—201 или 130—200, или 131—200) неизменно переплетались с филологическими. Гален составил словарь и комментарии к сочинениям Гиппократа. Он ввел немало новых греческих наименований, уточнил значения старых, возродил нек-рые почти забытые или малопонятные для его современников гиппократовские обозначения. Он стремился, чтобы состав и внутренняя форма слова правильно ориентировали в отношении обозначаемого предмета, а анатомические наименования — и в отношении функции, выполняемой соответствующим органом. Он считал особенно важным, чтобы каждое специальное слово имело однозначное применение и толкование. В подходе Галена, как в зародыше, заключались основные требования, к-рые в науке нового времени стали предъявляться к терминам, в том числе к медицинским.

Гален свел применение слова diaphragma до единственного значения «грудобрюшная преграда», закрепил за словом ganglion, обозначавшим опухолевидное образование, также и анатомическое значение — «нервный узел».

Галену удалось сделать однозначным наименование sternon — грудина. Он уточнил формальную и содержательную стороны термина anastomōsis. Ему принадлежит авторство наименований thalamos — лат. thalamus (зрительный бугор мозга), phleps azygos — лат. vena azygos (непарная вена), cremaster (мышца, поднимающая яичко), peristaltikē kinēsis — перистальтика и др.

После падения Западной Римской империи основным наследником поздней античной культуры, в т. ч. и медицины, стала Византия. Здесь продолжала развиваться литература на греческом, вернее, на среднегреческом языке. В Византии 4—7 вв. протекала деятельность многих известных врачей конца античности и раннего средневековья, чья профессионально-языковая культура формировалась в традиционных медицинских школах. Сочинения Орибазия (325—403), Немезия (ок. 370), Аэция Амидийского (502—572), Александра Тралесского (525—605), Павла Эгинского (625—690) и нек-рых других византийских врачей-энциклопедистов представляли собой в значительной мере компиляции из трудов Галена, Руфа и представителей александрийской медицинской школы, дополненные тонкими наблюдениями и выводами из собственной практики; они во многом способствовали ознакомлению последующих поколений врачей со сложившейся терминологией.

Высшим достижением медицины эпохи феодализма является медицина народов арабского Востока, включая Иран и Среднюю Азию. Исторической заслугой арабоязычной медицины является сохранение богатейшего наследия медицины античного мира.

В 9—10 вв. на арабский язык с греческого были переведены почти все сочинения Гиппократа и Галена. На этой базе началось становление арабоязычной медицинской литературы. Поначалу это были гл. обр. компилятивные обработки греческих сочинений, но постепенно появляются и выдающиеся самостоятельные произведения, написанные арабскими врачами. К ним относятся прежде всего труды Абу Бакра Рази (865—925) и особенно Али Ибн-Сины, или Авиценны (980—1037). В их трудах утверждалась арабская медицинская терминология.

Язык европейской медицины того времени был крайне пестрым и противоречивым. В то время как знание греческого языка было достоянием одиночек, латинский язык подвергался качественной трансформации. И раньше, в римский период, существовало два различающихся между собой социальных диалекта: литературный, ориентированный на классическую латынь язык высших, образованных слоев римского общества и разговорный язык, так наз. народный, или «деревенская» латынь.

В 8—9 вв. народно-разговорный латинский язык стал «мертвым», т. е. перестал быть понятным для народов, начинающих говорить на новых, национальных языках Европы, романских: французском, итальянском, испанском и др. Основой для их образования к 9 в. послужила народная латынь. Однако «мертвая» латынь оказалась особым языком: на протяжении ряда столетий она оставалась письменным, книжным языком, понятным всей ученой и учащейся Европе.

Приобщение западноевропейских врачей к греческому наследию могло осуществляться только через посредство латинских переводов арабских переводных сочинений с греческого.

Первые латинские переводы с арабского были выполнены в 11 в. Константином Африканским — преподавателем Салернской медицинской школы, обучение в к-рой велось на латинском языке. Свыше 70 переводов с арабского на латинский выполнил в 12 в. Герард Кремонский (1114—1187). Им, в частности, был сделан первый перевод «Канона врачебной науки» Ибн-Сины, снабженный подробным словарем специальных выражений. Латинский перевод «Канона...» преобладал в преподавании медицины в Европе почти до 17 в.

Средневековая «варварская» латынь значительно отличалась от классического латинского языка. С одной стороны, она помогала европейской медицине как бы заново воссоздавать классическую терминологию; с другой стороны, этому серьезно мешало неудовлетворительное качество латинских переводов. Особенно страдала из за многократных и многоступенчатых переводов с одного языка на другой терминология. Многие переводчики плохо знали арабский язык и медицинскую терминологию, а также неправильно обращались с арабской транскрипцией греческих слов. Немало ошибок возникало и по вине переписчиков. Специальную лексику в арабских переводах с греческого можно было бы правильно истолковать только при наличии греческих оригиналов, но поскольку они были

утеряны, трудности интерпретации становились почти непреодолимыми.

Интересно, что, несмотря на многовековое преобладание арабского языка, а также на засоренность средневековой латыни сотнями арабизмов, арабская медицина почти не оставила следа в современной медицинской терминологии. Сохранились лишь единичные арабизмы, гл. обр. в названиях лекарственных препаратов; напр.: *калий* и *алкалоид*, восходящие к арабскому слову al-qali (растительная зола), от к-рого произошло латинское alkali (щелочь); *алкоголь* — от арабского al-kohl (тонкий порошок сурьмы); *эликсир*, от арабского — al-iksir (философский камень); *бура* — от арабского buraq.

В анатомической латинской номенклатуре уцелело лишь одно слово арабского происхождения nucha, к-рое ныне употребляется в значении *выя* — задняя сторона шеи. Оно восходит к «Канону...» Ибн-Сины, где означало «спинной мозг», а заднюю сторону шеи Ибн-Сина называл иначе. Такое смещение обозначений можно объяснить ошибкой переводчика Герарда Кремонского. Латинским переводам «Канона...» медицинская лексика обязана также неологизмами albugineum (белочный), ileum (подвздошная кишка). С неверным пониманием переводчиками арабских наименований связан и латинский неологизм retina, впервые появившийся в переводе «Канона...». В классической латыни такого слова не было; сходно звучащее греческое слово rhētinē (камедь) не имело никакого отношения к анатомии. В арабском подлиннике слову retina соответствовало слово rescheth. Ошибочное отождествление его с латинским словом rete (сеть) и явилось причиной создания переводчиком неологизма retina (сетчатка). Странное с анатомической точки зрения наименование латеральной подкожной вены руки «vena cephalica» (головная вена), вероятно, также является результатом этимологической ошибки переводчика. В арабском подлиннике стояло слово al-kifal (внешний, наружный), а переводчик отождествил его с греческим kephalē (голова).

Нек-рые латинские переводные наименования были созданы как семантические кальки с соответствующих арабских метафорических обозначений. Таковы, напр., vermis cerebelli — червь мозжечка (у греков данное образование вызывало ассоциацию с другим образом — botrys — виноградная гроздь); auricula cordis — ушко сердца (у Цельса слово auricula употребляется только для обозначения уха, ушной раковины); orbita — глазница (в классической латыни это слово означало «колея», а в древнерусских сочинениях переводилось как «обочина»). Использование метафор, особенно «семейных» образов, для обозначения предметов — характерная черта арабской поэзии. Этим можно объяснить появление необычных для греческого языка и классической латыни средневековых латинских обозначений твердой и мягкой оболочек мозга — dura mater и pia mater, представляющих собой метафоры. Латинское слово mater означает «мать», следовательно, подлинный смысл этого обозначения — мать мозга, т. е. оболочка выступает как «мать — защитница мозга». При этом pia буквально означает *«любезная, нежная»*, что хорошо сочетается со словом «мать». У греков мозговые оболочки назывались прямо и точно — mēninx sklēra или mēninx pacheia (твердая или плотная оболочка) и mēninx leptē (тонкая, нежная оболочка). Арабы передали эти понятия с помощью метафор, а переводчик пытался сохранить те же образы в латинской передаче.

Начиная с 14 в. влияние арабской медицины начало ослабевать, но развитию европейской медицины мешала невероятная терминологическая путаница: медицинский лексикон представлял собой смесь латинизированных арабизмов, гебраизмов (древнееврейских слов), арабизированных грецизмов, неверно калькируемых, часто неправильно понятых переводчиками. Появилось огромное количество синонимов, по выражению А. Везалия,— «мириады наименований». Все это служило питательной средой для схоластических споров, в к-рых не считалось обязательным строгое и последовательное определение терминов посредством дефиниций. Европейской медицинской науке угрожало «терминологическое удушение».

Становилось очевидным, что без расчистки «авгиевых конюшен» терминологии, нельзя развивать медицину. Европейские врачи больше не доверяли арабизированному Галену и желали вернуться к неискаженным греческим подлинникам. Повсеместно возрождался интерес к классической греческой медицине. Этот процесс совпал с началом новой эпохи — переходного периода от средневековья к новому времени, известному в истории стран Западной и Центральной Европы как эпоха Возрождения (15—16 вв.). Около 1443 г. было найдено сочинение «О медицине» Авла Корнелия Цельса, а в 1478 г. оно впервые было издано во Флоренции. И европейские врачи увидели, какая пропасть лежит между классическим латинским языком с терминологией Цельса и средневековой латынью. С этих пор язык сочинения Цельса надолго признается образцом терминологической точности.

Развертывается целенаправленная борьба за языковое единство медицинской терминологии, за сокращение количества синонимов, за очищение от непонятных арабизмов и варваризмов. Формируется новая латынь — латынь Возрождения, претендующая на роль международного научного языка в европейском регионе. В ее обновлении активную роль сыграли анатомы, поскольку 16 в. был веком анатомических открытий, а анатомическая терминология в то время была запутанной. Многие выдающиеся анатомы эпохи Возрождения вынуждены были стать одновременно филологами.

Огромный вклад в анатомическую терминологию на латинском языке внес Андреас Везалий (1514—1564) — основоположник современной анатомии. Взяв за основу наименования, введенные Цельсом, он придал анатомической терминологии единообразие, выбросил, за крайне редкими исключениями, все средневековые варваризмы. Одновременно Везалий свел до минимума грецизмы, что в какой-то мере можно объяснить его неприятием многих положений галеновской медицины. Это имело и отрицательную сторону, т. к. нек-рые восходящие к классической греческой медицине краткие наименования Везалий заменил многословными латинскими терминами-описаниями. В нек-рых случаях он применял наименование, данное Цельсом, совсем для другого анатомического объекта. Подобные издержки реформаторской деятельности Везалия в ряде случаев спровоцировали последующий возврат терминологии к грецизмам и варваризмам. За сохранение грецизмов в медицинской терминологии выступали менее склонные к языковому пуризму представители французской медицинской школы.

К числу сохранившихся в современной анатомической номенклатуре наименований, введенных Везалием, относятся: atlas — атлант, crista galli — петушиный гребень, incus — наковальня, malleolus — лодыжка, os ilium — подвздошная кость, scapula — лопатка. Сохранились также нек-рые термины, введенные учениками Везалия, напр. Фаллопием (1523—1562) — tuba uterina — маточная труба, labyrinthus — лабиринт внутреннего уха; Р. Коломбо (ок. 1516—1559) —pelvis — таз. При создании новых терминов нек-рые анатомы прибегали к метафорическим наименованиям. Так, Аранций (1530—1589) ввел термин cornu Ammonis или hippocampus — аммонов рог или гиппокамп (морской конек), а Северин (ок. 1643) — *caput Medusae* — голова медузы.

Вклад анатомов Возрождения в развитие словаря анатомических терминов был огромным. К концу 18 в. число анатомических наименований превысило 30 000, в то время как от древних греков их было унаследовано лишь около 700.

Научная революция 17 в. вызвала бурный прогресс медицинской науки, характеризующийся становлением новых научных дисциплин и фундаментальных научных направлений, что сопровождалось созданием множества новых терминов. Уже с периода позднего Возрождения происходило постепенное приспособление языка медицины к потребностям развития живых национальных языков. Так, французский хирург Амбруаз Паре (1510—1590), нарушая традицию, писал свои сочинения на разговорном французском языке. Однако в 18 в. латынь еще оставалась международным языком биологии и медицины, на к-ром издавались научные труды, велось преподавание, происходили научные диспуты. Латынь гармонично уживалась с национальными языками как со своими равноценными и равноправными преемниками в каждой отдельной стране. К середине 19 в. положение в корне меняется. Латынь окончательно уступает место (в разных странах — в разное время) национальным языкам, и теперь они становятся средством письменного и устного научного общения, а за латынью сохраняется лишь номинативная функция, т. е. функция называния изучаемых объектов в нек-рых медико-биологических классификациях (в анатомии, гистологии, ботанике, зоологии и др.).

В странах европейского и американского регионов греческий и латинский языки традиционно признавались основными источниками пополнения ме-

ТАБЛИЦА

ПРИМЕРЫ НЕОКЛАССИЦИЗМОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Термин	Источник словообразования	Автор
Ортопедия (orthopaedia)	Греч. orthos — прямой, правильный + paideia — воспитание, обучение	Андре (N. André, 1658—1742)
Симпатический (sympathicus)	Греч. sympathēs — сочувствующий	Винслоу (J. B. Winslow, 1669—1760)
Цирроз (cirrhosis)	Греч. kirrhos — желтый	Лаэннек (R. Th. H. Laennec, 1781—1826)
Стетоскоп	Греч. stethos грудь + skopeō — исследовать	
Агорафобия (agoraphobia)	Греч. agora — рыночная площадь + phobos — страх	Вестфаль (K. F. O. Westphal, 1833—1890)
Фагоцит (phagocytus)	Греч. phagos — поедающий, пожирающий + kytos — вместилище (в гистологии латинизированное cytus — клетка)	И. И. Мечников (1845—1916)
Лейкемия (leukaemia)	Греч. leukos — белый + haima — кровь	Вирхов (R. Virchow, 1821—1902)
Амилоид (amyloidum)	Греч. amylon — крахмал + eidos — вид	
Атетоз (athetosis)	Греч. athetos — не занимающий определенного положения в пространстве, неустойчивый	Хаммонд (W. A. Hammond, 1828—1900)
Парабиоз	Греч. para — вблизи, около + bios — жизнь	Н. Е. Введенский (1852—1922)
Гормон	Греч. hormaō — побуждать, приводить в движение	Бейлисс и Старлинг (W.M.Bayliss, 1860—1924; E. H. Starling, 1866—1927)
Аллергия (allergia)	Греч. allos — другой + ergon — действие	Пирке и Шик (C. P. Pirquet, 1874—1929; B. Schick, 1877—1967)

дико-биологической терминологии, и подавляющее большинство новых, впервые вводимых в язык медицины обозначений являлись словами греческого или латинского происхождения. Наряду с наименованиями, к-рые заимствовались из словарей классических языков в готовом виде, стали в большом количестве появляться неоклассицизмы (неогрецизмы и неолатинизмы), искусственно созданные учеными разных стран на основе лексического и словообразовательного материала классических языков. Примеры неоклассицизмов, авторы к-рых известны, представлены в таблице.

Конкретно-языковое оформление неоклассицизмов происходило по-разному: они оформлялись по-латыни или получали форму того или иного национального языка; зачастую имело место и то, и другое одновременно. Благодаря греко-латинской этимологии такие термины легко проникали в терминологию различных национальных языков и, модифицируясь в соответствии с их фонетико-морфологическими системами, превращались в интернациональные наименования — интернационализмы.

Из истории развития русской медицинской терминологии

Исконно русская медицинская лексика уходит своими корнями в общеиндоевропейский язык-основу и общеславянский язык-основу, на базе к-рого в 7—8 в. возник древнерусский язык. Письменность появилась на Руси в середине 10 в. в виде старославянского (церковнославянского) языка.

Не исключено, что первоначальными хранителями медицинских знаний у древних славянских племен, как и у многих других народов, были жрецы-волхвы. Общеславянское слово *врач*, имеющее общий корень со словами «ворчать», «говорить», первоначально означало колдун, чародей, гадатель, прорицатель, лечащий чарами, заговорами и наговорами. Из глубины веков дошли до нас засвидетельствованные в древнерусских рукописных памятниках слова, принадлежащие к общеславянскому пласту: бедро (уменьшительное «бедрецо, берцо»; отсюда «берцовая кость»), бельмо, бок, бровь, волос, воспа (оспа), голова, горло, грудь, грыжа, губа, зуб, лицо, лоб, моча, нос, ноготь, плод, почка, рак, рука, селезенка, сердце, темя, ухо и др. Можно считать древнерусскими слова, общие для церковнославянского и древнерусского языков, а также слова, принадлежавшие к одному из них, но устойчиво вошедшие в русский литературный язык, напр.: беременная, бесплодие, близнецы, болезнь, боль, больной, гной, голень, гортань, жажда, желудок, желчь, зачатие, здоровье, зрение, кишка, кожа, кость, лекарство, лечебный, лечение, лечить, мозг, мозоль, мышца, ноздря, обоняние, осязание, отек, отравление, пах, печень, плева, плечо, подошва, поясница, пуп, рожа, рот, судорога, тело, челюсть, череп, шея, язва и др. В современную терминологию вошли такие древние наименования, как выйная связка[1], двенадцатиперстная кишка, надчревье (церковнославянское и древнерусское слово «выя» относилось к шее, а церковнославянские слова «перст» и «чрево» означали соответственно «палец руки» и «живот»).

Многие древнерусские наименования болезней и их признаков давно вышли из употребления, и идентификация их с современными терминами удается с большим трудом. К таким наименованиям относятся, напр., вдушь (астма), златница (желтуха), камчюг (артрит), кровавая утроба (дизентерия), падучая немочь (эпилепсия), прищ горющ (сибирская язва), прокажение (лепра, волчанка и нек-рые другие поражения кожи), свербежь (чесотка), трясца (малярия).

Нек-рые из употребляющихся в современном медицинском словаре древнерусских слов изменили свое значение. Так, напр., слово «мозоль» в древности обозначало увеличенные лимфатические узлы или язву, слово «со(у)став» — часть тела или орган, а также сустав в современном смысле, слово «железа» могло обозначать опухоль («железою мерли люди»). Древнерусское слово «живот» имело несколько значений: жизнь, имущество, животное. Слово «глаз», означавшее первоначально «шарик (блестящий)», только в 16—17 вв. приобрело современное значение наряду с синонимом — общеславянским словом «око» и окончательно вытеснило последнее только в 18 в. В литературных памятниках 16 в. впервые появляется слово «спина» как синоним древнего слова «хребет», в памятниках 17 в.— слово «легкие» вместо древнего названия «плющи», впервые встречается слово «кашель».

Множество оригинальных русских наименований, бытовавших в языке древнерусской эмпирической медицины и зафиксированных во всякого рода «Лечебниках», «Травниках» и «Вертоградах», не удержалось в языке научной медицины и уступило свое место другим наименованиям, чаще всего греко-латинского происхождения.

Грецизмы анатомо-физиологического содержания встречаются спорадически уже в ранних памятниках древнерусской письменности. Проникновению грецизмов после принятия Русью христианства (10 в.) способствовали как непосредственные контакты с Византией и ее культурой, так и рост числа переводных церковнославянских сочинений. Последние часто представляли собой компиляции отрывков из произведений Аристотеля, Гиппократа, Галена и византийских врачей.

Латинская лексика первоначально также заимствовалась через греко-византийское посредство, хотя в крайне

[1] Здесь и далее для терминов-словосочетаний применен обычный порядок слов. При поиске соответствующих статей в Энциклопедическом словаре медицинских терминов следует руководствоваться пунктами 7—8 раздела «Как пользоваться словарем» (стр. 5).

ничтожном объеме. Активно она стала проникать в 15—16 в. благодаря посредству польского языка. В 17 в. в связи с прогрессом просвещения на Украине латинизмы стали заимствоваться непосредственно из сочинений на латинском языке. Едва ли не самое первое из таких сочинений — «Эпитоме» Везалия, являющееся авторским кратким извлечением из сочинения «О строении человеческого тела», было переведено в 1657—1658 гг. видным русским просветителем Епифанием Славинецким. Предполагают, что перевод должен был служить учебником по анатомии для учеников школы русских лекарей, якобы открытой в 1654—1655 гг. при Аптекарском приказе. Хотя перевод Е.Славинецкого утерян, можно полагать на основании другого его труда «Полного греко-славяно-латинского лексикона», что он создал определенные предпосылки для освоения терминологии западноевропейской медицины той эпохи. Е.Славинецкий применял только два способа перевода терминов — использование исконных русских эквивалентов и калькирование [напр., термин polyphagia (от греч. poly- много и phagein есть) он передал словом «многоядение»] и почти не применял заимствований.

Значительный шаг в осмыслении и освоении русскими греко-латинской лексики, в том числе медицинского содержания, сделал замечательный лексикограф начала 18 в. Ф. П. Поликарпов. Его «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллино-греческих и латинских сокровище» (1704), состоящий из 19 712 статей, содержит значительное число названий болезней и лекарственных трав на греческом, латинском и русском языках. Большое число приводимых им синонимов свидетельствует о широком круге использованных литературных медицинских источников. Каждая статья начинается с русского наименования, к-рое чаще всего представляет собой или русский эквивалент (каменная болезнь, оспа, рожа, оковрач или очник и др.), или описательное обозначение; реже применяются заимствования — грецизмы и латинизмы (апоплексия, гангрена, дизентерия, доктор и др.).

После первых выпусков Славяно-греко-латинской академии, открытой в 1658 г. в Москве, классицизмы стали заимствоваться непосредственно из сочинений античных авторов и в значительно более широких масштабах, чем прежде. Особое внимание уделялось обучению научной анатомической и хирургической терминологии на латинском языке в Первой госпитальной школе, учрежденной в 1707 г. по указанию Петра I и руководимой Н. Бидлоо.

В Петровскую эпоху и после нее, в течение всего 18 в., в активно формирующийся русский литературный язык вливаются сотни научных латинизмов как непосредственно из латинских сочинений, так и через западноевропейские языки. В начале 18 в. получили широкое распространение следующие слова: медик, медикамент, медицина, микстура, пилюля, провизор, рецепт, сангва (лат. sanguis кровь), урина (лат. urina моча), фебра (лат. febris лихорадка). В середине 18 в. в литературе появляются слова абсцесс, ампула, ампутация, ангина, вена, консилиум, конституция, контузия, мускул, нерв, окулист, пациент, прозектор, пульс, респирация (дыхание), ретина, рецидив, секция, скальпель, скорбут (цинга), темперамент, фибра (жила), фистула и др.

Огромный вклад в обоснование принципов и разработку русской научной терминологии внес М. В. Ломоносов (1711—1765). Блестящий знаток классических языков, он неоднократно подчеркивал их важное значение для нужд просвещения и для прогресса терминологии в России. М. В. Ломоносов принимал участие в рассмотрении первого анатомического атласа, переведенного с немецкого языка А. П. Протасовым (1724—1796), заложившим основы научной анатомической терминологии на русском языке.

Русским врачам-переводчикам 18 в. принадлежит заслуга создания русской научной медицинской терминологии. Это был поистине подвиг учености и патриотизма. Русским переводчикам приходилось преодолевать значительные трудности при передаче средствами родного языка наименований отвлеченных понятий, выработанных западноевропейскими языками, включая освоенные последними классицизмы и неоклассицизмы.

Особо остро недостатки терминологии ощущались русскими врачами-педагогами. Преподавание медицинских дисциплин на русском языке было возможно только при условии разработки отечественной терминологии. Поэтому многие выдающиеся русские врачи становились одновременно переводчиками и филологами. Среди них прежде всего следует упомянуть главного лекаря С.-Петербургского адмиралтейского госпиталя М. И. Шеина (1712—1762), к-рый создал самую раннюю в русской литературе сводку русских анатомических терминов.

Переводчикам легче удавалось справляться с названиями болезней и симптомов, т. к. для них часто имелись эквивалентные обозначения, бытовавшие в языке народной медицины. Труднее обстояло дело с научной анатомией, поскольку многие анатомические образования, напр. pleura, pancreas, trochanter, вообще не имели русских наименований. В подобных случаях нередко создавали описательные составные термины вместо одного латинского (или латинизированного греческого) слова. Так, М. И. Шеин создал для слова diaphragma русский эквивалент «грудобрюшная преграда». Наряду с этим переводчики прибегали к калькированию. А. П. Протасов ввел наименование *ключица*, являющееся калькой с латинского слова clavicula (от clavis ключ).

В процессе формирования отечественной терминологии не было почти ни одного иноязычного термина, для к-рого не предлагалось бы разными авторами по нескольку эквивалентов на русском языке. Далеко не все они выдержали испытание временем и были заменены терминами греко-латинского происхождения, в том числе неологизмами.

Первые словари медицинских терминов на латинском, русском и французском языках были составлены первым русским профессором «повивального искусства» Н. М. Амбодиком-Максимовичем (1744—1812). В 1783 г. вышел в свет его «Анатомо-физиологический словарь», содержащий ок. 4000 наименований, причем русские были извлечены, по словам автора, «из разных печатных, церковных и гражданских, также новых, старых и рукописных книг», а также представляли «собственноручное» его творчество. В следующем выпуске — «Медико-патологико-хирургическом словаре» (1785)— были собраны «наименования болезней и их симптомов, пребывающих в человеческом теле, а также приспособлений, операций, перевязок, применяемых в хирургии для выполнения определенных манипуляций».

Русская медицинская лексика была представлена в первом академическом словаре русского языка — «Словаре Академии Российской» (1789—1794)— более чем 600 словами. Были включены народные общеупотребительные русские наименования, а также заимствованные научные термины греко-латинского происхождения. Слова сопровождались весьма полными, тщательно сформулированными определениями. Медицинскую часть словаря составляли ведущие русские ученые врачи А. П. Протасов и Н. Я. Озерцковский (1750—1827). В этом словаре, в частности, был впервые зафиксирован термин *воспаление*, созданный Шеиным в 1761 г. как калька с латинского слова inflammatio (от inflammo поджигать, запаливать, зажигать).

Крупный вклад в создание русской анатомической терминологии внес основоположник русской анатомической школы П. А. Загорский (1764—1846), написавший первый отечественный учебник анатомии (1802), куда ввел русские эквиваленты ряда латинских терминов. Развитием отечественной анатомической терминологии много занимался Е. О. Мухин (1766—1850), также создавший курс анатомии на русском языке.

Качественно новым этапом в лексикографической обработке, уточнении и систематизации быстро растущей русской медицинской терминологии можно считать «Врачебный словарь», составленный в 1835 г. А. Н. Никитиным — учредителем и первым секретарем Общества русских врачей Петербурга. Это был первый в России медицинский словарь, в к-ром истолковывались термины. Медицинская общественность первой половины 19 в. высоко оценила труд Никитина «за глубокое знание русского языка и обширное знакомство с русской врачебной литературой», что позволило «представить без нововведений номенклатуру в полном сборе и в таком виде, чтобы впредь она могла служить образцом русской врачебной терминологии».[1]

В течение всего 19 в. русская медицинская лексика продолжала активно пополняться терминами, имевшими интернациональное распространение, преобладающую массу к-рых составляли классицизмы и неоклассицизмы, напр. *аборт, альвеола, амбулатория, бацилла, вакцина, галлюцинация, дентин, иммунизация, иммунитет, инфаркт, инфекция, каверна, карбун-*

[1] Журн. «Друг здравия», Спб., 1835, № 26, с. 48.

кул, лимфа, перкуссия, пульпа, рефлекс, экссудат и др., сохранившиеся до наших дней.

В то же время среди русских врачей были и крайние пуристы, возражавшие против заимствований и неологизмов, отстаивавшие исконно русскую общеупотребительную лексику, к-рую они наделяли специальным медицинским значением. Такой точки зрения придерживался, в частности, В. И. Даль (1801—1872) — врач по профессии, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». Однако ни одна из предложенных им замен не удержалась в языке отечественной медицины.

Большинство русских врачей отстаивало термины, устоявшиеся в профессиональном словоупотреблении, независимо от того, являются ли они интернационализмами греко-латинского происхождения или их русскими эквивалентами. Они осознавали также важность сохранения латинских termini technici, т. е. эталонных, интернациональных не только по значению, но и по форме, по латинской транскрипции наименований. В 1892—1893 гг. вышел в свет в переводе с немецкого языка «Энциклопедический медицинский словарь» А. Виларе. В предисловии к русской редакции словаря говорилось, что «за последние десятилетия русская медицинская терминология значительно развилась и укрепилась между практическими врачами, однако, она не находится еще на такой высоте, чтобы исключала употребление латинских названий». В нем отстаивалось преимущество общепринятых в то время латинских терминов типа autodigestio, abrachia, acromegalia, epilepsia, и высказывалось возражение против соответствующих русских наименований «самопереваривание», «безручие», «гигантский рост», «падучая» и пр. Интересно, что дальнейшая судьба указанных терминов оказалась различной: в языке закрепилось *самопереваривание*, а не autodigestio, а остальные термины сохранились в форме заимствования, без сопровождения русскими эквивалентами (*абрахия, акромегалия, эпилепсия*).

Современную русскую медицинскую терминологию на основании языкового происхождения, форм письменности, выполняемой на национальном или интернациональном уровнях функции, можно разделить на следующие основные группы: 1) исконно русские наименования; 2) заимствованные к л а с с и ц и з м ы, в разной степени ассимилированные, приспособленные к звуковой и морфологической системе русского литературного языка; подавляющее большинство их фактически выполняет функцию и н т е р н а ц и о н а л и з м о в, т. е. терминов, получивших межъязыковое распространение хотя бы в трех языках из различных языковых групп (напр., в латинском, французском, английском, немецком, русском и др.); 3) исконные з а п а д н о е в р о п е и з м ы, фактически выполняющие функцию интернационализмов; 4) латинские t e r m i n i t e c h n i c i.

Во второй половине 20 в. медицинская лексика продолжает обогащаться интернационализмами. В современной русской медицинской терминологии интернационализмы и их русские эквиваленты (в т. ч. кальки иноязычного термина) выступают в качестве синонимов. При этом в одних случаях предпочтительно используется русский эквивалент, напр. *вшивость* вместо *педикулез, почесуха* вместо *пруриго, окостенение* вместо *оссификация, понос* вместо *диарея, карликовость* вместо *нанизм, ущемление* вместо *инкарцерация, выворот века* вместо *эктропион*. В других случаях предпочитаются интернационализмы, напр. *пункция*, а не *прокол, малигнизация*, а не *озлокачествление, фавус*, а не *парша, пальпация*, а не *ощупывание, энуклеация*, а не *вылущение, гинекофобия*, а не *женоненавистничество*. Во многих из приведенных случаев предпочтительное применение заимствованного слова объясняется тем, что его русский эквивалент употребляется и в общелитературном языке в более широком или ином значении. Иногда русский эквивалент отступает перед интернационализмом, поскольку от последнего легче образовать производные слова, напр. *плацента* (плацентарный) — *детское место*. Нередко такие синонимы являются практически равноправными, напр.: *кровотечение, кровоизлияние* и *геморрагия* (геморрагический), *близорукость* и *миопия* (миопический), *поджелудочная железа* и *pancreas* (панкреатический), *переливание крови* и *гемотрансфузия* (гемотрансфузионный).

Множество терминов греко-латинского происхождения, в том числе неоклассицизмов, проникает в русскую терминологию через посредство западноевропейских языков. Нередко они смогли завоевать фактический статус интернационализмов, появившись почти одновременно в двух или нескольких языках, и зачастую трудно или невозможно выяснить, в каком именно западноевропейском языке появился впервые тот или иной термин, отмеченный печатью классического или неоклассического происхождения. Многие термины, появившись первоначально в английском, французском или немецком языковом оформлении, подвергаются одновременной или последующей формальной латинизации; впрочем, этот процесс может развиваться и в обратном направлении: от латинизированного по форме термина — к его национально-адаптированному аналогу.

Иногда явным указанием на то, что классицизм или неоклассицизм был заимствован через посредство западноевропейских языков, служат не характерные для классических языков фонетические особенности. Так, наличие в нек-рых словах звука [ш], отсутствовавшего в классических языках, свидетельствует о том, что слово было заимствовано из немецкого (*ишиас*, неоклассицизмы *шизофрения, шизотимия* и др.). Под воздействием фонетической системы французского языка возник термин *сенестопатия* (франц. cénestopathie), происходящий от греческих слов koinos (общий), aisthēsis (ощущение, чувство) и pathos (страдание, болезнь).

Под влиянием западноевропейских языков в нек-рых латинизированных словах греческого происхождения появился отсутствующий в греческом языке звук [ц], напр.: *циста* (лат. cysta,от греч. kystis), *цианоз* (лат. cyanosis, от греч. kyanōsis).

На искусственный (неоклассицистский) характер ряда терминов указывают входящие в их состав компоненты разных языков, гл. обр. греческого и латинского; напр.: *ваготомия* (лат. анат. nervus vagus блуждающий нерв + греч. tomē разрез), *коронаросклероз* (лат. анат. arteria coronaria венечная артерия + греч. sklērōsis затвердение, склероз), *ректоскопия* (лат. rectum прямая кишка + греч. skopeō рассматривать, исследовать). Аналогично образованы «гибриды» *аппендицит, гингивит, дуоденит, конъюнктивит, ретинит, тонзиллит* и др. (к латинским анатомическим терминам appendix — придаток, gingiva — десна, duodenum — двенадцатиперстная кишка, conjunctiva — соединительная оболочка глаза, retina — сетчатка, tonsilla — миндалина, прибавлен греческий суффикс *-itis*, применяемый для обозначения воспаления). Греческие приставки *гипер-, гипо-, пери-* и др. нередко соединены с латинской основой: гиперфункция, гипотензия, перивисцеральный, периваскулярный. Встречаются и греко-русские «гибриды»: *аллохрящ, лейковзвесь, речеграмма* и др.

Подобная «гибридизация» вполне закономерна в рамках медико-биологической терминологии, где греческие и латинские корни и словообразовательные элементы на протяжении многих столетий врастали в ткань национальных языков и образовали в них интернациональный фонд. Поэтому «гибридное» слово «ацидофильный» (лат. acidus кислый + греч. philos любящий, склонный) столь же правомерно, как и одноязычное слово «термофильный» (греч. thermos тепло, теплота + греч. philos).

Исконных з а п а д н о е в р о п е и з м о в, т. е. слов, возникших из лексического и словообразовательного материала западноевропейских языков, в русской медицинской лексике сравнительно немного. Их активное внедрение отмечается лишь с конца 19 в. и особенно в 20 в. Они представлены в основном в терминологии, относящейся к медицинской технике, оперативным приемам, генетике, физиологии, гигиене, и значительно реже встречаются в номенклатуре болезней. Так, к англицизмам относятся, напр., *атачмен, блокада, допинг, инбридинг, клиренс, кроссинговер, пейсмекер, сайт, шунт* и «гибридные» термины *аэротенк, демпинг-синдром, рант-болезнь, уэстинг-синдром*. К заимствованиям из французского языка относятся, напр., *абсанс, акушерка, бандаж, буж, грипп, дренаж, зонд, канюля, коклюш, кретинизм, кюретка, патронаж, пипетка, распатор, тампон, тик, фрамбезия, шанкр*, «гибридный» термин *кульдоскопия*. Примерами заимствований из немецкого языка могут служить *бор, бюгель, кламмер, корнцанг, курорт, рейтеры, шпатель, шуб*, «гибридные» слова *абортцанг, рауш-наркоз* и др.

Интернационализмами стали нек-рые нозологические термины итальянского происхождения: *инфлюэнца, малярия, пеллагра, скарлатина*. Из испанского языка происходит термин *сигватера*, из шотландского — *круп*.

Встречаются отдельные слова, заимствованные из восточных и африканских языков: японское слово *цуцугамуши*, африканское племенное — *квашиоркор*, сингальское — *бери-бери*. Сексопатологи пользуются нек-рыми словами древнеиндийского происхождения, напр., *викхарита*, *виргхата*, *кумбитмака*, *нарвасадата*. Из племенных языков американских индейцев заимствованы названия нек-рых лекарственных веществ: ипекакуана, кураре, хинин.

Традиционной особенностью медико-биологической терминологии продолжает оставаться применение termini technici — терминов, графически и грамматически оформленных на латинском языке. Идентичность их понимания различными специалистами во всех странах делает termini technici незаменимым средством интернационализации терминологии.

Большие группы termini technici объединены в современные международные номенклатуры, имеют официально утвержденный международный статус. К их числу относятся номенклатуры морфологических и биологических дисциплин: анатомическая, гистологическая и эмбриологическая номенклатуры, кодексы ботанической и зоологической номенклатуры и кодекс номенклатуры бактерий. В «Международной фармакопее» в качестве основного, эталонного указывается латинское наименование лекарственного средства.

Иной статус имеют termini technici, относящиеся к словарю клинической медицины, обозначающие болезни, патологические состояния, симптомы, синдромы и др. В большинстве случаев они фактически выполняют функцию международных обозначений, но их применение носит факультативный характер. «Международная классификация болезней, травм и причин смерти» не содержит в качестве обязательных международные латинские наименования. В СССР большинство таких termini technici применяются лишь совместно с их русскими эквивалентами, напр. *грыжа* (hernia), *крапивница* (urticaria), *опоясывающий герпес* (herpes zoster), *холецистит* (cholecystitis). В то же время нек-рые termini technici этого типа употребляются в отечественной медицинской терминологии в качестве предпочтительных терминов. К их числу относятся, напр., *caries sicca*, *carcinoma in situ*, *partus conduplicato corpore*, *situs viscerum inversus*, *spina bifida*, *status typhosus*, *tabes dorsalis*, coxa vara.

О взаимоотношении семантики и этимологии терминов греко-латинского происхождения

Если сравнить современное значение (семантику) заимствованных терминов греко-латинского происхождения со значением этих слов в классических языках-источниках, можно различить две группы заимствований.

Одну группу образуют полные заимствования звукового комплекса слова (почти без изменений) с сохранением основных элементов его значения в классическом языке. К этой группе относятся древнегреческие наименования *амузия* (amusia), *аналгезия* (analgesia), *аневризма* (aneurysma), *анатия* (apatheia), аритмия (arrhythmia), *астения* (astheneia), *астма* (asthma), *афты* (aphthai), *геморрагия* (haimorrhagia), *диагноз* (diagnōsis), *дизентерия* (dysenteria), *диплоэ* (diploē), *диспноэ* (dyspnoia), *кахексия* (kachexia), *колобома* (kolobōma), *кома* (kōma), *ларингготомия* (laryngotomia), *летаргия* (lethargia), *подагра* (podagra), *трахома* (trachōma), *хирургия* (cheirurgia), *эпилепсия* (epilepsia) и много других. К той же группе можно отнести латинские термины *абсцесс* (abscessus), *вертиго* (vertigo), *кариес* (caries), *лакуна* (lacuna), *лентиго* (lentigo), *лигатура* (ligatura), *люмбаго* (lumbago), *медицина* (medicina), *невус* (naevus), *пруриго* (prurigo), *пульс* (pulsus), *пустула* (pustula), *ремиссия* (remissio), *синус* (sinus), *стриктура* (strictura), *ступор* (stupor) и др.

Другую группу составляют неполные заимствования, т. е. слова греческого или латинского языков, к-рые, войдя в состав научной медицинской терминологии, приобрели новое значение. Среди них одни (первая подгруппа) вообще не имели в классическом языке специального медицинского значения, а были общеупотребительными, обиходными словами; другие (вторая подгруппа) применялись в языке древней медицины, но в значениях, существенно отличающихся от тех, к-рые им придала медицина нового и новейшего времени.

К первой подгруппе относится, напр., термин *идиотия*, значение к-рого в психиатрии не имеет ничего общего с греческим словом idiōteia (невежество; жизнь человека, отдалившегося от общества). Греческое слово autopsia (видение собственными глазами) стало патологоанатомическим термином *аутопсия*, означающим вскрытие трупа; греческое слово meiōsis (уменьшение, сокращение) стало фундаментальным термином биологии *мейоз*. Заимствованному из классической латыни слову infectio (окрашивание, пропитывание, порча, растление, от inficio, infectum внедрять, пропитывать) К. Гуфеланд в 1841 г. придал новое значение «заражение болезнью». Так возник термин *инфекция*.

Латинское слово lens и греческое phakos в классических языках обозначали чечевицу. Позднее научная анатомия использовала эти слова для обозначения *хрусталика*, к-рый по форме похож на чечевичное зерно. В классических словарях этого анатомического значения не могло быть, т. к. хрусталик и его функции не были известны древней медицине.

Неполные заимствования, относящиеся ко второй подгруппе,— это специальные наименования античной медицины, значение к-рых в последующие эпохи радикально изменилось. Так, напр., в древнегреческой медицине словом *asphyxia* (отрицательная приставка а- + sphyxis пульс) называли любое состояние, для к-рого был характерен слабый пульс. Затем Аретей и Гален стали называть этим словом преимущественно случаи отсутствия пульса, сопровождающиеся прекращением дыхания. В современной медицине термином *асфиксия* обозначают угрожающее жизни патологическое состояние, обусловленное остро или подостро развившимися гипоксией и гиперкапнией.

Словом typhos (дым, чад) греческие врачи называли любое острое лихорадочное состояние, сопровождавшееся помрачением сознания. В современной медицине слово *тиф* служит составной частью терминов, обозначающих нек-рые инфекционные болезни, для к-рых характерно наличие status typhosus.

Греческие врачи именовали словом lepra болезнь, ныне называемую *псориаз*. Лишь с 3 в. слово lepra в греческом языке стало употребляться в современном значении. Однако они использовали слова satyriasis, leontiasis, а позже elephantiasis для обозначения присущих лепре изменений строения лица, вызывающих ассоциации с сатиром (Satyros) или львом (leōn, leontos), утолщения и складчатости кожи, как у слона (elephas, elephantos). Под названием glaukōma греческие врачи описывали различные заболевания глаз, при к-рых наблюдалась синеватая или зеленоватая окраска (помутнение) зрачка, чаще заболевание, именуемое ныне катарактой. Термин *глаукома* в современном значении применяется лишь с 60—70 гг. 19 в.

Раскрытие этимологии часто позволяет лучше понять, почему данное слово, данный звуковой комплекс стали использоваться для обозначения определенного медицинского понятия. Так, словом eklampsis (вспышка) греки называли любую болезнь, возникновение к-рой столь же внезапно, как вспышка света. В современном научном смысле термин *эклампсия* утвердился только в 18 в. Древнегреческий корень hist- (*гист-*), используемый в биологии и медицине для обозначения понятия «ткань», был связан с ремесленной терминологией греческих корабелов и ткачей. Histos (от histemi ставить) имело несколько значений: 1) корабельная мачта; 2) ткацкий навой, т. е. вал, на к-рый навивают основу; 3) вал вместе с навитой на него основой; 4) основа ткани, ткань, любой кусок материи. Греческое слово podagra, состоящее из двух основ: pus, podos (нога) и agra (охота, ловля), первоначально обозначало капкан; позже оно получило значение сковывающей боли в ногах, и, наконец, стало названием болезни *подагра*.

Интересную этимологию имеет термин *гибрид*. Непосредственно он происходит от латинского слова hybrida (ребенок, родившийся от брака римлянина и неримлянки). Слово имело явный оттенок порицания, осуждения и, в свою очередь, произошло от греческого слова hybris, hybridos (невоздержанность, кровосмешение, внебрачный ребенок).

Этимология помогает восстанавливать древнейшие, зачастую ошибочные, представления греков о причинах или патогенезе болезни. Так, современное понимание истерии не имеет ничего общего с тем значением, к-рое вкладывали в слово hysteria греческие врачи, произведя его от hystera (матка), поскольку полагали, что причина истерии заключается в нарушениях функции матки.

Созданный в ранний период древнегреческой медицины термин *артерия* (arteria), как показывает этимология (aēr воздух + tereō содержать), отражает представление, что артерии со-

держат воздух. Древние греки полагали, что поскольку после смерти человека эти сосуды оказываются пустыми, у живого человека они также ничего, кроме воздуха, не содержат. Поэтому длительное время греческие анатомы не находили функционального различия между собственно артериями и трахеей; и то и другое именовалось общим словом arteria, а различие между ними выражалось эпитетами: собственно артерия именовалась arteria leia (leios гладкий), а трахея — arteria tracheia (trachys — шероховатый).

Термин *паренхима* (parenchyma от parenchеō — изливать возле) обязан своим возникновением мнению древних, «что тонкие составные части печени, селезенки, почек, легких доставляются к ним путем излияния из венозных сосудов в полости и там, застывая, служат для образования и роста органических субстанций» [1].

Нек-рые слова допускают различные толкования их этимологии. Так, согласно одной, наиболее вероятной версии, греч. слово cholera происходит от древнееврейского chaul rah (дурная болезнь). Остальные этимологические объяснения были распространены еще в древности. По одному из них, общеупотребительное греч. слово cholera (водосточный желоб) получило метафорическое применение и стало обозначением болезни, характеризующейся извержением жидкостей, «как из водосточного желоба». Другие версии выделяют в слове элементы cholē (желчь) или cholas (кишка) и rheō (течь, истекать).

Существуют несколько этимологий неолатинского термина *сифилис*, предложенного итальянским ученым 16 в. Фракасторо для обозначения новой болезни. По одной версии, слово произведено от греч. syphilia (coитие), по другой — от греч. syphlos (постыдный, позорный), по третьей — образовано сложением греч. sys (свинья) и philos (друг, любитель), поскольку имя Syphilus носит герой поэмы Фракасторо — свинопас, как бы персонифицирующий эту болезнь.

Противоречивые мнения существуют относительно этимологии неолатинизма (sectio caesarea) *кесарево сечение*, впервые появившегося в 18 в. во Франции. По одной версии, caesarea происходит от имени Гая Цезаря (Caesar), т. к. он был извлечен из матки матери путем сечения; по другой, слово произведено от caedere — резать (латинское выражение ab utero caeso из рассеченной матки), но получающаяся тавтология — «сечение резаньем» — малоубедительна. Кроме того, прилагательное caesarea не могло быть образовано от глагола caedo, т. к. это противоречило бы латинским словообразовательным моделям. Более убедительной представляется третья версия, согласно к-рой caesarea произведено от нарицательного caesar (царь, кесарь), поскольку одному из древнеримских царей приписывалось установление закона, к-рый обязывал удалять плод из матки до погребения умершей беременной женщины.

В этимологии нек-рых терминов явственно проступают черты одной из наиболее долговечных теорий греческой медицины — гуморальной теории. Согласно ей, болезни возникают от нарушения равновесия между четырьмя жидкостями организма (haima или лат. sanguis, sanguinis — кровь, cholē — желчь, melaina cholē — черная желчь, phlegma — флегма), а преобладание одной из жидкостей определяет темперамент человека. На этой основе появились наименования темпераментов: *сангвинический*, *холерический*, *меланхолический*, *флегматический*.

Отголоски гуморальной теории слышны в терминах *ревматизм* (греч. rheumatismos, от rheuma течение какой-либо жидкости) и *катар* (греч. katarrhoos нечто стекающее вниз).

Устаревшее название гипофиза — *питуитарная железа* (glandula pituitaria) — обусловлено представлением древних, будто эта железа секретирует носовую слизь (pituita).

Рассматривая семантику заимствованных терминов, следует иметь в виду, что преобразование значения древнегреческого или латинского слова происходит чаще всего на почве какого-либо современного языка; оттуда с новым, обогащенным значением слово-термин поступает в русский язык или в интернациональный фонд. Так, напр., современный термин *клон* заимствован из английского языка, хотя слово clon восходит к греч. klōn (росток, отпрыск). Термины *криз* и *трепан* заимствованы из французского языка, хотя слово crise и trépan произошли от греч. *krisis* (разделение, перелом болезни) и *trypanon* (бурав).

Если известно, что русский термин состоит из греческих или латинских этимонов (слов, корней, элементов), это не означает, что в классическом словаре слово существовало в готовом виде; весьма часто оно является неоклассицизмом.

Семантика современного термина и его этимология могут находиться в сложных отношениях друг с другом. В одних случаях они совпадают, в других — семантика как бы вырастает из этимологического обиходного значения древнего слова, надстраивается на нем, как на своей образной основе, помогая пониманию термина; в нек-рых случаях между ними возникает противоречие, и современная семантика полностью не соответствует этимологии, что позволяет выявлять ошибочные представления прошлых времен. Поэтому, хотя этимология представляет несомненный историко-научный или познавательный интерес, она в лучшем случае может служить лишь подспорьем и ориентиром в уяснении значения терминов. В связи с этим требование, чтобы семантика и этимология термина соответствовали друг другу, не всегда является обоснованным.

О некоторых структурных и семантических особенностях терминоэлементов греко-латинского происхождения

Большинство терминов представляет собой производные слова, образованные от других, производящих слов (основ) посредством различных способов словообразования: использование приставок и суффиксов, осново- и словосложение. Значение таких производных слов обычно определяется семантикой (значением) их составных частей, к-рые принято называть терминоэлементами. В данном томе «Энциклопедического словаря медицинских терминов» помещен «Словарь греко-латинских терминоэлементов», содержащий основные этимологические группы терминоэлементов, употребляемых в медико-биологических науках.

В медицинской терминологии велик удельный вес многокомпонентных слов, содержащих 3 и более терминоэлементов; напр.: *гастро/энтеро/кол/ит*, *динамо/баллисто / кардио/граф*, *поли/фибро/миоз/ит*, *сплено/порто/хол/ангио/графия*.

За каждым терминоэлементом в рамках медико-биологической терминологии, как правило, закрепилось одно, реже два или три значения, к-рые участвуют в формировании семантики термина. Так, напр., ориентироваться в семантике терминов *а/генезия*, *ан/емия*, *ан/урия*, *а/тония*, *гипо/генезия*, *гипо/тония*, *диз/урия*, *дис/генезия* и *дис/тония* позволяет знание семи составляющих терминоэлементов, семантика к-рых стабильна и четко зафиксирована:

а-, *ан-* (греч. неотделяемая отрицательная приставка *a-*, *an-*) — отсутствие, недостаточность или отрицание признака, выраженного во второй части слова;

гипо- (греч. предлог и приставка *hypo*) — 1) под, ниже, снизу; 2) понижение, уменьшение чего-либо, недостаточность, слабая выраженность;

диз-, *дис-* (греч. неотделяемая приставка *dys-*) — затруднение, отклонение от нормы, нарушение, расстройство функции;

-генезия (греч. *genesis* происхождение, развитие) — происхождение, развитие;

-емия (греч. *haima* кровь) — относящийся к крови, содержание чего-либо в крови;

-тония (греч. *tonos* натяжение, напряжение; лат. *tonus* натяжение) — напряжение, натяжение, давление;

-урия (греч. *uron* моча) — относящийся к моче, к мочеобразованию.

Благодаря знанию семантики терминоэлементов *гастро-* (относящийся к желудку), *нефро-* (относящийся к почке), *-рragия* (кровотечение из какого-либо органа), *-пексия* (прикрепление, фиксация какого-либо органа) выясняется семантика терминов *гастроррагия*, *нефроррагия*, *гастропексия*, *нефропексия*.

Значения терминоэлементов могут быть этимологическими, т. е. присущими данному терминоэлементу еще в древнем языке-источнике, и (или) специализированными в рамках медико-биологической терминологии.

Греческая приставка para-, сохраняя в качестве терминоэлемента свои основные этимологические значения (нахождение, расположение рядом, вблизи, возле чего-либо; отступление, отклонение от чего-либо), получила в то же время одно специализированное значение: несоответствие внешних проявлений сущности данного явления (напр., *параструма*, *паратиф*, *парахолера*). Терминоэлемент *-пения* на основе развития этимологического значения греч. слова penia (бедность, нужда, недостаток) приобрел специализированное значение: сниженное содержание формен-

[1] П. И. Карузин. Словарь анатомических терминов. М.— Л., 1928, с. 161.

ных элементов крови (напр., *лейкопения, эритропения, тромбопения*).

Узкоспециализированной семантикой в рамках дерматовенерологической терминологии обладает терминоэлемент *-ид*, от греческого суффикса -eidēs (подобный, похожий). Он указывает на кожные проявления болезни или патологического состояния, напр. *аллергид, бруцеллид, диабетид, туберкулид*.

В греческом языке существительные с суффиксом *-(ō)ma* имели общее значение: результат действия, обозначенного корнем слова, напр. glaukōma, от glaukoō (страдательный залог glaukomai) — становиться голубым; trachōma, от trachoō-trachynō — делать что-либо шершавым; sklerōma, от sklerōō — уплотнять, skotōma, от skotoō — затемнять. Эти слова в древнегреческой медицине обозначали различные патологические состояния. В современной терминологии терминоэлемент *-ома* специализирован почти исключительно на обозначении опухолей: *аденома, миома, нейролипома, остеома, фиброма, эндотелиома* и др.

Терминоэлементы обладают различной степенью частотности: одни могут входить в состав двух—трех, другие — в состав нескольких десятков терминов. С помощью одного терминоэлемента образуются целые серии однотипных, построенных по одной и той же словообразовательной модели терминов. Так, напр., по модели термина греческой медицины gastrorrhaphia (ушивание раны живота) было образовано множество наименований с терминоэлементом *-рафия*: *герниорафия, гепаторафия, кольпорафия, энтерорафия* и др. По модели древнегреческих наименований laryngotomia и omphalotomia образована обширная серия хирургических терминов с компонентом *-томия*: *гастротомия, дуоденотомия, пневмотомия, эзофаготомия* и др.

Многовековое накопление подобных словообразовательных моделей привело к устойчивому закреплению обобщенной и наиболее распространенной модели несколькокомпонентного термина, по к-рой к терминоэлементу(ам), обозначающему(им) клетку, ткань, орган, часть тела, присоединяют терминоэлемент, обозначающий симптом, патологическое состояние, нозологическую форму, тип оперативного вмешательства, способ обследования или лечения, тип инструмента, прибора, технического устройства и т. п.; напр.: *ганглиоцит/ома, гастро/скопия, кардио/графия, ларинго/скоп, менинг/ит, нейро/фиброма, нейтро/пения, остео/патия, остео/хондроз, пиело/графия, пилоро/стомия, пилоро/томия, флеб/эктазия, энтеро/триб, энцефало/графия*.

Одна из наиболее характерных особенностей медицинской терминологии, обусловленная ее двуязычной греколатинской основой, заключается в наличии большого числа дублетных (обладающих идентичной семантикой) терминоэлементов греческого и латинского происхождения. Дублетными могут быть как терминоэлементы-приставки (напр., греч. *анти-* и лат. *контра-*, греч. *эндо-, энто-* и лат. *интра-*), так и корневые терминоэлементы (напр., греч. *нефр-* и лат. *рен-*, греч. *пневм-, пневмон-* и лат. *пульмон-*, греч. *спланхн-* и лат. *висцер-*, греч. *фак-* и лат. *лент-*, греч. *анг(и)-* и лат. *ваз-*, греч. *прокт-* и лат. *ректо-*, греч. *маст-* и лат. *мамм-*, греч. *коф-* и лат. *сурд-*, греч. *галакт-* и лат. *лакт-*, греч. *карцин-* и лат. *канкр-, канцеро-*). Встречаются и триплетные, и тетраплетные терминоэлементы: напр., греч. *лапар-, цели(о)-* и лат. *абдомин-, вентр-*; греч. *метр-, гистер-* и лат. *утер(ин)-*; греч. *сиал-, птиал-* и лат. *салив-*. В «Словаре греко-латинских терминоэлементов» дублетные терминоэлементы снабжены перекрестными ссылками: «см. также...».

Значительно реже встречаются терминоэлементы, к-рые при наличии общего значения имеют нек-рые специальные различия (напр., *адип-, лип-, себо-, стеат-* с общим значением «жирный», «жировой»; *-артрия, лало-, лог-, -фазия, -фем-, -фразия* с общим значением «речь», относящийся к нарушениям речи).

В функционировании медико-биологических терминов важную роль играют отношения смысловой противоположности (антонимии) пар терминоэлементов. Чаще всего в этой роли выступают пары терминоэлементов-приставок типа *гипо- — гипер-, изо- — анизо-, интра- — экстра-, ана- — ката-, олиго- — поли-, гетеро- — гомо-* (*гомео-*). При их посредстве образованы многочисленные термины-антонимы. Нек-рые многозначные приставки имеют не одну антонимичную приставку. Так, греч. приставка *гип(о)-* противопоставляется греч. приставке *гипер-* в терминах, обозначающих процессы, состояния, свойства (*гипотония — гипертония, гипоксия — гипероксия, гипоплазия — гиперплазия* и т. п.), но в терминах, обозначающих расположение чего-либо, *гип(о)-* противопоставляется греч. приставка *эпи-* (*гипоталамус — эпиталамус, гипогастрий — эпигастрий* и т. п.); лат. приставка *суб-* обычно противопоставляется лат. приставке *супер-* в терминах, обозначающих недостаточную, слабую степень — высшую степень (*субинволюция — супериволюция*), но при обозначении расположения чего-либо *суб-* может противопоставляться греч. приставке *эпи-* (*субдуральный — эпидуральный*). Терминоэлементы-антонимы в «Словаре греко-латинских терминоэлементов» снабжены перекрестными ссылками: «противопол...».

Основная масса терминоэлементов существует лишь в связанном виде, т. е. в качестве составных частей производных слов; нек-рые из терминоэлементов, существовавших в классическом языке только в связанном виде, в современной терминологии лексикализировались, т. е. стали употребляться в виде самостоятельных терминов, напр. *эктомия, фобия*.

В зависимости от занимаемого места в составе слова терминоэлементы делят на начальные, промежуточные (срединные) и конечные. Только в виде конечных применяются терминоэлементы *-ерез, -криния, -кринный, -крота, -кротия, -лагния, -одиния, -пексия, -ррагия, -форез, -фория, -фузия* и др.

Часто от одного и того же корня производятся как начальные и промежуточные, так и конечные терминоэлементы; напр.: *гем-, гемат-* и *-емия, кардио-* и *-кардия, пато-* и *-патия, уро-* и *-урез, -урия*. Обычно такие однокоренные терминоэлементы имеют идентичное значение независимо от занимаемого ими места в термине, но иногда возможны нек-рые смысловые оттенки. Так, у однокоренных терминоэлементов *гем-, гемато-* и *-емия* общее значение — кровь, относящийся к крови; в то же время начальный терминоэлемент *гем-, гемат-* в сочетании с наименованием органа обычно указывает на скопление крови, кровотечение, кровоизлияние (*гемартроз, гематокольпос*), а конечный терминоэлемент *-емия* указывает обычно на кровь как на среду, в к-рой обнаружен тот или иной объект (*азотемия, бактериемия, уремия* и др.). Однокоренные терминоэлементы *лог(о)-* и *-логия* также различаются по смыслу: *лог(о)-* обычно означает нарушение речи (логоневроз), а *-логия* (паразитология) — относящийся к науке, учению.

Нек-рые терминоэлементы могут быть образованы двояко: от основы именительного и основы родительного падежа; напр.: *гем-* и *гемат-* (греч. haima, род. падеж haimatos кровь), *пан-* и *пант-* (греч. pan, pantos всё), *пневм-* и *пневмат-* (греч. pneuma, pneumatos воздух), *пульм-* и *пульмон-* (лат. pulmo, pulmonis легкое), *-сом(ия)* и *сомат-* (греч. sōma, sōmatos тело).

Из-за фонетического или морфологического чередования один и тот же терминоэлемент может быть представлен в двух-трех вариантах; напр., *тарз-* и *тарс-, -оз* и *-ёз, -ома* и *-ема, -поэз* и *-поэт-, верс-* и *верт-, -триб* и *трип(сия), мик-* и *миц-*.

Нек-рые терминоэлементы-приставки в русском языке претерпевают определенные фонетические модификации из-за ассимиляции, т. е. уподобления конечного звука приставки начальному звуку корня, или из-за выпадения конечного звука приставки; напр.: *аб-* и *а-*; *ад-* и *аг-, ак-, ал-, ап-; дис-* и *диз-*; *мета-* и *мет-*.

Один и тот же терминоэлемент может быть различно транскрибирован на русский язык; напр., *хейро-, хир-, хиро-, -хейрия, -хирия* (греч. cheir рука), *невро-, нейро-, неври-* (греч. neuron жила, сухожилие, волокно; нерв), *ятро-, -иатрия* (греч. iatēr врач). Нек-рые же терминоэлементы, разные по значению, в русской передаче одинаково звучат и пишутся, т. е. являются омонимичными: напр., *гидр-(о)-* (греч. hidrōs пот; hydōr вода), *тимо-* (греч. thymós душа, настроение, thýmos вилочковая железа). В «Словаре греко-латинских терминоэлементов» такие омонимы представлены раздельно и снабжены порядковыми цифровыми индексами.

В целом греко-латинские терминоэлементы обладают рядом особенностей, к-рые делают их незаменимыми при конструировании новых терминов. Во-первых, поскольку они черпаются из лексической и словообразовательной сокровищницы классических, мертвых языков, их значения не развиваются, не меняются, как это происходит в живых языках. Этимологический аспект в их толковании отступает в тень и на первый план выступает терминологическая семантика — значение в составе термина. Во-вторых, будучи весьма краткими по числу составляющих слогов, греко-латинские терминоэлементы удобны и позволяют легко создавать многокомпонентные высокоинформативные слова вместо несколькословных термi-

нов-словосочетаний на национальном языке, напр.: *цист/ит* вместо «воспаление мочевого пузыря», *пери/кард* вместо «околосердечная сумка», *томо/-графия* вместо «послойное рентгенологическое исследование». В-третьих, повторяемость многих терминоэлементов в различных терминах с сохранением семантической однозначности обеспечивает их легкую усвояемость и воспроизводимость, что позволяет, с одной стороны, ориентироваться в семантике состоящих из них терминов (по нек-рым подсчетам, 500 терминоэлементов обеспечивают возможность понимания 15 000 терминов), а с другой стороны, обусловливает высокую степень системности терминологии, т. е. способность формировать комплексы взаимосвязанных терминов. В качестве примера можно привести микросистему наименований воспалительных заболеваний. Начало ей положил в 18 в. французский врач Франсуа Соваж (1706—1767). Он придал греческому суффиксу имен прилагательных в женском роде -itis, имевшему общее значение «относящийся, принадлежащий к чему-либо», специализированное значение «воспаление» вместо более раннего значения (в сочетании со словом nosos) «заболевание органа, именуемого основой слова», напр. nephritis nosos — почечная болезнь. Сам Соваж создал термин peritonitis — воспаление брюшины, затем Бедгам в 1800 г. образовал термин bronchitis. В-четвертых, терминоэлементы в первую очередь обеспечивают выраженную интернационализацию медико-биологической терминологии. В-пятых, благодаря тому, что греко-латинские терминоэлементы легко соединяются с разноязычными терминоэлементами, образуя слова-«гибриды», значительно возрастает терминообразовательный потенциал научного языка. И наконец, греко-латинские терминоэлементы легко адаптируются ко многим национальным языкам.

Некоторые проблемы упорядочения современной медицинской терминологии

Изложенная выше многовековая история возникновения и развития медицинской терминологии, имеющей множество разноязычных источников, а также приведенные примеры сложных отношений между этимологией, структурой и семантикой терминов, вероятно, позволят лучше понять и оценить современное состояние отечественной медицинской терминологии и актуальнейшие проблемы ее упорядочения.

Современная медицинская терминология — одна из самых обширных и сложных в понятийном, содержательном отношении систем терминов. Медицинский лексикон, включая употребляемые в научной медицине термины других наук (биологии, химии, физики, микробиологии, радиологии, генетики, антропологии, психологии, кибернетики и др.), составляет несколько сот тысяч слов и словосочетаний. В их число входят весьма многочисленные синонимы, составляющие в нек-рых областях медицины 25—40% терминологического фонда. Так, «Международная классификация болезней» упоминает более 50 000 наименований, хотя количество выделяемых нозологических форм в несколько раз меньше этого числа. Количество названий лекарственных средств (вместе с синонимами) превышает 80 000. Интенсивное увеличение объема медицинской и медико-биологической информации на самых различных языках сопровождается появлением в медицинской литературе многих новых терминов, число к-рых, по нек-рым источникам, ежегодно превышает 1000.

Огромному объему современной медицинской терминологии сопутствует исключительное многообразие отражаемых ею категорий научных понятий, являющихся предметом исследования многих научных дисциплин; в совокупности она образует сложнейшую макротерминосистему.

Вместе с тем каждый медицинский термин является элементом соответствующей микротерминосистемы (анатомической, гистологической, эмбриологической, гинекологической, дерматологической, физиотерапевтической и т. д.). Любая микротерминосистема базируется на классификациях научных понятий. Каждый термин, занимая соответствующее место в микротерминосистеме, находится в фиксированных родо-видовых или иных связях с другими ее терминами. Вместе с тем термины разных микротерминосистем состоят в определенных отношениях и связях между собой на уровне макротерминосистемы, что отражает двойственную тенденцию прогресса: дальнейшую дифференциацию медицинских наук, с одной стороны, и их усиливающиеся взаимообусловленность, интеграцию, с другой стороны. В 20 в. значительно выросло число частных микротерминосистем, выражающих понятия, связанные с диагностикой, лечением и профилактикой болезней, поражающих преимущественно отдельные органы и системы (эндокринология, пульмонология, урология, нефрология, сексопатология, гематология, артрология, гастроэнтерология, кардиоваскулярная хирургия, абдоминальная хирургия, нейрохирургия и др.). За последние десятилетия достигли внушительных размеров узкоспециальные лексиконы кардиологии, онкологии, рентгенологии, иммунологии, медицинской вирусологии, наук гигиенического профиля.

Дифференциация наук и областей знания облегчает обмен информацией в пределах узкой специальности, но затрудняет взаимопонимание в рамках макротерминосистемы медицины. Узкие специальные дисциплины, конечно, опираются в той или иной степени на общий для них терминологический фонд, но развивают прежде всего и в основном свои узкоспециальные словари. Оперируя терминами преимущественно в границах своей частной микротерминосистемы, специалист не всегда может полноценно вступить в контакт с представителями смежных специальностей и, следовательно, смежных микротерминосистем при изучении одного и того же объекта.

Примером влияния интеграции наук в медицине может служить терминология трансплантологии, складывающаяся в значительной степени в результате межотраслевого контакта с общей и оперативной хирургией, клиническими дисциплинами хирургического профиля, с анестезиологией, реаниматологией, иммунологией, патофизиологией, генетикой, фармакологией, морфологией и биохимией, а также с такими науками, как физика, химия, технология материалов, этика, деонтология, социология и др. Терминология сравнительно новой дисциплины — медицинской радиологии складывается в условиях совместной деятельности врачей-радиологов с рентгенологами, представителями многих клинических специальностей и инженерами-физиками. На уровне межотраслевого контакта возникает возможность для дублированного дефинирования и обозначения одних и тех же понятий, становятся неизбежными случаи, когда один и тот же термин начинает выражать отличающиеся понятия.

Стихийный, почти не управляемый рост терминологического фонда, приводит к его засорению неполноценными, а зачастую ненужными терминами, к неточности, расплывчатости, многозначности многих терминов, обилию синонимов. Происходит интенсивное, далеко не всегда оправданное внедрение иноязычных заимствований или, наоборот, бесперспективная русификация терминов-интернационализмов.

Во всем мире медицинская общественность отдает себе отчет в том, что подобное неблагополучие в медицинской терминологии отрицательным образом сказывается на темпах развития медицинской науки и здравоохранения. Тенденции и противоречия современного развития отечественной медицинской терминологии подверглись критическому рассмотрению на первой в СССР научной конференции «Проблемы упорядочения и стандартизации медицинской терминологии», состоявшейся в Москве в 1975 г. В принятом решении конференция предложила ряд первоочередных мер организационного, методического и научного характера в целях упорядочения отечественной медицинской терминологии[1].

Эта работа должна базироваться на теоретических положениях советской терминоведческой науки и выработанных ею практических рекомендациях. Исходным является положение, согласно к-рому функциональное назначение термина — кратко, точно и однозначно выражать научное понятие, служить средством его отождествления и различения в специальном языке. Для успешной реализации этой функции термин, представляющий собой единство формы, или звукового комплекса, и содержания, или значения (семантики), должен удовлетворять нескольким важным требованиям.

1. Требование адекватности: содержание терминируемого понятия должно соответствовать современному научному знанию о соответствующем объекте.

2. Требование точности: а) содержание и объем терминируемого понятия должны недвусмысленно и строго отличаться от других понятий в данной микротерминосистеме; б) звуковой комплекс термина не должен содержать элементов, к-рые могут неправильно ориенти-

[1] Актуальные вопросы упорядочения медицинской терминологии, под ред. И. П. Лидова, М., 1981.

ровать в отношении содержания и объема терминируемого понятия.

3. Требование однозначности (моносемии): любой звуковой комплекс должен быть закреплен только за одним понятием; многозначность (полисемия) термина недопустима.

4. Требование ооформленности: понятие должно выражаться только одним звуковым комплексом; синонимия недопустима.

Два последних требования обычно сводятся к формуле однозначного соответствия между формой и содержанием термина в рамках определенной терминосистемы.

Помимо этих основных, к терминам обычно предъявляются дополнительные требования: 1) одни и те же признаки понятий должны выражаться в разных терминах одними и теми же языковыми знаками (словами, терминоэлементами); 2) звуковые комплексы, выражающие однотипные понятия, должны строиться по одной и той же структурно-семантической модели. Смысл этих дополнительных требований сводится к тому, чтобы термины, связанные на уровне понятий, были бы связаны и словообразованием, структурно.

Чем последовательней и строже соблюдаются основные и дополнительные требования, тем полнее и нагляднее проявляется важнейшее свойство терминов — свойство занимать определенное, строго очерченное место в структуре родо-видовых и иных связей внутри терминосистемы. Однако эти требования являются скорее идеальными, чем реально выполнимыми в рамках столь сложных микротерминосистем, как медицинские. Они не могут быть полностью выполнены по ряду существенных причин.

Первая, гносеологическая причина заключается в характере самого человеческого мышления, постоянно поддерживающего тенденцию к однозначности и точности словоупотребления и постоянно противодействующего этой тенденции в процессе изменения границ сложившихся понятий и создания новых понятий, требующих словесного выражения. Понятия, выражаемые терминами, подвижны, семантические границы их изменчивы, точность и однозначность временны и непрочны. Происходит наполнение старых звуковых форм новым содержанием.

Вторая причина заключается в специфике теоретической и клинической медицины, изучающей явления, этиологическая, патогенетическая, патоморфологическая сущность к-рых скрыта за множеством признаков и не всегда поддается точной идентификации, что порождает неизбежные затруднения в достижении единства понимания этих явлений и применения терминов, их обозначающих. Чем более отвлеченным значением обладает тот или иной термин, тем труднее достигается это единство. Так, до сих пор вызывают спорные толкования такие кардинальные понятия медицины, как *болезнь* и *инфекция*. Терминология тех объектов, к-рые отличаются бо́льшей предметностью и конкретностью (анатомические образования, методы оперативного вмешательства и др.), характеризуется значительно бо́льшей точностью и однозначностью. Если в рамках отечественной медицины не всегда удается добиться единомыслия в интерпретации того или иного явления, то еще бо́льшие расхождения наблюдаются между учеными разных стран, зачастую представляющих школы и направления, основывающиеся на разном мировоззрении. Многие медицинские термины (напр., *шизофрения*) несут на себе печать определенных гипотез, теорий, точек зрения, концепций. В пределах одной науки могут сосуществовать особые подмикросистемы терминов, отображающие оригинальные научные концепции, причем отдельные термины становятся своего рода их визитными карточками. Так, термины *акцептор результатов действия* или *обратная афферентация* представляют концепцию П. К. Анохина о функциональной системе. Специфична терминология психиатров — последователей школы З. Фрейда. Все это лишний раз подчеркивает, насколько актуальной является проблема достижения единства в понимании и применении медицинских терминов. Пока этого лучше всего сумели добиться только морфологи, согласовавшие соответствующие международные анатомическую и гистологическую номенклатуры. Согласованностью в отношении присваиваемых лекарственным веществам международных непатентованных наименований отличаются также документы экспертного совета по подготовке и изданию Международной фармакопеи.

Третьей объективной причиной затруднений в реализации терминологических требований следует считать то, что ведущие области медицины до сих пор не располагают полными классификационными иерархическими схемами понятий, каждое звено к-рых можно было бы выразить идентично понимаемыми и применяемыми терминами. Хотя, как указывал И. П. Павлов, «все наши классификации всегда более или менее условны и имеют значение только для данного времени, в условиях данной методики, в пределах наличного материала»[1], отсутствие классификационных схем сильно ограничивает возможности выполнения требований адекватности, точности и однозначности медицинских терминов.

Классификация понятий, как правило, строится на едином основании деления, т. е. наиболее существенном признаке, изменения к-рого позволяют отнести к различным видам объекты, принадлежащие к одному и тому же роду. Классификации, построенные по родовидовому принципу, имеют наиболее широкое распространение в микросистемах медицинских терминов. Однако далеко не всегда удается построить классификации на однопризнаковой основе—едином основании для деления. Особые трудности в этой связи возникают при построении классификационных схем номенклатуры болезней, когда за основание для деления принимают то этиологию, то эпидемиологию, то патоморфологическую, патофизиологическую или клиническую характеристики болезни, то нек-рые другие ее признаки. В результате «Международная классификация болезней» подвергается существенным изменениям при каждом очередном пересмотре, а составление международных номенклатур болезней растянулось на длительный срок. До сих пор отсутствуют классификационные схемы и номенклатуры многих патоморфологических субстратов, патологических процессов и состояний, количественных и качественных диагностических показателей, симптомов, синдромов и др. Остро ощущается отсутствие классификационных схем и номенклатур методов диагностики, профилактики и лечения, в том числе хирургических операций.

Отсутствие рациональных классификационных схем отрицательно сказывается не только на адекватности и точности содержания медицинских терминов, но и на составе их звуковых комплексов, к-рые далеко не всегда выражают наиболее существенный классификационный признак понятия. Так, названия инфекционных и паразитарных болезней построены то по синдромному (*чесотка*), то по патоморфологическому признаку (*инфекционный гепатит*), то по названию возбудителя (*иерсиниоз*), то по имени автора, впервые более или менее точно описавшего болезнь (*болезнь Брилла*), то по месту, где болезнь была впервые выявлена (*крымская геморрагическая лихорадка*). В названиях нек-рых болезней используются цифровые или буквенные обозначения (*пятая болезнь*, *шестая болезнь*; *Ку-лихорадка* — от первой буквы английского слова query неясный, неизвестный). На отсутствие однопризнаковой основы в наименованиях анатомических объектов как на недостаток, к-рый желательно устранить, указывают ученые анатомы. Напр., в названиях около 600 скелетных мышц человека отражены самые различные признаки (форма, расчлененность, место прикрепления, функция), в то время как наиболее существенным признаком является функция.

Часто родо-видовые связи выражаются терминами-словосочетаниями. В ряду таких словосочетаний постоянная их часть выражает родовое (вышестоящее в иерархии) понятие, а изменяемые части обладают уточняющей, ограничивающей функцией и выражают видовые понятия. Очень важно при построении терминов следить за тем, чтобы в пределах одной терминосистемы изменяемые части звуковых комплексов выражали признак, принятый за основание деления; напр. локализацию (*аневризма аорты*, *артериальная аневризма*, *артериоловенулярная аневризма* и др.), или этиологию (*амебный гепатит*, *бруцеллезный гепатит*, *волчаночный гепатит*, *лучевой гепатит* и др.). Большая часть медицинских понятий классифицируется одновременно по различным основаниям деления, в результате чего звуковой комплекс термина может содержать несколько изменяемых частей. Так, наряду с терминами *вирусный гепатит* и *холестатический гепатит* существует термин *холестатический вирусный гепатит*.

Звуковая форма термина, как правило, отстает от изменения содержания и объема понятия. Современные знания об этиологии, патогенезе и клинической картине многих инфекционных болезней значительно более точны, чем в те времена, когда они получили свои названия, произвольные и случайные с точки зрения нашего понима-

[1] Павлов И. П. Полн. собр. соч., М., 1949, т. III, с. 169.

ния соответствующих инфекционных процессов. Однако нереально в настоящее время менять наименования всех инфекционных болезней, руководствуясь каким-то единым принципом. Вообще, при упорядочении терминологии нельзя задаваться целью во что бы то ни стало переиначивать совокупности звуковых комплексов целых микросистем, сложившихся на разнопризнаковой основе, напр. названия всех мышц или костей. Все же возникают ситуации, когда развитие науки вынуждает заменять какую-либо группу взаимосвязанных звуковых комплексов на новую. Так, в трансплантологии вместо терминов «аутологичный», «гомологичный» и «гетерологичный», восходящих к 19 в., в последние годы применяют термины «аутогенный», «аллогенный», «ксеногенный» и соответственно *аллотрансплантация* вместо *гомотрансплантация*, *ксенотрансплантация* вместо *гетеротрансплантация* и т. д. Эти существенные перемены терминологии были обусловлены необходимостью ее сближения с терминологией современной генетики.

При упорядочении терминологии в первую очередь подлежат замене те звуковые комплексы, к-рые страдают явной неточностью, неясностью в выражении отличительных признаков понятий или уступают по своей информативности другим, синонимичным наименованиям.

Решая вопрос о преимуществе, полноценности того или иного звукового комплекса, необходимо учитывать нек-рые закономерности языковой семантики. При создании нового термина его авторы, как правило, стараются отобразить в звуковом комплексе определенный мотивирующий признак (реже — несколько признаков), производя термин от слов родного или иностранного языков, из интернациональных терминоэлементов, имеющих соответствующее этому признаку значение. Иногда звуковой комплекс термина полностью совпадает со словом литературного языка, выражая, однако, не первичное, обиходное, а вторичное, специальное (медицинское) значение. Термин считается мотивированным, если специалист улавливает семантическую связь между производящими и производными звуковыми комплексами слов или между вторичным, специальным, значением и первичным значением одного и того же слова. Мотивировка—это более или менее наглядный образ, к-рым содержание термина связывается с его звуковым комплексом, в том числе со словообразовательной структурой. Таковы, напр., звуковые комплексы терминов *родо|вспоможение, здраво|охранение, косо|глазие, желтуха, потница, стрептококковая пневмония, гипо|трофия, а|витаминоз*. Мотивированными представляются наименования с переносным значением, напр. *грудная клетка, молоточек, наковальня, вертел, дрейф*.

Если связь звукового комплекса с содержанием термина не улавливается специалистом, то такой звуковой комплекс представляется лишенным мотивировки, условным, произвольным языковым знаком. Такими являются в большинстве случаев заимствованные слова, для к-рых нет производящих слов (корней) в родном языке (напр., *скарлатина, чума, кашель*), или исконно русские слова, производящие основы к-рых не сохранились или их трудно выделить (напр., *лихорадка, легкие, заусеницы*).

Мотивировка осознается прежде всего в момент создания нового наименования или придания слову с обиходным значением специального значения. Позже, когда термин становится привычным, перестает актуально ощущаться и мотивировка (напр., *сыпной тиф, ветряная оспа*). Более четко осознается мотивировка звуковых комплексов, состоящих из регулярных терминоэлементов.

Характер связи (мотивировка) между содержанием понятия и его представлением в звуковом комплексе термина бывает различным, в связи с чем термины делят на квалификативные, ассоциативные и нейтральные. В квалификативных терминах эта мотивировка выражается прямо, путем непосредственного называния отличительного, мотивирующего признака (напр., *выбухание мозга, выворот века, гастродуоденопластика, грыжесечение, холодовая дрожь, эксфолиативный дерматит новорожденных*).

В ассоциативных терминах мотивировка выражается косвенно, опосредованно, с помощью разного рода ассоциаций, без прямого называния мотивирующего признака. Такие наименования отличаются обычно образной природой и основаны на метафорах и сравнениях (напр., *заячья губа, волчья пасть, опечение, петушиная походка*). В нек-рых наименованиях ассоциация вызывается упоминанием литературного или мифологического персонажа, обладавшего соответствующими чертами личности или судьбы (напр., *синдромы Агасфера, Мюнхгаузена, Робина Гуда, садизм, нарциссизм*). Иногда ассоциации, возникшие у автора термина, не свойственны широкому кругу специалистов, и мотивировка требует дополнительного разъяснения (напр., *болезнь кленового сиропа, синдром вечеров коктейлей, синдром менеджера, феномен медной проволоки* и др.). Образность нек-рых ассоциативных терминов скрыта за их иноязычным происхождением. Так, термин *лихорадка денге* происходит от dengue — переделанного на испанский лад английского слова dandy (щеголь, франт), поскольку одним из характерных признаков болезни является раскачивающаяся «франтоватая» походка больного. В наименованиях нек-рых вирусов (*орф-вирус*) используется терминоэлемент *орф-*, а в аббревиатурах (ECHO-*вирусы* и др.) — буква «о», происходящие от английского слова orphan (сирота). Это связано с тем, что долгое время ученые не знали, ткани какого органа служат местом обитания этих вирусов и считали их «бездомными», «без рода, без племени».

Нейтральными называются термины, в звуковых комплексах к-рых не содержится даже намека на существенные признаки понятия. Основную массу нейтральных составляют эпонимические термины, т. е. произведенные от фамилий ученых, врачей или больных (напр., *акушерский поворот Виганда, болезнь Боткина, дальтонизм, дарсонвализация, дугласово пространство, евстахиева труба, кардиопластика по Петровскому, катаракта Коппок, реакция Видаля, риккетсия Провацека, синдром Ван-Гога*), а также топонимические термины, произведенные от географических названий (*верденизация, лихорадка Итаки, палочка Бреслау, японский энцефалит* и др.).

Эпонимическими терминами перегружены почти все микросистемы медицинской терминологии. В неврологии эпонимы составляют около 30% всего терминологического фонда. Исключительно высок процент эпонимов в номенклатуре симптомов и синдромов. Рост эпонимов объясняется не только желанием увековечить имена ученых и врачей, впервые открывших или описавших явление, хотя нередко сам факт приоритета остается спорным и недоказанным. К эпонимическим терминам часто прибегают, если не удается подыскать удовлетворительного квалификативного термина, чтобы адекватно отобразить признак сложного феномена или кратко и экономно обозначить его с помощью одного или немногих слов. Кроме того, описание симптомов и синдромов часто опережало их правильное научное истолкование.

В последние годы широкая эпонимизация подверглась вполне обоснованной критике, поскольку эпонимические термины часто служат источниками ошибок и путаницы. Нередко несколько различных симптомов называются по имени одного и того же автора (напр., известны более 10 симптомов и рефлексов Бехтерева, 4 менингеальных симптома Брудзинского, 5 симптомов Бабинского). Многие эпонимические термины состоят из 2,3 и даже 4 имен, что делает подобные наименования громоздкими и неудобными. Однако главный недостаток эпонимизации состоит в том, что такие термины не несут никакой информации о содержании понятия.

При упорядочении медицинской терминологии приходится искать ответ на вопрос, какой звуковой комплекс термина более предпочтителен: тот, к-рый прямо отражает существенные признаки понятия (квалификативный термин), или тот, к-рый не связан прямо с содержанием, а лишь косвенно указывает на него (ассоциативный термин), или, наконец, тот, к-рый вообще не несет ни прямой, ни косвенной информации о содержании термина (нейтральный термин).

В последние годы вопрос о предпочтительном типе терминов решается преимущественно в пользу квалификативных терминов. Их положительная сторона — возможность отобразить отличительные признаки понятия с помощью часто употребляемых терминоэлементов и определяющих слов. Подавляющее большинство медицинских терминов относится к квалификативным терминам. Даже на названия лекарственных веществ во второй половине 20 в. перестали смотреть только как на условные различительные знаки, не несущие никакой научной информации. В соответствии с рекомендациями международных организаций, в международные непатентованные наименования лекарственных веществ включаются регулярные словесные отрезки (-мицин,

-эстр- и др.), указывающие на принадлежность вещества к определенной фармакологической группе (напр., экт/эстрол, син/эстрол, синто/мицин, диэтилстильб/эстрол, терра/мицин, фен/эстрол, эритро/мицин). Эпонимические термины целесообразно заменять на квалификативные. Исключение составляют наименования, давно и прочно вошедшие в медицинскую терминологию и от к-рых образованы производные слова. В таких случаях эпонимические термины должны оставаться хотя бы как равноправные синонимы квалификативных: напр., *слуховая труба* и *евстахиева труба* (есть *евстахиит*), *верхнечелюстная пазуха* и *гайморова пазуха* (есть *гайморит*, *гайморотомия*), *бульбоуретральная железа* и *куперова железа* (есть *купер*ит), *большая железа преддверия* и *бартолинова железа* (есть *бартолинит*). При наименовании хирургического инструментария многие эпонимические термины в силу их краткости и привычности продолжают применяться вне конкуренции (*зажим Кохера*, *корсет Гоффы*, *щипцы Гоффманна* и др.).

В увязке элементов звукового комплекса термина с отличительным признаком понятия также нельзя заходить слишком далеко. Ошибочно поступают те терминологи, к-рые представляют себе мотивировку термина в качестве некоего аналога дефиниции, а не краткого наглядного ориентира. Стремление отразить в одном звуковом комплексе несколько мотивирующих признаков приводит к его чрезмерному удлинению, превращает термин-название в термин-определение. Несомненно, такие неудобные многословные термины, как *прогрессирующая мышечная дистрофия с фибриллярным подергиванием* и *несемейная псевдосирингомиелитическая язвенно-мутилирующая акропатия*, не смогут окончательно вытеснить из медицинского лексикона их нейтральные эпонимические синонимы — соответственно *болезнь Кугельберга—Веландер* и *синдром Бюро—Баррьера*.

Не меньшие трудности представляет проблема устранения многозначности терминов. Причины, обусловливающие многозначность (полисемию), и формы ее проявления в медицинской терминологии — различны. Первая причина — это наличие различных микротерминосистем, в к-рых одни и те же звуковые комплексы используются для выражения разных понятий. Так, разные понятия скрываются за словом *ампула* в медицинской технике и в анатомии, за словом *анастомоз* — в анатомии и в хирургии, за словом *анестезия* — в неврологии и в хирургии, за словом *гемостаз* в хирургии и в патологии.

Такая междисциплинарная (межнаучная) форма полисемии обычно не вызывает особого беспокойства, пока соответствующие понятия не становятся объектом обмена информацией между представителями различных дисциплин. Ослаблению отрицательного влияния междисциплинарной полисемии способствует употребление при необходимости синонимов, к-рые, как правило, оказываются различными в контактирующих микротерминосистемах; напр. вместо термина *гемостаз* в хирургии применяют синоним — *остановка кровотечения*, а в патологии — *стаз крови*. Той же цели служит добавление к многозначному термину определяющих слов; напр., в психиатрии значение многозначного термина *вязкость* подчеркивают, дополнив его до синонимического словосочетания *психическая вязкость*.

Вторая причина многозначности коренится в «отставании» термина от эволюции содержания выражаемого им понятия. По мере развития научных знаний то или иное понятие разделяется на два и более самостоятельных понятия, а для их выражения в пределах одной и той же микросистемы (или близкородственных микросистем) продолжает использоваться один и тот же звуковой комплекс. Примерами такой внутридисциплинарной формы полисемии могут служить термины *аденомиома*, *альбуминурия*, *гематоциста*, *гемограмма*, *глоссолалия* и др. Свою долю во внутридисциплинарную полисемию вносят и эпонимические термины, напр. *операция по Денди*, *симптом Германа*. Внутридисциплинарная полисемия всегда вызывает трудности в терминоупотреблении, и от нее необходимо избавляться путем внедрения новых терминов (неологизмов или бывших синонимов) при одновременном ограничении значения исходного термина. Таким образом поступили с термином *гипертония*, внедрив термин *гипертензия*.

Кроме вышеописанных причин полисемии, порождаемых системой и эволюцией медицинской терминологии, имеются и чисто языковые причины. Возможна так называемая категориальная многозначность, возникающая, когда один и тот же звуковой комплекс благодаря своей словообразовательной структуре выражает категориально различные значения (предмета и процесса, состояния и действия, действия и его результата и др.); напр.: *патология* — совокупность отклонений от нормы в организме и совокупность знаний о них, *дегазатор* — средство и исполнитель, *кровоизлияние* и *пигментация* — процесс и его результат. Близка к этому многозначность, обусловленная грамматически альтернативными значениями терминоэлемента *-генный*, напр. *пиогенный* означает не только «вызывающий нагноение (гноеродный)», но и «вызванный нагноением».

Другой разновидностью многозначности является этимологическая полисемия, при к-рой в слове, заимствованном из греческого или латинского языка, исконно заложены два разных значения. Включение такого слова в качестве терминоэлемента приводит к многозначности термина. Так, в древнегреческом языке слово kēlē (лат. cele) имело значение «выбухание, выпячивание», «припухлость», «грыжа» и соответственно многозначным стал термин *гематоцеле*. Полисемию вносят в медицинскую терминологию и термины-омонимы, представляющие собой одинаково пишущиеся в русской транскрипции и одинаково произносимые, но разные по происхождению и значению слова древнегреческого языка. Так, омоним *атопия* происходит от греч. atopia (нечто необычайное, странное) и от греч. отрицательной приставки a- и слова topos (место, положение); омоним *ателия* происходит от греч. atelēs (неполный, незавершенный) и от греч. отрицательной приставки a- и thēlē (сосок); омоним *дерматом* — от греч. derma (кожа) и tomē (разрез, рассечение), а также от греч. derma (кожа) и tomos (отрезок, слой).

Термины, имеющие в своем составе какой-нибудь многозначный терминоэлемент, не обязательно являются многозначными, однако такой звуковой комплекс термина не позволяет надежно ориентироваться в его семантике. Терминоэлемент *-целе* привносит с собой разные значения, напр., в термины *гидроцеле* и *варикоцеле*. Терминоэлемент *онко-*, происходящий от греч. слова onkos, означавшего как «объем, масса», так и «вздутость», выступает в терминах *онкометрия* и *онкогенез* в разных значениях. Примерами подобной частичной многозначности могут также служить термины *гидр/аденит* (греч. hidrōs пот) и *гидро/фобия* (греч. hydōr вода), *мою/филия* (греч. phylon род, племя) и *гемо/филия* (греч. phileō любить, иметь склонность), *пневмо/пиелография* (греч. pneuma воздух) и *пневмо/плеврит* (греч. pneumōn легкое). В нек-рых случаях удается избежать омонимии благодаря варьированию транскрипции одного и того же терминоэлемента, напр. *нейрит* и *неврит*.

Особой формой проявления частичной многозначности являются случаи, когда один и тот же звуковой комплекс (слово или терминоэлемент) произведен от слова, входящего в обозначения разных анатомических образований. Так, *бульбарный* в составе одних терминов означает «относящийся к продолговатому мозгу» (bulbus medullae spinalis); напр. *бульбарный паралич*, а в составе других — «относящийся к глазному яблоку» (bulbus oculi), напр. *ретробульбарная анестезия*. Терминоэлемент *хориоид-* может относиться и к plexus chorioideus (сосудистое сплетение), напр. *хориоидкарцинома*, *хориоидпапиллома*, и к chorioidea (собственно сосудистая оболочка глаза), напр. *хориоидит*.

Одной из наиболее труднорешаемых проблем упорядочения медицинской терминологии является проблема синонимии. Синонимами в терминологии называют слова и словосочетания, к-рые, различаясь своим звуковым составом, выражают в рамках определенной микротерминосистемы тождественное научное понятие.

Почти все области терминологии клинической медицины изобилуют синонимами, причем в нек-рых дисциплинах их количество достигает 25—40% всего терминологического фонда. Число синонимов, выражающих нек-рые понятия, достигает 25 и более. Особенно велико число синонимов среди терминов, обозначающих болезни и синдромы.

С семантической точки зрения термины-синонимы в зависимости от тождества или различия мотивирующих признаков делятся на два типа: эквивалентные и интерпретационные. К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах к-рых отображен один и тот же мотивирующий признак, зафиксированный разными корневыми или словообразовательными элементами с одним и тем же или близкими значениями. В звуковых комплексах синонимов второго типа отображены разные мотивирующие признаки.

Среди медицинских терминов-синонимов эквивалентного типа подавляющее большинство составляют межъязыковые термины-дублеты, т. е. слова или словосочетания разноязычного происхождения, корневые или словообразовательные элементы к-рых имеют тождественное значение. Наиболее характерны пары дублетов, состоящие из интернационализма греко-латинского происхождения и его русского эквивалента. Весьма часто этот эквивалент представляет собой словообразовательную кальку, напр.: *абдукция — отведение, инкогерентность — бессвязность, гемопоэз — кроветворение, инсуффляция — вдувание, лапаротомия — чревосечение, неоплазма — новообразование, оссификация — окостенение, педикулез — вшивость, перфорация—прободение, пруриго — почесуха, эпигастрий — надчревье.* Среди подобных дублетов велик удельный вес калькированных прилагательных: *пилоидная — волосовидная* (астроцитома), *ретрокардиальное — позадисердечное* (пространство), *ретрофарингеальный — заглоточный* (абсцесс), *кардиопульмональная — сердечно-легочная* (недостаточность) и др. Русский эквивалент в серии дублетов может быть представлен не одним словом, а словосочетанием, исконным, калькированным и полукалькированным; напр.: *анус — задний проход, архэнтерон — первичная кишка, аэроэмболия — воздушная эмболия, гемотрансфузия — переливание крови, копростаз — каловый стаз, нейрорафия — шов нерва, спланхноптоз — опущение внутренностей, ишурия — задержка мочи, хориоидкарцинома — рак сосудистого сплетения.* Значительно реже встречаются пары дублетов, состоящие из западноевропейского заимствования и русской кальки, напр.: *деманд-кардиостимулятор — ждущий электрокардиостимулятор, демпинг-синдром — синдром сбрасывания, рейтеры — всадники.* Для медицинской терминологии характерны также дублеты, различающиеся только своими начальными частями — дублетными терминоэлементами греческого и латинского происхождения; напр.: *ангио/графия* и *вазо/графия, галакто/терапия* и *лакто/терапия, гистеро/графия* и *метро/графия, вагино/графия* и *кольпо/графия, маммо/графия* и *масто/графия, спланхно/птоз* и *висцеро/птоз, проктo/скопия* и *ректо/скопия, супрарен/эктомия* и *эпинефр/эктомия.*

Значительно реже среди синонимов эквивалентного типа встречаются одноязычные, русские, наименования. Один и тот же мотивирующий признак представлен в их звуковых комплексах разнокоренными словами или разными словообразовательными элементами, имеющими или тождественное, или очень близкое, сходное значение в общеупотребительном языке, напр.: *брюшная полость — полость живота, желточный пузырь — желточный мешок, желчеобразование — желчеотделение, затемнение сознания — помрачение сознания, заячья губа — расщелина губы, зев матки — отверстие матки, седалищная область — ягодичная область.*

Распространенность синонимов эквивалентного типа с преобладанием его дублетной разновидности (греко-латинский интернационализм — русский эквивалент) объясняется в основном чисто языковыми причинами. Внедрение заимствованных слов в медицинскую терминологию сопровождалось в прошлом и нередко сопровождается теперь нахождением или созданием их русских эквивалентов. Как правило, особенно на первых порах, после включения заимствования во врачебный лексикон продолжают сосуществовать оба члена серии синонимов, не вытесняя друг друга.

При упорядочении медицинской терминологии возникает необходимость определить предпочтительно употребляемый термин из серии синонимов эквивалентного типа, для чего приняты следующие критерии: а) традиционность употребления; б) краткость; в) терминологичность, т. е. точность, отсутствие вторичных, дополнительных значений; г) возможность образования производных терминов; д) наличие в данной микротерминосистеме других однокоренных образований аналогичной словообразовательной структуры. В процессе подготовки русского перевода анатомической номенклатуры, эквивалентного международному кодексу на латинском языке, при общей установке на максимальное использование отечественных слов и словообразовательных элементов, в ряде случаев было оказано предпочтение интернационализмам: *гипофиз* (а не *мозговой придаток, придаток мозга*), *таламус* (а не *зрительный бугор*), *гипоталамус* (а не *подбугорье*). Эти термины и производные от них (таламический, гипоталамический, гипофизарный) имеют широкое применение в теоретической и клинической медицине, особенно в неврологии и в нейрохирургии. Включен в русскую номенклатуру и грецизм *гиппокамп*, а не полукалькированное словосочетание *морской конек.* Отдано предпочтение транскрибированным латинизмам и грецизмам *апертура* (а не *отверстие*) и *ганглий* (а не *нервный узел*), что объясняется их большей терминологичностью, определенностью, позволяющей отграничить их от других анатомических образований, обозначаемых словами *отверстие* и *узел.* В целях предупреждения неточного осмысления предпочтен транскрибированный латинизм «эмиссарный» (*эмиссарные вены*, а не *выпускниковые вены*). Подтверждено явное преимущество термина *перикард* перед русским эквивалентом *околосердечная сумка* не только в силу его краткости и возможности образования от него производных (*перикардиальный*, а не околосердечносумочный, *перикардиотомия* и др.), но и благодаря системности его структуры, т. е. наличию однокоренных терминов *эндокард* и *миокард.*

В микротерминосистемах клинических дисциплин предпочтение интернационализмам перед русскими терминами отдается весьма часто. Так, термину *водянка глаза* предпочтен термин *гидрофтальм*; термин *гидроцеле* предпочтен, возможно, более точному, но длинному словосочетанию *водянка оболочек яичка*, а термин *варикоцеле* — словосочетанию *варикозное расширение вен семенного канатика.* В тех случаях, когда применение вышеуказанных критериев свидетельствует в пользу русского эквивалента, он, несомненно, должен быть предпочтен, но решать этот вопрос с чисто пуристических позиций предпочтения слов одноязычного, чаще отечественного происхождения, не следует. Все пуристические попытки сплошной замены интернационализмов словами родного языка оканчивались, как правило, неудачей.

Вышеуказанные критерии необходимо учитывать не только при выборе предпочтительного термина из синонимов эквивалентного типа, но и при оценке попыток внедрения в медицинский лексикон заимствованных неологизмов.

Особую разновидность синонимии эквивалентного типа образуют полные и краткие варианты одного и того же звукового комплекса, имеющие тождественное значение. Укороченные варианты термина образуют различными способами, напр. путем создания сложносокращенного слова из отдельных компонентов, входящих в состав словосочетания (адренергические рецепторы — *адренорецепторы*, вегетативный невроз — *вегетоневроз*, дуоденальный стаз — *дуоденостаз*, ревматический кардит — *ревмокардит* и др.), образованием существительного из прилагательного, входящего в состав словосочетания (анапептические средства — *анапептики*, антисептические средства — *антисептики*), созданием аббревиатур — сокращений, состоящих из начальных звуков и (или) букв слов, входящих в словосочетание (*аппарат искусственного кровообращения — АИК, адрено-кортикотропный гормон — АКТГ, дезоксирибонуклеиновая кислота — ДНК, острое респираторное заболевание — ОРЗ*), путем пропуска одного из компонентов сложного слова (*адено/тонзилло/синусо/пневмо/патия — адено/пневмо/патия, лейко/цито/лиз — лейко/лиз, окси/гено/метр — окси/метр, поли/рибо/сома — поли/сома, тромбо/цито/пения — тромбо/пения*). Вариантность одного и того же звукового комплекса может возникнуть из-за перестановки компонентов (напр., *гепато/радио/графия → радио/гепато/графия*). Синонимы эквивалентного типа не вызывают особых затруднений при упорядочении медицинской терминологии, поскольку они не несут семантических различий, к-рые давали бы повод сомневаться в тождественности выражаемого ими понятия. Однако ограничение роста таких синонимов, в том числе неоправданной дублетности, должно оставаться заботой терминологов, редакторов словарей, учебников и справочников.

Гораздо более осторожного к себе отношения требуют синонимы интерпретационного типа. Их большой удельный вес в медицинской терминологии, напр., в нозологии, обусловлен прежде всего и в основном внеязыковыми причинами — особенностями развития медицинской науки и практики. Во-первых, существует принципиальная возможность выделения у одного и того же объекта разных отличительных признаков, что и проявляется использованием при терминировании различных мотивирующих признаков. Для обозначения одной и той же болезни могут применяться как устаревшие, так и современные научные названия; напр., *голодный отек* и *алиментарная дистрофия, заеда* и *ангулярный хейлит, свинка* и *эпидемический паротит.* Во-вторых, один и тот же объект (симп-

ном, синдром, болезнь, патологический процесс, патоморфологический субстрат, метод диагностики, способ лечения, хирургическая операция, возбудитель инфекции и т. д.) может быть открыт или описан и соответственно по-разному назван различными специалистами в одной стране или специалистами разных стран, или в разное время, или одновременно, но независимо друг от друга. Если при этом в мышлении специалистов сложилось сходное научное понятие, то созданные ими наименования являются синонимами интерпретационного типа. Так, для обозначения болезни неясной этиологии, характеризующейся периодически возникающими явлениями поражения серозных оболочек, были предложены различные наименования, каждое из к-рых фиксирует тот или иной отличительный признак: *возвратный полисерозит, периодическая болезнь, периодический перитонит, семейный рецидивирующий полисерозит, шестидневная лихорадка* и др. В-третьих, в связи с более глубоким, более всесторонним познанием объекта происходит обогащение сложившегося о нем понятия. В мышлении специалиста отражаются иные существенные отличительные признаки понятия. На этой основе возникает необходимость выразить обогащенное понятие новым звуковым комплексом, в к-ром был бы представлен более точно ориентирующий признак; напр., *ангиогемофилия — геморрагическая капилляропатия — конституциональная тромбоцитопатия*. В-четвертых, интерпретационные синонимы могут возникать при появлении новой классификации группы понятий: напр., *болезнь Боткина — гепатит А — инфекционный гепатит*; *моноцитарная ангина — инфекционный мононуклеоз*. В-пятых, интерпретационная синонимия может быть результатом установления тождества болезни, обозначавшейся ранее разными наименованиями; напр., *болезнь Спенсера, ганноверская болезнь, зимняя рвотная болезнь, кишечный грипп* ныне считаются одной и той же болезнью, чаще именуемой *вирусная диарея*.

При упорядочении медицинской терминологии в связи с синонимами интерпретационного типа приходится решать две серьезные задачи. Во-первых, необходимо убедиться в том, что данные термины действительно являются синонимами, а не выражают разные понятия. Единственным основанием для такого решения служит научное определение или четкое описание. Их отсутствие не позволяет достоверно установить, выражает ли термин понятие в целом или лишь какие-то отдельные его признаки. Во-вторых, из числа синонимов необходимо выбрать наиболее адекватный и точный. Решение обеих задач представляет значительные трудности, связанные с наличием разных точек зрения, сторонников и противников того или иного синонима. Выбор наиболее предпочтительного термина должен проводиться путем всестороннего обсуждения проблемы компетентными коллективами ученых. В последнее время из синонимов, обозначающих аллергическую болезнь, характеризующуюся системным васкулитом и точечными кровоизлияниями, предпочтительным признан термин *геморрагический васкулит*, а остальные (*пурпура анафилактическая, геморрагическая пурпура Геноха, капилляротоксикоз*) употребляются все реже. Предпочитается термин *ахалазия пищевода*, а не врожденный *кардиоспазм*, поскольку последний термин неверно ориентирует: при данном состоянии спазма как такового не наблюдается. Термин *ревматоидный артрит* считается наиболее удачным для обозначения инфекционно-аллергической болезни, похожей на ревматизм; его синонимы (*деформирующий прогрессирующий артрит, инфектартрит, неспецифический инфекционный артрит, неспецифический инфекционный полиартрит, первичный хронический полиартрит* и др.) являются менее точными, а возможно, и неправильно ориентирующими.

Традиционность употребления терминов, наличие в науке различных точек зрения, взаимообмен информацией на разных языках, связанный нередко со специфическими национальными микротерминосистемами, наконец, недостаточность планомерных систематических усилий по ограничению роста синонимов — все это вместе взятое служит питательной почвой для возникновения множества интерпретационных синонимов.

Неупорядочечность медицинской терминологии, как в русском, так и в других языках, продолжает оставаться серьезным препятствием при обмене научной информацией, при ее машинной обработке, создает большие затруднения при адекватном научном переводе медицинской литературы.

Упорядочение и нормализация русской медицинской терминологии крайне необходимы, и в этой работе, кроме специалистов различного медицинского профиля, должны активно участвовать филологи.

СЛОВАРЬ ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ

(этимологический справочник)

1. «Словарь греко-латинских терминоэлементов» призван помочь врачу или студенту медицинского учебного заведения лучше разобраться в структуре многих терминов, заимствованных из греческого и латинского языков или созданных на их основе.

2. Заголовок каждой статьи словаря представляет собой перечисление начальных, срединных и конечных терминоэлементов, связанных общим происхождением, напр.: ОПТИКО-, -ОПТО-, -ОПИЯ, -ОПСИЯ, -ОПТИКА. При этом модификации терминоэлементов даются в сокращенном виде. Основа, являющаяся для них общей, приводится один раз, напр. терминоэлементы ген-, гено-, -ген, -генез, -генезия — в виде ГЕН(О)-, -ГЕН(ЕЗ, ЕЗИЯ).

3. Статьи словаря расположены в порядке русского алфавита по первому терминоэлементу группы. Для терминоэлементов, место которых по алфавиту отделено от места первого терминоэлемента группы другими статьями, даны ссылки, напр.:ГЛЮК(О) — см. *Глик-*, КЕФАЛ(О)- — см. *Цефал-*.

4. Каждая статья содержит сведения об этимологии (происхождении) терминоэлементов, а также об их значении в составе медицинских терминов. Срединные и конечные терминоэлементы снабжены примерами из числа терминов, представленных в «Энциклопедическом словаре медицинских терминов». Примеры к начальным терминоэлементам не приведены, поскольку простота их нахождения в тексте ЭСМТ обеспечена алфавитным расположением терминов.

5. Терминоэлементы-синонимы снабжены взаимными ссылками с пометой «см. также», напр.: МИЕЛ(О)-... см. также *Медулл-*; МЕДУЛЛ(О)-... см. также *Миел-*. Терминоэлементы, имеющие противоположное значение, снабжены взаимными ссылками с пометой «противопол.», напр.: ИНФРА-... противопол. *Супра-*; СУПРА-... противопол. *Инфра-*.

6. Терминоэлементы, транскрибируемые по-русски одинаково, но происходящие от разных слов и имеющие различное значение, представлены отдельными статьями, в заголовках которых они обозначены порядковыми цифровыми индексами, напр.: ГИДРО-[1] (греч. hidrōs пот)...; ГИДРО-[2] (греч. hydōr вода)...

7. Если терминоэлемент и его модификации применяются в разных значениях, то в тексте статьи эти значения пронумерованы, а примеры и ссылки расположены соответственно значению. Напр., «ПАТ(О)-, -ПАТИЯ...—1) относящийся к патологическому состоянию, к болезни; напр. психопатия; см. также *Нозо-*; 2) относящийся к чувствительности; напр. гиперпатия». Ссылки на такие статьи даны с указанием номера значения в скобках, напр., НОЗО-, -НОЗ...; см. также *Пат-(1)*. Следует иметь в виду, что каждый из группы терминоэлементов общего происхождения может применяться лишь в одном значении и реже в двух или нескольких приведенных значениях. Напр., терминоэлементы ПАТ- и ПАТО- применяются гл. обр. в значении «1)», а терминоэлемент -ПАТИЯ применяют в обоих значениях.

А- [1], перед гласными **АН-** (греч. отрицательная приставка a-, an-) — отсутствие, недостаточность или отрицание признака, выраженного во 2-й части слова; соответствует русским приставкам «без-» и «не-»; см. также *Ин-(2)*.

А- [2] — см. *Аб-*.

АБ- (лат. предлог и приставка ab), перед согласными «т», «ц». **АБС-** (abs), перед нек-рыми другими согласными **А-** (a) — удаление, отклонение; см. также *Апо-(1)*; противопол. Ад-.

АБДОМИН(О)- (лат. abdomen, abdominis живот) — относящийся к животу, к брюшной полости; см. также *Вентро-*, *Лапаро-*, *Целио-(2)*.

АБС- — см. *Аб-*.

АВТО- (греч. autos сам) — автоматический, автономный, автомобильный; см. также *Аутo-*.

АГ- — см. *Ад-*.

-АГОГ- (греч. agō вести; вызывать, производить; agōgos ведущий, приводящий, вызывающий) — ведущий, вызывающий что-либо, производящий; напр., психагогика.

АД- (лат. предлог и приставка ad), перед согласными г, к, п, р, с, т, ф и некрыми другими изменяется соответственно в **АГ-, АК-, АП-, АР-, АС-, АТ-, АФ-** и др.— направленность, близость, приближение, дополнительность, присоединение; соответствует русской приставке «при-»; противопол. *Аб-*.

АДАМАНТ(О)- (греч. adamas, adamantos очень твердый металл) — относящийся к эмали зуба.

АДЕН(О)- (греч. adēn, adenos железа) — 1) относящийся к железам, к железистой ткани; 2) относящийся к лимфатическим узлам; 3) относящийся к аденоидам.

АДИП(О)- (лат. adeps, adipis жир) — относящийся к жиру, жировой; см. также *Лип-*, *Себо-(1)*, *Стеат-*.

АДРЕН(О, АЛ)- (лат. adrenalis надпочечный, от ad- при + ren почка)— 1) относящийся к надпочечнику; 2) относящийся к адреналину.

АК- — см. *Ад-*.

АКАНТ(О)- (греч. akantha шип, острие, колючка, ость) — 1) характеризующийся наличием острия, шипа; 2) относящийся к шиповатому слою эпидермиса.

АКАРИ-, АКАРО- (греч. akari, лат. acarus клещ) — относящийся к клещу, клещевой.

АКР(О)- (греч. akros крайний, самый отдаленный, высокий; akron самая дальняя или самая высокая точка, верхушка, конец, край)— 1) относящийся к дистальным отделам частей тела; см.

также *Мел-*; 2) относящийся к верхушке, верхний.

АКСЕЛЕРО- — см. *Акцелеро-*.

АКСО- (греч. axōn, лат. axis ось) — относящийся к аксону.

АКТИНО- (греч. aktis, aktinos луч) — 1) относящийся к излучению, к лучистой энергии; 2) относящийся к актиномицетам.

АКУ- [1], **-АКУЗИЯ** (греч. akuō слышать, akusis слух) — относящийся к слуху; напр., гиперакузия; см. также *Ауди-*.

АКУ- [2] (лат. acus игла) — относящийся к игле.

АКЦЕЛЕРО-, АКСЕЛЕРО- (лат. accelero, acceleratum ускорять, от ad- при + celero делать что-либо быстро) — ускорение; обусловленный ускорением.

АЛГЕЗИ-, АЛЬГО-, -АЛГЕЗИЯ, -АЛГИЯ (греч. algēsis ощущение боли, боль; algos боль) — боль; напр.: гипералгезия, гастралгия; см. также *-Одиния*.

АЛЛ(О)- (греч. allos другой, иной) — 1) другой, иной, отличный, измененный; 2) происходящий от другого животного того же вида.

АЛЛЕЛ(О)- (греч. allēlōn друг друга, между собой, взаимно) — взаимно.

АЛЬБ- (лат. albus белый) — белого цвета; см. также *Лейк-(1)*.

АЛЬГО- — см. *Алгези-*.

АМБИ-, АМБО- (лат. приставка ambi- вокруг, с обеих сторон; ambo оба) — обоюдность, одновременное наличие двух различных, противоположных свойств, действий, объектов; см. также *Амф-*.

АМБЛИ(О)- (греч. amblys тупой, слабый, ослабленный) — притупление, ослабление.

АМБО- — см. *Амби-*.

АМИГДАЛ(О)- (лат. amygdala миндаль, миндалина, от греч. amygdalē миндаль) — 1) относящийся к миндалевидному телу; 2) относящийся к миндалине; 3) относящийся к миндалю.

АМИЛ(О)- (греч. amylon, лат. amylum крахмал) — относящийся к крахмалу.

АМНИО- [греч. amnion жертвенная чаша (овечья шкура, мешок, в к-рый собиралась кровь жертвенных животных); оболочка, окружающая плод] — относящийся к амниону.

АМФ(И, О)- (греч. наречие, предлог и приставка amphi, amphō оба) — вокруг, с обеих сторон, двойственный, и тот и другой, одновременное наличие двух противоположных свойств, действий, объектов; см. также *Амби-*.

АН- — см. *А* [-1].

АНА- (греч. наречие, предлог и приставка ana) — 1) движение вверх; противопол. *Ката-(1)*; 2) обратное, противоположное действие, свойство, возвратное действие; соответствует русским словам «вновь», «опять», «назад».

АНГИ(О)- (греч. angeion сосуд) — относящийся к сосудам (преимущественно кровеносным), сосудистый; см. также *Вазо-(1)*, *Васкул-*.

АНДРО-, -АНДР-, -АНДРИЯ (греч. anēr, andros мужчина, человек) — относящийся к мужчине, мужской; напр.: голандрический ген, гинандрия; см. также *Аррено-*, *Маскулин-*.

АНЕМО- (греч. anemos ветер, дуновение) — относящийся к движению воздуха, к ветру.

АНИЗ(О)- (греч. anisos неравный, от an- не + isos равный) — отсутствие равенства, соразмерности, симметрии; противопол. *Изо-*.

АНИМ-, -АНИМ- (лат. anima дыхание, душа, жизнь; animatus одушевленный) — 1) относящийся к жизни, к жизненным функциям; напр., реанимация; 2) одушевленность.

АНКИЛ(О)- (греч. ankylos кривой, изогнутый) — тугоподвижность или сращение частей.

АНО- (лат. anus задний проход) — относящийся к заднему проходу; см. также *Прокт-*.

АНТ(И)- (греч. приставка anti-) — против; противоположное положение, состояние, действие, свойство; соответствует русской приставке «противо-»; см. также *Контр-*.

АНТЕ- (лат. наречие, предлог и приставка ante) — находящийся перед чем-либо, спереди, прежде, раньше; см. также *Пре-*, *Про-*; противопол. *Пост-*.

АНТР(О, УМ)- (лат. antrum, от греч. antron пещера, полость тела) — относящийся к полости, к пещере, к пазухе.

АНТРАК(О)- [греч. anthrax, anthrakos уголь, драгоценный камень темно-красного цвета (карбункул), злокачественная пустула (карбункул); мед. лат. anthrax сибирская язва] — 1) относящийся к углю; см. также *Карб-(1)*; 2) относящийся к сибирской язве.

АНТРО- — см. *Антр-*.

АНТРОПО- (греч. anthrōpos человек) — относящийся к человеку, человеческий; см. также *Гоми-*.

АНТРУМ- — см. *Антр-*.

АП- — см. *Ад-*.

АПИ- (греч. apis пчела) — относящийся к пчеле.

АПИК(О)- (лат. apex, apicis вершина, верхушка) — относящийся к верхушке органа, части тела.

АПО- (греч. предлог и приставка apo), перед гласными **АП-**, иногда **АФ-** (греч. aph-) — 1) отделение, удаление; см. также *Аб-*; 2) прекращение действия; 3) завершенность, усиление действия.

АР- — см. *Ад-*.

АРАХНО- (греч. arachnē паук, паутина; arachnos паук) — относящийся к паукам, напоминающий паука.

АРАХНОИД- (анат. arachnoidea паутинная оболочка мозга, от греч. arachnoidēs паутиноподобный, от arachnē паук, паутина + -eidēs похожий, подобный) — относящийся к паутинной мозговой оболочке.

АРГЕНТ(О)- (лат. argentum серебро) — относящийся к серебру; см. также *Аргир(о)-*.

АРГИР(О)- (греч. argyros серебро) — относящийся к серебру; см. также *Аргент-*.

АРРЕНО- (греч. arrhēn мужчина, мужской) — мужской, мужского пола; см. также *Андро-*, *Маскулин-*.

АРСЕН(О)- (лат. arsenicum, от греч. arsenikon мышьяк) — относящийся к мышьяку.

АРТР(О)- (греч. arthron сустав, член) — относящийся к суставу.

-АРТРИЯ (греч. arthrō членораздельно произносить) — относящийся к членораздельной речи; напр., дизартрия; см. также *Лало-*, *Лог-(1)*, *Фазия*, *-Фем-*, *-Фразия*.

АРХ(Е, И)-, -АРХЕ (греч. archē начало, первопричина; главенство; archō быть первым, главенствовать; archaios древний, изначальный; archi- или arch- неотделяемая приставка с теми же значениями) — первый, первоначальный, главный, относящийся к предшествующей форме, стадии; напр., менархе; см. также *Палео-*; противопол. *Нео-*.

АС- — см. *Ад-*.

АСТЕН(О)-, -АСТЕНИЯ (греч. asthenēs слабый, от a- отсутствие, отрицание + sthenos сила; astheneia бессилие) — ослабление, слабость, астения; напр. неврастения.

АСТРО-, -АСТЕР (греч. astron и греч. astēr, лат. astrum звезда) — 1) относящийся к звезде, к звездам, звездчатый; напр., диастер; 2) относящийся к астроцитам.

АТ- — см. *Ад-*.

АТЕЛ(О)- (греч. atelēs неполный, незавершенный, от a- отсутствие, отрицание + telos конец, завершение) — характеризующийся незавершенностью, недоразвитием.

АТЕРО- (греч. athērē жидкая каша, кашица) — относящийся к отложению жира или жироподобных веществ.

АТРИО- (лат. atrium атрий — передний зал в древнеримском доме; анат. atrium предсердие) — относящийся к предсердию.

АУДИ(О)- (лат. audio слышать) — относящийся к слуху, к способности слышать; см. также *Аку-* [1].

АУРИКУЛО- (лат. auricula ушко, ушная раковина; уменьшительное от auris ухо) — относящийся к уху, к ушной раковине.

АУРО- [1] (лат. aurum золото) — относящийся к золоту.

АУРО- [2] (лат. auris ухо) — относящийся к уху; напр. ауропальпебральный рефлекс; см. также *От-*.

АУТ(О)- (греч. autos сам) — сам, тот же самый, свой, собственный; см. также *Авто-*.

АФ- — см. *Ад-*.

-АФЕРЕЗ (греч. aphaireō отнимать, отбирать; aphairesis отнятие) — взятие, извлечение; напр., лейкаферез; см. также *Ферез*.

-АФФИН- (лат. affinis родственный, сродный, свойственный) — обладающий сродством (химическим, физико-химическим и др.), напр., аргентаффинность.

АХИЛЛ(О)- (греч. Achilleus, лат. Achilles, Ахилл, Ахиллес — мифический герой Троянской войны, у к-рого уязвимой была только пятка; анат. tendo Achillos ахиллово сухожилие) — относящийся к пяточному (ахиллову) сухожилию.

АЦИД(О)-, -АЦИД- (лат. acidus кислый, acidum кислота) — относящийся к кислоте, к кислотности, кислый; напр., гиперацидный; см. также *Окси-* [1](2).

АЭРО- (греч. aēr, aēros, лат. aër, aëris воздух) — относящийся к воздуху, воздушный; см. также *Пневм-(1)*.

БАЗ(И, ИО, О)-, -БАЗИЯ (греч. basis предмет, на к-ром может что-либо стоять, основа, основание; шаг, ходьба; анат. basis cranii основание черепа) — 1) основа, основание, основной; 2) относящийся к химическим основаниям, к щелочной реакции среды; 3) относящийся к ходьбе; напр., абазия; 4) относящийся к основанию черепа; напр., платибазия.

БАЛАН(О)- (греч. balanos желудь; головка полового члена) — относящийся к головке полового члена.

БАЛЛИСТ(О)-, БОЛО-, -БОЛ (лат. ballista метательное орудие, метательный снаряд, от греч. ballō бросать, метать; греч. bolē или bolos бросание, метание) — 1) относящийся к снарядам;

2) характеризующийся толчкообразным перемещением; напр., эмбол.; 3) относящийся к обмену веществ; напр., метаболизм.

БАЛЬНЕО- (лат. balneum купание, ванна) — относящийся к минеральным водам и лечебным грязям.

БАРИ-, БАРО- (греч. barys тяжелый, baros тяжесть, вес) — 1) характеризующийся затруднением, отягощением какой-либо функции; 2) относящийся к весу, к давлению, чаще к атмосферному давлению.

БАТИ-, БАТО- (греч. bathys глубокий, bathos глубина) — глубокий, глубина.

БИ- (лат. bis и приставка bi- дважды) — два, дважды, двойной; соответствует русскому компоненту сложных слов «дву-»; см. также *Ди-* [1].

БИЛИ(О)- (лат. bilis желчь) — относящийся к желчи, желчный; см. также *Хол-*.

БИО-, -БИОЗ, -БИОНТ (греч. bios и biōsis существование, жизнь; biōn, biontos живущий, от bioō жить) — относящийся к жизни, к жизненным процессам; напр.: анабиоз, парабионты.

БЛАСТО-, -БЛАСТ (греч. blastos отросток, зачаток, зародыш) — относящийся к эмбриональной клетке, к зародышевому слою, к зачатку; напр., ангиобласт.

БЛЕННО- (греч. blennos или blenna слизистые выделения; слизь) — 1) слизистый; 2) относящийся к слизистым оболочкам, гл. обр. к их отделяемому.

БЛЕФАР(О)-, -БЛЕФАРИЯ (греч. blepharon веко) — относящийся к веку; напр., аблефария.

-БОЛ-, БОЛО- — см. *Баллист-*.

БРАДИ- (греч. bradys медленный) — медленный; противопол. *Такси-*.

БРАНХИО- (греч. branchia жабры) — относящийся к жабрам, к жаберным дугам и жаберным щелям зародыша.

БРАХИ- [1], -БРАХИЯ (греч. brachiōn плечо; рука, верхняя конечность; анат. brachium плечо) — относящийся к плечу; напр., абрахия; см. также *Ом-*.

БРАХИ- [2] (греч. brachys короткий) — короткий, укорочение; противопол. *Долихо-*.

-БУЛИЯ (греч. bulē воля) — относящийся к проявлению воли; напр., дисбулия.

БУЛЬБ(О)-, -БУЛЬБИЯ (лат. bulbus от греч. bolbos луковица) — 1) относящийся к анатомической структуре или органу, похожим на луковицу; напр., ретробульбарный неврит (анат. bulbus oculi глазное яблоко); 2) относящийся к продолговатому мозгу (анат. устар. bulbus medullae spinalis); напр., сирингобульбия.

БУРС(О)- (новолат. bursa кошелек, сумка, от греч. byrsa снятая кожа, шкура; анат. bursa synovialis синовиальная сумка) — относящийся к синовиальной сумке.

ВАГИН(О)- (лат. vagina ножны, футляр, оболочка; влагалище) — относящийся к влагалищу; см. также *Кольп-*.

ВАГО-, ВАГУС- (лат. vagus бродячий, блуждающий; анат. nervus vagus блуждающий нерв) — относящийся к блуждающему нерву.

ВАЗО- (лат. vas, vasis сосуд) — 1) относящийся к кровеносным сосудам; см. также *Анги-*, *Васкул-*; 2) относящийся к семявыносящему протоку (анат. устар. vas deferens).

ВАЛЕНТ-, -ВАЛЕНТ, -ВАЛИД (лат. valeo быть сильным, быть здоровым, значить; valens, valentis сильный, действенный, значительный; validus сильный) — обладающий силой, значимый, действенный; напр.: бивалент, инвалид.

ВАЛЬВУЛ(О)- (лат. valvula уменьшительное от valva створка двери, клапан; анат. valvula клапан, заслонка) — относящийся к клапанам (преимущественно сердца).

ВАСКУЛ- (лат. vasculum уменьшительное от vas сосуд; анат. vascularis сосудистый) — относящийся к сосудам; см. также *Анги-*, *Вазо-(1)*.

ВЕГЕТ(О)- (лат. vegeto возбуждать, оживлять, усиливать, расти, произрастать; vegetativus растительный) — 1) относящийся к вегетативной нервной системе; 2) характеризующийся ростом, разрастанием; 3) относящийся к растениям.

ВЕЗИК(О)- (лат. vesica пузырь; анат. vesica urinaria мочевой пузырь) — относящийся к мочевому пузырю; см. также *Цист-(2)*.

ВЕЗИКУЛ(О)- (лат. vesicula уменьшительное от vesica пузырь) — 1) относящийся к пузырьку, везикуле; 2) относящийся к семенному пузырьку (анат. vesicula seminalis).

ВЕНТРИКУЛ(О)- (лат. ventriculus брюшко, желудок, уменьшительное от venter живот; анат. ventriculus желудочек) — относящийся к желудочку головного мозга или сердца.

ВЕНТРО- (лат. venter живот) — относящийся к животу, к брюшной стенке; см. также *Абдомин-*, *Лапаро-*, *Целио-*.

-ВЕРГЕНЦИЯ (лат. vergo быть направленным, клониться) — наклон, направленность; напр., конвергенция.

-ВЕРСИЯ, -ВЕРТ- (лат. verto, versum вращать, вертеть, поворачивать) — поворот, вращение, обращение в какую-либо сторону; напр.: ретроверсия, интровертированность; см. также *Торсион-*.

ВЕСТИБУЛ(О)- (лат. vestibulum площадка перед входом в древнеримский дом, преддверие; анат. преддверие) — 1) относящийся к преддверию (влагалища, полости носа и др.); 2) относящийся к вестибулярному анализатору.

ВИБРО- (лат. vibro качать, колебать, дрожать, извиваться) — колебание, вибрация.

ВИВ (И, О)- (лат. vivus живой) — живой, относящийся к живому организму.

ВИЗУ-, -ВИЗОР (лат. visus зрение, video, visum видеть) — относящийся к зрению; напр., тепловизор.

ВИР(О)- (лат. virus яд) — относящийся к вирусам, вирусный, ядовитый.

ВИСЦЕР(О)- (лат. viscus, visceris обычно во множественном числе viscera внутренности)—относящийся к внутренним органам; см. также *Спланхн-(1)*.

ВИТ(А)- (лат. vita жизнь, vitalis жизненный) — относящийся к жизни, жизненно важный.

ВУЛЬВ(О)- (лат. vulva оболочка, матка; анат. vulva вульва) — относящийся к наружным женским половым органам, к вульве; см. также *Эпизио-*.

ГАЛАКТ(О)- (греч. gala, galaktos молоко) — молоко, молочный; см. также *Лакт- (1)*.

ГАМО-, -ГАМИЯ (греч. gamos брак, gameō вступать в брак) — соединение клеток или особей различных полов, брак; напр., полигамия.

ГАПЛ(О)- (греч. haploos простой, одиночный) — 1) простой; 2) одиночный, гаплоидный; противопол. *Дипл-*.

ГАПТО- (греч. haptō захватывать, схватывать, прикасаться; haptos осязаемый) — прикрепление, прикосновение.

ГАСТР(О)-, -ГАСТРИЯ (греч. gastēr, gasteros или gastros желудок, живот) — относящийся к желудку; напр., агастрия.

ГЕБ(Е, О)- (греч. hebē зрелость, возмужание; признаки половой зрелости — волосы на лобке; лобок; юношеский возраст, юность) — 1) относящийся к лобку, лобковой кости; 2) юность, юношеский.

-ГЕВЗИЯ (греч. geusis вкус) — вкусовое ощущение; напр., гипергевзия.

ГЕДОН(О)-, -ЕДОНИЯ (греч. hēdonē удовольствие, наслаждение) — чувство удовольствия, наслаждения; напр., гифедония.

-ГЕЗ-, -ГЕЗИЯ, -ГЕР- (лат. haero, haesum прилипать, быть связанным, скрепленным) — прилипание, сращение, связанность; напр.: адгезивность, адгезия, инкогерентность мышления.

ГЕЛИО- (греч. helios солнце) — относящийся к солнцу, солнечный.

ГЕМ(АТ, АТО, О)-, -ЕМИЯ (греч. hiama, haimatos кровь) — относящийся к крови, скопление крови, содержание чего-либо в крови; напр., бактериемия.

ГЕМИ- (греч. hēmi- половинный, односторонний; соответствует русскому «полу-»; см. также *Семи-*.

ГЕН(О)-, -ГЕН(ЕЗ, ЕЗИЯ), -ГЕНИЯ [1] (греч. genos род, рождение, потомство, пол; gennaō рождать, производить; gignomai рождаться, происходить; genesis происхождение, развитие; genea рождение, порождение, поколение; -genēs — суффикс со значением «порождающий», «порождаемый») — 1) относящийся к наследственности, к аппарату наследственности; см. также *Гередо-*; 2) относящийся к рождению, происхождению, развитию; порождающий, вызывающий, порождаемый, вызываемый чем-либо; напр.: гликоген, онкогенез, дисгенезия, экзогения; см. также *Гоно- (1)*.

ГЕНИТО- (лат. gigno, genui, genitum рождать, порождать; анат. organa genitalia половые органы) — относящийся к половым органам.

-ГЕНИЯ [1] — см. *Ген-*.

-ГЕНИЯ [2] (греч. geneion подбородок; genys, genyos челюсть, преимущественно нижняя) — относящийся к челюсти; напр., прогения; см. также *Гнато-*, *Максилл-*, *Мандибул-*.

-ГЕННЫЙ — см. *Ген-*.

ГЕНО- — см. *Ген-*.

ГЕО- (греч. gē земля) — относящийся к земле, к почве.

ГЕПАТ(О)- (греч. hēpar, hēpatos печень) — относящийся к печени.

ГЕПАТИКО- (греч. hēpatikos печеночный, анат. ductus hepaticus печеночный проток) — относящийся к печеночному протоку.

ГЕР(О, ОНТО)-, -ГЕРИЯ (греч. herōn, herontos старый человек, старик)— относящийся к старым людям, к старости, к старению, старческий; напр., прогерия; см. также *Пресби-*.

-ГЕР- — см. *Гез-*.

ГЕРЕДО- (лат. heres, heredis наследник; hereditas наследство, наследие) — относящийся к наследственности, наследственный; см. также *Ген-(1)*.

ГЕРМИН- (лат. germen, germinis росток, зародыш; germino, germinatum про-

израстать, производить на свет) — относящийся к зародышу, к оплодотворению.
ГЕРНИО- (лат. hernia грыжа) — относящийся к грыже; см. также *-Целе.*
ГЕРО- — см. *Гер-.*
ГЕРОНТО- — см. *Гер-.*
ГЕТЕР(О)- (греч. heteros другой, иной, разный) — другой, иной, непохожий; соответствует русскому «разно-»; см. также *Ксено-(1)*; противопол. *Гомо-.*
ГИАЛ(О)- (греч. hyalos стекло) — бесструктурная стекловидная масса.
ГИГАНТ(О)- (греч. gigas, gigantos великан, гигант) — огромный, гигантский.
ГИГР(О)- (греч. hygros влажный, жидкий) — влага, влажность, жидкость.
ГИДР(О)- [1], **-ГИДРОЗ** (греч. hidrōs пот) — относящийся к поту, к потоотделению; напр., гипергидроз.
ГИДР(О)- [2] (греч. компонент сложных слов hydro- от hydōr, hydatos вода, жидкость; лат. Hydrogenium водород) — 1) относящийся к воде, к жидкости; 2) скопление жидкого содержимого (в сочетании с наименованием части тела или болезни); 3) содержащий водород.
-ГИДРОЗ — см. *Гидр-* [1].
ГИМЕНО- (греч. hymēn кожица, пленка, перепонка) — 1) относящийся к девственной плеве; 2) пленкообразный.
ГИН(ЕКО)- (греч. gynē, gynaikos женщина) — относящийся к женщине, женский.
ГИНГИВ(О)- (лат. gingiva десна) — относящийся к деснам.
ГИНЕКО- — см. *Гин-.*
ГИП(О)- (греч. предлог и приставка hypo под, ниже), перед гласными в некрых случаях **ГИФ-** (hyph-) — 1) нахождение под чем-либо, ниже чего-либо; см. также *Инфра-, Суб-(1)*; противопол. *Супер-(1), Супра-, Эпи-*; 2) понижение, уменьшение чего-либо, недостаточность, слабая выраженность; см. также *Суб-(2)*; противопол. *Гипер-.*
ГИПЕР- (греч. предлог и приставка hyper, над, сверх) — 1) сверх, свыше; см. также *Супер-(2)*; 2) чрезмерное повышение, увеличение чего-либо; противопол. *Гип-.*
ГИПН(О)- (греч. hypnos сон; hypnoō усыплять) — 1) относящийся ко сну; см. также *Сомн-*; 2) относящийся к гипнозу.
ГИПО- — см. *Гип-.*
ГИР-, -ГИРИЯ (греч. gyros круг, круговой; кривой, извилистый; анат. gyrus извилина головного мозга) — относящийся к извилинам головного мозга; напр., пахигирия.
ГИСТ(ИО, О)- (греч. histos ткацкий навой — вал с навитой на него основой; ткань; histion уменьшительное от histos) — относящийся к ткани.
ГИСТЕР(О)- (греч. hystera матка) — относящийся к матке, маточный; см. также *Метр-* [1].
ГИСТИО- — см. *Гист-.*
ГИСТО- — см. *Гист-.*
ГИФ- — см. *Гип-.*
ГЛИК(О)-, ГЛЮК(О)- (греч. glykys сладкий) — сладкий, относящийся к сахару, к глюкозе.
ГЛИО- (греч. glia клей) — относящийся к нейроглии.
ГЛОБУЛ-, -ГЛОБУЛ-, -ГЛОБУС (лат. globus шар, уменьшительное globulus шарик) — 1) шаровидный; напр., кератоглобус; см. также *Сферо-*; 2) относящийся к форменным элементам крови; напр., полиглобулия.
ГЛОМЕРУЛ(О)- (glomerulum, уменьшительное от лат. glomus, glomeris клубок; гист. glomerulus corpusculi renalis клубочек почечного тельца) — относящийся к клубочку почечного тельца.
ГЛОСС(О)-, -ГЛОССИЯ (греч. glossa язык) — относящийся к языку; напр., макроглоссия.
ГЛЮК(О)- — см. *Глик-.*
ГЛУТ- — см. *Глют-.*
ГНАТО-, -ГНАТИЯ (греч. gnathos челюсть) — относящийся к челюсти; напр. микрогнатия; см. также *-Гения* [2], *Максил-.*
-ГНОЗ, -ГНОЗИЯ (греч. gignoskō будущее время gnosomai познавать, узнавать, замечать, знать; gnōsis познавание, знание) — относящийся к знанию, к способности узнавать, к науке; напр.: диагноз, агнозия, фармакогнозия.
ГНОТО-, -ГНОТО- (греч. gnotos указанный, известный, от gignoskō узнавать, замечать) — относящийся к животным, безмикробность или состав микрофлоры к-рых установлены; напр., моногнотофорное животное.
ГОЛ(О)- (греч. holos весь, целый) — весь, целиком, полный, полностью.
ГОМ (Е, ЕО, О)-, ОМЕО- (греч. homoios подобный, сходный; homos один и тот же, тот же самый, одинаковый) — сходство, одинаковость, однородность, тождество; напр., омеопаразиты; противопол. *Гетер-.*
ГОМИЛО- (греч. homilia общение, беседа) — относящийся к общению между людьми.
ГОМИ(Н)- (лат. homo, hominis человек) — относящийся к человеку, человеческий; см. также *Антропо-.*
ГОМО- — см. *Гом-.*
ГОН- (греч. gony колено) — относящийся к коленному суставу.
ГОНИО- (греч. gōnia угол) — 1) угол; 2) относящийся к радужно-роговичному углу глаза.
ГОНО-, -ГОНИЯ (греч. gonos род, рождение, зарождение, семя, сперма; gonē поколение, потомство) — 1) относящийся к рождению, к размножению, к полу, к сперме; напр., шизогония; см. также *Ген-(2)*; 2) относящийся к гонококку.
ГРАВИ- (лат. gravis тяжелый) — относящийся к силе тяжести, гравитация.
-ГРАММА (греч. gramma нечто написанное; буква, знак, запись, изображение, письмо; из graph + ma, от graphō чертить, царапать, изображать, писать) — запись, результат графической регистрации, изображение; напр., кардиограмма.
ГРАНУЛ(О)- (лат. granulum уменьшительное от granum зерно) — 1) зернистый; 2) относящийся к узелку; 3) относящийся к зернистому слою эпидермиса.
ГРАФО-, -ГРАФ(ИЯ) (греч. graphō чертить, царапать, изображать, писать) — относящийся к написанию, изображению, к графической регистрации; напр.: сфигмограф, дисграфия, пневмография.
-ГРИПОЗ (греч. grypos кривой, изогнутый, grypōsis искривление) — искривление; напр., артрогрипоз.
ДАКРИ(О)- (греч. dakryon слеза) — относящийся к слезам, слезный; см. также *Лакрим-.*
ДАКТИЛ(О)-, -ДАКТИЛИЯ (греч. daktylos палец) — относящийся к пальцам; напр., синдактилия.
ДЕ- (лат. предлог и приставка de), **ДЕЗ-, ДЕЗО-** (франц. dés- из новолат. des-) — 1) прекращение, удаление, устранение, избавление от чего-либо, отделение, отрицание или изменение понятия, выраженного последующей частью слова; соответствует русской приставке «обез-»; 2) движение вниз.
-ДЕЗ (греч. desis связывание, скрепление; deō, будущее время deso связывать, скреплять) — относящийся к фиксации, созданию неподвижности, укреплению органа; напр.: артродез, тенодез; см. также *-Синдез.*
ДЕЙТЕР-, ДЕЙТО- (греч. deuteros второй) — 1) второй, вторичный; 2) относящийся к восприятию зеленого цвета (второго из трех основных цветов).
ДЕКСТРО- (лат. dexter правый) — правосторонний; противопол. *Лево-, Синистро-.*
ДЕМО-, -ДЕМИЯ (греч. demos народ, население страны; область, страна; толпа) — относящийся к множеству людей, к населению; напр. эпидемия.
ДЕНДР(О)- (греч. dendron дерево) — 1) дерево; нечто ветвящееся, подобно дереву; 2) относящийся к дендриту.
ДЕНСИТО-, ДЕНСО- (лат. densus плотный; densitas плотность) — плотный, плотность.
ДЕНТ(И,О)-, -ДЕНТ- (лат. dens, dentis зуб) — относящийся к зубам, зубной; напр. макродентия; см. также *Одонт-.*
ДЕРМ(АТ,АТО,О)-, -ДЕРМА, ДЕРМИЯ (греч. derma, dermatos кожа) — относящийся к коже; напр.: энтодерма, склеродермия.
ДЕСМ(О)-, -ДЕСМА (греч. desmos связь, связка, соединение, скрепление, от deō, будущее время desō связывать, скреплять) — 1) относящийся к соединительной ткани; 2) относящийся к повязке; 3) нечто связующее; напр., центродесма.
-ДЕУМ (греч. hodaios находящийся в пути, от hodos путь, дорога) — относящийся к начальной стадии развития зародыша; напр., стомодеум.
ДИ- [1] (греч. dis и приставка di- дважды, от dyo два) — два, дважды, двойной; соответствует русскому компоненту сложных слов «дву-»; см. также *Би-.*
ДИ- [2] — см. *Диа-.*
ДИ- [3] — см. *Дис-* [2].
ДИА- (греч. предлог и приставка dia), перед гласными **ДИ-** — 1) движение сквозь, через, от начала до конца в пространстве или во времени; 2) полное завершение действия; 3) разделение, отделение; 4) промежуточное положение между чем-либо.
ДИАФАНО- (греч. diaphanēs прозрачный, просвечивающийся; diaphainomai просвечивать) — просвечивание, прозрачность.
-ДИДИМ- (греч. didymoi яички, от didymos двойной) — относящийся к яичкам; напр., эпидидимит; см. также *Орх-.*
-ДИЕРЕЗ (греч. diaireō разнимать, разъединять; diairesis разъятие, разделение) — разделение, разрушение; напр., лейкодиерез; см. также *-Ерез.*
ДИЗ- — см. *Дис-* [1].
ДИКТИО- (греч. diktyon сеть) — 1) имеющий сетевидную структуру; 2) относящийся к пластинчатому комплексу.
ДИНАМ(О)-, -ДИНАМИКА, -ДИНАМИЯ (греч. dynamis сила) — 1) сила,

усилие; 2) относящийся к движению; напр.: гемодинамика, гиподинамия.
ДИОПТО-, ДИОПТРИ-, ДИОПТРО- (греч. diopteia видение, наблюдение; dioptrikos относящийся к оптическим приборам, к измерениям) — 1) относящийся к оптическим приборам, измерениям, наблюдениям; 2) относящийся к преломляющей силе оптических систем, в т. ч. глаза.
ДИПЛ(О)- (греч. diploos двойной) — двойной, сдвоенный, парный, диплоидный; противопол. *Гапл*(2).
ДИПСО-, -ДИПСИЯ (греч. dipsa жажда) — относящийся к жажде (в переносном смысле — к влечению к алкоголю); напр., олигодипсия.
ДИС- [1]**, ДИЗ-** (греч. неотделяемая приставка dys-) — затруднение, отклонение от нормы; нарушение, расстройство функции; противопол. *Эу-*.
ДИС- [2] (лат. неотделяемая приставка dis-), перед «ф» изменяется в **ДИФ-**; перед «в», «г» и «с» с последующим согласным сокращается в **ДИ-** — разделение, разъединение, расчленение, отрицание.
ДОЛИХО- (греч. dolichos длинный) — длинный, удлиненный; противопол. *Брахи-* [2].
-ДОНЕЗ (греч. donēsis колебание, от doneō колебать, трясти) — колебание, дрожание; напр., иридодонез.
ДРОМО-, -ДРОМ- (греч. dromos бег) — 1) относящийся к движению, перемещению; напр., антидромный импульс; 2) относящийся к проявлениям болезни, к ее течению; напр., продромальный период.
ДУКТО-, -ДУКТ-, -ДУКТОР, -ДУКЦИЯ, -ДУЦ- (лат. duco, ductum вести, водить; ductio ведение) — 1) относящийся к переведению, к перемещению; напр.: редуктаза, абдуктор, аддукция, редуцент; 2) относящийся к протоку (анат. ductus).
ДУОДЕН(О)- (лат. duodeni по двенадцати, двенадцать; анат. duodenum двенадцатиперстная кишка) — относящийся к двенадцатиперстной кишке.
-ДУР- (лат. durus твердый; анат. dura mater твердая мозговая оболочка) — 1) твердый; напр., индурация; 2) относящийся к твердой мозговой оболочке; напр., эпидурит.
-ДУЦ- — см. *Дукто-*.
-ЕДЕМА (греч. oidēma припухлость, опухоль, от oideō или oidaō разбухать, набухать) — относящийся к отеку; напр., микседема.
-ЕДОНИЯ — см. *Гедон-*.
-ЁЗ — модификация терминоэлемента *-оз* после мягкого согласного «л»; напр., гранулёз.
-ЕЙРИЗ, -ЕЙРИНТЕР, ЭВРИ- (греч. eurys широкий, eurynō расширять) — относящийся к расширению; напр.: метрейриз, кольпейринтер.
-ЁМА — модификация терминоэлемента *-ома* после мягкого согласного «л»; напр., гранулёма.
-ЕМИЯ — см. *Гем-*.
-ЕРГАЗИЯ — см. *Эргазио-*.
-ЕРГИЯ — см. *Эргазио-*.
-ЕРЕЗ (греч. haireō, будущее время haireso брать, взять, хватать) — компонент со значением «взятие», входящий в состав ряда терминоэлементов; напр.: *-аферез, -диерез, -экзерез*.
-ЕСТЕЗИЯ — см. *Эстезио-*.
ЕЮНО- (лат. jejunus ничего не евший, тощий; intestinum jejunum тощая кишка) — относящийся к тощей кишке.
ЗИГО- (греч. zygon ярмо, zygotos спаренный, сопряженный, соединенный, от zygoō соединять) — двойной, парный, соединенный.
ЗИМО- (греч. zymē закваска, дрожжи) — относящийся к биологически активным веществам (ферментам, токсинам и др.).
-ЗО- — см. *Зоо-*.
ЗОНУЛО- (zonula уменьшительное от греч. zōnē пояс; анат. zonula ciliaris ресничный поясок) — относящийся к ресничному пояску (глаза).
ЗОО-, -ЗО- (греч. zōon живое существо, животное; zōē жизнь) — относящийся к животным, к живым существам; напр.: мерозоит, сперматозоид.
-ИАЗ(ИС) (греч. -iasis суффикс имен существительных, образованных от глаголов на -aō или -iaō) — патологический процесс, состояние, болезнь; напр.: псориаз, аллантиазис; см. также *-Оз*.
-ИАТР(ИЯ) — см. *Ятро-*.
-ИД(НЫЙ) (греч. суффикс -eidēs подобный, похожий, в латинизированной форме -ides или чаще - ideus, от eidos вид, образ, форма) — 1) похожий по виду, форме на что-либо, сходный, сравнимый; соответствует русскому терминоэлементу «-видный»; напр.: аденоиды, онейроидные галлюцинации; см. также *-Морфный, -Формный*; 2) кожное проявление болезни или патологического состояния; напр., туберкулид.
ИДЕО- (лат. idea, от греч. idea вид, наружность, форма; мысль, замысел, представление, понятие, идея) — относящийся к мышлению, к умственной, психической деятельности.
ИДИО- (греч. idios собственный, свой, сам по себе, частный, отдельный, своеобразный, необычный) — особенный, своеобразный, необычный, неясного происхождения.
-ИДНЫЙ — см. *-Ид*.
ИЗО- (греч. isos равный) — равенство, соразмерность, одинаковость, постоянство; противопол. *Анизо-*.
ИЛ- — см. *Ин-*.
ИЛЕ(О)- (лат. ile, ilis обычно во множественном числе ilia самая нижняя часть живота, пах; подвздошная область; внутренности; анат. ileum подвздошная кишка) — относящийся к подвздошной кишке.
ИЛИ(О)- (лат. ile, ilis обычно во множественном числе ilia самая нижняя часть живота, пах; подвздошная область; внутренности; анат. os ilium подвздошная кость, musculus ilium подвздошная мышца) — 1) относящийся к подвздошной кости; 2) относящийся к подвздошной мышце.
ИМ- — см. *Ин-*.
ИММУН(О)- (лат. immunis свободный, освобожденный, избавленный от чего-либо, незатронутый, не подверженный чему-либо; immunitas освобожденность; immunio укреплять изнутри, защищать) — иммунный, относящийся к иммунитету.
ИН- (лат. предлог и приставка in в; лат. отрицательная приставка in- не), перед согласными «б», «п», «м» изменяется в **ИМ-**, перед «л» — в **ИЛ-**, перед «р» — в **ИР-** — 1) расположение или нахождение в чем-либо, внутри чего-либо; действие, процесс, направленные внутрь чего-либо, на что-либо, по направлению к чему-либо; см. также *ЭН-*; противопол. *Экс-*; 2) отрицание; соответствует русским приставкам «без-» и «не-»; см. также *А-* [1].
-ИН- — см. *Ино-*.
ИНО-, -ИН- (греч. is, inos мышца, сухожилие; позднее — мышечное волокно) — относящийся к волокнам, к мышцам; напр., невринома.
ИНТЕР- (лат. наречие, предлог и приставка inter между, среди, взаимно)— расположение между структурами, соединение между ними, взаимодействие между чем-либо; соответствует русским приставкам «меж-», «между-»; см. также *Мез-*.
ИНТЕСТИНО- (лат. intestinum кишка, кишечник) — относящийся к кишке, к кишечнику; см. также *Энтер-*.
ИНТРА- (лат. наречие, предлог и приставка intra внутри) — нахождение внутри, в пределах чего-либо, действие в пределах какого-либо времени; соответствует русской приставке «внутри-»; см. также *Интро-, Энд-, Энт-*; противопол. *Экзо-, Экстеро-, Экстра-Экто-*.
ИНТРО- (лат. наречие и приставка intro внутрь) — действие, движение, направленное внутрь; см. также *Интра-, Энд-, Энт-*; противопол. *Экзо-, Экстеро-, Экстра-, Экто-*.
ИНФРА- (лат. наречие, предлог и приставка infra под, ниже) — нахождение ниже чего-либо, под чем-либо; соответствует русским приставкам «под-», «нижне-»; см. также *Гип-(1), Суб(1)*; противопол. *Супра-*.
ИР- — см. *Ин-*.
ИРИД(О)- (греч. iris, iridos ярко окрашенный кружок, окрашенный кружок в глазу, радужка; Iris богиня радуги) — относящийся к радужке.
ИСТМИКО-, ИСТМО- (греч. isthmos перешеек, узкий проход) — относящийся к перешейку (матки и др.).
-ИТ (греч. суффикс -itis имен прилагательных женского рода, имеющий значение «относящийся к чему-либо») — обозначение воспалительных процессов и болезней; напр.: гастрит, энцефалит.
ИХТИ(О)- (греч. ichthys рыба) — относящийся к рыбам, напоминающий рыбью чешую.
ИШ- (греч. ischō задерживать, препятствовать) — относящийся к задержке, к недостаточности, к препятствию.
ИШИ(О)- (греч. ischion тазобедренный сустав, седалище, бедро; анат. nervus ischiadicus седалищный нерв) — относящийся к седалищной кости, к седалищному нерву.
КАВ(О)- (лат. cavus полый; анат. vena cava полая вена) — относящийся к полой вене.
КАК- (греч. kakos плохой) — нечто плохое, неприятное, вредное, внушающее отвращение; противопол. *Эу-*.
КАЛИКО-, -КАЛИКС (греч. kalyx, kalykos оболочка, чашечка цветка; лат. calix, calicis кубок, чаша: анат. calyx renalis почечная чашка) — относящийся к почечным чашкам; напр., мегакаликс.
КАЛОРИ- (лат. calor тепло) — относящийся к теплу, к теплоте.
КАЛЬК-, КАЛЬЦ(И)- (лат. calx, calcis известняк, известь; calcino превращать в известь; Calcium кальций) — относящийся к кальцию, к солям кальция, к извести.
КАМПИ- (лат. campus поле) — относящийся к полю зрения (campus visionis).

КАНАЛИКУЛ(О)- (лат. canaliculus уменьшительное от canalis труба, трубчатый проход, канал) — относящийся к канальцу.
КАНКР-, КАНЦЕР(О)- [лат. cancer, cancri или canceri рак (животное); злокачественная опухоль, рак] — относящийся к злокачественной опухоли; см. также *Карцин-*.
КАНТО-, -КАНТУС (лат. canthus, от греч. kanthos угол глазной щели) — относящийся к углу глазной щели; напр., эпикантус.
КАНЦЕР(О)- — см. *Канкр-*.
КАПНО-, -КАПНИЯ (греч. kapnos дым) — относящийся к углекислому газу; напр., *гиперкапния*.
КАРБ(О,ОН)- (лат. carbo, carbonis уголь) — 1) относящийся к углю; см. также *Антрак-*(1); 2) относящийся к углероду.
КАРД(И)-, КАРДИО- [1], **КАРДИЯ** (греч. kardia сердце) — относящийся к сердцу; напр., стенокардия.
КАРДИО- [2] (греч. kardia входное отверстие желудка) — относящийся к кардиальному отверстию, к кардии.
-КАРДИЯ — см. *Кард-*.
КАРИО-, -КАРИОН (греч. karyon ядро ореха) — относящийся к ядру клетки; напр., гетерокарион; см. также *Нукл-*.
КАРН-, -КАРН- (лат. caro, carnis мясо, плоть, тело) — 1) относящийся к мясу, к мягким тканям; напр., инкарнация; 2) относящийся к мышцам; см. также *Сарк-* [1].
КАРЦИН(О)- [греч. karkinos краб, рак (животное); karkinos и karkinōma язва, разъедающая язва, рак] — относящийся к раку; см. также *Канкр-*.
КАТА- (греч. предлог и приставка kata) — 1) движение сверху вниз; противопол. *Ана-(1)*; 2) полное завершение действия; усиление значения, выраженного последующей частью слова.
-КАУСТИКА (греч. kaustikos жгучий, едкий; causis горение, жжение) — относящийся к прижиганию; напр., торакокаустика.
-КАУТЕР (греч. kautēr раскаленное железо, применяемое для выжигания клейма, для прижигания, от kaiō жечь) — инструмент для прижигания; напр., термокаутер.
КВАДРИ- (лат. quadri-, от quattuor четыре) — четыре, четверной; см. также *Тетра-*.
КЕЛИО- — см. *Целио-*.
КЕРАТ(О)- (греч. keras, keratos рог, вещество рога) — 1) относящийся к роговому веществу, к ороговению, роговой; 2) относящийся к роговице.
КЕФАЛ(О)- — см. *Цефал-*.
КИЕМАТО- (греч. kyēma, kyēmatos зачатое, утробный плод, зародыш, от kyeō зачать, забеременеть) — относящийся к организму на внутриутробной стадии развития; см. также *Фет-, Эмбрио-*.
КИМАТО-, КИМО-, -КИМИЯ (греч. kyma, kymatos волна, волнение) — волна, движение (гл. обр. колебательное); напр., миокимия.
КИН(О)- [1], **КИНЕЗИ-, КИНЕЗО-, КИНЕМАТ(О)-, КИНЕТО-, -КИНЕЗ (ИЯ)** (греч. kineō приводить в движение, двигать; **kinēsis** движение; kinēma, kinēmatos движение; **kinētos** движимый; kinētikos относящийся к движению, двигающий) — относящийся к движению; напр.: адиадохокинез, дискинезия; см. также *Мото-*.
КИН(О)- [2] (греч. kyōn, kynos собака) — относящийся к собаке.
КИСТ(О)- (греч. kystis пузырь, мешок) — относящийся к кисте, кистозный; см. также *Цист-*.
КЛАЗМАТО-, -КЛАЗ(ИЯ), -КЛАСТ (греч. klaō, будущее время klasō ломать, быть разбитым, klasis ломка, разламывание, разрушение; klasma, klasmatos обломок, фрагмент, разрыв; klastos разбитый на куски, раздробленный) — относящийся к разрушению; напр.: мукоклаз, краниоклазия, остеокласт.
КЛАУСТРО- (лат. claustrum засов, замок, закрытое помещение) — относящийся к закрытому помещению.
-КЛЕЙЗИС (греч. kleiō, будущее время kleisō закрывать, заключать; kleisis закрытие, запирание) — зашивание, закрывание; напр., ириденклейзис.
КЛИН(О)-, -КЛИН-, -КЛИЗА, -КЛИН (греч. klinō наклонять, склонять в ту или другую сторону, сгибать, укладывать; klinē кровать, постель; klisis наклонение) — 1) относящийся к наклону, к изгибу; напр., реклинация; 2) относящийся к положению лежа; 3) относящийся к отклонению от нек-рого состояния; напр.: патоклиза, геноклин.
КЛОНО-, -КЛОНИЯ, -КЛОНУС (греч. klonos беспорядочное движение; мед. лат. clonus клонус) — относящийся к судорогам, к спазмам, к клонусу; напр.: миоклония, опсоклонус.
КО- — см. *Ком-*.
КОАГУЛО- (лат. coagulo вызывать свертывание) — относящийся к свертыванию, к коагуляции.
КОКС- (лат. соха бедро; анат. os сохае тазовая кость, articulatio сохае тазобедренный сустав) — относящийся к тазобедренному суставу.
КОКЦИГ- (лат. coccyx, coccygis, от греч. kokkyx, kokkygos кукушка, копчик; анат. os coccygis копчик) — относящийся к копчику.
КОЛ- — см. *Ком-*.
КОЛ(О)-, КОЛОНО-, -КОЛОН (греч. kolon толстая кишка; анат. colon ободочная кишка) — относящийся к ободочной кишке, к толстой кишке; напр., мегаколон.
КОЛЬП(О)-, -КОЛЬПОС (греч. kolpos углубление, пазуха; влагалище) — относящийся к влагалищу; напр., мукокольпос; см. также *Вагин-*.
КОМ- [архаический лат. предлог com- (в классической латыни cum-) и приставка com-; перед «б», «м», «п»; изменяется в **КОР-** (лат. cor-) перед «р», в **КОЛ-** (лат. col-) перед «л», в **КОН-** (лат. con-) перед остальными согласными, сокращается в **КО-** перед гласными, а также в некоторых неологизмах] — совместность действия, взаимодействие; совместимость, совмещенность, соединение, связь, взаимозависимость; соответствует русским приставкам «с-», «со-»; см. *Син-*.
КОН- — см. *Ком-*.
КОНИ(О)-, -КОНИИ, -КОНИОЗ (греч. konia пыль) — относящийся к пыли, к мелким частицам; напр.: гемоконии, мангапокониоз.
КОНТР(А)- (лат. наречие, предлог и приставка contra) — противоположность, противопоставление, противодействие тому, что выражено в последующей части слова; см. также *Ант(и)-*.
КОНХО- (лат. concha, от греч. konchē раковина улитки, улитка) — относящийся к образованию, похожему на раковину, чаще к носовой раковине.
КОПР(О)- (греч. kopros навоз, помет, кал) — относящийся к калу, каловый, грязный (в переносном смысле); см. также *Стерко-*.
КОР- — см. *Ком-*.
-КОРИЯ (греч. korē зрачок) — относящийся к зрачку; напр., анизокория; см. также *Пупилл-*.
КОРО- (греч. korē девочка, кукла) — относящийся к девочке; напр., корофилия.
КОРОНАР(О)- (лат. coronarius венечный; лат. corona, от греч. korōnē корона, венец, венок; анат. arteriae coronarie cordis венечные артерии сердца) — относящийся к венечным артериям сердца.
КОРПОР(О)-, -КОРПОР- (лат. corpus, corporis тело) — относящийся к телу человека, к телу позвонка или другого анатомического образования; напр., гемикорпорэктомия; см. также *Сомат(о)-*.
КОРТИК(О)-, -КОРТИК-, -КОРТЕКС (лат. cortex, corticis кора) — относящийся к коре (чаще большого мозга), к корковому веществу (надпочечника); напр.: декортикация, архикортекс.
КОСТО- (лат. costa ребро) — относящийся к ребру.
КОФО- (греч. kophos глухой, притупленный) — относящийся к глухоте, глухой; см. также *Сурдо-*.
КОХЛЕО- (лат. cochlea, от греч. kochlos улитка, раковина улитки; анат. cochlea улитка внутреннего уха) — относящийся к улитке внутреннего уха.
КРАНИО-, -КРАНИЯ (греч. kranion, лат. cranium череп) — относящийся к черепу; напр., гемикрания; 2) относящийся к головному концу тела.
-КРЕТ, -КРЕЦИЯ (лат. creno, cretum различать, решать; просеивать) — относящийся к отделению, выделению чего-либо; напр.: секрет, экскреция; см. также *-Криния*.
КРИКО- (греч. krikos круг, кольцо, перстень; анат. cartilago cricoidea перстневидный хрящ) — относящийся к перстневидному хрящу.
-КРИНИЯ, -КРИННЫЙ, -КРИТ (греч. krinō отделять, выделять; kritos отделенный, определенный) — относящийся к отделению, выделению чего-либо; напр.: дискриния, эндокринный, гематокрит; см. также *-Крет*.
КРИО- (греч. kryos холод, лед) — относящийся к холоду, к низкой температуре, к замораживанию.
КРИПТ(О)- (греч. kryptos скрытый, тайный; лат. crypta, от греч. kryptē склеп, скрытое место; анат. crypta крипта, лакуна) — 1) скрытый, относящийся к какому-либо скрытому состоянию; 2) относящийся к крипте (миндалины, радужки и др.).
-КРИТ — см. *-Криния*.
-КРОТА, -КРОТИЯ (греч. krotеō ударять, хлопать, стучать; krotos удар) — относящийся к пульсу, к пульсовой волне; напр.: дикрота, дикротия.
КРУРО- (лат. crus, cruris голень; комель; анат. ножка) — относящийся к ножке (напр., стремени).
КСАНТ(О)- (греч. xanthos желтый) — желтого цвета; см. также *Флав-*.
КСЕНО- (греч. xenos чужак, чужой, чужеземец, чуждый) — 1) чужой, чужеродный, необычный; см. также *Гетер-*;

2) происходящий от животного другого вида.
КСЕР(О)- (греч. xeros сухой) — сухой, сухость.
КСИФО- (греч. xyphos меч + -eidēs подобный, похожий; анат. processus xyphoideus мечевидный отросток) — относящийся к мечевидному отростку.
-ЛАГНИЯ (греч. lagneia похоть, сладострастие) — относящийся к половому возбуждению, к половому извращению; напр., альголагния.
ЛАКРИМ(О)- (лат. lacrima слеза; lacrimo, lacrimatum проливать слезы) — относящийся к слезам, слезный; см. также *Дакри-*.
ЛАКТ(О)- (лат. lac, lactis молоко) — 1) относящийся к молоку; см. также *Галакт-*; 2) относящийся к молочной кислоте.
ЛАЛО-, -ЛАЛИЯ (греч. lalia речь, болтовня; laleō лепетать, болтать) — относящийся к речи; напр., дислалия; см. также *-Артрия*, *Лог-*, *-Фазия*, *-Фем-*, *-Фразия*.
ЛАМИН(О)- (лат. lamina пластинка, тонкий лист, тонкий пласт) — относящийся к пластинке, к тонкому слою ткани.
ЛАПАРО- (греч. lapara или laparē живот, чрево, бок, поясница, пах) — относящийся к брюшной или брюшинной полости, к животу; см. также *Абдомин-*, *Вентро-*, *Целио-*.
ЛАРВ(И,О)- (лат. larva маска, личина; биол. личинка) — 1) относящийся к личинке; 2) замаскированный.
ЛАРИНГ(О)- (греч. larynx, laryngos гортань) — относящийся к гортани.
ЛАТЕР(О)- (лат. latus, lateris бок, сторона) — боковой (латеральный).
ЛЕВО- (лат. laevus левый) — левый, левосторонний; см. также *Синистро-*; противопол. *Декстро-*.
ЛЕЙК(О)- (греч. leukos белый) — 1) белый; см. также *Альб-*; 2) относящийся к лейкоцитам; 3) относящийся к белому веществу головного мозга.
ЛЕЙО-, ЛИО- [1] (греч. leios гладкий, ровный) — гладкий (о ткани, волокне).
-ЛЕКСИЯ (греч. lexis речь, слово) — относящийся к чтению, к способности читать; напр., брадилексия.
ЛЕММО-, -ЛЕММА (греч. lemma корка, оболочка) — относящийся к оболочке; напр., сарколемма.
ЛЕНТИ- (лат. lens, lentis чечевица, линза; анат. хрусталик) — 1) чечевицеподобный (по форме, размеру или цвету); 2) относящийся к хрусталику глаза; см. также *Фако-*.
-ЛЕПСИЯ (греч. lēpsis схватывание, нападение; приступ, припадок; от lambanō, будущее время lēpsomai хватать, нападать, овладевать) — относящийся к приступам, припадкам; напр., гипнолепсия.
-ЛЕПТ- (греч. lēptikos способный взять, воспринять) — способный захватить, воспринять; напр., органолептические свойства.
ЛЕПТО- (греч. leptos тонкий, нежный, слабый, узкий) — нечто тонкое, нежное.
-ЛЕЦИТ- (греч. lekithos яичный желток) — относящийся к яичному желтку; напр., изолецитальная яйцеклетка.
ЛИЕН(О)- (лат. lien селезенка) — относящийся к селезенке; см. также *Сплен-*.
ЛИЗ(О)-, ЛИО- [2], **-ЛИТ-, -ЛИЗ(ИС), -ЛИТ** [1] (греч. lysis развязывание, разложение, растворение, распад; ослабление лихорадки; от lyō, будущее время lysō развязывать, освобождать, растворять, разрушать) — 1) относящийся к растворению, разложению, распаду, рассасыванию чего-либо; напр.: аутолиз, кариолизис, сарколит, кератолитические средства; 2) относящийся к хирургической операции освобождения от сращения, рубцов; напр., кардиолиз.
ЛИМФ(О)- (лат. lympha чистая вода; анат. лимфа) — относящийся к лимфе, к лимфатической системе; см. также *Хил-*.
ЛИО- [1] — см. *Лейо-*.
ЛИО- [2]— см. *Лиз-*.
ЛИП(О)- (греч. lipos жир) — относящийся к жиру, к липидам, жирный, жировой; см. также *Адип-*, *Себо-*(1), *Стеат-*.
-ЛИТ- [1] — см. *Лиз-*.
ЛИТО-, -ЛИТ [2], **-ЛИТИАЗ** (греч. lithos камень, lithiasis каменная болезнь) — относящийся к конкременту, к плотному образованию; напр.: флеболит, нефролитиаз; см. также *Петри-*.
ЛОБ(О)- (лат. lobus доля, от греч. lobos доля, доля печени легкого) — относящийся к доле какого-либо органа.
ЛОБУЛ- (лат. lobulus уменьшительное от lobus доля) — относящийся к дольке органа.
ЛОГ(О)-[1] (греч. logos слово, речь) — относящийся к речи; см. также *-Артрия*, *Лало-*, *-Фазия*, *-Фем-*, *-Фразия*.
ЛОГ-[2], **-ЛОГ-, -ЛОГ(ИЯ)** (греч. logos рассуждение, понятие; наука, учение) — 1) относящийся к науке, к учению; напр.: уролог, физиология; 2) относящийся к рассуждению, к мышлению; напр.: алогизм, паралогия.
ЛОК(О) (лат. locus место) — относящийся к какому-либо месту, к участку, местный (локальный); см. также *Топ-*.
ЛЮМБ(О) (лат. lumbus поясница) — относящийся к поясничной области, к поясничному отделу позвоночника или спинного мозга.
ЛЮП- (лат. lupus волк; мед. лат. lupus волчанка) — относящийся к волчанке.
ЛЮТЕ(О)- (лат. luteus желтый; анат. corpus luteus желтое тело) — относящийся к желтому телу.
МАКР(О)- (греч. makros длинный, большой) — большой, крупный; см. также *Мега-*; противопол. *Микр-*.
МАКСИЛЛ(О)- (лат. maxilla челюсть; анат. верхняя челюсть) — относящийся к верхней челюсти; см. также *-Гения* [2], *Гнато-*.
МАКУЛ(О)- [лат. macula пятно, анат. macula lutea retinae желтое пятно (пятно сетчатки)] — 1) пятно; 2) желтое пятно (пятно сетчатки).
МАЛАКО-, -МАЛЯЦИЯ (греч. malakos мягкий, malakia мягкость) — мягкость, размягчение; напр. остеомаляция.
МАММО- [лат. mamma грудь (преимущественно женская); анат. mamma молочная железа] — относящийся к молочной железе; см. также *Маст-*.
МАНДИБУЛ(О)- (лат. mandibula челюсть, от mando жевать; анат. mandibula нижняя челюсть) — относящийся к нижней челюсти; см. также *-Гения* [2], *Гнато-*.
-МАНИЯ (греч. mania безумие, сумасшествие, безумная страсть, влечение) — болезненное влечение к чему-либо; напр., наркомания.
МАСКУЛИН- (лат. masculinus мужской, мужского пола) — относящийся к мужским половым признакам, мужской; см. также *Андро-*, *Аррено-*.
МАСТ(О)-, -МАСТИЯ [греч. mastos грудь (преимущественно женская), сосок] — относящийся к молочной железе; напр., макромастия; см. также *Маммо-*.
МАСТОИД(О) (греч. mastos грудь, сосок + -eidēs подобный; анат. processus mastoideus сосцевидный отросток) — относящийся к сосцевидному отростку височной кости.
МЕАТ(О)- (лат. meatus ход, путь, выход, устье; анат. устар. meatus urinarius наружное отверстие мочеиспускательного канала) — относящийся к наружному отверстию мочеиспускательного канала.
МЕГА-, МЕГАЛ(О)-, -МЕГАЛИЯ (греч. megas, megalu большой) — большой, увеличенный; напр., акромегалия; см. также *Макр-*.
МЕДИАСТИН(О)- (лат. mediastinum средостение, от mediastinus находящийся посредине) — относящийся к средостению.
МЕДИО- (лат. medius средний, medium середина) — относящийся к середине, к средней части чего-либо; см. также *Мез-*.
МЕДУЛЛ(О)- (лат. medulla костный мозг, сердцевина, мякоть) — относящийся к мозгу, мозговой; см. также *Миел-*.
МЕЗ(О)- (греч. mesos средний, срединный, промежуточный) — средний, находящийся посредине, занимающий промежуточное положение во времени, или в пространстве; см. также *Интер-*, *Медио-*.
МЕЛ-, МЕЛО- [1], **-МЕЛИЯ** (греч. melos часть тела, конечность) — относящийся к части тела, к конечности; напр., макромелия; см. также *Акро-*(1).
МЕЛАН(О)- (греч. melas, melanos темный, черный) — 1) темный, черный; 2) относящийся к меланину.
-МЕЛИЯ — см. *Мел-*.
МЕЛО- [1] — см. *Мел-*.
МЕЛО- [2] (греч. melon щека) — относящийся к щеке.
МЕН(О)- (греч. mēn месяц) — относящийся к менструации, к менструальному циклу.
МЕНИНГ(О)-, -МЕНИНКС (греч. mēninx, mēningos оболочка, оболочка мозга; анат. meninges мозговые оболочки) — относящийся к мозговым оболочкам; напр., лептоменингс.
МЕР(О)-, -МЕР(А,ИЯ) (греч. meros часть, доля) — относящийся к части чего-либо, частичный; напр.: миомер, центромера, изомерия.
МЕТ(А)- (греч. наречие, предлог и приставка meta) — следование за чем-либо, после чего-либо; расположение за чем-либо, между чем-либо; неполное соответствие чему-либо, промежуток в пространстве или во времени, переход из одного места или состояния в другое; см. также *Пост-*; противопол. *Про-*.
МЕТЕО(РО)- (греч. meteora небесные явления) — относящийся к метеорологии, к метеорологическим явлениям.
МЕТР(О)- [1], **-МЕТРА, -МЕТРИЙ** (греч. mētra матка) — относящийся к матке; напр.: лохиометра, эндометрий; см. также *Гистер-*.
МЕТР(О)- [2], **-МЕТР(ИЯ)** (греч. metron мера, metreō измерять, определять) — относящийся к измерению, из-

меряющий; напр.: астигмометр, краниометрия.
-МЕТРА — см. *Метр-* [1].
-МЕТРИЙ — см. *Метр-* [1].
-МЕТРИЯ — см. *Метр-* [2].
МЕХАНО- (греч. mēchanē изобретение, орудие, приспособление, сооружение) — относящийся к механике, к механическому воздействию.
МИ(О,ОЗ)- (греч. mys, myos мышь; мышца) — относящийся к мышцам, мышечный.
МИЕЛ(О)-, -МИЕЛИЯ (греч. myelos мозг, костный мозг) — относящийся к спинному или костному мозгу; напр., сирингомиелия; см. также *Медулл-*.
МИЗ-,МИЗО [1]**-** (греч. misos ненависть, отвращение, предмет отвращения) — ненависть, отвращение к чему- или к кому-либо.
МИЗО [2]**-** (греч. mysos грязь, загрязнение, бесчестие) — относящийся к загрязнению, к заражению.
МИК(О)-, МИЦЕТ(О)- (греч. mykēs, mykētos гриб) — относящийся к грибам, к паразитическим грибкам или к вызываемым ими болезням; см. также *Фунги-*.
МИКР(О)- (греч. mikros малый) — малый, относящийся к очень малым предметам или величинам; противопол. *Макр-*.
МИКС-, МИКСО[1]**-** (греч. myxa слизь) — относящийся к слизи, слизистый; см. также *Муко-*(1).
МИКСО[2]**-, -МИКСИС, -МИКСИЯ** (греч. mixis смешение, смесь, соединение, совокупление) — смешение, смесь, соединение, совокупление, половой акт; напр., амфимиксис, панмиксия.
-МИМЕТИК, -МИМИЯ (греч. mimia и mimēsis подражание; mimētikos способный к подражанию, подражающий, от mimeomai подражать, представлять, изображать) — относящийся к мимике; подражающий, воспроизводящий; напр., психотомиметики, гипермимия.
МИО(З)- — см. *Ми-*.
МИРИНГ(О)- (новолат. myringa барабанная перепонка, искаженное греч. mēninx, mēningos оболочка, оболочка мозга, барабанная перепонка) — относящийся к барабанной перепонке; см. также *Тимпан-*(1).
МИТО- (греч. mitos пить) — 1) нитевидный, нитчатый; см. также *Фило*[2]-; 2) относящийся к митозу.
МИЦЕТ(О)- — см. *Мик-*.
МНЕМО-, -МНЕЗИЯ, -МНЕСТИЧЕСКИЙ (греч. mnēmē и mnēsis память, воспоминание) — относящийся к памяти, к воспоминаниям; напр., гипермнезия, экмнестические конфабуляции.
МОН(О)- (греч. monos один, единственный) — один, единственный; см. также *Уни-*; противопол. *Мульти-*, *Поли-*.
МОРФ(О)-, -МОРФ-, -МОРФ (греч. morphē вид, форма, образ; morphōsis формирование, образование; morphoō формировать, образовывать) — относящийся к виду, к форме, к строению чего-либо; напр., гетероморфоз, аллеломорфы; см. также *-Идный*, *-Формный*.
МОТО(Р)- (лат. motus движение, motor приводящий в движение, от moveo двигать, приводить в движение) — относящийся к движению, двигательный; см. также *Кинези-*.
МУКО-, -МУКОЗ- (лат. mucus слизь, mucosus полный слизи, слизистый; анат. tunica mucosa слизистая оболочка) — 1) относящийся к слизи, слизистый; см. также *Микс-*; 2) относящийся к слизистой оболочке; напр., демукозация.
МУЛЬТИ- (лат. multi-, от multus многий, многочисленный, multum многое, много) — множественность, многократность; см. также *Поли-*.
НАЗ(О)- (лат. nasus нос) — относящийся к носу, к полости носа, носовой; см. также *Рин-*.
НАН(О)- (греч. nanos и nannos карлик) — относящийся к карликовости.
НАРК(О)- (греч. narkē и narkōsis оцепенение, помрачнение сознания, сон; narkoō делать оцепенелым, бесчувственным, усыплять; narkōtikos приводящий в оцепенение, помрачающий сознание) — помрачение сознания, оцепенение, потеря чувствительности, наркоз.
-НАТ- (лат. natus рождение, natalis относящийся к рождению) — относящийся к родам, к рождению; напр., постнатальный.
НЕВР(И, О)-, НЕЙР(О)- (греч. neuron жила, сухожилие, волокно, нерв) — относящийся к нервам, к нервной системе.
НЕЙТРО- (лат. neutrum ни то, ни другое) — 1) нейтральный (напр., реакция среды); 2) относящийся к нейтрофильным гранулоцитам.
НЕКР(О)- (греч. nekros мертвый, труп) — 1) омертвение (некроз); 2) относящийся к трупу.
НЕМАТО-, НЕМА (греч. nēma, nēmatos нить) — 1) нить, нитевидный; напр., хромонема; 2) относящийся к нематодам.
НЕО- (греч. neos молодой, новый) — новый, молодой, вновь созданный или возникший, созданный взамен чего-либо; соответствует русскому компоненту сложных слов «ново-»; противопол. *Арх-*, *Палео-*.
НЕФР(О)- (греч. nephros почка) — относящийся к почке, почечный; см. также *Рен-*.
НИКТ(О)- (греч. nyx, nyktos ночь, темнота) — относящийся к ночи, к темноте; ночной.
НИТРО- (греч. nitron щелок, сода; лат. nitrogenium азот) — относящийся к азоту, к его соединениям.
НОЗО-, -НОЗ (греч. nosos болезнь) — относящийся к болезни; напр., зооноз; см. также *Пат-* (1).
-НОЙЯ, -НОЭТИЧЕСКИЙ (греч. nus, noos ум, разум; noeō воспринимать, представлять себе, мыслить; noētikos способный к восприятию, к мышлению) — относящийся к мышлению, к интеллектуальным способностям; напр., дизнойя, аноэтический синдром.
НОМО-, -НОМ(ИКА, ИЯ) (греч. nomos закон, порядок, правило) — относящийся к определенному порядку, подчиняющийся определенной закономерности, обычный; напр., метроном, эргономика, гомономия.
НОРМ(О)- (лат. norma норма) — соответствующий норме.
-НОЭТИЧЕСКИЙ — см. *-Нойя*.
НУКЛЕО-, -НУКЛЕУС (лат. nucleus ядро) — относящийся к ядру чего-либо, чаще к клеточному ядру; напр., пронуклеус; см. также *Карио-*.
ОВ(И, О, УЛ)- (лат. ovum яйцо, ovulum яичко) — относящийся к яйцу, к яйцеклетке; см. также *Оо-*.
ОВАРИ(О)-, -ОВАРИЯ (анат. ovarium яичник, от лат. ovum яйцо) — относящийся к яичнику; напр., ановария; см. также *Оофор-*.
ОВИ-, ОВО-, ОВУЛ- — см. *Ов-*.
-ОДИНИЯ (греч. odynē боль) — боль, болевые ощущения; напр., кокцигодиния; см. также *Алгези-*.
ОДОНТ(О)-, -ОДОНТ- (греч. odus, odontos зуб) — относящийся к зубам, зубной; напр., ортодонтия; см. также *Дент-*.
ОДОР(И)- (лат. odor запах, odoratus обоняние, чутье; запах) — относящийся к запаху, к обонянию; см. также *Ольфакто-*, *Осм-*.
-ОЗ (греч. -ōsis суффикс имен существительных, образованных от глаголов на -oō), после мягкого «л» изменяется в -ёз — 1) процесс или результат процесса; напр., пикноз; 2) патологическое состояние, болезнь; напр., силикоз; см. также *-Иаз*.
-ОЙКИЯ — см. *Эко-*.
ОКСИ [1]**-** (греч. oxys острый, остроконечный; острый, кислый) — 1) остроконечный; 2) кислый, кислотный, окисленный; см. также *Ацид-*.
ОКСИ [2]**-, ОКСИГЕНО-, -ОКС-, -ОКСИЯ** (лат. oxygenium кислород, от греч. oxys острый, кислый + -genēs порождающий, производящий) — относящийся к кислороду, кислородный; напр., аноксемия, гипоксия.
ОКУЛО- (лат. oculus глаз) — относящийся к глазу, глазной; см. также *Офтальм-*.
ОЛЕ(О)- (лат. oleum растительное масло) — относящийся к растительному, животному, минеральному маслу.
ОЛИГ(О)- (греч. oligos малый, немногочисленный, незначительный) — малый, незначительный, неполный, недостаточный.
ОЛЬФАКТО- (лат. olfactus обоняние, запах) — относящийся к запаху, к обонянию; см. также *Одор-*, *Осм-*.
ОМ(О)- (греч. ōmos плечо) — относящийся к плечу, к плечевому суставу; см. также *Брахи* [1]-.
-ОМА (греч. суффикс имен существительных -ōma; в древнегреч. медицинской терминологии означал «патологическое состояние», в частности «опухоль») — (преимущественно) новообразование, опухоль; напр., фиброма.
ОМЕНТ(О)- (лат. omentum сальник) — относящийся к сальнику.
ОМЕО- — см. *Гом-*.
ОМО- — см. *Ом-*.
ОМФАЛ(О)- (греч. omphalos пупок, пуповина) — относящийся к пупку, к пупочному канатику.
ОНЕЙРО-, ОНИР- (греч. oneiros сон, сновидение; oneireios относящийся к сновидениям)— относящийся к сновидениям или напоминающим их явлениям (галлюцинациям, конфабуляциям и др.).
-ОНИМИЯ — см. *Ономато-*.
ОНИР- — см. *Онейро-*.
ОНИХ(О)-, -ОНИХИЙ, -ОНИХИЯ (греч. onyx, onychos ноготь) — относящийся к ногтям, ногтевой; напр., эпонихий, паронихия.
ОНКО- (греч. onkos груда, масса, объем, вздутость; onkōma опухоль) — 1) относящийся к объему, к массе или к давлению; 2) относящийся к опухоли (преимущественно злокачественной), опухолевый.
ОНОМАТО-, ОНИМИЯ (греч. onoma, onomatos и onyma, onymatos имя, название, слово) — имя, название, слово; напр., анонимия.
ОНТО-, -ОНТ (греч. on, ontos сущее, существо, от eimi быть, существовать) — нечто существующее, существо, бытие, существование; напр., шизонт.

ОО- (греч. ōon яйцо) — относящийся к яйцу, к яйцеклетке; см. также *Ов-*.
ООФОР- (греч. ōophoros яйценосный, от ōon яйцо + phoros несущий; анат. oophoron яичник) — относящийся к яичнику; см. также *Овари-*.
ОПИСТО- (греч. opisthen сзади, позади, назад) — находящийся позади, оттянутый назад.
-ОПИЯ — см. *Оптико-*.
ОПСИ-, ОПСО- (греч. opse и opsi после длительного периода, поздно) — поздний, задерживающийся.
-ОПСИЯ — см. *Оптико-*.
ОПСО- — см. *Опси-*.
ОПТИКО-, ОПТО-, -ОПИЯ, -ОПСИЯ, -ОПТИКА (греч. ōps, ōpos глаз; ops opos глаз, зрение; opsis зрение, зрительное восприятие; optikos относящийся к зрению; optos видимый) — относящийся к глазам, к зрению, к зрительному восприятию, зрительный; напр.: амблиопия, биопсия, ортоптика.
ОРБИТО- (лат. orbita колея, круговой путь, орбита; от orbis окружность, круг; анат. orbita глазница) — относящийся к глазнице.
ОРГАН(О)- (греч. organon орудие, инструмент; орган; от ergō работать, действовать; лат. organismus организм) — относящийся к органу или к организму.
-ОРЕКСИЯ (греч. orexis устремление, желание; аппетит) — желание есть, аппетит; напр., парорексия.
ОРТ(О)- (греч. orthos прямой, прямо стоящий, вертикальный; правильный)— 1) прямой, вертикально направленный; 2) правильный, соответствующий норме.
ОРХ(И)-, ОРХИДО-, -ОРХИДИЯ, -ОРХИЗМ, -ОРХИЯ (греч. orchis и orchidion яичко) — относящийся к яичку; напр., синорхидия, криптorхизм, анорхия; см. также *-Дидим-*.
ОСМ-, -ОСМИЯ (греч. osmē обоняние, запах) — относящийся к запаху, к обонянию; напр., какосмия; см. также *Одор-, Ольфакто-*.
ОСМО- (греч. ōsmos толчок, проталкивание, давление) — относящийся к осмосу, к осмотическому давлению.
ОСТ(ЕО)-, -ОСТ (греч. osteon кость) — относящийся к кости, к костной ткани; напр., периост.
ОСЦИЛЛ(О)- (лат. oscillo, oscillatum качаться, колебаться) — относящийся к колебаниям, к колебательным процессам.
ОТ(О)-, -ОТИЯ (греч. us, ōtos ухо) — относящийся к органу слуха, к слуху; напр., анкилотия; см. также *Ауро* [2]-.
ОФТАЛЬМ(О)-, -ОФТАЛЬМ(ИЯ) (греч. ophthalmos глаз) — относящийся к органу зрения, к зрению; напр., лагофтальм, ксерофтальмия; см. также *Окуло-*.
-ПАГ (греч. pagos прикрепленный) — прикрепленный, сросшийся, соединенные близнецы; напр., торакопаг.
ПАЛАТ(О)- (лат. palatum нёбо) — относящийся к нёбу; см. также *Урано-*(1).
ПАЛЕО- (греч. palaios древний) — древний, ископаемый; см. также *Арх-*; противопол. *Нео-*.
ПАЛИ(Н)- (греч. palin вновь, опять, снова) — возвратность, повторность действия.
ПАН(ТО)- (греч. pan, pantos всё) — охватывающий в целом все, обозначенное последующей частью слова; соответствует словам «весь», «целиком».
ПАНКРЕАТ(О)-, ПАНКРЕО- (греч. pankreas, pankreatos поджелудочная железа, от pan всё + kreas, kreatos мясо) — относящийся к поджелудочной железе.
ПАНТО- — см. *Пан-*.
ПАПИЛЛ(О)- (лат. papilla грудной сосок) — 1) относящийся к соску, к сосочку, к сосцевидному образованию; 2) относящийся к печеночно-поджелудочной ампуле.
ПАР(А)- (греч. наречие, предлог и приставка para) — 1) нахождение, расположение рядом, вблизи, возле чего-либо; соответствует русским предлогам и приставкам «около», «при», «близ»; 2) отступление, отклонение от чего-либо, ошибочное отождествление с чем-либо, несоответствие внешних проявлений сущности данного явления.
ПАРИЕТО- (лат. paries, parietis стена, стенка) — относящийся к стенке полости или органа.
ПАРТЕНО- (греч. parthenos девственница) — относящийся к девственности, девственный.
ПАТ(О)-, -ПАТИЯ (греч. pathos чувство, переживание, страдание, болезнь) — 1) относящийся к патологическому состоянию, к болезни; напр., психопатия; см. также *Нозо-*; 2) относящийся к чувствительности; напр., гиперпатия.
ПАТЕЛЛ(О)- (лат. patella чашка, коленная чашка; анат. надколенник) — относящийся к надколеннику.
ПАХИ- (греч. pachys толстый, плотный, твердый) — плотный, твердый, уплотненный, увеличенный в объеме.
ПЕД(ИО, О)-, -ПЕДИОН, -ПЕДИЯ [1] (греч. pais, paidos и уменьшительное paidion дитя, ребенок; paideia воспитание, обучение) — 1) относящийся к ребенку, детский; напр., литопедион, мизопедия; 2) относящийся к обучению, к исправлению дефектов; напр., логопедия.
-ПЕД-, -ПЕДИЯ [2] (лат. pes, pedis нога, стопа) — относящийся к нижней конечности, к стопе; напр., карпопедальный спазм, бипедия; см. также *Под-*.
-ПЕДЕЗ (греч. pēdēsis скакание, прыгание; diapēdēsis просачивание, проникновение) — просачивание, проникновение; напр., эритропедез.
ПЕДИО- — см. *Пед-*.
-ПЕДИОН — см. *Пед.*
-ПЕДИЯ [1] — см. *Пед-*.
-ПЕДИЯ [2] — см. *-Пед-*.
ПЕДО- — см. *Пед-*.
-ПЕКСИЯ (греч. pēxis прикрепление)— прикрепление, фиксация какого-либо органа; напр., кольпопексия.
ПЕЛЬВИ(О)- [лат. pelvis таз (посуда), анат. pelvis таз] — относящийся к тазу, к тазовой области.
ПЕНИА-, -ПЕНИЯ (греч. penia бедность, нужда, недостаток) — бедность, недостаток чего-либо; напр., лейкопения.
ПЕПС-, ПЕПТ-, ПЕПСИЯ (греч. pepsis пищеварение; peptos сваренный, переваренный; peptikos способствующий пищеварению; pepto, pessō и pettō варить, размягчать, переваривать) — относящийся к пищеварению; напр. диспепсия.
ПЕР- (лат. предлог и приставка per) — 1) действие, направленное через, сквозь что-либо; 2) усиление признака, завершение действия.
ПЕРИ- (греч. предлог и приставка peri) — расположение вокруг, около, снаружи, при чем-либо.
ПЕРИНЕО (греч. perineos, perineon или perinaion промежность) — относящийся к промежности.
ПЕРИТОН(ЕО)- (греч. peritonaion, анат. peritoneum брюшина) — относящийся к брюшине.
-ПЕТ- (лат. peto направляться, устремляться) — идущий, проводящий, распространяющийся; напр., центрипетальный.
ПЕТРИ-, -ПЕТР- (греч. и лат. petra скала, камень; греч. petros камень) — окаменелость, обызвествление; напр., остеопетроз; см. также *Лито-*.
ПИ(О)- (греч. pyon гной) — содержащий гной, гнойный.
ПИЕЛ(О)- (греч. pyelos корыто, лохань) — относящийся к почечной лоханке.
ПИКН(О)- (греч. pyknos плотный, уплотненный, крепкий; частый, густой) — 1) плотный, уплотненный; 2) частый (о повторяющемся действии).
ПИЛЕ- (греч. pylē множественное число pylai створка, ворота) — относящийся к воротной вене.
-ПИЛЕ (греч. pylē вход, отверстие) — отверстие; напр., микропиле.
ПИЛО-, -ПИЛ- (лат. pilus волос) — относящийся к волосу, волосяной, волосковый; напр., депиляция; см. также *Трих-*.
ПИЛОР(О)- (греч. pylōros привратник, от pylē множественное число pylai створка, ворота, вход, отверстие) — относящийся к привратнику желудка.
ПИНЕАЛ(О)-, ПИНЕО- (лат. pinea сосновая шишка, от pinus сосна; анат. corpus pineale шишковидная железа) — относящийся к шишковидной железе.
ПИО- — см. *Пи-*.
ПИР(О)-, ПИРЕТ(О)-, -ПИРЕТ-, -ПИРЕКСИЯ (греч. pyr огонь, жар; pyretos и pyrexis жар, лихорадочное состояние; pyressō быть в жару, лихорадить) — 1) огонь, жар; 2) лихорадочное состояние; напр., электропирексия, антипиретики.
ПИТУИ-, -ПИТУИТ- [лат. pituita мокрота, слизь, выделения; анат. glandula pituitaria гипофиз (в древности считался источником выделений из носа)] — относящийся к гипофизу; напр., гиперпитуитаризм.
ПЛАЗМ(О)-, -ПЛАЗИЯ, -ПЛАЗМА, -ПЛАСТ(ИКА) (греч. plasma нечто сформированное, образованное; plasis формирование, образование; plastos сформированный, образованный; plastikē формирование, образование, от plassō лепить, ваять, формировать, образовывать) — 1) относящийся к формированию, образованию чего-либо; напр.: гипоплазия, неоплазма, симпласт; 2) относящийся к плазме крови; 3) относящийся к протоплазме; напр., гиалоплазма; 4) относящийся к пластической хирургической операции; напр., кератопластика.
ПЛАНТО-, -ПЛАНТ [1]- (лат. planta стопа, подошва) — относящийся к стопе, подошве; напр., медиоплантарный рефлекс.
-ПЛАНТ [2]- (лат. planto, plantatum сажать, пересаживать) — сажать, пересаживать; напр., трансплантация.
-ПЛАСТ(ИКА) — см. *Плазм-*.
ПЛАТИ(СТ)- (греч. platys плоский, широкий; platystatos очень плоский, очень широкий) — плоский, широкий.
ПЛЕ(ЙО, О)- (греч. pleiōn и pleōn большой, pleon больше, сравнительная степень от polys многий) — больше, множество.
-ПЛЕГИЯ (греч. plēgē удар, поражение) — паралич; напр., гемиплегия.
ПЛЕЗИ(О)- (греч. plēsios близкий,

plēsion близко) — близко расположенный, близкий, подобный.
ПЛЕЙО- — см. *Пле-*.
ПЛЕКС(УС)- (лат. plexus сплетение, от plecto плести, сплетать) — относящийся к нервному или сосудистому сплетению.
ПЛЕО- — см. *Пле-*.
-ПЛИКАЦИЯ (лат. plica складка; plico, plicatum складывать, свертывать) — образование складок; напр., гастропликация.
ПНЕВМ-, ПНЕВМАТ(О)-, ПНЕВМО[1]- (греч. pneuma, pneumatos дуновение, дыхание; воздух) — 1) относящийся к воздуху, к газу; см. также *Аэро-*; 2) относящийся к дыханию; см. также *-Пноэ*, *Спиро* [2]-.
ПНЕВМО [2]-, ПНЕВМОН(О)- (греч. pneumōn легкое, легкие) — относящийся к легким, легочный; см. также *Пульмо-*.
-ПНОЭ (греч. pnoē и pnoia дыхание, от pneō дышать) — относящийся к дыханию; напр., тахипноэ; см. также *Пневмо* [1]- (2), *Спиро* [2]-.
ПОД(О)-, -ПОДИЯ (греч. pus, podos нога, стопа) — относящийся к ноге, к стопе; напр., макроподия; см. также *-Пед-*.
ПОЙКИЛО-, -ПОЙКИЛИЯ (греч. poikilos пестрый, пятнистый, разнообразный; poikilia пестрота, пятнистость) — пестрый, пятнистый, многообразный; напр., остеопойкилия.
ПОЛИ- (греч. poly- от polys многий, многочисленный) — много, множество, множественный; больший, чем в норме; см. также *Мульти-*; противопол. *Мон-*.
ПОЛИО-, -ПОЛИО (греч. poliōs серый) — 1) относящийся к серому веществу головного или спинного мозга; 2) серый; напр., трихополиоз.
ПОЛЯР(И, О)- (лат. polaris полярный, от polus полюс) — относящийся к поляризации, противоположный.
ПОР(О)-, -ПОР(ИЯ) (греч. poros отверстие, проход, пора) — отверстие, проход, пора; напр., бластопор, диспория.
ПОСТ- (лат. наречие, предлог и приставка post) — находящийся позади, за чем-либо, следующий после чего-либо; соответствует русским предлогам «позади», «вслед за» и приставке «после-»; см. также *Мет-*; противопол. *Анте-*, *Пре-*, *Про-*.
-ПОЭЗ, -ПОЭТ- (греч. poiēsis выработка, образование; poiētikos способный вырабатывать, создавать; poieō вырабатывать, образовывать) — относящийся к созданию, к выработке чего-либо; напр., гемопоэз, эритропоэтины.
-ПРАКСИЯ (греч. praxis дело, действие, деятельность) — действие, деятельность; напр., эхопраксия.
ПРЕ- (лат. наречие, предлог и приставка prae) — находящийся впереди чего-либо, предшествующий чему-либо (во времени или в пространстве); соответствует русским предлогам «перед», «до» и приставкам «пред-», «до-»; см. также *Анте-*, *Про-*; противопол. *Пост-*.
ПРЕСБИ(О)- (греч. presbys старый, старший, старик) — свойственный старости, старческому возрасту; см. также *Гер-*.
ПРЕССО(Р)-, -ПРЕССИЯ, -ПРЕССУРА (лат. presso давить, жать; прижимать; pressorius сжимающий; pressio, pressus и pressura давление) — давление, сжатие; напр., пневмопрессия, акупрессура.
-ПРИВ- (лат. privus лишенный чего-либо) — лишенный чего-либо; напр., ренопривный фактор.
ПРО- (греч. предлог и приставка pro) — находящийся впереди, перед чем-либо, предшествующий чему-либо (во времени или в пространстве); соответствует русским предлогам «перед», «до» и приставкам «пред-», «до»; см. также *Анте-*, *Пре-*; противопол. *Мет-*, *Пост-*.
ПРОЗОП(О)-, -ПРОЗОП (греч. prosōpon лицо) — относящийся к лицу; напр., дипрозоп.
ПРОКТ(О)- (греч. prōktos задний проход) — относящийся к заднему проходу, к прямой кишке; см. также *Ано-*, *Ректо-*.
ПРОТ(О)- (греч. prōtos первый, первичный; prōton сначала) — 1) первый, первоначальный, первичный, предшествующий; 2) относящийся к восприятию красного цвета (первого из трех основных цветов).
ПСАММ(О)- (греч. psammos песок) — песок, песчаный, напоминающий песок.
-ПСАТИР- (греч. psathyros крошащийся, ломкий, хрупкий) — ломкость, хрупкость; напр., остеопсатироз.
ПСЕВД(О)- (греч. pseudēs ложный) — ложный, мнимый; соответствует русским компонентам сложных слов «ложно-», «лже-».
ПСИХ(О)-, -ПСИХИЯ (греч. psychē душа, дух, сознание; душевные свойства, душевное состояние; psychikos относящийся к душе, к душевным свойствам) — относящийся к психике; напр., олигопсихия; см. также *Френ-*(2).
ПСИХРО- (греч. psychros холодный, psychria холод) — холод, холодный, охлаждение.
ПТИАЛ-, -ПТИАЛ- (греч. ptyalon слюна) — относящийся к слюне, слюнный; напр., олигоптиализм; см. также *Салив-*, *Сиал-*.
ПУЛЬМО-, ПУЛЬМОН(О)- (лат. pulmo, pulmonis легкое) — относящийся к легкому, легочный; см. также *Пневмо-* [2].
ПУЛЬСО-, -ПУЛЬСИЯ (лат. pulsus удар, толчок, пульс, от pello, pulsum бить, толкать, приводить в движение) — толчок, пульсация; напр., латеропульсия.
-ПУНКТУРА (лат. punctura укол, от pungo, punctum колоть, жалить, прокалывать) — укалывание; напр., акупунктура.
-ПУНКЦИЯ (лат. punctio прокол, от pungo, punctum колоть, жалить, прокалывать) — прокол; напр., вентрикулопункция; см. также *-Центез*.
ПУПИЛЛ(О)- (лат. pupilla зрачок) — относящийся к зрачку; см. также *-Кория*.
ПЬЕЗО- (греч. piezō давить, сжимать) — относящийся к сжатию, к давлению, к пьезоэлектрическому эффекту.
РАБДО- (греч. rhabdos прут, палка, полоса) — 1) палочкообразный; 2) полосатый, поперечнополосатый.
РАДИКО-, РАДИКУЛ(О)- (лат. radix, radicis корень, уменьшительное radicula корешок) — относящийся к корешкам спинномозговых или черепномозговых (черепных) нервов.
РАДИО- (лат. radio излучать, испускать лучи; radius палочка, радиус, луч) — 1) относящийся к излучению; 2) относящийся к радиоактивности; 3) относящийся к радиотехнике.
-РАФИЯ (греч. rhaphē шов) — наложение хирургического шва; напр., блефарорафия.
РАХИ(О)-, -РАХИС, -РАХИЯ (греч. rhachis спинной хребет, спина, позвоночник) — относящийся к позвоночнику, к спинному мозгу; напр., гематорахис, гипогликорахия.
РЕ- (лат. приставка re-) — 1) повторность, возобновление, воспроизведение действия; 2) противоположное, обратное действие; 3) противодействие.
РЕВМАТО-, РЕВМО- (лат. rheuma и rheumatismus, от греч. rheuma и rheumatismos течение, истечение жидкости; патологические выделения) — относящийся к ревматизму, ревматический.
-РЕКСИС (греч. rhēxis ломка, дробление, разрушение, разрыв, трещина) — разрыв, разрушение, распад; напр., кариорексис.
РЕКТ(О)- (лат. rectus прямой; анат. rectum прямая кишка) — относящийся к прямой кишке; см. также *Прокт-*.
РЕН(О)-, -РЕНИЯ (лат. ren почка) — относящийся к почке, почечный; напр. арения; см. также *Нефр-*.
РЕО-, -РЕЯ (греч. rheō течь; rheos ток, поток; rhoia течение, истечение) — ток, поток, течение, истечение; напр., бронхорея.
РЕТИКУЛ(О)- (лат. reticulum, уменьшительное от rete сеть) — 1) сетчатый; 2) относящийся к ретикулярной ткани.
РЕТИН(О)- (анат. retina сетчатка глаза) — относящийся к сетчатке.
РЕТРО- (лат. наречие, предлог и приставка retro) — расположение позади, за чем-либо; направление назад, обратно, обратное действие.
-РЕЯ — см. *Рео-*.
РИЗ(О)- (греч. rhiza корень, начало, основание; rhizoō укреплять, фиксировать, пускать корни) — относящийся к корню, основанию чего-либо.
РИН(О)- (греч. rhis, rhinos нос) — относящийся к носу, к полости носа; см. также *Назо-*.
-РРАГИЯ (греч. rhagos разорванный, прорванный; rhēgnymi разрывать, раскалывать, прорывать) — кровотечение (геморрагия) из какого-либо органа; напр., гастроррагия.
РУБРО- (лат. ruber красный) — 1) красный; см. также *Эритр-*(1); 2) относящийся к красному ядру (анат. nucleus ruber).
САКР(О)- [лат. sacer священный, os sacrum крестец (в древности его называли «священным» как самую большую кость позвоночника)] — относящийся к крестцу, крестцовый.
САЛИВ(О)- (лат. saliva слюна) — относящийся к слюне, слюнный; см. также *Птиал-*, *Сиал-*.
САЛЬПИНГ(О), -САЛЬПИНКС (греч. salpinx, salpingos труба; анат. salpinx, salpingis маточная труба) — 1) относящийся к маточной трубе; напр., сактосальпинкс; см. также *Туб-* (3); 2) относящийся к слуховой трубе; см. также *Туб-*(2).
САН(О)-, САНИТАР- (лат. sanus здоровый; sano лечить, оздоровлять; sanitarius способствующий здоровью, благотворный) — относящийся к здоровью, к оздоровлению, к санитарии.
САПРО- (греч. sapros гнилой) — гнилой, гниющий, относящийся к гниению.
САРК(О)- (греч. sarx, sarkos мясо, плоть; sarkōma мясистый нарост; шишка, опухоль) — 1) относящийся к мышцам, к мышечной ткани, к мясу; см.

также *Карн-*; 2) относящийся к саркоме.
СЕ- (лат. приставка se-) — отделение, выделение чего-либо; соответствует русским приставкам «от-», «вы-», «из-».
СЕБО- (лат. sebum сало) — 1) относящийся к кожному салу, к жиру; см. также *Адип-*, *Лип-*, *Стеат-*; 2) относящийся к сальной железе.
СЕКС(О)-, СЕКСУАЛ- (лат. sexus пол, sexualis половой) — относящийся к полу, половой.
-СЕКТОР, -СЕКЦИЯ (лат. seco, sectum разрезать, рассекать, оперировать; sectio разрезание, рассечение) — относящийся к рассечению; напр., диссектор, вивисекция; см. также *Томо-*(2).
СЕМИ- (лат. приставка semi-) — полу-, наполовину; см. также *Геми-*.
СЕМИО-, -СЕМИЯ (греч. sēma и sēmeion знак, признак) — знак, значение; напр., асемия.
СЕНСИ-, СЕНСИБИЛ-, СЕНСО(Р)- (лат. sensus чувство, ощущение, восприятие; сознание; sensibilis чувствительный; sensorius относящийся к чувствам, к ощущениям) — 1) относящийся к чувствам, к ощущениям, к восприятию; см. также *Эстезио-*; 2) относящийся к чувствительности.
СЕПС-, СЕПТИК(О)-, СЕПТИЦ- (греч. sēpsis гниение, sēptikos гнилостный, вызывающий гниение) — 1) относящийся к гниению; 2) относящийся к гнойной инфекции.
СЕРО- (лат. serum сыворотка) — 1) относящийся к сыворотке крови, сывороточный; 2) относящийся к серозной жидкости, серозной железе.
СИАЛ(О)-, -СИАЛИЯ (греч. sialon слюна) — относящийся к слюне, к слюнной железе; напр., олигосиалия; см. также *Птиал-*, *Салив-*.
СИГМО-, СИГМОИДО-, -СИГМА (лат. sigma Romanum название буквы «s»; анат. colon sigmoideum сигмовидная кишка) — 1) имеющий S-образную форму; 2) относящийся к сигмовидной ободочной кишке; напр., долихосигма.
СИДЕР(О)- (греч. sidēros железо) — относящийся к железу, содержащий железо.
СИМ- — см. *Син-*.
СИМПАТ(О)-, СИМПАТИКО- (греч. sympathēs испытывающий сходное чувство, страдание; sympatheō испытывать сходное чувство, страдание; анат. pars sympathica симпатическая часть вегетативной нервной системы) — относящийся к симпатической части вегетативной нервной системы.
СИН- (греч. наречие, предлог и приставка syn), перед «б», «м», «п», «ф» изменяется в СИМ-(sym-) — соединение, совместность действия, одновременность, взаимодействие; соответствует русским приставкам «с-», «со-»; см. также *Ком-*.
-СИНДЕЗ (греч. syndesis связывание, соединение, стягивание, сжатие) — связывание, соединение; напр., парасиндез; см. также *-Дез*.
СИНИСТРО- (лат. sinister левый) — левый, левосторонний; см. также *Лево-*; противопол. *Декстро-*.
СИРИНГ(О)- (греч. syrinx, syringos трубка, трубчатая полость) — относящийся к какому-либо полому образованию, напр., каналу, свищу.
СКИА- (греч. skia тень) — относящийся к тени, к теневому изображению.
СКЛЕР(О)- (греч. sklēros плотный, твердый; анат. sclera склера) — 1) твердый, уплотненный; 2) относящийся к склере.
СКОПО-, -СКОП(ИЯ) (греч. skopeō смотреть, рассматривать, наблюдать, исследовать) — относящийся к рассматриванию, наблюдению, исследованию, преимущественно визуальному; напр., гастроскоп, ларингоскопия.
СКОТ(О)- (греч. skotos темнота; skotoō затемнять, темнеть) — 1) относящийся к темноте, к потемнению; 2) относящийся к скотоме.
СОМАТ(О)-, -СОМА-, -СОМИЯ (греч. sōma, sōmatos тело, нечто материальное) — относящийся к телу, телесный; напр., хромосома, микрогенитосомия; см. также *Корпор-*.
СОМН-, -СОМНИЯ (лат. somnus сон; somnium сон, сновидение) — относящийся к состоянию сна; напр., гиперсомния; см. также *Гипн-*(1).
СПАЦИО- (лат. spatium пространство) — относящийся к пространству, пространственный.
СПЕРМАТ(О)-, СПЕРМИО-, СПЕРМО-, -СПЕРМИЯ (греч. sperma, spermatos или spermeion, семя, сперма) — относящийся к сперме, к сперматозоидам; напр., азооспермия.
СПИН(О)- (лат. spina шип, ость, хребет, позвоночник) — относящийся к позвонкам, к позвоночнику, к спинному мозгу; см. также *Спондил-*.
СПИР-, СПИРО [1]-, -СПИРА (греч. speira извилина, завиток; лат. spira изгиб, виток) — спирально изогнутый; напр., лептоспиры.
СПИРО [2]- (лат. spiro, spiratum дуть, дышать, выдыхать) — относящийся к дыханию; см. также *Пневм-*(2), *-Пноэ*.
СПЛАНХН(О)- (греч. splanchna внутренности) — 1) относящийся к внутренним органам; см. также *Висцер-*; 2) относящийся к чревному нерву (nervus splanchnicus).
СПЛЕН(О)-, -СПЛЕНИЗМ, -СПЛЕНИЯ (греч. splēn селезенка) — относящийся к селезенке; напр., гиперспленизм, микроспления; см. также *Лиен-*.
СПОНГИО-, -СПОНГИЙ (греч. spongia губка) — пористый, напоминающий губку; напр., миелоспонгий.
СПОНДИЛ(О)-, -СПОНДИЛИЯ (греч. spondylos позвонок, spondyloi позвонки, позвоночник) — относящийся к позвонкам, к позвоночнику; напр., платиспондилия; см. также *Спин-*.
СПОРИ-, СПОРО-, -СПОРИЯ (греч. spora посев, семя) — относящийся к спорам; напр., микроспория.
-СТАЗ(ИЯ) (греч. stasis стояние, неподвижность; histēmi останавливать, стоять, уравновешивать) — стояние, неподвижность, застой, задержка, равновесие; напр., гомеостаз, холестаз, астазия.
СТАТО-, -СТАТ(ИКА) (греч. statos установленный, неподвижный, statikos останавливающий, устанавливающий, от histēmi останавливать, стоять, устанавливать, уравновешивать) — стоящий, установленный, устанавливающий, неподвижный, относящийся к равновесию, занимающий определенное положение; напр.: термостат, цитостатики.
СТАФИЛ(О)-, -СТАФИЛИЯ (греч. staphylē виноградная гроздь, виноград; набухший небный язычок) — 1) похожий на виноградную гроздь, на виноград; 2) относящийся к мягкому небу; напр., гипсистафилия; 3) относящийся к стафилококкам.
СТЕАТ(О)- (греч. stear, steatos жир, сало) — относящийся к жирам, содержащий жиры; см. также *Адип-*, *Лип-*, *Себо-*(1).
СТЕН(О)-, СТЕНОТ- (греч. stenos узкий, тесный; stenotēs узость, ограниченность; stenōsis сужение) — сужение, относящийся к сужению.
-СТЕН- (греч. sthenos сила) — 1) относящийся к силе, к состоянию активности; напр., гиперстеническая конституция; 2) относящийся к плотности (массе единицы объема вещества); напр., гипостенурия.
СТЕРЕО- (греч. stereos твердый, прочный; объемный, пространственный) — 1) пространственный; 2) постоянный, неизменный, устойчивый.
СТЕРКО- (лат. stercus кал) — относящийся к калу, каловый; см. также *Копр-*.
СТЕРНО- (греч. sternon грудь, грудная клетка, грудина; анат. sternum грудина) — относящийся к грудине.
СТЕТО- (греч. stēthos грудь) — относящийся к груди, к грудной клетке; см. также *Торак-*.
СТОМАТ(О)-, СТОМО-, -СТОМА, -СТОМИЯ (греч. stoma, stomatos рот, отверстие) — 1) отверстие, образование отверстия (анастомоза); напр., гастростома, уретероилеостомия; 2) относящийся ко рту, к полости рта; напр., микростома.
СТРЕПТО- (греч. streptos крученый, витой; ожерелье, цепочка) — 1) имеющий вид цепочки; 2) относящийся к стрептококкам.
СУБ- (лат. предлог и приставка sub), изменяется перед «г» в **СУГ-**, перед «п» — в **СУП-** или в **СУС-**, перед «ц» — в **СУК-** — 1) расположение под чем-либо, ниже чего-либо; подчинение; см. также *Гип-*(1), *Инфра-*; противопол. *Супра-*; 2) неполнота качества, свойства, выраженного последующей частью слова; соответствует русским словам «немного», «несколько», «не в полной мере»; см. также *Гип-*(2).
СУГ- — см. *Суб-*.
СУК- — см. *Суб-*.
СУЛЬФ(О)- (лат. sulfur и sulphur сера) — содержащий серу, серную кислоту; см. также *Тио-*.
СУП- — см. *Суб-*.
СУПЕР- (лат. наречие, предлог и приставка super) — 1) нахождение сверху, над чем-либо; соответствует русской приставке «над-»; см. также *Гипер-*(1), *Супра-*; противопол. *Гип-*(1), *Инфра-*, *Суб-*(1); 2) превышение; соответствует русским предлогам «кроме», «сверх» и приставкам «сверх-», «пре-»; см. также *Гипер-*(2); противопол. *Гип-*(2), *Суб-*(2).
СУПРА- (лат. наречие, предлог и приставка supra) — нахождение сверху, вверху, над чем-либо, поверх, выше чего-либо; соответствует русским предлогам и приставкам «над», «на», «поверх», «выше»; см. также *Супер-*(1); противопол. *Гип-*(1), *Инфра-*, *Суб-*(1).
СУРДО- (лат. surdus глухой) — 1) относящийся к тугоухости, к глухоте; см. также *Кофо-*; 2) характеризующийся отсутствием звуковых раздражителей.
СУС- — см. *Суб-*.
СФЕРО- (греч. sphaira шар) — шаровидный, имеющий сферическую поверхность; см. также *Глобул-*(1).
СФИГМО-, -СФИГМИЯ, -СФИКСИЯ (греч. sphygmos и sphyxis пульс, пуль-

сация) — относящийся к пульсу, к пульсации; напр., микросфигмия, асфиксия.

-СХИЗ(ИС) — см. *Шиз-*.

ТАКСО-, -ТАКСИС, -ТАКСИЯ (греч. taxis порядок, устройство, расположение, от tassō, будущее время taxō приводить в порядок, располагать в определенном порядке) — порядок, расположение по порядку, движение в определенном направлении; напр., хемотаксис, атаксия.

ТАЛАМ(О)- (греч- thalamos комната, внутренние покои; анат. thalamus таламус) — относящийся к таламусу (зрительному бугру).

ТАЛАСС(О)- (греч. thalassa море) — относящийся к морю, морской.

ТАНАТО-, -ТАНАЗИЯ (греч. thanatos смерть) — относящийся к смерти; напр., эйтаназия.

ТАРЗ(О)-, -ТАРЗУС (греч. tarsos плоская поверхность, подошвенная поверхность стопы, край века; анат. tarsus предплюсна, tarsus palpebrae хрящ века) — 1) относящийся к хрящу века; напр., эпитарзус; 2) относящийся к предплюсне.

ТАХИ(СТО)-, ТАХО- (греч. tachys скорый, быстрый, tachistos скорейший, быстрейший; tachos скорость) — быстрый, частый, скорость, частота; противопол. *Бради-*.

ТЕК(А, О)-, -ТЕКА (греч. thēkē ящик, вместилище, коробка; гист. theca оболочка, тека) — относящийся к полому образованию, к оболочке; напр., кариотека.

ТЕЛ [1](Е, ЕО, О)- (греч. tēle далеко; telos конец, завершение, достижение цели; teleios и teleos завершенный; teleō завершать, заканчивать) — 1) отдаленный; 2) относящийся к окончанию, завершенный, конечный; 3) относящийся к телеметрии, к телевидению.

ТЕЛ [2]-, -ТЕЛИЙ, -ТЕЛИЯ (греч. thēlē грудной сосок) — 1) сосок молочной железы; напр., гипертелия; 2) слой клеток, покров; напр., эндотелий.

ТЕЛЕ- — см. *Тел* [1]-.

ТЕЛЕО- — см. *Тел* [1]-.

ТЕЛО- — см. *Тел* [1]-.

-ТЕНА — см. *Тенио-*.

ТЕНДИН-, ТЕНДО- (лат. tendo, tendinis сухожилие) — относящийся к сухожилию; см. также *Тено-*.

ТЕНЗИО-, -ТЕНЗИЯ (лат. tensio напряжение, от tendo, tensum тянуть, вытягивать, напрягать) — относящийся к напряжению, давлению, растяжению; напр., гипертензия; см. также *Тон-*(1).

ТЕНИ(О)-, -ТЕНА, -ТЕНИЯ (греч. tainia повязка, лента, полоса; лат. taenia лента, полоса; ленточный червь) — 1) полоса, нить; напр., амфитена, политения; 2) относящийся к ленточным червям.

ТЕНО- (греч. tenōn сухожилие) — относящийся к сухожилию; см. также *Тендин-*.

ТЕРАТ(О)- (греч. teras, teratos чудовище, урод, уродство) — относящийся к аномалиям развития, к уродствам.

ТЕРМ(О)-, -ТЕРМИЯ (греч. thermē теплота, жар; лихорадочное состояние; thermos теплый) — относящийся к теплу, к температуре; напр., гипотермия.

ТЕТАН(О)- (греч. tetanos судорожное напряжение, столбняк; лат. tetanus столбняк) — относящийся к столбняку, к судорожному сокращению мышц.

ТЕТРА- (греч. tetra четыре) — четыре, четверной; см. также *Квадри-*.

ТИМ(О) [1]- (греч. thýmos вилочковая железа, от thýmos или thýmon растение тимьян, с плодными головками к-рого железа сходна по структуре) — относящийся к вилочковой железе.

ТИМ(О) [2]-, -ТИМИЯ (греч. thymós душа, настроение, чувство) — относящийся к настроению, к чувству; напр., дистимия.

ТИМПАН(О)- [греч. tympanon (лат. tympanum) барабан] — 1) относящийся к барабанной перепонке (анат. membrana tympani); см. также *Миринг-*; 2) относящийся к барабанной полости (анат. cavum tympani).

ТИО- (греч. theion сера) — содержащий серу; см. также *Сульф-*.

-ТИП, -ТИПИЯ (греч. typos отпечаток, образец, тип) — образец, модель, общность; напр., генотип, стереотипия.

ТИРЕО(ИД)-, ТИРО- (греч. thyreoeidēs щитовидный, от thyreos щит + -eidēs подобный) — 1) относящийся к щитовидной железе (анат. glandula thyroidea); 2) относящийся к щитовидному хрящу (анат. cartilago thyroidea).

ТИФЛ(О)- (греч. typhlos слепой, typhlon слепая кишка) — 1) относящийся к слепой кишке; см. также *Цеко-*; 2) относящийся к слепоте.

ТОКО- (греч. tokos роды) — относящийся к родам, к родовой деятельности.

ТОКС(И, ИК, ИКО, О)-, -ТОКС(ИК)- [греч. toxon лук, стрела toxikon (pharmakon) — яд, которым смазывали стрелы, от toxikos относящийся к луку и стреле] — ядовитый, токсический, относящийся к ядам, к отравляющим веществам; напр., интоксикация.

ТОМО-, -ТОМ(ИЯ) (греч. tomos отрезок, пластинка, слой; tomē разрез, рассечение, temnō резать, разрезать, рассекать) — 1) относящийся к слою чего-либо, послойный; 2) относящийся к рассечению; напр., гониотом, лапаротомия; см. также *-Сектор*.

ТОН(О)-, -ТОНИЯ, -ТОНУС (греч. tonos натяжение, напряжение; лат. tonus натяжение) — напряжение, натяжение, давление; напр., дистония, офтальмотонус; см. также *Тензио-*.

ТОП(О)-, -ТОП(ИЯ) (греч. topos место, местность; положение; topikos относящийся к определенному месту; topizō сосредоточивать, локализовать) — относящийся к определенному месту, положению, локализации; напр., биотоп, дистопия; см. также *Лок-*.

ТОРАК(О)-, -ТОРАКС (греч. thōrax, thōrakos грудь, грудная клетка) — относящийся к груди, к грудной клетке, к грудной полости; напр., пневмоторакс; см. также *Стето-*.

ТОРСИОН(О)-, ТОРТ(О)-, -ТОРСИЯ (лат. torqueo, tortum вращать, скручивать, torsio, torsionis вращение, скручивание, tortilis крученый, витой, изогнутый) — поворот, вращение; напр., декстроторсия; см. также *-Версия*.

ТРАНС- (лат. предлог и приставка trans) — движение, направление через, сквозь что-либо, нахождение за пределами чего-либо; соответствует русским предлогам и приставкам «через», «сквозь», «пере-», «за»; противоп. *Цис-*.

ТРАХЕЛО- (греч. trachēlos шея, шейка) — относящийся к шейке матки; см. также *Цервик-*(1).

-ТРЕЗИЯ, -ТРЕМА (греч. trēsis и trēma отверстие) — отверстие; напр., атрезия, геликотрема.

ТРИ- (лат. tres, tria; греч. treis, tria три) — три, тройной.

-ТРИБ, -ТРИПСИЯ, -ТРИПТОР (греч. tribō, будущее время tripsō тереть, давить, дробить; thryptō крошить, дробить; tripsis, thrypsis и trypsis трение, растирание, раздавливание, раздробление) — относящийся к раздавливанию, к раздроблению; напр., кефалотриб, ангиотрипсия, литотриптор.

ТРИГОН(О)- (греч. trigōnon треугольник, от treis три + gōnia угол) — 1) треугольный; 2) относящийся к мочепузырному треугольнику (анат. trigonum vesicae).

-ТРИКС — см. *Трих-*.

-ТРИПСИЯ — см. *-Триб*.

-ТРИПТОР — см. *-Триб*.

ТРИХ(О)-, -ТРИКС, -ТРИХ(ИЯ) (греч. thrix, trichos волос) — относящийся к волосам, к жгутикам; напр., монилетрикс, монотрих, ахромотрихия; см. также *Пило-*.

ТРОМБ(О)- (греч. thrombos сгусток, сгусток крови, тромб) — 1) относящийся к тромбу, к тромбообразованию; 2) относящийся к тромбоцитам.

ТРОП(О)-, -ТРОП-, -ТРОПИЯ (греч. tropos поворот, направление, способ или образ действия; tropē поворот, направление, изменение) — направление, направленность действия, способ или образ действия; напр., психотропные средства, гетеротропия.

ТРОФ(О)-, -ТРОФ(ИЯ) (греч. trophē питание) — относящийся к питанию, связанный с питанием; напр., аутотрофы, дистрофия.

ТРОХО- (греч. trochos колесо, круг) — имеющий округлую форму, вращающийся.

ТУБ(О)- (лат. tuba труба) — 1) труба, трубка; 2) относящийся к слуховой трубе (анат. tuba auditiva); см. также *Сальпинг-*(2); 3) относящийся к маточной трубе (анат. tuba uterina); см. также *Сальпинг-*(1).

ТУБЕРКУЛ(О)- (лат. tuberculum бугорок, уменьшительное от tuber бугор) — относящийся к туберкулезу; см. также *Фтиз-*(2).

ТУБО- — см. *Туб-*.

ТУБУЛ(О)- [лат. tubulus (уменьшительное от tubus) и tubula (уменьшительное от tuba) трубка, трубочка] — имеющий форму трубки, относящийся к трубкам, канальцам.

УВЕ(О)- (лат. uva виноградная гроздь, виноград; анат. устар. uvea сосудистая оболочка глаза) — относящийся к сосудистой оболочке глаза.

УНИ- (лат. unus один) — один, единственный, единичный; соответствует русскому компоненту сложных слов «одно-»; см. также *Мон-*; противопол. *Мульти-*, *Поли-*.

УР(О)-, -УРЕЗ, -УРИЯ (греч. uron моча, urēsis мочеобразование) — относящийся к моче, к мочевой системе, к мочеобразованию; напр., диурез, гематурия.

УРАНО- (греч. uranos небесный свод, небо; нёбо) — 1) относящийся к нёбу; см. также *Палат-*; 2) относящийся к небу.

-УРГИЯ — см. *Эрго-*.

-УРЕЗ — см. *Ур-*.

УРЕТЕР(О)-, -УРЕТЕР (греч. urētēr, анат. ureter мочеточник) — относящийся к мочеточнику; напр., мегауретер.

УРЕТР(О)- (греч. urēthra, анат. urethra мочеиспускательный канал) — относящийся к мочеиспускательному каналу.
-УРИЯ — см. *Ур-*.
УРО- — см. *Ур-*.
ФАГО-, -ФАГ(ИЯ) (греч. phagein есть, поедать, пожирать, поглощать; phagos пожирающий) — 1) относящийся к процессу еды, к глотанию; напр., аэрофагия; 2) относящийся к поглощению, поглощающий; напр., нейронофаг; 3) относящийся к бактериофагу или близкий к нему; напр., актинофаг.
-ФАЗИЯ (греч. phasis выражение, высказывание, речь) — относящийся к речи, к произношению; напр., эмболофазия; см. также *-Артрия, Лало-, Лог-*(1), *-Фем-, -Фразия*.
ФАКО-, -ФАКИЯ (греч. phakos чечевица; нечто, имеющее форму чечевицы) — 1) относящийся к хрусталику глаза; напр., афакия; см. также *Лента-*(1); 2) относящийся к линзе; напр., кератофакия.
ФАЛЛ(О)-, -ФАЛЛИЯ (греч. phallos половой член) — относящийся к половому члену; напр., дифаллия.
-ФАНЕРОЗ (греч. phaneros видимый, очевидный; phanerōsis выявление, проявление) — видимый, очевидный, проявляющийся; напр., липофанероз, фетофанероз; см. также *Фено-*.
ФАРИНГ(О)- (греч. pharynx, pharyngos глотка) — относящийся к глотке.
ФАРМАКО-, ФАРМАЦ- (греч. pharmakon лекарство; лат. pharmacia, от греч. pharmakeia применение, употребление лекарств) — относящийся к лекарственным веществам или средствам.
ФАСЦ(И, ИО)- (лат. fascia повязка, свивальник, полоса; анат. фасция) — относящийся к фасции.
-ФЕМ-, -ФЕМИЯ (греч. phēmi говорить) — относящийся к речи; напр., афеместезия, тахифемия; см. также *-Артрия, Лало-, Лог-*(1), *-Фазия, -Фразия*.
ФЕНО-, -ФЕН- (греч. phainō являть, проявлять, являться, проявляться) — явление, проявление, признак; напр., евфеника; см. также *-Фанероз*.
-ФЕР- (лат. fero нести, приносить; рождать, производить; ferens, ferentis несущий) — несущий, производящий, порождающий; напр., пролиферация; см. также *-Фор*.
ФЕТ(О)- (лат. fetus потомок, отпрыск) — относящийся к плоду, к фетальному периоду; см. также *Киемат-, Эмбрио-*.
ФИБР(О)-, ФИБРИЛЛ(О)- (лат. fibra волокно, fibrilla волоконце) — относящийся к волокнам, к волокнистой ткани, волокнистый.
ФИЗИО-, ФИТО(Н)-, -ФИЗ, -ФИТ (греч. phyō, будущее время physō порождать, производить на свет, создавать; phyomai расти, возникать; physis природные свойства, природа; рост; phyton нечто вырастающее, растение) — 1) вырастающий, образовавшийся; напр., диафиз, остеофит; 2) относящийся к природе, к природным свойствам; 3) относящийся к физическим факторам; 4) относящийся к растениям.
-ФИКАЦИЯ (лат. ficatio, от facio делать, формировать) — образование, формирование, превращение; напр., карнификация.
ФИЛ [1]-, ФИЛО [1]-, -ФИЛИЯ [1] (греч. phylon род, племя) — относящийся к роду, виду, классу; напр., полифилия.
ФИЛ [2]-, ФИЛО [2]-, -ФИЛАМЕНТ (лат. filum нить, ткань; filamentum нить) — относящийся к нити, нитевидный; напр., нейрофиламент; см. также *Мито-*(1).
ФИЛО [3]-, -ФИЛ, -ФИЛИЯ [2] (греч. phileō любить, иметь расположение, склонность; philos любящий; philia любовь, влечение, склонность) — относящийся к сродству, склонности, влечению к чему-либо; напр., базофил, партенофилия.
-ФИТ — см. *Физио-*.
ФИТО(Н)- — см. *Физио-*.
ФЛАВ(О)- (лат. flavus желтый) — желтый; см. также *Ксант-*.
ФЛЕБ(О)- (греч. phleps, phlebos вена) — относящийся к венам.
-ФЛЕКСИЯ (лат. flexio сгибание, изгиб, поворот, от flecto, flexum гнуть, сгибать, поворачивать, отклонять) — изгиб, поворот, отклонение; напр., антефлексия.
ФЛЮОР(И, О)- (лат. fluor течение, поток, fluo течь, струиться; Fluorum фтор) — 1) относящийся к флюоресценции, флюоресцирующий; 2) содержащий фтор.
ФОБО-, -ФОБИЯ (греч. phobos страх, боязнь; phobeō пугаться, бояться) — относящийся к боязни чего-либо, страху перед чем-либо, болезненное отвращение к кому-либо или чему-либо; напр., клаустрофобия.
ФОН(О)-, -ФОНИЯ (греч. phōnē звук, голос) — относящийся к звуку, к голосу; напр., бронхофония.
ФОР-, -ФОР(ЕЗ, ИЯ) (греч. phoreō нести, переносить; phorēsis несение, перенос; phoros несущий) — перенос, направление; напр., психрофор, ионофорез, гетерофория; см. также *-Фер-*.
-ФОРМНЫЙ (лат. -formis похожий, подобный, от forma форма, вид, внешность) — имеющий вид предмета, обозначенного предыдущей частью слова; напр., филиформный; см. также *-Идный, -Морфный*.
ФОТ(О)- (греч. phōs, phōtos свет) — 1) относящийся к свету, к оптическому излучению; 2) относящийся к фотографии.
-ФРАГМА (греч. phragma заграждение, перегородка) — преграда, перегородка; напр., диафрагма.
-ФРАЗИЯ (греч. phrasis речь, оборот речи, выражение; манера речи) — относящийся к речи, к способности говорить; напр., брадифразия; см. также *-Артрия, Лало-, Лог*-(1), *-Фазия, -Фем-*.
ФРЕНО-, ФРЕНИКО-, -ФРЕНИЯ [греч. phrēn грудобрюшная преграда, диафрагма (в этом значении обычно форма множественного числа — phrenes); средоточие чувств, душевных свойств; душа, ум, разум]—1) относящийся к уму, к психике человека; напр., шизофрения; см. также *Псих-*; 2) относящийся к диафрагме; 3) относящийся к диафрагмальному нерву (nervus phrenicus).
ФТИЗ(ИО)-, -ФТИЗ (греч. phthisis истощение, угасание, чахотка) — 1) истощение, разрушение какого-либо органа или ткани; напр., миелофтиз; 2) относящийся к туберкулезу; см. также *Туберкул-*.
ФУЗИ-, ФУЗО-, -ФУЗ- (лат. fusus веретено) — веретено, имеющий форму веретена; напр., интрафузальное мышечное волокно.
ФУЗИО-, -ФУЗИЯ (лат. fundo, fusum лить, течь; fusio истечение, литье) — относящийся к течению жидкости, к слиянию чего-либо; напр., перфузия.
ФУЗО- — см. *Фузи-*.
ФУНГИ- (лат. fungus гриб) — относящийся к грибам, к паразитическим грибкам; см. также *Мик-*.
ФУНИКУЛ(О)- (лат. funiculus канатик) — относящийся к какому-либо канатику, чаще к семенному (funiculus spermaticus).
ХЕЙЛ(О)-, -ХЕЙЛИЯ (греч. cheilos губа) — относящийся к губам; напр., ахейлия.
ХЕЙРО-, ХИР(О)-, -ХЕЙРИЯ-, -ХИРИЯ (греч. cheir рука) — относящийся к рукам, выполняемый с помощью рук; напр., ахейрия, дихирия.
ХЕМИ- — см. *Химио-*.
ХЕМО- — см. *Химио-*.
ХИЛ(О)-, -ХИЛИЯ (греч. chylos сок, млечный сок, хилус) — 1) относящийся к лимфе, содержащий лимфу; см. также *Лимф-*; 2) относящийся к желудочному соку; напр., ахилия.
ХИМИО-, ХЕМИ-, ХЕМО- (лат. chymia, от греч. chymeia и chēmeia искусство плавления металлов) — относящийся к химии, к химическим элементам и соединениям.
ХИР(О)- — см. *Хейро-*.
-ХИРИЯ — см. *Хейро-*.
ХЛОР(О)-, -ХЛОР- (греч. chloros зеленовато-желтый, бледно-зеленый; Chlorum хлор) — 1) зеленый; напр., ахлоропсия; 2) содержащий хлор или хлориды; напр., гипохлоремия.
ХОЛ(Е)-, -ХОЛИЯ (греч. cholē желчь) — относящийся к желчи, желчный; напр., ахолия; см. также *Били-*.
ХОЛЕДОХ(О)- (греч. cholēdochus принимающий, вмещающий желчь, от cholē желчь + dochē вместилище, сосуд, dechomai принимать; анат. ductus choledochus желчный проток) — относящийся к общему желчному протоку.
-ХОЛИЯ — см. *Хол-*.
ХОНДР(О)- (греч. chondros зерно; хрящ) — относящийся к хрящу, хрящевой.
-ХОР — см. *Хоро-*.
ХОРИО(ИД)- (греч. chorioeidēs похожий на хорион, от chorion кожа, оболочка, плодная оболочка, хорион + -eidēs подобный) — 1) относящийся к собственно сосудистой оболочке глаза (chorioidea); 2) относящийся к сосудистым сплетениям желудочков мозга (plexus chorioideus).
ХОРО-, -ХОР(ИЯ) (греч. chōros место, местность, участок, область) — место, участок; напр., кинетохор, аллохория.
ХРОМ(О)-,ХРОМАТ(О)-,-ХРОМ(ИЯ) (греч. chrōma, chrōmatos кожа, цвет кожи, краска, окраска, цвет) — относящийся к цвету, окраске; напр., урохром, анизохромия.
ХРОН(О)- (греч. chronos время) — относящийся к времени, временной.
ЦЕКО- (лат. intestinum caecum слепая кишка, от caecus слепой; анат. cecum слепая кишка) — относящийся к слепой кишке; см. также *Тифл-*(1).
-ЦЕЛЕ (греч. kēlē выбухание, выпячивание, припухлость; грыжа) — выбухание, припухлость, грыжа; напр., гематоцеле; см. также *Грыжо-*.
ЦЕЛИО-, КЕЛИО-, -ЦЕЛЬ (греч. koilos полый, koilia полость, брюшная полость) — 1) полый, относящийся к полости; напр., бластоцель; 2) относящийся к брюшной или брюшинной по-

лости; см. также *Абдомин-*, *Вентро-*, *Лапаро-*.

-ЦЕНОЗ (греч. koinos общий) — общность условий развития, распространенность какого-либо явления, процесса; напр., паразитоценоз.

-ЦЕНТЕЗ (греч. kentēsis укол, прокол) — прокол; напр., лапароцентез; см. также *-Пункция*.

-ЦЕПТОР, -ЦЕПЦИЯ (лат. capio, cepi, captum брать, принимать) — относящийся к восприятию раздражителя; напр., проприоцептор, интероцепция.

ЦЕРВИК(О)-, ЦЕРВИЦ- (лат. cervix, cervicis шея, шейка, горлышко; анат. cervix uteri шейка матки) — 1) относящийся к шейке матки; см. также *Трахело-*; 2) относящийся к шее.

ЦЕРЕБР(О)- (лат. cerebrum головной мозг) — относящийся к головному мозгу; см. также *Энцефал-*.

ЦЕФАЛ(О)-, КЕФАЛ(О)-, -ЦЕФАЛИЯ (греч. kephalē голова) — относящийся к голове; напр., микроцефалия.

ЦИАНО-, -ЦИАН- (греч. kyanos темно-синий) — имеющий темно-синюю окраску, синюшный; напр., акроцианоз.

-ЦИД-, -ЦИД (лат. caedo бить, рубить, рассекать, убивать) — убивающий, уничтожающий; напр., бактерицидность, пестицид.

ЦИКЛ(О)- (греч. kyklos круг, окружность; нечто, имеющее округлую форму; глаз) — 1) круглый; 2) связанный с циклом; 3) относящийся к глазному яблоку; 4) относящийся к ресничному телу.

ЦИС- (лат. приставка cis-) — расположение по эту сторону, на той же стороне; противопол. *Транс-*.

ЦИСТ(О)-, -ЦИСТА (греч. kystis пузырь, мешок; мочевой пузырь; позднелатинское cysta киста) — 1) полость, пузырь; напр., ооциста; 2) мочевой пузырь; см. также *Везик-*; 3) относящийся к кисте, кистозный; см. также *Кист-*.

ЦИТО-, ЦИТ (греч. kytos пустота, полость, сосуд, вместилище; гист. cytus клетка) — относящийся к клетке, клеточный; напр., лейкоцит.

ШИЗ(О)-, -ШИЗО-, -СХИЗИС, -ШИЗИС (греч. schisis расщепление, раскалывание, разделение; schizō раскалывать, разделять) — 1) разделение, расщепление; напр., рахисхизис, онихошизис; 2) относящийся к нарушению психики, к шизофрении; 3) относящийся к шизонтам; напр., гематошизотропные средства.

Э- — см. *Экс-*.

ЭВ- — см. *Эу-*.

ЭВРИ- — см. *-Ейриз*.

ЭЗО- (греч. наречие и предлог eisō и esō внутрь, внутри) — направленный внутрь, сходящийся.

ЭЗОФАГ(О)- [греч. oisophagos пищевод, от oisō (будущее время глагола pherō нести) + phagein поедать; анат. esophagus, oesophagus пищевод] — относящийся к пищеводу.

ЭЙ- — см. *Эу-*.

ЭК-, ЭКЗ [1]**-** (греч. предлог и приставка ek, перед гласными ex) — вне, за пределами чего-либо; противопол. *Эн-*.

ЭКВИ- (лат. aequus ровный, соразмерный, равный) — равный, одинаковый.

ЭКЗ [1]**-** — см. *Эк-*.

ЭКЗ [2]**-** — см. *Экс-*.

-ЭКЗЕРЕЗ (греч. exaireō вынимать; exairēsis вынимание, изъятие, извлечение) — изъятие, иссечение; напр., френикоэкзерез.

ЭКЗО- (греч. exō вне, снаружи, извне) — вне, снаружи, извне, внешний, наружный; см. также *Экстеро-*, *Экто-*; противопол. *Интра-*, *Интро-*, *Энд-*, *Энт-*.

ЭКО-, -ОЙКИЯ (греч. oikos дом, жилище, место обитания) — относящийся к месту обитания, к окружающей среде; напр., энтойкия.

ЭКС-, перед гласными **ЭКЗ-**, перед согласными иногда **Э-** (лат. предлог и приставка ex, e) — удаление, извлечение чего-либо, лишение чего-либо, освобождение от чего-либо; соответствует русским приставкам «из-», «от-», «вы-»; противопол. *Ин-*(1).

ЭКСТЕРО- (лат. exter и exterus находящийся вне, наружный, внешний) — находящийся вне, за пределами чего-либо, внешний; см. также *Экзо-*, *Экто-*; противопол. *Интра-*, *Интро-*, *Энд-*, *Энт-*.

ЭКСТРА- (лат. наречие, предлог и приставка extra) — вне, сверх; противопол. *Интра-*.

-ЭКТАЗ(ИЯ), -ЕКТАЗ (греч. ektasis растягивание, расширение) — растягивание, расширение; напр., бронхоэктаз, ангиэктазия, ателектаз.

ЭКТО- (греч. ektos вне, снаружи) — вне, снаружи, внешний, наружный; см. также *Экзо-*, *Экстеро-*; противопол. *Интра-*, *Интро-*, *Энд-*, *Энт-*.

-ЭКТОМ(ИЯ) (греч. ektomē вырезание, иссечение, удаление, от ek из + tomē разрез, рассечение) — относящийся к иссечению, удалению какого-либо органа или ткани; напр., стенозэктом, эмболэктомия.

ЭЛАСТ(О)- [лат. elasticus упругий, от греч. elastos тягучий, вязкий (о металле)] — 1) упругий, эластичный; 2) относящийся к эластическим волокнам или к эластической ткани.

ЭЛЕКТРО- (от греч. ēlektron янтарь) — электрический, обусловленный электрическими явлениями, связанный с электрическими полями или током.

ЭМ- — см. *Эн-*.

ЭМБРИО- (греч. embryon утробный плод, зародыш, эмбрион) — относящийся к эмбриону; см. также *Киемат-*, *Фет-*.

ЭН- (греч. предлог и приставка en), перед «б», «м», «п», «ф» изменяется в **ЭМ-** — находящийся внутри, в пределах чего-либо; соответствует русской приставке «в-»; см. также *Ин-*(1), противопол. *Эк-*.

ЭНД(О)- (греч. endō и endon внутри) — внутри, внутренний; см. также *Интра-*, *Интро-*, *Энт-*; противопол. *Экзо-*, *Экстеро-*, *Экто-*.

ЭНКЕФАЛ- — см. *Энцефал-*.

ЭНТ(О)- (греч. entos внутри) — внутри, внутренний; см. также *Интра-*, *Интро-*, *Энд-*; противопол. *Экзо-*, *Экстеро-*, *Экто-*.

ЭНТЕР(О)-, -ЕНТЕР- (греч. enteron кишка; entera кишки, кишечник, внутренности) — относящийся к тонкой кишке, к кишечнику, к внутренностям; напр., экзентерация; см. также *Интестино-*.

ЭНЦЕФАЛ(О)-, -ЭНЦЕФАЛИЯ [греч. enkephalos (myelos) головной мозг, от en + kephalē голова] — относящийся к головному мозгу; напр., микроэнцефалия; см. также *Церебр-*.

ЭПИ- (греч. предлог и приставка epi), перед гласными обычно сокращается в **ЭП-** — расположение над чем-либо, поверх чего-либо, возле или вокруг чего-либо; следование за чем-либо, после чего-либо; соответствует русским приставкам «на-», «над-», «при-»; противопол. *Гип-*.

ЭПИДИДИМ (О)- (греч. epididymis придаток яичка, от epi + didimoi яички) — относящийся к придатку яичка.

ЭПИЗИО- (греч. epision, episeion наружные женские половые органы, лобковая область) — относящийся к наружным женским половым органам; см. также *Вульв-*.

ЭРГО-, -ЕРГИЯ, -УРГИЯ (греч. ergasis, ergon работа, действие, деятельность) — относящийся к работе, к действию, к деятельности; напр., аллергия, хирургия.

ЭРИТР(О)- (греч. erythros красный) — 1) красный, краснота; см. также *Рубро-*(1); 2) относящийся к эритроцитам.

ЭРО-, ЭРОТ(О)- (греч. erōs, erōtos любовь, желание, влечение, страсть) — любовь, страсть, половое влечение.

ЭСТЕЗИО-, -ЕСТЕЗИЯ, -ЭСТЕЗИЯ (греч. aisthēsis чувство, ощущение) — относящийся к ощущению, к чувствительности; напр., гиперестезия, акроэстезия; см. также *Сенси-*.

ЭТИО- (греч. aitia причина) — относящийся к причине болезни.

ЭУ-, ЭВ-, ЭЙ- (греч. eu хорошо, вполне, совершенно, правильно) — хороший, подлинный, правильный; противопол. *Дис-*; [1] *Как-*.

ЭХО- (греч. ēchō эхо, отголосок) — 1) относящийся к отраженным волнам (чаще ультразвуковым); 2) относящийся к повторению, подражанию.

ЯТРО-, -ИАТР(ИЯ) (греч. iatros врач; iatreia врачевание, лечение) — относящийся к лечению, к деятельности врача; напр., психиатр, педиатрия.

СПИСОК АВТОРОВ СТАТЕЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ

Авен О. И.
Адо А. Д.
Акопян В. С.
Акопян С. Ш.
Александрова М. Б.
Алякринский Б. С.
Анзимиров В. Л.
Апатенко А. К.
Артюхов В. Г.

Бабаян Э. А.
Бабаянц Р. С.
Бадалян Л. О.
Баландин И. Г.
Балантер Б. И.
Белов И. Н.
Белоусов А. С.
Белькевич В. И.
Беляков В. Д.
Берглезов М. А.
Бледнов Ю. А.
Блинов В. М.
Богомильский М. Р.
Богословский А. И.
Богословский В. А.
Большунов А. В.
Боришполец В. И.
Боровский Е. В.
Бржезовский М. М.
Будковская Н. Г.
Бузник И. М.
Буромский И. В.
Бутурлакин М. С.

Вайнберг М. Ш.
Вайнштейн Е. С.
Васильев Г. А.
Васильченко Г.С.
Ведерников А. С.
Вербицкий В. М.
Виленский В. Я.
Власов В. К.
Властовский В. Г.
Волкова М. А.
Володин В. М.
Волоконенко А. И.
Воробьев Г. И.
Воробьева Е. А.
Воронин Н. М.
Вотрин И. И.
Вульфсон И. З.

Гаврилов Е. И.
Гемонов В. В.
Георгиевский А. С.
Гераськин В. И.
Гладштейн Ш. П.
Голубева В. Л.
Гольдфарб Д. М.
Гостев В. С.
Гребенев А. Л.
Гринберг К. Н.
Громова Л. С.
Гудынский Я. В.
Гуменюк В. А.
Гусева Н. Г.
Гущин И. С.
Дарбинян Т. М.
Денисов Л. Е.
Державин В. М.
Дубров Э. Я.
Дымов М. В.
Дьяконова М. В.

Жариков Н. М.
Жаров В. В.
Жмакин К. Н.
Жмуркин В. П.
Жуков Ю. А.

Завьялов Е. С.
Загрядский В. П.
Залетаева Т. А.
Замчук Л. А.
Заречная С. Н
Зборовский А. Б.
Зедгенидзе Г. А.
Зилов В. Г.
Зольников С. М.
Зотиков Е. А.
Зубарев Р. П.
Иванов В. В.
Иванов В. И.
Иванов Н. К.
Иванова-Смоленская И. А.
Илларионов В. П.
Исаев В. Г.
Исаков Ю. Ф.
Истомина Т. И.
Ишмухаметов А. И.

Кабаков А. И.
Кабатов Ю. Ф.
Каган И. И.
Канюка В. К.
Карачунский М. А.
Катковский Г. Б
Кеирим-Маркус И. Б.
Кефели И. Ф.
Клишов А. А.
Кнорре А. Г.
Ковалевский Е. И.
Ковач Р. И.
Козлов Н. П.
Копшев С. Н.
Кореневская Е. И.
Королева И. А.
Котельникова М. А.
Кочетов Г. А.
Краснов А. М.
Крель А. А.
Кротовский Г. С.
Кряжева С. С.
Крячко И. А.
Кудашева В. А.
Кулешов Ю. Я.
Кульберг А. Я.
Кучеренко Д. Г.

Лаврова И. Г.
Лазовский И. Р.
Лапин В. П.
Лашков К. В.
Лебедев Б. В.
Лебедев В. П.
Левашов В. С.
Лейкина Е. С.
Леонов И. Т.
Лидов И. П.
Линденбратен А. Л.
Линденбратен Л. Д.
Лобастов О. С.
Лосев О. Л.
Лосев Н. И.
Любарский Я. Ю.

Мазовецкий А. Г.
Мазуров К. В.
Майстрах К. В.
Макаренко Ю. А.
Максимов В. Я.
Маньковский Н. Б.
Маркова О. Н.
Мартынова З. И.
Маттис Э. Р.
Мачабели М. С.
Медведев В. И.
Мерабишвили В. М.
Микулич Л. И.
Микулич Л. Л.
Миловидов Ю. К.
Миротворцев Ю. К.
Михайлов С. С
Михеев В. В.
Мишин В. П.
Мишин Л. Н.
Молотков В. И.
Монаенков А. М.
Морозов В. И.
Муслин Я. С.

Насонова В. А.
Невская Г. Ф.
Нечаева И. Д.
Никитюк Н. М.
Новиков Ю. В.
Новикова Е. Ч.
Носов С. Д.

Оганесян Н. М.
Обросов А. Н.
Олефиренко В. Т.
Ольховская И. Г.
Оппенгейм Д. Г.

Павлов В. П.
Пападопулос Т. Ф.
Пастушный С. А.
Пашинян Г. А.
Пермяков Н. К.
Петрусевич Ю. М.
Поддубная И. В.
Подрушняк Е. П.

Покровский А. А.
Покровский Г. А.
Поляков Л. Е.
Пономарчук В. А.
Попов В. М.
Попова З. С.
Преображенский Ю. Б.
Пригожина Е. Л.
Прохоров Б. Б.
Прянишникова Н. Т.
Пурин В. Р.
Пыцкий В. И.

Рачинский С. В.
Ревазов А. Л.
Ревуцкая З. Г.
Ровнова З. П.
Розенштраух Л. С.
Рощин А. В.
Рубцов И. В.
Рудаев Я. А.
Русанов С. А.
Рябых Л. Д.

Сапин М. Р.
Саркисов Д. С.
Саулитэ М. Р.
Саяпина Р. Я.
Сенов П. Л.
Сергеев В. М.
Сидоров К. К.
Сидорова Г. А.
Сметанин Э. Е.
Смольянинов В. М.
Соколова Т. С.
Соловьев М. М.
Соловьев Ю. Н.
Сопко Г. И.
Сперанский В. С.
Спесивцева В. Г.
Спивак Л. И.
Старосветская Н. А.
Сточик А. М.
Студницин А. А.
Суворова И. А.
Сумароков А. А.
Сутулов Л. С.
Сыркин А. Б.

Тархан У. А.
Тверской А. Л.
Темин П. А.
Тимохов В. С.
Тищенко В. И.
Тищенко П. Д.
Торсуев Н. А.
Туманов А. К.
Тур А. Ф.

Уваров Б. С.
Уленова М. А.
Улитин Ю. Г.

Фадеев Ю. А.
Федоров Г. Е.
Федотов В. В.
Фрейдин Л. М.
Фролькис В. В.

Хромченко О. М.

Цепоухов И. М.
Циновой П. Е.

Чельцова М. А.
Чернявский М. Н.
Черняк И. М.
Чертков И. Л.
Чурюканов В. В.

Шараев Г. А.
Шеклаков Н. Д.
Шмидт Е. В.
Штернберг Э. Я.
Шубов Я. И.
Шумский Н. Г.

Эйдинов Я. Б.

Юрин Р. Ф.

Яковлев А. А.
Ясногородский В. Г.

СПИСОК РЕДАКТОРОВ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫХ В «ПЕРЕЧНЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА РЕДАКЦИОННЫХ РАЗДЕЛОВ И ОТДЕЛОВ БМЭ» (т. 1, стр. 7—16)

Амосов М. Г.
Андреева Н. Г.
Ануфриев А. К.
Астрахан В. И.

Белокрысенко С. С.
Блюгер А. Ф.
Богорад И. В.
Бруенок А. В.

Ванюшенкова В. Б.
Варшавский В. Л.
Вашков В. И.

Галкин В. А.
Гиллер С. А.
Гинтер Е. К.
Гольдфайль Л. Г.

Дасаев А. Н.
Дьяченко С. С.
Дудникова Л. К.
Дупик В. С.

Еременко Г. С.
Жижин В. М.

Збарский И. Б.
Ильин И. И.
Ильичева К. И.
Ковалева Л. Г.
Крылов О. А.

Левандо В. А.
Левит М. М.
Леднева Р. К.
Лёнюшкин А. И.
Летунов С. П.
Лукьянов В. С.

Манухин И. Б.
Матвеева Л. Н.
Машков Г. В.
Михеева Л. С.

Новикова Л. А.

Орлова Л. Д.

Пальцев Ю. П.
Перельмутр А. С.
Плисс Г. Б.
Плотников Н. Н.
Покровская М. К.
Полгар А. А.

Родов Я. И.
Рогинский Я. Я.

Савельев А. И.
Самойлов А. Я.
Сафонов В. А.
Светлов В. А.
Сипайлов Ю. А.
Соколовский Г. А.
Султанов Т. А.

Тихомиров А. Н.
Троянский М. П.
Туровский Б. М.

Ушакова О. А.

Фридман Ф. Е.

Хоминский Б. С.

Червоненкис А. В.

Шехтер М. С.

Яковлев Л. А.

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья, разрешенных для применения в медицинской практике и к промышленному производству в СССР (в соответствии с Государственным реестром по состоянию на 1 января 1982 г.)

Перечень лекарственных средств и лекарственного растительного сырья, разрешенных для применения в медицинской практике и к промышленному производству в СССР (в соответствии с Государственным реестром по состоянию на 1 января 1982 года), предназначен врачам для сведения и практического использования.

Для удобства пользования (напр., при выписке рецепта) в Перечне приводится наименование препарата на латинском языке, в скобках, как правило, его окончание в родительном падеже, в некоторых случаях — в винительном.

Препараты, исключенные из Государственного реестра приказами Министерства здравоохранения СССР в 1982 г., январе 1983 г., в Перечень не вошли.

В Перечне не приведены радиофармацевтические препараты, вспомогательные вещества и реактивы, стандартные образцы лекарственных веществ, а также импортные лекарственные средства.

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
I ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ	
Абомин	**Abominum (-i)**
Таблетки абомина 50 000 ЕД	Tabulettae (-as) Abomini 50 000 ЕД
Ависан	**Avisanum (-i)**
Таблетки ависана 0,05 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae (-as) Avisani 0,05 obductae (-as)
Адипозин	**Adiposinum (-i)**
Адипозин для инъекций	Adiposinum (-i) pro injectionibus
Адиурекрин	**Adiurecrinum (-i)**
Адонизид	**Adonisidum (-i)**
Адонизид концентрированный	**Adonisidum (-i) concentratum (-i)**
Адонизид сухой	**Adonisidum (-i) siccum (-i)**
Таблетки адонизида сухого 0,00075 *г*	Tabulettae (-as) Adonisidi sicci 0,00075
Адреналин	**Adrenalinum (-i)**
Адреналин синтетический	**Adrenalinum (-i) synteticum (i)**
Раствор адреналина гидрохлорида 0,1%	Solutio (-onis) Adrenalini hydrochloridi 0,1%

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Адреналина гидротартрат Раствор адреналина гидротартрата 0,18% для инъекций	**Adrenalini hydrotartras** Solutio(-onis) Adrenalini hydrotartratis 0,18% pro injectionibus
Адроксон Раствор адроксона 0,025% для инъекций	**Adroxonum (-i)** Solutio(-onis) Adroxoni 0,025% pro injectionibus
Адсобар	**Adsobarum(-i)**
Аевит «Аевит» в капсулах	**Aëvitum (-i)** «Aëvitum» in capsulis
Азатиоприн Таблетки азатиоприна 0,05 *г*	**Azathioprinum (-i)** Tabulettae(-as) Azathioprini 0,05
Азафен Таблетки азафена 0,025 *г*	**Azaphenum (-i)** Tabulettae(-as) Azapheni 0,025
Азидин	**Azidinum (-i)**
Азота закись	**Nitrogenium (-i) oxydulatum (-i)**
Аймалин Раствор аймалина 2,5% для инъекций Таблетки аймалина 0,05 *г*	**Ajmalinum (-i)** Solutio(-onis) Ajmalini 2,5% pro injectionibus Tabulettae(-as) Ajmalini 0,05
Акрихин Таблетки акрихина 0,05 *г*, покрытые оболочкой	**Acrichinum (-i)** Tabulettae(-as) Acrichini 0,05 obductae (-as)
Алантон Таблетки алантона 0,1 *г*	**ıthonum (-i)** Tabulettae(-as) Alanthoni 0,1
Аллилчеп	**____lcepum (-i)**
Аллопуринол Таблетки аллопуринола 0,1 *г*	**Allopurinolum (-i)** Tabulettae(-as) Allopurinoli 0,1
Альбумин Раствор альбумина 5%, 10% или 20%	**Albuminum (-i)** Solutio(-onis) Albumini 5%, 10% aut 20%
Альбумин плацентарный Раствор альбумина плацентарного 5%, 10% или 20%	**Albuminum (-i) placentaris** Solutio(-onis) Albumini placentaris 5%, 10% aut 20%
Альбуминат	**Albuminatum (-i)**
Альбуминат сухой	**Albuminatum(-i) siccum (-i)**
Альгипор	**Algiporum (-i)**
Амедин Таблетки амедина 0,0015 *г* или 0,003 *г*	**Amedinum (-i)** Tabulettae(-as) Amedini 0,0015 aut 0,003
Амидопирин (пирамидон) Гранулы амидопирина Раствор амидопирина 2% или 4% для инъекций Таблетки амидопирина 0,25 *г* Таблетки амидопирина и анальгина по 0,25 *г* Таблетки амидопирина и анальгина по 0,25 *г*, кофеина-бензоата натрия 0,1 *г* Таблетки амидопирина и анальгина по 0,25 *г*, фенобарбитала 0,03 *г* Таблетки амидопирина и бутадиона по 0,125 *г*, покрытые оболочкой Таблетки амидопирина 0,3 *г* и кофеина 0,05 *г* Таблетки амидопирина 0,25 *г* и кофеина 0,05 *г* Таблетки амидопирина 0,25 *г* и кофеина-бензоата натрия 0,1 *г* Таблетки амидопирина 0,3 *г*, кофеина-бензоата натрия 0,1 *г* и фенобарбитала 0,01 *г* Таблетки амидопирина и фенацетина по 0,25 *г* Таблетки амидопирина и фенацетина по 0,25 *г*, кофеина-бензоата натрия 0,1 *г*, фенобарбитала 0,03 *г*	**Amidopyrinum (-i) [Pyramidonum (-i)]** Granulae(-as) Amidopyrini Solutio(-onis) Amidopyrini 2% aut 4% pro injectionibus Tabulettae(-as) Amidopyrini 0,25 Tabulettae(-as) Amidopyrini et Analgini aa 0,25 Tabulettae(-as) Amidopyrini et Analgini aa 0,25, Coffeini-Natrii benzoatis 0,1 Tabulettae(-as) Amidopyrini et Analgini aa 0,25, Phenobarbitali 0,03 Tabulettae(-as) Amidopyrini et Butadioni aa 0,125 obductae(-as) Tabulettae(-as) Amidopyrini 0,3 et Coffeini 0,05 Tabulettae(-as) Amidopyrini 0,25 et Coffeini 0,05 Tabulettae(-as) Amidopyrini 0,25 et Coffeini-Natrii benzoatis 0,1 Tabulettae(-as) Amidopyrini 0,3, Coffeini-Natrii benzoatis 0,1 et Phenobarbitali 0,01 Tabulettae(-as) Amidopyrini et Phenacetini aa 0,25 Tabulettae(-as) Amidopyrini et Phenacetini aa 0,25, Coffeini-Natrii benzoatis 0,1, Phenobarbitali 0,03

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки амидопирина и фенацетина по 0,25 *г*, фенобарбитала 0,03 *г*	Tabulettae(-as) Amidopyrini et Phenacetini aa 0,25, Phenobarbitali 0,03
Таблетки амидопирина 0,25 *г* и фенобарбитала 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Amidopyrini 0,25 et Phenobarbitali 0,1
Амизил	**Amizylum (-i)**
Таблетки амизила 0,001 *г* или 0,002 *г*	Tabulettae(-as) Amizyli 0,001 aut 0,002
Амиказол	**Amycazolum (-i)**
Мазь амиказоловая 5%	Unguentum (-i) Amycazoli 5%
Присыпка амиказола 2% или 5%	Aspersio(-onis) Amycazoli 2% aut 5%
Амикин	**Amicinum(-i)**
Амилнитрит	**Amylii nitris (-itis)**
Амилнитрит в ампулах (с оплеткой)	Amylii nitris (-itis) in ampullis
Аминазин	**Aminazinum (-i)**
Драже аминазина 0,025 *г*, 0,05 *г* и 0,1 *г*	Dragée Aminazini 0,025, 0,05 et 0,1
Раствор аминазина 2,5% для инъекций	Solutio(-onis) Aminazini 2,5% pro injectionibus
Таблетки аминазина 0,01 *г*, покрытые оболочкой для детей	Tabulettae(-as) Aminazini 0,01 obductae(-as) pro infantibus
Аминалон	**Aminalonum (-i)**
Таблетки аминалона 0,25 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Aminaloni 0,25 obductae (-as)
Аминоакрихин	**Aminoacrichinum (-i)**
Драже аминоакрихина 0,1 *г*	Dragée Aminoacrichini 0,1
Таблетки аминоакрихина 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Aminoacrichini 0,1
Аминокровин	**Aminocrovinum (-i)**
Аминопептид	**Aminopeptidum (-i)**
Аминохинол	**Aminochinolum (-i)**
Таблетки аминохинола 0,025 *г* и 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Aminochinoli 0,025 et 0,05
Аммиак водный концентрированный	**Solutio(-onis) Ammonii caustici concentrata(-ae)**
Линимент аммиачный	Linimentum(-i) ammoniatum(-i)
Раствор аммиака	Solutio(-onis) Ammonii caustici
Раствор аммиака 10% в ампулах	Solutio(-onis) Ammonii caustici 10% in ampullis
Раствор аммиака 10% в ампулах с оплеткой	Solutio(-onis) Ammonii caustici 10% in ampullis
Аммифурин	**Ammifurinum (-i)**
Раствор аммифурина 2%	Solutio(-onis) Ammifurini 2%
Таблетки аммифурина 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Ammifurini 0,02
Аммония хлорид	**Ammonii chloridum (-i)**
Ампиокс	**Ampioxum (-i)**
Ампиокс 0,25 *г* в капсулах	Ampioxum(-i) 0,25 in capsulis
Ампициллин	**Ampicillinum (-i)**
Ампициллин 0,25 *г* в капсулах	Ampicillinum 0,25 in capsulis
Порошок ампициллина 5 *г* для суспензий	Pulvis(-eris) Ampicillini 5,0 pro suspensionibus
Ампициллина натриевая соль	**Ampicillinum (-i) -natrium (-i)**
Таблетки ампициллина тригидрата 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Ampicillini trihydratis 0,25
Амфоглюкамин	**Amphoglucaminum (-i)**
Таблетки амфоглюкамина 100 000 ЕД	Tabulettae(-as) Amphoglucamini 100 000 ЕД
Амфотерицин В	**Amphotericinum (-i) B**
Амфотерицин В для внутривенного введения	Amphotericinum B pro injectione intravenosa
Мазь амфотерицина В 30 000 ЕД в 1 *г*	Unguentum Amphotericini B 30 000 ЕД in 1,0
Анабазина гидрохлорид	**Anabasini hydrochloridum (-i)**
Таблетки анабазина гидрохлорида 0,003 *г*	Tabulettae(-as) Anabasini hydrochloridi 0,003
Аналептическая смесь для инъекций	**Mixtura(-am) analeptica(-am) pro injectionibus**
Анальгин	**Analginum (-i)**
Таблетки анальгина 0,05 *г*, 0,1 *г* или 0,15 *г*	Tabulettae(-as) Analgini 0,05, 0,1 aut 0,15
Таблетки анальгина 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Analgini 0,5
Анальгин для инъекций	**Analginum (-i) pro injectionibus**
Раствор анальгина 25% или 50% для инъекций	Solutio(-onis) Analgini 25% aut 50% pro injectionibus

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Анаприлин Таблетки анаприлина 0,01 *г* или 0,04 *г*	**Anaprilinum (-i)** Tabulettae(-as) Anaprilini 0,01 aut 0,04
Анатруксоний Раствор анатруксония 0,3% для инъекций	**Anatruxonium (-i)** Solutio(-onis) Anatruxonii 0,3% pro injectionibus
Ангиотензинамид для инъекций	**Angiotensinamidum (-i) pro injectionibus**
Андекалин Андекалин для инъекций Таблетки андекалина, покрытые оболочкой	**Andecalinum (-i)** Andecalinum (-i) pro injectionibus Tabulettae(-as) Andecalini obductae(-as)
Анестезин Мазь анестезиновая 5% Таблетки анестезина 0,3 *г* Таблетки анестезина 0,3 *г*, папаверина гидрохлорида 0,02 *г*, экстракта красавки 0,015 *г*	**Anaesthesinum (-i)** Unguentum(-i) Anaesthesini 5% Tabulettae(-as) Anaesthesini 0,3 Tabulettae(-as) Anaesthesini 0,3, Papaverini hydrochloridi 0,02, extracti Belladonnae 0,015
Антиастматическая микстура по прописи Траскова	**Mixtura (-am) antiasthmatica (-am) Trascovi**
Антилимфолин «Кр»	**Antilympholinum (-i) «Kr»**
Антимонила-натрия тартрат (натрий винносурьмянокислый)	**Stibii et Natrii tartras (-atis) [Natrium (-i) tartaricostibium (-i)]**
Антипирин Таблетки антипирина 0,05 *г*, 0,075 *г*, 0,1 *г* или 0 15 *г*, 0,25 *г*	**Antipyrinum (-i)** Tabulettae(-as) Antipyrini 0,05, 0,075, 0,1 aut 0,15, 0,25
Антифомсилан Аэрозоль антифомсилана	**Antifomsilanum (-i)** Aërosolum (-i) Antifomsilani
Апилак Апилак лиофилизированный Мазь апилака 3% Порошок апилака Свечи «апилак» 0,005 *г* или 0,01 *г* Таблетки апилака 0,01 *г*	**Apilacum (-i)** Apilacum(-i) lyophilisatum(-i) Unguentum(-i) Apilaci 3% Pulvis(-eris) Apilaci Suppositoria «Apilacum» 0,005 aut 0,01 Tabulettae(-as) Apilaci 0,01
Апоморфина гидрохлорид Раствор апоморфина гидрохлорида 1% для инъекций	**Apomorphini hydrochloridum (-i)** Solutio(-onis) Apomorphini hydrochloridi 1% pro injectionibus
Апрессин Драже апрессина 0,01 *г* и 0,025 *г* Таблетки апрессина 0,01 *г* или 0,025 *г*, покрытые оболочкой	**Apressinum (-i)** Dragée Apressini 0,01 et 0,025 Tabulettae(-as) Apressini 0,01 aut 0,025 obductae (-as)
Апрофен Раствор апрофена 1% для инъекций Таблетки апрофена 0,025 *г*	**Aprophenum (-i)** Solutio(-onis) Apropheni 1% pro injectionibus Tabulettae(-as) Apropheni 0,025
Арахиден	**Arachidenum (-i)**
Армин Раствор армина 0,005% Раствор армина 0,01%	**Arminum (-i)** Solutio(-onis) Armini 0,005% Solutio(-onis) Armini 0,01%
Арпенал Таблетки арпенала 0,05 *г*	**Arpenalum (-i)** Tabulettae(-as) Arpenali 0,05
L-Аспарагиназа для инъекций	**L-Asparaginasum (-i) pro injectionibus**
Астматин	**Asthmatinum (-i)**
Атропина сульфат Мазь атропиновая 1% Пленки глазные с атропина сульфатом Раствор атропина сульфата 0,1% Раствор атропина сульфата 0,05% для инъекций Раствор атропина сульфата 0,1% для инъекций Раствор атропина сульфата 0,1% в шприц-тюбиках Раствор атропина сульфата 1% Таблетки атропина сульфата 0,0005 *г*	**Atropini sulfas (-atis)** Unguentum(-i) Atropini sulfatis 1% Membranulae(lamellae) ophthalmicae cum Atropini sulfate Solutio(-onis) Atropini sulfatis 0,1% Solutio(-onis) Atropini sulfatis 0,05% pro injectionibus Solutio(-onis) Atropini sulfatis 0,1% pro injectionibus Solutio(-onis) Atropini sulfatis 0,1% in spriz-tubulis Solutio(-onis) Atropini sulfatis 1% Tabulettae(-as) Atropini sulfatis 0,0005

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки атропина сульфата 0,0003 *г*, папаверина гидрохлорида 0,02 *г* Таблетки атропина сульфата 0,0005 *г*, папаверина гидрохлорида 0,02 *г*, фенобарбитала 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Atropini sulfatis 0,0003, Papaverini hydrochloridi 0,02 Tabulettae(-as) Atropini sulfatis 0,0005, Papaverini hydrochloridi 0,02, Phenobarbitali 0,02
Ацеклидин Мазь ацеклидиновая 3%, 5% Раствор ацеклидина 0,2% для инъекций	**Aceclidinum (-i)** Unguentum(-i) Aceclidini 3%, 5% Solutio(-onis) Aceclidini 0,2% pro injectionibus
Ацемин Мазь ацемина Раствор ацемина	**Aceminum (-i)** Unguentum(-i) Acemini Solutio(-onis) Acemini
Ацетилхолин-хлорид	**Acetylcholini chloridum (-i)**
Ацетилцистеин Раствор ацетилцистеина 20%	**Acetylcysteinum (-i)** Solutio(-onis) Acetylcysteini 20%
Ацефен Ацефен 0,25 *г* для инъекций Таблетки ацефена 0,1 *г*, покрытые оболочкой	**Acephenum (-i)** Acephenum (-i) 0,25 pro injectionibus Tabulettae(-as) Acepheni 0,1 obductae(-as)
Ацидин Таблетки ацидин-пепсина	**Acidinum (-i)** Tabulettae(-as) Acidin-pepsini
Аэрозоль «Каметон»	**Аёrosolum (-i) «Cametonum»**
Аэрозоль «Камфомен»	**Аёrosolum (-i) «Camphomenum»**
Аэрозоль «Ливиан»	**Аёrosolum (-i) «Livianum»**
Аэрозоль «Оксициклозоль»	**Аёrosolum (-i) «Oxycyclosolum»**
Аэрозоль «Эфатин»	**Аёrosolum (-i) «Ephatinum»**
Бализ	**Balysum (-i)**
Барбамил Таблетки барбамила 0,1 *г* или 0,2 *г* Таблетки барбамила 0,15 *г* и бромизовала 0,15 *г*	**Barbamylum (-i)** Tabulettae(-as) Barbamyli 0,1 aut 0,2 Tabulettae(-as) Barbamyli 0,15 et Bromisovali 0,15
Барбитал (веронал)	**Barbitalum (-i) [Veronalum (-i)]**
Барбитал-натрий (мединал) Таблетки барбитал-натрия 0,3 *г*	**Barbitalum (-i) -natrium (-i) [Medinalum (-i)]** Tabulettae(-as) Barbitali-natrii 0,3
Бария сульфат для рентгеноскопии	**Barii sulfas (-atis) pro roentgeno**
Батилол Таблетки батилола 0,02 *г*	**Batilolum (-i)** Tabulettae(-as) Batiloli 0,02
Батриден Таблетки батридена 0,1 *г*	**Batridenum (-i)** Tabulettae(-as) Batrideni 0,1
Бемегрид Раствор бемегрида 0,5% для инъекций	**Bemegridum (-i)** Solutio(-onis) Bemegridi 0,5% pro injectionibus
Бензилбензоат медицинский	**Benzylii benzoas (-atis) medicinalis (-is)**
Бензилникотинат*	**Benzylii nicotinas (-atis)**
Бензилпенициллина калиевая соль	**Benzylpenicillinum (-i) -kalium (-i)**
Бензилпенициллина натриевая соль	**Benzylpenicillinum (-i) -natrium (-i)**
Бензилпенициллина новокаиновая соль	**Benzylpenicillinum (-i) -novocainum (-i)**
Бензобамил Таблетки бензобамила 0,1 *г*	**Benzobamylum (-i)** Tabulettae(-as) Benzobamyli 0,1
Бензогексоний Раствор бензогексония 2,5% для инъекций Таблетки бензогексония 0,1 *г* или 0,25 *г*	**Benzohexonium (-i)** Solutio(-onis) Benzohexonii 2,5% pro injectionibus Tabulettae(-as) Benzohexonii 0,1 aut 0,25

* Здесь и далее звездочкой обозначаются лекарственные вещества и лекарственные формы, являющиеся составными частями препаратов, растворов, мазей и др.

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Бензодиксин Таблетки бензодиксина 0,025 *г*	**Benzodixinum(-i)** Tabulettae(-as) Benzodixini 0,025
Бензонал Таблетки бензонала 0,05 *г* Таблетки бензонала 0,1 *г*	**Benzonalum(-i)** Tabulettae(-as) Benzonali 0,05 Tabulettae(-as) Benzonali 0,1
Бензонафтол Таблетки бензонафтола 0,25 *г*	**Benzonaphtholum(-i)** Tabulettae(-as) Benzonaphtholi 0,25
Бензотэф Бензотэф 0,024 *г* для инъекций	**Benzotephum(-i)** Benzotephum(-i) 0,024 pro injectionibus
Бенфотиамин Таблетки бенфотиамина 0,005 *г* или 0,025 *г*	**Benphothiaminum(-i)** Tabulettae(-as) Benphothiamini 0,005 aut 0,025
Бепаск Таблетки бепаска 0,5 *г*	**Bepascum(-i)** Tabulettae(-as) Bepasci 0,5
Берберина бисульфат Таблетки берберина бисульфата 0,005 *г*	**Berberini bisulfas(-atis)** Tabulettae(-as) Berberini bisulfatis 0,005
Бероксан Раствор бероксана 0,25% или 0,5% Таблетки бероксана 0,02 *г*	**Beroxanum (-i)** Solutio(-onis) Beroxani 0,25% aut 0,5% Tabulettae(-as) Beroxani 0,02
Бефунгин	**Befunginum(-i)**
Бигумаль Драже бигумаля 0,1 *г* Таблетки бигумаля 0,05 *г* или 0,1 *г*	**Bigumalum(-i)** Dragée Bigumali 0,1 Tabulettae(-as) Bigumali 0,05 aut 0,1
Бийохинол	**Biiochinolum(-i)**
Билигнин	**Biligninum(-i)**
Билигност Билигност 50% для инъекций	**Bilignostum(-i)** Bilignostum(-i) 50% pro injectionibus
Билимин Таблетки билимина 0,5 *г*	**Biliminum(-i)** Tabulettae(-as) Bilimini 0,5
Биологический антисептический тампон	**Tamponum(-i) biologicum(-i) antisepticum(-i)**
Биосед	**Biossedum(-i)**
Бисмоверол	**Bismoverolum(-i)**
Битиодин Таблетки битиодина 0,01 *г*,покрытые оболочкой	**Bithiodinum(-i)** Tabulettae(-as) Bithiodini 0,01 obductae(-as)
Бициллин-1	**Bicillinum(-i)-1**
Бициллин-3	**Bicillinum(-i)-3**
Бициллин-5	**Bicillinum(-i)-5**
Бороментол	**Boromentholum(-i)**
Бревиколина гидрохлорид Раствор бревиколина гидрохлорида 1% для инъекций	**Brevicollini hydrochloridum(-i)** Solutio(-onis) Brevicollini hydrochloridi 1% pro injectionibus
Бриллиантовый зеленый Раствор бриллиантового зеленого спиртовой 1% или 2%	**Viride(-is) nitens(-tis)** Solutio(-onis) Viridis nitentis spirituosa(-ae) 1% aut 2%
Бромгексин Таблетки бромгексина 0,008 *г*	**Bromhexinum(-i)** Tabulettae Bromhexini 0,008
Бромизовал (бромурал) Таблетки бромизовала 0,3 *г*	**Bromisovalum(-i) [Bromuralum(-i)]** Tabulettae(-as) Bromisovali 0,3
Бромкамфора Таблетки бромкамфоры 0,15 *г* или 0,25 *г*	**Bromcamphora(-ae)** Tabulettae(-as) Bromcamphorae 0,15 aut 0,25
Брунеомицин Брунеомицин для инъекций	**Bruneomycinum(-i)** Bruneomycinum (-i) pro injectionibus

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Бутадион Таблетки бутадиона 0,15 *г* Таблетки бутадиона 0,03 *г* или 0,05 *г*, покрытые оболочкой	**Butadionum(-i)** Tabulettae(-as) Butadioni 0,15 Tabulettae(-as) Butadioni 0,03 aut 0,05 obductae(-as)
Бутамид Таблетки бутамида 0,25 *г* или 0,5 *г*	**Butamidum(-i)** Tabulettae(-as) Butamidi 0,25 aut 0,5
Вазелин	**Vaselinum(-i)**
Вазографин 70% для инъекций	**Vasographinum(-i) 70% pro injectionibus**
Валидол Валидол 0,05 *г* или 0,1 *г* в капсулах Таблетки валидола 0,06 *г*	**Validolum(-i)** Validolum(-i) 0,05 aut 0,1 in capsulis Tabulettae(-as) Validoli 0,06
Валокормид	**Valocormidum(-i)**
Взвесь плаценты для инъекций	**Suspensio(-onis) Placentae pro injectionibus**
Взвесь «Новоциндол»	**Suspensio(-onis) «Novocindolum»**
Видехол Раствор видехола в масле 0,125%, 0,25%	**Videcholum(-i)** Solutio(-onis) Videcholi oleosa(-ae) 0,125%, 0,25%
Викасол Раствор викасола 1% для инъекций Таблетки викасола 0,015 *г*	**Vikasolum(-i)** Solutio(-onis) Vikasoli 1% pro injectionibus Tabulettae(-as) Vikasoli 0,015
Винизоль	**Vinisolum(-i)**
Винилин (бальзам Шостаковского) Винилин в капсулах	**Vinylinum(-i) [Balsamum(-i) Schostakowsky]** Vinylinum in capsulis
Випраксин для инъекций	**Vipraxinum(-i) pro injectionibus**
Вискоза гемостатическая	**Viscosum haemostaticum(-i)**
Висмута нитрат основной Мазь висмутовая 10% Таблетки висмута нитрата основного 0,25 *г* или 0,5 *г* Таблетки висмута нитрата основного 0,25 *г* и экстракта красавки 0,015 *г*	**Bismuthi subnitras(-tis)** Unguentum(-i) Bismuthi subnitratis 10% Tabulettae(-as) Bismuthi subnitratis 0,25 aut 0,5 Tabulettae(-as) Bismuthi subnitratis 0,25 et extracti Belladonnae 0,015
Витамин Р из листьев чайного растения	**Vitaminum(-i) P e foliis Theae**
Витамин Р из цитрусовых Таблетки витамина Р из цитрусовых 0,05 *г* или 0,1 *г* Таблетки витамина Р из цитрусовых 0,05 *г*, аскорбиновой кислоты 0,05 *г*	**Vitaminum (-i) P e citris** Tabulettae(-as) Vitamini P e citris 0,05 aut 0,1 Tabulettae (-as) Vitamini P e citris 0,05, Acidi ascorbinici 0,05
Витаминизированный сироп плодов шиповника	**Sirupus(-i) fructuum Rosae vitaminisatus(-i)**
Витафтор	**Vitaphthorum(-i)**
Витогепат	**Vitohepatum(-i)**
Вицеин	**Viceinum(-i)**
Вода горькоминдальная	**Aqua(-ae) Amygdalarum amararum**
Вода деминерализованная для инъекционных растворов	**Aqua(-ae) demineralisata(-ae) pro solutionibus injectabilibus**
Вода дистиллированная	**Aqua(-ae) destillata(-ae)**
Вода для инъекций в ампулах	**Aqua(-ae) pro injectionibus in ampullis**
Вода для инъекций во флаконах	**Aqua(-ae) pro injectionibus in flaconibus**
Вода перечной мяты	**Aqua(-ae) Menthae piperitae**
Вода чемеричная	**Aqua(-ae) Veratri**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Галантамина гидробромид Раствор галантамина гидробромида 0,1%, 0,25%, 0,5% или 1% для инъекций	**Galanthamini hydrobromidum(-i)** Solutio(-onis) Galanthamini hydrobromidi 0,1%, 0,25%, 0,5% aut 1% pro injectionibus
Галаскорбин Таблетки галаскорбина 0,5 *г*	**Galascorbinum(-i)** Tabulettae(-as) Galascorbini 0,5
Гальманин	**Galmaninum(-i)**
Ганглерон Ганглерон в капсулах Раствор ганглерона 1,5% для инъекций	**Gangleronum(-i)** Gangleronum(-i) in capsulis Solutio(-onis) Gangleroni 1,5% pro injectionibus
Гексаметилентетрамин (уротропин) Раствор гексаметилентетрамина 40% для инъекций Таблетки гексаметилентетрамина 0,25 *г* или 0,5 *г* Таблетки гексаметилентетрамина 0,3 *г* и кофеина 0,05 *г* Таблетки гексаметилентетрамина 0,25 *г* и экстракта красавки 0,015 *г*	**Hexamethylentetraminum(-i) [Urotropinum(-i)]** Solutio(-onis) Hexamethylentetramini 40% pro injectionibus Tabulettae(-as) Hexamethylentetramini 0,25 aut 0,5 Tabulettae (-as) Hexamethylentetramini 0,3 et Coffeini 0,05 Tabulettae(-as) Hexamethylentetramini 0,25 et Extracti Belladonnae 0,015
Гексамидин Таблетки гексамидина 0,125 *г* или 0,25 *г*	**Hexamidinum(-i)** Tabulettae(-as) Hexamidini 0,125 aut 0,25
Гексафосфамид Таблетки гексафосфамида 0,01 *г*	**Hexaphosphamidum(-i)** Tabulettae(-as) Hexaphosphamidi 0,01
Гексенал	**Hexenalum(-i)**
Гексилтеобромин	**Hexyltheobrominum(-i)**
Гелиомицин Мазь гелиомициновая 4%	**Heliomycinum(-i)** Unguentum(-i) Heliomycini 4%
Гематоген детский	**Haematogenum(-i) puerile(-is)**
Гематопорфирин	**Haematoporphyrinum(-i)**
Гемодез	**Haemodesum(-i)**
Гемоспоридин	**Haemosporidinum(-i)**
Гемофирин	**Haemophyrinum(-i)**
Гентамицина сульфат Гентамицина сульфат 0,08 *г*	**Gentamycini sulfas(-atis)** Gentamycini sulfatis 0,08
Геоссен	**Geossenum(-i)**
Гепарин Мазь гепариновая Раствор гепарина для инъекций 5000 ЕД в 1 *мл*	**Heparinum(-i)** Unguentum(-i) Heparini Solutio(-onis) Heparini pro injectionibus 5000 EL in 1 ml
Гигроний Гигроний 0,1 *г* для инъекций	**Hygronium(-i)** Hygronii 0,1 pro injectionibus
Гидрокортизон Мазь гидрокортизоновая 1%	**Hydrocortisonum(-i)** Unguentum(-i) Hydrocortisoni 1%
Гидрокортизона ацетат	**Hydrocortisoni acetas(-atis)**
Гидрокортизонгемисукцинат Гидрокортизонгемисукцинат лиофилизированный 0,025 *г*, 0,1 *г* для инъекций	**Hydrocortisoni hemisuccinas(-atis)** Hydrocortisoni hemisuccinatis lyophilisati 0,025, 0,1 pro injectionibus
Гидролизат казеина	**Hydrolysatum(-i) Caseini**
Гидролизин сухой Раствор гидролизина	**Hydrolysinum(-i) siccum(-i)** Solutio(-onis) Hydrolysini
Гидроперит Таблетки гидроперита	**Hydroperitum(-i)** Tabulettae(-as) Hydroperiti
Гиндарин Таблетки гиндарина 0,05 *г*, покрытые оболочкой	**Hyndarinum(-i)** Tabulettae(-as) Hyndarini 0,05 obductae(-as)

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Гиосциамина камфорат	**Hyoscyamini camphoras(-atis)**
Гиосциамина сульфат Таблетки гиосциамина сульфата 0,0001 *г*	**Hyoscyamini sulfas(-atis)** Tabulettae(-as) Hyoscyamini sulfatis 0,0001
Гипофенат	**Hypophenatum(-i)**
Гипохлорид кальция	**Calcii hypochloridum(-i)**
Гистаглобулин	**Histaglobulinum(-i)**
Гистамина дигидрохлорид Раствор гистамина дигидрохлорида 0,1% для инъекций	**Histamini dihydrochloridum(-i)** Solutio(-onis) Histamini dihydrochloridi 0,1% pro injectionibus
Гистидина гидрохлорид Раствор гистидина гидрохлорида 4% для инъекций	**Histidini hydrochloridum(-i)** Solutio(-onis) Histidini hydrochloridi 4% pro injectionibus
Гитоксин Таблетки гитоксина 0,0002 *г*	**Gitoxinum(-i)** Tabulettae(-as) Gitoxini 0,0002
Гифотоцин	**Hyphotocinum(-i)**
Глауцина гидрохлорид Таблетки глауцина гидрохлорида 0,05 *г*, покрытые оболочкой	**Glaucini hydrochloridum(-i)** Tabulettae(-as) Glaucini hydrochloridi 0,05 obductae(-as)
Глибутид Таблетки глибутида 0,05 *г*	**Glibutidum(-i)** Tabulettae(-as) Glibutidi 0,05
Глицерин Мазь глицериновая Свечи с глицерином	**Glycerinum(-i)** Unguentum(-i) Glycerini Suppositoria cum Glycerino
Глицерина — 25 *г*	**Glycerini — 25,0**
Раствора аммиака 10% — 25 *мл*	**Solutionis Ammonii caustici 10% — 25 ml**
Спирта этилового 95% — 25 *мл*	**Spiritus aethylici — 25 ml**
Воды дистиллированной до 100 *мл*	**Aquae destillatae ad 100 ml**
Глицирам Таблетки глицирама 0,05 *г*	**Glycyrramum(-i)** Tabulettae(-as) Glycyrrami 0,05
Глудантан Таблетки глудантана 0,2 *г*	**Gludantanum(-i)** Tabulettae(-as) Gludantani 0,2
Глюкоза Раствор глюкозы 5% для инъекций во флаконах Раствор глюкозы 10%, 20% или 40% для инъекций во флаконах Раствор глюкозы 5%, 10%, 25% или 40% для инъекций Раствор глюкозы 40% с 5% аскорбината магния в ампулах Раствор глюкозы 30%, аскорбиновой кислоты 2%, магния сульфата 6%, натрия бромида 10% в ампулах Раствор глюкозы 25% и метиленового синего 1% для инъекций Раствор глюкозы 40% с аскорбиновой кислотой 1% для инъекций Таблетки глюкозы 0,5 *г* или 1 *г*	**Glucosum(-i)** Solutio(-onis) Glucosi 5% pro injectionibus in lagenis Solutio(-onis) Glucosi 10%, 20% aut 40% pro injectionibus in lagenis Solutio(-onis) Glucosi 5%, 10%, 25% aut 40% pro injectionibus Solutio(-onis) Glucosi 40% Magnesii ascorbatis 5% in ampullis Solutio(-onis) Glucosi 30%, Acidi ascorbinici 2%, Magnesii sulfatis 6%, Natrii bromidi 10% in ampullis Solutio(-onis) Glucosi 25% et Methyleni coerulei 1% pro injectionibus Solutio(-onis) Glucosi 40% et Acidi ascorbinici 1% pro injectionibus Tabulettae(-as) Glucosi 0,5 aut 1,0
Гоматропина гидробромид Раствор гоматропина гидробромида 0,25% с метилцеллюлозой	**Homatropini hydrobromidum(-i)** Solutio(-onis) Homatropini hydrobromidi 0,25 cum Methylcelluloso
Гонадотропин хорионический Гонадотропин хорионический для инъекций	**Gonadotropinum(-i) chorionicum(-i)** Gonadotropinum(-i) chorionicum(-i) pro injectionibus
Гонадотропин менопаузный Гонадотропин менопаузный для инъекций	**Gonadotropinum(-i) menopausicum(-i)** Gonadotropinum(-i) menopausicum(-i) pro injectionibus
Горчичники	**Chartae(-as) sinapisatae(-as)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Госсипол Линимент госсипола 3%	**Gossipolum(-i)** Linimentum(-i) Gossipoli 3%
Гранулы «Флакарбин»	**Granula «Flacarbinum»**
Гризеофульвин Суспензия гризеофульвина Таблетки гризеофульвина 0,125 *г*	**Griseofulvinum(-i)** Suspensio(-onis) Griseofulvini Tabulettae(-as) Griseofulvini 0,125
Губка гемостатическая	**Spongia(-am) haemostatica(-am)**
Губка гемостатическая коллагеновая	**Spongia(-am) haemostatica(-am) collagenica(-am)**
Губка желатиновая	**Spongia(-am) gelatinosa(-am)**
Гумизоль	**Gumisolum(-i)**
Дактиномицин Раствор дактиномицина для инъекций	**Dactinomycinum(-i)** Solutio(-onis) Dactinomycini pro injectionibus
Дамилена малеинат Таблетки дамилена малеината 0,05 *г*	**Damileni maleinas(-atis)** Tabulettae(-as) Damileni maleinatis 0,05
Дегмин	**Degminum(-i)**
Дегмицид	**Degmicidum(-i)**
Деготь березовый	**Pix(-cis) liquida(-ae) Betulae**
Дезаминоокситоцин Таблетки дезаминоокситоцина 50 ЕД	**Desaminooxytocinum(-i)** Tabulettae(-as) Desaminooxytocini 50 ЕД
Дезоксикортикостерона ацетат Раствор дезоксикортикостерона ацетата в масле 0,5% для инъекций Таблетки дезоксикортикостерона-ацетата 0,005 *г*	**Desoxycorticosteroni acetas(-atis)** Solutio(-onis) Desoxycorticosteroni acetatis oleosa(-ae) 0,5% pro injectionibus Tabulettae(-as) Desoxycorticosteroni acetatis 0,005
Дезоксикортикостерона триметилацетат Суспензия дезоксикортикостерона триметилацетата 2,5% в ампулах	**Desoxycorticosteroni trimethylacetas(-atis)** Suspensio(-onis) Desoxycorticosteroni trimethylacetatis 2,5% in ampullis
Дезоксипеганина гидрохлорид Раствор дезоксипеганина гидрохлорида 1% для инъекций	**Desoxypeganini hydrochloridum(-i)** Solutio(-onis) Desoxypeganini hydrochloridi 1% pro injectionibus
Дезоксирибонуклеаза	**Desoxyribonucleasum(-i)**
Декамин Карамель с декамином 0,00015 *г* Мазь декаминовая 0,5% или 1%	**Decaminum(-i)** Caramel cum Decamino 0,00015 Unguentum(-i) Decamini 0,5% aut 1%
Дексаметазон Таблетки дексаметазона 0,0005 *г*	**Dexamethasonum(-i)** Tabulettae(-as) Dexamethasoni 0,0005
Дентоксид	**Dentoxidum(-i)**
Депилаторий	**Depilatorium(-i)**
Дерматол Линимент дерматоло-дегтярный Мазь дерматоловая	**Dermatolum(-i)** Linimentum(-i) Dermatoli cum Pice liquida Unguentum(-i) Dermatoli
Диазолин Драже диазолина 0,05 *г* или 0,1 *г*	**Diazolinum(-i)** Dragée Diazolini 0,05 aut 0,1
Диакарб Таблетки диакарба 0,25 *г*	**Diacarbum(-i)** Tabulettae(-as) Diacarbi 0,25
Диафенилсульфон Таблетки диафенилсульфона 0,025 *г* или 0,05 *г*	**Diaphenylsulfonum(-i)** Tabulettae(-as) Diaphenylsulfoni 0,025 aut 0,05
Дибазол Раствор дибазола 0,5% или 1% для инъекций Таблетки дибазола 0,02 *г* Таблетки дибазола 0,002 *г*, 0,003 *г* или 0,004 *г* Таблетки дибазола 0,03 *г*, теобромина 0,25 *г*,	**Dibazolum(-i)** Solutio(-onis) Dibazoli 0,5% aut 1% pro injectionibus Tabulettae(-as) Dibazoli 0,02 Tabulettae(-as) Dibazoli 0,002, 0,003 aut 0,004 Tabulettae(-as) Dibazoli 0,03, Theobromini 0,25,

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
платифиллина гидротартрата 0,003 *г* Таблетки дибазола и фенобарбитала по 0,025 *г*	Platyphyllini hydrotartratis 0,003 Tabulettae(-as) Dibazoli et Phenobarbitali aa 0,025
Дибиомицин Мазь дибиомициновая глазная 10 000 ЕД в 1 *г*	**Dibiomycinum(-i)** Unguentum(-i) Dibiomycini ophthalmicum(-i) 10 000 ЕД in 1,0
Дибунол Линимент дибунола 10%	**Dibunolum(-i)** Linimentum(-i) Dibunoli 10%
Дигален-нео	**Digalen-neo**
Дигидрострептомицина пантотенат	**Dihydrostreptomycini pantothenas(-atis)**
Дигидрострептомицина сульфат	**Dihydrostreptomycini sulfas(-atis)**
Дигидротахистерол Раствор дигидротахистерола в масле 0,1%	**Dihydrotachisterolum(-i)** Solutio(-onis) Dihydrotachisteroli oleosa(-ae) 0,1%
Дигитоксин Свечи с дигитоксином 0,00015 *г* Таблетки дигитоксина 0,0001 *г*	**Digitoxinum(-i)** Suppositoria Digitoxini 0,00015 Tabulettae(-as) Digitoxini 0,0001
Дигитонин	**Digitoninum(-i)**
Дигоксин Таблетки дигоксина 0,00025 *г* Таблетки дигоксина 0,0001 *г* для детей	**Digoxinum(-i)** Tabulettae(-as) Digoxini 0,00025 Tabulettae(-as) Digoxini 0,0001 pro infantibus
Дийодбензотэф Таблетки дийодбензотэфа 0,05 *г*	**Diiodbenzotephum(-i)** Tabulettae(-as) Diiodbenzotephi 0,05
Дийодтирозин Таблетки дийодтирозина 0,05 *г*	**Diiodthyrosinum(-i)** Tabulettae(-as) Diiodthyrosini 0,05
Дикаин Пленки глазные с дикаином Пленки глазные с дикаином и сульфапиридазин-натрием Пленки глазные с дикаином сульфапиридазин-натрием и атропина сульфатом	**Dicainum(-i)** Membranulae (lamellae) ophthalmicae cum Dicaino Membranulae (lamellae) ophthalmicae cum Dicaino et Sulfapyridazino-natrio Membranulae (lamellae) ophthalmicae cum Sulfapyridazino-natrio et Atropini sulfate
Диклоксациллина натриевая соль Диклоксациллина натриевая соль 0,125 *г* и 0,25 *г* Диклоксациллина натриевая соль 0,25 *г* в капсулах	**Dicloxacillinum(-i)- natrium(-i)** Dicloxacillini-natrii 0,125 et 0,25 Dicloxacillini-natrii 0,25 in capsulis
Димедрол Палочки с димедролом Раствор димедрола 1% для инъекций Раствор димедрола 1% для инъекций в шприц-тюбиках Свечи с димедролом для детей Таблетки димедрола 0,03 *г*, 0,05 *г* или 0,1 *г* Таблетки димедрола 0,02 *г* для детей	**Dimedrolum(-i)** Bacilli(-os) cum Dimedrolo Solutio(-onis) Dimedroli 1% pro injectionibus Solutio(-onis) Dimedroli 1% pro injectionibus in spritz-tubulis Suppositoria Dimedroli pro infantibus Tabulettae(-as) Dimedroli 0,03, 0,05 aut 0,1 Tabulettae(-as) Dimedroli 0,02 pro infantibus
Димекарбин Таблетки димекарбина 0,01 *г* или 0,02 *г*	**Dimecarbinum(-i)** Tabulettae(-as) Dimecarbini 0,01 aut 0,02
Димеколин Таблетки димеколина 0,025 *г*, покрытые оболочкой	**Dimecolinum(-i)** Tabulettae(-as) Dimecolini 0,025 obductae(-as)
Димексид	**Dimexidum(-i)**
Диметпрамид Раствор диметпрамида 2% для инъекций Таблетки диметпрамида 0,02 *г*	**Dimethpramidum(-i)** Solutio(-onis) Dimethpramidi 2% pro injectionibus Tabulettae(-as) Dimethpramidi 0,02
Димэстрол Раствор димэстрола в масле 0,6% для инъекций	**Dimoestrolum(-i)** Solutio(-onis) Dimoestroli oleosa(-ae) 0,6% pro injectionibus
Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты	**Dinatrii aethylendiamintetraacetas(-atis)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Динезин Таблетки динезина 0,05 *г* или 0,1 *г*, покрытые оболочкой	**Dinezinum(-i)** Tabulettae(-as) Dinezini 0,05 aut 0,1 obductae(-as)
Диоксидин Раствор диоксидина 1% для инъекций	**Dioxydinum(-i)** Solutio(-onis) Dioxydini 1% pro injectionibus
Диоксоний Раствор диоксония 0,1% для инъекций	**Dioxonium(-i)** Solutio(-onis) Dioxonii 0,1% pro injectionibus
Дипин Дипин лиофилизированный 0,02 *г* для инъекций	**Dipinum(-i)** Dipinum(-i) lyophilisatum(-i) 0,02 pro injectionibus
Дипироксим Раствор дипироксима 15% для инъекций	**Dipiroximum(-i)** Solutio(-onis) Dipiroximi 15% pro injectionibus
Диплацина дихлорид Раствор диплацина дихлорида 2% для инъекций	**Diplacini dichloridum(-i)** Solutio(-onis) Diplacini dichloridi 2% pro injectionibus
Дипразин Драже дипразина по 0,025 *г* или 0,05 *г* Раствор дипразина 2,5% для инъекций Таблетки дипразина 0,005 *г* и 0,01 *г*, покрытые оболочкой, для детей Таблетки дипразина 0,025 *г*, покрытые оболочкой	**Diprazinum(-i)** Dragée Diprazini 0,025 aut 0,05 Solutio(-onis) Diprazini 2,5% pro injectionibus Tabulettae(-as) Diprazini 0,005 et 0,01 obductae(-as) pro infantibus Tabulettae(-as) Diprazini 0,025 obductae(-as)
Дипромоний Дипромоний 0,05 *г* для инъекций Таблетки дипромония 0,02 *г*	**Dipromonium(-i)** Dipromonium(-i) 0,05 pro injectionibus Tabulettae(-as) Dipromonii 0,02
Дипрофен Таблетки дипрофена 0,025 *г*	**Diprophenum(-i)** Tabulettae(-as) Dipropheni 0,025
Дипрофиллин Раствор дипрофиллина 10% для инъекций Суппозитории с дипрофиллином 0,5 *г* Таблетки дипрофиллина 0,2 *г*	**Diprophyllinum(-i)** Solutio(-onis) Diprophyllini 10% pro injectionibus Suppositoria Diprophyllini 0,5 Tabulettae(-as) Diprophyllini 0,2
Дисульформин Таблетки дисульформина 0,5 *г*	**Disulforminum(-i)** Tabulettae(-as) Disulformini 0,5
Дитетрациклин Мазь дитетрациклиновая глазная 10 000 ЕД в 1 *г*	**Ditetracyclinum(-i)** Unguentum(-i) Ditetracyclini ophthalmicum(-i) 10 000 ЕД in 1,0
Дитилин Раствор дитилина 2% для инъекций	**Dithylinum(-i)** Solutio(-onis) Dithylini 2% pro injectionibus
Дитразин	**Ditrazinum(-i)**
Дитразина цитрат Таблетки дитразина цитрата 0,05 *г* или 0,1 *г*	**Ditrazini citras(-atis)** Tabulettae(-as) Ditrazini citratis 0,05 aut 0,1
Дифезил	**Diphezylum(-i)**
Дифенин Таблетки дифенина 0,117 *г*	**Dipheninum(-i)** Tabulettae(-as) Diphenini 0,117
Дифрил Таблетки дифрила 0,03 *г* Таблетки дифрила 0,06 *г*	**Diphrylum(-i)** Tabulettae(-as) Diphryli 0,03 Tabulettae(-as) Diphryli 0,06
Дихлотиазид Таблетки дихлотиазида 0,025 *г*	**Dichlothiazidum(-i)** Tabulettae(-as) Dichlothiazidi 0,025
Диэтиламид никотиновой кислоты	**Diaethylamidum(-i) Acidi nicotinici**
Диэтилстильбэстрол Таблетки диэтилстильбэстрола 0,001 *г*	**Diaethylstilboestrolum(-i)** Tabulettae(-as) Diaethylstilboestroli 0,001
Диэтилстильбэстрола пропионат Раствор диэтилстильбэстрола пропионата в масле 0,1% или 0,5% для инъекций	**Diaethylstilboestroli propionas(-atis)** Solutio(-onis) Diaethylstilboestroli propionatis oleosa(-ae) 0,1% aut 0,5 pro injectionibus
Доксициклина гидрохлорид	**Doxycyclini hydrochloridum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Доксициклина гидрохлорид 0,05 *г*, 0,1 и 0,2 *г* в капсулах	Doxycyclini hydrochloridi 0,05, 0,1 et 0,2 in capsulis
Допан Таблетки допана 0,002 *г*	**Dopanum(-i)** Tabulettae(-as) Dopani 0,002
Драже «Гексавит»	**Dragée «Hexavitum»**
Драже «Гендевит»	**Dragée «Hendevitum»**
Драже «Ундевит»	**Dragée «Undevitum»**
Дрожжи пивные очищенные сухие	**Faex(-cis) medicinalis(-is); Cerevisiae fermentum(-i) depuratum(-i) siccum(-i)**
Дроперидол Раствор дроперидола 0,25% для инъекций	**Droperidolum(-i)** Solutio(-onis) Droperidoli 0,25% pro injectionibus
Дуст ДДТ	**Dust DDT**
Дустундан	**Dustundanum(-i)**
Желатин медицинский Раствор желатина медицинского 10% для инъекций	**Gelatina(-ae) medicinalis(-is)** Solutio(-onis) Gelatinae medicinalis 10% pro injectionibus
Желатиноль	**Gelatinolum(-i)**
Железа глицерофосфат	**Ferri glycerophosphas(-atis)**
Железа закисного сульфат	**Ferrosi sulfas(-atis)**
Железа лактат	**Ferri lactas(-atis)**
Железо восстановленное Таблетки железа восстановленного 0,2 *г*, покрытые оболочкой	**Ferrum(-i) reductum(-i)** Tabulettae(-as) Ferri reducti 0,2 obductae(-as)]
Желчь медицинская консервированная	**Chole(-es) conservata(-ae) medicinalis(-is)**
Жидкость Бурова	**Liquor(-oris) Burovi**
Жидкость Митрошина	**Liquor(-oris) Mitroshini**
Жидкость мозольная	**Liquor(-oris) ad clavos**
Жидкость Новикова	**Liquor(-oris) Novicovi**
Жир свиной очищенный	**Adeps(Adipis) suillus(-i) depuratus(-i)**
Зимозан Суспензия зимозана	**Zymosanum(-i)** Suspensio(-onis) Zymosani
Изадрин Таблетки изадрина 0,005 *г*	**Isadrinum(-i)** Tabulettae(-as) Isadrini 0,005
Изафенин Таблетки изафенина 0,01 *г*	**Isapheninum(-i)** Tabulettae(-as) Isaphenini 0,01
Изоверин Раствор изоверина 2% или 5% для инъекций Таблетки изоверина 0,1 *г*	**Isoverinum(-i)** Solutio(-onis) Isoverini 2% aut 5% pro injectionibus Tabulettae(-as) Isoverini 0,1
Изониазид (тубазид) Таблетки изониазида 0,1 *г*, 0,2 *г* или 0,3 *г*	**Isoniazidum(-i) [Tubazidum(-i)]** Tabulettae(-as) Isoniazidi 0,1, 0,2 aut 0,3
Изонитрозин Раствор изонитрозина 40% для инъекций	**Isonitrosinum(-i)** Solutio(-onis) Isonitrosini 40% pro injectionibus
Имехин Раствор имехина 1% для инъекций	**Imechinum(-i)** Solutio(-onis) Imechini 1% pro injectionibus
Имизин Раствор имизина 1,25% для инъекций Таблетки имизина 0,025 *г*, покрытые оболочкой	**Imizinum(-i)** Solutio(-onis) Imizini 1,25% pro injectionibus Tabulettae(-as) Imizini 0,025 obductae(-as)
Имифос	**Imiphosum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Имифос 0,05 *г* для инъекций	Imiphosi 0,05 pro injectionibus
Иммуноглобулин антирезус Rho(D)-человека	**Immunoglobulinum(-i) humanum(-i) antirhesus-Rho(D)**
Иммуноглобулин антирезус Rho(D)-человека лиофилизированный	**Immunoglobulinum(-i) humanum(-i) lyophilisatum(-i) antirhesus-Rho(D)**
Ингакамф (ингалятор карманный)	**Inhacamphum(-i)**
Ингалипт	**Inhalyptum(-i)**
Ингитрил	**Ingitrilum(-i)**
Индигокармин для инъекций Раствор индигокармина 0,4% для инъекций	**Indigocarminum(-i)** Solutio(-onis) Indigocarmini 0,4% pro injectionibus
Индопан Таблетки индопана 0,005 *г* или 0,01 *г*, покрытые оболочкой	**Indopanum(-i)** Tabulettae(-as) Indopani 0,005 aut 0,01 obductae(-as)
Инказан Таблетки инказана 0,025 *г*	**Incazanum(-i)** Tabulettae(-as) Incazani 0,025
Инсулин Инсулин для инъекций	**Insulinum(-i)** Insulinum(-i) pro injectionibus
Интермедин	**Intermedinum(-i)**
Ихтиол Мазь ихтиоловая 10% или 20% Мазь ихтиол-висмут-салициловая Мазь ихтиоло-нафталановая Паста ихтиол-висмут-цинковая Паста ихтиоло-цинко-нафталанная Раствор ихтиола 10% в глицерине Свечи с ихтиолом	**Ichthyolum(-i)** Unguentum(-i) Ichthyoli 10% aut 20% Unguentum(-i) Ichthyol-bismuth-salicylicum(-i) Unguentum(-i) naphthalano-ichthyolatum(-i) Pasta(-ae) Zinci-bismuth-ichthyolata(-ae) Pasta(-ae) Zinci-naphthalano-ichthyolata(-ae) Solutio(-onis) Ichthyoli 10% in glycerino Suppositoria cum Ichthyolo
Йод Раствор йода спиртовой 1%, 2% Раствор йода спиртовой 3% Раствор йода спиртовой 5% Раствор йода спиртовой 5% в ампулах с оплеткой Раствор йода спиртовой 10% Таблетки йодные	**Iodum(-i)** Solutio(-onis) Iodi spirituosa(-ae) 1%, 2% Solutio(-onis) Iodi spirituosa(-ae) 3% Solutio(-onis) Iodi spirituosa(-ae) 5% Solutio(-onis) Iodi spirituosa(-ae) 5% in ampullis Solutio(-onis) Iodi spirituosa(-ae) 10% Tabulettae(-as) Iodi
Йодамид Йодамид-300 и йодамид-380 для инъекций	**Iodamidum(-i)** Iodamidum-300 et Iodamidum-380 pro injectionibus
Йодинол	**Iodinolum(-i)**
Йодолипол	**Iodolipolum(-i)**
Йодонат	**Iodonatum(-i)**
Йодопирон	**Iodopironum(-i)**
Йодоформ	**Iodoformium(-i)**
Йодуксун-1 и 2	**Ioduxunum(-i)-1 et**
Йодуксун-3	**Ioduxunum(-i)-3**
Калефлон Таблетки калефлона 0,1 *г*, покрытые оболочкой	**Calefloпum(-i)** Tabulettae(-as) Calefloni 0,1 obductae(-as)
Калия аспарагинат*	**Kalii asparaginas(-atis)**
Калия ацетат Раствор калия ацетата 34%	**Kalii acetas(-atis)** Solutio(-onis) Kalii acetatis 34%
Калия бромид Раствор калия бромида 1%, 2%, 3% с фруктовым сиропом Таблетки калия бромида 0,5 *г*	**Kalii bromidum(-i)** Solutio(-onis) Kalii bromidi 1%, 2%, 3% cum Sirupo fructuum Tabulettae(-as) Kalii bromidi 0,5

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Калия гидротартрат	**Kalii hydrotartras(-atis)**
Калия йодид Раствор калия йодида 3% Раствор калия йодида 3% (глазные капли) Таблетки калия йодида 0,25 *г* Таблетки калия йодида 0,5 *г*	**Kalii iodidum(-i)** Solutio(-onis) Kalii iodidi 3% Solutio(-onis) Kalii iodidi 3% (Guttae ophthalmicae) Tabulettae(-as) Kalii iodidi 0,25 Tabulettae(-as) Kalii iodidi 0,5
Калия карбонат	**Kalii carbonas(-atis)**
Калия оротат Таблетки калия оротата 0,5 *г* Таблетки калия оротата 0,1 *г* для детей	**Kalii orotas(-atis)** Tabulettae(-as) Kalii orotatis 0,5 Tabulettae(-as) Kalii orotatis 0,1 pro infantibus
Калия перманганат	**Kalii permanganas(-atis)**
Калия хлорид Калия хлорид для инъекций 1 *г* Раствор калия хлорида 4% для инъекций Раствор калия хлорида 10%	**Kalii chloridum(-i)** Kalii chloridi 1,0 pro injectionibus Solutio(-onis) Kalii chloridi 4% pro injectionibus Solutio(-onis) Kalii chloridi 10%
Кальцекс Таблетки «кальцекс» 0,5 *г*	**Calcex** Tabulettae(-as) «Calcex» 0,5
Кальцийодин Таблетки кальцийодина 0,5 *г*	**Calciiodinum(-i)** Tabulettae(-as) Calciiodini 0,5
Кальция глицерофосфат Гранулы глицерофосфата Таблетки кальция глицерофосфата 0,2 *г* или 0,5 *г* Таблетки кальция глицерофосфата и фитина по 0,25 *г*	**Calcii glycerophosphas(-atis)** Granula glycerophosphatis Tabulettae(-as) Calcii glycerophosphatis 0,2 aut 0,5 Tabulettae(-as) Calcii glycerophosphatis et Phytini aa 0,25
Кальция глюконат Раствор кальция глюконата 10% для инъекций Таблетки кальция глюконата 0,5 *г* Таблетки кальция глюконата 0,25 *г* с какао	**Calcii gluconas(-atis)** Solutio(-onis) Calcii gluconatis 10% pro injectionibus Tabulettae(-as) Calcii gluconatis 0,5 Tabulettae(-as) Calcii gluconatis 0,25 cum Cacao
Кальция глютаминат	**Calcii glutaminas(-atis)**
Кальция карбонат осажденный	**Calcii carbonas(-atis) praecipitatus(-i)**
Кальция лактат Таблетки кальция лактата 0,5 *г* Таблетки кальция лактата и кальция глицерофосфата по 0,25 *г*	**Calcii lactas(-atis)** Tabulettae(-as) Calcii lactatis 0,5 Tabulettae(-as) Calcii lactatis et Calcii glycerophosphatis aa 0,25
Кальция пангамат Таблетки кальция пангамата 0,05 *г*, покрытые оболочкой	**Calcii pangamas(-atis)** Tabulettae(-as) Calcii pangamatis 0,05 obductae(-as)
Кальция пантотенат Раствор кальция пантотената 20% для инъекций Таблетки кальция пантотената 0,1 *г*	**Calcii pantothenas(-atis)** Solutio(-onis) Calcii pantothenatis 20% pro injectionibus Tabulettae(-as) Calcii pantothenatis 0,1
Кальция фосфат	**Calcii phosphas(-atis)**
Кальция хлорид Раствор кальция хлорида 10% Раствор кальция хлорида 10% для инъекций Раствор кальция хлорида 50% Раствор кальция хлорида 5% с фруктовым сиропом	**Calcii chloridum(-i)** Solutio(-onis) Calcii chloridi 10% Solutio(-onis) Calcii chloridi 10% pro injectionibus Solutio(-onis) Calcii chloridi 50% Solutio(-onis) Calcii chloridi 5% cum Sirupo fructuum
Камфоний Раствор камфония 1% для инъекций Таблетки камфония 0,01 *г* и 0,05 *г*	**Camphonium(-i)** Solutio(-onis) Camphonii 1% pro injectionibus Tabulettae(-as) Camphonii 0,01 et 0,05
Камфора	**Camphora(-ae)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Камфора рацемическая Камфора — 10 *г* Масло терпентинное очищенное — 20 *г* Жир свиной очищенный — 40 *г* Парафин медицинский — 10 *г* Вазелин медицинский — до 100 *г*	**Camphora(-ae) racemica(-ae)** Camphora — 10,0 Oleum Terebinthinae rectificatum — 20,0 Adeps (Adipis) suillus depuratus — 40,0 Paraffinum medicinale — 10,0 Vaselinum medicinale — ad 100,0
Камфорный спирт	Spiritus(-us) camphoratus(-i)
Капли камфорно-валериановые	Tinctura(-ae) Valerianae cum Camphora
Мазь камфорная	Unguentum(-i) camphoratum(-i)
Масло камфорное 10% для наружного применения	Solutio(-onis) Camphorae oleosa(-ae) ad usum externum
Раствор камфоры в масле 20% для инъекций	Solutio(-onis) Camphorae oleosa(-ae) 20% pro injectionibus
Раствор камфоры в оливковом масле 20% для инъекций	Solutio(-onis) Camphorae in oleo Olivarum 20% pro injectionibus
Раствор камфоры и салициловой кислоты спиртовой	Solutio(-onis) Camphorae et Acidi salicylici spirituosa(-ae)
Спирт камфорный 2%	Spiritus(-us) camphoratus(-i) 2%
Спирт камфорный и спирт муравьиный поровну	Spiritus(-us) camphoratus(-i) et Spiritus(-us) Acidi formicici aa
Камфоцин	**Camphocinum(-i)**
Канамицина моносульфат Таблетки канамицина моносульфата 0,125 *г* и 0,25 *г*	**Kanamycini monosulfas(-atis)** Tabulettae(-as) Kanamycini monosulfatis 0,125 aut 0,25
Канамицина сульфат Пленки глазные с канамицином	**Kanamycini sulfas(-atis)** Membranulae (lamellae) ophthalmicae cum Kanamycini sulfate
Капли «Дента»	**Guttae(-as) «Denta»**
Капли зубные: Ментола 0,06 *г*; Тимола 0,06 *г*; Фенилсалицилата 0,75 *г*; Глицерина 2,5 *г*; Спирта 25 *г*	**Guttae(-as) contra odontalgiam:** Mentholi 0,05; Thymoli 0,06; Phenylii salicylatis 0,75; Glycerini 2,5; Spiritus aethylici 25,0
Капли зубные: Масла мятного 3,1 *г*; Камфоры 6,4 *г*; Настойки валерианы 90,5 *г*	**Guttae (-as) contra odontalgiam:** Olei Menthae piperitae 3,1; Camphorae 6,4; Tincturae Valerianae 90,5
Капли ландышево-валериановые	**Tinctura(-ae) Convallariae et tinctura (-ae) Valerianae**
Капли ландышево-валериановые с адонизидом	**Tinctura(-ae) Convallariae et tinctura(-ae) Valerianae cum Adonisido**
Капли ландышево-валериановые с адонизидом и бромидом натрия	**Tinctura(-ae) Convallariae et tinctura(-ae) Valerianae cum Adonisido et Natrii bromido**
Капли ландышево-валериановые с бромидом натрия	**Tinctura(-ae) Convallariae et tinctura(-ae) Valerianae cum Natrii bromido**
Капли ландышево-пустырниковые	**Tinctura(-ae) Convallariae et tinctura(-ae) Leonuri**
Капли нашатырно-анисовые	**Liquor(-oris) Ammonii anisatus(-i)**
Капли «Эвкатол»	**Guttae(-as) «Eucatolum»**
Капсин	**Capsinum(-i)**
Капситрин	**Capsitrinum(-i)**
Карандаш кровоостанавливающий	**Stilus(-i) haemostaticus(-i)**
Карандаш ляписный	**Stilus(-i) Argenti nitratis**
Карбахолин	**Carbacholinum(-i)**
Карбенициллина динатриевая соль Карбенициллина динатриевая соль 1 *г*	**Carbenicillinum(-i) -dinatrium(-i)** Carbenicillini-dinatrii 1,0
Карбидин Раствор карбидина 1,25% для инъекций Таблетки карбидина 0,025 *г*, покрытые оболочкой	**Carbidinum(-i)** Solutio(-onis) Carbidini 1,25% pro injectionibus Tabulettae(-as) Carbidini 0,25 obductae(-as)
Карбокромен Таблетки карбокромена 0,075 *г*	**Carbocromenum(-i)** Tabulettae(-as) Carbocromeni 0,075

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Кардиовален	**Cardiovalenum(-i)**
Карловарская соль искусственная	**Sal(-is) carolinum(-i) factitium(-i)**
Карнитина хлорид Раствор карнитина хлорида 20%	**Carnitini chloridum(-i)** Solutio(-onis) Carnitini chloridi 20%
Каротолин	**Carotolinum(-i)**
. . . .	
Карофилен Мазь карофиленовая 5%, 10%	**Carofilenum(-i)** Unguentum(-i) Carofileni 5%, 10%
Кафиол	**Cafiolum(-i)**
Квалидил Раствор квалидила 2% в ампулах	**Qualidilum(-i)** Solutio(-onis) Qualidili 2% in ampullis
Квасцы	**Alumen(-inis)**
Квасцы жженые	**Alumen(-inis) ustum(-i)**
Кватерон Таблетки кватерона 0,02 *г*	**Quateronum(-i)** Tabulettae(-as) Quateroni 0,02
Кверцетин Таблетки кверцетина 0,02 *г*	**Quercetinum(-i)** Tabulettae(-as) Quercetini 0,02
Келлин Свечи с келлином 0,02 *г* Таблетки келлина 0,02 *г*	**Khellinum(-i)** Suppositoria cum Khellino 0,02 Tabulettae(-as) Khellini 0,02
Кислород	**Oxygenium(-i)**
Кислота адениловая (МАП)	**Acidum(-i) adenylicum(-i) [MAP]**
Кислота аденозинтрифосфорная	**Acidum(-i) adenosintriphosphoricum(-i)**
Кислота аминокапроновая Раствор кислоты аминокапроновой 5% для инъекций	**Acidum(-i) aminocaproicum(-i)** Solutio(-onis) Acidi aminocaproici 5% pro injectionibus
Кислота аскорбиновая Драже аскорбиновой кислоты 0,05 *г* Раствор аскорбиновой кислоты 5% для инъекций Раствор аскорбиновой кислоты 10% для инъекций Таблетки аскорбиновой кислоты 0,025 *г* Таблетки аскорбиновой кислоты (витамина С) 0,025 *г* Таблетки аскорбиновой кислоты 0,05 *г* Таблетки аскорбиновой кислоты 0,5 или 2,5 *г* Таблетки аскорбиновой кислоты 0,1 *г*	**Acidum(-i) ascorbinicum(-i)** Dragée Acidi ascorbinici 0,05 Solutio(-onis) Acidi ascorbinici 5% pro injectionibus Solutio(-onis) Acidi ascorbinici 10% pro injectionibus Tabulettae(-as) Acidi ascorbinici 0,025 Tabulettae(-as) Acidi ascorbinici (Vitamini C) 0,025 Tabulettae(-as) Acidi ascorbinici 0,05 Tabulettae(-as) Acidi ascorbinici 0,5 aut 2,5 Tabulettae(-as) Acidi ascorbinici 0,1
Кислота ацетилсалициловая (аспирин) Таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,1 *г* для детей Таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,25 *г* или 0,5 *г* Таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,25 *г* и кофеина 0,05 *г* Таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,5 *г* и кофеина 0,05 *г*	**Acidum(-i) acetylsalicylicum(-i) [Aspirinum(-i)]** Tabulettae(-as) Acidi acetylsalicylici 0,1 pro infantibus Tabulettae(-as) Acidi acetylsalicylici 0,25 aut 0,5 Tabulettae(-as) Acidi acetylsalicylici 0,25 et Coffeini 0,05 Tabulettae(-as) Acidi acetylsalicylici 0,5 et Coffeini 0,05
Кислота бензойная	**Acidum(-i) benzoicum(-i)**
Кислота борная	**Acidum(-i) boricum(-i)**
Кислота борная — 3 *г* Глицерин — 50 *г* Спирт этиловый 70% — до 100 *мл*	Acidum boricum — 3,0 Glycerinum — 50,0 Spiritus(-us) aethylicus(-i) 70% — ad 100 ml
Кислоты борной 0,6 *г* Мази цинковой Мази серной по 15 *г*	Acidi borici 0,6 Unguenti Zinci Unguenti sulfurici aa 15,0
Линимент борно-цинковый Мазь борная 5% Паста борно-цинко-нафталанная Раствор борной кислоты 10% в глицерине	Linimentum(-i) boro-zincatum(-i) Unguentum(-i) Acidi borici 5% Pasta(-ae) boro-zinco-naphthalanata(-ae) Solutio(-onis) Acidi borici 10% in glycerino

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Раствор борной кислоты спиртовой 0,5%, 1%, 2% или 3%	Solutio(-onis) Acidi borici spirituosa(-ae) 0,5%, 1%, 2% aut 3%
Раствор борной кислоты спиртовой 3%, раствор перекиси водорода поровну	Solutio(-onis) Acidi borici spirituosa(-ae) 3%, Solutio(-onis) Hydrogenii peroxydi diluta aa
Кислота глютаминовая	**Acidum(-i) glutaminicum(-i)**
Таблетки глютаминовой кислоты 0,25 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Acidi glutaminici 0,25 obductae(-as)
Таблетки глютаминовой кислоты 0,25 *г* или 0,5 *г* (растворимые в кишечнике)	Tabulettae(-as) Acidi glutaminici 0,25 aut 0,5 (enterosolubiles)
Таблетки глютаминовой кислоты 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Acidi glutaminici 0,5
Кислота дегидрохолевая	**Acidum(-i) dehydrocholicum(-i)**
Таблетки дигидрохолевой кислоты 0,2 *г*	Tabulettae(-as) Acidi dehydrocholici 0,2
Кислота диоксибензойная	**Acidum(-i) dioxybenzoicum(-i)**
Таблетки кислоты диоксибензойной 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Acidi dioxybenzoici 0,5
Кислота диэтилентриаминпен тауксусная	**Acidum (-i) diaethylentriaminpentaceticum(-i)**
Кислота липоевая	**Acidum(-i) lipoicum(-i)**
Раствор липоевой кислоты 0,5% для инъекций	Solutio(-onis) Acidi lipoici 0,5% pro injectionibus
Таблетки липоевой кислоты 0,012 *г* и 0,025 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Acidi lipoici 0,012 et 0,025 obductae(-as)
Кислота мефенаминовая	**Acidum(-i) mephenaminicum(-i)**
Таблетки мефенаминовой кислоты 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Acidi mephenaminici 0,25 aut 0,5
Кислота молочная — 15 *г*	**Acidum lacticum — 15,0**
Кислота салициловая — 15 *г*	**Acidum salicylicum — 15,0**
Ланолин безводный — 15 *г*	**Lanolinum anhydricum — 15,0**
Вазелин — до 100 *г*	**Vaselinum — ad 100,0**
Кислота никотиновая	**Acidum(-i) nicotinicum(-i)**
Раствор никотиновой кислоты 1% для инъекций	Solutio(-onis) Acidi nicotinici 1% pro injectionibus
Таблетки никотиновой кислоты 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Acidi nicotinici 0,05
Кислота нуклеиновая	**Acidum(-i) nucleinicum(-i)**
Кислота салициловая	**Acidum(-i) salicylicum(-i)**
Кислота салициловая — 13,33 *г* Кислота бензойная — 6,67 *г* Вазелин — 80,0 *г*	Acidum salicylicum —13,33 Acidum benzoicum — 6,67 Vaselinum — 80,0
Кислота салициловая — 2 *г* Левомицетин — 2 *г* Спирт этиловый 95% — до 100 *мл*	Acidum salicylicum — 2,0 Laevomycetinum — 2,0 Spiritus aethylicus 95% — ad 100 ml
Кислота салициловая — 1 *г* Масло касторовое — 10 *г* Настойка перца стручкового — 10 *мл* Спирт этиловый 95% — до 100 *мл*	Acidum salicylicum — 1,0 Oleum Ricini — 10,0 Tinctura Capsici — 10 ml Spiritus aethylicus 95% — ad 100 ml
Мазь салициловая 2% или 3% Паста салицилово-серно-цинковая Раствор салициловой кислоты спиртовой 1% или 2%	Unguentum(-i) salicylicum(-i) 2% aut 3% Pasta(-ae) sulfuro-zinco-salicylata(-ae) Solutio(-onis) Acidi salicylici spirituosa(-ae) 1% aut 2%
Кислота сульфокамфорная*	**Acidum(-i) sulfocamphoratum(-i)**
Кислота трихлоруксусная	**Acidum(-i) trichloraceticum(-i)**
Кислота фолиевая	**Acidum(-i) folicum(-i)**
Таблетки фолиевой кислоты 1 *мг*	Tabulettae(-as) Acidi folici 0,001
Кислота хлористоводородная	**Acidum(-i) hydrochloricum(-i)**
Кислота хлористоводородная разведенная	**Acidum(-i) hydrochloricum(-i) dilutum(-i)**
Клей для обработки микротравм (клей БФ-6)	**Colla(-ae) BF-6**
Клей к аппарату для срезания кожных трансплантатов (дерматому)	**Colla(-ae) pro dermatomo**
Клеол	**Cleolum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Клофелин Раствор клофелина 0,01% для инъекций Раствор клофелина 0,0125%, 0,25% и 0,5% в тюбик-капельницах Таблетки клофелина 0,000075 *г* или 0,00015 *г*	**Clophelinum(-i)** Solutio(-onis) Clophelini 0,01% pro injectionibus Solutio(-onis) Clophelini 0,0125%, 0,25% et 0,5% Tabulettae(-as) Clophelini 0,000075 aut 0,00015
Коамид Раствор коамида 1% для инъекций	**Coamidum(-i)** Solutio(-onis) Coamidi 1% pro injectionibus
Кобамамид Кобамамид 0,0001 *г*, 0,0005 *г* или 0,001 *г* для инъекций Таблетки кобамамида 0,0005 *г*, 0,001 *г* Таблетки кобамамида 0,0001 *г*, 0,0005 *г* или 0,001 *г*, покрытые оболочкой	**Cobamamidum(-i)** Cobamamidi 0,0001, 0,0005 aut 0,001 pro injectionibus Tabulettae(-as) Cobamamidi 0,0005 aut 0,001 Tabulettae(-as) Cobamamidi 0,0001, 0,0005 aut 0,001 obductae(-as)
Кодеин Таблетки кодеина 0,015 *г* и натрия гидрокарбоната 0,25 *г*	**Codeinum(-i)** Tabulettae(-as) Codeini 0,015 et Natrii hydrocarbonatis 0,25
Кодеина фосфат	**Codeini phosphas(-atis)**
Кокаина гидрохлорид	**Cocaini hydrochloridum(-i)**
Кокарбоксилазы гидрохлорид Кокарбоксилазы гидрохлорид 0,5 *г* для инъекций	**Cocarboxylasi hydrochloridum(-i)** Cocarboxylasi hydrochloridi 0,5 pro injectionibus
Коллагеназа	**Collagenasum(-i)**
Колларгол	**Collargolum(-i)**
Коллодий	**Collodium(-i)**
Колхамин Мазь колхаминовая 0,5% Таблетки колхамина 0,002 *г*	**Colchaminum(-i)** Unguentum(-i) Colchamini 0,5% Tabulettae(-as) Colchamini 0,002
Комбутек	**Combutecum(-i)**
Конвафлавин Таблетки конвафлавина 0,01 *г*, покрытые оболочкой	**Convaflavinum(-i)** Tabulettae(-as) Convaflavini 0,01 obductae(-as)
Концентрат горькоминдальной воды	**Concentratum(-i) Aquae Amygdalarum amararum**
Коразол Раствор коразола 10% Таблетки коразола 0,1 *г*	**Corazolum(-i)** Solutio(-onis) Corazoli 10% Tabulettae(-as) Corazoli 0,1
Корвалол	**Corvalolum(-i)**
Коргликон Раствор коргликона 0,06% для инъекций	**Corglyconum(-i)** Solutio(-onis) Corglyconi 0,06% pro injectionibus
Кордиамин Кордиамин для инъекций в шприц-тюбиках	**Cordiaminum(-i)** Cordiaminum(-i) pro injectionibus in spritz-tubulis
Кордигит Свечи с кордигитом 0,0008 *г* или 0,0012 *г* Таблетки «Кордигит»	**Cordigitum(-i)** Suppositoria cum Cordigito 0,0008 aut 0,0012 Tabulettae(-as) «Cordigitum»
Кортизона ацетат Таблетки кортизона ацетата 0,025 *г* или 0,05 *г*	**Cortisoni acetas(-atis)** Tabulettae(-as) Cortisoni acetatis 0,025 aut 0,05
Кортикотропин (АКТГ) Кортикотропин для инъекций	**Corticotropinum(-i) [ACTH]** Corticotropinum pro injectionibus
Котарнина хлорид (стиптицин) Таблетки котарнина хлорида 0,05 *г*, покрытые оболочкой	**Cotarnini chloridum(-i) [Stypticinum (-i)]** Tabulettae(-as) Cotarnini chloridi 0,05, obductae (-as)
Кофеин	**Coffeinum(-i)**
Кофеин-бензоат натрия Раствор кофеина-бензоата натрия 10% или 20% для инъекций Раствор кофеина-бензоата натрия 10% или 20% для инъекций в шприц-тюбиках	**Coffeinum(-i) -Natrii benzoas(-atis)** Solutio(-onis) Coffeini -Natrii benzoatis 10% aut 20% pro injectionibus Solutio(-onis) Coffeini -Natrii benzoatis 10% aut 20% pro injectionibus in pritz-tubulis

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки кофеина-бензоата натрия 0,075 *г* для детей	Tabulettae(-as) Coffeini -Natrii benzoatis 0,075 pro infantibus
Таблетки кофеина-бензоата натрия 0,1 *г* или 0,2 *г*	Tabulettae(-as) Coffeini -Natrii benzoatis 0,1 aut 0,2
Кризанол	**Crysanolum(-i)**
Кризанол в масле 5% или 10% для инъекций	Solutio(-onis) Crysanoli oleosa(-ae) 5% aut 10% pro injectionibus
Криопреципитат	**Cryopraecipitatum(-i)**
Криопреципитат сухой	Cryopraecipitatum(-i) siccum(-i)
Ксантинола никотинат	**Xantinoli nicotinas(-atis)**
Таблетки теоникола 0,15 *г*	Tabulettae(-as) Teonicoli 0,15
Ксероформ	**Xeroformium(-i)**
Мазь ксероформная	Unguentum(-i) Xeroformii
Ксикаин	**Xycainum(-i)**
Лактин (полупродукт)	**Lactinum(-i)**
Лактин для инъекций	**Lactinum(-i) pro injectionibus**
Ламинарид	**Laminaridum(-i)**
Гранулы ламинарида	Granula Laminaridi
Ланолин безводный	**Lanolinum(-i) anhydricum(-i)**
Ланолин безводный — 25 *г*	Lanolinum anhydricum — 25,0
Глицерин — 25 *г*	Glycerinum — 25,0
Вода дистиллированная — 25 *г*	Aqua destillata — 25,0
Вазелин медицинский — до 100 *г*	Vaselinum medicinale — ad 100,0
Ланоль	**Lanolum(-i)**
Лантозид	**Lantosidum(-i)**
Левовинизоль	**Laevovinisolum(-i)**
Левомицетин	**Laevomycetinum(-i)**
Левомицетин в капсулах по 0,1 *г*, 0,25 *г* и 0,5 *г*	Laevomycetini 0,1, 0,25 et 0,5 in capsulis
Левомицетина 2,5 *г*	Laevomycetini 2,5
Кислоты борной 1 *г*	Acidi borici 1,0
Спирта этилового 70% до 100 *мл*	Spiritus aethylici 70% ad 100 ml
Левомицетина 2 *г*	Laevomycetini 2,0
Новокаина 1 *г*	Novocaini 1,0
Спирта этилового 70% до 100 *мл*	Spiritus aethylici 70% ad 100 ml
Левомицетина 5 *г*	Laevomycetini 5,0
Пасты салицилово-цинковой 95 *г*	Pasta zinco-salicylatae 95,0
Раствор левомицетина 0,25%	Solutio(-onis) Laevomycetini 0,25%
Раствор левомицетина спиртовой 0,25%, 1%, 3%, 5%	Solutio(-onis) Laevomycetini spirituosa(-ae) 0,25%, 1%, 3%, 5%
Таблетки левомицетина 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Laevomycetini 0,25 aut 0,5
Таблетки левомицетина 0,25 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Laevomycetini 0,25 obductae(-as)

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки левомицетина 0,65 *г* пролонгированного действия	Tabulettae(-as) Laevomycetini 0,65 prolongatae(-as)
Левомицетина стеарат	**Laevomycetini stearas(-atis)**
Таблетки левомицетина стеарата 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Laevomycetini stearatis 0,25
Левомицетина сукцинат натрия	**Laevomycetini natrio-succinas(-atis)**
Леворин	**Levorinum(-i)**
Мазь левориновая 500 000 ЕД в 1 *г*	Unguentum(-i) Levorini 500 000 ЕД in 1,0
Порошок с леворином 4 000 000 ЕД для суспензий	Pulvis(-eris) cum Levorino 4 000 000 ЕД pro suspensionibus
Таблетки леворина 500 000 ЕД	Tabulettae(-as) Levorini 500 000 ЕД
Таблетки леворина защечные 500 000 ЕД	Tabulettae(-as) Levorini 500 000 ЕД transbuccales
Леворина натриевая соль	**Levorinum(-i)-natrium(-i)**
Легразоль	**Legrasolum(-i)**
Лейкоген	**Leucogenum(-i)**
Таблетки лейкогена 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Leucogeni 0,02
Лейкопластырь	**Emplastrum(-i) adhaesivum(-i)**
Лейкопластырь бактерицидный	**Emplastrum(-i) adhaesivum(-i) bactericidum(-i)**
Лецитин очищенный	**Lecithinum(-i) depuratum(-i)**
Лидаза (для инъекций)	**Lydasum(-i) pro injectionibus**
Лизоформ	**Lysoformium(-i)**
Лизоцим	**Lysocimum(-i)**
Ликвиритон	**Liquiritonum(-i)**
Таблетки ликвиритона 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Liquiritoni
Ликорина гидрохлорид	**Lycorini hydrochloridum(-i)**
Таблетки ликорина гидрохлорида 0,0002 *г*	Tabulettae(-as) Lycorini hydrochloridi 0,0002
Ликуразид*	**Licurasidum(-i)**
Линетол	**Linaetholum(-i)**
Линимент алоэ	**Linimentum(-i) Aloës**
Линимент бальзамический (по Вишневскому)	**Linimentum(-i) balsamicum(-i) (Wishnevsky)**
Линимент нафталанской нефти 10%	**Linimentum(-i) Naphthalani liquidi 10%**
Линимент «Нафтальгин»	**Linimentum(-i) «Naphthalginum»**
Линимент перцово-аммиачный	**Linimentum(-i) Capsici ammoniatum(-i)**
Линимент перцово-камфорный	**Linimentum(-i) Capsici camphoratum(-i)**
Линимент «Санитас»	**Linimentum(-i) «Sanitas»**
Линимент скипидарный сложный	**Linimentum(-i) olei Terebinthinae compositum(-i)**
Линимент «Спедиан»	**Linimentum(-i) «Spedianum»**
Линимент хлороформный сложный	**Linimentum(-i) Chloroformii compositum(-i)**
Линкомицина гидрохлорид	**Lincomycinum(-i) hydrochloridum(-i)**
Линкомицина гидрохлорид 0,25 *г* в капсулах	Lincomycini hydrochloridi 0,25 in capsulis
Раствор линкомицина гидрохлорида 30% для инъекций	Solutio(-onis) Lincomycini hydrochloridi 30% pro injectionibus

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Линкомицина гидрохлорид-моногидрат	**Lincomycini hydrochloridum(-i)-monohydras(-atis)**
Лиобил	**Liobilum(-i)**
Таблетки лиобила 0,2 *г* (растворимые в кишечнике)	Tabulettae(-as) Liobili 0,2 enterosolubiles
Липамид	**Lipamidum(-i)**
Таблетки липамида 0,025 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Lipamidi 0,025 obductae(-as)
Лития бензоат	**Lithii benzoas(-atis)**
Лития карбонат	**Lithii carbonas(-atis)**
Таблетки лития карбоната 0,3 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Lithii carbonatis 0,3 obductae(-as)
Лития оксибутират	**Lithii oxybutyras(-atis)**
Раствор лития оксибутирата 20% для инъекций	Solutio(-onis) Lithii oxybutyratis 20% pro injectionibus
Лифузоль	**Lifusolum(-i)**
Лобелина гидрохлорид	**Lobelini hydrochloridum(-i)**
Раствор лобелина гидрохлорида 1 % для инъекций	Solutio(-onis) Lobelini hydrochloridi 1% pro injectionibus
Раствор лобелина гидрохлорида 1% для инъекций в шприц-тюбиках	Solutio(-onis) Lobelini hydrochloridi 1% pro injectionibus in spritz-tubulis
Лофенал	**Lophenalum(-i)**
Таблетки лофенала 0,3 *г*	Tabulettae(-as) Lophenali 0,3
Лютенурин	**Lutenurinum(-i)**
Линимент лютенурина 0,5%	Linimentum(-i) Lutenurini 0,5%
Суппозитории вагинальные с лютенурином 0,003 *г*	Suppositoria vaginalia cum Lutenurino 0,003
Таблетки лютенурина 0,003 *г*	Tabulettae(-as) Lutenurini 0,003
Магния аспарагинат*	**Magnesii asparaginas(-atis)**
Магния карбонат основной	**Magnesii subcarbonas(-atis)**
Таблетки магния карбоната основного, натрия гидрокарбоната по 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Magnesii subcarbonatis, Natrii hydrocarbonatis aa 0,5
Магния окись	**Magnesii oxydum(-i)**
Таблетки магния окиси 0.5 *г*	Tabulettae(-as) Magnesii oxydi 0,5
Магния перекись	**Magnesii peroxydum(-i)**
Магния сульфат	**Magnesii sulfas(-atis)**
Раствор магния сульфата 20% или 25% для инъекций	Solutio(-onis) Magnesii sulfatis 20% aut 25% pro injectionibus
Мазь автоловая	**Unguentum(-i) Autoli**
Мазь «Антипсориатикум» 1 : 40 000 или 1 : 100 000	**Unguentum(-i) «Antipsoriaticum» 1 : 40 000 aut 1 : 100 000**
Мазь Бом-бенге	**Unguentum(-i) Boum-Benge**
Мазь Вилькинсона	**Unguentum(-i) Wilkinsoni**
Мазь Вилькинсона	Unguenti Wilkinsoni
Паста салицилово-цинковая поровну	Pastae zinco-salicylatae aa
Мазь «Випросал»	**Unguentum(-i) «Viprosalum»**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Мазь «Випросал В»	**Unguentum(-i) «Viprosalum B»**
Мазь «Гиоксизон»	**Unguentum(-i) «Hyoxysonum»**
Мазь «Гэвкамен»	**Unguentum(-i) «Geucamenum»**
Мазь диахильная	**Unguentum(-i) diachylon**
Мазь «Календула»	**Unguentum(-i) «Calendula»**
Мазь Конькова	**Unguentum(-i) Koncovi**
Мазь Конькова с дегтем	**Unguentum Koncovi cum Pice liquida**
Мазь нафталанная	**Unguentum(-i) Naphthalani**
Мазь «Оксизон»	**Unguentum(-i) «Oxyzonum»**
Мазь от обморожения	**Unguentum(-i) contra congelationem**
Мазь «Пропоцеум»	**Unguentum(-i) «Propoceum»**
Мазь «Псориазин»	**Unguentum(-i) «Psoriasinum»**
Мазь ртутная серая	**Unguentum(-i) Hydrargyri cinereum(-i)**
Мазь ртутно-висмутовая	**Unguentum(-i) Hydrargyro-bismuthatum(-i)**
Мазь серная простая	**Unguentum(-i) sulfuratum(-i) simplex(-icis)**
Мазь серно-дегтярная	**Unguentum(-i) Picis lipuidae sulfuratum**
Мазь серно-нафталанная	**Unguentum(-i) Naphthalani sulfuratum(-i)**
Мазь скипидарная	**Unguentum(-i) olei Terebinthinae**
Мазь солидоловая («Рыбакова»)	**Unguentum(-i) Solidoli (Ribacovi)**
Мазь «Ундецин»	**Unguentum(-i) «Undecinum»**
Мазь «Фастин» 1	**Unguentum(-i) «Fastinum» 1**
Мазь «Фастин» 2	**Unguentum(-i) «Fastinum» 2**
Мазь формалиновая	**Unguentum(-i) Formalini**
Мазь «Цинкундан»	**Unguentum(-i) «Zincundanum»**
Мазь «Эфкамон»	**Unguentum(-i) «Efcamonum»**
Маммофизин	**Mammophysinum(-i)**
Маннит для инъекций	**Mannitum(-i) pro injectionibus**
Раствор маннита 15%	Solutio(-onis) Manniti 15%
Марля кровоостанавливающая	**Tela(-ae) haemostatica(-ae)**
Масло анисовое	**Oleum(-i) Anisi**
Масло арахисовое	**Oleum(-i) Arachidis**
Масло беленное	**Oleum(-i) Hyoscyami**
Масло вазелиновое	**Oleum(-i) Vaselini**
Эмульсия вазелинового масла	Emulsum(-i) olei Vaselini
Масло гвоздичное	**Oleum(-i) Caryophylli**
Масло касторовое	**Oleum(-i) Ricini**
Масло касторовое в капсулах — 1 *г*	Oleum Ricini in capsulis — 1,0
Масло кориандровое	**Oleum(-i) Coriandri**
Масло лавандовое	**Oleum(-i) Lavandulae**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Масло лимонное	**Oleum(-i) Citri**
Масло льняное	**Oleum(-i) Lini**
Масло миндальное	**Oleum(-i) Amygdalarum**
Масло мяты перечной	**Oleum(-i) Menthae piperitae**
Масло облепиховое	**Oleum(-i) Hippophaës**
Масло оливковое	**Oleum(-i) Olivarum**
Масло персиковое	**Oleum(-i) Persicorum**
Масло подсолнечное	**Oleum(-i) Helianthi**
Масло розмариновое	**Oleum(-i) Rosmarini**
Масло спермацетовое	**Oleum(-i) Cetacei**
Масло фенхелевое	**Oleum(-i) Foeniculi**
Масло шиповника	**Oleum(-i) Rosae**
Масло эвкалиптовое	**Oleum(-i) Eucalypti**
Масса коллагеновая	**Massa(-ae) collagenica(-ae)**
Мебикар	**Mebicarum(-i)**
Таблетки мебикара 0,3 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Mebicari 0,3 aut 0,5
Мегестрола ацетат	**Megestroli acetas(-atis)**
Меди сульфат	**Cupri sulfas(-atis)**
Меди ундециленат	**Cupri undecylenas(-atis)**
Медротестрона пропионат	**Medrotestroni propionas(-atis)**
Раствор медротестрона пропионата в масле 5% для инъекций	Solutio(-onis) Medrotestroni propionatis oleosa(-ae) 5% pro injectionibus
Мезатон	**Mesatonum(-i)**
Раствор мезатона 1% для инъекций	Solutio(-onis) Mesatoni 1% pro injectionibus
Мексамин	**Mexaminum(-i)**
Таблетки мексамина 0,05 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Mexamini 0,05 obductae(-as)
Мелликтин	**Mellictinum(-i)**
Таблетки мелликтина 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Mellictini 0,02
Меновазин	**Menovasinum(-i)**
Ментол	**Mentholum(-i)**
Ментол рацемический	**Mentholum(-i) racemicum(-i)**
Ментол — 1 *г*	Mentholi — 1,0
Фенилсалицилат — 3 *г*	Phenylii salicylas — 3,0
Вазелиновое масло — 96 *г*	Oleum Vaselini — 96,0
Карандаш ментоловый (мигреневый)	Stilus Mentholi
Масло ментоловое 1% и 2%	Oleum(-i) Mentholi 1%, 2%
Раствор ментола спиртовой 1% или 2%	Solutio(-onis) Mentholi 1% aut 2% spirituosa(-ae)
Мепротан	**Meprotanum(-i)**
Таблетки мепротана 0,2 *г* или 0,4 *г*	Tabulettae(-as) Meprotani 0,2 aut 0,4
Мерказолил	**Mercazolilum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки мерказолила 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Mercazolili 0,005
Меркамина гидротартрат	**Mercamini hydrotartras(-atis)**
Таблетки меркамина гидротартрата 0,2 *г*, пиридоксина гидрохлорида 0,005 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Mercamini hydrotartratis 0,2, Pyridoxini hydrochloridi 0,005 obductae(-as)
Меркаптопурин	**Mercaptopurinum(-i)**
Таблетки меркаптопурина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Mercaptopurini 0,05
Меркузал	**Mercusalum(-i)**
Местранол	**Mestranolum(-i)**
Метазид	**Methazidum(-i)**
Таблетки метазида — 0,1 *г*, 0,3 *г*, 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Methazidi 0,1, 0,3 aut 0,5
Метандростенолон	**Methandrostenolonum(-i)**
Таблетки метандростенолона 0,001 *г*	Tabulettae(-as) Methandrostenoloni 0,001
Таблетки метандростенолона 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Methandrostenoloni 0,005
Метациклина гидрохлорид	**Methacyclini hydrochloridum(-i)**
Метациклина гидрохлорид — 0,15 *г* или 0,3 *г* в капсулах	Methacyclini hydrochloridum — 0,15 aut 0,3 in capsulis
Метацин	**Methacinum(-i)**
Раствор метацина 0,1% для инъекций	Solutio(-onis) Methacini 0,1% pro injectionibus
Таблетки метацина 0,002 *г*	Tabulettae(-as) Methacini 0,002
Метеразин	**Metherazinum(-i)**
Таблетки метеразина 0,005 *г* или 0,025 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Metherazini 0,005 aut 0,025 obductae(-as)
Метиландростендиол	**Methylandrostendiolum(-i)**
Таблетки метиландростендиола 0,01 *г* или 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Methylandrostendioli 0,01 aut 0,025
N-Метилглюкамин*	**N-Methylglucaminum(-i)**
2α-Метилдигидротестостерон*	**2α-Methyldihydrotestosteronum(-i)**
2α-Метилдигидротестостерона капронат*	**2α-Methyldihydrotestosteroni caproas(-atis)**
2α-Метилдигидротестостерона энантат*	**2α-Methyldihydrotestosteroni oenanthas(-atis)**
Метиленовый синий	**Methylenum(-i) coeruleum(-i)**
Раствор метиленового синего 1% водный	Solutio(-onis) Methyleni coerulei 1% aquosa(-ae)
Раствор метиленового синего спиртовой 1%	Solutio(-onis) Methyleni coerulei spirituosa(-ae) 1%
Метилметионинсульфония хлорид (витамин U)	**Methylmethioninsulfonii chloridum(-i) [Vitaminum(-i) U]**
Таблетки метилметионинсульфония хлорида (витамин U) 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Methylmethioninsulfonii chloridi 0,05 (Vitaminum U)
Метилсалицилат	**Methylii salicylas(-atis)**
Линимент метилсалицилата сложный	Linimentuum(-i) Methylii salicylatis compositum (-i)
Мазь метилсалицилата 10%	Unguentuum(-i) Methylii salicylatis 10%
Метилтестостерон	**Methyltestosteronum(-i)**
Таблетки метилтестостерона 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Methyltestosteroni 0,005
Таблетки метилтестостерона 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Methyltestosteroni 0,01

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Метилурацил	**Methyluracilum(-i)**
Мазь метилурациловая 10%	Unguentum(-i) Methyluracili 10%
Свечи с метилурацилом 0,5 *г*	Suppositoria cum Methyluracilo 0,5
Таблетки метилурацила 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Methyluracili 0,5
Метилэстрадиол	**Methyloestradiolum(-i)**
Таблетки метилэстрадиола 0,00002 *г*	Tabulettae(-as) Methyloestradioli 0,00002
Метиндион	**Methindionum(-i)**
Таблетки метиндиона 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Methindioni 0.25
Метионин	**Methioninum(-i)**
Таблетки метионина 0,25 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Methionini 0,25 obductae(-as)
Метисазон	**Methisazonum(-i)**
Таблетки метисазона 0,2 *г*	Tabulettae(-as) Methisazoni 0,2
Метициллина натриевая соль	**Methicillinum(-i)-natrium(-i)**
Меторин	**Methorinum(-i)**
Таблетки меторина 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Methorini 0,02
Метотрексат	**Methotrexatum(-i)**
Метотрексат — 0,005 *г* для инъекций	Methotrexatum — 0,005 pro injectionibus
Таблетки метотрексата 0,0025 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Methotrexati 0,0025 obductae(-as)
Метронидазол	**Metronidazolum(-i)**
Мефенамина натриевая соль	**Mephenaminum(-i)-natrium(-i)**
Миарсенол	**Myarsenolum(-i)**
Мидантан	**Midantanum(-i)**
Таблетки мидантана 0,1 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Midantani 0,1 obductae(-as)
Миелосан	**Myelosanum(-i)**
Таблетки миелосана 0,002 *г*	Tabulettae(-as) Myelosani 0,002
Микалит	**Micalitum(-i)**
Микалит — 0,5 *г* в капсулах	Micalitum — 0,5 in capsulis
Микогептин	**Mycoheptinum(-i)**
Таблетки микогептина 50 000 ЕД, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Mycoheptini 50 000 ЕД obductae (-as)
Микроцид	**Microcidum(-i)**
Мозолин, жидкость мозольная	**Liquor(-oris) ad clavos**
Мозольный лейкопластырь «Салипод»	**Emplastrum(-i) adhaesivum(-i) ad clavos «Salipodum»**
Мономицин	**Monomycinum(-i)**
Таблетки мономицина 0.25 *г*	Tabulettae(-as) Monomycini 0,25
Морфина гидрохлорид	**Morphini hydrochloridum(-i)**
Раствор морфина гидрохлорида 1% для инъекций	Solutio(-onis) Morphini hydrochloridi 1% pro injectionibus
Раствор морфина гидрохлорида 1% в шприц-тюбиках	Solutio(-onis) Morphini hydrochloridi 1% in spritz-tubulis

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки морфина гидрохлорида 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Morphini hydrochloridi 0,01
Морфоциклин	**Morphocyclinum(-i)**
Моршинская слабительная соль	**Sal(-is) Morschinicum(-i) laxans(-ntis)**
Мочевина для инъекций	**Urea(-ae) pro injectionibus**
Мукалтин	**Mucaltinum(-i)**
Таблетки мукалтина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Mucaltini 0,05
Мыло зеленое	**Sapo(-onis) viridis(-is)**
Мыло инсектицидное гексахлорановое 3%	**Sapo(-onis) insecticidus(-i) hexachloranicus(-i) 3%**
Мыло инсектицидное ДДТ 5% (на 60% масляной основе)	**Sapo(-onis) insecticidus(-i) DDT 5% (in 60% basi oleosa)**
Мыло «К»	**Sapo(-onis) «K»**
Мышьяковистый ангидрид	**Acidum(-i) arsenicosum(-i)anhydricum (-i)**
Наганин	**Naganinum(-i)**
Налорфин	**Nalorphinum(-i)**
Раствор налорфина 0,05% или 0,5% в ампулах	Solutio(-onis)Nalorphini 0,05% aut 0,5% in ampullis
Настойка аралии	**Tinctura(-ae) Araliae**
Настойка арники	**Tinctura(-ae) Arnicae**
Настойка березового гриба-чаги	**Tinctura(-ae) Fungi betulini**
Настойка боярышника	**Tinctura(-ae) Crataegi**
Настойка валерианы	**Tinctura(-ae) Valerianae**
Настойка валерианы — 10 *мл*	Tinctura(-ae)Valerianae — 10 ml
Настойка полыни — 8 *мл*	Tinctura(-ae) Absinthii — 8 ml
Настойка красавки — 2 *мл*	Tinctura(-ae) Belladonnae — 2 ml
Настойка валерианы — 20 *мл*	Tinctura(-ae) Valerianae — 20 ml
Настойка полыни — 15 *мл*	Tinctura(-ae) Absinthii — 15 ml
Настойка мяты перечной — 10 *мл*	Tinctura(-ae) Menthae piperitae — 10 ml
Настойка красавки — 5 *мл*	Tinctura(-ae) Belladonnae — 5 ml
Настойка горькая	**Tinctura(-ae) amara(-ae)**
Настойка женьшеня	**Tinctura(-ae) Ginseng**
Настойка заманихи	**Tinctura(-ae) Echinopanacis**
Настойка зверобоя	**Tinctura(-ae) Hyperici**
Настойка из плодов лимонника	**Tinctura(-ae) fructuum Schizandrae**
Настойка ипекакуаны	**Tinctura(-ae) Ipecacuanhae**
Настойка календулы	**Tinctura(-ae) Calendulae**
Настойка корневищ с корнями валерианы свежих	**Tinctura(-ae) rhizomatum cum radicibus Valerianae recentium**
Настойка корневищ с корнями эхинацеи пурпурной свежих	**Tinctura(-ae) rhizomatum cum radicibus Echinaceae purpureae recentium**
Настойка корней лаконоса американского свежих	**Tinctura(-ae) radicum Phytolaccae americanae recentium**
Настойка красавки (белладонны)	**Tinctura(-ae) Belladonnae**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Настойка красавки — 10 *мл*	Tinctura(-ae) Belladonnae — 10 ml
Настойка валерианы — 20 *мл* с ментолом 0,2 *г*	Tinctura(-ae) Valerianae — 20 ml cum Mentholo 0,2
Настойка красавки — 5 *мл*	Tinctura(-ae) Belladonnae — 5 ml
Настойка ландыша — 10 *мл*	Tinctura(-ae) Convallariae — 10 ml
Настойка валерианы — 10 *мл* с ментолом 0,2 *г*	Tinctura(-ae) Valerianae — 10 ml cum Mentholo 0,2
Настойка лагохилуса	**Tinctura(-ae) Lagochili**
Настойка ландыша	**Tinctura(-ae) Convallariae**
Настойка лапчатки	**Tinctura(-ae) Tormentillae**
Настойка лимонника	**Tinctura(-ae) Schizandrae**
Настойка листьев барбариса обыкновенного	**Tinctura(-ae) foliorum Berberidis vulgaris**
Настойка листьев мимозы стыдливой свежих	**Tinctura(-ae) foliorum Mimosae pudicae recentium**
Настойка мяты перечной	**Tinctura(-ae) Menthae piperitae**
Настойка обвойника	**Tinctura(-ae) Periplocae**
Настойка пиона	**Tinctura(-ae) Paeoniae**
Настойка плодов айланта	**Tinctura(-ae) fructuum Ailanthi**
Настойка подорожника	**Tinctura(-ae) Plantaginis**
Настойка полыни	**Tinctura(-ae) Absinthii**
Настойка полыни	Tinctura(-ae) Absinthii
Настойка мяты перечной по 10 *мл*	Tinctura(-ae) Menthae piperitae $\overline{aa}$ 10 ml
Настойка пустырника	**Tinctura(-ae) Leonuri**
Настойка софоры японской	**Tinctura(-ae) Sophorae japonicae**
Настойка стальника	**Tinctura(-ae) Ononidis**
Настойка стеркулии	**Tinctura(-ae) Sterculiae**
Настойка стручкового перца	**Tinctura(-ae) Capsici**
Настойка стручкового перца (1 : 5)	**Tinctura(-ae) Capsici (1 : 5)**
Настойка травы аконита свежей	**Tinctura(-ae) herbae Aconiti recentis**
Настойка чемерицы	**Tinctura(-ae) Veratri**
Настойка чеснока	**Tinctura(-ae) Allii sativi**
Настойка чилибухи	**Tinctura(-ae) Strychni**
Настойка эвкалипта	**Tinctura(-ae) Eucalypti**
Натрия арсенат	**Natrii arsenas(-atis)**
Раствор натрия арсената 1% для инъекций	Solutio(-onis) Natrii arsenatis 1% pro injectionibus
Натрия бензоат	**Natrii benzoas(-atis)**
Натрия бромид	**Natrii bromidum(-i)**
Раствор натрия бромида 3%	Solutio(-onis) Natrii bromidi 3%
Раствор натрия бромида 1%, 2%, 3% с фруктовым сиропом	Solutio(-onis) Natrii bromidi 1%, 2%, 3% cum sirupo fructuum
Раствор натрия бромида и калия бромида с фруктовым сиропом	Solutio(-onis) Natrii bromidi et Kalii bromidi cum sirupo fructuum
Натрия гидрокарбонат	**Natrii hydrocarbonas(-atis)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Натрия гидрокарбонат — 4 *г* для инъекций	Natrii hydrocarbonas — 4,0 pro injectionibus
Раствор натрия гидрокарбоната 4% для инъекций	Solutio(-onis) Natrii hydrocarbonatis 4% pro injectionibus
Свечи с натрия гидрокарбонатом 0,3 *г*, 0,5 *г* или 0,7 *г*	Suppositoria cum Natrii hydrocarbonate 0,3, 0,5 aut 0,7
Таблетки натрия гидрокарбоната 0,3 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Natrii hydrocarbonatis 0,3 aut 0,5
Натрия гидроцитрат (двузамещенный) для инъекций	**Natrii hydrocitras(-atis) pro injectionibus**
Натрия йодид	**Natrii iodidum(-i)**
Натрия-калия тартрат (сеньетова соль)	**Natrii et Kalii tartras(-atis)**
Натрия нитрит	**Natrii nitris(-itis)**
Раствор натрия нитрита 1% в ампулах	Solutio(-onis) Natrii nitritis 1% in ampullis
Натрия нуклеинат	**Natrii nucleinas(-atis)**
Натрия оксибутират	**Natrii oxybutyras(-atis)**
Раствор натрия оксибутирата 20% для инъекций	Solutio(-onis) Natrii oxybutyratis 20% pro injectionibus
Натрия пара-аминосалицилат	**Natrii para-aminosalicylas(-atis)**
Гранулы натрия пара-аминосалицилата	Granula Natrii para-aminosalicylatis
Раствор натрия пара-аминосалицилата 3%	Solutio(-onis) Natrii para-aminosalicylatis 3%
Таблетки натрия пара-аминосалицилата 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Natrii para-aminosalicylatis 0,5
Таблетки натрия пара-аминосалицилата 0,5 *г* (растворимые в кишечнике)	Tabulettae(-as) Natrii para-aminosalicylatis 0,5 (enterosolubiles)
Таблетки натрия пара-аминосалицилата 0,5 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Natrii para-aminosalicylatis 0,5 obductae(-as)
Натрия салицилат	**Natrii salicylas(-atis)**
Раствор натрия салицилата 10% для инъекций	Solutio(-onis) Natrii salicylatis 10% pro injectionibus
Таблетки натрия салицилата 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Natrii salicylatis 0,25 aut 0,5
Таблетки натрия салицилата 0,3 *г*, кофеина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Natrii salicylatis 0,3, Coffeini 0,05
Натрия сульфат	**Natrii sulfas(-atis)**
Натрия тетраборат	**Natrii tetraboras(-atis)**
Раствор натрия тетрабората (буры) 20% в глицерине	Solutio(-onis) Natrii tetraboratis (Boracis) 20% in glycerino
Натрия тиосульфат	**Natrii thiosulfas(-atis)**
Раствор натрия тиосульфата 30% для инъекций	Solutio(-onis) Natrii thiosulfatis 30% pro injectionibus
Натрия уснинат	**Natrii usninas(-atis)**
Раствор натрия уснината 1% спиртовой	Solutio(-onis) Natrii usninatis 1% spirituosa(-ae)
Раствор натрия уснината 0,5% и анестезина 2% в масле	Solutio(-onis) Natrii usninatis 0,5% et Anaesthesini 2% oleosa(-ae)
Раствор натрия уснината 0,3%, 0,5% в пихтовом бальзаме	Solutio(-onis) Natrii usninatis 0,3% aut 0,5% in balsamo Abietis
Натрия фосфат (двузамещенный)	**Natrii phosphas(-atis)**
Натрия хлорид Натрия хлорид — 5 *г* и 6 *г* для инъекций	**Natrii chloridum(-i)** Natrii chloridum — 5,0 et 6,0 pro injectionibus

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Раствор натрия хлорида 10% для инъекций	Solutio(-onis) Natrii chloridi 10% pro injectionibus
Раствор натрия хлорида изотонический 0,9% для инъекций	Solutio(-onis) Natrii chloridi isotonica(-ae) 0,9% pro injectionibus
Раствор натрия хлорида изотонический 0,9% для инъекций (во флаконах)	Solutio(-onis) Natrii chloridi isotonica(-ae) 0,9% pro injectionibus (in lagenis)
Раствор натрия хлорида 10% для инъекций (во флаконах)	Solutio(-onis) Natrii chloridi 10% pro injectionibus (in lagenis)
Таблетки натрия хлорида 0,9 *г*	Tabulettae(-as) Natrii chloridi 0,9
Натрия холеинат	**Natrii choleinas(-atis)**
Натрия цитрат для инъекций	**Natrii citras(-atis) pro injectionibus**
Натуральная соль «Барбара»	**Sal(-is) naturale(-is) «Barbara»**
Нафтамон	**Naphthammonum(-i)**
Нафтизин	**Naphthyzinum(-i)**
Раствор нафтизина 0,05% и 0,1%	Solutio(-onis) Naphthyzini 0,05% et 0,1%
Нафтусин	**Naphthusinum(-i)**
Наяксин	**Najaxinum(-i)**
Нейротраст	**Neurotrastum(-i)**
Необензинол для инъекций	**Neobenzinolum(-i) pro injectionibus**
Неодикумарин	**Neodicumarinum(-i)**
Таблетки неодикумарина 0,05 *г* или 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Neodicumarini 0,05 aut 0,1
Неомицина сульфат	**Neomycini sulfas(-atis)**
Мазь неомициновая 0,5% или 2%	Unguentum(-i) Neomycini 0,5% aut 2%
Пленки глазные с неомицина сульфатом	Membranulae(-as) (lamellae) ophthalmicae(-as) cum Neomycini sulfate
Таблетки неомицина сульфата 0,1 *г* или 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Neomycini sulfatis 0,1 aut 0,25
Неотизоль	**Neothysolum(-i)**
Нефть нафталанская рафинированная	**Naphthalanum(-i) liquidum(-i) raffinatum(-i)**
Ниаламид	**Nialamidum(-i)**
Таблетки ниаламида 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Nialamidi 0,025
Никодин	**Nicodinum(-i)**
Таблетки никодина 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Nicodini 0,5
Никотинамид	**Nicotinamidum(-i)**
Раствор никотинамида 1%, 2,5% или 5% для инъекций	Solutio(-onis) Nicotinamidi 1%, 2,5% aut 5% pro injectionibus
Таблетки никотинамида 0,005 *г* или 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Nicotinamidi 0,005 aut 0,025
Таблетки никотинамида 0,015 *г*	Tabulettae(-as) Nicotinamidi 0,015
Нистатин	**Nystatinum(-i)**
Мазь нистатиновая 100 000 ЕД в 1 *г*	Unguentum(-i) Nystatini 100 000 ЕД in 1,0
Свечи с нистатином 250 000 ЕД или 500 000 ЕД	Suppositoria cum Nystatino 250 000 ЕД aut 500 000 ЕД
Суппозитории вагинальные с нистатином 250 000 ЕД или 500 000 ЕД	Suppositoria vaginalia cum Nystatino 250 000 ЕД aut 500 000 ЕД
Таблетки нистатина 250 000 ЕД или 500 000 ЕД, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Nystatini 250 000 ЕД, 500 000 ЕД obductae(-as)

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Нитазол	**Nitazolum(-i)**
Суппозитории вагинальные с нитазолом 0,12 *г*	Suppositoria vaginalia cum Nitazolo 0,12
Суспензия нитазола 2,5%	Suspensio Nitazoli 2,5%
Таблетки нитазола 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Nitazoli 0,1
Нитразепам	**Nitrazepamum(-i)**
Таблетки нитразепама 0,005 *г* и 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Nitrazepami 0,005 et 0,01
Нитроксолин	**Nitroxolinum(-i)**
Таблетки нитроксолина 0,05 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Nitroxolini 0,05 obductae(-as)
Нитросорбид	**Nitrosorbidum(-i)**
Таблетки нитросорбида 0,005 *г* или 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Nitrosorbidi 0,005 aut 0,01
Нитрофарин	**Nitropharinum(-i)**
Таблетки нитрофарина 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Nitropharini 0,005
Новарсенол	**Novarsenolum(-i)**
Новоиманин	**Novoimaninum(-i)**
Раствор новоиманина спиртовой 1%	Solutio(-onis) Novoimanini spirituosa(-ae) 1%
Новокаин	**Novocainum(-i)**
Мазь новокаиновая 5% и 10%	Unguentum(-i) Novocaini 5% et 10%
Раствор новокаина 0,25%, 0,5%, 1% или 2% для инъекций	Solutio(-onis) Novocaini 0,25%, 0,5%, aut 1%, 2% pro injectionibus
Раствор новокаина 0,25% или 0,5% для инъекций (во флаконах)	Solutio(-onis) Novocaini 0,25% aut 0,5% pro injectionibus (in lagenis)
Свечи с новокаином 0,1 *г*	Suppositoria cum Novocaino 0,1
Новокаина 2 *г*	Novocaini 2,0
Кислоты борной 3 *г*	Acidi borici 3,0
Спирта этилового 70% до 100 *мл*	Spiritus aethylici 70% ad 100 ml
Новокаина 0,66 *г*	Novocaini 0,66
Фурацилина 0,066 *г*	Furacilini 0,066
Спирта этилового 70% до 100 *мл*	Spiritus aethylici 70% ad 100 ml
Новокаинамид	**Novocainamidum(-i)**
Раствор новокаинамида 10% для инъекций	Solutio(-onis) Novocainamidi 10% pro injectionibus
Таблетки новокаинамида 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Novocainamidi 0,25
Новокаина основание	**Novocaini basis**
Новоцин	**Novocinum(-i)**
Новэмбихин	**Novembichinum(-i)**
Нозепам	**Nozepamum(-i)**
Таблетки нозепама 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Nozepami 0,01
Нонахлазин	**Nonachlazinum(-i)**
Раствор нонахлазина 1,5%	Solutio(-onis) Nonachlazini 1,5%
Таблетки нонахлазина 0,03 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Nonachlazini 0,03 obductae(-as)

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Норадреналина гидротартрат	**Noradrenalini hydrotartras(-atis)**
Раствор норадреналина гидротартрата 0,2% для инъекций	Solutio(-onis) Noradrenalini hydrotartratis 0,2% pro injectionibus
Норсульфазол	**Norsulfazolum(-i)**
Таблетки норсульфазола 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Norsulfazoli 0,25 aut 0,5
Норсульфазол-натрий	**Norsulfazolum(-i)-natrium(-i)**
Оксазил	**Oxazylum(-i)**
Таблетки оксазила 0,001 *г*, 0,005 *г* или 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Oxazyli 0,001, 0,005 aut 0,01
Оксафенамид	**Oxaphenamidum(-i)**
Таблетки оксафенамида 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Oxaphenamidi 0,25 aut 0,5
Оксациллина натриевая соль	**Oxacillinum(-i)-natrium(-i)**
Оксациллина натриевая соль — 0,25 *г* в капсулах	Oxacillinum-natrium — 0,25 in capsulis
Оксациллина натриевая соль — 0,25 *г* или 0,5 *г*	Oxacillinum-natrium — 0,25 aut 0,5
Таблетки оксациллина натриевой соли 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Oxacillini-natrii 0,25 aut 0,5
Оксикобаламин	**Oxycobalaminum(-i)**
Раствор оксикобаламина 0,01%, 0,05% или 0,1% для инъекций	Solutio(-onis) Oxycobalamini 0,01%, 0,05% aut 0,1% pro injectionibus
Оксилидин	**Oxylidinum(-i)**
Раствор оксилидина 2% или 5% для инъекций	Solutio(-onis) Oxylidini 2% aut 5% pro injectionibus
Таблетки оксилидина 0,02 *г* или 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Oxylidini 0,02 aut 0,05
Оксипрогестерона капронат	**Oxyprogesteroni caproas(-atis)**
Раствор оксипрогестерона капроната в масле 12,5% для инъекций	Solutio(-onis) Oxyprogesteroni caproatis oleosa (-ae) 12,5% pro injectionibus
Раствор оксипрогестерона капроната в масле 25% для инъекций	Solutio(-onis) Oxyprogesteroni caproatis oleosa (-ae) 25% pro injectionibus
Раствор оксипрогестерона капроната в оливковом масле 12,5% и 25% для инъекций	Solutio(-onis) Oxyprogesteroni caproatis in oleo Olivarum 12,5% et 25% pro injectionibus
Окситетрациклина гидрохлорид	**Oxytetracyclini hydrochloridum(-i)**
Таблетки окситетрациклина гидрохлорида 100 000 ЕД, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Oxytetracyclini hydrochloridi 100 000 ЕД obductae(-as)
Окситетрациклина-дигидрат	**Oxytetracyclini dihydras(-atis)**
Таблетки окситетрациклина 250 000 ЕД	Tabulettae(-as) Oxytetracyclini 250 000 ЕД
Оксицелодекс	**Oxycelodexum(-i)**
Оксодолин	**Oxodolinum(-i)**
Таблетки оксодолина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Oxodolini 0,05
Оксолин	**Oxolinum(-i)**
Мазь оксолиновая 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%	Unguentum(-i) Oxolini 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%
Октадин	**Octadinum(-i)**
Таблетки октадина 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Octadini 0,025
Октатион	**Octathionum(-i)**
Мазь октатионовая 3%	Unguentum(-i) Octathioni 3%
Присыпка октатионовая 3%	Aspersio(-onis) Octathioni 3%

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Октилин 1% или 3%	**Octilinum(-i) 1% aut 3%**
Октицил	**Octicylum(-i)**
Мазь октициловая 1%	Unguentum(-i) Octicyli 1%
Раствор октицила 1%	Solutio(-onis) Octicyli 1%
Октэстрол	**Octoestrolum(-i)**
Таблетки октэстрола 0,001 *г*	Tabulettae(-as) Octoestroli 0,001
Олазоль	**Olasolum(-i)**
Олеандомицина фосфат	**Oleandomycini phosphas(-atis)**
Таблетки олеандомицина фосфата 0,125 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Oleandomycini phosphatis 0,125 obductae(-as)
Олеморфоциклин	**Olemorphocyclinum(-i)**
Олететрин — 0,25 *г* (250 000 ЕД) в капсулах	Oletetrinum — 0,25 (250 000 ЕД) in capsulis
Мазь олететриновая	Unguentum(-i) Oletetrini
Таблетки олететрина 125 000 ЕД, 250 000 ЕД, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Oletetrini 125 000 ЕД aut 250 000 ЕД obductae(-as)
Оливомицин	**Olivomycinum(-i)**
Олиметин в капсулах	**Olimetinum(-i) in capsulis**
Омефин	**Omephinum(-i)**
Таблетки омефина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Omephini 0,5
Омнопон	**Omnoponum(-i)**
Раствор омнопона 1% или 2% для инъекций	Solutio(-onis) Omnoponi 1% aut 2% pro injectionibus
Ораза	**Orazum(-i)**
Гранулы оразы	Granula Orazi
Орнид	**Ornidum(-i)**
Раствор орнида 5% для инъекций	Solutio(-onis) Ornidi 5% pro injectionibus
Осарсол	**Osarsolum(-i)**
Таблетки осарсола 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Osarsoli 0,25
Основная висмутовая соль моновисмутвинной кислоты	**Bismuthi submonobismuthotartras(-atis)**
Панкреатин	**Pancreatinum(-i)**
Пантогам	**Pantohamum(-i)**
Таблетки пантогама 0,25 *г* и 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Pantohami 0,25 et 0,5
Пантокрин	**Pantocrinum(-i)**
Пантокрин для инъекций	Pantocrinum(-i) pro injectionibus
Таблетки пантокрина 0,075 *г* или 0,15 *г*	Tabulettae(-as) Pantocrini 0,075 aut 0,15
Пантоцид	**Pantocidum(-i)**
Таблетки пантоцида 0,0082 *г*	Tabulettae(-as) Pantocidi 0,0082
Пантрипин	**Pantrypinum(-i)**
Папаверина гидрохлорид	**Papaverini hydrochloridum(-i)**
Раствор папаверина гидрохлорида 2% для инъекций	Solutio(-onis) Papaverini hydrochloridi 2% pro injectionibus

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Свечи с папаверина гидрохлоридом 0,02 *г*	Suppositoria cum Papaverini hydrochlorido 0,02
Таблетки папаверина гидрохлорида 0,01 *г* для детей	Tabulettae(-as) Papaverini hydrochloridi 0,01 pro infantibus
Таблетки папаверина гидрохлорида 0,04 *г*	Tabulettae(-as) Papaverini hydrochloridi 0,04
Таблетки папаверина гидрохлорида 0,02 *г*, экстракта красавки 0,015 *г*	Tabulettae(-as) Papaverini hydrochloridi 0,02, extracti Belladonnae 0,015
Паратиреоидин для инъекций	**Parathyreoidinum(-i) pro injectionibus**
Парацетамол (ацетофен)	**Paracetamolum(-i)**
Таблетки парацетамола 0,2 *г*	Tabulettae(-as) Paracetamoli 0,2
Пармидин	**Parmidinum(-i)**
Таблетки пармидина 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Parmidini 0,25
Пасомицин	**Pasomycinum(-i)**
Паста гексахлорана 15%	**Pasta(-ae) Hexachlorani 15%**
Паста защитная ИЭР-1	**Pasta(-ae) defendens(-ntis) IER-1**
Паста защитная ИЭР-2	**Pasta(-ae) defendens(-ntis) IER-2**
Паста «Кальцин»	**Pasta(-ae) «Calcinum»**
Паста мыльно-сольвентная	**Pasta(-ae) Sapo-solvens(-ntis)**
Паста отмывочно-защитная с солидолом	**Pasta(-ae) abluenti-defendens(-ntis) cum Solidolo**
Паста серно-цинко-нафталанная	**Pasta(-ae) Zinco-naphthalano-sulfurata(-ae)**
Паста стоматологическая (дентин-паста)	**Pasta(-ae) stomatologica(-ae) (Dentinum-pasta)**
Паста стоматологическая нафэстезин 75% (фтористая)	**Pasta(-ae) stomatologica(-ae) Naphaesthesinum 75% (fluorata)**
Паста Теймурова	**Pasta(-ae) Teimurovi**
Паста ХИОТ-6	**Pasta(-ae) CHIOT-6**
Пастинацин	**Pastinacinum(-i)**
Таблетки пастинацина 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Pastinacini 0,02
Пафенцил	**Paphencylum(-i)**
Таблетки пафенцила 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Paphencyli 0,025
Пахикарпина гидройодид	**Pachycarpini hydroiodidum(-i)**
Раствор пахикарпина гидройодида 3% для инъекций	Solutio(-onis) Pachycarpini hydroiodidi 3% pro injectionibus
Таблетки пахикарпина гидройодида 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Pachycarpini hydroiodidi 0,1
Пелоидин	**Peloidinum(-i)**
Пелоидодистиллат для инъекций	**Peloidodestillatum(-i) pro injectionibus**
Пенициллиназа	**Penicillinasum(-i)**
Пентабисмол	**Pentabismolum(-i)**
Раствор пентабисмола для инъекций	Solutio(-onis) Pentabismoli pro injectionibus
Пентамин	**Pentaminum(-i)**
Раствор пентамина 5% для инъекций	Solutio(-onis) Pentamini 5% pro injectionibus
Пентацин	**Pentacinum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Раствор пентацина 5% для инъекций	Solutio(-onis) Pentacini 5% pro injectionibus
Пентоксил	**Pentoxylum(-i)**
Таблетки пентоксила 0,025 *г* или 0,2 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Pentoxyli 0,025 aut 0,2 obductae(-as)
Пепсидил	**Pepsidilum(-i)**
Пепсин	**Pepsinum(-i)**
Пертуссин	**Pertussinum(-i)**
Перхлорат калия	**Kalii perchloras(-atis)**
Таблетки перхлората калия 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Kalii perchloratis 0,25
Пилокарпина гидрохлорид	**Pilocarpini hydrochloridum(-i)**
Мазь пилокарпиновая 1% или 2%	Unguentum(-i) Pilocarpini hydrochloridi 1% aut 2%
Пленки глазные с пилокарпина гидрохлоридом	Membranulae(-as) (lamellae) ophthalmicae(-as) cum Pilocarpini hydrochlorido
Раствор пилокарпина гидрохлорида 6%	Solutio(-onis) Pilocarpini hydrochloridi 6%
Раствор пилокарпина гидрохлорида 1% в тюбик-капельницах	Solutio(-onis) Pilocarpini hydrochloridi 1%
Раствор пилокарпина гидрохлорида 1% с метилцеллюлозой	Solutio(-onis) Pilocarpini hydrochloridi 1% cum Methylcelluloso
Раствор пилокарпина гидрохлорида 2% с натрий-карбоксиметилцеллюлозой	Solutio(-onis) Pilocarpini hydrochloridi 2% cum Natrium-carboxymethylcelluloso
Пинабин	**Pinabinum(-i)**
Пиоцид в ампулах	**Pyocidum(-i) in ampullis**
Пиперазин	**Piperazinum(-i)**
Пиперазина адипинат	**Piperazini adipinas(-atis)**
Раствор пиперазина адипината 5% для детей	Solutio(-onis) Piperazini adipinatis 5% pro infantibus
Таблетки пиперазина адипината 0,2 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Piperazini adipinatis 0,2 aut 0,5
Пиразидол	**Pyrazidolum(-i)**
Таблетки пиразидола 0,025 *г* или 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Pyrazidoli 0,025 aut 0,05
Пирацетам	**Pyracetamum(-i)**
Пирацетам — 0,4 *г* в капсулах	Pyracetamum — 0,4 in capsulis
Раствор пирацетама 20% для инъекций	Solutio(-onis) Pyracetami 20% pro injectionibus
Пиридитол	**Pyriditolum(-i)**
Таблетки пиридитола 0,05 *г*, 0,1 *г* или 0,2 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Pyriditoli 0,05, 0,1 aut 0,2 obductae(-as)
Пиридоксальфосфат	**Pyridoxalphosphatum(-i)**
Пиридоксальфосфат — 0,005 *г* и 0,01 *г* для инъекций	Pyridoxalphosphatum — 0,005 et 0,01 pro injectionibus
Таблетки пиридоксальфосфата 0,01 *г* или 0,02 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Pyridoxalphosphati 0,01 aut 0,02 obductae(-as)
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	**Pyridoxini hydrochloridum(-i) [Vitaminum(-i) B_6]**
Раствор пиридоксина гидрохлорида 1% или 5% для инъекций	Solutio(-onis) Pyridoxini hydrochloridi 1% aut 5% pro injectionibus
Таблетки пиридоксина гидрохлорида 0,002 *г*, 0,005 *г* или 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Pyridoxini hydrochloridi 0,002, 0,005 aut 0,01
Пирилен	**Pirilenum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки пирилена 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Pirileni 0,005
Пирогенал	**Pyrogenalum(-i)**
Пиромекаин	**Pyromecainum(-i)**
Раствор пиромекаина 0,5%, 1% или 2%	Solutio(-onis) Pyromecaini 0,5%, 1% aut 2%
Пирофос	**Pyrophosum(-i)**
Раствор пирофоса в масле 0,01% и 0,02%	Solutio(-onis) Pyrophosi oleosa(-ae) 0,01% et 0,02%
Пирроксан	**Pyrroxanum(-i)**
Раствор пирроксана 1% для инъекций	Solutio(-onis) Pyrroxani 1% pro injectionibus
Таблетки пирроксана 0,015 *г*	Tabulettae(-as) Pyrroxani 0,015
Питуитрин для инъекций	**Pituitrinum(-i) pro injectionibus**
Пихтовый бальзам лечебный	**Balsamum(-i) Abietis medicinale(-is)**
Пиявка медицинская	**Hirudines medicinales**
Плазма антигемофильная	**Plasma(-atis) antihaemophilicum(-i)**
Плазма нативная концентрированная	**Plasma(-atis) nativum(-i) concentratum(-i)**
Плазма сухая с викасолом	**Plasma(-atis) siccum(-i) cum Vikasolo**
Плазмол	**Plasmolum(-i)**
Плантаглюцид	**Plantaglucidum(-i)**
Гранулы плантаглюцида	Granula Plantaglucidi
Пластодерм	**Plastodermum(-i)**
Пластырь мозольный	**Emplastrum(-i) ad clavos**
Пластырь перцовый	**Emplastrum(-i) Capsici**
Пластырь ртутный	**Emplastrum(-i) Hydrargyri**
Пластырь свинцовый простой	**Emplastrum(-i) Plumbi simplex(-icis)**
Пластырь свинцовый сложный	**Emplastrum(-i) Plumbi compositum(-i)**
Платифиллина гидротартрат	**Platyphyllini hydrotartras(-atis)**
Раствор платифиллина гидротартрата 0,2% для инъекций	Solutio(-onis) Platyphyllini hydrotartratis 0,2% pro injectionibus
Таблетки платифиллина гидротартрата 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Platyphyllini hydrotartratis 0,005
Таблетки платифиллина гидротартрата 0,005 *г*, папаверина гидрохлорида 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Platyphyllini hydrotartratis 0,005 et Papaverini hydrochloridi 0,02
Таблетки платифиллина гидротартрата 0,003 *г*, папаверина гидрохлорида 0,03 *г* и теобромина 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Platyphyllini hydrotartratis 0,003, Papaverini hydrochloridi 0,03 et Theobromini 0,25
Пленка коллагеновая	**Membrana(-ae) collagenica(-ae)**
Пленка фибринная	**Membrana(-ae) fibrinosa(-ae)**
Пленка фибринная изогенная	**Membrana(-ae) fibrinosa(-ae) isogena(-ae)**
Подофиллин	**Podophyllinum(-i)**
Полиамин	**Polyaminum(-i)**
Полибиолин	**Polybiolinum(-i)**
Поливинилпирролидон	**Polyvinylpyrrolidonum(-i)**
Раствор поливинилпирролидона 20% (растворитель для андекалина)	Solutio(-onis) Polyvinylpyrrolidoni 20%

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Поливиниловый спирт*	**Spiritus(-us) polyvinylatus(-i)**
Полиглюкин сухой	**Polyglucinum(-i) siccum(-i)**
Полиглюкин	Polyglucinum(-i)
Раствор полиглюкина 20%*	Solutio(-onis) Polyglucini 20%
Полидез	**Polydesum(-i)**
Полимиксина В сульфат	**Polymyxini B sulfas(-atis)**
Полимиксина М сульфат	**Polymyxini M sulfas(-atis)**
Мазь полимиксиновая 20 000 ЕД в 1 *г*	Unguentum(-i) Polymyxini 20 000 ЕД in 1.0
Таблетки полимиксина М сульфата 500 000 ЕД	Tabulettae(-as) Polymyxini M sulfatis 500 000 ЕД
Полиспонин	**Polysponinum(-i)**
Таблетки полиспонина 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Polysponini 0,1
Полисурьмин	**Polysurminum(-i)**
Полифепан	**Polyfepanum(-i)**
Гранулы полифепана	Granula Polyfepani
Полифер	**Polyferum(-i)**
Порошок окисленной целлюлозы*	**Pulvis(-eris) Cellulosi oxydati**
Прегнин	**Praegninum(-i)**
Таблетки прегнина 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Praegnini 0,01
Предион-кислота	**Predionum(-i)-acidum(-i)**
Предион — 0,5 *г* для инъекций	Predionum — 0,5 pro injectionibus
Преднизолон	**Prednisolonum(-i)**
Мазь преднизолоновая 0,5%	Unguentum(-i) Prednisoloni 0,5%
Таблетки преднизолона 0,001 *г* или 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Prednisoloni 0,001 aut 0,005
Преднизон	**Prednisonum(-i)**
Таблетки преднизона 0,001 *г* или 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Prednisoni 0,001 aut 0,005
Преднизона ацетат	**Prednisoni acetas(-atis)**
Таблетки преднизона ацетата 0,0011 *г* или 0,0056 *г*	Tabulettae(-as) Prednisoni acetatis 0,0011 aut 0,0056
Препарат для искусственных сероводородных ванн	**Praeparatum(-i) pro balneis hydrosulfuricis factitiis**
Препарат из тамбуканской грязи	**Praeparatum(-i) ex limo Tambucanico**
Препарат PPSB	**Praeparatum(-i) PPSB**
Присыпка детская	**Aspersio(-onis) puerilis(-is)**
Прогестерон	**Progesteronum(-i)**
Раствор прогестерона в масле 1% или 2,5% для инъекций	Solutio(-onis) Progesteroni oleosa(-ae) 1% aut 2,5% pro injectionibus
Раствор прогестерона в масле оливковом 1% или 2,5% для инъекций	Solutio(-onis) Progesteroni in oleo Olivarum 1% aut 2,5% pro injectionibus
Продигиозан	**Prodigiosanum(-i)**
Раствор продигиозана 0,005% для инъекций	Solutio(-onis) Prodigiosani 0,005% pro injectionibus
Прозерин	**Proserinum(-i)**
Раствор прозерина 0,05% для инъекций	Solutio(-onis) Proserini 0,05% pro injectionibus

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки прозерина 0,015 *г*	Tabulettae(-as) Proserini 0,015
Пролотестон	**Prolotestonum(-i)**
Промедол	**Promedolum(-i)**
Раствор промедола 1% или 2% для инъекций	Solutio(-onis) Promedoli 1% aut 2% pro injectionibus
Раствор промедола 1% или 2% в шприц-тюбиках	Solutio(-onis) Promedoli 1% aut 2% in sprit-tubulis
Таблетки промедола 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Promedoli 0,025
Промеран	**Promeranum(-i)**
Таблетки промерана 0,0183 *г*	Tabulettae(-as) Promerani 0,0183
Пропазин	**Propazinum(-i)**
Драже пропазина 0,025 *г* или 0,05 *г*	Dragée Propazini 0,025 aut 0,05
Раствор пропазина 2,5% для инъекций	Solutio(-onis) Propazini 2,5% pro injectionibus
Таблетки пропазина 0,025 *г* или 0,05 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Propazini 0,025 aut 0,05 obductae(-as)
Пропилйодон	**Propyliodonum(-i)**
Пропилйодон — 10 *г*	Propyliodonum — 10,0
Пропилйодон 50% водная суспензия	Suspensio(-onis) Propyliodoni 50% aquosa(-ae)
Прополис	**Propolis(-is)**
Аэрозоль «Пропосол»	Aërosolum(-i) «Proposolum»
Мазь «Пропоцеум»	Unguentum(-i) «Propoceum»
Проспидин	**Prospidinum(-i)**
Проспидин лиофилизированный — 0,1 *г* для инъекций	Prospidinum lyophilisatum — 0,1 pro injectionibus
Мазь проспидина 30% и 50%	Unguentum(-i) Prospidini 30% et 50%
Протамина сульфат	**Protamini sulfas(-atis)**
Раствор протамина сульфата 1% для инъекций	Solutio(-onis) Protamini sulfatis 1% pro injectionibus
Протамин-цинк-инсулин для инъекций	**Protamin-zinc-insulinum(-i) pro injectionibus**
Раствор протамин-цинк-инсулина для инъекций	Solutio(-onis) Protamin-zinc-insulini pro injectionibus
Протаргол	**Protargolum(-i)**
Протеин	**Proteinum(-i)**
Противоядие при отравлении металлами	**Antidotum(-i) metallorum**
Псоберан	**Psoberanum(-i)**
Раствор псоберана 0,1%	Solutio(-onis) Psoberani 0,1%
Таблетки псоберана 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Psoberani 0,01
Псорален	**Psoralenum(-i)**
Раствор псоралена 0,1%	Solutio(-onis) Psoraleni 1%
Таблетки псоралена 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Psoraleni 0,01
Пуфемид	**Puphemidum(-i)**
Таблетки пуфемида 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Puphemidi 0,25
Пчелиный яд очищенный*	**Apitoxum(-i) depuratum(-i)**
Рамнил	**Rhamnilum(-i)**
Таблетки рамнила 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Rhamnili 0,05

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Раствор «Ацесоль» для инъекций	**Solutio(-onis) «Acesolum» pro injectionibus**
Раствор «Глюгицир»	**Solutio(-onis) «Glugicyrum»**
Раствор грамицидина С 2%	**Solutio(-onis) Gramicidini C 2%**
Паста грамицидиновая	Pasta(-ae) Gramicidini
Таблетки грамицидина С защечные 1,5 *мг* (1500 ЕД)	Tabulettae(-as) Gramicidini C transbuccales 1,5 mg (1500 ЕД)
Раствор «Дисоль» для инъекций	**Solutio(-onis) «Disolum» pro injectionibus**
Раствор «Дуплекс» для инъекций	**Solutio(-onis) «Duplex» pro injectionibus**
Раствор калия арсенита (фаулеров раствор)	**Liquor(-oris) Kalii arsenitis (Liquor(-oris) arsenicalis Fowleri)**
Раствор калия теллурита 1% или 2%	**Solutio(-onis) Kalii telluritis 1% aut 2%**
Раствор коллагена 2%	**Solutio(-onis) Collageni 2%**
Раствор «Лактасол»	**Solutio(-onis) «Lactasolum»**
Раствор Люголя с глицерином	**Solutio(-onis) Lugoli cum Glycerino**
Раствор натрия аденозинтрифосфата 1% для инъекций	**Solutio(-onis) Natrii adenosintriphosphatis 1% pro injectionibus**
Раствор нитроглицерина 1%	**Solutio(-onis) Nitroglycerini 1%**
Раствор нитроглицерина 1% в масле в капсулах 0,0005 *г* и 0,001 *г*	Solutio(-onis) Nitroglycerini 1% oleosa(-ae) in capsulis 0,0005 et 0,001
Таблетки нитроглицерина 0,0005 *г*	Tabulettae(-as) Nitroglycerini 0,0005
Раствор перекиси водорода концентрированный (пергидроль)	**Solutio(-onis) Hydrogenii peroxydi concentrata(-ae) [Perhydrolum(-i)]**
Раствор перекиси водорода	Solutio(-onis) Hydrogenii peroxydi
Раствор перекиси водорода спиртовой 1,5%	Solutio(-onis) Hydrogenii peroxydi spirituosa(-ae) 1,5%
Раствор прегнантола гидрохлорида 1,2% для инъекций	**Solutio(-onis) Pregnantoli hydrochloridi 1,2% pro injectionibus**
Раствор «Тетрастерон» в масле для инъекций	**Solutio(-onis) «Tetrasteronum» oleosa(-ae) pro injectionibus**
Раствор «Тиодин»	**Solutio(-onis) «Tiodinum»**
Раствор «Трисоль» для инъекций	**Solutio(-onis) «Trisolum» pro injectionibus**
Раствор фолликулина в масле 0,05% или 0,1 для инъекций	**Solutio(-onis) Folliculini oleosa(-ae) 0,05% aut 0,1% pro injectionibus**
Раствор формальдегида	**Solutio(-onis) Formaldehydi**
Раствор формальдегида 10%	Solutio(-onis) Formaldehydi 10%
Раствор «Фукорцин»	**Solutio(-onis) «Fucorcinum»**
Раствор «Хлосоль» для инъекций	**Solutio(-onis) «Chlosolum» pro injectionibus**
Раствор цитраля спиртовой 1%	**Solutio(-onis) Citrali spirituosa(-ae) 1%**
Раствор «Цитроглюкофосфат»	**Solutio(-onis) «Citroglucophosphatum»**
Ратиндан	**Ratindanum(-i)**
Раунатин	**Raunatinum(-i)**
Таблетки раунатина 0,002 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Raunatini 0,002 obductae(-as)
Ребепин	**Rebepinum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Редэт	**Redetum(-i)**
Резерпин	**Reserpinum(-i)**
Таблетки резерпина 0,0001 *г* или 0,00025 *г*	Tabulettae(-as) Reserpini 0,0001 aut 0,00025
Резорцин	**Resorcinum(-i)**
Раствор резорцина спиртовой 1% или 2%	Solutio(-onis) Resorcini spirituosa(-ae) 1% aut 2%
Ремантадин	**Remantadinum(-i)**
Таблетки ремантадина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Remantadini 0,05
Реоглюман	**Rheoglumanum(-i)**
Реополиглюкин	**Rheopolyglucinum(-i)**
Реополиглюкин сухой	Rheopolyglucinum(-i) siccum(-i)
Реополиглюкин с глюкозой	Rheopolyglucinum(-i) cum Glucoso
Репеллин-альфа (жидкий)	**Repellinum(-i)-alpha (liquidum)**
Ретинола ацетат	**Retinoli acetas(-atis)**
Гранулы ретинола ацетата (витамин А) 300 000 МЕ или 500 000 МЕ в 1 *г*	Granula Retinoli acetatis (Vitaminum A) 300 000 ME aut 500 000 ME in 1,0
Драже ретинола ацетата 0,00114 *г* или ретинола пальмитата 0,00182 *г* (витамина А 3300 МЕ)	Dragée Retinoli acetatis 0,00114 aut Retinoli palmitatis 0,00182 (Vitamini A 3300 ME)
Драже «Ревит»	Dragée «Revitum»
Драже «Ренивит»	Dragée «Renivitum»
Раствор ретинола ацетата в масле 3,44%, 6,88% или 8,6%	Solutio(-onis) Retinoli acetatis oleosa(-ae) 3,44%, 6,88% aut 8,6%
Раствор ретинола ацетата (витамин А) в масле 0,86% или 5,68% по 0,2 *г* или 6,88% по 0,5 *г* в капсулах	Solutio(-onis) Retinoli acetatis (Vitaminum A) oleosa(-ae) 0,86% aut 5,68% aa 0,2 aut 6,88% aa 5,0 in capsulis
Раствор ретинола ацетата в масле по 25 000, 50 000 или 100 000 МЕ в 1 *мл* для инъекций	Solutio(-onis) Retinoli acetatis oleosa(-ae) 25 000, 50 000 aut 100 000 ME in 1 ml pro injectionibus
Таблетки ретинола ацетата 0,01135 *г* или ретинола пальмитата 0,01816 *г* (витамин А 33 000 МЕ), покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Retinoli acetatis 0,01135 aut Retinoli palmitatis 0,01816 (Vitaminum A 33 000 ME) obductae(-as)
Таблетки «Ревит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Revitum» obductae(-as)
Ретинола пальмитат	**Retinoli palmitas(-atis)**
Раствор ретинола пальмитата 1,651%	Solutio(-onis) Retinoli palmitatis 1,651%
Раствор ретинола пальмитата 5,5%, 11% или 16,5% в масле	Solutio(-onis) Retinoli palmitatis 5,5%, 11% aut 16,5% oleosa(-ae)
Раствор ретинола пальмитата 55% в масле	Solutio(-onis) Retinoli palmitatis 55% oleosa(-ae)
Ретофезоль	**Retofesolum(-i)**
Рибоксин	**Riboxinum(-i)**
Таблетки рибоксина 0,2 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Riboxini 0,2 obductae(-as)
Рибонуклеаза аморфная	**Ribonucleasum(-i) amorphum(-i)**
Рибофлавин (витамин B_2)	**Riboflavinum(-i) [Vitaminum(-i) B_2]**
Драже рибофлавина 0,002 *г*	Dragée Riboflavini 0,002
Таблетки рибофлавина 0,002 *г*, 0,005 *г* или 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Riboflavini 0,002, 0,005 aut 0,01
Рибофлавин-мононуклеотид	**Riboflavinum(-i)-mononucleotidum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Раствор рибофлавин-мононуклеотида 1% для инъекций	Solutio(-onis) Riboflavini-mononucleotidi 1% pro injectionibus
Риодоксол	**Riodoxolum(-i)**
Мазь риодоксоловая 0,25%, 0,5% и 1%	Unguentum(-i) Riodoxoli 0,25%, 0,5% et 1%
Ристомицина сульфат	**Ristomycini sulfas(-atis)**
Рифампицин	**Rifampicinum(-i)**
Рифампицин — 0,05 *г* и 0,15 *г* в капсулах	Rifampicinum — 0,05 et 0,15 in capsulis
Рифатироин	**Rifathyroinum(-i)**
Рифатироин — 0,0005 *г* для инъекций	Rifathyroinum — 0,0005 pro injectionibus
Розевин	**Rosevinum(-i)**
Розевин лиофилизированный — 0,005 *г* для инъекций	Rosevinum lyophilisatum — 0,005 pro injectionibus
Рондекс	**Rondexum(-i)**
Ронидаза	**Ronidasum(-i)**
Ртути амидохлорид	**Hydrargyri amidochloridum(-i)**
Мазь ртутная белая	Unguentum(-i) Hydrargyri album(-i)
Ртути дийодид	**Hydrargyri diiodidum(-i)**
Ртути дихлорид (сулема)	**Hydrargyri dichloridum(-i)**
Таблетки ртути дихлорида 0,5 *г* или 1 *г*	Tabulettae(-as) Hydrargyri dichloridi 0,5 aut 0,1
Ртути монохлорид (каломель)	**Hydrargyri monochloridum(-i)**
Ртути окись желтая	**Hydrargyri oxydum(-i) flavum(-i)**
Мазь ртутная желтая	Unguentum(-i) Hydrargyri oxydi flavi
Ртути оксицианид	**Hydrargyri oxycyanidum(-i)**
Ртути салицилат	**Hydrargyri salicylas(-atis)**
Ртути цианид	**Hydrargyri cyanidum(-i)**
Рубомицина гидрохлорид	**Rubomycini hydrochloridum(-i)**
Рутин	**Rutinum(-i)**
Таблетки рутина 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Rutini 0,02
Рыбий жир	**Oleum(-i) jecoris**
Рыбий жир тресковый	**Oleum(-i) jecoris Aselli**
Салазодиметоксин	**Salazodimethoxinum(-i)**
Таблетки салазодиметоксина 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Salazodimethoxini 0,5
Салазопиридазин	**Salazopyridazinum(-i)**
Суспензия салазопиридазина 5%	Suspensio(-onis) Salazopyridazini 5%
Таблетки салазопиридазина 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Salazopyridazini 0,5
Салинимент	**Salinimentum(-i)**
Салициламид	**Salicylamidum(-i)**
Таблетки салициламида 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Salicylamidi 0,25 aut 0,5
Сальвин	**Salvinum(-i)**
Раствор сальвина спиртовой 1%	Solutio(-onis) Salvini spirituosa(-ae) 1%

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Салюзид растворимый	**Saluzidum(-i) solubile(-is)**
Раствор салюзида растворимого 5% для инъекций	Solutio(-onis) Saluzidi solubilis 5% pro injectionibus
Санасол	**Sanasolum(-i)**
Сангвиритрин	**Sanguiritrinum(-i)**
Таблетки сангвиритрина 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Sanguiritrini 0,005
Сапарал	**Saparalum(-i)**
Таблетки сапарала 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Saparali 0,05
Сарколизин	**Sarcolysinum(-i)**
Сарколизин — 0,02 *г* и 0,04 *г* (для приготовления инъекционных растворов)	Sarcolysinum — 0,02 et 0,04 (pro injectionibus)
Таблетки сарколизина 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Sarcolysini 0,01
Сахарин	**Saccharinum(-i)**
Таблетки сахарина 0,04 *г*	Tabulettae(-as) Saccharini 0,04
Сахарин растворимый	**Saccharinum(-i) solubile(-is)**
Свечи «Анестезол»	**Suppositoria «Anaesthesolum»**
Свечи «Анестезол» (на полиэтиленоксидной основе)	**Suppositoria «Anaesthesolum» (in basi polyaethylenoxydi**
Свечи «Анузол»	**Suppositoria «Anusolum»**
Свечи «Бетиол»	**Suppositoria «Bethiolum»**
Свечи «Нео-Анузол»	**Suppositoria «Neo-Anusolum»**
Свечи «Цефекон»	**Suppositoria «Cefeconum»**
Свинца ацетат	**Plumbi acetas(-atis)**
Вода свинцовая	Aqua(-ae) Plumbi
Раствор свинца ацетата основного	Solutio(-onis) Plumbi subacetatis
Свинца окись	**Plumbi oxydum(-i)**
Секуринина нитрат	**Securinini nitras(-atis)**
Раствор секуринина нитрата 0,4%	Solutio(-onis) Securinini nitratis 0,4%
Раствор секуринина нитрата 0,2% в ампулах	Solutio(-onis) Securinini nitratis 0,2% in ampullis
Таблетки секуринина нитрата 0,002 *г*	Tabulettae(-as) Securinini nitratis 0,002
Сера осажденная	**Sulfur(-uris) praecipitatum(-i)**
Сера очищенная	**Sulfur(-uris) depuratum(-i)**
Серебра нитрат	**Argenti nitras(-atis)**
Серотонина адипинат	**Serotonini adipinas(-atis)**
Раствор серотонина адипината 1% для инъекций	Solutio(-onis) Serotonini adipinatis 1% pro injectionibus
Сибазон	**Sibazonum(-i)**
Таблетки сибазона 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Sibazoni 0,005
Сигареты «Астматин»	**Sigaretae(-as) «Asthmatinum»**
Сигареты «Астматол»	**Sigaretae(-as) «Asthmatolum»**
Сигетин	**Sygethinum(-i)**
Раствор сигетина 1% для инъекций	Solutio(-onis) Sygethini 1% pro injectionibus

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки сигетина 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Sygethini 0,1
Сиднокарб	**Sydnocarbum(-i)**
Таблетки сиднокарба 0,005 *г*, 0,01 *г* или 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Sydnocarbi 0,005, 0,01 aut 0,025.
Сиднофен	**Sydnophenum(-i)**
Таблетки сиднофена 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Sydnopheni 0,005
Силаболин	**Silabolinum(-i)**
Раствор силаболина в масле 2,5% и 5% для инъекций	Solutio(-onis) Silabolini oleosa(-ae) 2,5% et 5% pro injectionibus
Синафлан	**Synaflanum(-i)**
Мазь синафлана 0,025%	Unguentum(-i) Synaflani 0,025%
Синтомицин	**Synthomycinum(-i)**
Линимент синтомицина 1%, 5% или 10%	Linimentum(-i) Synthomycini 1%, 5% aut 10%
Линимент синтомицина 1% с новокаином 0,5%	Linimentum(-i) Synthomycini 1% cum Novocaino 0,5%
Суппозитории вагинальные с синтомицином 0,25 *г*	Suppositoria vaginalia cum Synthomycino 0,25
Синэстрол	**Synoestrolum(-i)**
Раствор синэстрола в масле 0,1% для инъекций	Solutio(-onis) Synoestroli oleosa(-ae) 0,1% pro injectionibus
Раствор синэстрола в масле 2% для инъекций	Solutio(-onis) Synoestroli oleosa(-ae) 2% pro injectionibus
Раствор синэстрола в оливковом масле 2% для инъекций	Solutio(-onis) Synoestroli in oleo Olivarum 2% pro injectionibus
Таблетки синэстрола 0,001 *г*	Tabulettae(-as) Synoestroli 0,001
Сироп алоэ древовидного	**Sirupus(-i) Aloës arborescentis**
Сироп алоэ с железом	**Sirupus(-i) Aloës cum Ferro**
Сироп алтейный	**Sirupus(-i) Althaeae**
Сироп «Амтерсол»	**Sirupus(-i) «Amtersolum»**
Сироп вишневый	**Sirupus(-i) Cerasi**
Сироп из плодов шиповника	**Sirupus(-i) ex fructibus Rosae**
Сироп малиновый	**Sirupus(-i) Rubi idaei**
Сироп ревенный	**Sirupus(-i) Rhei**
Сироп солодкового корня	**Sirupus(-i) Glycyrrhizae**
Скополамина гидробромид	**Scopolamini hydrobromidum(-i)**
Раствор скополамина гидробромида 0,05% для инъекций	Solutio(-onis) Scopolamini hydrobromidi 0,05% pro injectionibus
Раствор скополамина гидробромида 0,25% с метилцеллюлозой	Solutio(-onis) Scopolamini hydrobromidi 0,25% cum Methylcelluloso
Смесь для ингаляций	**Mixtio(-onis) pro inhalationibus**
Смесь метилсалицилата с хлороформом 1:1	**Mixtio(-onis) Methylii salicylatis cum Chloroformio 1:1**
Совкаин	**Sovcainum(-i)**
Раствор совкаина 0,5% и 1% для инъекций	Solutio(-onis) Sovcaini 0,5% et 1% pro injectionibus
Сок алоэ	**Succus(-i) Aloës**
Сок желтушника раскидистого	**Succus(-i) Erysimi diffusi**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Сок желудочный натуральный	**Succus(-i) gastricus(-i) naturalis**
Сок желудочный натуральный («Эквин»)	**Succus(-i) gastricus(-i) naturalis(-is) («Equinum»)**
Сок каланхое	**Succus(-i) Kalanchoës**
Сок подорожника	**Succus(-i) Plantaginis**
Сок подорожника блошного	**Succus(-i) Plantaginis psyllii**
Сок подорожника большого	**Succus(-i) Plantaginis majoris**
Солизим	**Solizymum(-i)**
Таблетки солизима 20 000 ЛЕ (растворимые в кишечнике)	Tabulettae(-as) Solizymi 20 000 LE (enterosolubiles)
Соль для ванн	**Sal(-is) pro balneis**
Соль морская	**Sal(-is) marinum(-i)**
Солюсульфон	**Solusulfonum(-i)**
Солюсурьмин	**Solusurminum(-i)**
Раствор солюсурьмина 20% для инъекций	Solutio(-onis) Solusurmini 20% pro injectionibus
Солютизон	**Soluthizonum(-i)**
Соматотропин человека	**Somatotropinum(-i) humanum(-i)**
Соматотропин человека для инъекций	Somatotropinum(-i) humanum(-i) pro injectionibus
Спазмолитин	**Spasmolytinum(-i)**
Спиразидин	**Spirazidinum(-i)**
Спирт камфорный и спирт муравьиный поровну	**Spiritus(-us) camphoratus(-i) et Spiritus(-us) Acidi formicici aa**
Спирт лавандовый	**Spiritus(-us) Lavandulae**
Спирт муравьиный	**Spiritus(-us) Acidi formicici**
Спирт мыльный	**Spiritus(-us) saponatus(-i)**
Спирт мыльный сложный	**Spiritus(-us) saponatus(-i) compositus(-i)**
Спирт поливиниловый низкомолекулярный	**Spiritus(-us) polyvinylus(-i)**
Спирт этиловый 90%, 70%, 40%	**Spiritus(-us) aethylicus(-i) 90%, 70%, 40%**
Спирт этиловый 95%	**Spiritus(-us) aethylicus(-i) 95%**
Спленин	**Spleninum(-i)**
Стекловидное тело	**Corpus vitreum**
Стефаглабрина сульфат	**Stephaglabrini sulfas(-atis)**
Раствор стефаглабрина сульфата 0,25% для инъекций	Solutio(-onis) Stephaglabrini sulfatis 0,25% pro injectionibus
Стрептолиаза	**Streptoliasum(-i)**
Стрептомицина сульфат	**Streptomycini sulfas(-atis)**
Стрептомицин-хлоркальциевый комплекс	**Streptomycini et Calcii chloridum(-i)**
Стрептосалюзид	**Streptosaluzidum(-i)**
Стрептосульмицина сульфат	**Streptosulmycini sulfas(-atis)**
Стрептоцид	**Streptocidum(-i)**
Линимент стрептоцида 5%	Linimentum(-i) Streptocidi 5%
Мазь стрептоцидовая 5% или 10%	Unguentum(-i) Streptocidi 5% aut 10%

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки стрептоцида 0,3 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Streptocidi 0,3 aut 0,5
Стрептоцид растворимый	**Streptocidum(-i) solubile(-is)**
Линимент стрептоцида растворимого 5%	Linimentum(-i) Streptocidi solubilis 5%
Стрихнина нитрат	**Strychnini nitras(-atis)**
Раствор стрихнина нитрата 0,1% для инъекций	Solutio(-onis) Strychnini nitratis 0,1% pro injectionibus
Строфантидина ацетат	**Strophanthidini acetas(-atis)**
Раствор строфантидина ацетата 0,05% для инъекций	Solutio(-onis) Strophanthidini acetatis 0,05% pro injectionibus
Строфантин К	**Strophanthinum(-i) K**
Раствор строфантина К 0,05% для инъекций	Solutio(-onis) Strophanthini K 0,05% pro injectionibus
Суинсулин	**Suinsulinum(-i)**
Сукцимер	**Succimerum(-i)**
Сукцимер — 0,03 *г* для инъекций	Succimeruum — 0,03 pro injectionibus
Таблетки сукцимера 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Succimeri 0,5
Сульгин	**Sulginum(-i)**
Таблетки сульгина 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Sulgini 0,5
Сульсен	**Sulsenum(-i)**
Паста сульсена 2,5%	Pasta(-ae) Sulseni 2,5%
Сульфадимезин	**Sulfadimezinum(-i)**
Таблетки сульфадимезина 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Sulfadimezini 0,25 aut 0,5
Сульфадиметоксин	**Sulfadimethoxinum(-i)**
Таблетки сульфадиметоксина 0,2 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Sulfadimethoxini 0,2 aut 0,5
Сульфазин	**Sulfazinum(-i)**
Сульфален	**Sulfalenum(-i)**
Таблетки сульфалена 0,2 *г* и 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Sulfaleni 0,2 et 0,5
Сульфамонометоксин	**Sulfamonomethoxinum(-i)**
Таблетки сульфамонометоксина 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Sulfamonomethoxini 0,5
Сульфантрол	**Sulfanthrolum(-i)**
Сульфапиридазин	**Sulfapyridazinum(-i)**
Таблетки сульфапиридазина 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Sulfapyridazini 0,5
Сульфапиридазин натрий	**Sulfapyridazinum(-i)-natrium(-i)**
Пленки глазные с сульфапиридазин-натрием	Membranulae(-as) (lamellae) ophthalmicae(-as) cum Sulfapyridazin-onatrio
Сульфацил-натрий	**Sulfacylum(-i)-natrium(-i)**
Мазь сульфациловая 30%	Unguentum(-i) Sulfacylinis 30%
Раствор сульфацил-натрия 30%	Solutio(-onis) Sulfacyli-natrii 30%
Раствор сульфацил-натрия 30% для инъекций	Solutio(-onis) Sulfacyli-natrii 30% pro injectionibus
Раствор сульфацил-натрия 20% в тюбик-капельницах	Solutio(-onis) Sulfacyli-natrii 20%
Раствор сульфацил-натрия 30% в тюбик-капельницах	Solutio(-onis) Sulfacyli-natrii 30%

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Раствор сульфацила растворимого 10% с метилцеллюлозой	Solutio(-onis) Sulfacyli-natrii solubilis 10% cum Methylcelluloso
Сульфокамфокаин 10% для инъекций	**Sulfocamphocainum(-i) 10% pro injectionibus**
«Сунорэф» мазь	**Unguentum(-i) «Sunorephum»**
Суппозитории вагинальные «Контрацептин Т»	**Suppositoria vaginalia «Contraceptinum T»**
Суппозитории вагинальные «Осарбон»	**Suppositoria vaginalia «Osarbonum»**
Суппозитории вагинальные «Осарцид»	**Suppositoria vaginalia «Osarcidum»**
Суспензия инсулин-протамина для инъекций	**Suspensio(-onis) Insulin-protamini pro injectionibus**
Суспензия «Циндол»	**Suspensio(-onis) «Cindolum»**
Суспензия цинк-инсулина аморфного для инъекций	**Suspensio(-onis) Zinc-insulini amorphi pro injectionibus**
Суспензия цинк-инсулина для инъекций	**Suspensio(-onis) Zinc-insulini pro injectionibus**
Суспензия цинк-инсулина кристаллического для инъекций	**Suspensio(-onis) Zinc-insulini crystallisati pro injectionibus**
Суспензия цинк-кортикотропина	**Suspensio(-onis) Zinc-corticotropini**
Сухая микстура от кашля для взрослых	**Mixtura(-ae) sicca(-ae) contra tussim pro adultis**
Сухая микстура от кашля для детей	**Mixtura(-ae) sicca(-ae) contra tussim pro infantibus**
Сухая плазма	**Plasma(-atis) siccum(-i)**
Сухая плазма с глюкозой	Plasma(-atis) cum Glucoso siccum(-i)
Сферофизина бензоат	**Sphaerophysini benzoas(-atis)**
Сыворотка «Ф» стерилизованная	**Serum(-i) «F» sterilisatum(-i)**
Таблетки «Адонис», покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Adonis» obductae(-as)**
Таблетки «Адонис-бром», покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Adonis-brom» obductae(-as)**
Таблетки «Аллохол», покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Allocholum» obductae(-as)**
Таблетки «Аллохол», покрытые оболочкой для детей	**Tabulettae(-as) «Allocholum» obductae(-as) pro infantibus**
Таблетки алоэ, покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Aloë» obductae(-as)**
Таблетки «Амазол» (амидопирин 0,3 г, дибазол 0,02 г)	**Tabulettae(-as) «Amazolum» (Amidopyrini 0,3, Dibazoli 0,02)**
Таблетки «Амитетравит», покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Amitetravitum» obductae(-as)**
Таблетки «Андипал» (анальгин 0,25 г, дибазол, папаверина гидрохлорид, фенобарбитал по 0,02 г)	**Tabulettae(-as) «Andipalum» (Analgini 0,25, Dibazoli, Papaverini hydrochloridi, Phenobarbitali aa 0,02)**
Таблетки «Анкофен» (антипирин, фенацетин по 0,25 г, кофеин-бензоат натрия 0,05 г)	**Tabulettae(-as) «Ancophenum» (Antipyrini, Phenacetini aa 0,25, Coffeini-natrii benzoatis 0,05)**
Таблетки «Антиструмин»	**Tabulettae(-as) «Antistruminum»**
Таблетки «Апифор»	**Tabulettae(-as) «Apiphorum»**
Таблетки «Аскорутин»	**Tabulettae(-as) «Ascorutinum»**
Таблетки «Аскофен»	**Tabulettae(-as) «Ascophenum»**
Таблетки «Аснитин»	**Tabulettae(-as) «Asnithinum»**
Таблетки «Аспаркам»	**Tabulettae(-as) «Asparkamum»**
Таблетки «Аэровит», покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Aërovitum» obductae(-as)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки «Аэрон»	Tabulettae (-as) «Aëronum»
Таблетки «Бекарбон»	Tabulettae(-as) «Becarbonum»
Таблетки «Беллалгин»	Tabulettae(-as) «Bellalginum»
Таблетки «Белластезин»	Tabulettae(-as) «Bellasthesinum»
Таблетки «Беллатаминал»	Tabulettae(-as) «Bellataminalum»
Таблетки «Беллатаминал», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Bellataminalum» obductae(-as)
Таблетки «Бепасал»	Tabulettae(-as) «Bepasalum»
Таблетки «Бесалол»	Tabulettae(-as) «Besalolum»
Таблетки «Бикарминт»	Tabulettae(-as) «Bicarmintum»
Таблетки Бло, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Blaudi obductae(-as)
Таблетки «Викаир»	Tabulettae(-as) «Vicairum»
Таблетки «Викалин»	Tabulettae(-as) «Vicalinum»
Таблетки «Вигератин», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Vigeratinum» obductae(-as)
Таблетки «Гексавит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Hexavitum» obductae(-as)
Таблетки «Гемостимулин»	Tabulettae(-as) «Haemostimulinum»
Таблетки «Гептавит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Heptavitum» obductae (-as)
Таблетки «Гефефитин»	Tabulettae(-as) «Hefaephytinum»
Таблетки «Глюферал»	Tabulettae (-as) «Gluferalum»
Таблетки «Декамевит 1», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Decamevitum 1» obductae(-as)
Таблетки «Декамевит 2», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Decamevitum 2» obductae(-as)
Таблетки «Диафеин»	Tabulettae(-as) «Diapheinum»
Таблетки «Дивенал»	Tabulettae(-as) «Divenalum»
Таблетки «Дипасалин»	Tabulettae(-as) «Dipasalinum»
Таблетки «Изаман»	Tabulettae(-as) «Isamanum»
Таблетки из плодов аронии черноплодной (рябины черноплодной), содержащие по 0,05 *г* витамина Р	Tabulettae(-as) Vitamini P ex fructibus Aroniae melanocarpae 0,05
Таблетки из плодов аронии черноплодной (рябины черноплодной), содержащие витамина Р и аскорбиновой кислоты по 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Vitamini P ex fructibus Aroniae melanocarpae et Acidi ascorbinici aa 0,05
Таблетки «Квадевит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Quadevitum» obductae(-as)
Таблетки «Кверсалин»	Tabulettae(-as) «Quersalinum»
Таблетки «Келлатрин»	Tabulettae(-as) «Khellatrinum»
Таблетки «Келливерин»	Tabulettae(-as) «Khelliverinum»
Таблетки кобальта хлорида 0,04 *г* и натрия хлорида 0,96 *г*	Tabulettae(-as) Cobalti chloridi 0,04 et Natrii chloridi 0,96
Таблетки «Кодтерпин»	Tabulettae(-as) «Codterpinum»
Таблетки «Корбелла», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Corbella» obductae(-as)
Таблетки «Кофальгин»	Tabulettae(-as) «Cofalginum»
Таблетки «Кофетамин», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Coffetaminum» obductae(-as)
Таблетки липоцеребрина 0,15 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Lipocerebrini 0,15 obductae(-as)
Таблетки «Лобесил»	Tabulettae(-as) «Lobesilum»

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки «Микройод», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Microiodum» obductae(-as)
Таблетки «Микройод» с фенобарбиталом, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Microiodum» cum Phenobarbitalo obductae(-as)
Таблетки мятные	Tabulettae(-as) Menthae
Таблетки «Нигексин»	Tabulettae(-as) «Nihexinum»
Таблетки «Никоверин»	Tabulettae(-as) «Nicoverinum»
Таблетки «Никовит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Nicovitum» obductae(-as)
Таблетки «Новомиграфен»	Tabulettae(-as) «Novomigraphenum»
Таблетки «Новоцефальгин»	Tabulettae(-as) «Novocephalginum»
Таблетки от кашля	Tabulettae(-as) contra tussim
Таблетки П-3	Tabulettae(-as) П-3
Таблетки «Павестезин»	Tabulettae(-as) «Pavesthesinum»
Таблетки «Паглюферал» 1, 2, 3	Tabulettae(-as) «Pagluferalum» 1,2,3
Таблетки «Палюфин»	Tabulettae(-as) «Palufinum»
Таблетки «Пангексавит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Panhexavitum» obductae(-as)
Таблетки «Папазол»	Tabulettae(-as) «Papazolum»
Таблетки «Пектусин»	Tabulettae(-as) «Pectussinum»
Таблетки «Пенталгин»	Tabulettae(-as) «Pentalginum»
Таблетки «Пентовит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Pentovitum» obductae(-as)
Таблетки Петрова	Tabulettae(-as) Petrovi
Таблетки пиразинамида 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Pyrazinamidi 0,5
Таблетки «Пирамеин»	Tabulettae(-as) «Pyrameinum»
Таблетки «Пираминал»	Tabulettae(-as) «Pyraminalum»
Таблетки «Пиркофен»	Tabulettae(-as) «Pyrcophenum»
Таблетки «Плавефин»	Tabulettae(-as) «Plavefinum»
Таблетки поливитаминные B_1B_2PP Вс	Tabulettae(-as) polyvitaminosae(-as) B_1, B_2, PP, Вс
Таблетки «Прегэстрол»	Tabulettae(-as) «Praegoestrolum»
Таблетки примахина 0,003 *г* или 0,009 *г*	Tabulettae(-as) Primachini 0,003 aut 0,009
Таблетки ревеня 0,3 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) radicis Rhei 0,3 aut 0,5
Таблетки «Рибовит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Ribovitum» obductae(-as)
Таблетки Рингера — Локка	Tabulettae(-as) Ringer — Locke
Таблетки «Тансал»	Tabulettae(-as) «Tansalum»
Таблетки «Теминал»	Tabulettae(-as) «Theminalum»
Таблетки «Теоверин»	Tabulettae(-as) «Theoverinum»
Таблетки «Теодибаверин»	Tabulettae(-as) «Theodibaverinum»
Таблетки «Теодинал»	Tabulettae(-as) «Theodinalum»
Таблетки «Теофедрин»	Tabulettae(-as) «Theophedrinum»
Таблетки «Тепафиллин»	Tabulettae(-as) «Thepaphyllinum»
Таблетки «Тестобромлецит», покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) «Testobromlecithum» obductae(-as)

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки «Тетравит», покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Tetravitum» obductae(-as)**
Таблетки «Тетрафолевит»	**Tabulettae(-as) «Tetrafolevitum»**
Таблетки травы термопсиса 0,01 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г	**Tabulettae(-as) herbae Thermopsidis 0,01, Natrii hydrocarbonatis 0,25**
Таблетки «Трацептин»	**Tabulettae(-as) «Traceptinum»**
Таблетки триамцинолона 0,004 г	**Tabulettae(-as) Triamcinoloni 0,004**
Таблетки «Уробесал»	**Tabulettae(-as) «Urobesalum»**
Таблетки «Уросал»	**Tabulettae(-as) «Urosalum»**
Таблетки «Феррокаль», покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Ferrocalum» obductae(-as)**
Таблетки «Фитоферролактол»	**Tabulettae(-as) «Phytoferrolactolum»**
Таблетки «Холензим», покрытые оболочкой	**Tabulettae(-as) «Cholenzymum» obductae(-as)**
Таблетки «Цитрамон»	**Tabulettae(-as) «Citramonum»**
Таблетки «Эсфлазид»	**Tabulettae(-as) «Aesflazidum»**
Танальбин	**Tannalbinum(-i)**
Танин	**Tanninum(-i)**
Раствор танина 4% спиртовой	Solutio(-onis) Tannini 4% spirituosa(-ae)
Теброфен	**Tebrophenum(-i)**
Мазь теброфеновая 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3% или 5%	Unguentum(-i) Tebropheni 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3% aut 5%
Тезан	**Thesanum(-i)**
Линимент тезана 0,2%	Linimentum(-i) Thesani 0,2%
Раствор тезана 0,5% в ампулах	Solutio(-onis) Thesani 0,5% in ampullis
Темехин	**Temechinum(-i)**
Таблетки темехина 0,001 г	Tabulettae(-as) Temechini 0,001
Темисал	**Themisalum(-i)**
Теобромин	**Theobrominum(-i)**
Таблетки теобромина 0,25 г	Tabulettae(-as) Theobromini 0,25
Таблетки теобромина 0,25 г и дибазола 0,02 г	Tabulettae(-as) Theobromini 0,25 et Dibazoli 0,02
Таблетки теобромина 0,25 г и папаверина гидрохлорида 0,02 г	Tabulettae(-as) Theobromini 0,25 et Papaverini hydrochloridi 0,02
Таблетки теобромина 0,25 г и фенобарбитала 0,02 г	Tabulettae(-as) Theobromini 0,25 et Phenobarbitali 0,02
Таблетки теобромина 0,25 г, фенобарбитала дибазола и папаверина гидрохлорида по 0,02 г	Tabulettae(-as) Theobromini 0,25, Phenobarbitali, Dibazoli et Papaverini hydrochloridi aa 0,02
Таблетки теобромина 0,25 г, фенобарбитала и папаверина гидрохлорида по 0,02 г	Tabulettae(-as) Theobromini 0,25, Phenobarbitali et Papaverini hydrochloridi 0,02
Теофиллин	**Theophyllinum(-i)**
Свечи с теофиллином 0,2 г	Suppositoria cum Theophyllino 0,2
Свечи с теофиллином 0,2 г на полиэтиленоксидной основе	Suppositoria cum Theophyllino 0,2 in basi polyaethylenoxydi
Таблетки теофиллина 0,1 г и димедрола 0,025 г	Tabulettae(-as) Theophyllini 0,1 et Dimedroli 0,025
Таблетки теофиллина 0,25 г и димедрола 0,025 г	Tabulettae(-as) Theophyllini 0,25 et Dimedroli 0,025

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Терпингидрат	**Terpinum(-i) hydratum(-i)**
Таблетки терпингидрата 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Terpini hydrati 0,25 aut 0,5
Таблетки терпингидрата и натрия гидрокарбоната по 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Terpini hydrati et Natrii hydrocarbonatis aa 0,25
Терпентин обыкновенный	**Terebinthina(-ae) communis(-is)**
Масло терпентинное очищенное	Oleum(-i) Terebinthinae rectificatum(-i)
Террилитин	**Terrilytinum(-i)**
Тестостерона изокапронат*	**Testosteroni isocaproas(-atis)**
Тестостерона капринат*	**Testosteroni caprias(-atis)**
Тестостерона пропионат	**Testosteroni propionas(-atis)**
Раствор тестостерона пропионата в масле 1% или 5% для инъекций	Solutio(-onis) Testosteroni propionatis oleosa(-ae) 1% aut 5% pro injectionibus
Раствор тестостерона пропионата в оливковом масле 1%, 5% для инъекций	Solutio(-onis) Testosteroni propionatis in oleo Olivarum 1%, 5% pro injectionibus
Тестостерона фенилпропионат*	**Testosteroni phenylpropionas(-atis)**
Тестостерона энантат	**Testosteroni oenanthas(-atis)**
Тестэнат 10% для инъекций	**Testoenatum(-i) 10% pro injectionibus**
Тетацин-кальций	**Tetacinum(-i)-calcium(-i)**
Раствор тетацин-кальция 10% для инъекций	Solutio(-onis) Tetacini-calcii 10% pro injectionibus
Тетрациклин	**Tetracyclinum(-i)**
Мазь тетрациклиновая 30 *мг* (30 000 ЕД) в 1 *г*	Unguentum(-i) Tetracyclini 0,03 (30 000 ЕД) in 1,0
Мазь тетрациклиновая глазная 10 000 ЕД в 1 *г*	Unguentum(-i) Tetracyclini ophthalmicum(-i) 10 000 ЕД in 1,0
Таблетки тетрациклина 50 000 ЕД, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Tetracyclini 50 000 ЕД obductae(-as)
Таблетки тетрациклина 100 000 ЕД или 250 000 ЕД, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Tetracyclini 100 000 ЕД aut 250 000 ЕД obductae(-as)
Таблетки тетрациклина и нистатина по 100 000 ЕД, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Tetracyclini et Nystatini aa 100 000 ЕД obductae(-as)
Тетрациклина гидрохлорид	**Tetracyclini hydrochloridum(-i)**
Тетрациклина гидрохлорид — 0,1 *г*	Tetracyclini hydrochloridum(-i) — 0,1
Тетрациклина гидрохлорид — 0,25 *г* в капсулах	Tetracyclini hydrochloridum(-i) — 0,25 in capsulis
Таблетки тетрациклина гидрохлорида 0,1 *г* или 0,25 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Tetracyclini hydrochloridi 0,1 aut 0,25 obductae(-as)
Тетурам (антабус)	**Teturamum(-i) [Antabus]**
Таблетки тетурама 0,1 *г*, 0,15 *г* или 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Teturami 0,1, 0,15 aut 0,25
Тиамина бромид (витамин B_1)	**Thiamini bromidum(-i) [Vitaminum(-i) B_1]**
Раствор тиамина бромида 3% или 6% для инъекций	Solutio(-onis) Thiamini bromidi 3% aut 6% pro injectionibus
Таблетки тиамина бромида 0,00258 *г*, 0,00645 *г* или 0,0129 *г*	Tabulettae(-as) Thiamini bromidi 0,00258, 0,00645 aut 0,0129
Тиамина хлорид (витамин B_1)	**Thiamini chloridum(-i) [Vitaminum(-i) B_1]**
Драже тиамина хлорида 0,002 *г* или тиамина бромида 0,0026 *г*	Dragée Thiamini chloridi 0,002 aut Thiamini bromidi 0,0026

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Раствор тиамина хлорида 2,5% или 5% для инъекций	Solutio(-onis) Thiamini chloridi 2,5% aut 5% pro injectionibus
Таблетки тиамина хлорида 0,002 *г*, 0,005 *г*, 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Thiamini chloridi 0,002, 0,005 aut 0,01
Таблетки тиамина хлорида 0,005 *г* или тиамина бромида 0,00645 *г*, никотиновой кислоты 0,03 *г*, аскорбиновой кислоты 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Thiamini chloridi 0,005 aut Thiamini bromidi 0,00645, Acidi nicotinici 0,03, Acidi ascorbinici 0,1
Таблетки тиамина хлорида 0,005 *г* или тиамина бромида 0,00645 *г*, рибофлавина 0,005 *г*, аскорбиновой кислоты 0,1 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Thiamini chloridi 0,005 aut Thiamini bromidi 0,00645, Riboflavini 0,005, Acidi ascorbinici 0,1 obductae(-as)
Тимол	**Thymolum(-i)**
Тимол синтетический	**Thymolum(-i) syntheticum(-i)**
Тиоацетазон (тибон)	**Thioacetazonum(-i) [Thibonum(-i)]**
Таблетки тиоацетазона 0,01 *г*, 0,025 *г* или 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Thioacetazoni 0,01, 0,025 aut 0,05
Тиодипин	**Thiodipinum(-i)**
Таблетки тиодипина 0,005 *г* или 0,01 *г*	Tabulettae(-as).Thiodipini 0,005 aut 0,01
Тиопентал-натрий	**Thiopentalum(-i)-natrium(-i)**
Тиофосфамид	**Thiophosphamidum(-i)**
Таблетки тиофосфамида 0,01 *г* или 0,02 *г* для инъекционных растворов	Tabulettae(-as) Thiophosphamidi 0,01 aut 0,02 pro injectionibus
Тиреоидин	**Thyreoidinum(-i)**
Таблетки тиреоидина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Thyreoidini 0,05
Таблетки тиреоидина 0,1 *г* или 0,2 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Thyreoidini 0,1 aut 0,2 obductae(-as)
Тиротропин	**Thyrotropinum(-i)**
Тиротропин для инъекций	Thyrotropinum(-i) pro injectionibus
Тифен	**Tiphenum(-i)**
Драже тифена 0,003 *г*	Dragée Tipheni 0,003
Таблетки тифена 0,02 *г* или 0,03 *г*	Tabulettae(-as) Tipheni 0,02 aut 0,03
Токоферола ацетат	**Tocopheroli acetas(-atis)**
Раствор α-токоферола ацетата (витамина Е) 5%, 10% или 30% в масле	Solutio(-onis) α-Tocopheroli acetatis (Vitamini E) 5%, 10% aut 30% oleosa(-ae)
Раствор α-токоферола ацетата (витамина Е) в масле 50% в капсулах 0,1 *г* и 0,2 *г*	Solutio(-onis) α-Tocopheroli acetatis (Vitamini E) oleosa(-ae) 50% in capsulis 0,1 et 0,2
Раствор α-токоферола ацетата (витамина Е) 5%, 10% или 30% в масле для инъекций	Solutio(-onis) α-Tocopheroli acetatis (Vitamini E) 5%, 10% aut 30% oleosa(-ae) pro injectionibus
Торфот	**Torfotum(-i)**
Трибуспонин	**Tribusponinum(-i)**
Таблетки трибуспонина 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Tribusponini 0,1
Трикрезол	**Tricresolum(-i)**
Тримекаин	**Trimecainum(-i)**
Раствор тримекаина 0,25%, 0,5%, 1%, 2% или 5% для инъекций	Solutio(-onis) Trimecaini 0,25%, 0,5%, 1%, 2% aut 5% pro injectionibus
Триметин	**Trimethinum(-i)**
Тринитролонг — 0,001 *г* и 0,002 *г*	**Trinitrolong — 0,001 et 0,002**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Триомбраст 60% и 76% для инъекций	**Triombrastum(-i) 60% et 76% pro injectionibus**
Триомбрин	**Triombrinum(-i)**
Трипсин аморфный	**Trypsinum(-i) amorphum(-i)**
Трипсин кристаллический	**Trypsinum(-i) crystallisatum(-i)**
Трисамин	**Trisaminum(-i)**
Раствор трисамина 3,66% для инъекций	Solutio(-onis) Trisamini 3,66% pro injectionibus
Трифтазин	**Triphthazinum(-i)**
Раствор трифтазина 0,2% для инъекций	Solutio(-onis) Triphthazini 0,2% pro injectionibus
Таблетки трифтазина 0,001 *г*, 0,005 или 0,01 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Triphthazini 0,001, 0,005 aut 0,01 obductae(-as)
Трихлорэтилен для наркоза	**Trichloraethylenum(-i) pro narcosi**
Трихомонацид	**Trichomonacidum(-i)**
Суппозитории вагинальные с трихомонацидом 0,05 *г*	Suppositoria vaginalia cum Trichomonacido 0,05
Таблетки трихомонацида 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Trichomonacidi 0,05
Тромбин	**Trombinum(-i)**
Тромболитин	**Trombolytinum(-i)**
Тропафен	**Tropaphenum(-i)**
Тропафен лиофилизированный — 0,02 *г* для инъекций	Tropaphenum lyophilisatum — 0,02 pro injectionibus
Тропацин	**Tropacinum(-i)**
Таблетки тропацина 0,001 *г*, 0,003 *г*, 0,005 *г*, 0,01 *г* или 0,015 *г*	Tabulettae(-as) Tropacini 0,001, 0,003, 0,005, 0,01 aut 0,015
Уголь активированный	**Carbo(-nis) activatus(-i)**
Таблетки угля активированного 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Carbonis activati 0,25 aut 0,5
Таблетки угля активированного «КМ» 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Carbonis activati «KM» 0,25
Унитиол	**Unithiolum(-i)**
Раствор унитиола 5% для инъекций	Solutio(-onis) Unithioli 5% pro injectionibus
Уродан	**Urodanum(-i)**
Уролесан	**Urolesanum(-i)**
Уросульфан	**Urosulfanum(-i)**
Таблетки уросульфана 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Urosulfani 0,5
Уросульфан растворимый	**Urosulfanum(-i) solubile(-is)**
Феназепам	**Phenazepamum(-i)**
Раствор феназепама 3% для инъекций	Solutio(-onis) Phenazepami 3% pro injectionibus
Таблетки феназепама 0,0005 *г*, 0,001 *г* или 0,0025 *г*	Tabulettae(-as) Phenazepami 0,0005; 0,001 aut 0,0025
Фенамин	**Phenaminum(-i)**
Таблетки фенамина 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Phenamini 0,01
Фенасал	**Phenasalum(-i)**
Фенацетин	**Phenacetinum(-i)**
Фенибут	**Phenibutum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки фенибута 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Phenibuti 0,25
Феникаберан	**Phenicaberanum(-i)**
Раствор феникаберана 0,25% для инъекций	Solutio(-onis) Phenicaberani 0,25% pro injectionibus
Таблетки феникаберана 0,02 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Phenicaberani 0,02 obductae(-as)
Фенилин	**Phenylinum(-i)**
Таблетки фенилина 0,03 *г*	Tabulettae(-as) Phenylini 0,03
Фенилсалицилат (салол)	**Phenylii salicylas(-atis) [Salolum(-i)]**
Таблетки фенилсалицилата 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Phenylii salicylatis 0,25, 0,5
Таблетки фенилсалицилата, висмута нитрата основного по 0,25 *г* и экстракта красавки 0,015 *г*	Tabulettae(-as) Phenylii salicylatis, Bismuthi subnitratis aa 0,25 et Extracti Belladonnae 0,015
Фенкарол	**Phencarolum(-i)**
Таблетки фенкарола 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Phencaroli 0,025
Фенобарбитал (люминал)	**Phenobarbitalum(-i) [Luminalum(-i)]**
Раствор фенобарбитала 0,2% для детей	Solutio(-onis) Phenobarbitali 0,2% pro infantibus
Таблетки фенобарбитала 0,005 *г* для детей	Tabulettae(-as) Phenobarbitali 0,005 pro infantibus
Таблетки фенобарбитала 0,05 *г* или 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Phenobarbitali 0,05 aut 0,1
Таблетки фенобарбитала 0,05 *г* и папаверина гидрохлорида 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Phenobarbitali 0,05 et Papaverini hydrochloridi 0,02
Феноболин	**Phenobolinum(-i)**
Раствор феноболина в масле 1%, 2,5% для инъекций	Solutio(-onis) Phenobolini oleosa(-ae) 1%, 2,5% pro injectionibus
Феноксиметилпенициллин	**Phenoxymethylpenicillinum(-i)**
Феноксиметилпенициллин (для суспензии) — 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД или 2 000 000 ЕД	Phenoxymethylpenicillinum (pro suspensione) — 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД aut 2 000 000 ЕД
Драже феноксиметилпенициллина 100 000 ЕД	Dragée Phenoxymethylpenicillini 100 000 ЕД
Таблетки феноксиметилпенициллина 0,1 *г* или 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Phenoxymethylpenicillini 0,1 aut 0,25
Фенол чистый	**Phenolum(-i) purum(-i)**
Фенол чистый жидкий	Phenolum(-i) purum(-i) liquefactum(-i)
Вода карболовая 2%	Aqua(-ae) carbolica(-ae) 2%
Мазь феноловая 2%	Unguentum(-i) Phenoli 2%
Раствор фенола в глицерине 3% или 5%	Solutio(-onis) Phenoli in Glycerino 3% aut 5%
Фенолфталеин	**Phenolphthaleinum(-i)**
Таблетки фенолфталеина 0,05 *г* или 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Phenolphthaleini 0,05 aut 0,1
Фентанил	**Phentanylum(-i)**
Раствор фентанила 0,005% для инъекций	Solutio(-onis) Phentanyli 0,005% pro injectionibus
Фентирин	**Phenthyrinum(-i)**
Таблетки фентирина 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Phenthyrini 0,025
Фентоламина гидрохлорид	**Phentolamini hydrochloridum(-i)**
Таблетки фентоламина гидрохлорида 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Phentolamini hydrochloridi 0,025
Фепранон	**Phepranonum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Драже фепранона 0,025 *г*	Dragée Phepranoni 0,025
Фепромарон	**Phepromaronum(-i)**
Таблетки фепромарона 0,01 *г*	Tabulettae(-as) Phepromaroni 0,01
Ферамид	**Ferramidum(-i)**
Таблетки ферамида 0,02 *г* или 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Ferramidi 0,02 aut 0,1
Фербитол	**Ferbitolum(-i)**
Ферезол	**Pheresolum(-i)**
Ферковен	**Fercovenum(-i)**
Ферроцерон	**Ferroceronum(-i)**
Таблетки ферроцерона 0,3 *г*	Tabulettae(-as) Ferroceroni 0,3
Ферроцин	**Ferrocinum(-i)**
Фетанол	**Phethanolum(-i)**
Раствор фетанола 1% для инъекций	Solutio(-onis) Phethanoli 1% pro injectionibus
Таблетки фетанола 0,005 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Phethanoli 0,005 obductae(-as)
Фибриноген	**Fibrinogenum(-i)**
Фибринолизин	**Fibrinolysinum(-i)**
Фибриносол	**Fibrinosolum(-i)**
Фибс для инъекций	**Fibs pro injectionibus**
Физостигмина салицилат	**Physostigmini salicylas(-atis)**
Фитин	**Phytinum(-i)**
Таблетки фитина 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Phytini 0,25
Фицилин	**Ficilinum(-i)**
Флавазид*	**Flavazidum(-i)**
Флавинат	**Flavinatum(-i)**
Флавинат — 0,002 *г* для инъекций	Flavinatum — 0,002 pro injectionibus
Флакумин	**Flacuminum(-i)**
Таблетки флакумина 0,02 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Flacumini 0,02 obductae(-as)
Фламин	**Flaminum(-i)**
Таблетки фламина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Flamini 0,05
Фловерин	**Phloverinum(-i)**
Таблетки фловерина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Phloverini 0,05
Флореналь	**Florenalum(-i)**
Мазь флореналя 0,25%, 0,5%	Unguentum(-i) Florenali 0,25%, 0,5%
Пленки глазные с флореналем	Membranulae(-as) (lamellae) ophthalmicae(-as) cum Florenalo
Флоримицина сульфат	**Florimycini sulfas(-atis)**
Флюоресцеин растворимый	**Fluoresceinum(-i) solubile(-is)**
Фопурин	**Phopurinum(-i)**
Фопурин лиофилизированный — 0 04 *г* для инъекций	Phopurinum lyophilisatum — 0,04 pro injectionibus

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Формидрон	**Formidronum(-i)**
Фосфаден	**Phosphadenum(-i)**
Раствор фосфадена 2% для инъекций	Solutio(-onis) Phosphadeni 2% pro injectionibus
Таблетки фосфадена 0,025 *г* или 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Phosphadeni 0,025 aut 0,05
Фосфакол	**Phosphacolum(-i)**
Раствор фосфакола 0,01%, 0,013% или 0,02%	Solutio(-onis) Phosphacoli 0,01%, 0,013% aut 0,02%
Фосфотиамин	**Phosphothiaminum(-i)**
Таблетки фосфотиамина 0,01 *г* или 0,03 *г*	Tabulettae(-as) Phosphothiamini 0,01 aut 0,03
Фосфэстрол	**Phosphoestrolum(-i)**
Раствор фосфэстрола 6% для инъекций	Solutio(-onis) Phosphoestroli 6% pro injectionibus
Таблетки фосфэстрола 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Phosphoestroli 0,1
Фотрин	**Photrinum(-i)**
Фотрин — 0,01 *г* и 0,02 *г* для инъекций	Photrinum — 0,01 et 0,02 pro injectionibus
Фруктозодифосфат натрия	**Natrii fructosodiphosphas(-atis)**
Фтазин	**Phthazinum(-i)**
Таблетки фтазина 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Phthazini 0,5
Фталазол	**Phthalazolum(-i)**
Таблетки фталазола 0,5 *г*	Tabulettae Phthalazoli 0,5
Фтивазид	**Phthivazidum(-i)**
Таблетки фтивазида 0,1 *г*, 0,3 *г*, 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Phthivazidi 0,1, 0,3, 0,5
Фторафур	**Phthorafurum(-i)**
Фторафур — 0,4 *г* в капсулах	Phthorafurum — 0,4 in capsulis
Раствор фторафура 4% для инъекций	Solutio(-onis) Phthorafuri 4% pro injectionibus
Фторацизин	**Phthoracizinum(-i)**
Раствор фторацизина 1,25% для инъекций	Solutio(-onis) Phthoracizini 1,25% pro injectionibus
Таблетки фторацизина 0,01 *г* или 0,025 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Phthoracizini 0,01 aut 0,025 obductae(-as)
Фторбензотэф	**Phthorbenzotephum(-i)**
Фторбензотэф — 0,04 *г* для инъекций	Phthorbenzotephum — 0,04 pro injectionibus
Фторлак	**Phthorlacum(-i)**
Фторотан	**Phthorothanum(-i)**
Фторурацил	**Phthoruracilum(-i)**
Раствор фторурацила 5% для инъекций	Solutio(-onis) Phthoruracili 5% pro injectionibus
Фубромеган	**Fubromeganum(-i)**
Таблетки фубромегана 0,03 *г*	Tabulettae(-as) Fubromegani 0,03
Фузидин-натрий	**Fusidinum(-i)-natrium(-i)**
Таблетки фузидин-натрия 0,125 *г* или 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Fusidini-natrii 0,125 aut 0,25
Фурагин	**Furaginum(-i)**
Таблетки фурагина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Furagini 0,05
Фурагин растворимый	**Furaginum(-i) solubile(-is)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Фурадонин	**Furadoninum(-i)**
Таблетки фурадонина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Furadonini 0,05
Таблетки фурадонина 0,05 *г* (растворимые в кишечнике) для детей	Tabulettae(-as) Furadonini 0,05 (enterosolubiles) pro infantibus
Таблетки фурадонина 0,1 *г*, растворимые в кишечнике	Tabulettae(-as) Furadonini 0,1 enterosolubiles
Фуразолидон	**Furazolidonum(-i)**
Таблетки фуразолидона 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Furazolidoni 0,05
Фуразолин	**Furazolinum**
Таблетки фуразолина 0,05 *г*	Tabulettae(-as) Furazolini 0,05
Фурапласт (с перхлорвинилом)	**Furaplastum(-i) cum Perchlorvinylo**
Фурацилин	**Furacilinum(-i)**
Мазь фурацилиновая 0,2%	Unguentum(-i) Furacilini 0,2%
Паста фурацилиновая	Pasta(-ae) Furacilini
Раствор фурацилина 0,02% (стерильный)	Solutio(-onis) Furacilini 0,02% (sterilis)
Раствор фурацилина спиртовой 1 : 1500	Solutio(-onis) Furacilini spirituosa(-ae) 1 : 1500
Таблетки фурацилина 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Furacilini 0,1
Таблетки фурацилина 0,02 *г* для наружного употребления	Tabulettae(-as) Furacilini 0,02 ad usum **externum**
Химопсин	**Chymopsinum(-i)**
Химотрипсин	**Chymotrypsinum(-i)**
Хингамин	**Chingaminum(-i)**
Таблетки хингамина 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Chingamini 0,25
Хинидина сульфат	**Chinidini sulfas(-atis)**
Хинина гидрохлорид	**Chinini hydrochloridum(-i)**
Таблетки хинина гидрохлорида 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Chinini hydrochloridi 0,25 aut 0,5
Хинина дигидрохлорид	**Chinini dihydrochloridum(-i)**
Раствор хинина дигидрохлорида 50% для инъекций	Solutio(-onis) Chinini dihydrochloridi 50% pro injectionibus
Хинина сульфат	**Chinini sulfas(-atis)**
Таблетки хинина сульфата 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Chinini sulfatis 0,25 aut 0,5
Хиниофон (ятрен)	**Chiniofonum(-i) [Jatrenum(-i)]**
Таблетки хиниофона 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Chiniofoni 0,25
Хинозол	**Chinosolum(-i)**
Хиноксидин	**Chinoxydinum(-i)**
Таблетки хиноксидина 0,25 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Chinoxydini 0,25 obductae(-as)
Хинотилин	**Chinotilinum(-i)**
Раствор хинотилина 0,05% и 0,2% для инъекций	Solutio(-onis) Chinotilini 0,05% et 0,2% pro injectionibus
Хиноцид	**Chinocidum(-i)**
Таблетки хиноцида 0,005 *г* или 0,01 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Chinocidi 0,005 aut 0,01 obductae(-as)

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Хлодитан	**Chloditanum(-i)**
Таблетки хлодитана 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Chloditani 0,5
Хлозепид	**Chlozepidum(-i)**
Таблетки хлозепида 0,005 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Chlozepidi 0,005 obductae(-as)
Хлоксил	**Chloxylum(-i)**
Хлоракон	**Chloraconum(-i)**
Таблетки хлоракона 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Chloraconi 0,25 aut 0,5
Хлоралгидрат	**Chlorali hydras(-atis)**
Хлорамин Б	**Chloraminum(-i) B**
Хлорацетофос	**Chloracetophosum(-i)**
Мазь хлорацетофосовая 5% или 7%	Unguentum(-i) Chloracetophosi 5% aut 7%
Хлорацизин	**Chloracyzinum(-i)**
Таблетки хлорацизина 0,015 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Chloracyzini 0,015 obductae(-as)
Хлорбутин	**Chlorbutinum(-i)**
Таблетки хлорбутина 0,002 *г* или 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Chlorbutini 0,002 aut 0,005
Хлоридин	**Chloridinum(-i)**
Таблетки хлоридина 0,01 *г* или 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Chloridini 0,01 aut 0,005
Хлорная известь	**Calcaria(-ae) chlorata(-ae)**
Хлоробутанолгидрат	**Chlorobutanoli hydras(-atis)**
Хлоробутанолгидрат для ингаляций	Chlorobutanoli hydras(-atis) pro inhalationibus
Хлорофиллипт	**Chlorophylliptum(-i)**
Раствор хлорофиллипта в масле 2%	Solutio(-onis) Chlorophyllipti oleosa(-ae) 2%
Раствор хлорофиллипта спиртовой 0,25%	Solutio(-onis) Chlorophyllipti spirituosa(-ae) 0,25%
Раствор хлорофиллипта спиртовой 1%	Solutio(-onis) Chlorophyllipti spirituosa(-ae) 1%
Хлороформ	**Chloroformium(-i)**
Хлороформ для наркоза	**Chloroformium(-i) pro narcosi**
Хлорофтальм	**Chlorophthalmum(-i)**
Хлорпропамид	**Chlorpropamidum(-i)**
Таблетки хлорпропамида 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Chlorpropamidi 0,1
Таблетки хлорпропамида 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Chlorpropamidi 0,25
Хлортианизен	**Chlortrianisenum(-i)**
Таблетки хлортианизена 0,012 *г*	Tabulettae(-as) Chlortrianiseni 0,012
Хлорэтил	**Acthylii chloridum(-i)**
Хлотазол	**Chlotazolum(-i)**
Таблетки хлотазола 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Chlotazoli 0,1
Хлофосфол	**Chlophospholum(-i)**
Раствор хлофосфола в масле 5%	Solutio(-onis) Chlophospholi oleosa(-ae) 5%
Хлоцикламид	**Chlocyclamidum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки хлоцикламида 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Chlocyclamidi 0,25
Холина хлорид	**Cholini chloridum(-i)**
Раствор холина хлорида 20% для инъекций	Solutio(-onis) Cholini chloridi 20% pro injectionibus
Холосас	**Cholosasum(-i)**
Хонсурид	**Chonsuridum(-i)**
Хромолимфотраст	**Chromolymphotrastum(-i)**
Целанид	**Celanidum(-i)**
Раствор целанида 0,05%	Solutio(-onis) Celanidi 0,05%
Раствор целанида 0,02% для инъекций	Solutio(-onis) Celanidi 0,02% pro injectionibus
Таблетки целанида 0,00025 *г*	Tabulettae(-as) Celanidi 0,00025
Целлюлозы фосфат*	**Cellulosi phosphas(-atis)**
Церебро-лецитин	**Cerebro-lecithinum(-i)**
Таблетки церебро-лецитина 0,05 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Cerebro-lecithini 0,05 obductae(-as)
Церигель	**Cerigelum(-i)**
Цетамифен	**Cetamiphenum(-i)**
Таблетки цетамифена 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Cetamipheni 0,25
Цефалексин	**Cephalexinum(-i)**
Цефалексин — 0,25 *г* в капсулах	Cephalexinum 0,25 in capsulis
Цефедрин	**Cephedrinum(-i)**
Таблетки цефедрина 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Cephedrini 0,025
Циамид	**Cyamidum(-i)**
Цианокобаламин	**Cyanocobalaminum(-i)**
Раствор цианокобаламина для инъекций	Solutio(-onis) Cyanocobalamini pro injectionibus
Таблетки цианокобаламина 0,00005 *г*, фолиевой кислоты 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Cyanocobalamini 0,00005, Acidi folici 0,005
Таблетки цианокобаламина 0,00005 *г*, фолиевой кислоты 0,0008 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Cyanocobalamini 0,00005, Acidi folici 0,0008 obductae(-as)
Цигерол	**Cygerolum(-i)**
Циквалон	**Cycvalonum(-i)**
Таблетки циквалона 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Cycvaloni 0,1
Цикламид	**Cyclamidum(-i)**
Таблетки цикламида 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Cyclamidi 0,25
Циклобутоний	**Cyclobutonium(-i)**
Раствор циклобутония 0,7% для инъекций	Solutio(-onis) Cyclobutonii 0,7% pro injectionibus
Циклодол	**Cyclodolum(-i)**
Таблетки циклодола 0,001 *г*, 0,002 *г*, 0,005 *г*	Tabulettae(-as) Cyclodoli 0,001, 0,002, 0,005
Циклозил	**Cyclozylum(-i)**
Циклометиазид	**Cyclomethiazidum(-i)**
Таблетки циклометиазида 0,0005 *г*	Tabulettae(-as) Cyclomethiazidi 0,0005
Циклопропан	**Cyclopropanum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Циклосерин	**Cycloserinum(-i)**
Циклофосфан	**Cyclophosphanum(-i)**
Таблетки циклофосфана 0,05 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Cyclophosphani 0,05 obductae(-as)
Циминаль	**Ciminalum(-i)**
Цинка окись	**Zinci oxydum(-i)**
Линимент окиси цинка	Linimentum(-i) Zinci oxydi
Мазь цинковая	Unguentum(-i) Zinci
Мазь цинко-нафталановая с анестезином	Unguentum(-i) Zinci-naphthalanatum(-i) cum Anaesthesino
Паста цинковая	Pasta(-ae) Zinci
Паста цинко-ихтиоловая	Pasta(-ae) Zinci-ichthyoli
Паста цинко-нафталанная	Pasta(-ae) Zinci-naphthalanata(-ae)
Цинка сульфат	**Zinci sulfas(-atis)**
Раствор цинка сульфата 0,25%, борной кислоты 2% в тюбик-капельницах	Solutio(-onis) Zinci sulfatis 0,25%, Acidi borici 2%
Раствор цинка сульфата 0,25% или 0,5% и кислоты борной 2%	Solutio(-onis) Zinci sulfatis 0,25% aut 0,5% et Acidi borici 2%
Цинка ундециленат*	**Zinci undecylenas(-atis)**
Цинхофен (атофан)	**Cinchophenum(-i)**
Таблетки цинхофена 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Cinchopheni 0,5
Цистамина дигидрохлорид	**Cystamini dihydrochloridum(-i)**
Таблетки цистамина 0,4 *г*	Tabulettae(-as) Cystamini 0,4
Цистеин	**Cysteinum(-i)**
Цитизин	**Cytisinum(-i)**
Цититон	**Cytitonum(-i)**
Цитохром-С для инъекций	**Cytochromum(-i)-C pro injectionibus**
Экстракт алоэ жидкий	**Extractum(-i) Aloës fluidum(-i)**
Экстракт алоэ жидкий для инъекций	**Extractum(-i) Aloës fluidum(-i) pro injectionibus**
Экстракт алтейного корня сухой	**Extractum(-i) Althaeae siccum(-i)**
Экстракт бессмертника сухой	**Extractum(-i) Helichrysi arenarii fluidum(-i)**
Экстракт боярышника жидкий	**Extractum(-i) Crataegi fluidum(-i)**
Экстракт валерианы густой	**Extractum(-i) Valerianae spissum(-i)**
Таблетки экстракта валерианы 0,02 *г*, покрытые оболочкой	Tabullettae(-as) extracti Valerianae 0,02 obductae(-as)
Экстракт валерианы жидкий (1:2)	**Extractum(-i) Valerianae fluidum(-i) (1:2)**
Экстракт водяного перца жидкий	**Extractum(-i) Polygoni hydropiperis fluidum(-i)**
Экстракт горицвета жидкий (1:2)	**Extractum(-i) Adonidis vernalis fluidum(-i) (1:2)**
Экстракт горицвета сухой	**Extractum(-i) Adonidis vernalis siccum(-i)**
Экстракт калины жидкий	**Extractum(-i) Viburni fluidum(-i)**
Экстракт крапивы густой	**Extractum(-i) Urticae spissum(-i)**
Экстракт крапивы жидкий	**Extractum(-i) Urticae fluidum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Экстракт красавки (белладонны) густой	**Extractum(-i) Belladonnae spissum(-i)**
Экстракт красавки (белладонны) сухой	**Extractum(-i) Belladonnae siccum(-i)**
Свечи с экстрактом красавки (на основе лазупол-G)	Suppositoria cum extracto Belladonnae (in basi lasupolo-G)
Таблетки желудочные с экстрактом красавки	Tabulettae(-as) stomachicae(-as) cum extracto Belladonnae
Экстракт кровохлебки жидкий	**Extractum(-i) Sanguisorbae fluidum(-i)**
Экстракт крушины жидкий	**Extractum(-i) Frangulae fluidum(-i)**
Экстракт крушины сухой	**Extractum(-i) Frangulae siccum(-i)**
Таблетки экстракта крушины 0,2 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) extracti Frangulae 0,2 obductae(-as)
Экстракт кукурузных рылец жидкий	**Extractum(-i) stigmatum Maydis fluidum(-i)**
Экстракт лагохилуса сухой	**Extractum(-i) Lagochili siccum(-i)**
Таблетки экстракта лагохилуса 0,2 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) extracti Lagochili 0,2 obductae(-as)
Экстракт левзеи жидкий	**Extractum(-i) Leuzeae fluidum(-i)**
Экстракт магнолии жидкий	**Extractum(-i) Magnoliae fluidum(-i)**
Экстракт марены красильной сухой	**Extractum(-i) Rubiae tinctorum siccum(-i)**
Таблетки экстракта марены красильной 0,25 *г*	Tabulettae(-as) extracti Rubiae tinctorum 0,25
Экстракт мужского папоротника, густой	**Extractum(-i) Filicis maris spissum(-i)**
Экстракт мужского папоротника — 0,5 *г* в капсулах	Extractum(-i) Filicis maris — 0,5 in capsulis
Экстракт одуванчика густой	**Extractum(-i) Taraxaci spissum(-i)**
Экстракт пассифлоры жидкий	**Extractum(-i) Passiflorae fluidum(-i)**
Экстракт пастушьей сумки жидкий	**Extractum(-i) Bursae pastoris fluidum(-i)**
Экстракт печени лиофилизированный	**Extractum(-i) Hepatis lyophilisatum(-i)**
Экстракт плаценты для инъекций	**Extractum(-i) Placentae pro injectionibus**
Экстракт плодов моркови дикой жидкий	**Extractum(-i) fructuum Dauci carotae fluidum(-i)**
Экстракт полыни густой	**Extractum(-i) Absinthii spissum(-i)**
Экстракт прополиса густой	**Extractum(-i) Propolis spissum(-i)**
Экстракт пустырника жидкий	**Extractum(-i) Leonuri fluidum(-i)**
Экстракт ревеня сухой	**Extractum(-i) Rhei siccum(-i)**
Экстракт родиолы жидкий	**Extractum(-i) Rhodiolae fluidum(-i)**
Экстракт сенны сухой	**Extractum(-i) Sennae siccum(-i)**
Таблетки экстракта сенны сухого 0,3 *г*	Tabulettae(-as) extracti Sennae sicci 0,3
Экстракт солодкового корня густой	**Extractum(-i) Glycyrrhizae spissum(-i)**
Экстракт солодкового корня сухой	**Extractum(-i) Glycyrrhizae siccum(-i)**
Экстракт стручкового перца густой	**Extractum(-i) Capsici spissum(-i)**
Экстракт термопсиса жидкий (1:2)	**Extractum(-i) Thermopsidis fluidum(-i) (1:2)**
Экстракт термопсиса сухой	**Extractum(-i) Thermopsidis siccum(-i)**
Экстракт тимьяна жидкий	**Extractum(-i) Thymi fluidum(-i)**
Экстракт травы душицы жидкий	**Extractum(-i) herbae Origani fluidum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Экстракт трилистника водяного густой	**Extractum(-i) Trifolii fibrini spissum(-i)**
Экстракт хвойный в брикетах	**Extractum(-i) Pini silvestris in briketis**
Экстракт хвойный натуральный	**Extractum(-i) Pini silvestris naturale(-is)**
Экстракт чабреца жидкий	**Extractum(-i) Serpylli fluidum(-i)**
Экстракт чеснока густой	**Extractum(-i) Allii sativi spissum(-i)**
Экстракт чилибухи сухой	**Extractum(-i) Strychni siccum(-i)**
Экстракт чистеца буквицецветного жидкий	**Extractum(-i) Stachydis betonicaeflorae fluidum(-i)**
Экстракт шишек хмеля жидкий	**Extractum(-i) fructuum Lupuli fluidum(-i)**
Экстракт элеутерококка жидкий	**Extractum(-i) Eleutherococci fluidum(-i)**
Эктерицид	**Ectericidum(-i)**
Эластолитин	**Elastolytinum(-i)**
Эликсир грудной	**Elixir(-iris) pectorale(-is)**
Эметина гидрохлорид	**Emetini hydrochloridum(-i)**
Раствор эметина гидрохлорида 1% для инъекций	Solutio(-onis) Emetini hydrochloridi pro injectionibus 1%
Эмульсия ДЭТА	**Emulsum(-i) «Deta»**
Эпилин	**Epilinum(-i)**
Пластырь эпилиновый	Emplastrum(-i) Epilini
Эргокальциферол (витамин D_2)	**Ergocalciferolum(-i) [Vitaminum(-i) D_2]**
Драже эргокальциферола (витамина D_2) по 500 МЕ	Dragée Ergocalciferoli (Vitamini D_2) 500 ME
Раствор эргокальциферола в масле 0,125%	Solutio(-onis) Ergocalciferoli oleosa(-ae) 0,125%
Раствор эргокальциферола (витамина D_2) в масле 0,5%	Solutio(-onis) Ergocalciferoli (Vitamini D_2) oleosa(-ae) 0,5%
Раствор эргокальциферола (витамина D_2) в масле 0,0625%	Solutio(-onis) Ergocalciferoli (Vitamini D_2) oleosa(-ae) 0,0625%
Раствор эргокальциферола в масле 500 МЕ или 1000 МЕ в капсулах	Solutio(-onis) Ergocalciferoli oleosa(-ae) 500 ME aut 1000 ME in capsulis
Раствор эргокальциферола (витамина D_2) в спирте 0,5%	Solutio(-onis) Ergocalciferoli (Vitamini D_2) spirituosa(-ae) 0,5%
Эргометрина малеат	**Ergometrini maleas(-atis)**
Раствор эргометрина малеата 0,02% для инъекций	Solutio(-onis) Ergometrini maleatis 0,02% pro injectionibus
Таблетки эргометрина малеата 0,0002	Tabulettae(-as) Ergometrini maleatis 0,0002
Эрготал	**Ergotalum(-i)**
Раствор эрготала 0,05% для инъекций	Solutio(-onis) Ergotali 0,05% pro injectionibus
Таблетки эрготала 0,001 *г*	Tabulettae(-as) Ergotali 0,001
Эрготамина тартрат	**Ergotamini tartras(-atis)**
Эригем	**Eryhaemum(-i)**
Эризид-концентрат	**Erysidum(-i) concentratum(-i)**
Эринит	**Erynitum(-i)**
Таблетки эринита 0,01 *г* или 0,02 *г*	Tabulettae(-as) Eryniti 0,01 aut 0,02
Эритромицин	**Erythromycinum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Эритромицин в капсулах — 100 *мг* или 200 *мг* (100 000 ЕД или 200 000 ЕД)	Erythromycinum in capsulis — 100 aut 200 (100 000 ЕД aut 200 000 ЕД)
Мазь эритромициновая 10 000 ЕД в 1 *г*	Unguentum(-i) Erythromycini 10 000 ЕД in 1,0
Таблетки эритромицина 0,1 *г* или 0,25 *г*	Tabulettae(-as) Erythromycini 0,1 aut 0,25
Эритромицина фосфат	**Erythromycini phosphas(-atis)**
Эрициклин — 0,25 *г* в капсулах	**Erycyclinum — 0,25 in capsulis**
Эстоцин	**Aesthocinum(-i)**
Таблетки эстоцина 0,005 *г*, 0,015 *г*, 0,03 *г* или 0,06 *г*	Tabulettae(-as) Aesthocini 0,005, 0,015, 0,03 aut 0,06
Эстрадиола дипропионат	**Oestradioli dipropionas(-atis)**
Раствор эстрадиола дипропионата в масле 0,1% для инъекций	Solutio(-onis) oestradioli dipropionatis oleosa(-ae) 0,1% pro injectionibus
Эсулан	**Esulanum(-i)**
Мазь эсулановая 1%	Unguentum(-i) Esulani 1%
Этазол	**Aethazolum(-i)**
Таблетки этазола 0,25 *г* или 0,5 *г*	Tabulettae(-as) Aethazoli 0,25 aut 0,5
Этазол-натрий	**Aethazolum(-i)-natrium(-i)**
Раствор этазол-натрия 10% или 20% для инъекций	Solutio(-onis) Aethazoli-natrii 10% aut 20% pro injectionibus
Этакридина лактат (риванол)	**Aethacridini lactas(-atis) [Rivanolum(-i)]**
Мазь этакридина лактата 3%	Unguentum(-i) Aethacridini lactatis 3%
Раствор этакридина (риванола) спиртовой 0,1%	Solutio(-onis) Aethacridini spirituosa(-ae) 0,1%
Таблетки этакридина 0,01 *г*, борной кислоты 0,09 *г*	Tabulettae(-as) Aethacridini 0,01, Acidi borici 0,09
Этамид	**Aethamidum(-i)**
Таблетки этамида 0,35 *г*	Tabulettae(-as) Aethamidi 0,35
Этаминал-натрий (нембутал)	**Aethaminalum(-i)-natrium(-i)**
Таблетки этаминал-натрия 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Aethaminali-natrii 0,1
Этанолмеркурихлорид	**Aethanolmercurichloridum(-i)**
Этаперазин	**Aethaperazinum(-i)**
Таблетки этаперазина 0,004 *г*, 0,01 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Acthaperazini 0,004, 0,01 obductae(-as)
Таблетки этаперазина 0,006 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Aethaperazini 0,006 obductae(-as)
Этилморфина гидрохлорид (дионин)	**Aethylmorphini hydrochloridum(-i) [Dioninum(-i)]**
Таблетки этилморфина гидрохлорида 0,01 *г* или 0,015 *г*	Tabulettae(-as) Aethylmorphini hydrochloridi 0,01 aut 0,015
Этимизол	**Aethimizolum(-i)**
Раствор этимизола 1,5% для инъекций	Solutio(-onis) Aethimizoli 1,5% pro injectionibus
Таблетки этимизола 0,1 *г*	Tabulettae(-as) Aethimizoli 0,1
Этинилэстрадиол	**Aethinyloestradiolum(-i)**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Таблетки этинилэстрадиола 0,00001 *г*, 0,00005 *г*	Tabulettae(-as) Aethinyloestradioli 0,00001, 0,00005
Этиотраст	**Aethiotrastum(-i)**
Этиотраст для инъекций	Aethiotrastum(-i) pro injectionibus
Этмозин	**Aethmozinum(-i)**
Раствор этмозина 2,5% для инъекций	Solutio(-onis) Aethmozini 2,5% pro injectionibus
Таблетки этмозина 0,025 *г* или 0,1 *г*, покрытые оболочкой	Tabulettae(-as) Aethmozini 0,025 aut 0,1 obductae(-as)
Этоний	**Aethonium(-i)**
Паста этония	Pasta(-ae) Aethonii
Эуфиллин	**Euphyllinum(-i)**
Раствор эуфиллина 2,4% для инъекций	Solutio(-onis) Euphyllini 2,4% pro injectionibus
Раствор эуфиллина 24% для инъекций	Solutio(-onis) Euphyllini 24% pro injectionibus
Таблетки эуфиллина 0,15 *г*	Tabulettae(-as) Euphyllini 0,15
Эфедрина гидрохлорид	**Ephedrini hydrochloridum(-i)**
Раствор эфедрина гидрохлорида 2% и 3%	Solutio(-onis) Ephedrini hydrochloridi 2% et 3%
Раствор эфедрина гидрохлорида 5% для инъекций	Solutio(-onis) Ephedrini hydrochloridi 5% pro injectionibus
Раствор эфедрина гидрохлорида 5% для инъекций в шприц-тюбиках	Solutio(-onis) Ephedrini hydrochloridi 5% pro injectionibus in spritz-tubulis
Таблетки эфедрина гидрохлорида 0,025 *г*	Tabulettae(-as) Ephedrini hydrochloridi 0,025
Таблетки эфедрина гидрохлорида 0,002 *г*, 0,003 *г* или 0,01 *г* для детей	Tabulettae(-as) Ephedrini hydrochloridi 0,002, 0,003 aut 0,01 pro infantibus
Таблетки эфедрина гидрохлорида, димедрола по 0,01 *г* для детей	Tabulettae(-as) Ephedrini hydrochloridi, Dimedroli aa 0,01 pro infantibus
Эфир медицинский	**Aether(-eris) medicinalis(-is)**
Эфир для наркоза	**Aether(-eris) pro narcosi**
Эфир для наркоза стабилизированный	**Aether(-eris) pro narcosi stabilisatus(-i)**

II. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

Амми зубная (смесь плодов с половой)	**Ammi visnaga(-ae) (mixtio fructuum cum palea)**
Бадяга	**Spongilla(-ae)**
Боковой побег алоэ древовидного свежий	**Turio(-onis) Aloës arborescentis recens(-ntis)**
Брикет корневищ и корней девясила	**Briketum rhizomatum et radicum Inulae**
Брикет корневищ с корнями валерианы	**Briketum rhizomatum cum radicibus Valerianae**
Брикет корневища лапчатки	**Briketum rhizomatis Tormentillae**
Брикет листа брусники	**Briketum folii Vitis idaeae**
Брикет листа крапивы	**Briketum folii Urticae**
Брикет листа подорожника большого	**Briketum folii Plantaginis majoris**
Брикет листа сенны	**Briketum folii Sennae**
Брикет листа эвкалипта	**Briketum folii Eucalypti**
Брикет почечного чая	**Briketum folii Orthosiphonis**
Брикет травы душицы	**Briketum herbae Origani**

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Брикет травы зверобоя	Briketum herbae Hyperici
Брикет травы хвоща	Briketum herbae Equiseti arvensis
Брикет травы череды	Briketum herbae Bidentis
Бутоны софоры японской	Alabastra(-orum) Sophorae japonicae
Клубнелуковица безвременника свежая	Bulbotuber(-eris) Colchici recens (-ntis)
Клубни с корнями стефании гладкой	Tubera(-um) cum radicibus Stephaniae glabrae
Кора дуба	Cortex(-icis) Quercus
Кора калины	Cortex(-icis) Viburni
Кора корней хлопчатника	Cortex(-icis) radicum Gossypii
Кора крушины	Cortex(-icis) Frangulae
Кора обвойника	Cortex(-icis) Periplocae graecae
Кора хинная	Cortex(-icis) Chinae (Cinchonae)
Кора эвкомии	Cortex(-icis) Eucommiae
Корень алтея	Radix(-icis) Althaeae
Корень алтея неочищенный	Radix(-icis) Althaeae cruda(-ae)
Корень аралии маньчжурской	Radix(-icis) Araliae mandshuricae
Корень барбариса обыкновенного	Radix(-icis) Berberidis vulgaris
Корень горичника	Radix(-icis) Peucedani
Корень женьшеня	Radix(-icis) Ginseng
Корень ипекакуаны	Radix(-icis) Ipecacuanhae
Корень истода	Radix(-icis) Polygalae
Корень красавки	Radix(-icis) Belladonnae
Корень мыльный белый туркестанский дробленый	Radix(-icis) Saponariae alba(-ae) turkestanica(-ae) contusa(-ae)
Корень одуванчика	Radix(-icis) Taraxaci
Корень окопника жесткого	Radix(-icis) Symphyti asperi
Корень переступня белого (брионии белой) свежий	Radix(-icis) Bryoniae albae recens(-ntis)
Корень ревеня	Radix(-icis) Rhei
Корень солодки	Radix(-icis) Glycyrrhizae (Liquiritiae)
Корень стальника	Radix(-icis) Ononidis
Корень шлемника байкальского	Radix(-icis) Scutellariae baicalensis
Корень щавеля конского	Radix(-icis) Rumicis conferti
Корневища и корни марены	Rhizomata(-um) et radices(-um) Rubiae
Корневище аира	Rhizoma(-atis) Calami
Корневище аира в порошке	Rhizoma(-atis) Calami pulveratum(-i)
Корневище бадана	Rhizoma(-atis) Bergeniae
Корневище змеевика	Rhizoma(-atis) Bistortae
Корневище касатика (ириса) желтого	Rhizoma(-atis) Iridis pseudacori
Корневище кубышки желтой	Rhizoma(-atis) Nupharis lutei

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Корневище лапчатки	Rhizoma(-atis) Tormentillae
Корневище мужского папоротника	Rhizoma(-atis) Filicis maris
Корневище и корень вздутоплодника сибирского	Rhizoma(-atis) et radix(-icis) Phlojodicarpi sibirici
Корневище и корень девясила резаные	Rhizoma(-atis) concisum(-i) et radix(-icis) concisa(-ae) Inulae
Корневище и корень кендыря коноплевого	Rhizoma(-atis) et radix(-icis) Apocyni cannabini
Корневище и корень кровохлебки	Rhizoma(-atis) et radix(-icis) Sanguisorbae
Корневище и корень лабазника шестилепестного	Rhizoma(-atis) et radix(-icis) Filipendulae hexapetalae
Корневище и корень пиона уклоняющегося	Rhizoma(-atis) et radix(-icis) Paconiae anomalae
Корневище и корень элеутерококка	Rhizoma(-atis) et radix(-icis) Eleutherococci
Корневище и корни барвинка прямого	Rhizoma(-atis) et radices(-icum) Vincae erectae
Корневище с корнями валерианы	Rhizoma(-atis) cum radicibus Valerianae
Корневище с корнями валерианы свежие	Rhizoma(-atis) cum radicibus Valerianae recens(-ntis)
Корневище с корнями диоскореи кавказской	Rhizoma(-atis) cum radicibus Dioscoreae caucasicae
Корневище с корнями диоскореи ниппонской	Rhizoma(-atis) cum radicibus Dioscoreae nipponicae
Корневище с корнями заманихи	Rhizoma(-atis) cum radicibus Echinopanacis
Корневище с корнями крестовника ромболистного	Rhizoma(-atis) cum radicibus Senecionis rhombifolii
Корневище с корнями левзеи	Rhizoma(-atis) cum radicibus Leuzeae
Корневище с корнями морозника красноватого	Rhizoma(-atis) cum radicibus Hellebori purpurescentis
Корневище с корнями подофилла щитовидного	Rhizoma(-atis) cum radicibus Podophylli peltati
Корневище с корнями родиолы розовой	Rhizoma(-atis) cum radicibus Rhodiolae roseae
Корневище с корнями синюхи	Rhizoma(-atis) cum radicibus Polemonii
Корневище с корнями цимицифуги даурской	Rhizoma(-atis) cum radicibus Cimicifugae dahuricae
Корневище с корнями чемерицы	Rhizoma(-atis) cum radicibus Veratri
Корневище с корнями эхинацей пурпурной свежие	Rhizoma(-atis) cum radicibus Echinaceae purpureae recens(-ntis)
Кукурузные рыльца	Stigmata(-um) Maydis
Ликоподий	Lycopodium(-i)
Лист алоэ древовидного свежий	Folium(-i) Aloës arborescentis recens(-ntis)
Лист алоэ древовидного сухой	Folium(-i) Aloës arborescentis siccum(-i)
Лист барбариса обыкновенного	Folium(-i) Berberidis vulgaris
Лист белены	Folium(-i) Hyoscyami
Лист белокопытника (подбела) гибридного	Folium(-i) Petasitis hybridi
Лист брусники	Folium(-i) Vitis idaeae
Лист дурмана	Folium(-i) Stramonii
Лист земляники	Folium(-i) Fragariae
Лист катарантуса розового	Folium(-i) Catharanthi rosei
Лист копытня европейского свежий	Folium(-i) Asari europaei recens(-ntis)
Лист крапивы	Folium(-i) Urticae
Листьев крапивы 30,0	Foliorum Urticae 30,0
Плодов рябины 70,0	Fructuum Sorbi 70,0

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Лист красавки	Folium(-i) Belladonnae
Лист лаконоса американского (фитолакки американской)	Folium(-i) Phytolaccae americanae
Лист магнолии крупноцветковой	Folium(-i) Magnoliae grandiflorae
Лист мать-и-мачехи	Folium(-i) Farfarae
Лист мать-и-мачехи резано-прессованный	Folium(-i) Farfarae conciso-compressum(-i)
Лист мимозы стыдливой свежий	Folium(-i) Mimosae pudicae recens(-ntis)
Лист мяты перечной	Folium(-i) Menthae piperitae
Лист мяты перечной в порошке	Folium(-i) Menthae piperitae pulveratum(-i)
Лист наперстянки	Folium(-i) Digitalis
Лист наперстянки пурпуровой в порошке	Folium(-i) Digitalis purpureae pulveratum(-i)
Лист наперстянки шерстистой	Folium(-i) Digitalis lanatae
Лист олеандра	Folium(-i) Oleandri
Лист омелы белой свежий	Folium(-i) Visci albi recens(-ntis)
Лист подорожника большого резаный	Folium(-i) Plantaginis majoris concisum(-i)
Лист сенны	Folium(-i) Sennae
Лист смоковницы обыкновенной (инжира)	Folium(-i) Ficus caricae
Лист стеркулии	Folium(-i) Sterculiae
Лист токсикодендрона свежий	Folium(-i) Toxicodendri recens(-ntis)
Лист толокнянки	Folium(-i) Uvae ursi
Лист трилистника водяного	Folium(-i) Menyanthidis (Trifolii fibrini)
Лист унгернии Виктора резаный	Folium(-i) Ungerniae Victoris concisum(-i)
Лист шалфея	Folium(-i) Salviae
Лист эвкалипта	Folium(-i) Eucalypti
Лист эвкалипта прутовидного	Folium(-i) Eucalypti viminalis
Лишайники	Lichenes
Луб бархата амурского	Suber Phellodendri amurensis
Лук репчатый свежий	Bulbus(-i) Allii cepae
Морская капуста — слоевища ламинарии	Laminaria(-ae)
Плод айланта	Fructus(-us) Ailanthi
Плод аммии большой	Fructus(-us) Ammi majoris
Плод аммии зубной	Fructus(-us) Ammi visnagae
Плод аморфы кустарниковой	Fructus(-us) Amorphae fruticosae
Плод аниса	Fructus(-us) Anisi vulgaris
Плод аронии черноплодной (рябины черноплодной) свежий	Fructus(-us) Aroniae melanocarpae recens(-ntis)
Плод боярышника	Fructus(-us) Crataegi
Плод дурмана индейского	Fructus(-us) Daturae innoxiae
Плод жостера	Fructus(-us) Rhamni catharticae
Плод калины	Fructus(-us) Viburni

Наименование препарата		Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)	
Плод кориандра		**Fructus(-us) Coriandri**	
Плод лимонника		**Fructus(-us) Schizandrae**	
Плод малины		**Fructus(-us) Rubi idaei**	
Плод можжевельника		**Fructus(-us) Juniperi communis**	
Плод мордовника		**Fructus(-us) Echinopsis**	
Плод моркови дикой		**Fructus(-us) Dauci carotae**	
Плод облепихи свежий		**Fructus(-us) Hippophaës recens(-ntis)**	
Плод пастернака посевного		**Fructus(-us) Pastinacae sativae**	
Плод псоралеи костянковой		**Fructus(-us) Psoraleae drupaceae**	
Плод софоры японской		**Fructus(-us) Sophorae japonicae**	
Плод стручкового перца резаный		**Fructus(-us) Capsici concisus(-i)**	
Плод тмина		**Fructus(-us) Carvi**	
Плод укропа огородного		**Fructus(-us) Anethi graveolentis**	
Плод фенхеля		**Fructus(-us) Foeniculi**	
Плод черемухи		**Fructus(-us) Pruni padi**	
Плод черники		**Fructus(-us) Myrtilli**	
Плод шиповника		**Fructus(-us) Rosae**	
Побеги брусники		**Turiones(-onum) Vitis idaeae**	
Побеги секуринеги		**Turiones(-onum) Securinegae**	
Побеги толокнянки		**Turiones(-onum) Uvae ursi**	
Порошок корневища и корней валерианы		**Pulvis(-eris) rhizomatis et radicum Valerianae**	
Порошок солодкового корня сложный		**Pulvis(-eris) radicis Glycyrrhizae compositus(-i)**	
Почечный чай		**Folium(-i) Orthosiphonis**	
Почки березовые		**Gemmae(-arum) Betulae**	
Почки сосновые резаные		**Gemmae(-arum) (Turiones) Pini concisae(-arum)**	
Почки тополя		**Gemmae(-arum) Populi**	
Рожки спорыньи эрготаминового штамма		**Cornua(-uum) Secalis cornuti stamm Ergotamini**	
Рожки спорыньи эрготоксинового штамма		**Cornua(-uum) Secalis cornuti stamm Ergotoxini**	
Рябина сушеная (плоды)		**Fructus(-uum) Sorbi exsiccati**	
Салеп		**Tuber(-eris) Salep**	
Сбор ветрогонный		**Species(-erum) carminativae(-arum)**	
Состав:		Compositio:	
Листьев мяты перечной	33,3 *г*	Foliorum Menthae piperitae	33,3
Плодов фенхеля	33,3 *г*	Fructuum Foeniculi	33,3
Корневищ с корнями валерианы	33,3 *г*	Rhizomatum cum radicibus Valerianae	33,3
Сбор грудной № 1		**Species(-erum) pectorales(-ium) N 1**	
Состав:		Compositio:	
Корня алтея	40 *г*	Radicis Althaeae	40,0
Листьев мать-и-мачехи	40 *г*	Foliorum Farfarae	40,0
Травы душицы	20 *г*	Herbae Origani	20,0

Наименование препарата		Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)	
Сбор грудной № 2		**Species(-erum) pectorales(-ium) N 2**	
Состав:		Compositio:	
Листьев мать-и-мачехи	40 г	Foliorum Farfarae	40,0
Листьев подорожника	30 г	Foliorum Plantaginis	30,0
Корня солодки	30 г	Radicis Glycyrrhizae	30,0
Сбор грудной № 3		**Species(-erum) pectorales(-ium) N 3**	
Сбор для возбуждения аппетита		**Species(-erum) amarae(-arum)**	
Состав:		Compositio:	
Травы полыни горькой	80 г	Herbae Absinthii	80,0
Травы (или цветков) тысячелистника	20 г	Herbae (aut florum) Millefolii	20,0
Сбор желудочный № 3		**Species(-erum) stomachicae(-arum) № 3**	
Состав:		Compositio:	
Коры крушины измельченной	30 г	Corticis Frangulae concisi	30,0
Листьев крапивы измельченных	30 г	Foliorum Urticae concisorum	30,0
Листьев мяты перечной измельченных	10 г	Foliorum Menthae piperitae concisorum	10,0
Корневищ с корнями валерьяны измельченных	10 г	Rhizomatum cum radicibus Valerianae concisorum	10,0
Корневищ аира измельченных	10 г	Rhizomatum Calami concisorum	10,0
Сбор желчегонный		**Species(-erum) cholagogae(-arum)**	
Состав:		Compositio:	
Цветков бессмертника песчаного	40 г	Florum Helichrysi arenarii	40,0
Листьев трилистника водяного	30 г	Foliorum Menyanthidis	30,0
Листьев мяты перечной	20 г	Foliorum Menthae piperitae	20,0
Плодов кориандра	20 г	Fructuum Coriandri	20,0
Сбор желчегонный № 2		**Species(-erum) cholagogae(-arum) N 2**	
Состав:		Compositio:	
Цветков бессмертника песчаного, отделенных от остатков стеблей	40 г	Florum Helichrysi arenarii	40,0
Травы или цветков тысячелистника измельченных	20 г	Herbae aut florum Millefolii concisorum	20,0
Листьев мяты перечной измельченных	20 г	Foliorum Menthae piperitae concisorum	20,0
Плодов кориандра	20 г	Fructuum Coriandri	20,0
Сбор мочегонный № 2		**Species(-erum) diureticae(-arum) N 2**	
Состав:		Compositio:	
Листьев толокнянки	40 г	Foliorum Uvae ursi	40,0
Корней солодки	20 г	Radicum Glycyrrhizae	20,0
Плодов можжевельника	40 г	Fructuum Juniperi	40,0
Сбор потогонный № 1		**Species(-erum) diaphoreticae(-arum) N 1**	
Состав:		Compositio:	
Плодов малины	50 г	Fructuum Rubi idaei	50,0
Цветков липы	50 г	Florum Tiliae	50,0
Сбор потогонный № 2		**Species(-erum) diaphoreticae(-arum) N 2**	
Состав:		Compositio:	
Плодов малины	40 г	Fructuum Rubi idaei	40,0

Наименование препарата		Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)	
Листьев мать-и-мачехи	40 г	Foliorum Farfarae	40,0
Травы душицы	20 г	Herbae Origani	20,0
Сбор противоастматический		Species(-erum) antiasthmaticae(-arum)	
Сбор противогеморроидальный		Species(-erum) antihaemorrhoidales(-ium)	
Сбор слабительный № 1		Species(-erum) laxantes(-ntium) N 1	
Сбор для приготовления микстуры по прописи М. Д. Здренко		Species(-erum) Zdrenko pro praeparatione mixturae Zdrenco	
Свежая зеленая масса каланхое (побеги каланхое)		Cornua Kalanchoes recentia	
Семя горчицы		Semen(-inis) Sinapis nigrae	
Семя джута		Semen(-inis) Corchori	
Семя дурмана индейского		Semen-(-inis) Daturae innoxiae	
Семя лимонника		Semen(-inis) Sehizandrae	
Семя льна		Semen(-inis) Lini	
Семя миндаля сладкого		Semen(-inis) Amygdali dulcis	
Семя подорожника блошного		Semen(-inis) Plantaginis psyllii	
Семя строфанта		Semen(-inis) Strophanthi	
Семя тыквы		Semen(-inis) Cucurbitae	
Семя чилибухи		Semen(-inis) Strychni	
Соплодия ольхи		Fructus Alni	
Спорынья		Secale(-is) cornutum(-i)	
Столбики с рыльцами кукурузы резано-прессованные		Styli(-orum) cum stigmatis Maydis conciso-compressi(-orum)	
Трава аврана		Herba(-ae) Gratiolae	
Трава аконита джунгарского свежая		Herba(-ae) Aconiti soongorici recens(-ntis)	
Трава астрагала шерстисто-цветкового		Herba(-ae) Astragali dasyanthi	
Трава багульника болотного		Herba(-ae) Ledi palustris	
Трава василистника вонючего		Herba(-ae) Thalictri foetidi	
Трава василистника малого		Herba(-ae) Thalictri minoris	
Трава водяного перца		Herba(-ae) Polygoni hydropiperis	
Трава володушки многожильчатой		Herba(-ae) Bupleuri multinervis	
Трава гармалы обыкновенной		Herba(-ae) Pegani harmalae	
Трава горицвета		Herba(-ae) Adonidis vernalis	
Трава горца почечуйного (почечуйная трава)		Herba(-ae) Polygoni persicariae	
Трава горца птичьего (опорыша)		Herba(-ae) Polygoni avicularis	
Трава душицы		Herba(-ae) Origani vulgaris	
Трава желтушника раскидистого (желтушника серого)		Herba(-ae) Erysimi diffusi (Erysimi canescentis)	
Трава желтушника раскидистого свежая		Herba(-ae) Erysimi diffusi recens (-ntis)	
Трава живокости сетчатоплодной		Herba(-ae) Delphinii dictyocarpi	
Трава живокости спутанной		Herba(-ae) Delphinii confusi	
Трава живучки лаксмана		Herba(-ae) Ajugae Laxmannii	

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Трава зверобоя	Herba(-ae) Hyperici
Трава золототысячника	Herba(-ae) Centaurii
Трава зопника колючего	Herba(-ae) Phlomidis pungentis
Трава красавки	Herba(-ae) Belladonnae
Трава крестовника плосколистного	Herba(-ae) Senecionis platyphylloidis
Трава ландыша	Herba(-ae) Convallariae
Трава лапчатки серебристой	Herba(-ae) Potentillae argenteae
Трава маклейи	Herba(-ae) Maclejae
Трава мачка желтого	Herba(-ae) Glancii flavi
Трава наперстянки реснитчатой	Herba(-ae) Digitalis ciliatae
Трава осоки парвской	Herba(-ae) Caricis brevicollis
Трава очитки большого свежая	Herba(-ae) Sedi majoris recens(-ntis)
Трава пассифлоры	Herba(-ae) Passiflorae
Трава пастушьей сумки	Herba(-ae) Bursae pastoris
Трава пиона уклоняющегося	Herba(-ae) Paeoniae anomalae
Трава плауна-баранца	Herba(-ae) Huperziae selaginis
Трава подорожника блошного свежая	Herba(-ae) Plantaginis psyllii recens(-ntis)
Трава полыни горькой	Herba(-ae) Absinthii
Трава полыни обыкновенной (чернобыльника)	Herba(-ae) Artemisiae vulgaris
Трава полыни таврической	Herba(-ae) Artemisiae tauricae
Трава пустырника	Herba(-ae) Leonuri
Трава пустырника резано-прессованная	Herba(-ae) Leonuri conciso-compressa(-ae)
Трава руты душистой свежая	Herba(-ae) Rutae graveolentis recens(-ntis)
Трава софоры толстоплодной	Herba(-ae) Sophorae pachycarpae
Трава сухоцвета однолетнего	Herba(-ae) Xeranthemi annui
Трава сушеницы топяной	Herba(-ae) Gnaphalii uliginosi
Трава сферофизы	Herba(-ae) Sphaerophysae salsulae
Трава термопсиса	Herba(-ae) Thermopsidis
Трава термопсиса очередноцветкового	Herba(-ae) Thermopsidis alterniforae
Трава тимьяна	Herba(-ae) Thymi
Трава тысячелистника	Herba(-ae) Millefolii
Трава фиалки трехцветной резаная (анютины глазки, иван-да-марья)	Herba(-ae) Violae tricoloris concisa(-ae)
Трава хвоща полевого	Herba(-ae) Equiseti arvensis
Трава хвоща резано-прессованная	Herba(-ae) Equiseti conciso-compressa(-ae)
Трава чабреца	Herba(-ae) Serpylli
Трава череды трехраздельной	Herba(-ae) Bidentis tripartiti
Трава чистеца буквицецветного	Herba(-ae) Stachysis betonicaeflorae
Трава чистотела	Herba(-ae) Chelidonii
Трава шалфея эфиопского	Herba(-ae) Salviae Aethiopidis

Наименование препарата	Наименование препарата на латинском языке (в скобках окончание в родительном падеже)
Трава эфедры хвощевой горной	Herba(-ae) Ephedrae equisetinae (montanae)
Трава якорцев стелющихся	Herba(-ae) Tribuli terrestris
Хмель (шишки)	Fructus(-uum) Humulus(-i) lupulus(-i)
Цветки арники	Flores(-um) Arnicae
Цветки бессмертника песчаного	Flores(-um) Helichrysi arenarii
Цветки бессмертника песчаного резано-прессованные	Flores(-um) Helichrysi arenarii conciso-compressi(-orum)
Цветки боярышника	Flores(-um) Crataegi
Цветки бузины черной	Flores(-um) Sambuci nigrae
Цветки василька синего	Flores(-um) Centaureae cyani
Цветки и листья лагохилуса (зайцегуба)	Flores(-um) et Folia(-orum) Lagochili
Цветки липы	Flores(-um) Tiliae
Цветки ноготков	Flores(-um) Calendulae
Цветки ноготков в порошке	Flores(-um) Calendulae pulverati(-orum)
Цветки пижмы	Flores(-um) Tanaceti
Цветки ромашки	Flores(-um) Chamomillae
Цветки ромашки далматской	Flores(-um) Pyrethri cinerariifolii
Цветки ромашки кавказской	Flores(-um) Pyrethri carnei
Цветки тысячелистника	Flores(-um) Millefolii
Цветки цитварной полыни	Flores(-um) Cinae
Чага березовый гриб	Fungus(-i) betulinus(-i)
Чай успокоительный	Species(-erum) sedativae(-arum)
Чеснок свежий	Bulbus(-i) Allii sativi recens(-ntis)
Ягоды лесной земляники	Fructus(-uum) Fragariae vescae
Ягоды черной смородины	Fructus(-uum) Ribis nigri